I.C.M.S.C.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS DE SÃO CARLOS

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM
HOMOLOGIA PRÉ-FIXADA

LAÉRCIO APARECIDO LUCAS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SÃO CARLOS - SÃO PAULO
BRASIL

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM
HOMOLOGIA PRÉ-FIXADA

LAÉRCIO APARECIDO LUCAS

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA AO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS DE
SÃO CARLOS - USP, PARA OBTENÇÃO DO TÍ-
TULO DE MESTRE EM MATEMÁTICA.

Orientador: Prof. Dr. Oziride Manzoli Neto

SÃO CARLOS

1984

A Jô
e meus pais.

A G R A D E C I M E N T O S

Ao Prof. Dr. Ozíride Manzoli Neto, não só pela orientação como também pela amizade e paciência que sempre me dedicou durante toda esta jornada.

Aos professores Dr. Gilberto F. Loibel, Dr. Roberto de Carvalho Engler Pinto e Dr. Carlos Biasi pelo apoio e atenção.

Aos professores da AFA pela colaboração e compreensão que sempre me dedicaram

À Neube Elisabeth D.G. Stabili, pelo trabalho de datilografia.

Este trabalho contou com o apoio das instituições: CNPq e CAPES.

CONSTRUCTION OF SPACES WITH PRE-ASSIGNED HOMOLOGY

A B S T R A C T

The purpose of this work is the realization of certain families of abelian groups as homology of topological spaces.

The case of realization by manifolds is studied in dimensions ≤ 4 . The lens space are important for these condition and a carefull study of them is made.

Some tools from Algebraic and Differential Topology is used and briefly presented.

INDICE

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I

Preliminares

§1 - Resultados Básicos de Álgebra e Álgebra Homológica...	1
§2 - Topologia de Identificação	7
§3 - Ação de Grupos	10
§4 - Grupos de Homotopia	11
§5 - Grupos de Homologia e Cohomologia de espaços :.....	14

CAPÍTULO II

Resultados sobre Homologia, Cohomologia e Grupo Fundamental de Variedades

§1 - Soma Conexa	24
§2 - Colagem de Variedades através dos bordos.....	27
§3 - Cirurgia	29
§4 - Grau de Aplicação Diferenciável	32
§5 - Resultados Gerais sobre Grupos de Homologia e Variedades.....	33

CAPÍTULO III

Espaços Lenticulares

§1 - Espaços Lenticulares obtidos por Ação de Grupos.....	35
§2 - Espaços Lenticulares por classificação de Nós no Toro	52
§3 - Espaços Lenticulares - Definição Clássica	66
§4 - Espaços Lenticulares como Espaço de Órbita de Ação de Z_p em S^3	69

CAPÍTULO IV

Construção de Espaços com Homologia Pré-Fixada

§1 - Realização por C.W.....	74
§2 - Realização por Variedades Diferenciáveis de dimensão 3	76
§3 - Realização por Variedades Diferenciáveis de dimensão 4	77
BIBLIOGRAFIA	85

I N T R O D U Ç Ã O

Este trabalho tem como objetivo a construção de espaços com invariantes pré-estabelecidos. Inicialmente fizemos um estudo para espaços topológicos e em seguida para variedades diferenciáveis.

No caso das variedades, há certas peculiaridades devendo satisfazer às condições especiais, tais como dualidades, e isto restringe muito as seqüências de grupos a serem realizados.

Apresentamos o trabalho em quatro capítulos.

No Capítulo I, apresentamos algumas definições e resultados básicos que nos serão úteis no decorrer do trabalho.

No Capítulo II, estudamos alguns resultados sobre variedades no que diz respeito aos grupos de homologia, soma conexa e cirurgia, além disso, para obtermos certas variedades com H_1 pré estabelecido tivemos que recorrer ao processo de cirurgia.

No Capítulo III, apresentamos algumas descrições dos espaços lenticulares, que são básicas para as construções do capítulo seguinte, e também, calculamos seus grupos de homologia.

No Capítulo IV é desenvolvido o trabalho de realização.

Fixamos seqüências de grupos abelianos e fazemos a realização dos mesmos como homologia de espaços topológicos e de variedades considerando neste último caso as restrições necessárias.

CAPÍTULO I

PRELIMINARES

Neste capítulo faremos uma exposição de definições e resultados básicos sobre Grupos Abelianos, Ação de Grupos, Topologia de Identificação, Topologia Algébrica e Diferencial, que serão necessários para o desenvolvimento dos capítulos posteriores.

Para maiores detalhes sobre as proposições apresentadas ver [5], [7], [9], [11] e [18].

§1 - Resultados Básicos de Álgebra e Álgebra Homológica

Dado um grupo abeliano G , denotaremos $T(G)$ sua parte de torção, isto é, $T(G) = \{g \in G \mid g^n = e \text{ para algum } n > 0\}$.

Se $T(G) = \{e\}$, G é dito livre de torção.

Todo grupo abeliano G finitamente gerado se escreve $G \cong T(G) \oplus \mathbb{Z}^m$ onde a parte de torção $T(G)$ é finita e m é inteiro positivo.

Definição 1.1

Se G é finitamente gerado então o inteiro m acima descrito é chamado rank G .

Note-se que G grupo abeliano significa que G é módulo sobre $\mathbb{Z}$.

Proposição 1.2 (Teorema fundamental dos grupos abelianos finitos)

Todo grupo abeliano finito G , $G \neq \{e\}$ é soma direta de uma família $\{G_i\}_{1 \leq i \leq r}$ de p -subgrupos cíclicos não nulos; além disso, o número destes grupos cíclicos e suas ordens são determinados de modo único pelo grupo G .

Uma consequência do teorema acima é que temos então uma classificação dos grupos finitamente gerados dada pelo rank G e pela caracterização de $T(G)$ dada pelo Teorema fundamental.

Seja $(G_i)_{i \in J}$ uma família qualquer de grupos, $\prod_{i \in J} G_i$ o produto direto da família $(G_i)_{i \in J}$, isto é, o produto cartesiano munido da lei de composição $(g_i).(g'_i) = (g_i g'_i)$.

O produto direto fraco é o subgrupo $\prod_{i \in J} G_i$ constituído das famílias $(g_i)_{i \in J}$ tais que $g_i \neq 1$ só para um número finito de índices.

O produto direto fraco pode ser caracterizado pela propriedade: Sejam G um grupo e $\phi_i: G_i \rightarrow G$ uma família de homomorfismos

(PDF) Para todo grupo abeliano A e toda família de homomorfismos $\psi_i: G_i \rightarrow A$, existe um e um único homomorfismo $f: G \rightarrow A$ que torna comutativo todos os diagramas abaixo com $i \in J$.

Teorema 1.3

Dados grupos abelianos G_i e uma família de homomorfismos $\phi_i: G_i \rightarrow G$, então $G = \pi'_{i \in J} G_i$ se e somente se está satisfeita a propriedade. (PDF)

Teorema 1.4

Seja $(G_i)_{i \in J}$ uma família de grupos abelianos, $G = \pi'_{i \in J} G_i$ seu produto livre e $[G, G]$ o subgrupo dos comutadores de G .

Então, $G/[G, G] \cong \pi'_{i \in J} G_i$ onde $\pi'_{i \in J} G_i$ é o produto direto fraco da família.

Uma generalização do teorema 1.4 pode ser dada por:

Se G' indica o subgrupo dos comutadores de um grupo G , e $G = \pi'_{i \in J} G_i$ é o produto livre de uma família qualquer de grupos G_i , então: $G/G' \cong \pi'_{i \in J} (G_i/G'_i)$.

Observação 1: O produto livre, mesmo de grupos abelianos é em geral um grupo não abeliano.

Observação 2: Os grupos livres podem ser caracterizados pela propriedade universal: "Seja $S \subseteq G$ sistema de geradores $i: S \rightarrow G$ a inclusão.

Para todo grupo H e toda função $\phi: S \rightarrow H$, existe um homomorfismo $\phi': G \rightarrow H$ tal que $\phi'.i = \phi$."

Proposição 1.5

Sejam p, q primos e m, n inteiros positivos quaisquer. Então $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_n$; $\mathbb{Z}_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_n$, $\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{(m,n)}$

e $Z_p \otimes_Z Z_q \cong 0$ $\text{Tor}_Z(Z, Z_n) = 0$; $\text{Tor}_Z(Z_p, Z_p) \cong Z_p$; $\text{Tor}_Z(Z_m, Z_n) \cong Z_{(m,n)}$; $\text{Tor}_Z(Z_p, Z_q) = 0$ onde (m,n) é o máximo divisor comum de m e n .

Observação: Suponhamos que $G_1 \cong Z^m \oplus T(G_1)$ e $G_2 \cong Z^n \oplus T(G_2)$ e passemos a calcular o $\text{Tor}_Z(G_1, G_2)$.

$$\begin{aligned} \text{Tor}_Z(G_1, G_2) &= \text{Tor}_Z(Z^m \oplus T(G_1), Z^n \oplus T(G_2)) = \\ &= \text{Tor}_Z(Z^m, Z^n) \oplus \text{Tor}_Z(Z^m, T(G_2)) \oplus \text{Tor}_Z(T(G_1), Z^n) + \\ &+ \text{Tor}_Z(T(G_1), T(G_2)) \cong \text{Tor}_Z(T(G_1), T(G_2)). \end{aligned}$$

$$\text{Como } T(G_1) \cong \bigoplus_{i=1}^n Z_{P_i}^{\alpha_i} \text{ e } T(G_2) \cong \bigoplus_{j=1}^m Z_{P_j}^{\beta_j} \text{ então}$$

podemos escrever

$$\begin{aligned} \text{Tor}_Z(G_1, G_2) &\cong \text{Tor}_Z\left(\bigoplus_{i=1}^n Z_{P_i}^{\alpha_i}, \bigoplus_{j=1}^m Z_{P_j}^{\beta_j}\right) \cong \bigoplus_{i,j} \text{Tor}_Z(Z_{P_i}^{\alpha_i}, Z_{P_j}^{\beta_j}) \cong \\ &\cong \bigoplus_{\{i/P_i=P_j\}} \text{Tor}_Z(Z_{P_i}^{\alpha_i}, Z_{P_i}^{\beta_i}) \cong \bigoplus_{\{i/P_i=P_j\}} Z_{P_i}^{\alpha_i + \beta_i} \end{aligned}$$

Portanto

$$\text{Tor}_Z(G_1, G_2) \cong \bigoplus_{\{i/P_i=P_j\}} Z_{P_i}^{\alpha_i + \beta_i}$$

Complexo de Cadeias e Cocadeias - Homologia e Cohomologia

Definição 1.6

Um complexo de cadeias $C = (C_q, \partial_q)$ é definido

por um par de seqüências: uma seqüência de grupos abelianos

$(C_q)_{q \in \mathbb{Z}}$ e uma seqüência de homomorfismos $\partial_q: C_q \rightarrow C_{q-1}$ tal que $\partial_{q-1} \circ \partial_q = 0$ para todo $q \in \mathbb{Z}$.

Nas aplicações que faremos desta noção teremos normalmente $C_p = (0)$ se $p < 0$; além disso, freqüentemente, um complexo de cadeias será representado por um diagrama

$$\dots \rightarrow C_{p+1} \xrightarrow{\partial_{p+1}} C_p \xrightarrow{\partial_p} C_{p-1} \rightarrow \dots$$

A um complexo de cadeias $C = (C_q, \partial_q)$ se associa de modo natural certos subgrupos dos grupos de cadeias C_q .

Os homomorfismos ∂_q são denominados operadores de bordo, os elementos de C_q são chamados q-cadeias, o grupo $Z_q(C) = \text{Ker } \partial_q$ é chamado grupo dos q-ciclos, o grupo $B_q(C) = \text{Im } \partial_{q+1}$ é chamado grupo dos q-bordos e o grupo quociente $H_q(C) = \frac{Z_q(C)}{B_q(C)}$ é chamado q-ésimo grupo de homologia do complexo C .

A seqüência $\dots \rightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\alpha_{q+1}} C_q \xrightarrow{\alpha_q} C_{q-1} \rightarrow \dots$ é dita exata em C_q se $\text{Ker } \alpha_q = \text{Im } \alpha_{q+1}$.

Observação: Para um complexo de cadeias C , o grupo de homologia

$H_q(C)$ é uma "medida" de o quanto a seqüência

$\dots \rightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \rightarrow \dots$ não é exata em C_q .

Sejam C um complexo de cadeias e G um grupo abeliano. Podemos formar a cadeia $C \otimes G$, dada por

$\dots \rightarrow C_{q+1} \otimes G \xrightarrow{\partial_{q+1} \otimes 1} C_q \otimes G \xrightarrow{\partial_q \otimes 1} C_{q-1} \otimes G \rightarrow \dots$ onde

$1: G \rightarrow G$ é o homomorfismo identidade.

Definimos $H_q(C, G) = H_q(C \otimes G)$ como sendo o q -ésimo grupo de homologia do complexo C com coeficientes no grupo G .

A relação entre os grupos $H_q(C, G)$ e $H_q(C)$ é dada pelo seguinte:

Teorema 1.7 (Teorema dos Coeficientes Universais para Homologia)

Seja C um complexo de cadeias onde os C_q são grupos livres. Então

$$H_q(C, G) = H_q(C) \otimes G \oplus \text{Tor}(H_{q-1}(C), G)$$

Observação: Se A ou B são grupos livres temos que $\text{Tor}(A, B) = 0$.

Um complexo de cocadeias C é uma sequência $\dots C^q \xrightarrow{\delta^{q+1}} C^{q+1} \xrightarrow{\delta^{q+2}} C^{q+2} \rightarrow \dots$ de grupos abelianos C^q e homomorfismos $\delta^{q+1}: C^q \rightarrow C^{q+1}$ tais que $\delta^{q+1} \circ \delta^q = 0$.

Os homomorfismos δ^{q+1} são chamados operadores cobordos, os elementos de C^q são chamados n -cocadeias.

O grupo $Z^q(C) = \text{Ker } \delta^{q+1}$ é chamado grupo dos n -cocícl^{os}, o grupo $B^q(C) = \text{Im } \delta^q$ é chamado grupo dos n -cobordos e o grupo quociente

$$\frac{Z^q(C)}{B^q(C)} = H^q(C)$$

é chamado q -ésimo grupo de cohomologia do complexo de cocadeias C .

Sejam G grupo abeliano, $C = \{C_q, \partial_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ complexo de cadeias e $C^q = \text{Hom}(C_q, G)$. Consideremos $\alpha \in \text{Hom}(C_{q-1}, G)$.

Seja δ^{q-1} tal que $\delta^{q-1}(\alpha) = \alpha \cdot \partial_q$, então a sequência $\dots \rightarrow C^{q+1} \xrightarrow{\delta^q} C^q \xrightarrow{\delta^{q+1}} C^{q-1} \rightarrow \dots$ é um complexo de cocadeias e

$$H^q(C, G) = \frac{\text{Ker } \delta^{q+1}}{\text{Im } \delta^q}$$

Teorema 1.8 (Coeficientes Universais para Cohomologia)

Se os C_q são livres então:

$$H^n(C, G) = \text{Hom}(H_n(C), G) \oplus \text{Ext}(H_{n-1}(C), G).$$

Observação: Se tivermos A um grupo livre então $\text{Ext}(A, B) = 0$ para todo B .

§ 2 - Topologia de Identificação

Definição 2.1

Sejam X, Y espaços topológicos, $A \subset X$ subconjunto fechado e $f: A \rightarrow Y$ contínua.

O espaço colagem de X e Y por f , será denotado por

$$X \cup_f Y = \frac{X + Y}{R}$$

onde R é uma relação, $aRf(a)$ para cada $a \in A$ e $X + Y$ é reunião disjunta de X e Y .

Teorema 2.2

Sejam $p: X + Y \rightarrow X \cup_f Y$ a projeção e $C \subset X + Y$ tal que $C \cap X$ é fechado em X . Então $p(C)$ é fechado em $X \cup_f Y$ se e somente se $(C \cap Y) \cap f(C \cap A)$ é fechado em Y .

Teorema 2.3 (transgressão)

Sejam $p: X \rightarrow Y$ uma identificação e $h: X \rightarrow Z$ contínua.

Como h é constante em cada fibra $p^{-1}(y)$ fica bem definida $\bar{h}: Y \rightarrow Z$ por $\bar{h}(y) = h(p^{-1}(y))$ a qual é contínua e torna o diagrama comutativo.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & Y \\ h \downarrow & \searrow & \bar{h} = hp^{-1} \\ Z & & \end{array}$$

$\bar{h}: Y \rightarrow Z$ é aberta (fechada) se e somente se $h(U)$ é , aberto (fechado) quando U é aberto (fechado) que satisfaz $U = p^{-1}(p(U))$.

Teorema 2.4

Sejam X colado a Y por $f: A \rightarrow Y$, $A \subset X$ fechado, e $p: X + Y \rightarrow X \cup_f Y$ a aplicação identificação.

Sejam $\phi: X \rightarrow Z$ e $\psi: Y \rightarrow Z$ funções contínuas e seja $(\phi, \psi): X + Y \rightarrow Z$ a única extensão comum. Se ϕ e ψ são consistentes (isto é, $\phi(a) = \psi(f(a))$ para todo $a \in A$) então $(\phi, \psi)p^{-1}: X \cup_f Y \rightarrow Z$ é contínua.

Teorema 2.5

Seja $f: X \rightarrow Y$ contínua e sobrejetora. Então $\bar{f} = f_p^{-1}: \frac{X}{K_f} \rightarrow Y$ é homeomorfismo se e somente se f é uma identificação onde K_f é uma relação em X definida pela f .

Proposição 2.6

Suponha Y subespaço fechado de um espaço de Hausdorff Z e $f: E^n \rightarrow Z$ uma aplicação contínua tal que $f(S^{n-1}) \subset Y$ e leva a n -célula aberta E^n homeomorficamente sobre $Z - Y$. Então Z é obtido de Y por adjunção de uma n -célula E^n pela f/S^{n-1} .

Demonstração:

Consideremos $\phi: E^n \cup Y \rightarrow Z$, $\phi(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in E^n \\ x & \text{se } x \in Y \end{cases}$

e a relação: $x \sim f(x) \iff x \in S^{n-1}$.

Observemos o diagrama abaixo:

Mostraremos que ϕp^{-1} é homeomorfismo.

i) Mostremos que ϕ é sobrejetora.

Seja $y \in Z - Y \xrightarrow{\text{def}} \exists x \in E^n$ tal que $f(x) = y \Rightarrow \Rightarrow f(x) = y = \phi(x)$.

Se $y \in Y \xrightarrow{\text{def}} \phi(y) = y$. Logo, ϕ é sobrejetora.

ii) Mostremos que ϕ é fechada.

Seja $F \underset{\text{fechado}}{\subset} E^n \cup Y$, então $p^{-1}(F) \cap Y$ é fechado em Y e $p^{-1}(F) \cap E^n$ é fechado em E^n .

Como $Y \subset Z$ é fechado, então $p^{-1}(F) \cap Y$ é fechado em Z .

Da definição de ϕ vem que:

$$\phi(p^{-1}(F) \cap Y \cup p^{-1}(F) \cap E^n) = (p^{-1}(F) \cap Y) \cup f(p^{-1}(F) \cap E^n).$$

Resta-nos mostrar que $f(p^{-1}(F) \cap E^n)$ é fechado.

Se $p^{-1}(F) \cap E^n \subset \overset{\circ}{E}^n \Rightarrow f$ é homeomorfismo e portanto

$f(p^{-1}(F) \cap E^n)$ é fechado.

$$\begin{aligned} \text{Se } p^{-1}(F) \cap E^n \subset S^{n-1} \Rightarrow f(p^{-1}(F) \cap E^n) \subset \\ f(S^{n-1}) \subset Y \subset Z \\ \text{fechado} \end{aligned}$$

Logo, $f(p^{-1}(F) \cap E^n)$ é fechado. Portanto, ϕ é fechada.

Sendo ϕ fechada e sobrejetora, ϕ é identificação.

Pelo teorema 2.5 segue-se que ϕp^{-1} é homeomorfismo.

§3 - AÇÃO DE GRUPOS

Definição 3.1

Um grupo G atua sobre um conjunto S , se existir uma aplicação $G \times S \rightarrow S$, $(g, x) \mapsto g.x$, tal que para todo $x \in S$ e $g_1, g_2 \in G$, $ex = x$, $(g_1.g_2)x = g_1(g_2x)$.

Dependendo da estrutura que se tem em S e em G podemos pedir que a ação seja contínua, diferenciável, etc.

Seja $\theta : G \times S \rightarrow S$ uma ação de grupo, então:

- i) A relação em S definida por $x \sim x' \iff gx = x'$ para algum $g \in G$, é uma relação de equivalência e cada classe é chamada órbita de G em S .
- ii) Para cada $x \in S$, $G_x = \{g \in G / gx = x\}$ é um subgrupo chamado grupo de isotropia de x .

Um grupo G de homeomorfismos de um espaço topológico Y é chamado descontínuo se as órbitas de G em Y são subconjuntos discretos de Y . Também dizemos que G é propriamente descontínuo se para $y \in Y$ existe uma vizinhança aberta U de y em Y tal que se $g, g' \in G$ e $gU \cap g'U \neq \emptyset$ então $g = g'$.

§4 - GRUPOS DE HOMOTOPIA

Para maiores detalhes sobre as proposições apresentadas neste parágrafo, bem como suas demonstrações ver [5], [7] e [9].

Seja (X, x_0) um par onde X é um espaço topológico e x_0 um ponto de X .

Descrevemos o grupo fundamental do espaço X com ponto base x_0 , denotado por $\pi_1(X, x_0)$ como o conjunto de todas as classes de homotopia de aplicações contínuas $f: (S^1, p) \rightarrow (X, x_0)$ tais que $f(p) = x_0$.

Também para $n > 1$ denotaremos por $\pi_n(X, x_0)$ o n -ésimo grupo de homotopia de X com ponto base x_0 que pode ser descrito como o conjunto das classes de homotopia de apli-

cações contínuas $f: (S^n, p) \rightarrow (X, x_0)$ tais que $f(p) = x_0$

Definição 4.1

Um espaço topológico X conexo por caminhos é dito simplesmente conexo se $\pi_1(X, x_0) = 0$ para todo $x_0 \in X$.

Proposição 4.2

Se X é um espaço conexo por caminhos, o grupo fundamental independe do ponto base x_0 , isto é, $\pi_1(X, x_0)$ é isomorfo a $\pi_1(X, x_1)$ para quaisquer x_0, x_1 pontos de X .

Proposição 4.3

Dados espaços topológico X, Y e $x_0 \in X, y_0 \in Y$ então $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

Proposição 4.4

$$\pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_n(X, x_0) \oplus \pi_n(Y, y_0)$$

Proposição 4.5

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \text{ e } \pi_n(S^1) = 0 \text{ se } n > 1.$$

Teorema 4.6 (Teorema de Van-Kampen)

Sejam X, X_0, X_1, X_2 espaços topológicos com $X = X_1 \cup X_2$ e $X_0 = X_1 \cap X_2 \neq \emptyset$, X_1 e X_2 abertos, X_0, X_1, X_2 conexos por caminhos.

Seja $p \in X_0$ e consideramos o diagrama comutativo in

duzido pelas inclusões nos grupos fundamentais.

Então as imagens $w_i(\pi_1(X_i, p))$ ($i = 1, 2$) geram $\pi_1(X, p)$.

Além disso, dado um grupo arbitrário H com homomorfismos $\psi_i: \pi_1(X_i, p) \rightarrow H$ satisfazendo $\psi_0 = \psi_1\theta_1 = \psi_2\theta_2$, existe um único homomorfismo $\lambda: \pi_1(X, p) \rightarrow H$ tal que $\psi_i = \lambda.w_i$.

Observação: O teorema de Van-Kampen nos dá a seguinte informação: Se $X = X_1 \cup X_2$, X_1 e X_2 abertos de X , tais que X_1 , X_2 e $X_1 \cap X_2$ são conexos por caminhos, então $\pi_1(X)$ é inteiramente determinado em termos dos grupos $\pi_1(X_1)$, $\pi_1(X_2)$ e $\pi_1(X_1 \cap X_2)$ e dos homomorfismos induzidos pelas inclusões $X_1 \rightarrow X$, $X_2 \rightarrow X$ e $X_1 \cap X_2 \rightarrow X$.

Uma interessante formulação do teorema de Van-Kampen pode ser dada em termos de apresentação de grupos.

Suponhamos que os grupos tenham as seguintes apresentações:

$$\pi_1(X_1) \cong |x_1, x_2, \dots : r_1, r_2, \dots|$$

$$\pi_1(X_2) \cong |y_1, y_2, \dots : s_1, s_2, \dots|$$

$$\pi_1(X_0) \cong |z_1, z_2, \dots : t_1, t_2, \dots|$$

Então o grupo fundamental de X tem a seguinte apresentação:

$$\begin{aligned} \pi_1(X) \cong & |x_1, x_2, \dots, y_1, y_2, \dots : r_1, r_2, \dots, s_1, s_2, \dots, \theta_1(z_1) = \\ & = \theta_2(z_1), \theta_1(z_2) = \theta_2(z_2), \dots| \end{aligned}$$

Observação: Caso $\pi_1(X_0) = 0$ então $\pi_1(X)$ é o produto livre $\pi_1(X_1) * \pi_1(X_2)$.

Proposição 4.7

Seja G um grupo propriamente descontínuo de homeomorfismos de um espaço simplesmente conexo Y . Então o grupo fundamental do espaço das órbitas Y/G é isomorfo a G .

Demonstração

Sendo Y simplesmente conexo então o revestimento $\eta = (Y, p, Y/G)$ é universal, com $p: Y \rightarrow Y/G$ uma projeção de revestimento. Segue-se então que $\text{Aut}(\eta) \cong \pi_1(Y/G)$. Pelo Teorema 17.14 de [13] segue-se que $G = \text{Aut}(\eta) \cong \pi_1(Y/G)$.

§5 - GRUPOS DE HOMOLOGIA E COHOMOLOGIA DE ESPAÇOS

Enunciaremos os axiomas de Eilenberg-Steenrod, empre-

gados para o cálculo efetivo de homologia de espaços topológicos. Como os espaços utilizados são complexos celulares finitos, existe essencialmente uma única teoria de homologia nesta categoria.

Sejam X, Y espaços topológicos e A, B subespaços de X e de Y respectivamente.

Definição 5.1

Uma aplicação $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ é contínua $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow f: X \rightarrow Y$ é contínua e $f(A) \subset B$.

Consideraremos a identificação $X = (X, \phi)$ bem como as inclusões

$$(\phi, \phi) \rightarrow (A, \phi) \begin{array}{l} \nearrow (A, A) \\ \searrow (X, \phi) \end{array} \begin{array}{l} \nearrow (X, A) \\ \searrow (X, X) \end{array}$$

São os seguintes os dados para uma teoria de homologia.

A cada par de espaços (X, A) pode-se associar, de uma maneira bem definida, um grupo $H_q(X, A)$ pertencente à classe Ab dos grupos abelianos, para cada inteiro q ; para cada $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ associamos um homomorfismo $f_* = H(f): H_q(X, A) \rightarrow H_q(Y, B)$. Também para cada par (X, A) e $q \in \mathbb{Z}$, associamos o operador bordo $\partial = \partial(X, A, q): H_q(X, A) \rightarrow H_{q-1}(A)$

A) AXIOMAS-HOMOLOGIA

A.1 : (identidade)

Se $f: (X,A) \rightarrow (X,A)$ é a identidade, então

$$f_*: H_q(X,A) \rightarrow H_q(X,A)$$

é a identidade de $H_q(X,A)$, $\forall q$.

A.2 : Se $f: (X,A) \rightarrow (Y,B)$ e $g: (Y,B) \rightarrow (Z,C)$ são aplicações de pares, então $(g.f)_* = g_* \cdot f_*$.

A.3 : Se $f: (X,A) \rightarrow (Y,B)$ é contínua, então o diagrama abaixo comuta

$$\begin{array}{ccc} H_q(X,A) & \xrightarrow{\partial_A} & H_{q-1}(A) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f'_* \\ H_q(X,B) & \xrightarrow{\partial_B} & H_{q-1}(B) \end{array} \quad f' = f|_A$$

A.4 : (Seqüência exata) Para todo par (X,A) a seqüência de grupos denominada seqüência de homologia do par (X,A) $\rightarrow H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{\partial_*} H_q(X,A) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{q-1}(X) \rightarrow \dots$ é uma seqüência exata.

A.5 : (Homotopia) Se as aplicações $f, g: (X,A) \rightarrow (Y,B)$ são homotópicas então $f_* = g_*$.

A.6 : (Excisão) Se U é um aberto de X tal que $\bar{U}$ está contido no interior de A , então a inclusão

$e: (X-U, A-U) \rightarrow (X, A)$ induz um isomorfismo de grupos

$$e_* : H_q(X-U, A-U) \xrightarrow{\cong} H_q(X, A), \quad \forall q.$$

A.7 : Se $P = \{x_0\}$ então $H_q(P) = 0$ se $q \neq 0$
 $H_0(P) = G$, G é o grupo de coeficientes).

B) COHOMOLOGIA

Uma teoria de cohomologia numa categoria admissível para a teoria de homologia e cohomologia C é uma coleção

$H = \{H^q, *_q, \delta^q\}$ satisfazendo os seguintes axiomas:

I) Se $i: (X, A) \rightarrow (X, A)$ é identidade então

$$i^*_q: H^q(X, A) \rightarrow H^q(X, A) \text{ é identidade.}$$

II) Se $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ e $g: (Y, B) \rightarrow (Z, C)$ então

$$(g \circ f)^*_q = f^*_q \circ g^*_q.$$

III) Se $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ e $f|_A = g: A \rightarrow B$ contínuas. Então

o diagrama é comutativo

$$\begin{array}{ccc} H^{q-1}(B) & \xrightarrow{g^*_q} & H^{q-1}(A) \\ \downarrow \delta^q & \curvearrowright & \downarrow \delta^q \\ H^q(Y, B) & \xrightarrow{f^*_q} & H^q(X, A) \end{array}$$

IV) Se $i: A \rightarrow X$ e $j: X \rightarrow (X, A)$ são as inclusões

então a seqüência infinita é exata:

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow H^{q-1}(X) &\xrightarrow{\delta^q} H^q(X, A) \xrightarrow{j^*_q} H^q(X) \xrightarrow{i^*_q} H^q(A) \rightarrow \\ &\rightarrow H^{q+1}(X, A) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

V) Se f e $g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ são homotópicas então
 $f^*q = g^*q \quad \forall q \in Z.$

VI) Se U é aberto de X tal que $\bar{U} \subset A$ e
 $e : (X-U, A-U) \rightarrow (X, A)$ inclusão, então
 $e^*q : H^q(X, A) \rightarrow H^q(X-U, A-U)$ é isomorfismo $\forall q \in Z.$

VII) Seja P_0 um espaço constituído de um único ponto
então $H^q(P_0) = 0$ se $q \neq 0.$

C) HOMOLOGIA SINGULAR

Definição 5.2

Se X é um espaço topológico, um n -simplexo singular em X é uma aplicação contínua $\sigma : \Delta_n \rightarrow X$ onde Δ_n é o n -simplexo padrão.

Seja $S_n(X)$ o grupo livre gerado por todos os n -simplexos singulares de X .

Note-se que os elementos de $S_n(X)$ não são funções contínuas de Δ_n em X , são combinações lineares formais com coeficientes em Z , de funções contínuas $\Delta_n \rightarrow X$ isto é,

$z_n \in S_n(X)$ se e só se $z_n = \sum_{\sigma} n_{\sigma} \sigma$, $n_{\sigma} \in Z$ e $\sigma : \Delta_n \rightarrow X$.

Os elementos z_n são chamados n -cadeias singulares de X .

Definição 5.3

Passemos agora a definir o operador bordo

$\partial_n : S_n(X) \rightarrow S_{n-1}(X).$

Para um n -simplexo singular em X definimos a i -ésima face $\sigma^{(i)}$ de σ como sendo o $(n-1)$ -simplexo $\sigma \circ F_n^i$ onde $F_n^i : \Delta_{n-1} \rightarrow \Delta_n$, $F_n^i(E_j) = \begin{cases} E_j, & j < i \\ E_{j+1}, & j \geq i \end{cases}$

Assim, o operador bordo de um n -simplexo singular σ em X é uma $n-1$ cadeia dada por: $\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma^{(i)}$.

Como $S_n(X)$ é livre podemos estender ∂_n a $S_n(X)$ por linearidade, isto é, $\partial_n(\sum_{\sigma} v_{\sigma} \sigma) = \sum_{\sigma} v_{\sigma} \partial_n \sigma$.

Observa-se que $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$, isto é, a sequência $\dots \rightarrow S_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X) \dots$ é um complexo de cadeias singular de X sobre Z .

Definimos $H_n(X, Z) = \frac{\text{Ker } \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}}$ e denominamos n -ésimo grupo de homologia do espaço X com coeficientes em Z . Denotaremos $H_n(X, Z)$ simplesmente por $H_n(X)$.

Seja A um subespaço de X . Desde que a inclusão $i : A \rightarrow X$ é contínua, cada n -simplexo de A é tomado como um n -simplexo de X por $\Delta_n \xrightarrow{\sigma} A \xrightarrow{i} X$. Assim $\dots \rightarrow S_{n+1}(A) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(A) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(A) \rightarrow \dots$ é um subcomplexo de cadeias de $\dots \rightarrow S_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(X) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X) \rightarrow \dots$

Podemos então definir o complexo de cadeias relativo $\dots \rightarrow S_{n+1}(X, A) \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n(X, A) \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1}(X, A) \rightarrow \dots$ e denotaremos por $H_n(X, A)$ o n -ésimo grupo de homologia relativo de X módulo A .

Proposição 5.4

Se (X, A) é um par de espaços com $A \neq \emptyset$ então a

seqüência $\dots \xrightarrow{\partial} H_{q+1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{q+1}(X) \xrightarrow{j_*} H_{q+1}(X,A) \xrightarrow{\partial_*} H_q(A) \rightarrow \dots$
é exata.

Esta seqüência é chamada a seqüência de homologia do par (X,A) .

Enunciaremos um teorema que juntamente com outras propriedades torna a homologia singular efetivamente calculável.

Teorema 5.5 (Teorema da Excisão)

Se X é um espaço topológico, A e U são subespaços de X tais que $\bar{U} \subset \overset{\circ}{A}$, então a inclusão $e: (X-\bar{U}, A-U) \rightarrow (X,A)$ induz um isomorfismo $e_*: H_q(X-U, A-U) \rightarrow H_q(X,A)$ para todo q .

Observação: Um teorema usado para verificar se a inclusão é uma excisão é o seguinte:

Teorema 5.6

Suponha $V \subset_{ab} U \subset_{ab} A$ com $\bar{V} \subset \overset{\circ}{U}$ e

- i) $(X-V, A-V) \xrightarrow{e} (X,A)$ é uma excisão.
- ii) $(X-U, A-U)$ é um retrato de deformação de $(X-V, A-V)$.

Então $(X-U, A-U) \xrightarrow{i} (X,A)$ é uma excisão.

Demonstração:

Como $e: (X-V, A-V) \rightarrow (X,A)$ é excisão, e_* é isomorfismo. Sendo $(X-U, A-U)$ retrato de deformação de $(X-V, A-V)$ temos:

$(X-U, A-U) \xrightarrow{i_1} (X-V, A-V) \xrightarrow{r} (X-U, A-U)$ onde r retração e i_1 inclusão tal que $r \cdot i_1 = \text{ident}$. Além disso, sendo r retrato de deformação $i_1 \cdot r = \text{ident}$. ($i_1 \cdot r$ é homotópica a identidade). Logo, os homomorfismos induzidos são iguais, isto é, $H_q(i_1 \cdot r) = H_q(i_1) \cdot H_q(r) = H_q(\text{ident}) = \text{ident}$. Como temos $H_q(r \cdot i_1) = H_q(r) \cdot H_q(i_1) = H_q(\text{ident.})$, da primeira igualdade se segue que $H_q(i_1)$ é epimorfismo e da segunda, que é monomorfismo. Portanto $H_q(i_1)$ é isomorfismo.

Observando que $i = e \cdot i_1$ a induzida $H_q(i)$ é um isomorfismo para todo q .

Portanto $i: (X-U, A-U) \rightarrow (X, A)$ é uma excisão.

Teorema 5.7 (Sequência de Mayer-Vietoris)

Seja (X, U, V) uma tríade exata (ou seja $K_1: (U, U \cap V) \rightarrow (U \cup V, V)$ e $K_2: (V, U \cap V) \rightarrow (U \cup V, U)$ são excisões) onde $U \cup V = X$. Então a sequência $\dots \rightarrow H_q(U \cap V, G) \xrightarrow{\psi} H_q(U, G) \oplus H_q(V, G) \xrightarrow{\phi} H_q(X, G) \xrightarrow{\Delta} H_{q-1}(U \cap V, G) \rightarrow$ é exata. As aplicações ψ , ϕ e Δ são definidas por:

$$\psi(a) = (m_{1*}(a), -m_{2*}(a))$$

$$\phi(x_1, x_2) = i_{1*}(x_1) + i_{2*}(x_2)$$

$$\Delta = -\partial' K_{1*}^{-1} s_{1*} = \partial'' K_{2*}^{-1} s_{2*}.$$

$$m_{1*}: H_q(U \cap V) \rightarrow H_q(U); m_{2*}: H_q(U \cap V) \rightarrow H_q(V)$$

$$s_{1*}: H_q(X) \rightarrow H_q(X, V); s_{2*}: H_q(X) \rightarrow H_q(X, U)$$

$$K_{1*}: H_q(U, U \cap V) \rightarrow H_q(X, V); K_{2*}: H_q(V, U \cap V) \rightarrow H_q(X, U)$$

$$i_{1*}: H_q(U) \rightarrow H_q(X); i_{2*}: H_q(V) \rightarrow H_q(X)$$

são as induzidas de inclusões e

$$\partial_*^I : H_q(U, U \cap V) \rightarrow H_{q-1}(U \cap V) ; \partial_*^{II} : H_q(V, U \cap V) \rightarrow H_{q-1}(U \cap V)$$

Teorema 5.8 (Hurewicz)

Seja X um espaço simplesmente conexo. As afirmações seguintes são equivalentes.

- i) $\pi_j(X) = 0$, $1 \leq j \leq n-1$
- ii) $H_j(X) = 0$, $1 \leq j \leq n-1$

No caso de uma das duas condições acima estar verificada, podemos afirmar que

$$\text{iii) } H_n(X) \cong \pi_n(X).$$

Teorema 5.9 (Fórmula de Künneth)

$$H_j(X \times Y) \cong \bigoplus_{i=0}^j H_i(X) \otimes H_{j-i}(Y) \oplus$$

$$\bigoplus_{i=0}^j \text{Tor}(H_i(X), H_{j-i-1}(Y)).$$

Corolário 5.10

Se todos os módulos de homologia de Y (ou de X) são livres para dimensões menores que j então

$$H_j(X \times Y) \cong \bigoplus_{i=0}^j H_i(X) \otimes H_{j-i}(Y).$$

Proposição 5.11

$$H_1(X) = \frac{\pi_1(X)}{[\pi_1(X), \pi_1(X)]} \text{ onde } [\pi_1(X), \pi_1(X)] \text{ é o comu}$$

tador de $\pi_1(X)$.

Em particular, se $\pi_1(X)$ for abeliano, $H_1(X) = \pi_1(X)$.

CAPÍTULO II

RESULTADOS SOBRE HOMOLOGIA, COHOMOLOGIA E GRUPO FUNDAMENTAL DE VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS

Neste capítulo exporemos alguns resultados e construções essenciais, utilizados nos capítulos posteriores no cálculo efetivo dos grupos de homologia de variedades diferenciáveis.

§1 - Soma Conexa

Definição 1.1

Sejam M_1 e M_2 n -variedades conexas. A soma conexa de M_1 e M_2 denotada por $M_1 \# M_2$ é construída retirando-se os interiores de discos n -dimensionais B_1 e B_2 em M_1 e M_2 , respectivamente, colando-se as variedades $M_i - \overset{\circ}{B}_i$ por algum homeomorfismo $h: \partial B_2 \rightarrow \partial B_1$.

$$\text{Assim, obtemos } M_1 \# M_2 = (M_1 - \overset{\circ}{B}_1) \bigcup_h (M_2 - \overset{\circ}{B}_2)$$

Observação:

A operação "soma conexa" é bem definida (a menos de difeomorfismo) pois, variedades diferenciáveis conexas são espa

ços homogêneos, isto é, quaisquer pontos P e Q de M , existe um difeomorfismo $\psi: M \rightarrow M$ tal que $\psi(P) = Q$.

Proposição 1.2

Sejam M^m e N^m variedades de dimensão m , conexas, orientáveis, com $m \geq 3$.

$$\text{Então } H_q(M^m \amalg N^m) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } q = 0, m \\ H_q(M^m) \oplus H_q(N^m), & 1 \leq q < m \\ 0 & \text{se } q > m. \end{cases}$$

Demonstração:

Tomemos $X = M^m \amalg N^m = (M^m - D^m) \cup_{\text{ident.}} (N^m - D^m)$. Sejam $A = M^m - D^m$ e $B = N^m - D^m$. Logo, $A \cap B = S^{m-1} \times I \cong S^{m-1}$ (tipo de homotopia).

Precisamos determinar $H_*(M^m - D^m)$ e $H_*(N^m - D^m)$ conhecendo-se $H_*(M^m)$ e $H_*(N^m)$.

Para determinarmos $H_*(M^m - D^m)$, consideremos o par $(M^m, M^m - D^m)$.

Seja U bola aberta de M^m tal que $D^m \subset U$. Pelo teorema 1,5.5 tem-se que $H_*(U, U - D^m) \xrightarrow{\text{exc.}} H_*(M^m, M^m - D^m)$.

Consideremos a seqüência exata do par $(U, U - D^m)$:

$$\dots \rightarrow H_q(U) \rightarrow H_q(U, U - D^m) \rightarrow H_{q-1}(U - D^m) \rightarrow H_{q-1}(U) \rightarrow \dots$$

Sendo U contrátil, tem-se

$$H_q(U, U - D^m) \cong H_{q-1}(U - D^m) \cong H_{q-1}(S^{m-1}).$$

Dessa forma obtemos $H_q(M^m, M^m - D^m) \cong H_{q-1}(S^{m-1}) = 0$ para $1 < q < m$. Considerando-se a seqüência exata do par $(M^m, M^m - D^m)$ tem-se

$$\dots \rightarrow H_{q+1}(M^m, M^m - D^m) \rightarrow H_q(M^m - D^m) \rightarrow H_q(M^m) \rightarrow H_q(M^m, M^m - D^m) \rightarrow \dots$$

Assim: $H_q(M^m) \cong H_q(M^m - D^m)$ e, analogamente,
 $H_q(N^m) \cong H_q(N^m - D^m)$ para $1 < q < m$.

Considerando que $H_q(A \cap B) \cong H_q(S^{m-1}) \cong 0$ $1 \leq q < m-1$

a seqüência de Mayer-Vietories aplicada à terna (X, A, B)

$\dots \rightarrow H_q(A \cap B) \rightarrow H_q(A) \oplus H_q(B) \rightarrow H_q(X) \rightarrow H_{q-1}(A \cap B) \rightarrow \dots$ fica reduzida à seqüência:

$$0 \rightarrow H_q(A) \oplus H_q(B) \rightarrow H_q(X) \rightarrow 0 \text{ para } 1 < q \leq m-1$$

Assim, $H_q(X) = H_q(M^m \amalg N^m) = H_q(M^m) \oplus H_q(N^m)$ para $1 < q \leq m-1$.

Se $q = 0$ ou $q = m$ então $H_q(M^m \amalg N^m) \cong \mathbb{Z}$ pois, $M^m \amalg N^m$ é conexa e orientável.

Se $q > m$ pelo teorema 5.2 vem que $H_q(M^m \amalg N^m) = 0$.

Resta-nos determinar $H_1(M^m \amalg N^m)$. Vamos aplicar o teorema 1, 4.6 para obtermos primeiramente $\pi_1(M^m \amalg N^m)$.

Observe o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1(S^{m-1}) \cong 0 & m \geq 3 \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ \pi_1(N^m) \cong \pi_1(N^m - D^m) & & \pi_1(M^m - D^m) \cong \pi_1(M^m) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \pi_1(M^m \amalg N^m) & \end{array}$$

Como $\pi_1(S^{m-1}) \cong 0$, então $\pi_1(M^m \amalg N^m) \cong \pi_1(M^m) * \pi_1(N^m)$.

Pela proposição 1, 5.11 vem que

$$H_1(M^m \amalg N^m) \cong \frac{\pi_1(M^m \amalg N^m)}{[\pi_1(M^m \amalg N^m); \pi_1(M^m \amalg N^m)]}.$$

Aplicando o teorema 1, 1.4 temos:

$$\begin{aligned} H_1(M^m \amalg N^m) &\cong \frac{\pi_1(M^m) * \pi_1(N^m)}{[\pi_1(M^m) * \pi_1(N^m), \pi_1(M^m) * \pi_1(N^m)]} \cong \frac{\pi_1(M^m)}{[\pi_1(M^m); \pi_1(M^m)]} \times \\ &\times \frac{\pi_1(N^m)}{[\pi_1(N^m); \pi_1(N^m)]} \cong H_1(M^m) \oplus H_1(N^m). \end{aligned}$$

Assim, ficam determinados todos os grupos de homologia da soma conexa $M^m \amalg N^m$.

§2 - COLAGEM DE VARIEDADES ATRAVÉS DOS BORDOS

Neste parágrafo abordaremos um resultado frequentemente utilizado na literatura usual; além disso, será empregado essencialmente para obtenção de algumas variedades, das quais estudaremos os grupos de homologia.

Teorema 2.1 (Existência de Colarinho)

Se M é uma variedade diferenciável com bordo ∂M então existe uma vizinhança W de ∂M tal que W é homeomorfa a $\partial M \times [0,1]$ de modo que ∂M se corresponde naturalmente com $\partial M \times \{0\}$.

Proposição 2.2

Sejam $(M^m, \partial M)$, $(N^m, \partial N)$ variedades diferenciáveis e

$\phi: \partial M \rightarrow \partial N$ difeomorfismo. Então $M \bigcup_{\phi} N$ é variedade diferenciável.

Demonstração: (esboço)

Para mostrarmos que $M \bigcup_{\phi} N$ é variedade, é necessário cobri-la com cartas locais cujas mudanças de coordenadas sejam diferenciáveis.

Pelo teorema 5.9 pag. 16 de [16] consideraremos os colarinhos $p_0: U_0 \rightarrow \partial M \times [0,1)$ e $p_1: U_1 \rightarrow \partial N \times (0,1]$.

Em $M \bigcup_{\phi} N$ consideramos $U = p(U_0) \cup p(U_1)$ onde $p: M \cup N \rightarrow M \bigcup_{\phi} N$.

Temos então que $M \bigcup_{\phi} N = A \cup U \cup B$ com abertos $A = p(M - p_0^{-1}(\partial M \times [0, \frac{1}{2})))$ e $B = p(N - p_1^{-1}(\partial N \times [0, \frac{1}{2})))$.

As cartas em A e B são restrições de cartas de M e N respectivamente pois, $p|_A: A \rightarrow p(A)$ e $p|_B: B \rightarrow p(B)$ são difeomorfismos.

As cartas em U são obtidas usando-se o diagrama abaixo para verificar a existência de homeomorfismo entre U e $\partial M \times (-1,1)$ compatível com as cartas de A e B .

Observação:

Em particular conclui-se que $M^m \amalg N^m$ é variedade diferenciável.

§3 - CIRURGIA

O objetivo principal deste parágrafo é definir cirurgia em uma variedade diferenciável W , e estudar esta construção aplicando-a para modificar o grupo fundamental π_1 da variedade e através disso, tirar conclusão sobre o grupo de homologia H_1 .

Para alcançarmos nosso objetivo, faremos uma pequena introdução seguindo "A Procedure for Killing Homotopy Groups of Differentiable Manifolds" de J.W. Milnor [15].

Definição 3.1

Denotamos D^{p+1} ao disco unitário no espaço euclídeo no R^{p+1} , com bordo $S^p \subset R^{p+1}$. Observemos que o produto de $S^p \times S^q$ pode ser considerado como bordo de $D^{p+1} \times S^p$ ou $S^p \times D^{q+1}$.

Dados W uma variedade orientável de dimensão n , $n = p + q + 1$ e $f: S^p \times D^{q+1} \rightarrow W$, um mergulho diferenciável que preserva orientações.

Denotaremos por $X(W, f)$ a variedade obtida por passagem ao quociente, da reunião disjunta $[W - f(S^p \times 0) + (D^{p+1} \times S^q)]$ identificando-se $f(u, \theta v)$ com $(\theta u, v)$ com $u \in S^p$, $v \in S^q$ e $0 \leq \theta \leq 1$.

Observemos que através desse processo chamado cirur-

gia podemos obter uma nova variedade W' , removendo o interior de $S^p \times D^{q+1}$ mergulhado em W , e substituindo pelo interior de $D^{p+1} \times S^q$, colando-o ao bordo comum.

A variedade $X(W', f)$ será orientada, pois f preserva orientações e, se W possui bordo, este será o mesmo de $X(W, f)$, pois a operação é realizada no interior de W .

Se W' é uma variedade diferenciável, difeomorfa a $X(W, f)$, por um difeomorfismo que preserva orientações, podemos dizer que W' é obtida de W por cirurgia do tipo $(p+1, q+1)$.

Se uma sequência $W_1, W_2, \dots, W_r$ de variedades tais que, cada W_{i+1} é obtida de W_i por cirurgia diremos que W_1 é X -equivalente a W_r .

A seguir, apresentaremos um processo que nos permitirá eliminar certos grupos de homotopia (se finitamente gerados) eliminando sucessivamente seus geradores.

Consideremos W uma variedade conexa de dimensão $n = p + q + 1$ e $\lambda \in \pi_p(W)$ uma classe de homotopia, a qual desejamos eliminar por cirurgia.

Definição 3.2

Diremos que um mergulho $f: S^p \times D^{q+1} \rightarrow W$ representa uma classe de homotopia $\lambda \in \pi_p(W)$ se $\lambda = f_*[\ell]$ onde f_* é o homomorfismo induzido $f_*: \pi_p(S^p \times D^{q+1}) \rightarrow \pi_p(W)$ e $[\ell]$ um gerador cíclico infinito $\pi_p(S^p \times D^{q+1})$.

Lema 3.3

Suponhamos que λ é representada por um mergulho co-

o anterior e que $\eta \geq 2p + 2$.

Nestas condições, os grupos de homotopia $\pi_i(W')$ são isomorfos aos grupos $\pi_i(W)$ para $i < p$ e $\pi_p(W')$ é isomorfo ao quociente de $\pi_p(W)$ por um subgrupo que contém λ onde $W' = X(W, f)$.

Resumidamente: O efeito da cirurgia é eliminar a classe de homotopia de λ .

Demonstração: ver [15].

Lema 3.4

Sejam M^n variedade orientável e $\alpha \in \pi_1(M^n)$ com $n \geq 4$.

$f: S^1 \rightarrow M^n$ mergulho representando α .

Seja $F: S^1 \times D^{n-1} \rightarrow M^n$ trivialização de vizinhança tubular de $f(S^1)$ (que sempre existe pois M^n é orientável).

$$M_F = [M^n - F(S^1 \times D^{n-1})] \cup_{\text{bordo}} D^2 \times S^{n-2},$$

$\bar{\alpha} \in \pi_1(M^n - F(S^1 \times D^{n-1}))$ representado por $F|_{S^1 \times \{a\}}$ onde $a \in S^{n-2} = \partial D^{n-1}$.

Então, $\pi_1(M_F) = \frac{\pi_1(M^n)}{\langle \bar{\alpha} \rangle}$ onde $\langle \bar{\alpha} \rangle$ é o subgrupo gerado por $\bar{\alpha}$.

Demonstração

Aplicando o teorema 1, 4.6 temos:

$$\begin{array}{ccc}
 & \pi_1(S^1 \times S^{n-2}) \cong \mathbb{Z} & (n \geq 4) \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 \pi_1(M^n - F(S^1 \times D^{n-1})) & & \pi_1(D^2 \times S^{n-2}) \cong 0 \\
 & \searrow \quad \swarrow & \\
 & \pi_1(M_F) &
 \end{array}$$

Assim, $\pi_1(M_F) = \pi_1(M^n - F(S^1 \times D^{n-1}))$.

Temos $\pi_1(M^n - F(S^1 \times D^{n-1})) \cong \pi_1(M^n - \text{im} f)$, pois

$M^n - F(S^1 \times D^{n-1})$ é retrato por deformação de $M^n - f(S^1)$. Como, por hipótese $n \geq 4$, por transversalidade tem-se $\pi_1(M^n - f(S^1)) \cong \pi_1(M^n)$. Segue-se, então, o lema.

Observação:

O lema 3.3 foi enunciado de maneira adequada a ser aplicado no capítulo IV.

§4 - GRAU DE APLICAÇÃO DIFERENCIÁVEL

Definição 4.1

Sejam M e N variedades diferenciáveis de mesma dimensão, ambas sem bordo, com M compacta. Seja $f: M \rightarrow N$ aplicação diferenciável e $y \in N$ valor regular de f .

A cada $x \in f^{-1}(y)$ associamos o valor $sDf(x) = 1$ se $Df(x)$ preserva a orientação e $sDf(x) = -1$ se $Df(x)$ inverte

a orientação.

Podemos então para cada valor regular y de f tomar $\deg(f, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} s Df(x)$ que chamamos de grau de f em y .

Observe que $f^{-1}(y)$ tem um número finito de pontos pois M é compacta, e que o valor depende apenas da classe de homotopia de f .

Por exemplo, seja N compacta, sem bordo, orientada e conexa. Um difeomorfismo de N tem grau $+1$ ou -1 respectivamente se preserva ou inverte a orientação. Assim, se um difeomorfismo tem grau -1 , ele não pode ser homotópico à identidade, pois, grau é invariante por homotopia.

§5 - RESULTADOS GERAIS SOBRE GRUPOS DE HOMOLOGIA DE VARIEDADES

Teorema 5.1 (Dualidade de Poincaré)

Seja X uma variedade n -dimensional, orientável, compacta, sem bordo (fechada). Então $H^q(X, G) \cong H_{n-q}(X, G)$ onde G é um anel comutativo com unidade.

Teorema 5.2

Se X é uma variedade n -dimensional, fechada, orientável, então temos: $H_q(X, G) = 0$ e $H^q(X, G) = 0$ para todo grupo abeliano G e $q > n$.

Além disso, $H^n(X, G) = G$, $H_n(X, G) = G$.

Teorema 5.3

Seja R um D.I.P. (domínio de ideais principais) e $H_{q-1}(X,A)$ finitamente gerado. Seja T_{q-1} o submódulo de torção de $H_{q-1}(X,A)$.

Se também $H_q(X,A)$ é finitamente gerado e F_q é o submódulo quociente de $H_q(X,A)$ por $T_q(X,A)$ então $H^q(X,A) \cong F_q \oplus T_{q-1}(X,A)$. (não canonicamente).

CAPÍTULO III

ESPAÇOS LENTICULARES

O objetivo deste capítulo é mostrar as várias formas de obter os espaços lenticulares, bem como computar seus grupos de homologia e fundamental.

As referências deste capítulo são [1] e [17].

§1 - ESPAÇOS LENTICULARES OBTIDOS POR AÇÃO DE GRUPOS

1.1. Considerações sobre aplicações equivariantes

Seja um G -espaço A . Suponha que dada uma aplicação e quivariante $\theta: A \rightarrow G$, $a \rightarrow \theta_a$ onde G atua por conjugação em G $C_g(h) = ghg^{-1}$.

Denotamos o grupo das aplicações equivariantes por $\text{Map}^G(A, G)$.

Definimos uma função $\text{Map}^G(A, G) \rightarrow \text{Homeo}^G(A)$ por $\theta \rightarrow \theta^*$ onde $\theta^*(a) = \theta_a(a)$.

Mostremos que θ^* é equivariante. De fato, $\theta^*(ga) = \theta_{ga}(ga) = (g \theta_a g^{-1})(ga) = g(\theta_a(a)) = g(\theta^*(a))$. Além disso, θ^* é homeomorfismo, pois $(\theta^* \cdot \lambda^*)(a) = \theta^*(\lambda^*(a)) = \theta^*(\lambda a(a)) = \lambda_a(\theta^*(a)) = \lambda_a(\theta_a(a)) = (\lambda \theta)_a(a) = (\lambda \theta)^*(a)$. Daqui, conclui-se que $(\theta^{-1})^* = (\theta^*)^{-1}$, portanto, um homeomorfismo.

Suponha que seja dada uma aplicação equivariante $\theta: A \rightarrow G$ e $A \times A$ tem uma G -ação diagonal, isto é,

$g(a, a') = (g(a), g(a'))$. Então a aplicação $A \times A \rightarrow G$ dada por $(a, a') \rightarrow \theta_a$ é equivariante.

Pelas observações acima, $(a, a') \rightarrow (\theta_a(a), \theta_a(a'))$ é um homeomorfismo equivariante de $A \times A$.

Se $(a, a') \rightarrow (a', a)$ é também equivariante e então $(a, a') \rightarrow (\theta_a(a'), \theta_a(a))$ é homeomorfismo equivariante.

Neste parágrafo será interessante considerar o caso em que $\theta_a(a) = a$. Em particular, se $\theta: A \rightarrow G$, $a \rightarrow \theta_a$ tal que $\theta_a(a) = a$ para todo $a \in A$ e θ equivariante, então a aplicação $A \times A \rightarrow A \times A$ definida por $(x, y) \rightarrow (\theta_x(y), x)$ é um homeomorfismo equivariante. Pois, definindo $\phi(x, y) = (\theta_x(y), x)$ então tem-se:

$$\begin{aligned} \phi(gx, gy) &= (\theta_{gx}(gy), gx) = ((g\theta_x g^{-1})(gy), gx) = (g\theta_x(y), gx) = \\ &= g(\phi_x(y), x) = g\phi(x, y). \end{aligned}$$

Portanto, ϕ é equivariante.

1.2 - Sobre Colagem de Espaços

Usando as observações anteriores construiremos alguns espaços por colagem de $S^{n-1} \times D^n$ em $S^{n-1} \times D^n$ através de um homeomorfismo equivariante ϕ de $S^{n-1} \times S^{n-1}$.

Observemos que o nosso grupo será $G = O(n)$ que consiste de todas as matrizes $A \in GL(n)$ tal que $A \cdot A^t = I$, e consideraremos a ação standard de $O(n)$ em S^{n-1} e D^n e a ação diagonal em $S^{n-1} \times D^n$.

Queremos uma aplicação $\theta: S^{n-1} \rightarrow O(n)$ onde $O(n)$ atua em si mesmo por conjugação. Vamos caracterizar tais aplicações.

Se $x \in S^{n-1}$ e $gx = x$ então $\theta_x = \theta_{gx} = g\theta_x g^{-1}$. As

sim, θ_x comuta com cada elemento do grupo de $O(n)_x$ (que é o conjugado de $O(n-1)$). Temos quatro possibilidades para θ_x : 1, -1, uma reflexão através do hiperplano perpendicular a x ou igual a uma reflexão através da linha Rx .

Vamos considerar somente o caso em que θ_x é a reflexão através de Rx , isto é, para cada $x \in S^{n-1}$ e $y \in \mathbb{R}^n$ considere $\theta_x(y) = 2\langle x, y \rangle x - y$. Observe que $\theta_x(x) = x$.

Consideremos a aplicação $\phi: S^{n-1} \times S^{n-1} \rightarrow S^{n-1} \times S^{n-1}$, $\phi(x, y) = (\theta_x(y), x)$. Como vimos anteriormente ϕ é uma aplicação equivariante sobre $O(n)$.

Mostremos que ϕ é homeomorfismo. Observemos que $\theta_x(\theta_x(y)) = y$ e $\theta_y(\theta_y(x)) = x$.

De fato:

$$\begin{aligned}\theta_x(\theta_x(y)) &= \theta_x(2\langle x, y \rangle x - y) = 2\{\langle x, [2\langle x, y \rangle x - y] \rangle\}x - \\ &\quad - \{2\langle x, y \rangle x - y\} = 2\{2\langle x, y \rangle \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle\}x - \\ &\quad - 2\langle x, y \rangle x + y = 2\{2\langle x, y \rangle - \langle x, y \rangle\}x - 2\langle x, y \rangle x + y = \\ &= 2\langle x, y \rangle x - 2\langle x, y \rangle x + y = y\end{aligned}$$

Analogamente mostra-se que $\theta_y(\theta_y(x)) = x$.

Para ver que ϕ é homeomorfismo basta tomar

$\phi^{-1}(x, y) = (y, \theta_y(x))$. Logo, tem-se:

$$\phi(\phi^{-1}(x, y)) = \phi(y, \theta_y(x)) = (\theta_y(\theta_y(x)), y) = (x, y)$$

$$\phi^{-1}(\phi(x, y)) = \phi^{-1}(\theta_x(y), x) = (x, \theta_x(\theta_x(y))) = (x, y)$$

Assim, $\phi(x, y) = (\theta_x(y), x)$ é homeomorfismo. Segue que θ é equivariante e portanto, ϕ é homeomorfismo equivariante,

bem como suas potências ϕ^k .

Observemos que isto poderia ser deduzido das preliminares, do fato de ser θ equivariante:

$$\begin{aligned}\theta_{AX}(y) &= 2\langle AX, y \rangle AX - y = \\ &= A(2\langle AX, y \rangle x - A^{-1}y) = A.\theta_x(y)A^{-1}.\end{aligned}$$

Definimos então, $\Sigma_k^{2n-1} = S^{n-1} \times D^n \cup_{\phi^k} S^{n-1} \times D^n$ como sendo o $O(n)$ - espaço resultante da colagem de $S^{n-1} \times D^n$ em si mesmo por meio da k -ésima potência de ϕ (K inteiro qualquer) em $S^{n-1} \times S^{n-1}$.

A aplicação θ geometricamente pode ser descrita para $n = 2$. $\theta: S^1 \rightarrow O(2)$ $\theta_x(y) = 2\langle x, y \rangle x - y$. Fixemos $x = (1, 0)$ então $\theta_{(1,0)}(x, y) = 2\langle (1, 0), (x, y) \rangle (1, 0) - (x, y) = (x, -y)$.

$$\begin{aligned}\theta_{(1,0)}(1,0) &= (1,0); \theta_{(1,0)}(0,1) = (0,-1). \quad \text{Portanto} \\ \theta_{(1,0)} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Logo, o vetor $e_2 = (0, 1)$ fêz uma reflexão em relação ao eixo $R(1, 0) = R$.

Sendo $\phi^0 = \text{identidade}$ $\Sigma_0^{2n-1} \simeq S^{n-1} \times S^n$ com a ação diagonal de $O(n)$. $[O(n)$ atua em S^n via inclusão standart

$$0(n) \subset 0(n+1)].$$

Observemos que $\Sigma_K^{2n-1} \cong \Sigma_{-K}^{2n-1}$ como $0(n)$ -espaços.

Para descrevermos $\Sigma_{K=1}^{2n-1}$ trocamos as componentes de $S^{n-1} \times D^n$ por $D^n \times S^{n-1}$ por meio de $\phi^1: (x, y) \rightarrow (x, \theta_x(y))$, em $S^{n-1} \times S^{n-1}$, (ϕ^1 é a composição de ϕ com uma mudança de fatores $T(x, y) = (y, x)$, pois, $(T \cdot \phi)(x, y) = T\phi(x, y) = T(\theta_x(y), x) = (x, \theta_x(y)) = \phi^1(x, \theta_x(y))$).

A extensão de ϕ^1 sobre o espaço $S^{n-1} \times D^n$ é feita da seguinte maneira:

$$\phi^1: S^{n-1} \times D^n \rightarrow S^{n-1} \times S^{n-1} \subset S^{n-1} \times D^n$$

$$\phi^1(x, y) = (x, \theta_x(y)).$$

Se $y \in S^{n-1}$ podemos calcular $\theta_x(y)$ naturalmente da definição.

Se $y = 0$ então $\phi^1(x, 0) = (x, \theta_x(0)) = (x, 0)$ pois $\theta_x(0) = 2\langle x, 0 \rangle x - 0 = 0$.

Se $y \neq 0$ com $y \in D^n$ então $y/\|y\| \in S^{n-1}$, logo, $(x, \frac{y}{\|y\|}) \rightarrow \phi^1(x, y/\|y\|) = (x, \theta_x(y/\|y\|)) \in D^n \times S^{n-1}$

Concluimos que $\Sigma_1^{2n-1} = S^{n-1} \times D^n \cup_{\phi^1} D^n \times S^{n-1} \cong S^{2n-1}$.

Logo, Σ_1^{2n-1} é equivalente à união dos espaços $S^{n-1} \times D^n$ por meio da função ϕ^1 , isto é,
 $\Sigma_1^{2n-1} \simeq S^{n-1} \times D^n \bigcup_{\phi^1} D^n \times S^{n-1} \simeq S^{2n-1} \subset R^{2n} \simeq R^n \times R^n$ onde $0(n)$ atua diagonalmente.

Observemos que pela proposição 11,2.1 o espaço Σ_K^{2n-1} obtido dessa forma tem estrutura de variedade diferenciável com $n \geq 2$.

Passemos a estudar o grupo de homologia dessa variedade e em seguida particularizar os valores de n e K para obtermos desse modo os espaços lenticulares como objetivo proposto.

Denotaremos por $*$ um ponto base de S^{n-1} e sejam α e β classes de $H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1})$ representadas por $S^{n-1} \times *$ e $* \times S^{n-1}$ respectivamente.

Assim, $\phi: S^{n-1} \times S^{n-1} \rightarrow S^{n-1} \times S^{n-1}$ induz automorfismo $\phi_*: H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1})$.

Por exemplo, $\phi_*(\alpha) = a_1\alpha + a_2\beta$ onde a_i é o grau da composição $S^{n-1} \times * \rightarrow S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{\phi} S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{p_i} S^{n-1}$ onde p_i é a projeção sobre o i -ésimo fator ($i=1,2$).

Analogamente para B .

Usando as definições de ϕ vamos determinar o valor de ϕ_* nos geradores α e β .

$$\text{Temos que: } \phi(x, *) = (\theta_x(*), x)$$

$$\phi(*, y) = (\theta_*(y), *)$$

Como $\phi_*(\alpha) = a_1\alpha + a_2\beta$, $\phi_*(\beta) = c_1\alpha + c_2\beta$ vamos de terminar a_1 , a_2 , c_1 e c_2 .

Determinação de a_1

Temos $S^{n-1} \rightarrow S^{n-1} \times *$, $\theta_x(*) = 2\langle x, * \rangle x - *$. Usando a definição 11, 4.1 queremos calcular o grau de $\theta_x(*)$.

Calculando as derivadas de $\theta_x(*)$ nos pontos regulares $*$ e $-*$, fixando-se $*$ = $(0, 0, \dots, 1)$ obtemos $s(D\theta_x(*)) = 1$ e $s(D\theta_x(-*)) = -1$. Então, $\deg \theta_x(*) = 0$ se n ímpar e $\deg \theta_x(*) = 2$ se n é par.

Logo, podemos escrever $a_1 = 1 + (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Determinação de a_2

Temos que $S^{n-1} \times * \subset S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{\phi} S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{p_2} S^{n-1}$

$$(x, *) \mapsto (p_2 \phi)(x, *) = p_2(\theta_x(*), x) = x$$

$$H_{n-1}(S^{n-1} \times *) \rightarrow H_{n-1}(S^{n-1})$$

$$\alpha \mapsto (p_2 \phi)_*(\alpha) = a_2 \alpha$$

$$a_2 = \deg(\text{identidade}) = 1.$$

Logo, $a_2 = 1$. Portanto, $\phi_*(\alpha) = (1 + (-1)^n)\alpha + 1\beta$.

Determinação de c_1

$$* \times S^{n-1} \subset S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{\phi} S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{p_1} S^{n-1}$$

$$(*, x) \mapsto (p_1 \phi)(*, x) = p_1(\phi(*, x)) = p_1(\theta_*(x), *) = \theta_*(x).$$

$$H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1}) \xrightarrow{(p_1 \phi)^*} H_{n-1}(S^{n-1})$$

$$\beta \mapsto (p_1 \phi)_*(\beta) = c_1 \beta.$$

Calculemos o grau de $\theta_*(y)$.

Podemos ver que $\theta_*(y_1, y_2, \dots, y_n) =$
 $= (-y_1, -y_2, \dots, -y_{n-1}, y_n)$. Como $r_i = S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$,
 $r_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, -x_i, \dots, x_n)$ tem grau
 $\deg(r_i) = (-1)^{n-1}$. Observemos que $\theta_* = r_1 r_2 \dots r_{n-2} \cdot \text{id}$ e que
 $\deg(\theta_*(y))$ depende do número par ou ímpar de composição de r_i .
 Assim $\deg(\theta_*(y)) = (-1)^{n-1}$. Portanto, $C_1 = (-1)^{n-1}$.

Determinação de C_2

Temos que: $* \times S^{n-1} \subset S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{\phi} S^{n-1} \times S^{n-1} \xrightarrow{p_2} S^{n-1}$.

$$(*, y) \rightarrow (p_2 \phi) (*, y) = p_2 \phi(*, y) = *$$

$$H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1}) \xrightarrow{(p_2 \phi)_*} H_{n-1}(S^{n-1})$$

$$\beta \rightarrow (p_2 \phi)_*(\beta) = 0 \cdot \beta = 0$$

$$\therefore c_2 = 0$$

$$\text{Portanto obtemos } \phi_*(\alpha) = (1 + (-1)^n)\alpha + 1 \cdot \beta$$

$$\phi_*(\beta) = (-1)^{n-1}\alpha.$$

Escrevendo matricialmente a expressão acima temos:

$$\phi_* = \begin{bmatrix} 1 + (-1)^n & (-1)^{n-1} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Usando ϕ_* na forma matricial, podemos calcular as potências de ϕ_* para todo inteiro K :

$$\phi_*^K = \begin{bmatrix} 1 + K & -K \\ K & 1 - K \end{bmatrix} \text{ se } n \text{ par}$$

$$\phi_*^{K=\text{ímpar}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{se } n \text{ ímpar}$$

$$\phi_*^{K=\text{par}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{se } n \text{ ímpar}$$

Observação sobre o espaço $\Sigma_k^{2n-1} = S^{n-1} \times D^n \xrightarrow{\phi_k} S^{n-1} \times D^n$.

Nesta construção foram consideradas as seguintes inclusões:

$$S^{n-1} \times S^{n-1} \approx (S^{n-1} \times S^{n-1})_1 \hookrightarrow S^{n-1} \times D^n.$$

§) difeomorfismo

$$S^{n-1} \times S^{n-1} \approx (S^{n-1} \times S^{n-1})_2 \hookrightarrow S^{n-1} \times D^n.$$

$$S^{n-1} \times S^{n-1} \hookrightarrow S^{n-1} \times D^n \hookrightarrow \Sigma_k^{2n-1}$$

Podemos considerar $S^{n-1} \times S^{n-1} \hookrightarrow S^{n-1} \times D^n$ através da inclusão ou de ϕ e denotaremos por:

$$(S^{n-1} \times D^n)_i \hookrightarrow \Sigma_k^{2n-1}$$

$$(S^{n-1} \times D^n)_\phi \hookrightarrow \Sigma_k^{2n-1}$$

Além disso, $(S^{n-1} \times D^n)_i \cap (S^{n-1} \times D^n)_\phi =$
 $= (S^{n-1} \times S^{n-1})_{(i, \phi)} \approx S^{n-1} \times S^{n-1}$. Portanto, queremos através da sequência de Mayer-Vietoris calcular $H_i(\Sigma_k^{2n-1})$ sabendo que:

$$H_i(S^{n-1} \times S^{n-1})_i \cong H_i(S^{n-1} \times S^{n-1})$$

$$H_i(S^{n-1} \times S^{n-1})_\phi \cong H_i(S^{n-1} \times S^{n-1})$$

$$H_i(S^{n-1} \times S^{n-1})(i, \phi) \cong H_i(S^{n-1} \times S^{n-1})$$

1.3 - GRUPOS DE HOMOLOGIA DE Σ_k^{2n-1}

Para calcular a homologia de Σ_k^{2n-1} , vamos usar a sequência de Mayer-Vietoris na tríade $(\Sigma_k^{2n-1}, S^{n-1} \times D^n, S^{n-1} \times S^{n-1})$.

Logo, temos a sequência de Mayer, Vietoris

$$\dots \rightarrow H_{j+1}(\Sigma_k^{2n-1}) \xrightarrow{\Delta} H_j(S^{n-1} \times S^{n-1}) \xrightarrow{(i_*, \phi_*^k) = \psi} H_j(S^{n-1} \times D^n) +$$

$$\oplus H_j(S^{n-1} \times D^n) \xrightarrow{\phi} H_j(\Sigma_k^{2n-1}) \rightarrow \dots$$

Antes de realizarmos os cálculos faremos duas observações:

Observação 1:

Da proposição 1, 5.7 precisamos verificar como é a aplicação $H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1}) \xrightarrow{\psi = (m_{1*}, -m_{2*})} H_{n-1}(S^{n-1} \times D^n) \oplus H_{n-1}(S^{n-1} \times D^n)$.

$(a_1, a_2) \mapsto (m_{1*}(a_1, a_2), -m_{2*}(a_1, a_2))$. Se tomarmos $(a_1, a_2) = (1, 0)$ e $(a_1, a_2) = (0, 1)$ elementos básicos de $H_{n-1}(S^{n-1} \times S^{n-1})$.

$$(1, 0) \mapsto (m_{1*}(1, 0), -m_{2*}(1, 0))$$

$$(0, 1) \mapsto (m_{1*}(0, 1), -m_{2*}(0, 1))$$

Como neste caso $i_* = m_{1*}$ então $m_{1*}(1, 0) = 1$ e $m_{1*}(0, 1) = 0$. Resta-nos encontrar o valor de $m_{2*}(1, 0) = \phi_*^k(1, 0)$ e

$$m_{2*}(0,1) = \phi_*^k(0,1).$$

Para isto, vamos usar ϕ_*^k na forma matricial. Assim

$$m_{2*}(1,0) = \phi_*^k(1,0) = [1+k, -k] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [1+k] \in H_{n-1}(S^{n-1} \times D^n).$$

$$m_{2*}(0,1) = \phi_*^k(0,1) = [1+k, -k] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [-k] \in H_{n-1}(S^{n-1} \times D^n).$$

Podemos então tomar ψ como $\psi = (i_*, \phi_*^k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1+k & -k \end{bmatrix}$.

Passemos agora a determinar a homologia de Σ_k^{2n-1} . Esses cálculos estão divididos em duas etapas de acordo com n ser par ou ímpar.

A) Suponhamos $n = 2m$, $m \geq 1$ e k inteiro qualquer

i) Se $j = 2m - 1$ e k inteiro qualquer obtemos:

$$0 \rightarrow H_{2m}(\Sigma_k^{4m-1}) \xrightarrow{\Delta} H_{2m-1}(S^{2m-1} \times S^{2m-1}) \xrightarrow{\psi} H_{2m-1}(S^{2m-1} \times D^{2m}) +$$

$$\oplus H_{2m-1}(S^{2m-1} \times D^{2m}) \xrightarrow{\phi} H_{2m-1}(\Sigma_k^{4m-1}) \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow H_{2m}(\Sigma_k^{4m-1}) \xrightarrow{\Delta} Z \oplus Z \xrightarrow{\psi} Z \oplus Z \xrightarrow{\phi} H_{2m-1}(\Sigma_k^{4m-1}) \rightarrow 0$$

Da exatidão da sequência temos: $\text{Ker } \psi \cong H_{2m}(\Sigma_k^{4m-1})$ e $\text{coker } \psi = \text{im } \phi = H_{2m-1}(\Sigma_k^{4m-1})$

Como $\psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1+k & -k \end{bmatrix}$ segue-se que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1+k & -k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ implica } (x,y) = (0,0) \text{ e portanto}$$

$\text{Ker } \psi = 0$. Logo, $H_{2m}(\Sigma_k^{4m-1}) \cong 0$.

Como $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1+k & -k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+k \end{bmatrix}$ e

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1+k & -k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -k \end{bmatrix}$ segue-se que

$\text{im } \psi = [(1, 1+k) \oplus (0, -k)] = [(1, 1) \oplus (0, k)].$

Portanto, $H_{2m-1}(\Sigma_k^{4m-1}) = \text{coker } \psi = \frac{Z \oplus Z}{[(1, 1) \oplus (0, k)]} \approx Z_k$

ii) Se $j = 4m - 1$ e K inteiro qualquer obtemos:

$\rightarrow H_{4m-1}(S^{2m-1} \times D^{2m}) \oplus H_{4m-1}(S^{2m-1} \times D^{2m}) \xrightarrow{\phi} H_{4m-1}(\Sigma_k^{4m-1}) \xrightarrow{\Delta}$

$\xrightarrow{\Delta} H_{4m-2}(S^{2m-1} \times S^{2m-1}) \xrightarrow{\psi} H_{4m-2}(S^{2m-1} \times D^{2m}) \oplus H_{4m-2}(S^{2m-1} \times D^{2m}) \xrightarrow{\phi}$

$\xrightarrow{\phi} H_{4m-2}(\Sigma_k^{4m-1}) \rightarrow H_{4m-3}(S^{2m-1} \times S^{2m-1})$

$0 \rightarrow H_{4m-1}(\Sigma_k^{4m-1}) \xrightarrow{\Delta} Z \xrightarrow{\psi} 0 \oplus 0 \xrightarrow{\phi} H_{4m-2}(\Sigma_k^{4m-1}) \rightarrow 0$

Segue-se então que $H_{4m-1}(\Sigma_k^{4m-1}) \approx Z$ e $H_{4m-2}(\Sigma_k^{4m-1}) = 0$

Além disso, se $j \neq 0, 2m - 1, 4m - 1$ então

$H_j(\Sigma_k^{4m-1}) = 0.$

Conclusão da parte A)

$$H_j(\Sigma_k^{4m-1}) = \begin{cases} Z & \text{se } j = 0, 4m - 1 \\ Z_k & \text{se } j = 2m - 1 \\ 0 & \text{se } j \neq 0, 2m - 1, 4m - 1 \end{cases}$$

B) Suponhamos $n = 2m + 1$ $m \geq 1$ e k inteiro qualquer

Quando n é ímpar, $n = 2m + 1$, $m \geq 1$ devemos considerar se K é par ou K é ímpar, pois as matrizes de Ψ são diferentes.

B.1) Se K é par a matriz de Ψ fica sendo $\Psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

i) $j = 2m$, k par

$$\rightarrow H_{2m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{2m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi} H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta}$$

$$\xrightarrow{\Delta} H_{2m}(S^{2m} \times S^{2m}) \xrightarrow{\psi} H_{2m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{2m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi}$$

$$\xrightarrow{\phi} H_{2m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow$$

$$0 \oplus 0 \rightarrow H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m-1}) \xrightarrow{\Delta} Z \oplus Z \xrightarrow{\psi} Z \oplus Z \xrightarrow{\phi}$$

$$\xrightarrow{\phi} H_{2m}(\Sigma_k^{4m-1}) \rightarrow 0$$

Temos que $H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \text{Ker } \Psi$ e $H_{2m}(\Sigma_k^{2m+1}) \cong \text{coker } \Psi$

$$\text{Como } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \begin{matrix} x = 0 \\ \forall y \end{matrix}$$

$\therefore \text{Ker } \psi \cong Z$.

$$\text{Também } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix} \text{ implica que } \text{im } \psi \cong Z$$

Portanto $H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong Z$ e $H_{2m}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong Z$.

ii) $j = 4m$, k par

$$\begin{aligned} &\rightarrow H_{4m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{4m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi} H_{4m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta} H_{4m}(S^{2m} \times S^{2m}) \xrightarrow{\psi} \\ &\xrightarrow{\psi} H_{4m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{4m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi} H_{4m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow 0 \\ &0 \oplus 0 \xrightarrow{\phi} H_{4m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{\psi} 0 \oplus 0 \xrightarrow{\phi} H_{4m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Da sequência exata segue-se que:

$$H_{4m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad H_{4m}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong 0.$$

B2) Se k é ímpar e $n = 2m + 1$, $m \geq 1$ a matriz de ψ fica sendo $\psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

i) Se $j = 2m$, k ímpar temos

$$\begin{aligned} &\rightarrow H_{2m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{2m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi} H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta} H_{2m}(S^{2m} \times S^{2m}) \xrightarrow{\psi} \\ &\xrightarrow{\psi} H_{2m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{2m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi} H_{2m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow 0 \\ &0 \oplus 0 \xrightarrow{\phi} H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\psi} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi} H_{2m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Temos que $H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \text{Ker } \psi$ e $H_{2m}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \text{coker } \psi$

$$\text{Como} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \begin{aligned} x &\cong 0 \\ y &\cong 0 \end{aligned}$$

segue-se que $\text{Ker } \psi \cong 0$.

Temos também $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ implica que

$$\text{im } \psi \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

Portanto, $H_{2m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \ker \psi \cong 0$ e
 $H_{2m}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \text{coker } \psi = 0$

ii) Se $j = 4m$, k ímpar temos:

$$\rightarrow H_{4m+1}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{4m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi} H_{4m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta}$$

$$\xrightarrow{\Delta} H_{4m}(S^{2m} \times S^{2m}) \xrightarrow{\psi} H_{4m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \oplus H_{4m}(S^{2m} \times D^{2m+1}) \xrightarrow{\phi}$$

$$\xrightarrow{\phi} H_{4m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow 0$$

$$\dots \rightarrow 0 \oplus 0 \xrightarrow{\phi} H_{4m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{\psi} 0 \oplus 0 \xrightarrow{\phi} H_{4m}(\Sigma_k^{4m+1}) \rightarrow 0$$

Desta seqüência segue-se que: $H_{4m+1}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong \mathbb{Z}$ e

$$H_{4m}(\Sigma_k^{4m+1}) \cong 0.$$

Conclusão de B)

$$H_j(\Sigma_{k=\text{par}}^{4m+1}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } j = 0, 2m, 2m+1, 4m+1. \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$H_j(\Sigma_{k=\text{ímpar}}^{4m+1}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } j = 0, 4m+1 \\ 0 & \text{se } j \neq 0, 4m+1. \end{cases}$$

Observemos que, $\Sigma_{k=\text{par}}^{4m+1}$ tem a mesma homologia de $S^{2m} \times S^{2m+1}$ e que $\Sigma_{k=\text{impar}}^{4m+1}$ tem a homologia de S^{4m+1} .

Para $n \geq 3$, $S^{n-1} \times D^n$ é simplesmente conexo pelo teorema 1, 4.6 implica que Σ_k^{2n-1} é simplesmente conexo.

1.4 - OBTENÇÃO DOS ESPAÇOS LENTICULARES A PARTIR DE Σ_k^{2n-1}

Se tomarmos $n = 2$, obtemos Σ_k^3 e queremos mostrar que este é justamente o espaço lenticulares do tipo $(k,1)$.

Para ver isto, consideremos a aplicação $\phi: S^1 \times S^1 \rightarrow S^1 \times S^1$ dada por $\phi(x,y) = (\theta_x(y), x)$.

Seja $\tilde{\phi}$ o levantamento de ϕ definido da seguinte maneira:

$$\begin{array}{ccc} & & R \times R \\ & \nearrow \tilde{\phi} & \downarrow q \\ R \times R & \xrightarrow{\phi} & S^1 \times S^1 \end{array}$$

$$\phi(s,t) = (e^{2\pi i(2s-t)}, e^{2\pi i s})$$

$$q(2s-t, s) = (e^{2\pi i(2s-t)}, e^{2\pi i s})$$

$$\tilde{\phi}(s,t) = (2s-t, s)$$

Temos que $q \circ \tilde{\phi}(s,t) = q(\tilde{\phi}(s,t)) = q(2s-t, s) = (e^{2\pi i(2s-t)}, e^{2\pi i s})$ e assim, $q \circ \tilde{\phi} = \phi$.

Vamos verificar que $\phi(e^{2\pi i s}, e^{2\pi i t}) = (e^{2\pi i(2s-t)}, e^{2\pi i s})$. Para isto, vamos mostrar que $\theta_{2\pi i s}(e^{2\pi i t}) = e^{2\pi i(2s-t)}$

$$\begin{aligned} \theta_{e^{2\pi i s}}(e^{2\pi i t}) &= 2 \langle e^{2\pi i s}, e^{2\pi i t} \rangle e^{2\pi i s} - e^{2\pi i t} = (\cos(4\pi s - 2\pi t) + \\ &+ \cos 2\pi t, \sin(4\pi s - 2\pi t) + \sin 2\pi t) - \\ &- (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = (\cos(4\pi s - 2\pi t), \sin(4\pi s - 2\pi t)) = \\ &= e^{2\pi i(2s-t)}. \end{aligned}$$

Observemos que, geometricamente, $\theta_{e^{2\pi i s}}(e^{2\pi i t}) = e^{(4s-2t)\pi i}$ corresponde a multiplicar $e^{-2\pi i t}$ pelo ângulo de $4\pi s$.

Escrevendo $\tilde{\phi}(s, t) = (2s-t, s)$ na base usual do $\mathbb{R}^2$ tem-se $\tilde{\phi} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Calculando-se as potências de $\tilde{\phi}$ vem que

$$\tilde{\phi}^k = \begin{bmatrix} 1+k & -k \\ k & 1-k \end{bmatrix}$$

No próximo parágrafo usaremos isto para definir os espaços lenticulares. Além disso, veremos que $L(k, q)$ depende somente de $|K|$ e da classe de congruência $\pm q \pmod{K}$. Assim $\Sigma_k^3 = L(k, 1-k) \approx L(K, 1)$.

Observação 1:

Podemos descrever $L(k, q)$ como sendo o espaço das órbitas da ação livre de Z_k em $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ gerado pela matriz

$$\begin{bmatrix} e^{\frac{2\pi i}{k}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i q}{k}} \end{bmatrix}, \text{ isto também veremos adiante.}$$

Observação 2:

Outro fato interessante é observado ao analisarmos o espaço Σ_k^1 , $\Sigma_k^1 = S^0 \times D^1 \cup_{\phi_k} S^0 \times D^1$ onde $\phi^k: S^0 \times S^0 \rightarrow S^0 \times S^0$, $\phi^k(x,y) = (y,x)$. Assim na base canônica do R^2 , podemos ver que $\phi^{k=\text{par}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$;

$$\phi^{k=\text{impar}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo, $\Sigma_{k=\text{impar}}^1 \cong S^1$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

$\Sigma_{k=\text{par}}^1 \cong S^0 \times S^1 \cong \text{dois círculos}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Observação 3:

Portanto, pelo que foi visto anteriormente podemos calcular os grupos de homologia de Σ_k^3 .

Então,

$$H_j(\Sigma_k^3) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } j = 0, 3 \\ \mathbb{Z}_k & \text{se } j = 1 \\ 0 & \text{se } j \neq 0, 1, 3 \end{cases}$$

§2 - OS ESPAÇOS LENTICULARES POR CLASSIFICAÇÃO DE NÓS NO TORO

Neste parágrafo descreveremos os espaços lenticulares usando essencialmente classificação de nós no toro. Para isso,

precisamos de alguns resultados básicos.

Para as demonstrações dos resultados enunciados a seguir ver [17].

Um nó $K \subset T^2$ que é não homotópico a zero ($[K] \neq \langle 0, 0 \rangle$ em $H_1(T^2)$) será dito essencial, onde $T^2 = S^1 \times S^1$.

Teorema 2.1

Quaisquer dois nós em $T^2 = S^1 \times S^1$ de classe $\langle 0, \pm 1 \rangle$ são isotópicos.

Teorema 2.2

Para qualquer nó $K \subset T^2$ de classe $[k] \neq \langle 0, 0 \rangle$, existe um homeomorfismo $h: T^2 \rightarrow T^2$ tal que $h(K) = M$, um meridiano standart.

Teorema 2.3

Dois nós $J, K \subset T^2$ são isotópicos se e somente se $[J] = \pm[k]$.

Lema 2.4 (Lema de Dehn)

Suponha M^3 uma 3-variedade e $f: D^2 \rightarrow M^3$ aplicação sem singularidades em ∂D^2 (isto é, $x \in \partial D^2, x \neq y \in D^2 \Rightarrow f(x) \neq f(y)$). Então existe um mergulho $g: D^2 \rightarrow M^3$ com $g(\partial D^2) = f(\partial D^2)$.

Corolário 2.5

Suponha que $J \subset \partial M$ é uma curva fechada simples na fronteira de uma 3-variedade M^3 e que J é homotopicamente trivial em M^3 . Então J borda um disco D^2 mergulhado propriamente em M^3 (isto é, $\partial D^2 \subset \partial M$, $\overset{\circ}{D}^2 \subset \overset{\circ}{M}^3$).

Lema 2.6

Seja $X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } 0 \leq z \leq 1\}$ e $f: X \rightarrow D^2 \times S^1$, $f(x,y,z) = (x,y, e^{2\pi i z})$. Então $\frac{X}{k_f}$ é homeomorfo a $D^2 \times S^1$ onde k_f é uma relação de equivalência definida pela função f .

Demonstração

Consideremos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & D^2 \times S^1 \\ p \downarrow & \nearrow \bar{f} \circ p^{-1} & \\ \frac{X}{k_f} & & \end{array}$$

onde p é identificação.

Mostremos que $\bar{f}$ é bijetora contínua e fechada. Temos que $\bar{f}$ é bijetora pois se $y \in \frac{X}{k_f}$ então $p^{-1}(y) = \{(t_1, t_2, 0), (t_1, t_2, 1)\}$ ou $p^{-1}(y) = \{(x, y, z) \in X \text{ com } z \in (0, 1)\}$.

Como $f(t_1, t_2, 0) = f(t_1, t_2, 1) = (t_1, t_2, 1)$ e $f(x, y, z) \in D^2 \times S^1$ vem que $\bar{f}$ é constante nas fibras $p^{-1}(y)$.

Além disso, $\bar{f}$ é naturalmente contínua, pois f é identificação.

Para ver que $\bar{f}$ é fechada, seja $F \subset X/k_f$ fechado. Então $p^{-1}(F)$ é fechado em X . Sendo X compacto de Hausdorff então $p^{-1}(F)$ é compacto. Como f é contínua segue que $f(p^{-1}(F)) \subset D^2 \times S^1$ é compacto e também $D^2 \times S^1$ sendo compacto e também $D^2 \times S^1$ sendo compacto de Hausdorff então $f(p^{-1}(F))$ é fechado. Portanto, $\bar{f}$ é fechada.

Segue-se então pelo Teorema 1, 2.3 que $\bar{f}$ é um homeomorfismo.

Lema 2.7

Sejam V_1 toro sólido e J uma curva fechada simples em ∂V_1 que é essencial. As seguintes afirmações são equivalentes:

- a) J é homologicamente trivial em V_1 .
- b) J é homotopicamente trivial em V_1 .
- c) J borda um disco D em V_1 .
- d) para algum homeomorfismo $h: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$ existe um homeomorfismo $H: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$ tal que $H(1 \times \partial D^2) = J$.

Demonstração:

- a) $\Leftrightarrow$ b) pois $\pi_1(V_1) \cong H_1(V_1) \cong \mathbb{Z}$
- b) $\Rightarrow$ c) Corolário 2.5
- c) $\Rightarrow$ b) óbvio
- d) $\Rightarrow$ c) Suponha que existe algum homeomorfismo

$H: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$ com $J = H(1 \times \partial D^2)$. Tomemos $H(1 \times \partial D^2) = D_1^2$

c) $\Rightarrow$ d). Suponha que J borda um disco $D^2 \subset V_1$ e

$h: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$ um homeomorfismo.

Temos então que $(1 \times \partial D^2)$ e $h^{-1}(J)$ são nós do tipo $\langle 0, \pm 1 \rangle$ pelo teorema 2.1. Portanto, existe uma isotopia

$G: S^1 \times S^1 \times I \rightarrow S^1 \times S^1$ tal que $G(x, 0) = \text{Id}_{S^1 \times S^1}$ e

$G(x, 1) = f_1: h^{-1}(J) \rightarrow 1 \times \partial D^2$.

Tomemos então $F: S^1 \times S^1 \times I \rightarrow S^1 \times S^1 \times I$ dada por $F(x, t) = (G(x, t), t)$ isto é, o traço da isotopia G .

Seja p a identificação, então, observemos que se $g: S^1 \times S^1 \times I \rightarrow S^1 \times D^2$, $g(x_1(y, t)) = (x, ty)$ temos os diagramas comutativos. Aplicando estes fatos no diagrama obteremos a conclusão desejada, onde tomamos H como sendo $H = \bar{F}$ o h que é o homeomorfismo desejado.

Definição 2.8

Uma curva fechada simples em ∂V_1 satisfazendo as condições do lema 2.7 é chamada de meridiano em V_1 .

Uma longitude de ∂V_1 é qualquer curva fechada simples em ∂V_1 da forma $h(S^1 \times 1)$, para algum homeomorfismo $h: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$.

Lema 2.9

Se $K \subset \partial V_1$ é uma curva fechada simples, as seguintes condições são equivalentes.

- a) K representa uma longitude
- b) K representa um gerador de $H_1(V_1) \cong \pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$
- c) K intercepta algum meridiano (transversalmente) em um único ponto.

Demonstração

a) $\Rightarrow$ b) por definição

a) $\Rightarrow$ c) Supondo K uma longitude de V_1 , $K=h(S^1 \times 1)$ para algum homeomorfismo $h: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$.

Consideramos o meridiano $J = h(1 \times \partial D^2)$, então a única interseção entre K e J é $h(1 \times 1)$.

b) $\Rightarrow$ a) similar à demonstração de c) $\Rightarrow$ d) do lema 2.7.

c) $\Rightarrow$ b)

Suponha que k intercepta algum meridiano em um úni-

co ponto. Seja J o meridiano em ∂V_1 tal que $J \cap k = \{p\}$. Pelo lema 2.7, $h(1 \times \partial D^2) = J$ para algum homeomorfismo $h: S^1 \times D^2 \rightarrow V_1$.

Como existe uma retração r de $S^1 \times D^2$ em S^1 , definimos $\lambda(\theta) = h^{-1}k(\theta)$ onde $K: S^1 \rightarrow V_1$ $K(\theta) = k$. Sendo k curva fechada simples e intercepta J em um único ponto, então $r \circ \lambda$ tem grau 1. Logo, $r_* \circ \lambda_*: \pi_1(S^1 \times D^2) \rightarrow \pi_1(S^1)$ é isomorfismo e sendo r_* isomorfismo, segue-se que $\lambda_*: \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_1(S^1 \times S^2)$ é isomorfismo. Portanto, k é gerador de $\pi_1(V_1)$ pois h_* é isomorfismo.

Lema 2.10

Um homeomorfismo $f: \partial V \rightarrow \partial V$ estende a um homeomorfismo $F: V \rightarrow V$ se e somente se f leva meridiano em meridiano.

Demonstração

Suponha que f leva meridiano em meridiano. Temos que $f: \partial V \rightarrow \partial V$ homeomorfismo e ∂V homeomorfo a $S^1 \times S^1$.

Consideremos o seguinte diagrama, com f_1 e f_2 homeomorfismos.

Logo, $\bar{f} = f_2 \circ f \circ f_1^{-1}: S^1 \times S^1 \rightarrow S^1 \times S^1$ é um homeomorfismo. Seja m um meridiano qualquer de $S^1 \times S^1$. Como a imagem de $\bar{f}$ é meridiano, podemos estender $\bar{f}$ sobre o disco D que borda m (lema 2.7). Cortamos $S^1 \times S^1$ ao longo do disco D^2 . Naturalmente, o que obtemos é homeomorfo a uma bola B^3 , podemos estender $\bar{f}$ a $\bar{f}$ para o bordo de B^3 . Usando os lemas 2.6 e 2.7 estendemos a função $\bar{f}$ para todo $S^1 \times D^2$ onde h_1 e h_2 são homeomorfismos. Observando o diagrama vem que $F = h_2 \circ \bar{F} \circ h_1^{-1}$ onde $\bar{F}$ é passagem ao quociente de $\bar{F}$ que existe pelo lema 2.6.

Definição 2.11

Seja $h: \partial V_2 \rightarrow \partial V_1$ homeomorfismo com V_1 e V_2 toros sólidos.

Fixando-se uma longitude ℓ_1 e um meridiano m_1 como geradores de $H_1(\partial V_1)$, escrevemos $h_*: H_1(\partial V_2) \rightarrow H_1(\partial V_1)$, $h_*(m_2) = p\ell_1 + qm_1$ onde m_2 é um meridiano em ∂V_2 .

O espaço resultante da colagem de V_1 e V_2 via h é chamado espaço lenticular de tipo (p,q) , com p e q relativamente primos. Denotaremos por $L(p,q) = V_1 \cup_h V_2$.

Em outras palavras, uma 3-variedade, orientável, conexa, compacta é um espaço lenticular se e somente se contém um toro sólido, cujo fêcho do complementar é também um toro sólido. Além disso, o que define qual é o espaço lenticular obtido é somente h_* e mais especificamente, se fixarmos uma trivialização em um dos toros sólidos, digamos V_1 , então o que define $L(p,q)$ é exatamente $h_*(m_2) = p\ell_1 + qm_1$ como definido acima.

Observemos que $L(p,q)$ depende a menos de homeomorfismo somente da classe de homotopia de $h_*(m_2)$ em ∂V_1 . De fato, suponha que $L^{h_1}(p,q) = V_1 \cup_{h_1} V_2$, $L^{h_2}(p,q) = V_1 \cup_{h_2} V_2'$ onde as aplicações $h_1: \partial V_2 \xrightarrow{\cong} T^2$, $h_2^{-1}(x) \rightarrow x$ e $h_1: \partial V_2' \xrightarrow{\cong} T^2$, $h_2^{-1}(x) \rightarrow x$ são homeomorfismos. Pelo fato de que

$h_{1*}(m_2) = p\ell_1 + qm_1 = h_{2*}(m_2')$ então podemos tomar a aplicação identidade $i: V_1 = S^1 \times D^2 \rightarrow V_1' = S^1 \times D^2$. Podemos observar o diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 L^{h_1}(p,q) = S^1 \times D^2 \cup_{h_1} V_2 & & \\
 \uparrow \text{id} & & \uparrow \phi \\
 L^{h_1}(p,q) = S^1 \times D^2 \cup_{h_2} V'_2 & &
 \end{array}$$

onde $\text{id}|_{S^1 \times \partial D^2} = \text{id}S^1 \times S^1$. Observando a função induzida em ∂V_2 e $\partial V'_2$ obtemos a função $\phi: \partial V'_2 \rightarrow \partial V_2$ tal que $\phi: h_1^{-1} \rightarrow h_2$, isto é, $\phi(h_1^{-1}(x)) = h_2^{-1}(x)$.

$$\begin{array}{ccc}
 \partial V_2 & \xleftarrow{\phi} & \partial V'_2 \\
 \uparrow h_1^{-1} & & \uparrow h_2 \\
 & T^2 &
 \end{array}$$

Logo, $\phi_*(m'_2) = (h_1^{-1} \cdot h_2)_*(m'_2) = h_1^{-1}(pl_1 + qm_1) = m_2$.

Portanto, $\phi_*(m'_2) = m_2$, isto é, ϕ_* leva meridiano em meridiano.

Pelo lema III, 2.10, podemos estender ϕ a uma função $\phi': V'_2 \rightarrow V_2$.

$$\begin{array}{ccc}
 V'_2 & \xrightarrow{\phi'} & V_2 \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \partial V'_2 & \xrightarrow{\phi} & \partial V_2
 \end{array}$$

que também é homeomorfismo. Assim conclui-se que $L^{h_1}(p,q) = L^{h_2}(p,q)$.

Observação 1

Para $p = 0$ e $q = 1$ então $L(0,1) = S^2 \times S^1$.

Pela definição 2.11, temos que $h_*(m_2) = m_1$. Em $S^2 \times S^1$ podemos fazer a seguinte decomposição:

$$S^1 \times S^2 = (S^1 \times D_1^2) \bigcup_{S^1 \times S^1} (S^1 \times D_2^2) \quad \text{onde} \quad S^2 = D_1^2 \bigcup_{S^1} D_2^2. \quad \text{Usando}$$

do teorema 2.2, podemos obter homeomorfismos

$$f: \partial(S^1 \times D_1^2)_1 \rightarrow \partial(S^1 \times D_1^2)_1 \quad \text{e} \quad g: \partial(S^1 \times D_2^2)_2 \rightarrow \partial(S^1 \times D_2^2)_2.$$

Portanto, pelo lema 2.10, podemos estender f e g da seguinte forma $F: S^1 \times D_1^2 \rightarrow S^1 \times D_1^2$, $G: S^1 \times D_2^2 \rightarrow S^1 \times D_2^2$, observando que $\frac{S^2 \times I}{(a,0) \sim (a,1)} \cong S^2 \times S^1$. Seja $p: S^1 \times D_1^2 \bigcup_h (S^1 \times D_2^2) \rightarrow L(0,1)$ a identificação. Da comutatividade do diagrama, segue-se pelo teorema 1, 2.4 o homeomorfismo entre $S^1 \times S^2$ e $L(0,1)$.

Observação 2

$$L(1,q) \cong S^3.$$

Pela definição 2.11, fazendo $p = 1$ e q qualquer em h_* obtemos $h_*(m_2) = \ell_1 + qm_1$.

Em S^3 , fazemos $S^3 = R^3 + \infty$, como reunião de um toro sólido $S^1 \times D_1^2$ com seu complementar que é também um toro sólido. Pelo teorema 2.2, podemos obter homeomorfismos $f: \partial(S^1 \times D_1^2)_1 \rightarrow \partial(S^1 \times D_1^2)_1$ e $g: \partial(S^1 \times D_2^2)_2 \rightarrow \partial(S^1 \times D_2^2)_2$ que levam m_2 e m_1 respectivamente em meridianos nas imagens.

Portanto, pelo lema 2.10, podemos estender f e g da seguinte forma $F: S^1 \times D_1^2 \rightarrow S^1 \times D_1^2$ e $G: S^1 \times D_2^2 \rightarrow S^1 \times D_2^2$. Sendo $p: (S^1 \times D_1^2) \cup_h (S^1 \times D_2^2) \rightarrow L(1,q)$ a identificação, temos o diagrama abaixo comutativo. Portanto, pelo teorema 1, 2.4 segue-se o homeomorfismo entre S^3 e $L(1,q)$.

Proposição 2.12

O grupo fundamental de $L(p,q)$ é isomorfo a $\mathbb{Z}_p$.

Demonstração

Tomemos $L(p,q) = (S^1 \times D^2) \cup_h (S^1 \times D^2)$ onde

$h: \partial(S^1 \times D^2) \rightarrow \partial(S^1 \times D^2)$ homeomorfismo tal que:

$h_*: \pi_1(\partial(S^1 \times D^2)) \rightarrow \pi_1(\partial(S^1 \times D^2))$ com $h_*(m_2) = pm_1 + qm_1$ e também p e q relativamente primos, $0 < q < p$.

Consideremos os espaços conexos por caminhos $X_0 = S^1 \times S^1$, $X_1 = S^1 \times D^2$, $X_2 = S^1 \times D^2$ e $X = L(p,q)$ com os respectivos grupos $\pi_1(X_0) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $\pi_1(X_1) \cong \mathbb{Z}$ e $\pi_1(X_2) \cong \mathbb{Z}$.

Pelo teorema I, 4.6, vem que:

Usando as definições de i_{1*} e i_{2*} , vamos encontrar as respectivas imagens dos geradores de $\pi_1(X_0)$. Observe que $i_{1*}(1,0) = 1$ e $i_{1*}(0,1) = 0$.

Passemos agora a determinar as imagens de i_{2*} sobre os geradores de $\pi_1(X_0)$. Sabemos que $H_1(S^1 \times S^1) \cong \pi_1(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ e que $H_1(X_1) \cong \pi_1(X_1)$, $H_1(X_2) \cong \pi_1(X_2)$.

Temos que $h_*: H_1(S^1 \times S^1) \rightarrow H_1(S^1 \times S^1)$,

$$h_* = \begin{bmatrix} r & p \\ s & q \end{bmatrix} \text{ com } rq - sp = 1$$

$$(1,0) \mapsto h_*(1,0) = (r,s)$$

$$(0,1) \mapsto h_*(0,1) = (p,q)$$

$$H_1(S^1 \times D^2) \xleftarrow{i_*} H_1(S^1 \times S^1) \xrightarrow{i_*} H_1(S^1 \times S^1) \xrightarrow{h_*^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \\ 0 & \end{bmatrix}} H_1(S^1 \times D^2)$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longleftrightarrow & (1,0) & \longrightarrow & (r,s) & \longrightarrow & r \\ 0 & \longleftrightarrow & (0,1) & \longrightarrow & (p,q) & \longrightarrow & p \end{array}$$

Então, $h_*^{-1} \circ h_*(1,0) = p$ e $h_*^{-1} \circ h_*(0,1) = r$.

Como $\pi_1(X_1) \cong Z = |b:|$ e $\pi_1(X_2) \cong Z \cong |a:|$ de acordo com a observação feita no §4 do Capítulo I, podemos escrever o grupo fundamental de $L(p,q)$ como sendo:

$$\begin{aligned} \pi_1(L(p,q)) &\cong |a,b: i_{1*}(1,0) = h_*^{-1}h_*(1,0), i_{1*}(0,1) = h_*^{-1}h_*(0,1)| = \\ &= |a,b: 1 = a^p, b = a^r|. \end{aligned}$$

Assim, concluímos que $\pi_1(L(p,q)) \cong |a: a^p = 1| \cong Z_p$.

Observação

Como vimos pela proposição anterior, o grupo fundamental de $L(p,q)$ não depende de q .

Logo, os espaços $L(p,1), L(p,2), \dots, L(p,p-1)$ apre-

sentam grupo fundamental isomorfo a Z_p .

De acordo com [2] tem-se que $L(p,q)$ e $L(p,q')$ são homeomorfos se e somente se $\pm q' \equiv \pm q \pmod{p}$.

Além disso, a classificação destes espaços quanto ao tipo de homotopia tem-se que $L(p,q)$ e $L(p,q')$ são do mesmo tipo de homotopia se e somente se $\pm qq' \equiv m^2 \pmod{p}$ para algum m (ver [19]).

Assim, por exemplo, $L(7,1)$ e $L(7,2)$ são 3-variedades que tem o mesmo tipo de homotopia mas não são homeomorfos.

§3 - ESPAÇOS LENTICULARES - DEFINIÇÃO CLÁSSICA

Nesta descrição obteremos os espaços lenticulares pelo corte através de uma "lente" com identificação nos bordos.

Considere a bola unitária B^3 em R^3 . Então identifique cada ponto da metade superior ($Z \geq 0$) de ∂B^3 com a imagem obtida por meio de rotação de um ângulo de $\frac{2\pi q}{p}$, ao redor do eixo Z , seguido de uma reflexão no plano xy , como podemos ver na figura abaixo.

Vamos verificar que o espaço com a identificação acima é $L(p,q)$ segundo a definição 2.11.

Seja V_1 a parte interna do espaço contido no cilindro $x^2 + y^2 \leq 1/4$ (com identificações) e V_2 o complementar do fecho.

Podemos ver que V_1 com as identificações acima descritas é um toro sólido e que V_2 é um toro sólido também.

A figura abaixo nos mostra um caso particular onde tomamos $p = 5$ e $q = 2$.

FIGURA 1

Em V_1 fazemos as identificações do topo com a base e obtemos um toro sólido.

Para ver que V_2 é também um toro sólido, cortamos V_2 em cinco partes e identificamos conforme figura 1.

Juntando as partes de acôrdo com as identificações indicadas obtemos a figura 2.

FIGURA 2

Na figura 2 se identificarmos o topo com a base obtemos um toro V_2 e se colocarmos o meridiano e a longitude nesse toro Standart podemos ver na figura 3.

Seja α um meridiano de V_1 e β uma longitude de V_1 . Como o espaço $L(5,2)$ é caracterizado pelo valor da aplicação $h_*: H_1(\partial V_1) \rightarrow H_1(\partial V_2)$ um meridiano, devemos portanto, encontrar a imagem de α pela h_* .

Podemos dividir $\alpha = \alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \alpha_3 \vee \alpha_4 \vee \alpha_5$ onde

$\alpha_1 \in A, \alpha_2 \in E, \alpha_3 \in D, \alpha_4 \in C, \alpha_5 \in B.$

Usando as identificações, podemos ver que: $A \equiv E,$
 $B \equiv A, C \equiv B, D \equiv C, E \equiv D.$

Assim, $h_*(\alpha_1) = 1\phi.$ Portanto, $h_*(\alpha) = 5\phi + 2\psi$ e
 $h_*(\beta) = 2\phi + 1\psi.$

Logo, h_* pode ser representada pela seguinte matriz:

$h_* = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$ Usando a definição 2.11, o espaço $L(5,2)$ é

caracterizado pela matriz $A = \begin{bmatrix} r & 5 \\ s & 2 \end{bmatrix}$ tal que $\det A = \pm 1.$

Portanto, a definição 2.11 é equivalente a este parágrafo.

Um caso particular da definição dada neste parágrafo é o homeomorfismo entre $L(2,1) \approx RP^3$ ($RP^3 = S^3$ com identificação dos pontos antípodas).

Assim, baseado nessas descrições dos espaços $L(p,q)$ com p e q relativamente primos, podemos obter vários exemplos de espaços (variedades) conhecidos variando somente os p e $q.$

§ 4 - ESPAÇOS LENTICULARES COMO ÓRBITA DA AÇÃO DE Z_p em S^3

Consideremos $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ o subespaço

$S^3 = \{(Z_0, Z_1) \in \mathbb{C}^2 / |Z_0|^2 + |Z_1|^2 = 1\}.$

Seja $\tau: S^3 \rightarrow S^3$ definida por $\tau(Z_0, Z_1) =$

$= (e^{\frac{2\pi i}{p}} Z_0, e^{\frac{2\pi i}{q}} Z_1)$ homeomorfismo com p e q relativamente primos.

Observemos que τ tem período p , isto é, $\tau^p = \text{Id}_{S^3}.$

Logo, τ define uma ação de Z_p em S^3 como $\bar{K}.x = \tau^K(x)$ para todo $K \in Z$ e $x \in S^3$. Além disso, $q: S^3 \rightarrow S^3/Z_p$ é um revestimento regular pois, S^3 é (localmente conexo por caminhos) e Z_p é um grupo totalmente descontínuo de homeomorfismo de S^3 .

Consideremos o espaço das órbitas desta ação, isto é, identificamos os pontos $x, y \in S^3$ se $x = \tau^K(y)$ para algum $K \in Z$.

Verificaremos que o espaço das órbitas é homeomorfo a $L(p, q)$ conforme descrição do parágrafo anterior. Isto faremos em três etapas.

1) $A = \{(Z_0, Z_1) \in \mathbb{C}^2 / |Z_0|^2 + |Z_1|^2 = 1, 0 \leq \arg Z_0 \leq \frac{2\pi}{p}\}$ é

uma lente. Sabemos que $S^1 \subset A$, pois, $Z_0 = 0$ tem-se que $\{(0, Z_1) \in \mathbb{C}^2 / |Z_1|^2 = 1\} = S^1$.

Seja $B = \{w_0 \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \arg w_0 \leq \frac{2\pi}{p} \text{ e } |w_0|^2 \leq 1\}$. Então $B \times S^1$ é um toro sólido. Definimos $f: B \times S^1 \rightarrow A$ / $f(w_0, \theta) = (w_0, e^{2\pi i \theta} \sqrt{1 - |w_0|^2})$ e podemos ver que se $|w_0| = 1$ então, $f(w_0, \theta) = (w_0, 0)$, $\forall \theta \in S^1$. Usando o teorema 1, 2.5 temos o diagrama

comutativo onde F é homeomorfismo e K_f é relação de equivalência definida por f .

2) A é região fundamental pois, todos os pontos de espaço quociente S^3/Z_p tem ao menos um representante em A e os pontos de A representa um único ponto.

Assim, restringindo a relação definida por τ em A e tomando-se a restrição $q|_A$ temos o homeomorfismo entre $A/\sim$ e $X(p,q)$.

3) Resta-nos verificar que $A/\sim$ é do tipo da descrição do parágrafo anterior.

Temos
$$\partial A = \begin{cases} \arg x_0 = 0 \\ \arg z_0 = \frac{2\pi}{p} \end{cases}$$

Tomemos $Z = (\lambda, z_1) \in \partial A$ e vamos aplicar τ no ponto Z . Então fica: $\tau(\lambda, z_1) = (e^{\frac{2\pi i}{p}} \lambda, e^{\frac{2\pi i q}{p}} z_1)$. Daí segue-se que $\arg(e^{\frac{2\pi i}{p}} \lambda) = \frac{2\pi}{p}$ e portanto, $e^{\frac{2\pi i}{p}} \lambda \in \partial A$. Também podemos ver que $|\tau(Z)| = |Z|$. Geometricamente podemos ver em A :

$$B_1 \approx B_2$$

Assim, a relação em A após as identificações coincide com aquela dada no parágrafo anterior. Assim, conclui-se que $X(p,q)$ é homeomorfo a $L(p,q)$.

CAPÍTULO IV

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM HOMOLOGIA PRÉ-FIXADA

Dado um espaço topológico X , temos associado ao mesmo grupos abelianos $H_q(X)$, $q = 0, 1, 2, \dots$ que são seus grupos de homologia.

Se a natureza do espaço X não for muito ruim, a partir de um valor de q os grupos $H_q(X)$ se anulam e os não nulos são finitamente gerados.

Neste capítulo nos propomos a estudar a possibilidade de dada uma coleção de grupos abelianos $G_0, G_1, G_2, \dots, G_n$, construir um espaço $X = X(G_0, G_1, G_2, \dots, G_n)$ tal que $H_i(X) = G_i$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Claro está, nem toda coleção de grupos poderá ser realizada como se pode verificar facilmente; basta lembrar por exemplo, que $H_0(X) = \mathbb{Z}^m$ onde m é o número de componentes conexas de X . Segue-se daí que se tomarmos G_0 grupo abeliano com alguma torção estamos impossibilitados de realizá-lo como $H_0(X)$.

Fazemos desde já a restrição de que $G_0 = \mathbb{Z}$ o que significa que estamos procurando um espaço topológico conexo e, daqui por diante, não faremos mais menção do primeiro grupo da sequência, isto é, estaremos preocupados somente com a realização de sequência do tipo $G_1, G_2, \dots, G_n$ através de espaços conexos.

Mostraremos, inicialmente, como construir um espaço (C.W.) cuja homologia realiza uma sequência de grupos sem no en

tanto nos preocupar com a "natureza" do mesmo e a seguir tentaremos o mesmo exigindo que o espaço seja uma variedade diferenciável.

Naturalmente que no caso de procurarmos uma variedade diferenciável temos que nos restringir à seqüência de grupos ainda mais especiais para conseguirmos tal realização.

§1 - REALIZAÇÃO POR C.W.

Teorema 1.1

Dados grupos abelianos finitamente gerados $G_1, G_2, \dots$ $\dots G_n$ existe um espaço celular $X = X(G_1, G_2, \dots, G_n)$ tal que $H_i(X) = G_i$ $i = 1, 2, \dots, n$. Além disso, X pode ser escolhido de tal forma a ter apenas células de dimensão $\leq n + 1$.

Demonstração:

Faremos a demonstração por indução sobre n .

Para $n = 1$

Mostremos que existe X conexo tal que $H_1(X) = G_1$.

Suponhamos $G_1 = \mathbb{Z}^m \oplus \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$. Tomemos $X_i = D^2 \bigcup_{f_i} S^1$ onde $f_i: \partial D^2 \rightarrow S^1$ de grau n_i e assim $H_1(X_i) = \mathbb{Z}_{n_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Tomemos $X = \left(\bigvee_{j=1}^m S_j^1 \right) \vee \left(\bigvee_{i=1}^r X_i \right)$ que satisfaz às condições pedidas, isto é, X é conexo e $H_1(X) = G_1$

Suponhamos o teorema válido para n , e provemos que também é válido para $n + 1$. Então dada a seqüência $G_1, G_2, \dots G_n, G_{n+1}$ temos X_1 tal que $H_i(X_1) = G_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, uti

lizamos este X_1 para encontrar X tal que $H_i(X) = G_i$,
 $i = 1, 2, \dots, n, n+1$.

Consideremos $Y_i = D^{n+2} \bigcup_{f_i} S^{n+1}$ onde
 $f: \partial D^{n+2} \rightarrow S^{n+1}$ tem grau n_i .

Então temos que $H_{n+1}(Y_i) = \mathbb{Z}_{n_i}$ e $H_j(Y_i) = 0$ se
 $j = 1, 2, \dots, n$.

Seja $X = X_1 \vee \left(\bigvee_{k=1}^m S_k^{n+1} \right) \vee \left(\bigvee_{i=1}^r Y_i \right)$. Logo, temos que
 $H_i(X) = G_i$, $i = 1, 2, \dots, n+1$.

Observações:

1) A seqüência $G_1, G_2, \dots, G_n$ só terá chance de ser realizada como homologia de variedade se se respeitarem as condições necessárias contidas nos teoremas 1, 5.1 e 1, 5.3.

2) Nos restringiremos aqui à variedades compactas, orientáveis (sobre $\mathbb{Z}$) e conexas, de dimensão n e, portanto, $G_0 = \mathbb{Z}$ e $G_n = \mathbb{Z}$. Com isso omitiremos a citação sobre G_0 e G_n daqui para frente.

3) Se nos permitíssemos a realização de variedades com bordo, sem restrição de dimensão, veríamos que é sempre possível mergulhar o complexo realizado em algum $\mathbb{R}^N$ (teorema IV, 1.1) e daí, a sua vizinhança tubular (com bordo) realizaria a seqüência $G_1, G_2, \dots, G_n$ já que a vizinhança tubular retrai-se no complexo (ver C.P. Rourke - B.J. Sanderson; Introduction to Piecewise - Linear Topology).

Não foi possível desenvolver o processo indutivo para a realização da seqüência $G_1, G_2, \dots, G_n$ através de variedades.

Faremos a realização das seqüências nos casos de

$n = 1, 2, 3, 4$.

No caso $n = 1$, temos o círculo S^1 que nos realiza a sequência $G_0 = Z$ e $G_1 = Z$ apenas.

No caso $n = 2$, temos a classificação das superfícies e, portanto, sabemos quais os grupos que podem ser realizados, que são exatamente os grupos Z^{2g} onde g é o genus da superfície.

Os casos $n = 3$ e 4 serão abordados a seguir.

§2 - REALIZAÇÃO POR VARIEDADES DE DIMENSÃO 3

O problema que colocamos agora é o seguinte:

Dados G_1 e G_2 achar uma variedade M^3 compacta, o rientável, (sem bordo) tal que $H_1(M^3) = G_1$ e $H_2(M^3) = G_2$.

Notemos que neste caso, a realização só será possível se tivermos $\text{ran } K G_1 = \text{ran } K G_2$ e G_2 livre de torção (pelo teorema II, 5.1)

Teorema 2.1

Dados G_1 e G_2 grupos abelianos finitamente gerados com $\text{ran } K G_1 = \text{ran } K G_2$ e G_2 livre de torção, então existe uma variedade $M^3 = M^3(G_1, G_2)$ compacta, conexa, orientável (sem bordo) tal que $H_1(M^3) = G_1$ e $H_2(M^3) = G_2$.

Demonstração:

Faremos a demonstração do teorema construindo efetivamente uma variedade M^3 , utilizando para isso as variedades S^3 , P^3 , $S^1 \times S^3$ e de um modo geral os espaços lenticulares $L(m, n)$

com m e n relativamente primos.

Seja então $G_1 = Z^m \oplus Z_{m_1} \oplus Z_{m_2} \oplus \dots \oplus Z_{m_r}$ e

$$M^3 = \left[\coprod_{i=1}^m (S^1 \times S^2)_i \right] \coprod \left[\coprod_{i=1}^r L(m_i, n_i) \right] \text{ onde } n_i \text{ é inteiro}$$

relativamente primo com m_i , $i = 1, 2, \dots, r$.

Verifiquemos que M^3 satisfaz às condições. Aplicando a proposição II, 1.2 podemos ver que $H_1\left(\coprod_{i=1}^m (S^1 \times S^2)_i\right) = Z^m$, $H_2\left(\coprod_{i=1}^m (S^1 \times S^2)_i\right) = Z^m$ e $H_1\left(\coprod_{i=1}^r L(m_i, n_i)\right) = \bigoplus_{i=1}^r Z_{m_i}$ e

$$H_2\left(\coprod_{i=1}^r L(m_i, n_i)\right) = 0.$$

Aplicando novamente a proposição II, 1.2 vem que:

$$H_1(M^3) = H_1\left(\coprod_{i=1}^m (S^1 \times S^2)_i\right) \oplus H_1\left(\coprod_{i=1}^r L(m_i, n_i)\right) = Z^m \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^r Z_{m_i}\right) = G_1.$$

$$H_2(M^3) = H_2\left(\coprod_{i=1}^m (S^1 \times S^2)_i\right) \oplus H_2\left(\coprod_{i=1}^r L(m_i, n_i)\right) = G_2.$$

§3 - REALIZAÇÃO POR VARIEDADES DE DIMENSÃO 4

Neste caso, estamos procurando M^4 compacta, conexa, orientável (sem bordo) tal que $H_1(M^4) = G_1$, $H_2(M^4) = G_2$ e $H_3(M^4) = G_3$.

Observemos que a realização só será possível se $\text{ran } K G_1 = \text{ran } K G_3$ e G_3 livre de torção e torção $G_2 = \text{torção } G_1$ pelos teoremas II, 5.1 e II, 5.3.

Teorema 3.1

Dados G_1, G_2, G_3 grupos abelianos finitamente gerados com $\text{ran } K G_1 = \text{ran } K G_3$, G_3 livre e torção $G_1 \cong \text{torção } G_2$, então existe $M^4 = M^4(G_1, G_2, G_3)$ compacta, conexa, orientável, sem bordo, tal que $H_i(M^4) = G_i$, $i = 1, 2, 3$.

A título de ilustração provemos alguns casos particulares do Teorema 3.1.

Proposição 3.2

Nas condições do teorema acima, suponha $G_1 = \mathbb{Z}^n$, $G_2 = \mathbb{Z}^m$ e $G_3 = \mathbb{Z}^n$. Então existe variedade $N^4 = N^4(n, m)$, compacta, orientável, conexa (sem bordo) tal que $H_i(N^4) = G_i$, $i = 1, 2, 3$.

Demonstração:

Seja $N^4 = [\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i] \amalg [\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i]$ onde CP^2 = espaço projetivo complexo.

Usando a proposição 11, 1.2 vem que:

$$\begin{aligned} H_1 \left(\left[\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i \right] \right) &= \mathbb{Z}^n, \quad H_2 \left(\left[\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i \right] \right) = 0, \quad H_3 \left(\left[\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i \right] \right) = \\ &= \mathbb{Z}^n \\ H_1 \left(\left[\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i \right] \right) &= 0, \quad H_2 \left(\left[\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i \right] \right) = \mathbb{Z}^m, \quad H_3 \left(\left[\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i \right] \right) = 0 \end{aligned}$$

Dai concluímos que:

$$H_1(N^4) = H_1 \left(\left[\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i \right] \right) \oplus H_1 \left(\left[\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i \right] \right) = \mathbb{Z}^n$$

$$H_2(N^4) = H_2\left(\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i\right) \oplus H_2\left(\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i\right) = Z^m$$

$$H_3(N^4) = H_3\left(\coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i\right) \oplus H_3\left(\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i\right) = Z^n.$$

Casos Particulares da Proposição 3.2

1) Se $G_1 = G_3 = 0$ e $G_2 = Z^m$ então tome $N^4 = \coprod_{i=1}^m (CP^2)_i$ e teremos $H_1(N^4) = H_3(N^4) = 0$ e $H_2(N^4) = Z^m$.

2) Se tivermos $G_1 = G_3 = Z^n$ e $G_2 = 0$ tomemos $N^4 = \coprod_{i=1}^n (S^1 \times S^3)_i$.

Então, aplicando a proposição 11, 1.2 temos que $H_1(N^4) = H_3(N^4) = Z^n$ e $H_2(N^4) = 0$.

Proposição 3.3

Nas condições do lema 3.1, suponha $G_1 = Z^s \oplus Z_r$, $G_2 = Z_r$ e $G_3 = Z^s$. Então existe uma variedade, $L^4 = L^4(r,s)$, compacta, orientável, conexa (sem bordo) tal que $H_i(L^4) = G_i$ $i = 1, 2, 3$.

Demonstração:

Seja $L^4 = (L(r,p) \times S^1) \coprod_{i=1}^{s-1} (CP^2)_i$ onde $L(r,p)$ são os espaços lenticulares. Aplicando a proposição 11, 1.2 vem que: $H_1\left(\coprod_{i=1}^{s-1} (CP^2)_i\right) = Z^{s-1}$, $H_2\left(\coprod_{i=1}^{s-1} (CP^2)_i\right) = 0$, $H_3\left(\coprod_{i=1}^{s-1} (CP^2)_i\right) = Z^{s-1}$.

Usando o teorema 1,5.9 podemos calcular os grupos de homologia de $L(r,p) \times S^1$. Assim tem-se $H_1(L(r,p) \times S^1) = Z \oplus Z_r$

$$H_2(L(r,p) \times S^1) = Z_r, \quad H_3(L(r,p) \times S^1) = Z$$

Aplicando novamente a proposição 11, 1.2 vem que:

$$H_1(L^4) = Z^5 \oplus Z_r, \quad H_2(L^4) = Z_r \quad \text{e} \quad H_3(L^4) = Z^5.$$

3.4 - Homologia de $L(n,m)-D^3$

$L(n,m)$ = espaços lenticulares com $(n,m) = 1$.

Consideremos o par $(L(n,m), L(n,m)-D^3)$ e suponha que $D^3 \subset D_1^3$. Logo, $U = L(n,m) - D_1^3 \subset L(n,m)-D^3 = A$ e também

$$\begin{aligned} \bar{U} &\subset \bar{A}. \text{ Pelo teorema da excisão temos } H_q(L(n,m), A) \approx \\ &\approx H_q(L(n,m) - U, A - U) \approx \\ &\approx H_q(D_1^3, S^2) = \begin{cases} Z & \text{se } q = 3 \\ 0 & \text{se } q \neq 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Temos a seqüência exata do par $(L(n,m), L(n,m)-D^3)$:

$$\rightarrow H_{q+1}(L(n,m), L(n,m)-D^3) \rightarrow H_q(L(n,m)-D^3) \rightarrow H_q(L(n,m)) \rightarrow$$

$$\rightarrow H_q(L(n,m), L(n,m) - D^3) \rightarrow$$

$$\text{Se } q = 0 \text{ temos } 0 \rightarrow H_0(L(n,m) - D^3) \rightarrow Z \rightarrow 0$$

$$\text{donde } H_0(L(n,m) - D^3) \approx Z.$$

$$\text{Se } q = 1 \text{ temos } 0 \rightarrow H_1(L(n,m)-D^3) \rightarrow Z_n \rightarrow 0.$$

$$\text{donde } H_1(L(n,m) - D^3) \approx Z_n.$$

Cálculo de $H_3(L(n,m) - D^3)$

$$\text{Seja } D^3 \subset D_1^3 \text{ então } (L(n,m) - D_1^3) \subset (L(n,m) - D^3)$$

Portanto, temos $L(n,m) - D_1^3 \xrightarrow[\pi]{i} L(n,m) - D^3$

Assim, $H_3(L(n,m) - D_1^3) \cong H_3(L(n,m) - D^3)$. Como $H_3(L(n,m)) \cong \mathbb{Z}$, $H_3(L(n,m) - D_1^3) \cong 0$. Logo, $H_3(L(n,m) - D^3) \cong 0$

Cálculo de $H_2(L(n,m) - D^3)$

Da definição III, 3 temos $\frac{S^2}{\sim} \xrightarrow[\pi]{i} L(n,m) - D^3$

Portanto, $H_2(S^2/\sim) \cong H_2(\frac{D^2}{\text{rotação } \frac{2\pi}{q}}) \cong H_2(D^2) \cong 0$.

Logo, $H_2(L(n,m) - D^3) \cong 0$.

Assim conclui-se que:

$$H_q(L(n,m) - D^3) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } q = 0 \\ \mathbb{Z}_n & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } q \geq 2 \end{cases}$$

Lema 3.5

Nas condições do teorema 3.1 suponha que $G_1 = \mathbb{Z}_n$, $G_2 = \mathbb{Z}_n$ e $G_3 = 0$. Então existe uma variedade L^4 , compacta, orientável, conexa (sem bordo) tal que $H_i(L^4) = G_i$ com $i = 1, 2$ e 3 .

Demonstração:

Sejam $M^4 = L(n,m) \times S^1$ e $D^3 \times S^1 \subset M^4$ representando o gerador de $S^1 \subset M^4$ onde $L(n,m)$ espaços lenticulares e $(n,m) = 1$.

Consideremos $M_f^4 = (L(n,m) \times S^1 - (D^3 \times S^1)) \cup_f D^2 \times S^2$ onde $f: S^1 \times S^2 \rightarrow S^1 \times S^2$ homeomorfismo entre $\partial(D^2 \times S^2) \cong \partial(D^3 \times S^1)$.

Como $(L(n,m) \times S^1 - (D^3 \times S^1)) = (L(n,m) - D^3) \times S^1$ e sabemos que $H_1(L(n,m) - D^3) \cong \mathbb{Z}_n$, $H_2(L(n,m) - D^3) \cong 0$ e $H_3(L(n,m) - D^3) \cong 0$, podemos calcular os grupos de homologia pelo teorema 1, 5.9, isto é:

$$\begin{aligned} H_1((L(n,m) - D^3) \times S^1) &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n, \quad H_2((L(n,m) - D^3) \times S^1) \cong \mathbb{Z}_n \\ \text{e } H_3((L(n,m) - D^3) \times S^1) &\cong 0, \text{ e observando que } H_1(D^2 \times S^2) \cong 0, \\ H_2(D^2 \times S^2) &\cong \mathbb{Z}, \quad H_3(D^2 \times S^2) \cong 0; \\ H_1(S^1 \times S^2) &\cong \mathbb{Z}, \quad H_2(S^1 \times S^2) \cong \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Usando a seqüência de Mayer-Vietoris temos que:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H_{q+1}(M_f^4) \xrightarrow{\Delta} H_q(S^1 \times S^2) \xrightarrow{\Psi} H_q((L(n,m) - D^3) \times S^1) \oplus H_q(D^2 \times S^2) \xrightarrow{\phi} \\ H_q(M_f^4) \rightarrow \end{aligned}$$

Logo $0 \rightarrow H_4(M_f^4) \rightarrow H_3(S^1 \times S^2) \rightarrow 0$ e portanto, $H_4(M_f^4) \cong \mathbb{Z}$.

Cálculo de $H_3(M_f^4)$

$$0 \rightarrow H_3(M_f^4) \xrightarrow{\Delta} H_2(S^1 \times S^2) \xrightarrow{\Psi} H_2((L(n,m) - D^3) \times S^1) \oplus H_2(D^2 \times S^2) \rightarrow$$

Temos $\Psi: H_2(S^1 \times S^2) \rightarrow H_2((L(n,m) - D^3) \times S^1) \oplus H_2(D^2 \times S^2)$

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z} \quad \Psi(\alpha) = (*, \alpha)$$

Logo, Ψ é monomorfismo e $\text{Ker } \Psi = \text{im } \Delta$. Então

$$H_3(M_f^4) \cong 0.$$

Cálculo de $H_2(M_f^4)$

Consideremos a seqüência exata:

$$0 \rightarrow Z \xrightarrow{g_4} Z_n \oplus Z \xrightarrow{g_3} H_2(M_f^4) \xrightarrow{g_2} Z \xrightarrow{g_1} Z_n \oplus Z. \text{ Dai temos}$$

$$\text{Ker } g_4 = 0 \quad \therefore \quad \frac{Z_n \oplus Z}{\text{Ker } g_3} \approx \text{im } g_3. \text{ Logo, } \text{Ker } g_2 \approx \text{im } g_3 \approx$$

$$\frac{Z_n \oplus Z}{Z} \approx Z_n. \text{ Como } g_1 \text{ é monomorfismo segue-se } \frac{H_2(M_f^4)}{Z_n} = 0. \text{ Da}$$

$$\text{condição } G_1 = G_2 \text{ vemos que } H_2(M_f^4) = Z_n$$

Cálculo de $H_1(M_f^4)$

Para calcularmos $H_1(M_f^4)$ aplicamos o lema II, 3.3 e obtemos $\pi_1(M_f^4) \approx Z_n$. Segue-se que $H_1(M_f^4) \approx Z_n$.

Desta maneira, tomemos $L^4 = M_f^4$ e então teremos $H_1(L^4) = G_1$, $H_2(L^4) = G_2$ e $H_3(L^4) = G_3$ satisfazendo às condições iniciais.

Proposição 3.6

Nas condições do teorema 3.1, suponha que $G_1 = Z_p$, $G_2 = Z^m \oplus Z_p$, $G_3 = 0$. Então, existe uma variedade H^4 , compacta, orientável, conexa (sem bordo) tal que $H_i(H^4) = G_i$ com $i = 1, 2$ e 3 .

Demonstração

Pelo lema 3.5 podemos obter uma variedade M_1^4 tal que $H_1(M_1^4) = Z_p$, $H_2(M_1^4) = Z^m \oplus Z_p$ e $H_3(M_1^4) = 0$. Seja $H^4 = M_1^4 \amalg \left(\bigsqcup_{i=1}^m (\mathbb{CP}^2)_i \right)$. Aplicando a proposição II, 1.2 segue-se que: $H_1(H^4) = G_1$, $H_2(H^4) = G_2$, $H_3(H^4) = G_3$.

Passemos agora à demonstração do teorema 3.1. Suponha

$$G_1 = Z^\ell \oplus Z_{m_1} \oplus Z_{m_2} \oplus \dots \oplus Z_{m_r}, \quad G_2 = Z^m \oplus Z_{m_1} \oplus \\ \oplus Z_{m_2} \oplus \dots \oplus Z_{m_r} \quad \text{e} \quad G_3 = Z^\ell.$$

$$\text{Tomemos } X^4 = [\coprod_{i=1}^{\ell} (S^1 \times S^3)_i] \amalg [\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i] \amalg$$

$$\coprod_{i=1}^r [\coprod_{i=1}^r (L_i^4)] \quad \text{com} \quad H_1(L_i^4) = Z_{m_i}, \quad H_2(L_i^4) = Z_{m_i} \quad \text{e} \quad H_3(L_i^4) = 0.$$

Aplicando a proposição 11, 1.2 separadamente obtêm-

-se

$$H_1(\coprod_{i=1}^{\ell} (S^1 \times S^3)_i) = Z^\ell, \quad H_2(\coprod_{i=1}^{\ell} (S^1 \times S^3)_i) = 0, \quad H_3(\coprod_{i=1}^{\ell} (S^1 \times S^3)_i) =$$

$$= Z^\ell. \quad H_1(\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i) = 0, \quad H_2(\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i) = Z^m,$$

$$H_3(\coprod_{i=1}^m (CP^2)_i) = 0. \quad H_1(\coprod_{i=1}^r (L_i^4)) = \bigoplus_{i=1}^r Z_{m_i}, \quad H_2(\coprod_{i=1}^r (L_i^4)) =$$

$$= \bigoplus_{i=1}^r Z_{m_i}, \quad H_3(\coprod_{i=1}^r (L_i^4)) = 0$$

Aplicando novamente a proposição 11, 1.2 em X^4 te

mos: $H_1(X^4) = G_1$, $H_2(X^4) = G_2$, $H_3(X^4) = G_3$.

Assim, concluímos a demonstração do teorema 3.1.

Observemos que a proposição 3.6 é um caso particular do Teorema 3.1.

BIBLIOGRAFIA

- | 1 | - Bredon, G.E.; Introduction to Compact Transformation Groups, Academic Press. London and N.York (1972).
- | 2 | - Brody E.J.; The Topological Classification of the Lens Space, Ann.Math. vol.71 (1960).
- | 3 | - Cousin, A.T.; Redução dos Grupos de Homotopia de uma Variedade de Diferenciável. Dissertação de Mestrado, ICMSC-UPS (1982).
- | 4 | - Conde, A.; Introdução à Topologia Diferencial. 9º Colóquio Brasileiro de Matemática - Poços de Caldas (1973).
- | 5 | - Crowell, R.H. e Fox, R.H.; Introduction to Knot Theory GTM # 57. Springer - Verlag (1977).
- | 6 | - Dugundji, J.; Topology. Allyn and Bacon, Boston Massachusetts (1960).
- | 7 | - Greenberg, M.; Lectures on Algebraic Topology. Mathematics Lecture Note Series. N.A. Benjamin, Inc. (1967).
- | 8 | - Hempel, J.; 3-Manifolds, Princeton University Press (1976).
- | 9 | - Hu, S.T.; Homotopy Theory, Academic Press. London and N.Y. (1959).
- | 10 | - Hu, S.T.; Cohomology Theory, Chicago, Markham, (1968).
- | 11 | - Lang, S.; Algebra, Addison - Wesley, Reading, Massachussets (1964).

- |12| - Lima, E.L.; Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimentos
10º Colóquio Brasileiro de Matemática, Poços de Caldas
(1977).
- |13| - Lyra, C.B.de; - Grupo Fundamental de Revestimentos, 7º Coló
quio de Matemática Poços de Caldas (1969).
- |14| - Massey, W.; Algebraic Topology; An Introduction Springer -
- Verlag (1977).
- |15| - Milnor, J.W.; A Procedure for Killing Homotopy Groups of
Differentiable Manifolds; Differential Manifolds-Symposia
in Pure Mathematics III. AMS. (1961).
- |16| - Munkres, J.R.; Elementary Differential Topology, Princeton
University Press (1963).
- |17| - Rolfsen, D.; Knots and Links, Publish or Perish, Inc. (1976)
- |18| - Spanier, E.; Algebraic Topology, McGraw-Hill (1966).
- |19| - Whitehead, J.H.C.; On incidence matrices, nuclei and
homotopy, Ann. Math. 42.1197-1239 (1941).