UMA CARACTERIZAÇÃO DA OBSTRUÇÃO PRIMÁRIA
A EXISTÊNCIA DE SECÇÃO EM FIBRADOS

Rui Marcos de Oliveira Barros

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA AO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS DE SÃO CARLOS -
USP, PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM MATEMÁTICA.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Biasi

SÃO CARLOS

1989

A B S T R A C T

ABOUT EXISTENCE OF SECTIONS IN FIBRATIONS

Rui Marcos de Oliveira Barros

Adviser: Prof. Dr. Carlos Biasi

The main purpose of this work is to describe the primary obstruction of the existence of sections in a $(n-1)$ -oriented fiber bundle whose fiber is $(n-2)$ -connected.

We start generalizing the concept of the Euler Class, for $(n-1)$ -oriented fiber bundle and then we prove that this class is the primary obstruction if the fiber is $(n-2)$ -connected.

As an application we exhibit result about the topological classification of three dimensional manifolds.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos são feitos ao Prof. Dr. Carlos Biasi pela orientação neste trabalho e as instituições CAPES, CNPq e FAPESP que contribuíram através das bolsas de Pós-Graduação a mim concedidas.

Este trabalho dependeu parcialmente das seguintes instituições: CAPES, CNPq e FAPESP.

Í N D I C E

1. FIBRADOS	9
2. INTRODUÇÃO À TEORIA DE OBSTRUÇÃO EM FIBRADOS	19
3. DEFINIÇÃO DA CLASSE DE THOM E DA CLASSE DE EULER DE UM FIBRADO VETORIAL	26
4. SOBRE A SEQUÊNCIA DE HOMOLOGIA DE UMA FIBRAÇÃO ORI- ENTÁVEL E A CLASSE DE EULER GENERALIZADA	31
5. A CLASSE DE EULER COMO OBSTRUÇÃO PRIMÁRIA	43
6. APLICAÇÕES	49

INTRODUÇÃO

Sabe-se que em um fibrado vetorial orientado de posto n , $\xi = \{E, p, B, F\}$, a obstrução primária à existência de uma secção nunca nula $\gamma^n \in H^n(B, \Pi_{n-1}(S^{n-1}))$ é a classe de Euler $e(\xi) \in H^n(B)$ (veja [8]).

Seguindo esse raciocínio o objetivo principal deste trabalho é caracterizar γ^n a obstrução primária à existência de uma secção em um fibrado $(n-1)$ -orientável cuja fibra é $(n-2)$ -conexa.

Iremos primeiro generalizar o conceito de classe de Euler para fibrados $(n-1)$ -orientáveis e então mostrar que esta classe é a obstrução primária γ^n .

Essa caracterização é feita no capítulo 5 e para tal relembramos alguns resultados sobre fibrados nos quatro primeiros capítulos.

Os conceitos gerais sobre fibrados, sua sequência exata de homotopia, a ação do grupo fundamental do espaço base no q -ésimo grupo de homotopia da fibra são apresentados no capítulo 1, maiores informações sobre estes conceitos são encontrados em textos clássicos como [3] -Spanier e [10] -Steenrod.

Para falar em obstrução primária à existência de secções, apresentamos uma introdução a teoria de obstruções em fibrados no capítulo 2. No parágrafo 2.1 abordamos minuciosamente o cociclo de obstrução a existência de secção pois a caracterização a ser feita no capítulo 5 assim o exi

ge. Ressaltamos aqui a necessidade da atuação trivial do grupo fundamental da base no n -ésimo grupo de homotopia da fibra, fato este registrado no início do parágrafo 2.3 quando assumimos a n -orientabilidade do fibrado em questão; pois sem isso o sistema local de coeficientes $(\prod_n(F_b))_{b \in B}$ não seria um sistema simples (ver [9]) e teríamos que trabalhar com coeficientes torcidos.

No capítulo 3 encontra-se a definição de classe de Thom e Classe de Euler para fibrados vetoriais de posto n e também a sequência exata de homologia de um fibrado de esfera na qual verificamos que um homomorfismo Δ da mesma é exatamente a classe de cohomologia de Euler. Isso motivou a generalização da definição da classe de Euler através da análise de um homomorfismo similar a Δ da sequência de homologia de uma fibração orientável.

A apresentação de tal sequência é feita no capítulo 4 de duas maneiras, a primeira utilizando a sequência espectral de uma fibração orientável (ver [3]), a segunda utilizando o Teorema do Isomorfismo de Hurewicz.

Verificamos que nessa sequência existe um homomorfismo Δ' que é exatamente a então recém-definida classe de Euler.

Após o capítulo 5, onde provamos o resultado principal, aplicamos os estudos aqui realizados na classificação topológica de variedades de dimensão três.

Nos dois parágrafos que compõem o capítulo 6 destacam-se resultados que dão condições suficientes para que uma variedade conexa fechada de dimensão 3, com grupo funda

mental nulo, seja homeomorfa a S^3 , e também para que duas variedades conexas fechadas orientáveis de dimensão 3 sejam homeomorfas entre si.

Como exemplo desta última situação citamos certas variedades conhecidas por variedades de Brieskorn de tipo $M(p,q,r)$ que se fibram com fibra S^1 .

PRELIMINARES

Definição: Seja $f: X \rightarrow Y$ e seja Z_f o espaço quociente obtido de $X \times I$ e Y pela identificação de $(x,1)$ com $f(x)$, Z_f é dito mapping cylinder de f .

Notação: Para um fibrado $\{E, p, B\}$ usaremos em vez de Z_p o símbolo $\hat{E}$ para denotar o map cylinder, também usaremos $\hat{F}$ para indicar a fibra de $\{\hat{E}, \hat{p}, B\}$ onde $\hat{p}(x,t) = p(x)$ $t \in I$.

Notação: Quando E denotar um espaço vetorial a notação E_0 significa o conjunto dos elementos de E distintos do elemento nulo.

$\Pi_n(X, x_0)$ denota o n -ésimo grupo de homotopia do espaço X com ponto base x_0 .

$H_n(X, G)$ denota o n -ésimo grupo de homologia de X

com coeficiente no módulo G , $H^n(X, G)$ a cohomologia de X com coeficientes no módulo G .

$H(F)$ denota o conjunto dos homeomorfismos de F em F .

Seja X um espaço, $A \subset X$, $x_0 \in A$. Por uma função $f: (I^n, I^{n-1}, J^{n-1}) \rightarrow (X, A, x_0)$ nós entendemos uma função contínua que leva I^n em X , I^{n-1} em A , J^{n-1} em x_0 . Anote por $F^n(X, A, x_0)$ o conjunto de todas as funções desse tipo.

$\Pi_n(X, A, x_0)$ denota o n -ésimo grupo de homotopia do espaço X relativamente a A com ponto base x_0 , ou seja, é o conjunto das classes de homotopia de aplicações $f: (I^n, I^{n-1}, J^{n-1}) \rightarrow (X, A, x_0)$, onde I^{n-1} é a $(n-1)$ - face inicial de I^n , e a união das $(n-1)$ - faces restantes é J^{n-1} .

Definição: Dizemos que um espaço Y é n -conexo se $\Pi_i(Y) = 0$ para $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Operação de $\Pi_1(X)$ em $\Pi_n(X)$: Vamos supor X conexo por caminhos, tal que dados dois pontos distintos quaisquer x e y em X , eles podem ser ligados por um caminho, isto é, existe $\omega: I \rightarrow X$ contínua tal que $\omega(0) = x$ e $\omega(1) = y$, considere $\bar{\omega}(t) = \omega(1-t)$.

Podemos também considerar $[f] \in \Pi_n(X, x_0)$ como sendo a classe de homotopia de $f: (J^n, \dot{J}^n) \rightarrow (X, x_0)$ onde J^n é o "cubo" n -dimensional $(t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$ com $|t_i| \leq 1$.

Construo $h_{[\omega]}: \Pi_n(X, \omega(1)) \rightarrow \Pi_n(X, \omega(0))$ do seguinte modo:

se $[f] \in \Pi_n(X, x_0)$ então $h_{[\omega]}[f]$ é a classe de homotopia de

$$h_{[\omega]} f = \begin{cases} f(2t_1, \dots, 2t_n) & \text{se } (t_1, \dots, t_n) \in J_{1/2}^n \\ \bar{\omega}(2 \max |t_i| - 1) & \text{se } (t_1, \dots, t_n) \in J^n - J_{1/2}^n \end{cases}$$

onde $(t_1, \dots, t_n) \in J_{1/2}^n$ se $\max |t_i| \leq \frac{1}{2}$.

Verifica-se sem muita dificuldade que $h_{[\omega]}$ é bem definida e que independe também do particular representante da classe $[\omega]$.

Por este raciocínio vemos que $\Pi_1(X, x_0)$ é um grupo de operadores para $\Pi_n(X, x_0)$.

Definição: Um espaço conexo por caminhos X é dito n -simples (para $n > 1$) se para algum $x_0 \in X$ (e então para todos os pontos base $x \in X$) $\Pi_1(X, x_0)$ atua trivialmente em $\Pi_n(X, x_0)$.

Definição: X diz-se simplesmente conexo se $\Pi_1(X, x_0) = 0 \quad \forall x_0 \in X$.

Então um espaço simplesmente conexo é n -simples para todo $n \geq 1$, e um espaço X é 1-simples se e só se $\Pi_1(X, x_0)$ for abeliano. Para espaços n -simples existe um único isomorfismo canônico $\Pi_n(X, x_0) \approx \Pi_n(X, x_1)$ e $\Pi_n(X, x_0)$ está em correspondência biunívoca com as classes de homotopias livres de aplicações de S^n em X . Assim para espaços n -simples nós omitimos o ponto base e escrevemos apenas $\Pi_n(X)$.

Utilizando o desenvolvimento anterior que explicita o modo de $\Pi_1(X, x_0)$ atuar em $\Pi_n(X, x_0)$ vemos que $\Pi_1(X, x_0)$ atua sobre si mesmo através de conjugação.

Teorema do Isomorfismo de Hurewicz: Seja $x_0 \in A \subset X$ e assumamos que A e X são conexos por caminhos. Se existe um $n \geq 2$ tal que $\Pi_q(X, A, x_0) = 0$ para todo $q < n$, então $H_q(X, A, x_0) = 0$ para $q < n$ e existe um isomorfismo

$$\Pi'_n(X, A, x_0) \cong H_n(X, A) .$$

Conversamente, se A e X são simplesmente conexos e existe um $n \geq 2$ tal que $H_q(X, A) = 0$ para $q < n$, então $\Pi_q(X, A, x_0) = 0$ para $q < n$ e existe um isomorfismo

$$\Pi_n(X, A, x_0) \cong H_n(X, A) . \quad \blacksquare$$

Teorema (Absoluto): Seja $x_0 \in X$ e assumamos que existe $n \geq 1$ tal que $\Pi_q(X, x_0) = 0$ para $q < n$. Então $H_q(X, x_0) = 0$ para $q < n$ e existe isomorfismo

$$\Pi'_n(X, x_0) \cong H_n(X, x_0) .$$

Conversamente se X é simplesmente conexo e existe um $n \geq 2$ tal que $H_q(X, x_0) = 0$ para $q < n$, então $\Pi_q(X, x_0) = 0$ para $q < n$ e existe um isomorfismo

$$\Pi_n(X, x_0) \cong H_n(X, x_0) . \quad \blacksquare$$

Observação: $\Pi'_n(X, x_0)$ denota o grupo quociente de $\Pi_n(X, x_0)$ pelo subgrupo normal H gerado por

$$\left\{ (h_{[\omega]}[\alpha])[\alpha]^{-1} \text{ tal que } [\alpha] \in \Pi_n(X, x_0), [\omega] \in \Pi_1(X, x_0) \right\}.$$

Observe que se X é n -simples então $\forall [\omega] \in \Pi_1(X, x_0), h_{[\omega]}[\alpha] = [\alpha]$ para qualquer $[\alpha] \in \Pi_n(X, x_0)$. Logo o subgrupo H é o subgrupo nulo, ou seja, $\Pi'_n(X, x_0) = \Pi_n(X, x_0)$.

Definição: Um CW relativo (X, A) consiste de um espaço topológico X um subespaço fechado A , e uma sequência de subespaços fechados $(X, A)^k$ para $k \geq 0$ tais que:

- a) $(X, A)^0$ é obtido de A por adjunção de 0-células;
- b) Para $k \geq 1$ $(X, A)^k$ é obtido de $(X, A)^{k-1}$ por adjunção de k -células;
- c) $X = \bigcup (X, A)^k$;
- d) X tem topologia coerente com $\left\{ (X, A)^k \right\}_k$.

Definição: Dados dois CW relativos (X, A) e (X', A') e uma aplicação $f: (X, A) \rightarrow (X', A')$ dizemos que f é celular se $f((X, A)^k) \subset (X', A')^k$ para todo k .

Usando a caracterização dada anteriormente para $\Pi_n(X, A, x_0)$ o operador $\partial: \Pi_n(X, A, x_0) \rightarrow \Pi_{n-1}(A, x_0)$ fica caracterizado por:

se $f: (I^n, I^{n-1}, J^{n-1}) \rightarrow (X, A, x_0)$ então $\partial f: (I^{n-1}, I^{n-2},$

$$J^{n-2}) \rightarrow (A, x_0, x_0) .$$

Sequências exatas: Seja (X, A) um par topológico, então existe uma sequência exata de homotopia e uma sequência exata de homologia do par (X, A) , são elas:

$$\dots \xrightarrow{\partial_*} \Pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \Pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \Pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial_*} \Pi_{n-1}(A, x_0) \rightarrow \dots$$

$$\dots \xrightarrow{j_*} \Pi_2(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial_*} \Pi_1(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \Pi_1(X, x_0) .$$

$$\dots \xrightarrow{\partial_*} H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{n-1}(A) \rightarrow \dots$$

$$\dots \xrightarrow{j_*} H_2(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_1(A, x_0) \xrightarrow{i_*} H_1(X, x_0) .$$

Teorema dos Coeficientes Universais para Homologia: Se R é um domínio de ideais principais e C_n é um módulo livre sobre R para todo inteiro n , então existe um isomorfismo.

$$H_n(C; G) \simeq H_n(C) \otimes G \oplus \text{Tor} [H_{n-1}(C), G] \text{ para qual-} \\ \text{quer } R\text{-módulo } G. \quad \blacksquare$$

Teorema dos Coeficientes Universais para Cohomologia: Se R é um domínio de ideais principais e C_n é um módulo livre sobre R para todo inteiro n , então existe um isomorfismo

$$H^n(C; G) \simeq \text{Hom} [H_n(C), G] \oplus \text{Ext} [H_{n-1}(C), G] \text{ para} \\ \text{qualquer } R\text{-módulo } G. \quad \blacksquare$$

OBS: Neste trabalho estamos admitindo implicitamente que no conceito de fibrado o espaço base é paracompacto e portanto faz sentido falar em fibração correspondente a um fibrado. Por isso o termo $\{E, p, B, F\}$ é um fibrado n -orientado significa que a fibração correspondente a $\{E, p, B, F\}$ é n -orientada, isto é, $\Pi_1(B)$ atua trivialmente em $H_n(F)$. Já o termo "fibração orientada" significa $\Pi_1(B)$ atuando trivialmente em $H_q(F)$ para qualquer $q \in \mathbb{N}$.

CAPÍTULO 1

Neste capítulo relembremos resultados envolvendo fibrados.

Apesar de importantes e muito usados no prosseguimento do texto suas demonstrações fogem do objetivo desta dissertação, e assim vimos por bem omití-las. Tais demonstrações e fatos complementares são encontrados em textos clássicos como [3] e [10].

1. FIBRADOS

1.1 - Definições

DEFINIÇÃO 1.1.1: Um fibrado $\{E, p, B, F\}$ consiste num espaço total E , num espaço base B , numa fibra F e numa projeção $p: E \rightarrow B$ tais que existe um recobrimento aberto $\{U\}$ de B e para cada $U \in \{U\}$ um homeomorfismo $\phi_U: p^{-1}(U) \rightarrow U \times F$ tal que vale a comutatividade do seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 p^{-1}(U) & \xrightarrow{\phi_U} & U \times F \\
 \downarrow p & \searrow \Pi_1 & \\
 U & &
 \end{array}$$

Onde Π_1 denota a projeção na primeira coordenada. $\phi = \{\phi_U\}$ é chamado de sistema de trivialização local.

Para nosso estudo a base B será sempre um espaço paracompacto. Na realidade nos interessa casos onde a base B seja um espaço CW.

Seja $\{E, p, B, F\}$ um fibrado e $G \subset H(F)$ (considerado como subgrupo topológico). Dizemos que o fibrado admite G como grupo estrutural se existir um sistema $\{\phi_i, V_i\}_{i \in I}$ de trivializações locais do fibrado com a seguinte propriedade:

Dados $i, j \in I$, $\phi_{ix} \circ \phi_{jx}^{-1} \in G \quad \forall x \in V_i \cap V_j$

$$\begin{array}{ccccc}
 V_i \cap V_j \times F & \xleftarrow{\phi_j} & p^{-1}(V_i \cap V_j) & \xrightarrow{\phi_i} & V_i \cap V_j \times F \\
 & \searrow \Pi_1 & \downarrow p & \swarrow \Pi_1 & \\
 & & V_i \cap V_j & &
 \end{array}$$

onde $\phi_{ix} = \phi_i \Big|_{p^{-1}(x)}$ e $\phi_{jx} = \phi_j \Big|_{p^{-1}(x)}$

Podemos pensar assim: $\phi_{ix} \circ \phi_{jx}^{-1}(y) =$
 $= \phi_i \circ \phi_j^{-1}(x, y) = (x, g_{ij}(x)(y)) = (x, g_{ij}(x) \cdot y),$

$g_{ij}(x) \in G$ com $g_{ij} : V_i \cap V_j \rightarrow G$.

As funções g_{ij} são chamadas funções de transição.

PROPOSIÇÃO 1.1.2: Seja $\{E, p, B\}$ um fibrado. Então dada uma homotopia $h: X \times I \rightarrow B$ se existir $\bar{h}_0: X \rightarrow E$ tal que $p \circ \bar{h}_0 = h_0$ então existe $\bar{h}: X \times I \rightarrow E$ tal que $p \circ \bar{h} = h$. ■

Dizemos neste caso que $\{E, p, B\}$ tem a propriedade do levantamento de homotopia.

DEFINIÇÃO 1.1.3: Dados dois fibrados $\xi = \{E, p, B\}$ e $\eta = \{E', p', B'\}$ uma aplicação entre ξ e η (ou aplicação

"fibre-preserving") é um par $(\bar{f}, f)$ onde $\bar{f}: E \rightarrow E'$, $f: B \rightarrow B'$ e o diagrama comuta.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\bar{f}} & E' \\ p \downarrow & & \downarrow p' \\ B & \xrightarrow{f} & B' \end{array}$$

DEFINIÇÃO 1.1.4: Dados dois fibrados $\xi = \{E, p, B, F\}$ e $\{E', p', B, F\}$ com mesmo grupo estrutural e duas aplicações $h_0, h_1: \xi \rightarrow \eta$. Nós dizemos que h_0 e h_1 são homotópicas (como aplicações de fibrados) se existe $h: \xi \times I \rightarrow \eta$ tal que $h(b, 0) = h_0(b)$ e $h(b, 1) = h_1(b)$. É claro que a induzida na base $\bar{h}: B \times I \rightarrow B$ é uma homotopia como já conhecíamos, entre $\bar{h}_0$ e $\bar{h}_1$ ambas de B e B .

DEFINIÇÃO 1.1.5: A homotopia h é dita estacionária com a induzida $\bar{h}$ se, para cada $e \in E$ e cada intervalo $[t_1, t_2]$ tal que $\bar{h}[p(e), t]$ é constante para $t_1 \leq t \leq t_2$, então $h(e, t)$ é constante para $t_1 \leq t \leq t_2$.

TEOREMA 1.1.6: Seja $\xi = \{E, p, B\}$ um fibrado sobre uma base B e X um CW. Sejam $f_0: X \rightarrow E$ e $\bar{f}: X \times I \rightarrow B$ uma homotopia tal que $\bar{f}(x, 0) = p \circ f_0(x)$. Então existe uma homotopia $f: X \times I \rightarrow E$ de f_0 tal que $p \circ f = \bar{f}$ (isto é, é um levantamento de $\bar{f}$) e que é estacionária com f . ■

DEFINIÇÃO 1.1.7: Por um morfismo entre dois fibrados entendemos uma aplicação de fibrados onde a aplicação entre as bases é a identidade.

DEFINIÇÃO 1.1.8: Seja (ϕ, V) uma trivialização qualquer de $\{E, p, B\}$, dizemos que (ϕ, V) é admissível com o sistema $\{\phi_i, V_i\}$ se $\forall i \in I, \forall x \in V \cap V_i$ temos $\phi_{ix} \circ \phi_x^{-1} \in G$.

DEFINIÇÃO 1.1.9: Dizemos que $\{E, p, B, F\}$ é um fibrado dotado de um sistema de trivializações maximal se toda trivialização admissível já pertence ao sistema $\{\phi_i, V_i\}$ inicial. Este então é dito um fibrado com grupo estrutural G e fibra F .

DEFINIÇÃO 1.1.10: Um G -fibrado principal sobre B é um fibrado com grupo estrutural G , fibra G e base B .

Supor F e F' espaços onde G atua efetivamente, isto é, se $g.x = x \quad \forall x \in F$ então $g = 1$; Dado um fibrado $\{E, p, B, F\}$ com grupo estrutural G e um sistema de trivialização $\{\phi_i, V_i\}$ podemos construir um novo fibrado $\{E', p, B, F'\}$ utilizando as mesmas funções de transição g_{ij} de $\{E, p, B, F\}$. Este novo fibrado tem fibra F' e é dito fibrado com fibra F' associado a $\{E, p, B, F\}$.

DEFINIÇÃO 1.1.11: O fibrado com fibra G associado a $\{E, p, B\}$ é chamado "G-fibrado principal associado" ao fibrado dado.

DEFINIÇÃO 1.1.12: Reduzir o grupo estrutural G de um fibrado é encontrar um subgrupo de G tal que as funções de transição restritas a cada fibra ainda pertençam a este subgrupo.

DEFINIÇÃO 1.1.13: Dado um par de G-fibrados

$\{E, p, B, F\}$ e $\{E', p', B', F'\}$. Uma G-aplicação entre eles é um par $f: B \rightarrow B'$ e $\tilde{f}: E \rightarrow E'$ tal que dados $\{\psi_i, U_i\}$ e $\{\phi_j, V_j\}$ com $f(V_j) \subset U_i$ então

$$\psi_{if(x)} \circ \tilde{f}_x \circ \phi_{jx}^{-1} \in G, \quad \forall x \in V_j$$

$$V_j \times F \xleftarrow{\phi_j} p^{-1}(V_j) \xrightarrow{\tilde{f}} p^{-1}(U_i) \xrightarrow{\psi_i} U_i \times F$$

$$\{x\} \times F \dots F_x \dots F'_{f(x)} \dots \{f(x)\} \times F$$

DEFINIÇÃO 1.1.14: Dados dois fibrados com grupo

estrutural G e fibra F, dizemos que eles são G-equivalentes se existir uma G-aplicação fibrada entre elas onde a aplicação entre as bases é a identidade.

DEFINIÇÃO 1.1.15: Dizemos que um fibrado é tri-

vial se seu grupo estrutural pode ser reduzido ao grupo nulo (de um só elemento).

A definição acima nos diz que um fibrado trivial tem seu espaço total expresso como um produto cartesiano da base pela fibra, $E \approx B \times F$, visto que o sistema de trivializações locais é composto de um único homeomorfismo e a vizinhança aberta em B é o próprio espaço, $\{\phi, B\}$ com $\phi: B \rightarrow B \times F$.

DEFINIÇÃO 1.1.16: dizemos que um fibrado é vetorial se a

fibra for um espaço vetorial e existir um sistema de trivializações locais tal que $g_{ij}(x)$ é linear para todo x pertencente a B.

DEFINIÇÃO 1.1.17: Uma secção num fibrado $\{E, p, B\}$ é uma aplicação $s : B \rightarrow E$ tal que $p \circ s = 1_B$.

Utilizaremos mais tarde a noção de secção no n -esqueleto de B quando este for um CW, esta será uma aplicação $s : B_n \rightarrow E$ tal que $p \circ s = 1_{B_n}$.

DEFINIÇÃO 1.1.18: Dado $\{E, p, B, F\}$ e uma aplicação $f : X \rightarrow B$ o "pull-back" de $\{E, p, B, F\}$ por f é o fibrado $\{E', p', X, F\}$ onde $E' = \{(x, y) \in X \times E \text{ tal que } f(x) = p(y)\}$ e $p' : E' \rightarrow X$ é a projecção no primeiro fator.

PROPOSIÇÃO 1.1.20: Todo fibrado vetorial com fibra de dimensão n admite $O(n)$ como grupo estrutural. ■

DEFINIÇÃO 1.1.21: Um n -fibrado vetorial é dito orientável se pudermos escolher uma orientação em cada fibra F_x tal que seja possível escolher um sistema de trivializações $\{\phi_i, V_i\}$ tal que $\phi_{ix} : F_x \rightarrow \mathbb{R}^n$ preserva orientação.

PROPOSIÇÃO 1.1.22: Um n -fibrado vetorial é orientável se e só se admite $SO(n)$ como grupo estrutural. ■

PROPOSIÇÃO 1.1.23: Seja $\{M^m, p, N^n, S^p\}$ onde N é orientável. Então o fibrado é orientável se e só se M é orientável. ■

PROPOSIÇÃO 1.1.24: Fibrção orientável com base orientável implica espaço total orientável. ■

PROPOSIÇÃO 1.1.25: Se o espaço total e a base são orientáveis então se o fibrado é vetorial ele é orientável. ■

PROPOSIÇÃO 1.1.26: Todo pull-back de um fibrado com grupo estrutural G tem grupo estrutural G . ■

PROPOSIÇÃO 1.1.27: Seja $\{E, p, B\}$ um G -fibrado e $f, g: B' \rightarrow B$ homotópicas então os "pull-backs" de $\{E, p, B\}$ por f e por g são G -equivalentes. ■

COROLÁRIO 1.1.28: Se B é contrátil então todo fibrado sobre B é trivial.

DEFINIÇÃO 1.1.29: Dados dois fibrados $\xi = \{E, p, B\}$ e $\eta = \{E', p', B\}$ a soma de Whitney $\xi \oplus \eta$ é o fibrado $\xi \oplus \eta = \{\bar{E}, \pi, B\}$ onde $\bar{E} = \{(x, y) \in E \times E' \text{ tais que } p(x) = p'(y)\}$ e π é definido por $\pi(x, y) = p(x)$ ou por $\pi(x, y) = p'(y)$.

1.2 - A sequência de homotopia de um fibrado

Admitimos que o leitor já tenha familiaridade com a sequência exata de homotopia do par (X, A) .

TEOREMA 1.2.1: (fundamental). Seja $\{E, p, B\}$ um fibrado, $B' \subset B$, $E' = p^{-1}(B')$, $y_0 \in E'$, $x_0 = p(y_0)$. Então se $n \geq 2$

$P_*: \Pi_n(E, E', y_0) \rightarrow \Pi_n(B, B', x_0)$ é isomorfismo. ■

COROLÁRIO 1.2.2: $p_{\#} : \Pi_n(E, F, y_0) \rightarrow \Pi_n(B, x_0)$, $n \geq 2$
é isomorfismo.

Então tomando a sequência de homotopia do par (E, F)

$$\dots \rightarrow \Pi_n(F) \xrightarrow{i} \Pi_n(E) \xrightarrow{j} \Pi_n(E, F) \xrightarrow{\partial} \Pi_{n-1}(F) \rightarrow \dots$$

e utilizando $\Pi_n(E, F) \simeq \Pi_n(B)$ $n > 2$ temos:

$$\dots \rightarrow \Pi_n(F) \xrightarrow{i} \Pi_n(E) \xrightarrow{p} \Pi_n(B) \xrightarrow{\Delta} \Pi_{n-1}(F) \rightarrow \dots$$

$$\dots \rightarrow \Pi_2(B) \xrightarrow{\Delta} \Pi_1(F) \rightarrow \Pi_1(E) \rightarrow \Pi_1(B)$$

onde $\Delta = \partial \circ (p_{\#})^{-1} : \Pi_n(B, x_0) \rightarrow \Pi_{n-1}(F, y_0)$.

TEOREMA 1.2.3: A sequência acima é exata, e é chamada sequência exata de homotopia do fibrado $\{E, p, B\}$. ■

OBS: O isomorfismo entre $\Pi_1(E, F, y_0)$ e $\Pi_1(B, x_0, x_0)$ é imediato.

1.3 - Ação de $\Pi_1(B)$ em $\Pi_n(F)$

Considere agora $\{E, p, B\}$ um fibrado com fibra n -simples.

Seja λ um caminho em B que liga os pontos b e a , $\lambda(0) = b$, $\lambda(1) = a$. Chamemos de F_a e F_b as fibras sobre a e b respectivamente. Tomemos

$$h : F_a \times I \rightarrow B, \quad h(x, t) = \lambda(1-t), \quad h_0(x) = h(x, 0) = a.$$

h_0 se levanta a $\{0\} \times F_a \rightarrow E$ através da própria inclusão.

Por definição existe $\bar{h}: F_a \times I \rightarrow E$ tal que
 p o $\bar{h}(x, t) = h(x, t) = \lambda(1-t)$, portanto temos $\bar{h}_1: F_a \times \{1\} \rightarrow F_b$
 notação $\bar{h}_1 = \lambda_{\#}$.

Propriedades:

a) Se $\lambda = \text{cte}$ então $\lambda_{\#}: F_a \rightarrow F_a$ é homotópica a
 identidade;

b) Se $\alpha, \beta: I \rightarrow B$ são homotópicas (rel $\dot{I}$) então
 $\alpha_{\#}$ e $\beta_{\#}$ são homotópicas;

c) Se α é um caminho ligando c a b e β é um cami-
 nho ligando b a a então: $(\alpha\beta)_{\#} \sim \alpha_{\#} \circ \beta_{\#}$.

A ação de $\Pi_1(B)$ em $\Pi_n(F)$ (ou em $H_n(F)$ caso F seja
 $(n-1)$ -conexa é construída assim:

$$\Pi_1(B) \times \Pi_n(F) \rightarrow \Pi_n(F)$$

$$(\alpha, \mu) \rightarrow \alpha_{\#}(\mu)$$

$$(*) \text{ Se } \alpha \sim 0 \text{ então } 0_{\#}(\mu) = \mu ; \forall \mu \in \Pi_n(F).$$

$$(**) \text{ Se } \alpha \text{ e } \beta \text{ são como na propriedade c) acima, en-} \\
\text{tão } (\alpha\beta)_{\#}(\mu) = (\alpha_{\#} \circ \beta_{\#})(\mu) = \alpha_{\#} \beta_{\#}(\mu) .$$

CAPÍTULO 2

O estudo referente a introdução à Teoria de Obstrução a extensão de funções pressupõe-se conhecida. Tal conteúdo pode ser encontrado em [5] e [7]. Neste capítulo fazemos a introdução à teoria de obstrução em fibrados estudando a obstrução a existência de secções. Esta introdução aqui apresentada é uma adaptação da teoria de obstrução para fibrações contida em [9]. Veremos adiante que a obstrução primária exposta no parágrafo 2.3 será caracterizada como a classe de Euler generalizada ainda a ser definida.

2. INTRODUÇÃO À TEORIA DE OBSTRUÇÃO EM FIBRADOS

2.1 - O cociclo de obstrução à existência de secções em fibrados

Em nossa abordagem do assunto vamos supor $\xi = \{E, p, B, F\}$ um fibrado com F conexo por caminhos e o espaço base B um CW (também conexo por caminhos).

Seja $f: B_q \rightarrow E$ tal que $p \circ f = 1_{B_q}$ dizemos neste caso que f é uma secção no q -ésimo esqueleto de B . O problema de encontrar $g: B \rightarrow E$ tal que $p \circ g = 1_B$, isto é, encontrar uma secção global será atacado passo a passo tentando o aumento de dimensão do q -ésimo esqueleto.

Desde que B é 0 -conexo, p leva E sobre B , isto é, se e é um vértice de B existe um ponto $x \in p^{-1}(e)$. Podemos definir portanto uma secção no 0 -esqueleto $g_0: B_0 \rightarrow E$.

Seja B_α^1 uma 1 -célula de B com função característica $h_\alpha: (\Delta^1, \dot{\Delta}^1) \rightarrow (B_\alpha^1, \dot{B}_\alpha^1)$. Desde que Δ^1 é contrátil o pull-back $q_\alpha: W_\alpha \rightarrow \Delta^1$ induzido por h_α é equivalente ao fibrado trivial, e o espaço W_α tem o mesmo tipo de homotopia que $\Delta^1 \times F$, e então como F , é 0 -conexo.

Então a secção parcial de q_α , definida pela aplicação $g_\alpha \circ h_\alpha|_{\dot{\Delta}^1} : \dot{\Delta}^1 \rightarrow E$ tem extensão $k_\alpha : \Delta^1 \rightarrow W_\alpha$. Essa função k_α não precisa ser uma secção, entretanto $q_\alpha \circ k_\alpha$ coincide com a identidade em $\dot{\Delta}^1$. Desde que Δ^1 é 1-conexo $q_\alpha \circ k_\alpha \sim 1_{\dot{\Delta}^1}$ (rel $\dot{\Delta}^1$).

Pela propriedade de levantamento de homotopia k_α é homotópica a uma secção $k'_\alpha : \Delta^1 \rightarrow W_\alpha$. A função k'_α define por sua vez um levantamento $\ell_\alpha : \Delta^1 \rightarrow E$ de h_α que estende o levantamento $g_\alpha \circ h_\alpha|_{\dot{\Delta}^1}$.

Então $f_\alpha = \ell_\alpha \circ h_\alpha^{-1} : B_\alpha^1 \rightarrow E$ é uma secção parcial sobre B_α^1 que estende $g_\alpha|_{B_\alpha^1}$. As secções parciais sobre as 1-células de B , juntas definem uma secção $g_1 : B_1 \rightarrow E$ extensão de g_0 .

Provamos então:

TEOREMA 2.1.1: Se $\{E, p, B, F\}$ é um fibrado sobre um CW B , conexo, com F 0-conexa então existe secção $g_1 : B_1 \rightarrow E$. ■

Suponha agora que $g_n : B_n \rightarrow E$ seja uma secção ($n \geq 1$) e assuma que F é n -simples e que $\Pi_1(B)$ atua trivialmente em $\Pi_n(F)$; de modo que o sistema de coeficientes locais em B formado pelos $\Pi_n(F)$ é simples.

Seja B_α^{n+1} uma célula de B com função característica $h_\alpha : (\Delta^{n+1}, \dot{\Delta}^{n+1}) \rightarrow (B_\alpha^{n+1}, \dot{B}_\alpha^{n+1})$, vamos assumir $h_\alpha(e_0) = x_0$ um ponto arbitrário de B já que este é conexo (e_0 denota o 1º vértice de Δ^{n+1}).

A composta $g_n \circ h_\alpha|_{\dot{\Delta}^{n+1}}$ define uma secção $k_\alpha : \dot{\Delta}^{n+1} \rightarrow W_\alpha$ do pull-back $\{W_\alpha, q_\alpha, \Delta^{n+1}\}$ induzido por h_α . Desde que Δ^{n+1} é contrátil W_α tem o mesmo tipo de homotopia que a fibra $q_\alpha^{-1}(e_0) = F_\alpha$.

Então k_α representa um elemento unicamente determinado $\bar{c}^{n+1}(e_\alpha) \in \Pi_n(F_\alpha)$. (e_α é a $(n+1)$ -célula B_α^{n+1}).

A função $\bar{c}^{n+1}$ assim definida é a cocadeia $\bar{c}^{n+1} = \bar{c}^{n+1}(g_n) \in C^{n+1}(B; \Pi_n(F))$, dito obstrução a extensão da secção parcial g_n .

TEOREMA 2.1.2: A cocadeia de obstrução $\bar{c}^{n+1}(g_n)$ tem as seguintes propriedades:

- a) A secção g_n pode ser estendida a uma secção parcial sobre $B_n \cup B_\alpha^{n+1}$ se e só se $\bar{c}^{n+1}(e_\alpha) = 0$;
- b) A secção g_n pode ser estendida a uma secção sobre B_{n+1} se e só se $\bar{c}^{n+1}(g_n) = 0$;
- c) A cocadeia $\bar{c}^{n+1}(g_n)$ é um cociclo de B com coeficientes no grupo $\Pi_n(F)$.
- d) Se $\psi: B' \rightarrow B$ é aplicação celular entre dois CW e $g'_n = g_n \circ \psi|_{B'_n}: B'_n \rightarrow E$, então $\bar{c}^{n+1}(g') = \psi^\# \bar{c}^{n+1}(g_n)$;
- e) Se $g_{0,n}$ e $g_{1,n}$ são secções sobre B_n , que são verticalmente homotópicas então $\bar{c}^{n+1}(g_{0,n}) = \bar{c}^{n+1}(g_{1,n})$; ■

DEFINIÇÃO 2.1.3: Seja $\{E, p, B, F\}$ um fibrado, uma homotopia $h: I \times Y \rightarrow E$ entre duas funções $f_0, f_1: Y \rightarrow E$ é dita homotopia vertical se

$$p \circ h(t, y_0) = p \circ f_t(y_0) = x_0 \quad \forall t \in I.$$

2.2 - A cocadeia diferença

Nós podemos aplicar os resultados anteriores para estudar a existência de homotopia vertical entre duas sec-

ções parciais. De fato, sejam g_0 e $g_1 : B_n \rightarrow E$ secções parciais e seja $h : I \times B_n \rightarrow E$ homotopia vertical entre $g_0|_{B_{n-1}}$ e $g_1|_{B_{n-1}}$. Estas funções juntas definem um levantamento parcial

$g : \dot{I} \times B_n \cup I \times B_{n-1} \rightarrow E$ de $p_2 : I \times B \rightarrow B$ que é projeção no segundo fator.

A cocadeia diferença de g_0 e g_1 com respeito a h é a cocadeia $\bar{d}^n = \bar{d}^n(g) = \bar{d}^n(g_0, g_1, h) \in C^n(B; \Pi_n(F))$ tal que

$$\bar{d}^n(e_\alpha) = (-1)^n \cdot \bar{c}^{n+1}(g) \text{ em } \dot{I} \times e_\alpha \cup I \times (\partial e_\alpha).$$

Se a homotopia h é estacionária, ou seja $g_0|_{B_{n-1}} = g_1|_{B_{n-1}}$, nós escrevemos $\bar{d}^n(g_0, g_1)$ ao invés de $\bar{d}^n(g_0, g_1, h)$.

TEOREMA 2.2.1: A cocadeia diferença tem as seguintes propriedades:

a) A aplicação $h : I \times B_{n-1} \rightarrow E$ pode ser estendida a uma homotopia vertical $\bar{h}_\alpha : I \times (B_{n-1} \cup B_\alpha^n)$ entre restrições de g_0 e g_1 a $B_{n-1} \cup B_\alpha^n$ se e só se $\bar{d}^n(e_\alpha) = 0$;

b) A aplicação h pode ser estendida a uma homotopia vertical $\bar{h} : I \times B_n \rightarrow E$ entre g_0 e g_1 , se e só se $\bar{d}^n(g) = 0$;

c) O cobordo de $\bar{d}^n(g)$ é dado por

$$\delta \bar{d}^n(g) = \bar{c}^{n+1}(g_1) - \bar{c}^{n+1}(g_0) ;$$

d) Se $g_0 : B_n \rightarrow E$ é uma secção parcial, $h : I \times B_{n-1} \rightarrow E$ uma homotopia vertical de $g_0|_{B_{n-1}}$ a uma secção $f : B_{n-1} \rightarrow E$, e $d \in C^n(B; \Pi_n(F))$, então f pode ser estendida a uma secção $g_1 : B_n \rightarrow E$ tal que $\bar{d}^n(g_0, g_1, h) = d$;

e) Sejam $g_i : B_n \rightarrow E$ secções parciais ($i = 0, 1, 2$), e sejam as homotopias verticais $h_{01} : I \times B_{n-1} \rightarrow E$ entre restrições de g_0 e g_1 a B_{n-1} e $h_{12} : I \times B_{n-1} \rightarrow E$ entre restrições de g_1 e g_2 a B_{n-1} .

Seja $h_{02} : I \times B_{n-1} \rightarrow E$ a homotopia de g_0 e g_2 definida por h_{01} e h_{12} então: $\bar{d}^n(g_0, g_2, h_{02}) = \bar{d}^n(g_0, g_1, h_{01}) + \bar{d}^n(g_1, g_2, h_{12})$;

f) Seja $\psi : B' \rightarrow B$ uma aplicação celular, e seja $g : I \times B_n \cup I \times B_{n-1} \rightarrow E$ um levantamento de $p_2 : I \times B \rightarrow B$ (projeção no segundo fator). Então

$$\bar{d}^n(g \circ \psi|_{I \times B_n \cup I \times B_{n-1}}) = \psi^* \bar{d}^n(g).$$

COROLÁRIO 2.2.2: A cocadeia $\bar{c}^{n+1}(g_n)$ é um cobordo se e somente se $g_n|_{B_{n-1}}$ pode ser estendida a uma secção $g : B_{n+1} \rightarrow E$.

2.3 - A obstrução primária à uma secção

Seja $\{E, p, B, F\}$ fibrado n -orientável com base B CW 0 -conexo e $F(n-1)$ -conexa ($n \geq 1$; se $n=1$ assumimos F 1 -simples). Como resultado dos teoremas 2.1.1 e 2.1.2:

TEOREMA 2.3.1: Uma secção no 0 -esqueleto $f : B_0 \rightarrow E$ (que sempre existe) pode ser estendida a uma secção parcial $g : B_n \rightarrow E$. Se g_0 e g_1 são duas extensões, então $g_0|_{B_{n-1}}$ e $g_1|_{B_{n-1}}$ são verticalmente homotópicas.

Sejam $g_0, g_1 : B_{n-1} \rightarrow E$ secções parciais e seja $h : I \times B_{n-1} \rightarrow E$ uma homotopia vertical entre suas restrições a B_{n-1} . Então a cocadeia $\bar{d}^n = \bar{d}^n(g_0, g_1, h) \in C^n(K, L; \Pi_n(F))$ é definida e $\delta \bar{d}^n = \bar{c}^{n+1}(g_1) - \bar{c}^{n+1}(g_0)$ por teorema 2.1.2.

Então os cociclos de obstrução $\bar{c}^{n+1}(g)$ para todas as extensões de f são todos cohomólogos, isto é, diferem por um cobordo. A esta classe de cohomologia

$\bar{\gamma}^{n+1} = \bar{\gamma}^{n+1}(f) \in H^{n+1}(B, \Pi_n(F))$ chamamos obstrução primária a extensão de f .

As seguintes propriedades de $\bar{\gamma}^{n+1}(f)$ são consequências imediatas do teorema 2.1.2.

TEOREMA 2.3.3: A obstrução primária $\bar{\gamma}^{n+1}(f)$ tem as seguintes propriedades:

a) A secção f pode ser estendida a uma secção $g : B_{n+1} \rightarrow E$ se e só se $\bar{\gamma}^{n+1}(f) = 0$;

b) Se $\psi : B' \rightarrow B$ é uma aplicação celular e se $f : B_0 \rightarrow E$ é secção então $f \circ \psi|_{B'_0} : B'_0 \rightarrow E$ é secção parcial e

$$\bar{\gamma}^{n+1}(f \circ \psi|_{B'_0}) = \psi^* \bar{\gamma}^{n+1}(f) \in H^{n+1}(B'; \Pi_n(F));$$

c) Se $f_0, f_1 : B_0 \rightarrow E$ são secções parciais verticalmente homotópicas então

$$\bar{\gamma}^{n+1}(f_0) = \bar{\gamma}^{n+1}(f_1) .$$

■

CAPÍTULO 3

Neste capítulo encontra-se o Teorema do Isomorfismo de Thom (teorema 3.0.4) que nos serve como definição da Classe de Thom e da Classe de Euler para um fibrado vetorial orientado de posto n . Vê-se que a cada orientação escolhida para um fibrado orientável existe uma única classe de Thom. E mais, como estamos trabalhando com coeficientes em $\mathbb{Z}$ se a base de nosso fibrado for conexa, quando trocarmos a orientação pela sua oposta a classe de Thom correspondente será afetada por uma multiplicação por -1 .

Ao final deste capítulo veremos uma sequência exata em que um dos homomorfismos é a própria classe de cohomologia de Euler. Esta é a motivação para definir uma classe de Thom generalizada, procurando na sequência de homologia de uma fibração orientável um homomorfismo com mesma propriedade.

3. DEFINIÇÃO DA CLASSE DE THOM E DA CLASSE DE EULER DE UM FIBRADO VETORIAL

DEFINIÇÃO 3.0.1: Duas bases num espaço vetorial finito são equivalentes se o determinante da matriz que expressa os termos de uma em relação aos termos da outra é positivo.

DEFINIÇÃO 3.0.2: Uma orientação de um espaço vetorial V de dimensão n é uma classe de equivalência de bases.

Isto corresponde a escolha um gerador (há dois) de $H_n(V, V_0; \mathbb{Z})$. A correspondência pode ser dada como segue:

Seja $v_1, \dots, v_n$ uma base para V e Δ^n o n -simplexo com vértices $A_0, \dots, A_n$. A transformação linear $\Delta^n \rightarrow V$

dada por
$$\begin{cases} A_0 \rightarrow -v_1 - v_2 \dots - v_n \\ \vdots \\ A_i \rightarrow v_i \end{cases} \quad \text{para } i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

determina um gerador de $H_n(V, V_0, \mathbb{Z})$. Duas bases determinam o mesmo gerador sob esta correspondência se e só se elas são equivalentes.

DEFINIÇÃO 3.0.3: Um n -fibrado vetorial orientado é um fibrado vetorial junto com uma orientação para cada fibra de modo que essas orientações são localmente compatíveis no seguinte sentido. Para cada ponto b_0 do espaço base existe uma vizinhança N e secções $s_1, \dots, s_n: N \rightarrow E$ tais que para cada $b \in N$ os vetores $s_1(b), \dots, s_n(b)$ formam uma base para a fibra F_b que é compatível com a orientação dada para F_b .

Em termos de cohomologia isto significa que cada fibra F_b tem um gerador distinguido $u_b \in H^n(F_b, F_{b,0}; \mathbb{Z})$ ($F_{b,0}$ denota os vetores não nulos de F_b).

A compatibilidade da orientação pode ser entendida da seguinte forma. Para cada $b_0 \in B$ existe uma vizinhança N e uma classe de cohomologia $u \in H^n(p^{-1}(N), p^{-1}(N)_{b_0}; \mathbb{Z})$ tal que $j_b^*(u) = u_b$ onde $j_b: (F_b, F_{b,0}) \rightarrow (p^{-1}(N), p^{-1}(N)_{b_0})$ denota a inclusão.

TEOREMA 3.0.4: Para um n -fibrado orientado

- 1) $H^i(E, E_0; \mathbb{Z}) = 0$ para $i < n$;
- 2) Existe uma única classe $U \in H^n(E, E_0; \mathbb{Z})$ tal que $j_b^* U = u_b$ para todo $b \in B$ onde $j_b: (F, F_0) \rightarrow (E, E_0)$ e $F = p^{-1}(b)$;
- 3) $H^i(E; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cup U} H^{i+n}(E, E_0; \mathbb{Z})$ é isomorfismo para todo i .

DEFINIÇÃO 3.0.5: Chamamos de classe de Thom do n -fibrado vetorial orientado $\{E, p, B\}$ ao elemento $U \in H^n(E, E_0)$ citado no item 2 do teorema anterior.

Considere agora $j: E \rightarrow (E, E_0)$ a injeção canônica. Que também pode ser enfatizada como $j: (E, \emptyset) \rightarrow (E, E_0)$.

E denote por $g: B \rightarrow E$ a secção nula, isto é,
 $g(b) = (b, 0) \quad \forall b \in B$.

DEFINIÇÃO 3.0.6: O elemento $e = g*j*U \in H^n(B; \mathbb{Z})$ é chamado Classe de Euler do fibrado $\{E, p, B\}$.

No próximo capítulo vamos generalizar o conceito de Classe de Euler para certos tipos de fibrados. Isto será feito concomitantemente com a apresentação da sequência de homologia de uma fibração orientável. E para motivar essa apresentação construiremos agora a sequência de homologia do fibrado de esfera de um fibrado vetorial.

Sejam $\xi = \{E, p, B, F\}$ um fibrado vetorial de posto n , $\zeta = \{E_0, p, B, F_0\}$ e $\eta = \{S, p, B, S^{n-1}\}$ o fibrado de esfera de ξ .

Vemos que cada fibra F_0 tem o mesmo tipo de homotopia que S^{n-1} logo existe uma equivalência de homotopia entre ζ e η o que resulta em $H_q(S) \approx H_q(E_0) \quad \forall q \in \mathbb{N}$.

A projeção $p: E \rightarrow B$ e a secção nula $g: B \rightarrow E$ nos dão uma equivalência de homotopia entre E e B . Portanto
 $H_q(E) \approx H_q(B) \quad \forall q \in \mathbb{N}$.

Tomando a sequência de homologia do par (F, F_0) vemos que $H_q(F, F_0) \approx H_{q-1}(F_0) \approx H_{q-1}(S^{n-1})$.

Também temos o isomorfismo $H_n(E, E_0) \approx H_n(F, F_0)$.

Então a sequência de homologia do par (E, E_0)
 $H_n(E_0) \rightarrow H_n(E) \rightarrow H_n(E, E_0) \rightarrow H_{n-1}(E_0) \rightarrow H_{n-1}(E) \rightarrow H_{n-1}(E, E_0) \rightarrow \dots$

torna-se

$$H_n(S) \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{\Delta} H_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(S) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

Para $q \leq n-2$ temos $H_q(S) \simeq H_q(B)$.

Vamos analisar o homomorfismo $\Delta: H_n(B) \rightarrow H_{n-1}(S^{n-1})$.

Convencionamos chamar $j: E \rightarrow (E, E_0)$ a inclusão canônica e $g: B \rightarrow E$ a secção nula.

Seja $\mu \in H_n(E, E_0)$ tal que $\langle U, \mu \rangle = 1 \in \mathbb{Z}$.

Observe agora o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} H_n(E) & \xrightarrow{j_*} & H_n(E, E_0) \\ \uparrow g_* & & \downarrow \gamma \\ H_n(B) & \xrightarrow{\Delta} & H_{n-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z} \end{array}$$

Tomo $[x] \in H_n(B)$. Então $[j_* g_* x] \in H_n(E, E_0)$.

Chamemos $[j_* g_* x] = [a]$.

Sabemos que $\beta\gamma(\mu) = 1$. E mais:

$$\gamma(\mu) = 1.$$

$$\langle U, \mu \rangle = 1.$$

$$\text{Então } \gamma(a) = \gamma(a \cdot \mu) = a \cdot \gamma(\mu) = a \cdot \langle U, \mu \rangle =$$

$$= \langle U, a \cdot \mu \rangle = \langle U, j_* g_* x \rangle = \langle g^* j^* U, x \rangle = \langle e, x \rangle.$$

$$\underline{\Delta(x) = \langle e, x \rangle}.$$

Veremos uma caracterização similar a esta no parágrafo 4.2 a seguir.

CAPÍTULO 4

No início deste trabalho foi apresentada a sequência de homotopia de um fibrado. Poderia se pensar que existisse uma sequência exata de homologia nos moldes da sequência de homotopia, mas isso não é verdade.

Apresentaremos aqui a sequência de homologia de um fibrado cuja fibração é orientável, isto é, um fibrado em que a atuação de $\Pi_1(B)$ em $H_q(F)$ é trivial para toda dimensão q .

No parágrafo 4.1 será usada a sequência espectral de uma fibração orientável para obtermos a sequência de homologia.

Já no parágrafo 4.2 partiremos da sequência de homologia de um par apropriado de espaços topológicos e utilizando o Teorema do Isomorfismo de Hurewicz encontramos isomorfismos adequados que possibilitam a construção da sequência desejada.

Simultaneamente estaremos definindo a classe de Euler generalizada e verificando que certo homomorfismo da sequência da homologia do fibrado é exatamente esta classe.

4. SOBRE A SEQUÊNCIA DE HOMOLOGIA DE UMA FIBRAÇÃO ORIENTÁVEL E A CLASSE DE EULER GENERALIZADA

4.1 - Apresentação e prova da sequência

Considere $\{E, p, B, F\}$ um fibrado cuja fibração é orientável.

Existe para este fibrado (ver [3]. SPANIER) uma sequência espectral convergente $\{E^r, d^r\}$, $r \geq 1$ onde:

$$E_{p,q}^1 = C_p(B, H_q(F))$$

$$d_{p,q}^1: E_{p,q}^1 \rightarrow E_{p-1,q}^1 \text{ é exatamente o operador bordo:}$$

$$\partial_p: C_p(B, H_q(F)) \rightarrow C_{p-1}(B, H_q(F)) \text{ de modo que}$$

$$\frac{\text{Ker } \partial_p}{\text{Im } \partial_{p+1}} \simeq H_p(B, H_q(F)) = E_{p,q}^2$$

E mais:

$$E_{pq}^{\infty} = \frac{F_p H_{p+q}(E)}{F_{p-1} H_{p+q}(E)} = \frac{\text{Im} [H_{p+q}(E_p) \rightarrow H_{p+q}(E)]}{\text{Im} [H_{p+q}(E_{p-1}) \rightarrow H_{p+q}(E)]}$$

onde

$E_q = p^{-1}(B_q)$ isto é, E_q é a imagem inversa do q -ésimo esqueleto de B .

$$E_{p,q}^{r+1} = \frac{\text{Ker} [E_{p,q}^r \rightarrow E_{p-r,q+r-1}^r]}{\text{Im} [E_{p+r,q-r+1}^r \rightarrow E_{p,q}^r]}$$

Usando as informações acima podemos demonstrar o seguinte:

TEOREMA 4.1.1: Seja $\{E, p, B, F\}$ orientável sobre um CW B conexo, com fibra F $(n-2)$ -conexa, conexa por caminhos ($\Pi_1(F)$ abeliano se $n = 2$). Então $H_i(E) \approx H_i(B)$ se $i \leq n-2$, e temos a seguinte sequência exata:

$$H_n(E) \xrightarrow{P_*} H_n(B) \xrightarrow{\Delta} H_{n-1}(F) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(E) \xrightarrow{P_*} H_{n-1}(B) \xrightarrow{\Delta} 0 \dots$$

Dem:

Sabemos que existe uma sequência espectral com $E_{p,q}^2 = H_p(B, H_q(F))$ o que nos leva a $E_{p,q}^r = 0$ se $p < 0$ ou se $q < 0$.

A hipótese $F(n-2)$ -conexa nos dá $E_{p,q}^2 = 0$ se $1 \leq q \leq n-2$.

Prestamos atenção ao fato de que na nossa situação se $r > \max \{p, q+1\}$ então $E_{p,q}^r = E_{p,q}^{r+1} = E_{p,q}^{r+2} = \dots = E_{p,q}^{\infty}$.

A partir de $E_{n,o}^2 = H_n(B)$ usando as informações acima:

$$H_n(B) = E_{n,o}^2 = E_{n,o}^n \xrightarrow{d_{n,o}^n} E_{o,n-1}^n$$

$$H_n(E) \longrightarrow \frac{H_n(E)}{F_{n-1}H_n(E)} = E_{n,o}^\infty = \text{Ker } d_{n,o}^n \hookrightarrow E_{n,o}^n = E_{n,o}^2 = H_n(B)$$

A aplicação p_* é a composição acima: $p_*: H_n(E) \rightarrow H_n(B)$.

$$\text{E mais } \text{Im } p_* = \text{Ker } d_{n,o}^n.$$

A partir de $E_{o,n-1}^2 = H_{n-1}(F)$ e usando as informações conhecidas:

$$E_{n,o}^n \xrightarrow{d_{n,o}^n} E_{o,n-1}^n = E_{o,n-1}^2 = H_{n-1}(F)$$

$$H_{n-1}(F) = E_{o,n-1}^2 = E_{o,n-1}^n \longrightarrow \frac{E_{o,n-1}^n}{\text{Im } d_{n,o}^n} = E_{o,n-1}^\infty = F_o H_{n-1}(E) \hookrightarrow H_{n-1}(E)$$

A aplicação i_* é a composição acima: $i_*: H_{n-1}(F) \rightarrow H_{n-1}(E)$

E mais:

$$\text{Ker } i_* = \text{Im } d_{n,o}^n ; \text{Im } i_* = E_{o,n-1}^\infty = F_o H_{n-1}(E)$$

Similarmente $p_*: H_{n-1}(E) \rightarrow H_{n-1}(B)$ é a composição

$$H_{n-1}(E) \longrightarrow \frac{H_{n-1}(E)}{F_{n-2}H_{n-1}(E)} = E_{n-1,o}^\infty \hookrightarrow E_{n-1,o}^2 = H_{n-1}(B)$$

que tem como kernel $F_{n-2}H_{n-1}(E)$.

A aplicação $\Delta: H_n(B) \rightarrow H_{n-1}(F)$ é a diferencial $d_{n,o}^n$.

Assim temos a sequência:

$$H_n(E) \xrightarrow{p_*} H_n(B) \xrightarrow{\Delta} H_{n-1}(F) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(E) \xrightarrow{p_*} H_{n-1}(B) \rightarrow 0 \dots$$

onde $\text{Im } p_* = \text{Ker } d_{n,o}^n = \text{Ker } \Delta.$

$$\text{Ker } i_* = \text{Im } d_{n,o}^n = \text{Im } \Delta.$$

Sem muita dificuldade prova-se que

$$\text{Im } i_* = F_0 H_{n-1}(E) = F_{n-2} H_{n-1}(E) = \text{Ker } p_*.$$

Os isomorfismo $H_i(E) \cong H_i(B)$ $i \leq n-2$ vêm do fato de F ser $(n-2)$ -conexa pois continuando os cálculos da sequência obtemos:

$$0 \rightarrow H_i(E) \xrightarrow{p_*} H_i(B) \rightarrow 0 \quad i \leq n-2.$$

4.2 - Demonstração utilizando o Teorema de Hurewicz

Vamos concentrar nossas atenções neste parágrafo para um fibrado $\{E, p, B\}$ com fibra $(n-2)$ -conexa e conexa por caminhos ($\Pi_1(F)$ abeliano se $n = 2$).

Seja B_1 subespaço de B e $E_1 = p^{-1}(B_1)$ então

LEMA 4.2.1: Os homomorfismo $k_1: \Pi_q(\hat{F}, F) \rightarrow \Pi_q(\hat{E}, E)$ e $k_2: \Pi_q(E, F) \rightarrow \Pi_q(\hat{E}, \hat{F})$ são isomorfismo para todo $q \geq 1$.

Considere o diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Pi_q(E, F) & \xrightarrow{k_2} & \Pi_q(\hat{E}, \hat{F}) \\ & \searrow p_* & \swarrow \hat{p}_* \\ & \Pi_q(B, *) & \end{array}$$

e observe que p_* é isomorfismo pelo corolário 1.2.2 e que $\hat{p}_*$ é isomorfismo porque $\hat{p}$ é uma equivalência de homotopia. Então k_2 é isomorfismo. A prova de k_1 ser isomorfismo vem como corolário do seguinte lema. ■

LEMA 4.2.2: Se k_2 é monomorfismo em dimensão q e epimorfismo em dimensão $q+1$, então isso também é válido para k_1 . ■

COROLÁRIO 4.2.3: Se k_2 é isomorfismo para todo q , então k_1 também o é.

A demonstração do lema 4.2.2 é um exercício de diagram-chasing no quadro seguinte.

Lembrando que $\hat{F}$ é contrátil, a sequência de homotopia do par $(\hat{F}, F)$ "quebra-se" em

$$0 \simeq \Pi_i(\hat{F}) \rightarrow \Pi_i(\hat{F}, F) \rightarrow \Pi_{i-1}(F) \rightarrow \Pi_{i-1}(\hat{F}) \simeq 0.$$

$$\text{Então para } i \leq n-1 \quad \Pi_i(\hat{E}, E) \simeq \Pi_i(\hat{F}, F) \simeq \Pi_{i-1}(F) \simeq 0.$$

$$\text{E para } i = n \quad \Pi_n(\hat{E}, E) \simeq \Pi_{n-1}(F) \simeq H_{n-1}(F).$$

Observemos que o par $(\hat{E}, E)$ é $(n-1)$ -conexo, portanto pelo teorema de Hurewicz temos

$$H_i(\hat{E}, E) = 0 \quad \text{se } i \leq n-1$$

$$H_n(\hat{E}, E) \simeq \Pi'_n(\hat{E}, E)$$

Mas a atuação de $\Pi_1(E)$ em $\Pi_n(\hat{E}, E)$ é a atuação de $\Pi_1(B)$ em $\Pi_{n-1}(F)$.

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(E) \times \Pi_n(\hat{E}, E) & \rightarrow & \Pi_n(\hat{E}, E) \\ \downarrow p_* & \cap & \cup \\ \Pi_1(B) \times \Pi_{n-1}(F) & \rightarrow & \Pi_{n-1}(F) \end{array}$$

Então se acrescentarmos a hipótese de $\{E, p, B\}$ ser $(n-1)$ -orientado teremos $\Pi_1(E)$ atuando trivialmente em $\Pi_n(\hat{E}, E)$ e portanto $H_n(\hat{E}, E) \simeq \Pi_n(\hat{E}, E)$.

Analisando a sequência de homologia do par $(\hat{E}, E)$ descobrimos os isomorfismos seguintes.

$$\begin{array}{ccccccc}
H_n(E) & \rightarrow & H_n(\hat{E}) & \xrightarrow{j_*} & H_n(\hat{E}, E) & \rightarrow & H_{n-1}(E) \rightarrow H_{n-1}(\hat{E}) \rightarrow H_{n-1}(E, E) \rightarrow \dots \\
& & \uparrow g_* & & \uparrow \mathcal{H} & & \uparrow g_* \\
& & H_n(B) & & \Pi_n(\hat{E}, E) & & H_{n-1}(B) \\
& & & & \uparrow k_1 & & \\
& & & & \Pi_n(\hat{F}, F) & & \\
& & & & \downarrow \partial_* & & \\
& & & & \Pi_{n-1}(F) & & \\
& & & & \downarrow \mathcal{H} & & \\
& & & & H_{n-1}(F) & &
\end{array}$$

O isomorfismo $g_*: H_n(B) \xrightarrow{\sim} H_n(\hat{E})$ é induzido da inclusão canônica $g: B \rightarrow E$.

Chamemos a composta $H_n(\hat{E}, E) \xrightarrow{\mathcal{H}^{-1}} \Pi_n(\hat{E}, E) \xrightarrow{k_1^{-1}}$

$$\xrightarrow{k_1^{-1}} \Pi_n(\hat{F}, F) \xrightarrow{\partial_*} \Pi_{n-1}(F) \xrightarrow{\mathcal{H}} H_{n-1}(F)$$

de $\alpha: H_n(\hat{E}, E) \rightarrow H_{n-1}(F)$.

Tomando os homomorfismos apropriados temos a sequência exata

$$H_n(E) \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{\Delta} H_{n-1}(F) \rightarrow H_{n-1}(E) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

e para $i \leq n-2$ temos os isomorfismos $H_i(E) \xrightarrow{\sim} H_i(B)$.

Vamos analisar o homomorfismo $\Delta: H_n(B) \rightarrow H_{n-1}(F)$.

Para tal tome $\hat{U} \in H^n(\hat{E}, E; H_{n-1}(F))$ tal que

$$\langle \hat{U}, x \rangle = \alpha(x).$$

Considerando as inclusões canônicas $g: B \rightarrow \hat{E}$ e $j: \hat{E} \rightarrow (\hat{E}, E)$, a classe $\hat{U}$ será levada numa classe

$$\hat{e} = g_* j_* \hat{U} \in H^n(B; H_{n-1}(F)).$$

$$\begin{aligned} \text{Assim para } x \in H_n(B), \Delta(x) &= \alpha(j_* g_*(x)) = \\ &= \langle \hat{U}, j_* g_*(x) \rangle = \langle g_* j_* \hat{U}, x \rangle = \langle \hat{e}, x \rangle. \end{aligned}$$

Chamaremos respectivamente $\hat{U}$ e $\hat{e}$ de classe de Thom e classe de Euler do fibrado $\{E, p, B\}$. Se ζ for um fibrado vetorial orientado de posto n as classes $\hat{U}$ e $\hat{e}$ do fibrado de esfera de ζ coincidem com as classes U e e de ζ . (vide apêndice). A MENOS DE SINAL

Podemos enunciar então:

TEOREMA 4.2.4: Seja $\{E, p, B\}$ fibrado com fibra $(n-2)$ -conexa e conexa por caminhos ($\Pi_1(F)$ abeliano se $n = 2$) e base conexa por caminhos e ainda mais $\Pi_1(B)$ atua trivialmente em $H_{n-1}(F) \simeq \Pi_{n-1}(F)$. Então temos a seguinte sequência exata

$$H_n(E) \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{\Delta} H_{n-1}(F) \rightarrow H_{n-1}(E) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

e para $i \leq n-2$ temos $H_i(E) \simeq H_i(B)$. ■

PROPOSIÇÃO 4.2.5: Sejam $\{E, p, B, F\}$ e $\{E_1, p_1, B_1, F\}$ fibrados com fibra $(n-2)$ -conexa ($\Pi_1(F)$ abeliano se $n = 2$) conexa por caminhos sobre bases B e B_1 , conexas por caminhos onde $\Pi_1(B)$ e $\Pi_1(B_1)$ atuam trivialmente em $H_{n-1}(F)$. Considere a aplicação fibrada $(\bar{f}, f): \{E, p, B\} \rightarrow \{E_1, p_1, B_1\}$. Então $f^*(e_1) = e$, onde e_1 é a classe de Euler do fibrado $\{E_1, p_1, B_1\}$.

Observando que o seguinte diagrama é comutativo basta provar que $f_2^*(U_1) = U$. Onde U_1 denota a classe de Thom do fibrado $\{E_1, p_1, B_1\}$.

$$\begin{array}{ccc}
 H^n(B; H_{n-1}(F)) & \xleftarrow{f^*} & H^n(B_1; H_{n-1}(F)) \\
 \uparrow g^* & & \uparrow g_1^* \\
 H^n(E; H_{n-1}(F)) & \xleftarrow{f_1^*} & H^n(E_1; H_{n-1}(F)) \\
 \uparrow j^* & & \uparrow j_1^* \\
 H^n(\hat{E}, E; H_{n-1}(F)) & \xleftarrow{f_2^*} & H^n(\hat{E}_1, E_1; H_{n-1}(F))
 \end{array}$$

Lembrando que sob nossas hipóteses $H_{n-1}(\hat{E}, E) = 0$ e utilizando o teorema dos coeficientes universais obtemos o diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 H^n(\hat{E}, E; H_{n-1}(F)) & \xleftarrow{f_2^*} & H^n(\hat{E}_1, E_1; H_{n-1}(F)) \\
 \wr & & \wr \\
 \text{Hom} [H_n(\hat{E}, E); H_{n-1}(F)]_K & \xleftarrow{\quad} & \text{Hom} [H_n(\hat{E}_1, E_1); H_{n-1}(F)]
 \end{array}$$

Onde K age do seguinte modo $K(m) = \text{mof}_{2*}$.

Mas lembremos que U e U_1 são definidos por $\langle U, x \rangle = \alpha(n)$ e $\langle U_1, x \rangle = \alpha_1(x)$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \alpha & & & & \\
 & \swarrow & & \searrow & & & \\
 H_n(\hat{E}, E) & \xleftarrow{\mathcal{H}} & \Pi_n(\hat{E}, E) & \xleftarrow{k} & \Pi_n(\hat{F}, F) & \xrightarrow{\partial^*} & \Pi_{n-1}(F) \xrightarrow{\mathcal{H}} H_{n-1}(F) \\
 \downarrow f_{2*} & & \downarrow f_{1*} & \swarrow k & & & \uparrow \\
 H_n(\hat{E}_1, E_1) & \xleftarrow{\mathcal{H}} & \Pi_n(\hat{E}_1, E_1) & & & & \\
 & & & \nearrow \alpha_1 & & &
 \end{array}$$

Então $K(\alpha_1) = \alpha_1 \circ f_{2*}$, mas pela comutatividade do diagrama $K(\alpha_1) = \alpha_1 \circ f_{2*} = \alpha$ ou seja $f_2^*(U_1) = U$.

Em nosso trabalho temos utilizado o isomorfismo $\Pi_n(\hat{F}_b, F_b) \rightarrow \Pi_n(\hat{E}, E)$ em que é necessário tomar a fibra sobre um elemento $b \in B$. Será que a escolha desse ponto b não interfere no cálculo da classe de Thom? Na realidade a alteração da escolha do ponto $b \in B$ altera a classe de cohomologia de Thom apenas por uma mudança de coeficientes, vejamos:

Podemos escolher $d \in B$ e teremos os seguintes isomorfismos:

$$\begin{array}{c}
 \Pi_n(\hat{F}_b, F_b) \leftarrow \Pi_{n-1}(F_b) \simeq H_{n-1}(F_b) \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 H_n(\hat{E}, E) \xleftarrow{\mu} \Pi_n(\hat{E}, E) \quad \begin{array}{c} \uparrow \bar{\lambda}_{o*} \quad \downarrow \bar{\alpha}_{o*}^{-1} \\ \vdots \end{array} \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 \Pi_n(\hat{F}_d, F_d) \leftarrow \Pi_{n-1}(F_d) \simeq H_{n-1}(F_d)
 \end{array}$$

Como em nosso caso B é conexo por caminhos, seja $[\lambda]$ a classe de homotopia de $\lambda: I \rightarrow B$ tal que $\lambda(0) = b$, $\lambda(1) = d$.

Por construção anterior (vide §1.3) existe uma classe de homotopia λ -admissível $\bar{\lambda}: F_d \times I \rightarrow E$ entre $\bar{\lambda}_0: F_d \rightarrow F_b$ e $\bar{\lambda}_1 = \text{id}: F_d \rightarrow F_d$. Teremos então a induzida de λ_0 ao nível de homologia $\bar{\lambda}_{o*}: H_{n-1}(F_d) \rightarrow H_{n-1}(F_b)$.

Seja $\alpha: I \rightarrow B$ um outro caminho ligando b a d , obteremos então $\bar{\alpha}_{o*}: H_{n-1}(F_d) \rightarrow H_{n-1}(F_b)$.

A composição $\lambda\alpha^{-1}$ induz $(\lambda\alpha^{-1})_{o*}: H_{n-1}(F_d) \rightarrow H_{n-1}(F_d)$.

Mas como temos admitido que $\Pi_1(B, *)$ atua trivialmente em $H_{n-1}(F_*)$ da relação $(\overline{\lambda \alpha^{-1}})_{o*} = (\overline{\alpha^{-1}})_{o*} \circ (\overline{\lambda})_{o*}$ tiramos que $(\overline{\alpha^{-1}})_{o*} = (\overline{\lambda})_{o*}^{-1}$.

Ou seja $H_{n-1}(F_d) \cong H_{n-1}(F_b)$.

Disto concluimos que a escolha de pontos distintos da base, resulta numa escolha de grupos de coeficientes distintos para a cohomologia do espaço $(\hat{E}, E)$, mas todos eles isomorfos.

PROPOSIÇÃO 4.2.6: Seja $\{E, p, B\}$ com B conexo por caminhos, fibra F $(n-2)$ -conexa. Então a classe de Euler $e \in H^n(B, H_{n-1}(F))$ se anula caso haja uma secção $s: B \rightarrow E$.

Considere $g: B \rightarrow \hat{E}$ inclusão canônica e $n: (E, E) \rightarrow (\hat{E}, E)$ dada por $n(x, y) = ((x, o), y)$. Temos o seguinte diagrama onde o quadrado é comutativo.

$$\begin{array}{ccccc}
 (B, \phi) & \xrightarrow{g} & (\hat{E}, \phi) & \xrightarrow{j} & (\hat{E}, E) \\
 & \searrow s & \uparrow i & & \uparrow n \\
 & & (E, \phi) & \xrightarrow{m} & (E, E)
 \end{array}$$

Existe uma homotopia canônica $H: g \sim i \circ s$ (pois $g(x) \in \hat{F}_x$ e $i \circ s(x) \in \hat{F}_x$). Isso significa que a nível de cohomologia as duas aplicações são equivalentes (iguais).

Se $U \in H^n(\hat{E}, E; H_{n-1}(F))$ então a classe de Euler $e = g^* j^* U$ é também $e = s^* m^* n^* U$. Por termos $H^n(E, E; H_{n-1}(F)) = 0$ vem que $e = s^* m^*(0) = 0$.

No próximo capítulo provaremos que para fibrados como os admitidos neste parágrafo a classe de Euler é caracterizada como a obstrução primária a existência de secção.

CAPÍTULO 5

Chegamos ao objetivo principal deste trabalho que é demonstrar que em um fibrado $(n-1)$ -orientado cuja fibra F é $(n-2)$ -conexa a obstrução primária à existência de secção é exatamente a classe de Euler deste fibrado.

Essa caracterização é baseada na teoria de obstrução desenvolvida em [9]. Whitehead, G.W. Elements of homotopy theory.

5. A CLASSE DE EULER COMO OBSTRUÇÃO PRIMÁRIA

Neste parágrafo $\xi = \{E, p, B, F\}$ é $(n-1)$ -orientável sobre um CW B com fibra F $(n-2)$ -conexa ($\Pi_1(F)$ abeliano se $n = 2$).

Essa condição de conexidade da fibra nos assegura a existência de secção $s_{n-1} : B_{n-1} \rightarrow E$ no $(n-1)$ -esqueleto de B . Também sabemos que os cociclos de obstrução de quaisquer dessas secções estão na mesma classe de cohomologia, classe esta chamada de obstrução primária γ^n a existência de secções (vide § 2.3).

$\gamma^n = \gamma(s_{n-1}) \in H^n(B; H_{n-1}(F))$, denota a classe de todas as cocadeias $\bar{c}^n(s_{n-1}) \in \mathcal{C}^n(B; \Pi_{n-1}(F))$.

$H_n(B_n, B_{n-1})$ é representado como soma direta pelos homomorfismos $H_n(\Delta^n, \dot{\Delta}^n) \rightarrow H_n(B_n, B_{n-1})$ induzidos pelas funções características $h_\alpha: (\Delta^n, \dot{\Delta}^n) \rightarrow (E^n, \dot{E}^n)$ ou seja $H_n(B_n, B_{n-1})$ é isomorfo ao grupo de todas as somas formais $\sum g_\alpha e_\alpha^n$ com $g_\alpha \in \mathbb{Z}$ e $g_\alpha = 0$ exceto para um número finito de índices. Ou seja

$$H_n(B_n, B_{n-1}) = C_n(B).$$

Seja agora E_α^n uma n -célula de B com função característica $h_\alpha: (\Delta^n, \dot{\Delta}^n) \rightarrow (B_n, B_{n-1})$.

Defino

$$\hat{s}_\alpha: (\Delta^n, \dot{\Delta}^n) \rightarrow (\hat{E}, E) \text{ por}$$

$$\hat{s}_\alpha((1-t)b_n + t.z) = \begin{cases} \langle h_\alpha[(1-2t)b_n + 2t.z] \rangle & \text{se } t \leq \frac{1}{2} \text{ e } z \in \dot{\Delta}^n \\ \langle 2(1-t), s_{n-1} h_\alpha(z) \rangle & \text{se } t \geq \frac{1}{2} \text{ e } z \in \dot{\Delta}^n \end{cases}$$

onde b_n é um ponto fixado no interior de Δ^n .

Então $\hat{p} \circ \hat{s}_\alpha = h_\alpha \circ d$ para alguma aplicação $d: (\Delta^n, \dot{\Delta}^n) \rightarrow (\Delta^n, \dot{\Delta}^n)$ tal que $d|_{\dot{\Delta}^n}$ é a identidade.

Desde que Δ^n é convexo $d \sim 1_{\Delta^n} \text{ (rel } \dot{\Delta}^n)$.

As funções $\hat{s}_\alpha \circ h_\alpha^{-1}$ dão origem a uma função

$$\hat{s}: (B_n, B_{n-1}) \longrightarrow (\hat{E}, E)$$

$$\text{tal que } \hat{s} \circ h_\alpha = \hat{s}_\alpha \text{ e } \hat{p} \circ \hat{s} \circ h_\alpha = \\ = \hat{p} \circ \hat{s}_\alpha = h_\alpha \circ d \sim h_\alpha(\text{rel } \dot{\Delta}^n).$$

Essas homotopias por sua vez dão origem a uma homotopia entre $\hat{p} \circ \hat{s}$ e $1_{B_n}(\text{rel } B_{n-1})$.

Chamando de $\Delta' : H_n(\hat{E}, E) \rightarrow \pi_{n-1}(F)$ a composta

$$\partial \circ k_1^{-1} \circ \mathcal{H}^1 : H_n(\hat{E}, E) \rightarrow \pi_n(\hat{E}, E) \rightarrow \pi_n(\hat{F}, F) \rightarrow \pi_{n-1}(F) ;$$

se quisermos saber como é intrinsecamente a composta

$$\Delta' \circ \hat{s}_* : H_n(B_n, B_{n-1}) \rightarrow \pi_{n-1}(F) \quad \text{basta calcularmos a mesma}$$

nas classes e_α que geram $H_n(B_n, B_{n-1})$.

Seja $\Delta' \circ \hat{s}_*(e_\alpha) = \Delta'(\eta_\alpha)$ onde η_α é a classe de homologia de $\hat{s}_*(e_\alpha)$.

Seja $\{\hat{W}_\alpha, \hat{q}_\alpha, \Delta^n\}$ o pull-back de $\{\hat{E}, \hat{p}, B\}$ e $\{W_\alpha, q_\alpha, \Delta^n\}$ o pull-back de $\{E, p, B\}$ ambos induzidos pela aplicação $h_\alpha : (\Delta^n, \dot{\Delta}^n) \rightarrow (B, B_{n-1})$ então W_α é subespaço de $\hat{W}_\alpha$, $\hat{q}_\alpha/W_\alpha = q_\alpha$ e $\hat{W}_\alpha$ pode ser identificado com o map cylinder de $q_\alpha : W_\alpha \rightarrow \Delta^n$.

As funções $\hat{s}_\alpha : \Delta^n \rightarrow \hat{E}$ e $d : \Delta^n \rightarrow \Delta^n$ definem uma aplicação (pela própria definição de pull-back)

$\hat{k}_\alpha : \Delta^n \rightarrow \hat{W}_\alpha$. Por sua vez $s_\alpha : \dot{\Delta}^n \rightarrow E$ e $d : \Delta^n \rightarrow \Delta^n$ definem $k_\alpha : \dot{\Delta}^n \rightarrow W_\alpha$.

Temos $\hat{k}_\alpha|_{\dot{\Delta}^n} = k_\alpha$.

Construimos o diagrama abaixo que é comutativo.

$$\begin{array}{ccccc}
 \Pi_n(\Delta^n, \dot{\Delta}^n) & \xrightarrow{\hat{k}_\alpha^*} & \Pi_n(\hat{W}_\alpha, W_\alpha) & \xleftarrow{k_1} & \Pi_n(\hat{F}, F) \\
 \downarrow \partial_0 & & \downarrow \partial_1 & & \downarrow \partial_3 \\
 \Pi_{n-1}(\dot{\Delta}^n) & \xrightarrow{k_\alpha^*} & \Pi_{n-1}(W_\alpha) & \xleftarrow{i_4} & \Pi_{n-1}(F)
 \end{array}$$

Como Δ^n tem o mesmo tipo de homotopia de um ponto e $\hat{W}_\alpha$ e W_α são espaços totais do pull-back com base Δ^n , sabemos que $\hat{W}_\alpha$ e W_α têm o mesmo tipo de homotopia que $\hat{F}$ e F , respectivamente.

Logo ∂_3 e k_1 são isomorfismos, o que nos dá ∂_1 e i_4 também isomorfismos.

Agora $\Delta'(\eta_\alpha) = \partial_3 \circ k_1^{-1}(\eta_\alpha)$ e então

$$\begin{aligned}
 i_4[\Delta'(\eta_\alpha)] &= i_4[\partial_3 \circ k_1^{-1}(\eta_\alpha)] = \partial_1 \circ k_1 \circ k_1^{-1}(\eta_\alpha) = \\
 &= \partial_1(\eta_\alpha) \text{ que é a classe de homotopia da função } k_\alpha : \dot{\Delta}^n \rightarrow W_\alpha.
 \end{aligned}$$

Mas $i_4[\bar{c}^n(e_\alpha)]$ também é a classe de homotopia de k_α .

$$\text{Assim } \Delta' \circ \hat{s}_*(e_\alpha) = \Delta'(\eta_\alpha) = \bar{c}^n(e_\alpha).$$

Portanto temos a cocadeia de obstrução a extensão de s dada por

$$\begin{array}{ccc}
 \bar{c}^n(s) : C_n(B) \simeq H_n(B_n, B_{n-1}) & \xrightarrow{\hat{s}_*} & H_n(\hat{E}, E) \\
 & & \downarrow \Delta' \\
 & & \Pi_{n-1}(F)
 \end{array}$$

Prestando atenção ao fato de $C_n(\hat{E}, E) \approx Z_n(\hat{E}, E) \oplus G$ onde $G \approx B_{n-1}(\hat{E}, E)$ definimos:

$$\pi: C_n(\hat{E}, E) \rightarrow H_n(\hat{E}, E)$$

$$\pi(z+b) = z$$

o que possibilita considerar o seguinte diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccc} C_n(B) \approx H_n(B_n, B_{n-1}) & \xrightarrow{\hat{\lambda}_*} & H_n(\hat{E}, E) & \xrightarrow{\Delta'} & \pi_{n-1}(F) \approx H_{n-1}(F) \\ & \searrow (j \circ g)_* & \nearrow \pi & & \\ & & C_n(\hat{E}, E) & & \end{array}$$

onde $(j \circ g)_*$ é a induzida a nível de cadeias da inclusão $j \circ g: B \longrightarrow \hat{E}, E$ e a menos de isomorfismo " Δ' é igual a α " (ver §4.2)

Note que $[(j \circ g)_*]^*: \text{Hom}[C_n(\hat{E}, E); \pi_{n-1}(F)] \rightarrow \text{Hom}[C_n(B); \pi_{n-1}(F)]$ aplica $\alpha \circ \pi$ em $c^n(s_{n-1})$.

Então

$$(j \circ g)^*: H^n(\hat{E}, E; \pi_{n-1}(F)) \longrightarrow H^n(B; \pi_{n-1}(F)) \text{ é tal que}$$

$$e = (j \circ g)^* u = [c^n(s_{n-1})] = \gamma^n.$$

Então nas hipóteses admitidas $e = \gamma^n$.

CAPÍTULO 6

Nestes dois parágrafos utilizamos os estudos anteriores para classificarmos certas variedades topológicas de dimensão três, já que esse é um problema ainda não totalmente resolvido. Por exemplo cita-se a conjectura de Poincaré: "Toda variedade topológica M de dimensão 3 conexa e fechada com grupo fundamental nulo é homeomorfa a S^3 ".

No parágrafo 6.0 veremos que se M é orientável e se fibra com fibra S^1 sobre uma variedade orientável de dimensão 2 o teorema 6.0.5 garante que M é homeomorfa a S^3 .

No parágrafo 6.1 apresentamos variedades de dimensão três que estão nas condições acima. São elas certos tipos de variedades de Brieskorn (vide [14]) que podem ser classificadas pela proposição 6.1.5.

Outro resultado a ser destacado é a proposição 6.1.6 que classifica algumas variedades orientáveis de dimensão três.

6.0 - SOBRE CLASSIFICAÇÃO TOPOLÓGICA DE VARIEDADES DE DIMEN- SÃO 3

TEOREMA 6.0.1: Sejam $\xi_1 = \{E_1, p_1, B, F\}$ e $\xi_2 = \{E_2, p_2, B, F\}$ dois fibrados sobre um CW B conexo de dimensão n, onde $\Pi_1(B)$ atua trivialmente em $H_{n-1}(F)$, e F é (n-2)-conexa ($\Pi_1(F)$ abeliano se $n = 2$). Se além disso tivermos $H_{n-1}(E_1) \simeq H_{n-1}(E_2)$, $H_{n-1}(F) \simeq \mathbb{Z}$, $H_{n-1}(B)$ livre de torção, então $e(\xi_1) = \pm e(\xi_2)$ e portanto ξ_1 terá secção se e somente se ξ_2 tiver secção.

Podemos escrever as sequências de homologia dos fibrados:

$$H_n(E_1) \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{\Delta_1} H_{n-1}(F) \rightarrow H_{n-1}(E_1) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0$$

$$H_n(E_2) \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{\Delta_2} H_{n-1}(F) \rightarrow H_{n-1}(E_2) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0$$

De $H_{n-1}(E_1) \simeq H_{n-1}(E_2)$ e da exatidão das sequências temos:

$$\frac{H_{n-1}(F)}{\text{Im } \Delta_1} \approx \frac{H_{n-1}(F)}{\text{Im } \Delta_2}$$

Como $H_{n-1}(F) \approx \mathbb{Z}$ temos $\text{Im } \Delta_1 = \text{Im } \Delta_2$ e então

$$\left\{ \langle e(\xi_1), x \rangle ; x \in H_n(B) \right\} = \left\{ \langle e(\xi_2), x \rangle ; x \in H_n(B) \right\}$$

$$\langle e(\xi_1), x \rangle = \pm \langle e(\xi_2), x \rangle \quad \forall x \in H_n(B) \quad \text{ou seja}$$

$$\langle e(\xi_1) \pm e(\xi_2), x \rangle = 0 \quad \forall x \in H_n(B)$$

$$e(\xi_1) \pm e(\xi_2) \in H^n(B) \approx \text{Hom} [H_n(B); \mathbb{Z}] \oplus \text{Ext} [H_{n-1}(B), \mathbb{Z}].$$

Mas como $H_{n-1}(B)$ é livre de torção temos $e(\xi_1) =$
 $= \pm e(\xi_2)$.

Deste modo se existe secção em ξ_1 temos $e(\xi_1) = 0$

implicando $e(\xi_2) = 0$ o que acarreta a nulidade da obstrução primária a existência de secção em ξ_2 . Analogamente se existir secção em ξ_2 também existirá em ξ_1 . ■

DEFINIÇÃO 6.0.2: Dado um fibrado vetorial

$\xi = \{E, p, B, F\}$, uma aplicação contínua $Q: E \rightarrow R$ tal que $Q_x: F_x \rightarrow R$ é uma forma quadrática positiva-definida é dita uma métrica euclídeana em ξ .

LEMA 6.03: Seja $\zeta = \{E, p, B\}$ n-fibrado vetorial.

Se existem duas métricas euclídeanas d_1 e d_2 em ζ , então os fibrados de esfera de ζ com as métricas dadas são equivalentes.

Em cada fibra F_x tomemos a aplicação m que leva a esfera S^{n-1} de (F_x, d_1) em S^{n-1} de (F_x, d_2) . Então

$\bar{h}: E \rightarrow E$, $h(x,y) = (x,m(y))$ é uma equivalência entre (ζ,d_1) e (ζ,d_2) . ■

LEMA 6.0.4: Sejam ξ_1 e ξ_2 fibrados vetoriais equivalentes, sobre base comum B. Então os fibrados em esfera de ξ_1 e ξ_2 são equivalentes.

Seja $h: \xi_1 \rightarrow \xi_2$ a equivalência de fibrados e $\bar{h}: F_1 \rightarrow F_2$ o isomorfismo entre as fibras F_x e $F_{h(x)}$. Tomamos m_2 a métrica em F_1 induzida pela aplicação $\bar{h}$; pelo lema 6.0.3 existe aplicação $r: F_1 \rightarrow F_1$ que leva a esfera S^{n-1} de F_1 em S^{n-1} de (F_1, m_2) . Portanto $\bar{h} \circ r: F_1 \rightarrow F_2$ é função tal que

$t: E(\xi_1) \rightarrow E(\xi_2)$; $t(x,y) = (h(x), \bar{h} \circ r(y))$ é equivalência entre os fibrados de esfera de ξ_1 e ξ_2 . ■

Estamos aptos a demonstrar o seguinte teorema:

TEOREMA 6.0.5: Sejam ξ_1 e ξ_2 dois fibrados vetoriais orientados de posto 2 sobre uma variedade B de dimensão 2 orientada, M_1 e M_2 os respectivos espaços totais dos fibrados de esfera de ξ_1 e ξ_2 . Então são equivalentes:

- a) ξ_1 equivalente a ξ_2 ;
- b) M_1 homeomorfo a M_2 ;
- c) $H_1(M_1)$ isomorfo a $H_1(M_2)$.

Se $\xi_1 \approx \xi_2$ então pelo lema 6.0.4 segue que os fibrados de esfera de ξ_1 e ξ_2 são equivalentes, o que nos dá $M_1 \sim M_2$.

Se $M_1 \sim M_2$ temos de imediato $H_1(M_1) \approx H_1(M_2)$.

Se $H_1(M_1) \approx H_1(M_2)$ observando as sequências exatas de homologia

$$H_2(B) \xrightarrow{\Delta_1} H_1(S^1) \rightarrow H_1(M_1) \rightarrow 0$$

$$H_2(B) \xrightarrow{\Delta_2} H_1(S^1) \rightarrow H_1(M_2) \rightarrow 0$$

vemos que:

$$\frac{H_1(S^1)}{\text{Im } \Delta_1} \approx H_1(M_1) \approx H_1(M_2) \approx \frac{H_1(S^1)}{\text{Im } \Delta_2}$$

o que implica $\text{Im } \Delta_1 = \text{Im } \Delta_2$.

Portanto $\langle e_1, x \rangle = \pm \langle e_2, x \rangle \quad \forall x \in H_2(B)$

Daí $e_1 = \pm e_2$ ou seja ξ_1 é equivalente a ξ_2 . ■

OBS: Observe que foram usados os fatos $H_2(B) \approx \mathbb{Z}$ e $H_1(B)$ ser grupo livre.

PROPOSIÇÃO 6.0.6: Seja M variedade conexa orientada, fechada, de dimensão 3 que se fibra com $F = S^1$, sobre variedade orientada fechada N de dimensão 2. Se $H_1(M) = 0$ então M é homeomorfa a S^3 .

Usando a sequência de homologia deste fibrado (que é orientado) com fibra S^1 temos $H_1(M) \simeq H_1(N)$. Logo a base é homeomorfa a S^2 . Lembrando da existência da fibração de Hopf $\xi = \{S^3, p, S^2, S^1\}$ e de que $H_1(S^3) = 0 = H_1(M_1)$ utilizamos o teorema 6.0.5 e obtemos M homeomorfa a S^3 . ■

OBSERVAÇÃO: Usamos a notação Z_k para indicar o grupo quociente $\frac{Z}{kZ}$. Vejamos que quando $k = 1$, $Z_1 = 0$ e que quando $k = 0$, $Z_0 = Z$.

PROPOSIÇÃO 6.0.7: Seja $\xi = \{M, p, B, S^{n-1}, SO(n)\}$ fibrado onde: M é variedade de dimensão $2n-1$, B é variedade fechada orientada de dimensão n . Seja $e(\xi) = k \cdot \mu$ onde $k \in Z$ e μ é o gerador de $H_n(B) \simeq Z$. Então

$$H_{n-1}(M) \simeq H_{n-1}(B) \oplus Z_k.$$

Usando a sequência exata de homologia do fibrado:

$$H_n(M) \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{\Delta} H_{n-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(M) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0$$

$$\Delta(x) = kx, \quad \text{Im } \Delta = kZ = \ker i_*$$

Posso escrever então a seguinte sequência exata onde $H_{n-1}(B)$ é livre.

$$0 \rightarrow Z_k \rightarrow H_{n-1}(M) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

6.1 - Variedades de Brieskorn

Definiremos aqui uma classe de variedades tridimensionais conhecidas por variedades de Brieskorn. Existe a generalização deste conceito para variedades de dimensão n , mas em nosso estudo tomaremos as de dimensão 3 porque servem de exemplo para variedades como as descritas no parágrafo anterior.

Considere:

$$f: \mathbb{C}^3 - \{0\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z_1, z_2, z_3) = z_1^p + z_2^q + z_3^r$$

onde p, q e r são inteiros maiores ou iguais a 2.

$$g: \mathbb{C}^3 - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(z_1, z_2, z_3) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2$$

Vendo que 0 é valor regular de f e 1 é valor regular de g obtemos

$$M = f^{-1}(0) \subset \mathbb{C}^3 \quad \text{subvariedade de dimensão 4.}$$

$$K = g^{-1}(1) \subset \mathbb{C}^3 \quad \text{subvariedade de dimensão 5.}$$

Prova-se que M e N são transversais e que então $M \cap K$ é subvariedade de $\mathbb{C}^3$ de dimensão 3.

DEFINIÇÃO 6.1.2: Dizemos que $M \cap K = M(p, q, r)$ é uma variedade de Brieskorn.

O seguinte lema devido a Jonh Milnor encontra-se em [14].

LEMA 6.1.3: Se $m = \text{mmc}(p, q) = \text{mmc}(p, r) = \text{mmc}(q, r)$, então a variedade de Brieskorn $M(p, q, r)$ se

fibra sobre variedade orientável B com característica de Euler $\chi(B) = \frac{pqr}{m} (p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)$, com fibra $F = S^1$ e ainda mais: A classe de Euler deste fibrado é

$$e = \frac{pqr}{2m} \cdot \mu, \text{ onde } \mu \text{ é o gerador de } H_2(B). \quad \blacksquare$$

OBS: Pode-se provar que nas condições acima que $\frac{pqr}{2m}$ é igual ao máximo divisor comum de p , q e r .

PROPOSIÇÃO 6.1.4: Sejam $\xi_1 = \{M_1, p_1, B_1, S^1, SO(2)\}$ e $\xi_2 = \{M_2, p_2, B_2, S^1, SO(2)\}$ dois fibrados onde os espaços totais M_1 e M_2 são variedades de dimensão 3, as bases B_1 e B_2 são variedades de dimensão 2 orientadas. Então

$$H_1(M_1) \simeq H_1(M_2) \text{ se e somente se } H_1(B_1) \simeq H_1(B_2) \text{ e } e(\xi_1) = \pm e(\xi_2).$$

Tomemos $e(\xi_1) = k \cdot \mu$, onde μ é o gerador de $H_1(B_1)$.

Aplicando a proposição 6.0.7 para ambos os fibrados podemos escrever as seguintes sequências exatas

$$0 \rightarrow Z_k \rightarrow H_1(M_1) \rightarrow H_1(B_1) \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow Z_k \rightarrow H_1(M_2) \rightarrow H_1(B_2) \rightarrow 0$$

$$\text{Assim: } H_1(M_1) \simeq H_1(B_1) \oplus Z_k \text{ e}$$

$$H_1(M_2) \simeq H_1(B_2) \oplus Z_k$$

Se $H_1(B_1) \simeq H_1(B_2)$ e $e(\xi_1) = \pm e(\xi_2)$ é imediato que $H_1(M_1) \simeq H_1(M_2)$.

Lembremos agora que as variedades bidimensionais orientáveis são toros do tipo T_g^2 . Assim se g_1 é o genus de B_1 e g_2 é o genus de B_2 sabemos que

$$H_1(B_1) = Z^{2-\chi(B_1)} \quad \text{e} \quad H_1(B_2) = Z^{2-\chi(B_2)} \quad \text{pois}$$

$$\chi(B_1) = 2-2g_1, \quad \chi(B_2) = 2-2g_2 \quad \text{e} \quad H_1(T_g^2) = Z^{2g}.$$

$$\text{Considere } e(\xi_1) = k_1\mu \quad \text{e} \quad e(\xi_2) = k_2\mu.$$

Se $H_1(M_1) \simeq H_1(M_2)$ temos que considerar as situações:

$$a) \quad k_1 \neq k_2 \quad \text{ou} \quad k_1 = k_2 = 0.$$

$$H_1(B_1) \oplus Z_{k_1} \simeq H_1(B_2) \oplus Z_{k_2} \quad \text{se e somente se}$$

$$H_1(B_1) \simeq H_1(B_2) \quad \text{e} \quad Z_{k_1} \simeq Z_{k_2}.$$

$$b) \quad \text{Ou } k_1 = 0 \quad \text{e} \quad k_2 \neq 0, \quad \text{ou } k_1 \neq 0 \quad \text{e} \quad k_2 = 0.$$

$$\text{Suponhamos } k_1 = 0 \quad \text{e} \quad k_2 \neq 0.$$

Então vemos que

$$H_1(B_1) \oplus Z \simeq H_1(B_2) \oplus Z_{k_2}$$

implica $k_2 = 1$ mas aí teríamos o isomorfismo

$$Z^{2-\chi(B_1)+1} \simeq Z^{2-\chi(B_2)} \quad \text{que é impossível.} \quad \blacksquare$$

PROPOSIÇÃO 6.1.5: Considere duas variedades de Brieskorn $M_1(p_1, q_1, r_1)$ e $M_2(p_2, q_2, r_2)$ satisfazendo

$$m_1 = \text{mmc}(p_1, q_1) = \text{mmc}(p_1, r_1) = \text{mmc}(q_1, r_1)$$

$$m_2 = \text{mmc}(p_2, q_2) = \text{mmc}(p_2, r_2) = \text{mmc}(q_2, r_2)$$

Se ainda $\text{mdc}(p_1, q_1, r_1) = \text{mdc}(p_2, q_2, r_2)$ e

$$\frac{p_1 q_1 r_1}{m_1} (p_1^{-1} + q_1^{-1} + r_1^{-1} - 1) = \frac{p_2 q_2 r_2}{m_2} (p_2^{-1} + q_2^{-1} + r_2^{-1} - 1) \quad \text{então}$$

M_1 é homeomorfa a M_2 .

Aplicando o lema 6.1.3 as bases dos fibrados obtidos têm

$$\chi(B_1) = \chi(B_2).$$

Logo $H_1(B_1) \cong H_1(B_2)$, ou seja

Por 6.1.4 segue que $H_1(M_1) \cong H_1(M_2)$ e utilizando 6.0.5 obtemos M_1 homeomorfa a M_2 . ■

PROPOSIÇÃO 6.1.6: Sejam M_1 e M_2 variedades de dimensão 3 fechadas orientadas. Admita ainda que estas variedades se fibram com fibra S^1 sobre variedades fechadas orientadas B_1 e B_2 respectivamente. Se $H_1(M_1) \cong H_1(M_2)$ então M_1 é homeomorfa a M_2 .

Aplicamos a proposição 6.1.4 aos fibrados $\xi_1 = \{M_1, p_1, B_1, S^1, SO(2)\}$ e $\xi_2 = \{M_2, p_2, B_2, S^1, SO(2)\}$ e obtemos $H_1(B_1) \cong H_1(B_2)$, como as variedades bidimensionais orientáveis são classificadas pelos seus grupos de homologia em dimensão 1, temos B_1 homeomorfa a B_2 .

Aplicando então o teorema 6.0.5 obtemos M_1 homeomorfa a M_2 . ■

BIBLIOGRAFIA

- 1 SZE-TSEN, Hu. Introduction to homological algebra.
 Holden-Day, Inc., 1968.
- 2 GREENBERG, Marvin J. Lectures on algebraic topology.
 W.A. Benjamin, Inc., 1973.
- 3 SPANIER, Edwin H. Algebraic topology. McGraw-Hill
 Book Company, 1966.
- 4 NETO, Oziride M. Extensões de aplicações a espaços
 não N-simples. ICMSC-USP, 1976.
- 5 LOIBEL, Gilberto F. Introdução a teoria de obstrução,
 Vol. I e II. EESC-USP, 1963.
- 6 AZEVEDO, Alberto de. Módulos sobre domínios princi-
 pais. 8º Colóquio Brasileiro de Matemática, 1971.
- 7 BIASI, Carlos. Teoria de obstrução e aplicações.
 5º Encontro Bras. de Topologia. ICMSC-USP, 1986.
- 8 MILNOR, J. and STASHEFF, J. Characteristic Classes.
 Princeton Univ. Press, 1974.
- 9 WHITEHEAD, G.W. Elements of homotopy theory. Sprin-
 ger-Verlag, 1978.
- 10 STEENROD, Norman. The topology of fiber bundles.
 Princeton Univ. Press, 1951.
- 11 HILTON, P.J. and WYLIE, S. Homology theory. Cambri-
 dge Univ. Press, 1967.

- 12 LEES, Alexander J. Notes on bundle theory. Lectures Notes Séries nº 42, August 1974.
- 13 HUSEMOLLER, Dale. Fiber bundles. McGraw-Hill Book Company, 1966.
- 14 NEUWIRT, L.P. Knots, Groups, and 3-Manifolds (on the 3-dimensional Brieskorn Manifolds $M(p, q, r)$ by Jonh Milnor). Princeton Univ. Press and University of Tokyo Press, 1975.
- 15 HIRZEBRUCH, F. Topological methods in algebraic topology. Springer-Verlag, 1966.
- 16 SEIFERT, H. and THRELFALL, W. Leciones de topologia. CSIC - Madri, 1951.

A P Ê N D I C E

DEMONSTRAÇÃO DE $U = \pm U$

Seja $\xi = \{E, p, B, F, SO(n)\}$ um fibrado vetorial e considere $\eta = \{S, p, B, S^{n-1}\}$ seu fibrado de esfera.

Pelo teorema do isomorfismo de Thom temos

$$U \in H^n(E, E_0; Z) \approx \text{Hom} [H_n(E, E_0); Z] .$$

Pela construção do §4.2 para o fibrado η temos

$$\hat{U} \in H^n(\hat{S}, S; H_{n-1}(S^{n-1})) \approx \text{Hom} [H_n(\hat{S}, S); H_{n-1}(S^{n-1})] .$$

Por construção

$$\langle \hat{U}, \rangle : H_n(\hat{S}, S) \longrightarrow H_{n-1}(S^{n-1}) \quad \text{é isomorfismo}$$

Pelo teorema de Thom

$$Z \approx H^0(E, Z) \xrightarrow{\sim U} H^n(E, E_0; Z) \approx \text{Hom} [H_n(E, E_0); Z]$$

é isomorfismo e vemos então que o gerador $1 \in Z$ é levado no então gerador $U \in H^n(E, E_0; Z)$. Portanto

$$\langle U, \rangle : H_n(E, E_0) \longrightarrow Z \quad \text{é isomorfismo.}$$

Temos os isomorfismos $H_q(\hat{S}) \approx H_q(E) \quad \forall q \leq n$ e

$$H_q(S) \approx H_q(E_0) \quad \forall q \leq n.$$

Então pela sequência de homologia dos pares $(\hat{S}, S)$ e (E, E_0)

$$H_q(\hat{S}, S) \approx H_q(E, E_0) \quad \forall q \in \mathbb{N}.$$

Então podemos construir o diagrama:

$$\begin{array}{ccc} H_n(\hat{S}, S) & \xrightarrow[\text{iso}]{\langle \hat{U}, \rangle} & H_{n-1}(S^{n-1}) \\ \cong & & \cong \\ H_n(E, E_0) & \xrightarrow[\text{iso}]{\langle U, \rangle} & Z \end{array}$$

Donde concluímos que $\langle \hat{U}, x \rangle = \pm \langle U, x \rangle \quad \forall x \in H_n(E, E_0)$.