Existência de Atratores Globais para Equações Hiperbólicas O caso do Crescimento Subcrítico em Domínios Tridimensionais-

CLÁUDIA BUTTARELLO GENTILE

Orientador: PROF. DR. ALEXANDRE NOLASCO DE CARVALHO

*Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de
São Carlos - USP, como parte dos requisitos para obtenção do título
de "Mestre em Ciências - Área: Matemática".*

USP - São Carlos
Dezembro de 1994

"O entendimento dos símbolos e dos rituais (simbólicos) exige do intérprete que possua cinco qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão para ele mortos e ele um morto para eles.

A primeira é a simpatia; não direi a primeira em tempo, mas conforme vou citando, e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada - todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar.

A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo, sem que se veja.

A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói noutro nível o símbolo; tem, porém que fazê-lo depois que, no fundo, é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia no exame dos símbolos, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isso se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não tiver estabelecido. Então a inteligência, de discursiva que naturalmente é, se tornará analógica, e o símbolo poderá ser interpretado.

A quarta é a compreensão, entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias, que permitam o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia ter dito, pois a erudição é uma soma; nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese; e a compreensão é uma vida. Assim certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes, ou no mesmo tempo, o entendimento de símbolos diferentes.

A quinta é a menos definível. Direi talvez, falando a uns, que é a graça, falando a outros, que é a mão do Superior Incógnito, falando a terceiros, que é o Conhecimento e Conversação do Santo Anjo da Guarda, entendendo cada uma destas coisas, que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo."

Fernando Pessoa

*Aos meus pais
Geraldo e Janair*

Agradecimentos ¹

Agradeço ao Alexandre pela firmeza, pela disponibilidade e sobretudo pela paciência, ao Marcão principalmente pela força que me deu na ocasião do meu exame de qualificação, aos professores do ICMSC dos quais tive o prazer de ser aluna, aos professores da graduação que me apoiaram e incentivaram apesar das minhas hesitações, e em especial ao professor Henrique Lazari, pois foi sob a sua orientação que eu aprendi a aprender matemática.

Agradeço ainda aos meus pais por terem, muitas vezes em detrimento de si, possibilitado os meus estudos, aos meus irmãos Carla, Érika, Marco, Chico e Carol pelo apoio incondicional e pela forte amizade que nos une, a todos os bons amigos de dentro e de fora do departamento, particularmente à Sandra, pelo companheirismo nestes dois anos de São Carlos, e ao Valente, pela cumplicidade que às vezes me permite esquecer que a solidão é inerente ao homem.

¹Este trabalho teve suporte financeiro do CNPq

Abstract

In this work we prove the existence of global attractors for the scalar linearly damped hyperbolic equation in a bounded smooth domain $\Omega \subset \mathbb{R}^3$

$$w_{tt} + \beta w_t = \Delta w + f(w) \quad \text{in } \Omega,$$

$$w = 0 \quad \text{in } \partial\Omega,$$

when the nonlinear term grows subcritically .

Resumo

Neste trabalho nós provamos a existência de atratores globais para equações escalares hiperbólicas com atrito linear em domínios suaves $\Omega \subset \mathbb{R}^3$

$$w_{tt} + \beta w_t = \Delta w + f(w) \quad \text{em } \Omega,$$

$$w = 0 \quad \text{em } \partial\Omega,$$

com o termo não linear satisfazendo uma condição de crescimento subcrítico.

Conteúdo

1	Preliminares	3
1.1	Semigrupos e Potências Fracionárias	3
1.2	Existência, Unicidade e Regularidade	9
1.3	Espaços de Sobolev	14
2	Atratores para semigrupos e equações de evolução	28
3	Atratores Globais	39
3.1	Introdução	39
3.2	Existência Local de Soluções	39
3.3	Existência Global e Limitação	45
3.4	Compacidade Assintótica e Existência de Atratores Globais . . .	49

Introdução

Seja Ω um subconjunto aberto, limitado de $\mathbb{R}^3$, com fronteira $\partial\Omega$ suave e considere o seguinte problema de valor inicial e fronteira

$$\begin{aligned} u_{tt} + \beta u_t &= \Delta u + f(u) \text{ em } \Omega, \\ u &= 0, \text{ em } \partial\Omega. \end{aligned} \tag{0.1}$$

Neste trabalho procuramos obter condições ótimas de crescimento para o termo não linear f sob as quais o problema (0.1) tenha um atrator global minimal, e de forma a não utilizar na prova da existência do mesmo a fórmula da variação das constantes não linear de Alekseev que requer que o semigrupo associado a (0.1) seja um C^1 -semigrupo (veja Arrieta, Carvalho e Hale [1992]).

Como é usual assumimos que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaça a seguinte condição de dissipação

$$\limsup_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f(u)}{u} \leq -\delta < 0, \tag{0.2}$$

mas poderíamos assumir

$$\limsup_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f(u)}{u} \leq 0, \tag{0.3}$$

sem prejuízo de qualquer resultado.

A condição de crescimento adotada é a condição chamada de subcrítica que é

$$\lim_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f'(u)}{u^2} = 0. \tag{0.4}$$

A técnica utilizada na prova da existência de um atrator global para o problema (0.1) com termo não linear f satisfazendo (0.2) e (0.4) coincide com a técnica utilizada para o caso não crítico

$$|f'(u)| \leq c(1 + |u|^\gamma), \quad \gamma < 2$$

em todos os pontos, com exceção da prova de que o termo não linear é compacto, onde utilizamos uma técnica parecida com a adotada em Arrieta, Carvalho e Hale [1992], decompondo a não linearidade em uma parte compacta e uma não compacta. No caso de crescimento subcrítico, contudo, esta decomposição pode ser feita com a parte não compacta tão pequena quanto se queira, possibilitando provar que esta não linearidade é ainda compacta.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. No Capítulo 1 introduzimos os conceitos básicos indispensáveis ao desenvolvimento do trabalho, muitos dos quais sem prova. No Capítulo 2 apresentamos uma completa descrição de como obter existência de atratores globais para semigrupos, com todas as provas incluídas. Finalmente, no Capítulo 3 utilizamos os resultados dos capítulos precedentes para mostrar a existência de atratores globais para o problema (0.1) com as condições de crescimento e dissipação acima.

Capítulo 1

Preliminares

1.1 Semigrupos e Potências Fracionárias

Seja X um espaço de Banach real ou complexo e $L(X)$ o espaço das transformações lineares e contínuas de X em X com a norma usual

$$\|T\| = \sup_{\substack{x \neq 0 \\ x \in X}} \frac{\|Tx\|_X}{\|x\|_X}.$$

Definição 1.1 *Um semigrupo de operadores lineares limitados em X é uma família $\{T(t), 0 \leq t < \infty\} \subset L(X)$, satisfazendo:*

- $T(0) = I$;
- $T(t+s) = T(t)T(s) \quad \forall t, s \geq 0$.

$T(t)$ é fortemente contínuo ou um C_0 semigrupo se

$$\lim_{t \downarrow 0} T(t)x = x, \quad \forall x \in X.$$

Definição 1.2 *O gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo $T(t)$ é o operador $A : \mathbf{D}(A) \subset X \rightarrow X$, definido por*

$$Ax = \lim_{t \downarrow 0} \frac{T(t)x - x}{t}, \quad \forall x \in \mathbf{D}(A),$$

e o domínio de A , $\mathbf{D}(A)$, é o conjunto de todos os elementos $x \in X$ para os quais este limite existe.

O gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo é único, e se $T(t)$ e $S(t)$ são C_0 semigrupos com gerador infinitesimal A e B respectivamente, $A = B$ implica $T(t) = S(t)$, $\forall t \geq 0$.

Consideremos o problema de Cauchy

$$\begin{cases} \frac{dT(t)}{dt} = AT(t), \\ T(0) = I \end{cases} \quad (1.1)$$

onde A é um operador linear limitado. A solução de (1.1) é $T(t) = e^{At}$ que satisfaz as condições da Definição 1.1. Então a família de operadores $T(t) = e^{At}$, $t \geq 0$, é um semigrupo fortemente contínuo e A é o gerador infinitesimal de $T(t)$.

Como o gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo o determina unicamente, a partir daqui usaremos a notação e^{At} para indicar um C_0 semigrupo de operadores lineares limitados cujo gerador infinitesimal é A , mesmo que A não seja limitado.

Teorema 1.1 *Seja e^{At} um C_0 semigrupo em X . Então:*

(i) *Existem constantes $M \geq 1$, $\omega \in \mathbb{R}$ satisfazendo:*

$$\|e^{At}\| \leq Me^{\omega t}, \quad t \geq 0;$$

(ii) *Para $x \in D(A)$, $e^{At}x \in D(A)$, $t \rightarrow e^{At}x$ é diferenciável e*

$$\frac{d}{dt}e^{At}x = Ae^{At}x = e^{At}Ax, \quad t > 0;$$

(iii) *Para $x \in D(A)$, $t, s \in \mathbb{R}^+$,*

$$e^{At}x - e^{As}x = \int_s^t e^{A\tau}Ax d\tau = \int_s^t Ae^{A\tau}x d\tau;$$

(iv) $\overline{\bigcap_{n \geq 1} D(A^n)} = X$.

Se em (i) tivermos $\omega = 0$, dizemos que e^{At} é uniformemente limitado. Se ainda $M = 1$, então e^{At} é chamado um C_0 semigrupo de contrações.

Definição 1.3 *Se $A : D(A) \rightarrow X$, $D(A) \subset X$, é um operador linear fechado, o conjunto resolvente de A , $\rho(A)$, é o conjunto de todos os números complexos λ para os quais $\lambda I - A$ é invertível, i.e., $R(\lambda : A) = (\lambda I - A)^{-1}$ é um operador linear limitado em X . O espectro de A , $\sigma(A)$, é o complementar de $\rho(A)$, ou seja, $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$. O operador $R(\lambda : A)$ é chamado operador resolvente de A .*

Seja X^* o espaço dual de X . Denotamos o valor de $x^* \in X^*$ em $x \in X$ por $\langle x, x^* \rangle$. Se A é um operador linear em X , sua imagem numérica $S(A)$ é o conjunto

$$S(A) = \{\langle Ax, x^* \rangle : x \in D(A), \|x\| = 1, x^* \in X^*, \|x^*\| = 1, \langle x, x^* \rangle = 1\}.$$

Teorema 1.2 *Seja A um operador linear fechado densamente definido em X . Seja $S(A)$ a imagem numérica de A e Σ o complementar de $\overline{S(A)}$ em $\mathbb{C}$. Se Σ_0 é uma componente conexa de Σ satisfazendo $\rho(A) \cap \Sigma_0 \neq \emptyset$, então o espectro de A está contido no complementar S_0 de Σ_0 e*

$$\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{1}{d(\lambda : \overline{S(A)})}, \quad \lambda \in \rho(A).$$

Para todo $x \in X$ definimos o conjunto $F(x) \subset X^*$ por

$$F(x) = \{x^* : x^* \in X^* \text{ e } \langle x, x^* \rangle = \|x\|^2 = \|x^*\|^2\}$$

Segue do Teorema de Hanh-Banach que $F(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in X$. Observamos que se X é uniformemente convexo, então $F(x)$ é unitário.

Definição 1.4 *Um operador linear A é dissipativo se para todo $x \in D(A)$ existe um $x^* \in F(x)$ tal que $\operatorname{Re}\langle Ax, x^* \rangle \leq 0$.*

Teorema 1.3 (Lumner-Phillips) *Seja A um operador linear com domínio denso $D(A)$ em X .*

- (i) *Se A é dissipativo e existe um $\lambda_0 > 0$ tal que a imagem, $R(\lambda_0 I - A)$, de $\lambda_0 I - A$ é X , então A é o gerador infinitesimal de um C_0 -semigrupo de contrações em X .*
- (ii) *Se A é o gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo de contrações em X então $R(\lambda I - A) = X$ para todo $\lambda > 0$ e A é dissipativo. Além disso, para todo $x \in D(A)$ e todo $x^* \in F(x)$, $\operatorname{Re}\langle Ax, x^* \rangle \leq 0$.*

Definição 1.5 *Seja A um operador linear em X satisfazendo:*

- *para algum δ , $0 < \delta \leq \pi/2$,*

$$\rho(A) \supset \Sigma_\delta = \{\lambda : |\arg \lambda| < \frac{\pi}{2} + \delta\};$$

- *existe M tal que*

$$\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{M}{|\lambda|}, \quad \lambda \in \Sigma_\delta, \quad \lambda \neq 0.$$

Então dizemos que $-A$ é um operador setorial.

Definição 1.6 *Seja A um operador linear fechado, densamente definido, satisfazendo*

$$\rho(A) \supset \Sigma^+ = \{\lambda : 0 < \omega < |\arg \lambda| \leq \pi\} \cup V, \quad (1.2)$$

onde V é uma vizinhança do zero, e

$$\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{M}{1 + |\lambda|}, \quad \lambda \in \Sigma^+. \quad (1.3)$$

Para A satisfazendo (1.2) e (1.3) e $\alpha > 0$, definimos

$$A^{-\alpha} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C z^{-\alpha} (A - zI)^{-1} dz$$

onde C é um caminho no resolvente de A , de $\infty e^{-i\nu}$ à $\infty e^{i\nu}$, $\omega < \nu < \pi$, como abaixo:

Estamos supondo que $0 \in \rho(A)$, e portanto uma vizinhança V do zero pertence ao resolvente de A , principalmente por conveniência. A maioria dos resultados de potências fracionárias ainda valeriam mesmo que $0 \notin \rho(A)$.

Se $\alpha = n \in \mathbb{N}$, a Definição 1.6 coincide com a definição clássica de $A^{-\alpha} = A^{-n} = (A^n)^{-1}$. Para $0 < \alpha < 1$ nós podemos deformar o caminho de integração no semi eixo real negativo percorrido nos dois sentidos e obter

$$A^{-\alpha} = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \int_0^\infty t^{-\alpha} (tI + A)^{-1} dt.$$

Definição 1.7 Se $\omega < \pi/2$, i.e., se A é setorial, então $A^{-\alpha}$ é injetora $\forall \alpha > 0$, e definimos

$$A^\alpha := (A^{-\alpha})^{-1}.$$

Teorema 1.4 As potências fracionárias do operador A satisfazem:

(i) Se $\alpha > 0$, então A^α é um operador fechado;

(ii) $\alpha \geq \beta > 0$ implica $\mathbf{D}(A^\alpha) \subset \mathbf{D}(A^\beta)$;

(iii) $\overline{\mathbf{D}(A^\alpha)} = X$ para todo $\alpha \geq 0$;

(iv) Se α, β são reais, então

$$A^{\alpha+\beta}x = A^\alpha A^\beta x,$$

para todo $x \in \mathbf{D}(A^\gamma)$, onde $\gamma = \max(\alpha, \beta, \alpha + \beta)$.

Proposição 1 Seja H um espaço de Hilbert real com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Seja A um operador auto-adjunto, $A : \mathbf{D}(A) \subset H \rightarrow H$, satisfazendo:

(i) $\overline{\mathbf{D}(A)} = H$;

(ii) $\langle Au, u \rangle \geq \delta \|u\|^2$, $\delta > 0$.

Então A é um operador setorial e A^α está bem definido, $\alpha > 0$.

Prova: Como H é um espaço de Hilbert, H é uniformemente convexo e o conjunto

$$F(x) = \{x^*, x^* \in H^* \text{ e } \langle x, x^* \rangle = \|x\|^2 = \|x^*\|^2\}$$

é unitário. Além disso, o único elemento de $F(x)$ é o funcional linear $x^* := \langle \cdot, x \rangle$. Logo, a imagem numérica da A é

$$S(A) = \{\langle Ax, x^* \rangle = \langle Ax, x \rangle, \|x\| = 1\}.$$

Como por hipótese $\langle Ax, x \rangle \geq \delta \|x\|^2$, então $S(A) \subset [\delta, \infty)$.

Agora, A é sobrejetor, e pela hipótese (iii) A é injetor. Com isso, $0 \in \rho(A)$, e pelo Teorema 1.2, $\sigma(A) \subset [\delta, \infty)$ e

$$\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{1}{d(\lambda : \overline{S(A)})}, \quad \lambda \in \rho(A). \quad (1.4)$$

Consideremos o setor $\Sigma_{\delta'} := \{\lambda + \delta', \lambda \in \mathbb{C}, \theta < |\arg \lambda| \leq \pi\}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

É claro que $\rho(A) \supset \Sigma_{\delta'}$ e, se $\lambda \in \Sigma_{\delta'}$, (1.4) está satisfeita.

Se $\lambda \in \Sigma_{\delta'}$ e $\operatorname{Re} \lambda \leq \delta$, então

$$d(\lambda : \overline{S(A)}) \geq |\lambda - \delta| > |\lambda - \delta| \sin \theta,$$

e se $\operatorname{Re} \lambda > \delta$,

$$d(\lambda : \overline{S(A)}) \geq |\lambda - \delta| \sin \beta \geq |\lambda - \delta| \sin \theta,$$

onde β é tal que $\theta < \beta < \pi/2$. Portanto, $\forall \lambda \in \Sigma_{\delta'}$, $\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{C_0}{|\lambda - \delta|}$, onde $C_0 = \frac{1}{\sin \theta}$.

Como $\frac{|\lambda| + 1}{|\lambda - \delta|} \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 1$, dado $\varepsilon > 0$, existe M tal que $|\lambda| > M$ implica

$$|\lambda| + 1 \leq (\varepsilon + 1)|\lambda - \delta|,$$

e então existe C_1 tal que $|\lambda| > M$ implica

$$\frac{1}{|\lambda - \delta|} \leq \frac{C_1}{|\lambda| + 1} \quad \text{e} \quad \|R(\lambda : A)\| \leq \frac{C_2}{|\lambda| + 1} \quad C_2 = C_0 C_1.$$

Pela escolha de δ' , existe $K \neq 0$ tal que $|\lambda - \delta| \geq K$, $\forall \lambda \in \Sigma_{\delta'}$. Se $|\lambda| \leq M$, então

$$|\lambda| + 1 \leq M + 1 \leq C_3 K \leq C_3 |\lambda - \delta|,$$

para alguma constante C_3 . Logo

$$\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{C_0}{|\lambda - \delta|} \leq \frac{C_4}{|\lambda| + 1}, \quad C_4 = C_0 C_3.$$

Se $C = \max\{C_2, C_4\}$, então $\|R(\lambda : A)\| \leq \frac{C}{|\lambda| + 1}$. Portanto A satisfaz as condições (1.2) e (1.3) da Definição 1.6, com $\omega < \pi/2$, e A^α está bem definido. ■

1.2 Existência, Unicidade e Regularidade

Consideremos o seguinte problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = Au(t) + f(t, u(t)), & t \geq t_0 \\ u(t_0) = u_0, \end{cases} \quad (1.5)$$

onde A é o gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo e^{At} em um espaço de Banach X , e $f : [t_0, T] \times X \rightarrow X$ é contínua em t e satisfaz uma condição de Lipschitz em u .

Definição 1.8 *Uma solução contínua da equação integral*

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s, u(s))ds, \quad t_0 \leq t \leq T$$

é chamada uma solução fraca do p.v.i. (1.5). Uma função u que é quase sempre diferenciável em $[t_0, T]$ tal que $u' \in L^1(t_0, T; X)$ é chamada solução forte do p.v.i. (1.5) se $u(t_0) = u_0$ e $u'(t) = Au(t) + f(t, u(t))$ quase sempre em $[t_0, T]$.

Suponhamos que f satisfaça uma condição de Lipschitz em u em subconjuntos limitados de X , uniformemente em t em intervalos limitados, isto é, $\forall \tau \geq t_0$ e $c \geq 0$, existe $L(c, \tau)$ tal que

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L(c, \tau)\|u - v\| \quad (1.6)$$

quaisquer que sejam $u, v \in X$ com $\|u\| \leq c$, $\|v\| \leq c$ e $t \in [t_0, \tau]$. Então temos existência e unicidade de solução fraca do p.v.i. (1.5) conforme o seguinte teorema:

Teorema 1.5 *Seja $f : [0, \infty) \times X \rightarrow X$ contínua em t para $t \geq 0$ e satisfazendo uma condição de Lipschitz em u em subconjuntos limitados de X , uniformemente*

em t em intervalos limitados como em (1.6). Se A é o gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo e^{At} em X , então para todo $u_0 \in X$ existe um $t_{\max} \leq \infty$ tal que o p.v.i.

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = Au(t) + f(t, u(t)), & t \geq 0 \\ u(0) = u_0 \end{cases} \quad (1.7)$$

tem uma única solução fraca u em $[0, t_{\max})$. Além disso, se $t_{\max} < \infty$ então

$$\lim_{t \uparrow t_{\max}} \|u(t)\| = \infty.$$

Prova: Começamos mostrando que para todo $t_0 \geq 0$, $u_0 \in X$, o p.v.i.

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = Au(t) + f(t, u(t)), & t \geq t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tem, sob as hipóteses do nosso teorema, uma única solução fraca u no intervalo $[t_0, t_1]$, cujo comprimento é limitado por:

$$\delta = \delta(t_0, \|u_0\|) = \min \left\{ 1, \frac{\|u_0\|}{K(t_0)L(K(t_0), t_0 + 1) + N(t_0)} \right\},$$

onde $L(c, \tau)$ é a constante de Lipschitz de f , como em (1.6), e

$$M(t_0) = \max\{\|e^{A(t)}\|, 0 \leq t \leq t_0 + 1\},$$

$$K(t_0) = 2\|u_0\|M(t_0),$$

$$N(t_0) = \max\{\|f(t, 0)\|, 0 \leq t \leq t_0 + 1\}.$$

Seja $t_1 = t_0 + \delta$. A aplicação

$$F : C([t_0, t_1] : X) \rightarrow C([t_0, t_1] : X)$$

definida por

$$(Fu)(t) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s, u(s))ds, \quad t_0 \leq t \leq t_1$$

leva a bola de raio $K(t_0)$ centrada em 0 de $C([t_0, t_1] : X)$ em si mesma. Isto segue da seguinte estimativa:

$$\begin{aligned}
\|(Fu)(t)\| &= \|e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s, u(s))ds\| \\
&\leq M(t_0)\|u_0\| + \int_{t_0}^t \|e^{A(t-s)}(\|f(s, u(s)) - f(s, 0)\| + \|f(s, 0)\|)ds \\
&\leq M(t_0)\|u_0\| + M(t_0)K(t_0)L(K(t_0), t_0 + 1)(t - t_0) \\
&\quad + M(t_0)N(t_0)(t - t_0) \\
&\leq M(t_0)\|u_0\| + M(t_0)[K(t_0)L(K(t_0), t_0 + 1) + N(t_0)](t - t_0) \\
&\leq M(t_0)\|u_0\| \\
&\quad + M(t_0)[K(t_0)L(K(t_0), t_0 + 1) + N(t_0)]\frac{\|u_0\|}{K(t_0)L(K(t_0), t_0 + 1) + N(t_0)} \\
&= 2M(t_0)\|u_0\| = K(t_0).
\end{aligned}$$

Nesta bola, f satisfaz a condição uniforme de Lipschitz com constante $L = L(K(t_0), t_0 + 1)$, e

$$\|F(u)(t) - F(v)(t)\| \leq M(T_0)L\|u - v\|(t - t_0).$$

Com uma indução em n obtemos:

$$\|F^n(u)(t) - F^n(v)(t)\| \leq \frac{M(t_0)L(t - t_0)^n\|u - v\|}{n!} \leq \frac{(MLt_1)^n}{n!}\|u - v\|,$$

onde $M = M(t_0)$. Para n suficientemente grande, $\frac{(MLt_1)^n}{n!} < 1$, e pelo Teorema do Ponto Fixo de Banach, F possui um único ponto fixo no intervalo $[t_0, t_1]$.

Do que acabamos de provar segue que se u é uma solução fraca de (1.7) no intervalo $[0, \tau]$, u pode ser estendida ao intervalo $[0, \tau + \delta]$ com $\delta > 0$, definindo $u(t) = w(t)$ em $[\tau, \tau + \delta]$, onde $w(t)$ é a solução da equação integral:

$$w(t) = e^{A(t-\tau)}u(\tau) + \int_{\tau}^t e^{A(t-s)}f(s, w(s))ds, \quad \tau \leq t \leq \tau + \delta.$$

Além disso, δ depende apenas de $\|u(\tau)\|$, $K(\tau)$ e $N(\tau)$.

Seja $[0, t_{\max})$ o intervalo maximal à direita do zero de existência da solução fraca u de (1.7). Se $t_{\max} < \infty$ então

$$\lim_{t \rightarrow t_{\max}} \|u(t)\| = \infty,$$

pois caso contrário existiria uma sequência $t_n \uparrow t_{\max}$ tal que $\|u(t_n)\| \leq C \forall n$. Isto implicaria, pelo que acabamos de provar, que para cada t_n perto o suficiente de $t_{\max}$,

u definida em $[0, t_n]$ poderia ser estendida à $[0, t_n + \delta]$, onde $\delta > 0$ é independente de t_n . Então u poderia ser estendida além de $t_{\max}$, contrariando sua maximalidade.

Para provar a unicidade da solução fraca local u de (1.7) notamos que se v é uma solução fraca de (1.7) com valor inicial v_0 então

$$\begin{aligned} \|u(t) - v(t)\| &\leq \|e^{A(t-t_0)}u_0 - e^{A(t-t_0)}v_0\| + \int_{t_0}^t \|e^{A(t-s)}(f(s, u(s)) - f(s, v(s)))\| ds \\ &\leq M\|u_0 - v_0\| + ML \int_{t_0}^t \|u(s) - v(s)\| ds. \end{aligned}$$

Pela Desigualdade de Gronwall

$$\|u(t) - v(t)\| \leq Me^{ML(t-t_0)}\|u_0 - v_0\| \leq Me^{ML\delta}\|u_0 - v_0\|.$$

Portanto se $u_0 = v_0$, então $u = v$. ■

Teorema 1.6 *Seja X um espaço de Banach reflexivo e seja A o gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo e^{At} em X . Se $f : [t_0, T] \rightarrow X$ é Lipschitz contínua em $[t_0, T]$, então para todo $u_0 \in \mathbf{D}(A)$ o p.v.i.*

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = Au(t) + f(t), & t \geq t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad (1.8)$$

tem uma única solução forte em $[t_0, T]$ dada por

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s)ds. \quad (1.9)$$

Prova: Se X é reflexivo e f é Lipschitz contínua em $[t_0, T]$, então f é diferenciável quase sempre, e $f' \in L^1(t_0, T, X)$. Seja

$$v(t) = \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s)ds, \quad t_0 \leq t \leq T.$$

$v(t)$ é diferenciável e $v(t) \in \mathbf{D}(A)$ quase sempre em $[t_0, T]$. Além disso

$$v'(t) \stackrel{q.s.}{=} Av(t) + f(t) \in L^1(t_0, T, X).$$

Seja

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u_0 + v(t).$$

$u(t)$ é diferenciável quase sempre em $[t_0, T]$ e

$$u'(t) \stackrel{q.s.}{=} Ae^{A(t-t_0)}u_0 + Av(t) + f(t) = Au(t) + f(t) \in L^1(t_0, T, X).$$

Como $u(t_0) = u_0$, $u(t)$ é solução forte de (1.8), e é claro que $u(t)$ satisfaz a equação integral (1.9). ■

Teorema 1.7 *Seja A o gerador infinitesimal de um C_0 semigrupo e^{At} em um espaço de Banach reflexivo X . Se $f : [t_0, T] \times X \rightarrow X$ é Lipschitz contínua em ambas as variáveis, $u_0 \in \mathbf{D}(A)$ e u é a solução fraca do problema do valor inicial (1.7), então u é a solução forte deste p.v.i..*

Prova: Suponhamos que f satisfaça

$$\|f(t_1, x_1) - f(t_2, x_2)\| \leq C(|t_1 - t_2| + \|x_1 - x_2\|), \quad t_1, t_2 \in [t_0, T], \quad x_1, x_2 \in X.$$

Seja $\|e^{At}\| \leq M$ e $\|f(t, u(t))\| \leq N$ para $t_0 \leq t \leq T$. Para $0 < h < T - t_0$ temos

$$\begin{aligned} u(t+h) - u(t) &= e^{A(t+h-t_0)}u_0 - e^{A(t-t_0)}u_0 \\ &+ \int_{t_0}^{t_0+h} e^{A(t+h-s)}f(s, u(s))ds \\ &+ \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}[f(s+h, u(s+h)) - f(s, u(s))]ds, \end{aligned}$$

e portanto

$$\begin{aligned} \|u(t+h) - u(t)\| &\leq hM\|Au_0\| + hMN \\ &+ MC \int_{t_0}^t (h + \|u(s+h) - u(s)\|)ds \\ &\leq C_1h + MC \int_{t_0}^t \|u(s+h) - u(s)\|ds, \end{aligned}$$

que pela Desigualdade de Gronwall implica

$$\|u(t+h) - u(t)\| \leq C_1 e^{TMC} h.$$

Logo, u é Lipschitz contínua. A continuidade Lipschitz de u combinada com a continuidade Lipschitz de f implica que $t \rightarrow f(t, u(t))$ é Lipschitz contínua em $[t_0, T]$. Do Teorema 1.6 segue que o p.v.i.

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = Au(t) + f(t, u(t)), & t \geq t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad (1.10)$$

tem uma única solução forte no intervalo $[t_0, T]$ satisfazendo

$$v(t) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}f(s, u(s))ds = u(t),$$

e então u é a solução forte de (1.10). ■

1.3 Espaços de Sobolev

Seja Ω um subconjunto aberto do $\mathbb{R}^n$.

Definição 1.9 Uma função $u \in L^1_{loc}(\Omega)$ tem α -derivada de Sobolev se existe $v_\alpha \in L^1_{loc}(\Omega)$ tal que

$$\int_{\Omega} \phi v_\alpha = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u D^\alpha \phi, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\Omega),$$

onde $C_c^\infty(\Omega)$ denota as funções com suporte compacto contido em Ω e derivadas contínuas de todas as ordens, e $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ é tal que $\alpha_i \geq 0$, $\alpha_i \in \mathbb{Z}$, $i = 1, 2, \dots, n$ e $|\alpha| = \sum \alpha_i$. Denotamos $D^\alpha u = v_\alpha$.

Proposição 2 A derivada de Sobolev é única e satisfaz:

- (i) Se $v = D^\alpha u$ em Ω , então $v = D^\alpha u$ em qualquer $\Omega' \subset \Omega$;
- (ii) Se u_1 e u_2 têm α -derivada de Sobolev $D^\alpha u_1$, $D^\alpha u_2$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ então $c_1 u_1 + c_2 u_2$ tem α -derivada de Sobolev e $D^\alpha(c_1 u_1 + c_2 u_2) = c_1 D^\alpha u_1 + c_2 D^\alpha u_2$;
- (iii) Se u_m é uma sequência em $L^1_{loc}(\Omega)$ tal que existe $D^\alpha u_m \in L^1_{loc}(\Omega)$, $\forall m$, e ainda

$$u_m \xrightarrow{L^1_{loc}} u$$

$$D^\alpha u_m \xrightarrow{L^1_{loc}} v_\alpha,$$

então u tem α -derivada de Sobolev $D^\alpha u = v_\alpha$.

Definição 1.10 Seja $m \in \mathbb{Z}$, $m \geq 0$ e $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aberto, e seja p tal que $1 \leq p \leq \infty$. Definimos os Espaços de Sobolev $W^{m,p}(\Omega)$ da seguinte forma:

$$W^{m,p}(\Omega) := \{u \in L^p(\Omega) \text{ tal que } \exists D^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

$W^{m,p}(\Omega)$ é um espaço de Banach com a norma $\|\cdot\|_{m,p}$ dada por

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p},$$

onde

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_{\Omega} |u|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty, \text{ e}$$

$$\|u\|_{L^\infty} = \inf\{k \geq 0 : |u(x)| \leq k \text{ quase sempre}\}.$$

Equivalentemente, $W^{m,p}(\Omega)$ é o complemento de $\{u \in C^m(\Omega) : \|u\|_{m,p} < \infty\}$ com relação à norma $\|\cdot\|_{m,p}$. $W^{m,p}_0(\Omega)$ é o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ em $W^{m,p}(\Omega)$.

$W^{m,p}(\Omega)$ é separável se $1 \leq p < \infty$, reflexivo e uniformemente convexo se $1 < p < \infty$.

$W^{m,2}(\Omega)$ é um espaço de Hilbert com produto interno

$$\langle u, v \rangle_m = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \langle D^\alpha u, D^\alpha v \rangle,$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é o produto interno em $L^2(\Omega)$. Usamos a notação $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$ e $H_0^m(\Omega) = W_0^{m,2}(\Omega)$.

Teorema 1.8 (*partições da unidade*) - Seja Γ um compacto do $\mathbb{R}^n$ e sejam $U_1, U_2, \dots, U_k$ abertos satisfazendo $\Gamma \subset \bigcup_{i=1}^k U_i$. Existem funções $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_k \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ de tal forma que

(i) $0 \leq \theta_i \leq 1, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$ e $\sum_{i=0}^k \theta_i = 1$;

(ii) θ_i tem suporte compacto, $\text{supp } \theta_i \subset U_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$, e $\text{supp } \theta_0 \subset \mathbb{R}^n \setminus \Gamma$.

Se Ω é um aberto limitado e $\Gamma = \partial\Omega$, então $\theta_0|_\Omega \in C_c^\infty(\Omega)$.

Teorema 1.9 Seja $u \in L^p(\Omega)$ com $1 < p \leq \infty$. As seguintes propriedades são equivalentes:

(i) $u \in W^{1,p}(\Omega)$;

(ii) Existe uma constante C tal que

$$\left| \int_\Omega u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| \leq C \|\varphi\|_{L^{p'}}, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \quad \forall i = 1, 2, \dots, n,$$

onde p' é tal que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

(iii) Existe uma constante C tal que para todo aberto $\omega \subset\subset \Omega$ e todo $h \in \mathbb{R}^n$ com $|h| < d(\omega, \mathbb{R}^n \setminus \Omega)$ tem-se

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\omega)} \leq C|h|,$$

onde $\tau_h u(x) = u(x+h)$. Além disso a constante C pode ser tomada como $C = \|\nabla u\|_{L^p}$ em (ii) e (iii).

Definição 1.11 Dizemos que um aberto Ω é de classe C^m , $m \in \mathbb{Z}$, $m \geq 1$, se para todo $x \in \partial\Omega$ existe uma vizinhança U de x em $\mathbb{R}^n$ e uma aplicação bijetora $H : Q \rightarrow U$ tal que

- $H \in C^m(\overline{Q})$;
- $H^{-1} \in C^m(\overline{U})$;
- $H(Q_+) = U \cap \Omega$;
- $H(Q_0) = U \cap \partial\Omega$,

onde

$$Q = \{x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}; |x'| < 1 \text{ e } |x_n| < 1\};$$

$$Q_+ = Q \cap \mathbb{R}_+^n;$$

$$Q_0 = \{x \in Q; x_n = 0\}.$$

Teorema 1.10 Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, Ω aberto de classe C^1 com fronteira limitada. Então

$$H^1(\Omega) \subset L^p(\Omega), \quad 1 \leq p \leq 6,$$

e a imersão é contínua. Se $1 \leq p < 6$, a imersão é compacta.

Teorema 1.11 Seja Ω um aberto de classe C^2 com $\partial\Omega$ limitada ou $\Omega = \mathbb{R}_+^n$. Seja $f \in L^2(\Omega)$ e seja $u \in H_0^1(\Omega)$ satisfazendo:

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi = \int_{\Omega} f \varphi, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega). \quad (1.11)$$

Então $u \in H^2(\Omega)$ e $\|u\|_{H^2} \leq C\|f\|_{L^2}$, onde C é uma constante que só depende de Ω .

Prova:

Caso a: $\Omega = \mathbb{R}^n$.

Dado $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ seja

$$D_h u = \frac{1}{|h|}(\tau_h u - u), \quad \text{i.e.,} \quad D_h u(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{|h|},$$

e seja $\varphi = D_{-h}(D_h u)$. $\varphi \in H_0^1(\mathbb{R}^n)$ e por (1.11)

$$\int_{\Omega} |\nabla D_h u|^2 = \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi = \int_{\Omega} f \varphi = \int_{\Omega} f D_{-h}(D_h u),$$

portanto,

$$\|D_h u\|_{H^1}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|D_{-h}(D_h u)\|_{L^2}.$$

Pelo Teorema 1.9 temos

$$\|D_{-h} u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

Logo

$$\|D_h u\|_{H^1}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|\nabla D_h u\|_{L^2} = \|f\|_{L^2} \|D_h u\|_{H^1}$$

e então

$$\|D_h u\|_{H^1} \leq \|f\|_{L^2}.$$

Em particular,

$$\left\| D_h \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Pelo Teorema 1.9 $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in H^1(\Omega)$, $j = 1, 2, \dots, n$, e então $u \in H^2(\Omega)$. É claro que $\exists C$ tal que $\|u\|_{H^2} \leq C \|f\|_{L^2}$.

Caso b: $\Omega = \mathbb{R}_+^n$.

Seja $h \in \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. Dizemos que h é paralelo à fronteira de Ω e denotamos $h \parallel \partial\Omega$. Se $u \in H_0^1(\Omega)$ e $h \parallel \partial\Omega$, então $\tau_h u \in H_0^1(\Omega)$. Seja $\varphi = D_{-h}(D_h u)$. Como no **caso a**:

$$\|D_h u\|_{H^1}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|D_{-h}(D_h u)\|_{L^2}.$$

Se $h \parallel \partial\Omega$ ainda temos

$$\|D_h v\|_{L^2} \leq \|\nabla v\|_{L^2} \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

Portanto

$$\|D_h u\|_{H^1} \leq \|f\|_{L^2} \quad \forall h \parallel \partial\Omega. \quad (1.12)$$

Sejam $1 \leq j \leq n$, $1 \leq k \leq n-1$, $h = (0, 0, \dots, \overbrace{|h|}^{k^a}, 0, \dots, 0)$ e $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Temos

$$\int D_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \varphi = - \int u D_{-h} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right)$$

e por (1.12)

$$\left| \int u D_{-h} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right) \right| \leq \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2}.$$

Passando o limite quando $|h| \rightarrow 0$ obtemos

$$\left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_k} \right| \leq \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2}, \quad 1 \leq j \leq n, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Falta mostrarmos que

$$\left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_n^2} \right| \leq C \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Notemos que a equação (1.11) implica em

$$\left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_n^2} \right| \leq \sum_{i=1}^{n-1} \left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2} \right| + \left| \int f \varphi \right| \leq C \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2}, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Logo temos

$$\left| \int u \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_k} \right| \leq C \|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \quad 1 \leq j, k \leq n.$$

Então pelo Teorema 1.9, $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in H^1(\Omega)$, $j = 1, 2, \dots, n$, e portanto $u \in H^2(\Omega)$.

Caso geral: Ω limitado.

Seja $U_1, U_2, \dots, U_k$ uma cobertura finita de $\partial\Omega$ e consideremos uma partição da unidade $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$, subordinada a esta cobertura conforme o Teorema 1.8. É claro que $u = \sum_{i=0}^k \theta_i u$, e assim basta mostrarmos que $\theta_i u \in H^2(\Omega)$, $i = 0, 1, \dots, k$. Primeiro demonstramos que $\theta_0 u \in H^2(\Omega)$. Como $\theta_0 u|_\Omega \in C_c^\infty(\Omega)$, a função $\theta_0 u$ estendida por 0 fora de Ω pertence a $H^1(\mathbb{R}^n)$. Segue da equação (1.11) que $\theta_0 u$ satisfaz

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla(\theta_0 u) \nabla \varphi = \int_{\mathbb{R}^n} \theta_0 f \varphi - \int_{\mathbb{R}^n} 2 \nabla \theta_0 \nabla u \varphi - \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta \theta_0) u \varphi, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\mathbb{R}^n).$$

Se $g = \theta_0 f - 2 \nabla \theta_0 \nabla u - (\Delta \theta_0) u$, então $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, e segue portanto do caso a que $\theta_0 u \in H^2(\mathbb{R}^n)$ com

$$\|\theta_0 u\|_{H^2} \leq C(\|f\|_{L^2} + \|u\|_{H^1}) \leq C' \|f\|_{L^2},$$

já que $\|u\|_{H^1} \leq \|f\|_{L^2}$, pela equação (1.11).

Por fim demonstramos que $\theta_i u \in H^2(\Omega)$ para $1 \leq i \leq k$. Seja $v = \theta_i u \in H_0^1(\Omega \cap U_i)$. Como acima, v satisfaz

$$\int \nabla v \nabla \varphi = \int g \varphi, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega \cap U_i),$$

onde

$$g = \theta_i f - 2(\nabla \theta_i)(\nabla u) - (\Delta \theta_i)u,$$

e $g \in L^2(\Omega \cap U_i)$ com $\|g\|_{L^2} \leq C\|f\|_{L^2}$. Se H é como na Definição 1.11 e $J = H^{-1}$, seja $\omega(y) = v(H(y))$, $y \in Q_+$ e $\omega(Jx) = v(x)$, $x \in \Omega \cap U_i$. Seja $\psi \in H_0^1(Q_+)$ e seja $\varphi(x) = \psi(Jx)$, $x \in \Omega \cap U_i$. Então $\varphi \in H_0^1(\Omega \cap U_i)$ e

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x_j} &= \sum_k \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} &= \sum_\ell \frac{\partial \psi}{\partial y_\ell} \frac{\partial J_\ell}{\partial x_j}. \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} \int_{\Omega \cap U_i} \nabla v \nabla \varphi dx &= \int_{\Omega \cap U_i} \sum_{j,k,\ell} \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \frac{\partial J_\ell}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_\ell} dx \\ &= \int_{Q_+} \sum_{j,k,\ell} \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \frac{\partial J_\ell}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_\ell} |Jac H| dy. \end{aligned}$$

Portanto

$$\int_{\Omega \cap U_i} \nabla v \nabla \varphi = \int_{Q_+} \sum_{k,\ell} a_{k\ell} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_\ell} dy,$$

onde

$$a_{k\ell} = \sum_j \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \frac{\partial J_\ell}{\partial x_j} |Jac H|.$$

Notemos que $a_{k\ell} \in C^1(\overline{Q_+})$ e que qualquer que seja $\xi \in \mathbb{R}^n$, temos

$$\sum_{k,\ell} a_{k\ell} \xi_k \xi_\ell = |Jac H| \sum_j \left| \sum_k \frac{\partial J_k}{\partial x_j} \xi_k \right|^2 \geq \alpha |\xi|^2,$$

com $\alpha > 0$, uma vez que os jacobianos $Jac H$ e $Jac J$ são não singulares.

Por outro lado, temos

$$\int_{\Omega \cap U_i} g \varphi dx = \int_{Q_+} (g \circ H) \psi |Jac H| dy$$

Portanto temos

$$\sum_{k,\ell=1}^n \int_{Q_+} a_{k,\ell} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_\ell} dy = \int_{Q_+} \tilde{g} \psi dy \quad \forall \psi \in H_0^1(Q_+), \quad (1.13)$$

onde $\tilde{g} = (g \circ H) |Jac H| \in L^2(Q_+)$.

Mostraremos que $\omega \in H^2(Q_+)$ e que $\|\omega\|_{H^2} \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}$. Seja $\psi = D_{-h}(D_h\omega)$ com $h \parallel Q_0$ e $|h|$ pequeno o suficiente para que $\psi \in H_0^1(Q_+)$. Assim,

$$\sum_{k,\ell} \int_{Q_+} D_h \left(a_{k\ell} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \right) \frac{\partial}{\partial y_\ell} (D_h \omega) = \int_{Q_+} \tilde{g} D_{-h}(D_h \omega).$$

Mas

$$\int_{Q_+} \tilde{g} D_{-h}(D_h \omega) \leq \|\tilde{g}\|_{L^2} \|D_{-h}(D_h \omega)\|_{L^2} \leq \|\tilde{g}\|_{L^2} \|\nabla D_h \omega\|_{L^2}.$$

Por outro lado

$$D_h \left(a_{k\ell} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \right) (y) = a_{k\ell}(y+h) \frac{\partial}{\partial y_k} D_h \omega(y) + (D_h a_{k\ell}(y)) \frac{\partial \omega}{\partial y_k}(y),$$

e portanto temos

$$\sum_{k,\ell} \int_{Q_+} D_h \left(a_{k\ell} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \right) \frac{\partial}{\partial y_\ell} (D_h \omega) \geq \alpha \|\nabla D_h \omega\|_{L^2}^2 - \|\omega\|_{H^1} \|\nabla D_h \omega\|_{L^2}.$$

Assim obtemos

$$\|\nabla D_h \omega\|_{L^2} \leq C_1(\|\omega\|_{H^1} + \|\tilde{g}\|_{L^2}) \leq C_2 \|\tilde{g}\|_{L^2}.$$

Pela equação 1.13 e pela desigualdade de Poincaré temos $\|\omega\|_{L^1} \leq C_3 \|\tilde{g}\|_{L^2}$. Concluimos como no **caso b** que

$$\left| \int_{Q_+} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial \psi}{\partial y_\ell} \right| \leq C \|\tilde{g}\|_{L^2} \|\psi\|_{L^2} \quad \forall \psi \in \mathbf{C}_c^1(Q_+), \quad \forall (k, \ell) \neq (n, n) \quad (1.14)$$

Para concluirmos que $\omega \in H^2(Q_+)$ e $\|\omega\|_{H^2} \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}$, falta demonstrarmos que

$$\left| \int_{Q_+} \frac{\partial \omega}{\partial y_n} \frac{\partial \psi}{\partial y_n} \right| \leq C \|\tilde{g}\|_{L^2} \|\psi\|_{L^2} \quad \forall \psi \in \mathbf{C}_c^1(Q_+).$$

Se substituirmos, na equação (1.13), ϕ por $\frac{1}{a_{nn}}\phi$, $\phi \in \mathbf{C}_c^1(Q_+)$, teremos

$$\int a_{nn} \frac{\partial \omega}{\partial y_n} \frac{\partial}{\partial y_n} \left(\frac{1}{a_{nn}} \psi \right) = \int \frac{\tilde{g}}{a_{nn}} \psi - \sum_{(k,\ell) \neq (n,n)} \int a_{k\ell} \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial}{\partial y_\ell} \left(\frac{1}{a_{nn}} \psi \right),$$

quer dizer:

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial \omega}{\partial y_n} \frac{\partial \psi}{\partial y_n} &= \int \frac{1}{a_{nn}} \left(\frac{\partial a_{nn}}{\partial y_n} \right) \frac{\partial \omega}{\partial y_n} \psi + \int \frac{\tilde{g}}{a_{nn}} \psi \\ &+ \sum_{(k,\ell) \neq (n,n)} \int \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \left(\frac{\partial a_{k\ell}}{\partial y_\ell} \right) \frac{\psi}{a_{nn}} - \sum_{(k,\ell) \neq (n,n)} \int \frac{\partial \omega}{\partial y_k} \frac{\partial}{\partial y_\ell} \left(\frac{a_{k\ell}}{a_{nn}} \psi \right). \end{aligned} \quad (1.15)$$

Combinando (1.14) e (1.15) obtemos

$$\left| \int_{Q_+} \frac{\partial \omega}{\partial y_n} \frac{\partial \psi}{\partial y_n} \right| \leq C(\|\omega\|_{H^1} + \|\tilde{g}\|_{L^2}) \|\psi\|_{L^2} \quad \forall \psi \in C_c^1(Q_+).$$

Portanto $\omega \in H^2(Q_+)$ e $\|\psi\|_{H^2} \leq C\|\tilde{g}\|_{L^2}$. Voltando a $\Omega \cap U_i$, temos que $v = \theta_i u \in H^2(\Omega \cap U_i)$ e então $\theta_i u \in H^2(\bar{\Omega})$ com $\|\theta_i u\|_{H^2} \leq C\|f\|_{L^2}$. ■

Teorema 1.12 (Lax-Milgran) *Seja H um espaço de Hilbert, e seja $a(u, v)$ uma forma bilinear, contínua e coerciva. Então para todo $\varphi \in H^*$ existe um único $u \in H$ tal que*

$$a(u, v) = \langle v, \varphi \rangle \quad \forall v \in H.$$

Além disso, se a é simétrica, então u se caracteriza por:

$$u \in H \text{ e } \frac{1}{2}a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \min_{v \in H} \left\{ \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\}.$$

Teorema 1.13 $\overline{\{u \in C^2(\bar{\Omega}) : u = 0 \text{ em } \partial\Omega\}}^{H^2} = H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega).$

Teorema 1.14 *Seja Ω um subconjunto aberto, limitado e com fronteira suave do $\mathbb{R}^3$. Seja $\mathcal{A}$ o operador*

$$\mathcal{A} : D(\mathcal{A}) \subset X \rightarrow X$$

$$(\mathcal{A}u)x = -(\Delta u)x = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right) x, \quad x \in \Omega,$$

onde $X = L^2(\Omega)$ e $D(\mathcal{A}) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$. Então:

- (i) $\mathcal{A}$ é fechado;
- (ii) $\mathcal{A}$ é simétrico;
- (iii) $\mathcal{A}$ é sobrejetor;
- (iv) $\mathcal{A}$ é positivo;
- (v) $\mathcal{A}$ tem inversa compacta.

Prova:

(i) $\mathcal{A}u = -\Delta u = -(D^{\alpha_1}u + D^{\alpha_2}u + D^{\alpha_3}u)$, onde

$$\alpha_1 = (2, 0, 0)$$

$$\alpha_2 = (0, 2, 0)$$

$$\alpha_3 = (0, 0, 2)$$

Se $\{u_m\} \in \mathbf{D}(\mathcal{A}) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$,

$$u_m \xrightarrow{L^2} u \Rightarrow u_m \xrightarrow{L_{loc}^1} u$$

e $\exists \{D^{\alpha_i}u_m\}$, $i = 1, 2, 3$,

$$D^{\alpha_i}u_m \xrightarrow{L^2} v_i \Rightarrow D^{\alpha_i}u_m \xrightarrow{L_{loc}^1} v_i,$$

então $v_i = D^{\alpha_i}u$, $i = 1, 2, 3$. Ou seja, se $u_m \xrightarrow{L^2} u$ e $\mathcal{A}u_m \xrightarrow{L^2} v$ então $v = \mathcal{A}u$.

(ii) Se $u, v \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$, então pelo Teorema 1.13 existe uma sequência $\{v_n\} \subset C^2(\overline{\Omega})$, $v_n = 0$ em $\partial\Omega$ tal que $v_n \xrightarrow{H^2} v$, logo

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A}u, v \rangle &= \langle \mathcal{A}u, \lim v_n \rangle = \lim \langle \mathcal{A}u, v_n \rangle \\ &= \lim \left(-\int_{\Omega} \Delta u v_n \right) = \lim \int_{\Omega} \nabla u \nabla v_n \\ &= \lim \left(-\int_{\Omega} u \Delta v_n \right) = \lim \langle u, \mathcal{A}v_n \rangle \\ &= \langle u, \lim \mathcal{A}v_n \rangle = \langle u, \mathcal{A}v \rangle, \end{aligned}$$

onde $\langle , \rangle$ é o produto interno em $L^2(\Omega)$.

(iii) $H_0^1(\Omega) = W_0^{1,2}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{W^{1,2}(\Omega)}$ é um espaço de Hilbert com o produto interno

$$\langle u, v \rangle_{1,2} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq 1} \langle D^\alpha u, D^\alpha v \rangle.$$

Seja $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u(x) \nabla v(x) dx$, $u, v \in H_0^1(\Omega)$.

(a) $a(u, v)$ é bilinear:

$$\begin{aligned} a(u_1 + u_2, v) &= \int_{\Omega} \nabla(u_1 + u_2)(x) \nabla v(x) dx \\ &= \int_{\Omega} \nabla u_1(x) \nabla v(x) dx + \int_{\Omega} \nabla u_2(x) \nabla v(x) dx \\ &= a(u_1, v) + a(u_2, v). \end{aligned}$$

Analogamente $a(u, v_1 + v_2) = a(u, v_1) + a(u, v_2)$.

(b) $a(u, v)$ é contínua:

$$\|a(u, v)\| = \left| \int_{\Omega} \nabla u(x) \nabla v(x) dx \right| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

(c) $a(u, v)$ é coerciva:

$$a(v, v) = \int_{\Omega} \nabla v(x) \nabla v(x) dx = \|\nabla v\|_2^2 \geq C \|v\|_2^2, \text{ pela desigualdade de Poincaré.}$$

Assim, dada $h \in L^2(\Omega)$, seja $L_h : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$L_h(v) = \int_{\Omega} h(x) v(x) dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Pelo teorema de Lax-Milgran existe uma única $u \in H_0^1(\Omega)$ tal que

$$a(u, v) = L_h(v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

ou seja

$$\int_{\Omega} \nabla u(x) \nabla v(x) dx = \int_{\Omega} h(x) v(x) dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Agora, como demonstramos no Teorema 1.11, $u \in H^2(\Omega)$, logo $u \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$, então:

$$\int_{\Omega} h(x) v(x) dx = \int_{\Omega} \nabla u(x) \nabla v(x) dx = - \int_{\Omega} \Delta u(x) v(x) dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Portanto $h = -\Delta u = \mathcal{A}u$. Logo $\mathcal{A}$ é sobrejetora.

$$(iv) \quad \langle \mathcal{A}u, u \rangle = - \int_{\Omega} \Delta u u = \int_{\Omega} \nabla u \nabla u = \|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq C \|u\|_{L^2}^2,$$

pela desigualdade de Poincaré.

(v) Se $\|\cdot\|_{\mathcal{G}}$ denota a norma do gráfico em $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, então

$$\mathcal{A} : (\mathbf{D}(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{G}}) \longrightarrow L^2(\Omega)$$

é uma isometria. Logo, se B é um subconjunto limitado de $L^2(\Omega)$, $\mathcal{A}^{-1}(B)$ é um subconjunto limitado de $(\mathbf{D}(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{G}})$. Como $(\mathbf{D}(\mathcal{A}), \|\cdot\|_{\mathcal{G}})$ está compactamente imerso em $L^2(\Omega)$, então $\mathcal{A}^{-1}$ é compacta. ■

Corolário 1 O operador $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \subset X \rightarrow X$$

$$(\mathcal{A}u)x = -(\Delta u)x = - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right) x, \quad x \in \Omega,$$

onde $X = L^2(\Omega)$ e $\mathbf{D}(\mathcal{A}) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ é auto-adjunto.

Combinando a Proposição 1 e o Teorema 1.14 temos que $\mathcal{A}^\alpha$ está bem definida $\forall \alpha > 0$.

Mostremos que $\mathbf{D}(\mathcal{A}^{1/2}) = X^{1/2} = H_0^1(\Omega)$. Como $L^2(\Omega)$ é um espaço de Hilbert separável e $\mathcal{A}^{-1}$ é um operador compacto e auto-adjunto, então $L^2(\Omega)$ admite uma base Hilbertiana formada por auto vetores de $\mathcal{A}$. Ou seja $\forall u \in L^2(\Omega)$,

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} \langle u, \phi_n \rangle \phi_n,$$

onde ϕ_n é auto vetor de $\mathcal{A}$ qualquer que seja n . Se $u \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$,

$$\mathcal{A}u = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n \langle u, \phi_n \rangle \phi_n,$$

onde λ_n é auto valor de $\mathcal{A}$ qualquer que seja n .

Cada $\phi_n \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$ e então

$$\int_{\Omega} \nabla \phi_n \nabla \phi_m = - \int_{\Omega} \Delta \phi_n \phi_m = \int_{\Omega} \mathcal{A} \phi_n \phi_m = \lambda_n \int_{\Omega} \phi_n \phi_m = 0, \quad m \neq n,$$

e $\{\phi_n\}$ é uma sequência ortogonal em $H^1(\Omega)$. De forma análoga mostra-se que $\|\nabla \phi_n\|_{L^2} = \lambda_n^{1/2}$. Disto segue que, se $\|\cdot\|_{1/2}$ denota a norma do gráfico em $X^{1/2}$, então

$$\|u\|_{H^1}^2 = \left\| \sum_{i=1}^{\infty} \langle u, \phi_n \rangle \nabla \phi_n \right\|_{L^2}^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle u, \phi_n \rangle|^2 \lambda_n = \|u\|_{1/2}^2.$$

Portanto

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{H^1(\Omega)} \subset \overline{H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)}^{H^1(\Omega)} = \overline{H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)}^{X^{1/2}} = X^{1/2}.$$

Por outro lado, se $u \in X^{1/2}$, e ϕ_n , λ_n são auto vetores e auto valores de $\mathcal{A}$ respectivamente, $n \geq 1$,

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \langle u, \phi_n \rangle \phi_n \quad \text{implica} \quad \mathcal{A}^{1/2} u = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{1/2} \langle u, \phi_n \rangle \phi_n.$$

De fato,

$$(\mathcal{A} - \lambda I)u = \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2 - \lambda & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle u, \phi_1 \rangle \\ \langle u, \phi_2 \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

então

$$(\mathcal{A} - \lambda I)^{-1}u = \begin{pmatrix} (\lambda_1 - \lambda)^{-1} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & (\lambda_2 - \lambda)^{-1} & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle u, \phi_1 \rangle \\ \langle u, \phi_2 \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Logo,

$$(\mathcal{A} - \lambda I)^{-1}\phi_n = (\lambda_n - \lambda)^{-1}\phi_n.$$

Agora, o caminho C na definição de $A^{-\alpha}$, se $\alpha < 1$, pode ser tomado como a reunião de círculos C_n em torno dos auto valores λ_n , $n \geq 1$.

Então

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{-\alpha}\phi_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C z^{-\alpha} (\mathcal{A} - zI)^{-1} dz \phi_n \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_m \oint_{C_m} z^{-\alpha} (\mathcal{A} - zI)^{-1} dz \phi_n \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_m \oint_{C_m} z^{-\alpha} (\lambda_n - zI)^{-1} \phi_n dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_n} z^{-\alpha} (\lambda_n - zI)^{-1} \phi_n dz \\ &= \lambda_n^{-\alpha} \phi_n. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{A}^{-\alpha}u = \begin{pmatrix} \lambda_1^{-\alpha} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2^{-\alpha} & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle u, \phi_1 \rangle \\ \langle u, \phi_2 \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Seja $u_k = \sum_{n=1}^k \langle u, \phi_n \rangle \phi_n$, $u_k \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$. Então

$$\begin{aligned}
\|u - u_k\|_{1/2} &= \|\mathcal{A}^{1/2}(u - u_k)\|_{L^2} = \left\| \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{1/2} \langle u - u_k, \phi_n \rangle \phi_n \right\|_{L^2} \\
&= \left\| \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{1/2} \langle u, \phi_n \rangle \phi_n - \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{1/2} \langle \sum_{j=1}^k \langle u, \phi_j \rangle \phi_j, \phi_n \rangle \phi_n \right\|_{L^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.
\end{aligned}$$

Portanto

$$\|u - u_k\|_{H^1} = \|u - u_k\|_{X^{1/2}} \longrightarrow 0.$$

Como $H_0^1(\Omega)$ é fechado, $u \in H_0^1(\Omega)$. Portanto, $X^{1/2} \subset H_0^1(\Omega)$.

Capítulo 2

Atratores para semigrupos e equações de evolução

O objetivo deste capítulo é estudar o comportamento assintótico de semigrupos (em geral não lineares). Mais especificamente, o objetivo principal é dar condições suficientes sob as quais um semigrupo possui um atrator global minimal. Os resultados apresentados neste capítulo seguem Ladyzhenskaya [1991] e serão utilizados no capítulo seguinte para mostrar a existência de atratores globais para o semigrupo gerado pela equação das ondas com atrito linear e termo forçante com crescimento subcrítico.

Por todo este capítulo, X denota um espaço métrico completo.

Definição 2.1 *Um semigrupo $T(t)$, $t \in \mathbb{R}^+$, é uma família de operadores contínuos $T(t) : X \rightarrow X$ satisfazendo a seguinte propriedade:*

$$T(t_1)T(t_2)x = T(t_1 + t_2)x, \quad \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}^+ \text{ e } x \in X.$$

Dizemos que o semigrupo $T(t)$ é pontualmente contínuo se para cada $x \in X$ a aplicação $t \rightarrow T(t)x$ de $\mathbb{R}^+ \rightarrow X$ é contínua. Se a aplicação $(t, x) \rightarrow T(t)x$ de $\mathbb{R}^+ \times X \rightarrow X$ é contínua, dizemos que o semigrupo $T(t)$ é contínuo.

Dado um semigrupo $T(t)$ e $A \subset X$ usaremos a seguinte notação :

$$\gamma^+(A) = \bigcup_{x \in A} \{T(t)x, t \in \mathbb{R}^+\};$$

$$\gamma_{[t_1, t_2]}^+(A) = \bigcup_{x \in A} \{T(t)x, t \in [t_1, t_2]\};$$

$$\gamma_t^+(A) = \bigcup_{x \in A} \{T(\tau)x, \tau \in [t, \infty)\}.$$

Dizemos que $\gamma^+(A)$ é a semi-órbita positiva de A . Em particular se $A = \{x\}$, dizemos que $\gamma^+(x) = \gamma^+(\{x\})$ é a semi-órbita positiva de x .

O semigrupo $T(t)$ é limitado se para cada subconjunto limitado $B \subset X$, $\gamma^+(B)$ é limitado.

Definição 2.2 *Sejam A e M subconjuntos de X . Dizemos que A atrai M se dado $\varepsilon > 0$ existe $t_1 > 0$, t_1 dependendo de ε e M , tal que $T(t)(M) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(A) \forall t > t_1$, onde $\mathcal{O}_\varepsilon(A) = \cup_{x \in A} B_\varepsilon(x)$, e $B_\varepsilon(x)$ é a bola de centro x e raio ε . $A \subset X$ atrai o ponto x se A atrai $\{x\}$.*

Definição 2.3 *Se $A \subset X$, o conjunto ω -limite $\omega(A)$ é definido por*

$$\omega(A) = \{y \in X : y = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x_k, x_k \in A, t_k \rightarrow \infty\}.$$

Se $x \in X$, definimos o conjunto ω -limite $\omega(x) := \omega(\{x\})$.

Os conjuntos ω -limites podem ser descritos em termos de $\gamma_t^+(x) = \gamma_t^+(\{x\})$ e $\gamma_t^+(A)$ como mostra o lema a seguir:

Lema 2.1 *Se para cada $B \subset X$, $\bar{B}$ denota o fecho de B em X , temos:*

$$\omega(x) = \bigcap_{t \geq 0} \overline{\gamma_t^+(x)};$$

$$\omega(A) = \bigcap_{t \geq 0} \overline{\gamma_t^+(A)},$$

Prova: Se $y \in \omega(A)$ então

$$y = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x_k, \quad x_k \in A \text{ e } t_k \rightarrow \infty.$$

Assim, para todo $t \geq 0$ existe k_0 tal que se $k \geq k_0$, $t_k \geq t$ e $\{T(t_k)x_k\}_{k \geq k_0}$ é uma sequência em $\gamma_t^+(A)$ convergindo para y . Portanto $y \in \bigcap_{t \geq 0} \overline{\gamma_t^+(A)}$.

Por outro lado, se $y \in \bigcap_{t \geq 0} \overline{\gamma_t^+(A)}$, dado $k \in \mathbb{N}$, existe $y_k \in \gamma_k^+(A)$ tal que $d(y, y_k) < k^{-1}$. Como $y_k \in \gamma_k^+(A)$, $y_k = T(t_k)x_k$, com $t_k \geq k$ e $x_k \in A$. Logo $T(t_k)x_k \rightarrow y$ quando $k \rightarrow \infty$ e $y \in \omega(A)$. ■

Definição 2.4 *Um semigrupo $T(t)$ pertence à classe $\mathcal{K}$ se para cada $t > 0$ o operador $T(t)$ é compacto, i.e., dado um conjunto limitado $B \subset X$, $T(t)(B)$ é pré-compacto.*

Teorema 2.1 *Seja $T(t)$ um semigrupo de classe K . Seja $A \subset X$ e suponhamos que exista $\tau \in \mathbb{R}^+$ tal que $\gamma_\tau^+(A)$ é limitado. Então:*

- (i) $\omega(A)$ é não vazio e compacto;
- (ii) $\omega(A)$ atrai A ;
- (iii) $\omega(A)$ é invariante, i. e., $T(t)(\omega(A)) = \omega(A)$, $\forall t \in \mathbb{R}^+$;
- (iv) $\omega(A)$ é o menor conjunto fechado que atrai A ;
- (v) Se $T(t)$ é contínuo e A é conexo então $\omega(A)$ é conexo.

Prova:

- (i) $T(t)(\gamma_\tau^+(A)) = \gamma_{t+\tau}^+(A)$ é pré-compacto se $t > 0$, e $\gamma_{t_2+\tau}^+(A) \subset \gamma_{t_1+\tau}^+(A)$ para todo $t_2 > t_1$. Logo

$$\omega(A) = \bigcap_{t>0} \overline{\gamma_t^+(A)} = \bigcap_{t>0} \overline{\gamma_{t+\tau}^+(A)}$$

é a intersecção de uma família decrescente de conjuntos compactos. Portanto $\omega(A)$ é não vazio e compacto.

- (ii) Suponhamos que $\omega(A)$ não atraia A . Então existe $\varepsilon > 0$ e uma sequência $t_k \rightarrow \infty$, $t_k \geq \tau + 1$ tal que $T(t_k)(A) \not\subset \mathcal{O}_\varepsilon(\omega(A))$, i.e., existe $x_k \in A$ tal que $T(t_k)x_k \notin \mathcal{O}_\varepsilon(\omega(A))$. Logo $\{T(t_k)x_k\} \subset T(\tau + 1)(A) = T(1)(\gamma_\tau^+(A))$ e

$$d(T(t_k)x_k, \omega(A)) \geq \varepsilon \quad \forall k. \quad (2.1)$$

Como $T(1)(\gamma_\tau^+(A))$ é pré-compacto, é possível extrair da sequência acima uma subsequência convergente $\{T(t_{k_j})x_{k_j}\}$, $k_j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \infty$. Seja $y = \lim_{j \rightarrow \infty} T(t_{k_j})x_{k_j}$. Então $y \in \omega(A)$, contradizendo (2.1).

- (iii) Se $x \in \omega(A)$, $x = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x_k$, $x_k \in A$ e $t_k \rightarrow \infty$, então dado $t \in \mathbb{R}^+$,

$$T(t)x = T(t)\left(\lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t + t_k)x_k.$$

Logo, $T(t)x \in \omega(A)$. Além disso, podemos assumir $1 + \tau + t \leq t_1 < t_2 < \dots$. Os pontos $y_k = T(t_k - t)x_k$, $k = 1, 2, \dots$, pertencem ao conjunto pré-compacto $\gamma_{\tau+1}^+(A)$. Então a sequência $\{y_k\}$ admite uma subsequência convergente $\{y_{k_j}\}$ e $\lim_{j \rightarrow \infty} y_{k_j} = y \in \omega(A)$. Portanto

$$x = \lim_{j \rightarrow \infty} T(t_{k_j})x_{k_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} T(t)y_{k_j} = T(t)y \in T(t)(\omega(A)).$$

- (iv) Suponhamos que exista F fechado, propriamente contido em $\omega(A)$ e atraindo A . F é compacto desde que $\omega(A)$ é. Seja $y \in \omega(A) \setminus F$ e seja $\varepsilon > 0$ pequeno o suficiente para que

$$\mathcal{O}_\varepsilon(y) \cap \mathcal{O}_\varepsilon(F) = \emptyset. \quad (2.2)$$

Existe $t_\varepsilon > 0$ tal que $T(t)(A) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(F)$, $t \geq t_\varepsilon$. Mas $y = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x_k$, $x_k \in A$ e $t_k \rightarrow \infty$. Então $T(t_k)(A) \cap \mathcal{O}_\varepsilon(y) \neq \emptyset$ se t_k for suficientemente grande, o que contradiz (2.2).

- (v) Sejam F_1 e F_2 fechados satisfazendo $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ e $\omega(A) = F_1 \cup F_2$. Existe $\varepsilon > 0$ tal que $\overline{\mathcal{O}_\varepsilon(F_1)} \cap \overline{\mathcal{O}_\varepsilon(F_2)} = \emptyset$, e é claro que $\mathcal{O}_\varepsilon(\omega(A)) = \mathcal{O}_\varepsilon(F_1) \cup \mathcal{O}_\varepsilon(F_2)$. Como $\omega(A)$ atrai A , existe $t_1 = t_1(\varepsilon, A)$ tal que $\gamma_t^+(A) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(\omega(A))$, $t \geq t_1$. Agora, como supomos $T(t)$ contínuo e A conexo, então $\gamma_t^+(A)$ é conexo. Logo, para todo $t \geq t_1$, ou $\gamma_t^+(A) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(F_1)$ ou $\gamma_t^+(A) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(F_2)$. Portanto ou $\omega(A) = \bigcap_{t \geq t_1} \gamma_t^+(A) \subset F_1$, ou $\omega(A) \subset F_2$, e assim, $F_1 = \emptyset$ ou $F_2 = \emptyset$. ■

Definição 2.5 Uma órbita completa $\gamma(x)$ de um ponto $x \in X$ é uma curva $x(t)$, $-\infty < t < +\infty$, satisfazendo:

- $x(t) \in X \quad \forall t \in \mathbb{R}$;
- $x(0) = x$;
- $T(\tau)x(t) = x(t + \tau) \quad \forall t \in \mathbb{R} \text{ e } \tau \in \mathbb{R}^+$.

Dizemos que $\gamma^-(x) = \{x(t), -\infty < t \leq 0\}$ é uma semi-órbita negativa de x . Assim, $\gamma(x) = \gamma^+(x) \cup \gamma^-(x)$.

Em geral, para $x \in X$ arbitrário, a órbita completa $\gamma(x)$ pode não existir, ou mesmo quando existe, pode não ser única. Porém, se A é um subconjunto invariante de X e os operadores $T(t)$ são invertíveis em A , então temos unicidade da órbita $\gamma(x)$ para cada $x \in A$ conforme o lema abaixo.

Lema 2.2 Seja A um subconjunto invariante de X . Então para todo $x \in A$ existe uma órbita completa $\gamma(x)$. Se o semigrupo $T(t)$ é pontualmente contínuo, a órbita $\gamma(x)$ é uma curva contínua em A . Se os operadores $T(t)$, $t \in \mathbb{R}^+$, são invertíveis em A , então:

- (i) por cada $x \in A$ passa uma única órbita $\gamma(x)$;
- (ii) a família de operadores $\{T(t), t \in \mathbb{R}\}$, onde $T(t) := (T(-t))^{-1}$ se $t < 0$, satisfaz a propriedade de grupo $T(t_1 + t_2) = T(t_1)T(t_2)$, $\forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}$. Se A for compacto, então $\{T(t), t \in \mathbb{R}\}$ é um grupo de operadores contínuos. Este grupo é pontualmente contínuo se $\{T(t), t \in \mathbb{R}^+\}$ for pontualmente contínuo, e é contínuo se $\{T(t), t \in \mathbb{R}^+\}$ for contínuo.

Desde que $T(1)(A) = A$, dado $x \in A$ existe uma sequência $\{x_{-k}\}_{k=1}^{\infty}$ de pontos de A satisfazendo $T(1)x_{-1} = x$ e $T(1)x_{-k-1} = x_{-k}$, $k > 0$. Unimos os pontos x_{-k-1} e x_{-k} pela curva $\{T(t)x_{-k-1}, t \in [0,1]\}$. A coleção de todas estas curvas forma $\gamma^-(x)$ e $x(t) := T(t+k+1)x_{-k-1}$, $t \in [-k-1, -k]$, $k = 0, 1, \dots$

Segue da construção de $\gamma^-(x)$ que, se o semigrupo $T(t)$ for pontualmente contínuo então $\gamma(x) = \gamma^+(x) \cup \gamma^-(x)$ é contínua.

As afirmações do lema seguem então da construção da órbita $\gamma(x)$ e da definição de $T(t)$, $t < 0$.

Definição 2.6 Dizemos que um subconjunto A de X é um atrator de pontos global (para o semigrupo $T(t)$) se A atrai cada ponto x de X . Se A atrai cada conjunto limitado $B \subset X$, então A é um atrator global.

Definição 2.7 Se existir um atrator de pontos global limitado para o semigrupo $T(t)$, então dizemos que $T(t)$ é pontualmente dissipativo. Se existir um atrator global limitado, dizemos que $T(t)$ é B -dissipativo.

Definição 2.8 Um conjunto $A \subset X$ é chamado absorvente se para todo $x \in X$ existe $t_1(x) \in \mathbb{R}^+$ tal que $T(t)x \in A$ para todo $t \geq t_1$. A é B -absorvente se para todo conjunto limitado $B \subset X$ existe $t_1(B) \in \mathbb{R}^+$, tal que $T(t)(B) \subset A$ para todo $t \geq t_1(B)$.

Teorema 2.2 Seja $T(t)$ um semigrupo de classe $\mathcal{K}$. Suponhamos que $T(t)$ ou é B -dissipativo ou é pontualmente dissipativo e limitado. Então $T(t)$ tem um atrator global minimal $\mathcal{M}$, que é compacto e invariante. Além disso $\mathcal{M}$ é conexo se X for conexo.

Prova: Se $T(t)$ é B -dissipativo e B_0 é seu atrator global limitado, então dado $\varepsilon_0 > 0$, $B_1 := \mathcal{O}_{\varepsilon_0}(B_0)$ é um conjunto B -absorvente global limitado. Neste caso

$$\mathcal{M} = \omega(B_1) = \omega(\mathcal{O}_{\varepsilon_0}(B_0)).$$

De fato, para todo conjunto limitado $B \subset X$ existe $t_B \geq 0$ tal que $T(t)(B) \subset B_1$ se $t \geq t_B$. Em particular, $T(t)(B_1) \subset B_1$ se $t \geq t_{B_1}$. Logo, $\gamma_{t_{B_1}}^+(B_1) \subset B_1$ é limitado. Pelo Teorema 2.1, $\omega(B_1)$ é um conjunto não vazio, compacto e invariante, e $\omega(B_1)$ atrai B_1 . Portanto, para todo $\varepsilon > 0$ existe $t_1(\varepsilon) \geq 0$ tal que $T(t)(B_1) \subset \mathcal{O}_{\varepsilon}(\omega(B_1))$, $t \geq t_1(\varepsilon)$, e então, dado qualquer conjunto limitado $B \subset X$,

$$T(t)(B) \subset \mathcal{O}_{\varepsilon}(\omega(B_1)), \quad \forall t \geq t_1(\varepsilon) + t_B.$$

Portanto $\omega(B_1)$ é um atrator global fechado. A minimalidade segue do fato que $\omega(B_1)$ é o menor conjunto fechado que atrai B_1 .

Suponhamos agora que $T(t)$ é um semigrupo limitado e pontualmente dissipativo. Seja B_2 um atrator de pontos global limitado. Escolhemos $\varepsilon_2 > 0$ e definimos B_3

$:= \mathcal{O}_{\varepsilon_2}(B_2)$ e $B_4 := \gamma^+(B_3)$. Então $\mathcal{M} = \omega(B_3)$. De fato, desde que B_2 é um atrator de pontos global, para todo ponto $x \in X$ existe $t_x \geq 0$ tal que $T(t_x)x \in B_3$. Como B_3 é um conjunto aberto e o operador $T(t_x)$ é contínuo, segue que $T(t_x)(\mathcal{O}_{\varepsilon_x}x) \subset B_3$ para algum $\varepsilon_x > 0$. Então

$$T(t_x + t)(\mathcal{O}_{\varepsilon_x}x) \subset T(t)(B_3) \subset B_4 \quad \forall t \geq 0.$$

Agora, dado K compacto, seja $\{\mathcal{O}_{\varepsilon_{x_i}}(x_i)\}_{i=1,2,\dots,r}$, $x_1, x_2, \dots, x_r \in K$ uma cobertura finita de K . Seja ε_K tal que $\mathcal{O}_{\varepsilon_K}(K) \subset \bigcup_{i=1}^r \mathcal{O}_{\varepsilon_{x_i}}(x_i)$ e $t_K = \max_{1 \leq i \leq r} \{t_{x_i}\} \geq 0$. Então

$$T(t)(\mathcal{O}_{\varepsilon_K}(K)) \subset B_4 \quad \forall t \geq t_K. \quad (2.3)$$

Como $T(t)$ é limitado, segue do teorema 1 que todo conjunto limitado B é atraído por $\omega(B)$. Então $T(t)(B) \subset \mathcal{O}_{\varepsilon_1}(\omega(B))$, $t \geq t_1(\varepsilon_1, B)$, $\forall \varepsilon_1 > 0$. Desde que $\omega(B)$ é compacto, podemos escolher $\varepsilon_1 = \varepsilon_{\omega(B)}$ e segue de (2.3) que

$$T(t + t_1)(B) \subset B_4, \quad t \geq t_{\omega(B)} \text{ e } t_1 = t_1(\varepsilon_1, B).$$

Portanto B_4 é um B -absorvente limitado global, e como demonstramos acima, $\omega(B_4) = \mathcal{M}$. Mas pelas definições de B_3 e B_4 , $T(t)(B_4) = \gamma_t^+(B_3)$. Também

$$\gamma_t^+(B_4) = \gamma_t^+(\gamma^+(B_3)) = \bigcup_{s \geq t} T(s)(\gamma^+(B_3)) = \gamma_t^+(B_3).$$

Logo $\omega(B_4) = \omega(B_3)$. A minimalidade de $\omega(B_3)$ segue do Teorema 2.1. Finalmente, se existe um conexo $B \supset \mathcal{M}$, então $\mathcal{M}$ é conexo, desde que $T(t)(B)$ é conexo qualquer que seja $t \in \mathbb{R}^+$, para $\varepsilon > 0$,

$$\mathcal{M} = T(t)(\mathcal{M}) \subset T(t)(B) \subset \mathcal{O}_{\varepsilon}(\mathcal{M}), \quad t \geq t_1(\varepsilon, B).$$

■

Como um corolário da prova do teorema anterior obtemos o seguinte resultado:

Proposição 3 *Se o semigrupo $T(t)$ é limitado e pontualmente dissipativo então existe um conjunto limitado B_0 tal que para todo compacto K*

$$T(t)(\mathcal{O}_{\varepsilon_K}(K)) \subset B_0 \quad \forall t \geq t_K$$

com algum $\varepsilon_K > 0$ e $t_K \geq 0$. Além disso $T(t)(B_0) \subset B_0$, $\forall t \in \mathbb{R}^+$.

Proposição 4 *Se $T(t)$ é um semigrupo de classe $\mathcal{K}$ limitado e pontualmente dissipativo ou B -dissipativo, então o atrator minimal $\mathcal{M}$ pode ser caracterizado como segue:*

- (i) $\mathcal{M} = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} \omega(B)$, onde $\mathcal{B}$ é a coleção de todos os subconjuntos limitados de X ;
- (ii) $\mathcal{M} = \bigcup_{K \in \mathcal{K}} \omega(K)$, onde $\mathcal{K}$ é a coleção de todos os subconjuntos compactos em X ;

- (iii) $\mathcal{M}$ é a união de todas as órbitas completas limitadas em X ;
- (iv) $\mathcal{M}$ é a união de todas as órbitas completas pré-compactas em X ;
- (v) $\mathcal{M}$ é o conjunto invariante maximal em X ;
- (vi) $\widehat{\mathcal{M}} = \overline{\bigcup_{x \in X} \omega(x)}$, onde $\widehat{\mathcal{M}}$ denota o atrator de pontos global fechado minimal.

Prova:

- (i) Todo conjunto limitado B é atraído para seu conjunto ω -limite $\omega(B)$. Isso é claro se $T(t)$ é limitado e, se $T(t)$ é B -dissipativo com atrator global limitado A , então

$$\gamma_\tau^+(B) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(A) \in \mathcal{B},$$

se τ for grande o suficiente. Agora, $\omega(B)$ é invariante e $\mathcal{M}$ atrai $\omega(B)$, então $\omega(B) \subset \mathcal{O}_\varepsilon(\mathcal{M})$, $\forall \varepsilon > 0$. Como $\omega(B)$ é fechado, $\omega(B) \subset \mathcal{M}$, e desde que $\mathcal{M}$ é invariante e compacto, $\omega(\mathcal{M}) = \mathcal{M}$. Então $\mathcal{M} = \omega(\mathcal{M}) \subset \bigcup_{B \in \mathcal{B}} \omega(B) \subset \mathcal{M}$.

- (ii) $\bigcup_{K \in \mathcal{K}} \omega(K) \subset \bigcup_{B \in \mathcal{B}} \omega(B) = \mathcal{M} = \omega(\mathcal{M}) \subset \bigcup_{K \in \mathcal{K}} \omega(K)$.

- (iii) e (iv) Pelo lema 2.2, por cada ponto $x \in \mathcal{M}$ passa uma órbita completa $\gamma(x)$. Qualquer tal órbita está em $\mathcal{M}$ e então é limitada e pré-compacta. Portanto $\mathcal{M}$ está contido na reunião de todas as órbitas completas limitadas em X , e $\mathcal{M}$ está contido na reunião de todas as órbitas completas pré-compactas em X . Por outro lado, Seja $\gamma(x) = \{x(t), t \in \mathbb{R}\}$ uma órbita completa limitada passando por algum $x = x_0 \in X$. Desde que $\gamma(x)$ é invariante e limitada e o semigrupo $T(t)$ é de classe $\mathcal{K}$, $\gamma(x)$ é pré-compacta. Logo, $B := \overline{\gamma(x)}$ é um conjunto compacto invariante. Portanto $\omega(B) = B$ e então $B = \omega(B) \subset \mathcal{M} = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} \omega(B)$.

- (v) Se B é um conjunto invariante limitado, então $T(t)(B) = B$ e portanto $\omega(B) = B$ e $B \subset \mathcal{M}$. Uma vez que $\mathcal{M}$ é um conjunto invariante limitado $\mathcal{M}$ é o maior conjunto invariante limitado.

- (vi) $\forall x \in X$, $\omega(x) \subset \widehat{\mathcal{M}}$, pois $\omega(x)$ é o menor fechado que atrai x . Por outro lado, $\overline{\bigcup_{x \in X} \omega(x)}$ é um atrator global fechado que contém $\widehat{\mathcal{M}}$ pelo caráter minimal de $\widehat{\mathcal{M}}$. ■

Definição 2.9 Uma função de Liapunov é uma função contínua $\mathcal{L} : X \rightarrow \mathbb{R}$ estritamente decrescente ao longo de cada $\gamma^+(x)$, exceto em pontos estacionários z , $T(t)z = z$, $\forall t \in \mathbb{R}^+$.

Teorema 2.3 *Suponhamos que o semigrupo $T(t)$ pertence à classe $\mathcal{K}$ e $\gamma^+(x)$ é limitado para todo $x \in X$. Se para este semigrupo existe uma função de Liapunov $\mathcal{L}$, então seu atrator de pontos minimal global coincide com o conjunto $\mathcal{Z} = \{z : T(t)z = z, \forall t \geq 0\}$. Se $\mathcal{Z}$ for um conjunto limitado e $T(t)$ for limitado, então o semigrupo possui um atrator global minimal $\mathcal{M}$ compacto e invariante. Se X for conexo, então $\mathcal{M}$ é. Ambos os extremos de qualquer órbita completa $\gamma(x) \subset \mathcal{M}$ tendem para $\mathcal{Z}$ quando $t \rightarrow \pm\infty$ correspondentemente. Se X é conexo e $\mathcal{Z}$ não, então $\mathcal{Z}$ está propriamente contido em $\mathcal{M}$ e o atrator $\mathcal{M}$ consiste das órbitas completas que conectam pontos de $\mathcal{Z}$.*

Prova: Se $T(t)$ é de classe $\mathcal{K}$ e $\gamma^+(x)$ é limitado para todo $x \in X$, então qualquer que seja $x \in X$ o limite $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{L}(T(t)x) \equiv \ell_+(x)$ existe e $\mathcal{L}$ restrita à $\omega(x)$ é constante e igual à $\ell_+(x)$, pois se $y \in \omega(x)$, $y = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x$ e então $\mathcal{L}(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{L}(T(t_k)x) = \ell_+(x)$. Assim, $\omega(x) \subset \mathcal{Z}$ e $\mathcal{Z}$ atrai x . Como $\mathcal{Z}$ é fechado, $\widehat{\mathcal{M}} \subset \mathcal{Z}$. Mas da definição de $\mathcal{Z}$ é claro que $\mathcal{Z} \subset \widehat{\mathcal{M}}$. Portanto $\mathcal{Z} = \widehat{\mathcal{M}}$. Se $\mathcal{Z}$ é um conjunto limitado, então o semigrupo $T(t)$ é pontualmente dissipativo e, se $T(t)$ é limitado, existe um atrator global $\mathcal{M}$, de acordo com o Teorema 2.2. Para cada $x \in \mathcal{M}$, podemos tomar uma órbita completa $\gamma(x) = \{x(t), t \in \mathbb{R}, x(0) = x\} \subset \mathcal{M}$ e definir o conjunto α -limite:

$$\alpha(\gamma(x)) := \bigcap_{\tau \geq 0} \overline{\gamma_\tau^-(x)}, \text{ onde } \gamma_\tau^-(x) := \{x(t), t \leq \tau\}.$$

Este conjunto α -limite é não vazio, invariante e $x(t) \rightarrow \alpha(\gamma(x))$ quando $t \rightarrow -\infty$. Além disso $\alpha(\gamma(x)) \subset \mathcal{Z}$ desde que

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \mathcal{L}(x(t)) = \text{constante} = \mathcal{L}|_{\alpha(\gamma(x))}.$$

Agora, se X é conexo e $\mathcal{Z}$ não, então $\mathcal{M}$, que é conexo, contém não somente pontos de $\mathcal{Z}$, mas órbitas completas conectando pontos de $\mathcal{Z}$. ■

Definição 2.10 *Dizemos que um semigrupo $T(t)$ pertence à classe $\mathcal{AK}$ se para todo conjunto limitado $B \subset X$ tal que $\gamma^+(B)$ é limitado, cada sequência da forma*

$$\{T(t_k)x_k\}_{k=1}^\infty,$$

onde $x_k \in B$ e $t_k \rightarrow +\infty$ é pré-compacta.

No que segue estaremos supondo que $T(t)$ é um semigrupo contínuo de classe $\mathcal{AK}$.

Proposição 5 *Para todo conjunto compacto K e $t \in \mathbb{R}^+$ o conjunto $\gamma_{[0,t]}^+(K)$ é pré-compacto.*

Prova: $[0, t] \times K$ é compacto, $(t, x) \rightarrow T(t)x$ é contínua. Portanto $\gamma_{[0,t]}^+(K)$ é imagem contínua de compacto. ■

Proposição 6 Se K é compacto e $\gamma^+(K)$ é pré-compacto, então $\omega(K)$ é um conjunto invariante compacto não vazio atraindo K .

Prova: Seja $K_1 := \overline{\gamma^+(K)}$.

$$T(t)(K_1) = T(t)(\overline{\gamma^+(K)}) \subset \overline{T(t)(\gamma^+(K))} = \overline{\gamma_t^+(K)} \subset \overline{\gamma^+(K)} = K_1.$$

Então temos um semigrupo $\{T(t), t \in \mathbb{R}^+, K_1\}$ de operadores contínuos $T(t)$ em K_1 . Este semigrupo é de classe $\mathcal{K}$ uma vez que K_1 é compacto. Como $\gamma^+(K)$ é limitado, pelo Teorema 2.1, $\omega(K)$ é não vazio, compacto, invariante, e atrai K . ■

Proposição 7 Seja $T(t)$ um semigrupo contínuo de classe $\mathcal{AK}$. Suponhamos que K é um conjunto compacto tal que $\gamma^+(K)$ é limitado. Então $\gamma^+(K)$ é pré-compacto e portanto $\omega(K)$ é um conjunto não vazio, compacto e invariante que atrai K .

Prova: Seja $\{y_n\}, n = 1, 2, \dots$, uma sequência arbitrária de pontos de $\gamma^+(K)$, i. e., $y_n = T(t_n)x_n$, com $x_n \in K$ e $t_n \in \mathbb{R}^+$. Se o conjunto $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ é limitado, então o conjunto $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ é pré-compacto pela Proposição 5. Se o conjunto $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ não é limitado, então nós podemos escolher uma subsequência $t_{n_j} \rightarrow \infty$ e o conjunto $\{T(t_{n_j})x_{n_j}\}_{j=1}^\infty$ é pré-compacto pois o semigrupo $T(t)$ é de classe $\mathcal{AK}$. ■

Proposição 8 Seja $T(t)$ um semigrupo contínuo de classe $\mathcal{AK}$. Suponhamos que para algum conjunto limitado $B \subset X$, $\gamma^+(B)$ é limitado. Então $\omega(B)$ é não vazio, compacto, invariante e atrai B . Além disso, $\omega(B)$ é conexo se B é conexo.

Prova: Se $x \in B$, $\gamma^+(x)$ é limitado, pois $\gamma^+(x) \subset \gamma^+(B)$. Então $\omega(x) \neq \emptyset$, e portanto $\omega(B) \neq \emptyset$. Desde que

$$\omega(B) = \bigcap_{t \geq 0} \overline{\gamma_t^+(B)} \subset \overline{\gamma^+(B)}$$

é claro que $\omega(B)$ é fechado e limitado. Agora, como os operadores $T(t)$ são contínuos, $T(t)(\omega(B)) \subset \omega(B)$, pois se $x \in \omega(B)$, então

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t_k)x_k, \text{ com } x_k \in B \text{ e } t_k \rightarrow \infty.$$

Portanto

$$T(t)x = \lim_{k \rightarrow \infty} T(t + t_k)x_k \in \omega(B).$$

Além disso

$$T(t_k)x_k = T(t)(T(t_k - t))x_k \text{ se } t_k \geq t,$$

e o conjunto $\{T(t_k - t)x_k\}_{t_k \geq t}$ é pré-compacto já que $T(t)$ é de classe $\mathcal{AK}$. Assim podemos escolher uma subsequência convergente $\{T(t_{k_j} - t)x_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ e, se $y = \lim_{j \rightarrow \infty} T(t_{k_j} - t)x_{k_j}$, $y \in \omega(B)$ e $T(t)y = \lim_{j \rightarrow \infty} T(t_{k_j})x_{k_j} = x$. Portanto $x \in$

$T(t)(\omega(B))$, logo $\omega(B) = T(t)(\omega(B))$, ou seja, $\omega(B)$ é invariante. Disto segue que cada sequência $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ com $x_k \in \omega(B)$ pode ser representada como $\{x_k = T(k)\tilde{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$ com $\tilde{x}_k \in \omega(B)$. Logo $\{x_k\}$ é pré-compacto e $\omega(B)$ é compacto.

Resta provar que $\omega(B)$ atrai B . Suponhamos que isto não ocorra. Então podemos escolher uma sequência $\{T(t_k)x_k\}_{k=1}^{\infty}$ com $x_k \in B$ e $t_k \rightarrow +\infty$ tal que

$$d(\{T(t_k)x_k\}_{k=1}^{\infty}, \omega(B)) \geq \varepsilon \quad (2.4)$$

para algum $\varepsilon > 0$. Como $T(t)$ é de classe $\mathcal{AK}$, $\{T(t_k)x_k\}_{k=1}^{\infty}$ é pré-compacto. Desde que todos os pontos limites do conjunto $\{T(t_k)x_k\}_{k=1}^{\infty}$ devem estar em $\omega(B)$, a distância entre $\omega(B)$ e $\{T(t_k)x_k\}_{k=1}^{\infty}$ é zero, o que contradiz (2.4). De forma análoga à demonstração do Teorema 2.1 mostra-se que B conexo implica $\omega(B)$ conexo. ■

Teorema 2.4 *Seja $T(t)$ um semigrupo contínuo limitado e pontualmente dissipativo de classe $\mathcal{AK}$. Então existe um atrator global minimal não vazio $\mathcal{M}$. $\mathcal{M}$ é compacto e invariante e se X é conexo $\mathcal{M}$ também é conexo.*

Prova: Pela Proposição 3 existe um conjunto limitado B_0 tal que $\forall K$ compacto, $\exists \varepsilon_K > 0$ e $\exists t_K \geq 0$ satisfazendo

$$T(t)(\mathcal{O}_{\varepsilon_K}(K)) \subset B_0 \quad \forall t \geq t_K$$

$$\text{e } T(t)(B_0) \subset B_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}^+.$$

Desde que o semigrupo $T(t)$ é limitado, $\omega(B_0)$ é não vazio, compacto, invariante, e atrai B_0 . Provemos que $\omega(B_0) = \mathcal{M}$. Se B é limitado então B é atraído pelo conjunto compacto $K := \omega(B)$. Então existe $t_{B_1} \geq 0$ talque

$$T(t)(B) \subset \mathcal{O}_{\varepsilon_K}(K) \quad \forall t \geq t_1(B)$$

$$\text{e } T(t + t_1(B)) \subset T(t)(\mathcal{O}_{\varepsilon_K}(K)) \subset B_0 \quad \forall t \geq t_K.$$

Sabemos que B_0 é atraído para $\omega(B_0)$. Então B é atraído para $\omega(B_0)$ também. De forma análoga à demonstração do Teorema 2.1, mostra-se que $\omega(B_0)$ é o menor fechado que atrai B_0 , e portanto, $\omega(B_0) = \mathcal{M}$. Se X é conexo, podemos escolher um conjunto conexo limitado $B_1 \supset B_0$. Então $\omega(B_1)$ é conexo, e além disso $\omega(B_1) = \omega(B_0)$. De fato, $\omega(B_0) \subset \omega(B_1)$ pois $\omega(B_0)$ é o menor fechado que atrai B_0 . Da mesma forma, $\omega(B_1) \subset \omega(B_0)$ já que $\omega(B_0)$ atrai B_1 . ■

Teorema 2.5 *Se $T(t)$ é um semigrupo contínuo limitado de classe $\mathcal{AK}$ e possui uma função de Liapunov $\mathcal{L} : X \rightarrow \mathbb{R}$, então todas as afirmações do Teorema 2.3 valem.*

A prova deste teorema é essencialmente a mesma do Teorema 2.3, uma vez que temos os resultados do Teorema 2.4.

Teorema 2.6 *Suponhamos que o semigrupo $T(t)$ está definido em um subconjunto $\mathcal{M}$ de um espaço de Banach X com norma $\|\cdot\|_X$. Suponhamos também que $T(t)$ pode ser decomposto na soma $W_t + U_t$, onde $\{W_t, t \in \mathbb{R}^+, \mathcal{M}\}$ é uma família de operadores tal que para todo conjunto limitado $B \in \mathcal{M}$*

$$\|W_t(B)\|_X \leq m_1(t)m_2(\|B\|_X) \quad (4)$$

onde $m_i : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ é contínua, $i = 1, 2$, $m_1(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$, e

$$\|B\|_X := \sup_{x \in B} \|x\|_X.$$

Se ainda U_t é tal que $U_t(B)$ é pré-compacto para cada conjunto limitado $B \subset \mathcal{M}$, então $T(t)$ pertence à classe $\mathcal{AK}$.

Prova: Seja B tal que $\gamma^+(B)$ é limitado. Mostraremos que cada conjunto

$$B_1 := \{T(t_k)x_k\}_{k=1}^\infty, \quad t_k \rightarrow \infty \text{ e } x_k \in B$$

pode ser coberto por um número finito de bolas de raio ε , qualquer que seja $\varepsilon > 0$. Vamos escolher ℓ grande o suficiente para que

$$m_1(\ell) \leq \varepsilon[2m_2(\|B\|_X)]^{-1}$$

e decompor B_1 na soma $B'_1 \cup B''_1$, onde

$$B'_1 = \{T(t_k)x_k\}_{k=1}^{k_1}, \quad t_k < \ell \text{ e}$$

$$B''_1 = \{T(t_k)x_k\}_{k=k_1+1}^\infty, \quad t_{k_1+1} \geq \ell.$$

B'_1 é um subconjunto do conjunto $T(\ell)(\gamma^+(B))$ e qualquer elemento de $T(\ell)(\gamma^+(B))$ tem a forma $W_\ell(x) + U_\ell(x)$, $x \in \gamma^+(B)$. O conjunto $U_\ell(\gamma^+(B))$ pode ser coberto por um número finito de bolas de raio $\varepsilon/2$ desde que é pré-compacto, e as normas dos elementos de $W_\ell(\gamma^+(B))$ são menores que $\varepsilon/2$ pela escolha de ℓ . Portanto $T(\ell)(\gamma^+(B))$ pode ser coberto por um número finito de bolas de raio ε , e como $B_1 \subset T(\ell)(\gamma^+(B))$ a menos de um número finito de pontos, o mesmo acontece com B_1 . ■

Capítulo 3

Atratores Globais

3.1 Introdução

Neste capítulo mostraremos que a equação das ondas com atrito linear, sob certas condições, dá origem a um semigrupo não linear em $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ que possui um atrator global minimal. As condições são as seguintes: condição de fronteira de Dirichlet homogênea; termo não linear satisfazendo uma condição de dissipação para garantir a existência global de soluções, limitação e ponto-dissipação, e finalmente o termo não linear deve ainda satisfazer uma condição de crescimento para garantir a existência local de soluções e compacidade assintótica.

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 provamos a existência local de soluções, na Seção 3 mostramos que o semigrupo associado à equação das ondas está globalmente definido e é limitado; por fim, na Seção 4, mostramos que o semigrupo é de classe $\mathcal{AK}$ e concluímos que este possui um atrator global.

3.2 Existência Local de Soluções

Seja $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ satisfazendo:

$$\lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{|f'(s)|}{|s|^2} = 0; \quad (3.1)$$

$$\lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{|f(s)|}{|s|^3} = 0. \quad (3.2)$$

Seja Ω um subconjunto aberto, limitado e com fronteira suave em $\mathbb{R}^3$. Defina $f^\varepsilon(u) = f \circ u$, para $u \in H_0^1(\Omega)$. Dado $\beta > 0$, consideremos o seguinte problema:

$$u_{tt} + \beta u_t = \Delta u + f(u) \quad \text{em } \Omega \subset \mathbb{R}^3 \quad (3.3)$$

com condição de fronteira

$$u(x) = 0 \text{ se } x \in \partial\Omega.$$

A equação (3.3) é equivalente ao sistema:

$$\begin{cases} u_t = v \\ v_t = -\beta u_t + \Delta u + f(u) \end{cases}$$

e este, por sua vez, escrevemos na seguinte forma abstrata:

$$w_t = \mathcal{C}w + \mathcal{F}(w) \quad (3.4)$$

onde $w = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega) = X$, $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{A} & -\beta \end{bmatrix}$, $\mathcal{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ f^\varepsilon \end{bmatrix}$, e

$$\mathcal{A} : H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$$

$$\mathcal{A}\phi = -\Delta\phi, \quad \forall \phi \in \mathbf{D}(\mathcal{A}).$$

Nesta seção vamos mostrar que para cada dado inicial $(u_0, v_0) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ existe uma solução de (3.4) $(u(t), v(t))$ definida em $\mathbb{R}^+$ e satisfazendo $(u(0), v(0)) = (u_0, v_0) = x$, e que esta solução é uma função contínua de (t, x) .

Definição 3.1 *Sejam X e Y espaços de Banach. Dizemos que uma aplicação $f : X \rightarrow Y$ é limitada se a imagem de qualquer subconjunto limitado de X por f é um subconjunto limitado de Y . Dizemos que f é compacta se a imagem de um subconjunto limitado de X por f é um subconjunto pré-compacto de Y .*

Lema 3.1 *Seja $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Se $u \in H_0^1(\Omega)$ e f satisfaz (3.2), então $f \circ u \in L^2(\Omega)$ e a aplicação*

$$f^\varepsilon : H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$$

$$f^\varepsilon(u) = f \circ u,$$

é limitada. Adicionalmente, se (3.1) está satisfeita, f^ε é Lipschitz em conjuntos limitados.

Observamos que é suficiente supor que f satisfaça a condição (3.1), uma vez que esta implica (3.2).

Prova: Seja $M > 0$ tal que $|f(u)| \leq |u|^3$ se $|u| > M$, e seja K_M tal que $|f(u)| \leq K_M$ se $|u| \leq M$. Se

$$A := \{x \in \Omega : |u(x)| \leq M\},$$

então

$$\begin{aligned} \left(\int_{\Omega} |f \circ u(x)|^2 dx \right)^{1/2} &= \left(\int_A |f \circ u(x)|^2 dx + \int_{\Omega \setminus A} |f \circ u(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq \left(\int_A K_M^2 dx + \int_{\Omega} |u(x)|^6 dx \right)^{1/2} \\ &= \left(K_M^2 \mu(A) + \|u\|_{L^6}^6 \right)^{1/2} \\ &\leq K_1 + K_2 \|u\|_{H^1}^3 < \infty, \end{aligned}$$

onde μ é a medida de Lebesgue em $\mathbb{R}^3$, e K_1 e K_2 são constantes dependendo de Ω . Com isso, se $B \subset H_0^1(\Omega)$ é limitado, e K_B é tal que qualquer $u \in B$, $\|u\|_{H^1} \leq K_B$, então

$$\|f \circ u\|_{L^2} \leq K_1 + K_2 \|u\|_{H^1}^3 \leq K_1 + K_2 K_B.$$

Portanto f^e é limitada, i.e., a imagem de um subconjunto limitado de $H_0^1(\Omega)$ por f^e é um subconjunto limitado de $L^2(\Omega)$. Além disso, Se $\widehat{M}$ é tal que $|f'(u)| \leq |u|^2$ para $|u| > \widehat{M}$ e $f'(u) \leq K_{\widehat{M}}$ se $u \in [-\widehat{M}, \widehat{M}]$, então

$$|f'(u)| \leq K_{\widehat{M}} + |u|^2 \leq K(1 + |u|^2), \quad \forall u \in \mathbb{R},$$

onde $K = \max\{1, K_{\widehat{M}}\}$. Então dados $u, v \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f(u) - f(v)| &= \left| \int_u^v f'(s) ds \right| \\ &\leq K \left| \int_u^v (1 + s^2) ds \right| \\ &= K \left| v \left(1 + \frac{v^2}{3} \right) - u \left(1 + \frac{u^2}{3} \right) \right| \\ &= K |h(u, v)| |u - v|, \end{aligned}$$

onde

$$h(u, v) = \frac{v \left(1 + \frac{v^2}{3} \right) - u \left(1 + \frac{u^2}{3} \right)}{u - v} = -\frac{1}{3}(v^2 + u^2 + uv + 3).$$

Notemos que $\|h(u, v)^2\|_{L^{3/2}} < \infty$. De fato,

$$\|h(u, v)^2\|_{L^{3/2}}^{3/2} = \int_{\Omega} \left| \frac{1}{3}(v^2(x) + u^2(x) + u(x)v(x) + 3) \right|^3 dx, \text{ e}$$

$$\begin{aligned}
(v^2 + u^2 + uv + 3)^3 &= v^6 + u^6 + 6v^4u^2 + 6v^2u^4 \\
&+ 3uv^5 + 3u^5v + 7u^3v^3 + 9v^4 \\
&+ 9u^4 + 18uv^3 + 18u^3v + 27v^2 \\
&+ 27u^2 + 27u^2v^2 + 27uv + 27.
\end{aligned}$$

Agora, todos os termos acima têm $\| \cdot \|_{L^1}$ finita pela desigualdade de Hölder e pelo fato de $H_0^1(\Omega)$ estar continuamente imerso em $L^p(\Omega)$, $p \leq 6$. Além disso, cada um destes termos é majorado por uma constante dependendo de B e de Ω , ou seja, existe C_B tal que $\|h(u, v)^2\|_{L^{3/2}} \leq C_B$. Portanto,

$$\begin{aligned}
\|f^e(u) - f^e(v)\|_{L^2}^2 &= \int_{\Omega} |f(u(x)) - f(v(x))|^2 dx \\
&\leq \int_{\Omega} |h(u(x), v(x))|^2 |u(x) - v(x)|^2 dx \\
&\leq \|h(u, v)^2\|_{L^{3/2}} \|(u - v)^2\|_{L^3} \\
&\leq C_B \|u - v\|_{L^3}^2 \\
&\leq L_B \|u - v\|_{H^1}^2,
\end{aligned}$$

onde L_B é igual à C_B vezes a constante de imersão de $H^1(\Omega)$ em $L^3(\Omega)$. Como B é um subconjunto limitado arbitrário de $H_0^1(\Omega)$, concluímos que f^e é Lipschitz em conjuntos limitados. ■

Lema 3.2 *Seja X um espaço de Hilbert e $\mathcal{A}$ um operador auto-adjunto densamente definido em X , sobrejetor, e satisfazendo*

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle \geq \delta \|x\|^2 \quad \forall x \in X,$$

para algum $\delta > 0$. Se $\mathcal{C}$ é o operador definido por

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{A} & -\beta \end{bmatrix},$$

$\mathbf{D}(\mathcal{C}) = \mathbf{D}(\mathcal{A}) \times X^{1/2} \subset X^{1/2} \times X = Y$, então $\mathcal{C}$ gera um C_0 semigrupo em Y .

Prova: Como $\overline{\mathbf{D}(\mathcal{A})}^{X^{1/2}} = \mathbf{D}(\mathcal{A}^{1/2}) = X^{1/2}$ e $\overline{X^{1/2}}^X = X$, é claro que $\overline{\mathbf{D}(\mathcal{C})} = Y$.

Pelo teorema de Lumer-Phillips, basta mostrarmos que $\mathcal{C}$ é dissipativo e existe λ_0 tal que $\mathbf{R}(\lambda_0 I + \mathcal{C}) = Y$, onde $\mathbf{R}(\lambda_0 I + \mathcal{C})$ denota a imagem de $(\lambda_0 I + \mathcal{C})$.

Notemos que $\mathcal{A}$ auto-adjunto implica $\mathcal{A}^{1/2}$ auto adjunto. De fato, $R(\lambda : -\mathcal{A}) = (\lambda I + \mathcal{A})^{-1}$ é trivialmente auto-adjunto se $\lambda \in \rho(-\mathcal{A}) \cap \mathbb{R}$. Agora,

$$\mathcal{A}^{-1/2} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty t^{-1/2} (tI + \mathcal{A})^{-1} dt.$$

Então

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A}^{-1/2} x, y \rangle &= \frac{1}{\pi} \left\langle \int_0^\infty t^{-1/2} (tI + \mathcal{A})^{-1} x dt, y \right\rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty t^{-1/2} \langle (tI + \mathcal{A})^{-1} x, y \rangle dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty t^{-1/2} \langle x, (tI + \mathcal{A})^{-1} y \rangle dt \\ &= \left\langle x, \frac{1}{\pi} \int_0^\infty t^{-1/2} (tI + \mathcal{A})^{-1} y dt \right\rangle \\ &= \langle x, \mathcal{A}^{-1/2} y \rangle. \end{aligned}$$

Portanto, $\mathcal{A}^{-1/2}$ é auto-adjunto, e consequentemente $\mathcal{A}^{1/2}$ é auto-adjunto.

Y é um espaço de Hilbert com o produto interno

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle_{X^{1/2}} + \langle x_2, y_2 \rangle_{L^2}, \quad \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in Y = X^{1/2} \times X$$

e se

$$x, y \in X^{1/2}, \quad \langle x, y \rangle_{X^{1/2}} = \langle \mathcal{A}^{1/2} x, \mathcal{A}^{1/2} y \rangle_{L^2}.$$

A norma em Y proveniente do produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é denotada por $\| \cdot \|$. Se $y \in Y$, $\|y\| = 1$, desde que Y é Hilbert e então uniformemente convexo, o conjunto

$$F(y) := \{y^*; y^* \in Y^* \text{ e } \langle y, y^* \rangle = \|y\|^2 = \|y^*\|^2\}$$

é unitário, ou seja,

$$F(y) = \{\langle \cdot, y \rangle\}.$$

Então se $x \in \mathbf{D}(\mathcal{C}) = \mathbf{D}(\mathcal{A}) \times X^{1/2}$, $x = (x_1, x_2)$,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{C}x, x \rangle &= \langle x_1, x_2 \rangle_{X^{1/2}} - \langle \mathcal{A}x_1, x_2 \rangle_{L^2} - \beta \langle x_2, x_2 \rangle_{L^2} \\ &= \langle \mathcal{A}^{1/2} x_1, \mathcal{A}^{1/2} x_2 \rangle_{L^2} - \langle \mathcal{A}x_1, x_2 \rangle_{L^2} - \beta \langle x_2, x_2 \rangle_{L^2} \\ &= \langle \mathcal{A}x_1, x_2 \rangle_{L^2} - \langle \mathcal{A}x_1, x_2 \rangle_{L^2} - \beta \langle x_2, x_2 \rangle_{L^2} \\ &= -\beta \|x_2\|_{L^2}^2 \leq 0. \end{aligned}$$

Portanto $\mathcal{C}$ é dissipativo. Além disso, seja $(y_1, y_2) \in Y = X^{1/2} \times X$ e seja λ_0 tal

que $\lambda = \lambda_0^2 + \lambda_0\beta \in \rho(-\mathcal{A})$. Então $(\lambda I + \mathcal{A})^{-1} \in L(X)$. Logo existe $x_1 \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$ tal que

$$(\lambda I + \mathcal{A})x_1 = (\lambda_0 + \beta)y_1 + y_2.$$

Então

$$\lambda_0^2 x_1 + \lambda_0 \beta x_1 + \mathcal{A}x_1 - \lambda_0 y_1 - \beta y_1 = y_2.$$

Se $x_2 = \lambda_0 x_1 - y_1$,

$$(\lambda_0 I - \mathcal{C})(x_1, x_2) = (\lambda_0 x_1 - x_2, (\lambda_0 + \beta)x_2 + \mathcal{A}x_1) = (y_1, y_2).$$

Portanto $(\lambda_0 I + \mathcal{C})$ é sobrejetor e o resultado segue. ■

Com isso, pelo Teorema 1.14 e o Corolário 1.3 temos que o operador

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{A} & -\beta \end{bmatrix},$$

$\mathbf{D}(\mathcal{C}) = H^2 \cap H_0^1 \times H_0^1 \subset H_0^1 \times L^2 = Y$, onde $\mathcal{A}$ é o operador

$$\mathcal{A} : H^2 \cap H_0^1 \rightarrow L^2$$

$$(\mathcal{A}u)x = -(\Delta u)x$$

gera um C_0 semigrupo em Y . Agora, como f^e é Lipschitz em conjuntos limitados, é claro que o mesmo ocorre com $\mathcal{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ f^e \end{bmatrix}$.

Assim, pelo Teorema 1.5, para cada valor inicial $w_0 = (u_0, v_0) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ o p.v.i.

$$\begin{cases} w_t &= \mathcal{C}w + \mathcal{F}(w) \\ w(0) &= w_0 \end{cases}$$

tem uma única solução fraca $w(t)$ cujo intervalo maximal $[0, t_{\max})$ de definição é finito somente se

$$\lim_{t \rightarrow t_{\max}} \|w(t)\| = \infty.$$

Se ainda $(u_0, v_0) \in \mathbf{D}(\mathcal{C})$, pelo Teorema 1.7 $w(t)$ é solução forte deste p.v.i.. Além disso, as soluções dependem continuamente dos dados iniciais.

Suponhamos que

$$t_{\max} = \infty, \forall (u_0, v_0) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega).$$

Então a família de operadores $T(t) : H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, $t \in \mathbb{R}^+$

$$T(t) \begin{bmatrix} u_0 \\ v_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = e^{\mathcal{C}t} \begin{bmatrix} u_0 \\ v_0 \end{bmatrix} + \int_0^t e^{\mathcal{C}(t-s)} \mathcal{F} \begin{bmatrix} u(s) \\ v(s) \end{bmatrix} ds \quad (3.5)$$

define semigrupo em $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$. Mostraremos a seguir que existe uma função de Liapunov associada a $T(t)$.

3.3 Existência Global e Limitação

Nesta seção mostramos que (3.4) define um semigrupo limitado de operadores. Isto é obtido utilizando-se uma função de Liapunov apropriada.

Lema 3.3 *Seja $\mathcal{L} : H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:*

$$\mathcal{L}(\phi, \psi) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla \phi(x)|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \psi^2(x) dx - \int_{\Omega} F(u(x)) dx$$

onde

$$F(u) = \int_0^u f(s) ds$$

e f satisfaz (3.2) e a condição de dissipação :

$$\overline{\lim}_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f(u)}{u} \leq -\delta < 0.$$

Então $\mathcal{L}$ é uma função de Liapunov para o semigrupo $T(t)$ definido acima.

Prova: Seja B um subconjunto limitado de $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, e sejam $(\phi_1, \psi_1), (\phi_2, \psi_2) \in B$. Existem constantes C_1 e C_2 satisfazendo:

$$|\mathcal{L}(\phi_1, \psi_1) - \mathcal{L}(\phi_2, \psi_2)| \leq C_1 \|\phi_1 - \phi_2\|_{H_0^1} + C_2 \|\psi_1 - \psi_2\|_{L^2}.$$

Para mostrarmos isto basta observarmos que se ϕ_1 e ϕ_2 pertencem a um subconjunto B_1 de $H_0^1(\Omega)$, B_1 limitado, então existe uma constante L_{B_1} satisfazendo:

$$\left| \int_{\Omega} F(\phi_1(x)) dx - \int_{\Omega} F(\phi_2(x)) dx \right| \leq L_{B_1} \|\phi_1 - \phi_2\|_{H_0^1}. \quad (3.6)$$

Isso realmente ocorre, pois

$$\begin{aligned} |F(\phi_1) - F(\phi_2)| &= \left| \int_{\phi_1}^{\phi_2} f(s) ds \right| \leq K \left| \int_{\phi_1}^{\phi_2} (|s|^4 + 1) ds \right| \\ &\leq K \left| \phi_2 - \phi_1 + \frac{\phi_2^5}{5} - \frac{\phi_1^5}{5} \right| = K h(\phi_1, \phi_2) |\phi_1 - \phi_2|, \end{aligned}$$

onde $h(\phi_1, \phi_2)$ é um polinômio de grau 4 em ϕ_1, ϕ_2 .

Com isso,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} F(\phi_1) - F(\phi_2) \right| &\leq \int_{\Omega} |h(\phi_1, \phi_2)| |\phi_1 - \phi_2| \\ &\leq \|h(\phi_1, \phi_2)\|_{L^{6/5}} \|\phi_1 - \phi_2\|_{L^6} \\ &\leq \|h(\phi_1, \phi_2)\|_{L^{6/5}} \|\phi_1 - \phi_2\|_{H_0^1}. \end{aligned}$$

Agora se $\phi_1, \phi_2 \in B_1 \subset H_0^1(\Omega)$, B_1 limitado, então existe uma constante L_{B_1} satisfazendo (3.6) pois

$$\|h(\phi_1, \phi_2)\|_{L^{6/5}} \leq \sum_{i=0}^4 c_i \|\phi_1^i \phi_2^{4-i}\|_{L^{6/5}} + C$$

e cada um dos termos acima tem norma $\|\cdot\|_{L^1}$ finita e majorada por uma constante dependendo de B_1 e de Ω , pela desigualdade de Hölder e pelo fato de $H^1(\Omega)$ estar continuamente imerso em $L^p(\Omega)$, $p \leq 6$.

Logo temos

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}(\phi_1, \psi_1) - \mathcal{L}(\phi_2, \psi_2)| &\leq \left| \frac{1}{2} [\|\phi_1\|_{H_0^1}^2 - \|\phi_2\|_{H_0^1}^2] \right| \\ &+ \left| \frac{1}{2} [\|\psi_1\|_{H_0^1}^2 - \|\psi_2\|_{H_0^1}^2] \right| \\ &+ \left| \int_{\Omega} |F(\phi_1) - F(\phi_2)| \right| \\ &\leq C_1 \|\phi_1 - \phi_2\|_{H_0^1} + C_2 \|\psi_1 - \psi_2\|_{H_0^1}, \end{aligned}$$

ou seja, $\mathcal{L}$ é Lipschitz em conjuntos limitados, logo $\mathcal{L}$ é contínua.

$\mathcal{L}$ é diferenciável quase sempre ao longo de soluções. De fato, se $(u_0, v_0) \in D(\mathcal{C})$ temos que

$$u_{tt} + \beta u_t = \Delta u + f(u) \text{ quase sempre em } (0, t_{\max}) \times \Omega,$$

$$u = 0 \text{ em } \partial\Omega,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(u, u_t) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\Omega} u_t^2(x) dx - \int_{\Omega} F(u)(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \langle -\Delta u, u \rangle + \frac{1}{2} \langle u_t, u_t \rangle - \langle F(u), 1 \rangle, \end{aligned}$$

e então

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathcal{L}(u, u_t) &= \langle -\Delta u, u_t \rangle + \langle u_{tt}, u_t \rangle - \langle f(u), u_t \rangle \\ &= \langle -\Delta u + u_{tt} - f(u), u_t \rangle \\ &= \langle -\beta u_t, u_t \rangle = -\beta \|u_t\|^2. \end{aligned}$$

Então se $(u_0, v_0) \in \mathbf{D}(\mathcal{C}) = (H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)) \times H_0^1(\Omega)$,

$$\mathcal{L}(T(t_1)(u_0, v_0)) \leq \mathcal{L}(T(t_2)(u_0, v_0)), \quad t_1 \geq t_2.$$

Como $\mathbf{D}(\mathcal{C})$ é denso em $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ é claro que $\mathcal{L}$ decresce ao longo de cada órbita e portanto $\mathcal{L}$ é uma função de Liapunov para o semigrupo $T(t)$. ■

Notemos que

$$\lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{|F(s)|}{|s|^4} = 0.$$

De fato dado $\varepsilon > 0$, existe uma constante c_ε tal que

$$\begin{aligned} \lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{|F(s)|}{|s|^4} &\leq \lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{1}{s^4} \int_0^s |f(t)| dt \\ &\leq \lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{1}{s^4} \int_0^s (\varepsilon t^3 + c_\varepsilon) dt \\ &= \lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{1}{s^4} \left(\frac{\varepsilon s^4}{4} + c_\varepsilon s \right) \\ &= \lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon}{4} + \frac{c_\varepsilon}{s^3} = \frac{\varepsilon}{4}, \end{aligned}$$

se $s > 0$, e analogamente se $s < 0$. Portanto, como Ω é limitado, existe uma constante c satisfazendo:

$$|F(u)| \leq c(|u|^4 + 1) \quad \text{e} \quad \int_{\Omega} |F(u)| \leq c \int_{\Omega} |u|^4 + c|\Omega| < \infty,$$

onde $|\Omega|$ denota o volume de Ω . Então

$$\left| \int_{\Omega} F(\phi)(x) dx \right| \leq c \|\phi\|_{L^4}^4 + c|\Omega| \leq \tilde{c} \|\phi\|_{H_0^1}^4 + c|\Omega|.$$

Logo

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}(\phi, \psi)| &\leq \frac{1}{2} \|\phi\|_{H_0^1}^2 + \frac{1}{2} \|\psi\|_{L^2}^2 + \left| \int_{\Omega} F(\phi)(x) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\phi\|_{H_0^1}^2 + \frac{1}{2} \|\psi\|_{L^2}^2 + \tilde{c} \|\phi\|_{H_0^1}^4 + c|\Omega|. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\overline{\lim}_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f(u)}{u} < -\delta \quad \Rightarrow \quad \overline{\lim}_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f(u) + \delta u}{u} \leq 0.$$

Então existe $M_\varepsilon = M$ tal que $\frac{f(u) + \delta u}{u} \leq \varepsilon$ se $|u| \geq M$, e

$$\frac{f(u) + \delta u}{u} \leq \varepsilon \quad \text{e} \quad \left[\frac{f(u) + \delta u}{u} - 2\varepsilon \right] \leq -\varepsilon.$$

Logo,

$$\int_0^u f(s)ds + \frac{\delta u^2}{2} - \varepsilon u^2 = \int_0^u \left[\frac{f(s) + \delta s}{s} - 2\varepsilon \right] s ds \leq \int_0^M \left[\frac{f(s) + \delta s}{s} - 2\varepsilon \right] s ds \leq K_\varepsilon,$$

onde K_ε é uma constante dependendo de ε .

Analogamente, se $u > 0$, $u \leq -M$,

$$\left[\frac{f(u) + \delta u}{u} - 2\varepsilon \right] \leq -\varepsilon \quad \text{e}$$

$$\int_0^u \left[\frac{f(s) + \delta s}{s} - 2\varepsilon \right] s ds \leq \int_0^{-M} \left[\frac{f(s) + \delta s}{s} - 2\varepsilon \right] s ds \leq \widehat{K}_\varepsilon.$$

Se $C_\varepsilon = \max\{K_\varepsilon, \widehat{K}_\varepsilon\}$ temos

$$\int_0^u f(s)ds + \frac{\delta u^2}{2} - \varepsilon u^2 \leq C_\varepsilon, \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

Logo,

$$F(u) \leq C_\varepsilon + \varepsilon u^2 - \frac{\delta u^2}{2} \leq C_\varepsilon + \varepsilon u^2.$$

Então

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\phi, \psi) &\geq \frac{1}{2} \|\phi\|_{H_0^1}^2 + \frac{1}{2} \|\psi\|_{L^2}^2 - \int_\Omega |F(\phi)(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{2} \|\phi\|_{H_0^1}^2 + \frac{1}{2} \|\psi\|_{L^2}^2 - \varepsilon \|\phi\|_{L^2}^2 - C_\varepsilon |\Omega| \\ &\geq C_1 (\|\phi\|_{H_0^1}^2 + \|\psi\|_{L^2}^2) - C_2, \end{aligned}$$

onde C_1 e C_2 dependem de ε e de Ω . Portanto

$$C_1 \|(\phi, \psi)\| - C_2 \leq \mathcal{L}(\phi, \psi) \leq \frac{1}{2} \|\phi\|_{H_0^1}^2 + \frac{1}{2} \|\psi\|_{L^2}^2 + \tilde{c} \|\phi\|_{H_0^1}^4 + c |\Omega|.$$

Desde que $\mathcal{L}$ decresce ao longo de soluções ,

$$\mathcal{L}(T(t)(\phi, \psi)) \leq \mathcal{L}(\phi, \psi), \quad \forall (\phi, \psi) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega).$$

Concluimos que $T(t)$ é um semigrupo limitado, pois se B é um subconjunto limitado de $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, e K_B é um limitante superior de $\|\phi\|_{H_0^1}$, $\|\psi\|_{L^2}$, $(\phi, \psi) \in B$, então:

$$C_1 \|T(t)(\phi, \psi)\| - C_2 \leq \mathcal{L}(T(t)(\phi, \psi)) \leq \mathcal{L}(\phi, \psi) \leq C_B,$$

onde $C_B = \frac{1}{2} K_B^2 + \frac{1}{2} K_B^2 + \tilde{c} K_B^4 + c |\Omega|$.

Com isso, é claro que, para cada $(u_0, v_0) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, a solução fraca de

$$\begin{cases} w_t &= \mathcal{C}w + \mathcal{F}(w) \\ w(0) &= (u_0, v_0) \end{cases}$$

está globalmente definida, pois como já observamos, o intervalo maximal $[0, t_{\max})$ de definição da solução $w(t)$ do p.v.i. acima é finito somente se

$$\lim_{t \rightarrow t_{\max}} \|w(t)\| = \infty.$$

o que não é possível uma vez que $T(t)$ é limitado. Portanto o semigrupo $T(t)$ está bem definido.

3.4 Compacidade Assintótica e Existência de Atratores Globais

Nesta seção mostramos que o semigrupo associado a (3.4) é de classe $\mathcal{AK}$ o que juntamente com os resultados da Seção 3 implicam a existência de um atrator global para o semigrupo associado a (3.4).

Lema 3.4 *Se f satisfaz as condições (3.2) e (3.1) e $f^\varepsilon : H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ é dada por $f^\varepsilon(u) = f \circ u$, então f^ε é compacta.*

Prova: Para mostrarmos que f^ε é compacta, notamos que por (3.1), dado $\varepsilon > 0 \exists M_\varepsilon$ tal que se $|u| \geq M_\varepsilon$ então $|f(u)| \leq \varepsilon|u|^3$. Então

$$f(u) = \varepsilon g_\varepsilon(u) + h_\varepsilon(u),$$

onde

$$|g_\varepsilon(u)| \leq |u|^3,$$

e $h_\varepsilon(u)$ tem suporte compacto. Se $B \subset H_0^1(\Omega)$ e $v \in f^\varepsilon(B)$, então $v(x) = f^\varepsilon(u)(x) = f \circ u(x)$, $u \in B$ e

$$v(x) = f \circ u(x) = (\varepsilon g_\varepsilon + h_\varepsilon) \circ u(x) = \varepsilon g_\varepsilon \circ u(x) + h_\varepsilon \circ u(x) = \varepsilon g_\varepsilon^\varepsilon(u)(x) + h_\varepsilon^\varepsilon(u)(x).$$

Logo $f^\varepsilon(B) \subset \varepsilon g_\varepsilon^\varepsilon(B) + h_\varepsilon^\varepsilon(B)$. Se ainda supomos que as normas dos elementos de B são limitadas por K_B , então $\forall \varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \|g_\varepsilon^\varepsilon(u)\|_{L^2}^2 &= \int_\Omega |g_\varepsilon^\varepsilon(u)(x)|^2 dx = \int_\Omega |g_\varepsilon \circ u(x)|^2 dx \\ &\leq \int_\Omega |u(x)|^6 dx = \|u\|_{L^6}^6 \leq C_\Omega \|u\|_{H_0^1}^6 \leq C_\Omega K_B^6 = C_B, \end{aligned} \quad (3.7)$$

e C_B é uma constante que só depende de Ω e de B . É importante notar que C_B não depende de ε . Agora, se $u \in H^1(\Omega)$, $h_\varepsilon'(u) \in L^\infty(\Omega)$ pela definição de h_ε , e $\nabla u \in L^2(\Omega)$, logo

$$\begin{aligned} \int_\Omega |\nabla h_\varepsilon^\varepsilon(u)(x)|^2 dx &= \int_\Omega |h_\varepsilon'(u)(x) \nabla u(x)|^2 dx \\ &\leq \|h_\varepsilon'(u)\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^2}, \end{aligned}$$

ou seja, $\|\nabla h_\varepsilon^\varepsilon(u)\|_{L^2}$ é finita, e ainda mais, a imagem de um conjunto limitado $B \subset H^1(\Omega)$ por $h_\varepsilon^\varepsilon$ é ainda um subconjunto limitado de $H^1(\Omega)$. Como $H^1(\Omega)$ está compactamente imerso em $L^2(\Omega)$, então $h_\varepsilon^\varepsilon(B)$ é pré-compacto em $L^2(\Omega)$.

Assim, dado $\delta > 0$, seja ε tal que $\varepsilon C_B = \delta/3$, C_B como em (3.7). Podemos cobrir $h_\varepsilon^\varepsilon(B)$ por um número finito de bolas de raio $\delta/3$ e centro $x_i = h_\varepsilon^\varepsilon u_i$, $u_i \in B$, $i = 1, 2, \dots, r$. Seja $y_i = \varepsilon g_\varepsilon^\varepsilon u_i$ e $w_i = x_i + y_i \in f^\varepsilon(B)$, $i = 1, 2, \dots, r$.

$$\begin{aligned} \|f^\varepsilon(u) - w_i\|_{L^2} &= \|\varepsilon g_\varepsilon^\varepsilon(u) + h_\varepsilon^\varepsilon(u) - x_i - y_i\|_{L^2} \\ &\leq \|\varepsilon g_\varepsilon^\varepsilon(u)\|_{L^2} + \|h_\varepsilon^\varepsilon(u) - x_i\|_{L^2} + \|y_i\|_{L^2} \\ &\leq \frac{\delta}{3} + \frac{\delta}{3} + \frac{\delta}{3} = \delta, \end{aligned}$$

para algum i , $1 \leq i \leq r$. Portanto, f^ε é compacta. ■

Teorema 3.1 *O semigrupo $T(t)$ definido em (3.5) é de classe $\mathcal{AK}$.*

Prova: Seja $U_t = e^{Ct}$ e $W_t = \int_0^t e^{C(t-s)} \mathcal{F}$.

W_t é compacta desde que $\mathcal{F}$ é compacta.

Agora, consideremos a equação (3.3) com $f^e = 0$,

$$\phi_{tt} = \Delta\phi - \beta\phi_t,$$

que é equivalente à

$$\begin{cases} \phi_t &= \psi \\ \psi_t &= \Delta\phi - \beta\phi_t \end{cases}$$

e na forma abstrata

$$w_t = \mathcal{C}w,$$

onde $\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{A} & -\beta \end{pmatrix}$.

Pelos Teoremas 1.5 e 1.7 para cada dado inicial $w_0 = (u_0, v_0) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, o p.v.i.

$$\begin{cases} w_t &= \mathcal{C}w & t \geq 0 \\ w(0) &= (u_0, v_0) \end{cases} \quad (3.8)$$

tem uma única solução fraca $w(t)$, e se $w_0 \in \mathbf{D}(\mathcal{C})$, a solução $w(t)$ é forte.

Seja

$$\mathbf{L}(\phi, \psi) = \frac{1}{2} \int |\nabla\phi|^2 + \frac{1}{2} \int \psi^2 + \frac{\delta}{2} \int \phi\psi.$$

Então se ϕ satisfaz $\phi_{tt} = \Delta\phi - \beta\phi_t$,

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{L}}{dt}(\phi, \phi_t) &= \int_{\Omega} \mathcal{A}\phi\phi_t + \frac{\delta}{2} \int_{\Omega} (\phi_t\phi_t + \phi\phi_{tt}) + \int_{\Omega} \phi_t\phi_{tt} \\ &= -\beta \int_{\Omega} \phi_t^2 + \frac{\delta}{2} \int_{\Omega} \phi_t^2 + \frac{\delta}{2} \int_{\Omega} \phi\phi_{tt} \\ &= \left(-\beta + \frac{\delta}{2}\right) \int_{\Omega} \phi_t^2 + \frac{\delta}{2} \int_{\Omega} \phi(-\beta\phi_t + \Delta\phi) \\ &= \left(-\beta + \frac{\delta}{2}\right) \int_{\Omega} \phi_t^2 - \frac{\delta}{2} \int_{\Omega} |\nabla\phi|^2 - \frac{\beta\delta}{2} \int_{\Omega} \phi\phi_t \\ &= (-2\beta + \delta) \frac{1}{2} \int_{\Omega} \phi_t^2 - \frac{\delta}{2} \int_{\Omega} |\nabla\phi|^2 - \frac{\beta\delta}{2} \int_{\Omega} \phi\phi_t \\ &\leq -K\mathbf{L}(\phi, \phi_t) \end{aligned}$$

onde $K = \min\{(2\beta - \delta), \delta, \beta\}$. Com isso

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}(\phi, \phi_t) \leq -K\mathbf{L}(\phi, \phi_t)$$

e

$$\mathbf{L}(e^{Ct}(u_0, v_0)) \leq e^{-Kt},$$

sempre que $(u_0, v_0) \in \mathbf{D}(\mathcal{C})$. Segue por densidade que a desigualdade acima também vale em $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$.

Para concluir que o semigrupo gerado por $\mathcal{C}$ decai exponencialmente basta mostrarmos que $\mathbf{L}$ é uma norma equivalente à norma de $H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$, o que segue trivialmente da desigualdade de Hölder para δ suficientemente pequeno. ■

Para concluir que existe um atrator global para o problema (3.4) falta apenas mostrar que o conjunto dos pontos de equilíbrio de $T(t)$ é limitado. De fato, se (u_0, v_0) é ponto de equilíbrio de $T(t)$, temos que $v_0 = 0$ e

$$-\mathcal{A}u + f^e(u) = 0$$

$$u(\Delta u + f(u)) = 0 \quad \text{e} \quad \int_{\Omega} |\nabla u|^2 = \int_{\Omega} f(u) u.$$

Como $\overline{\lim}_{|u| \rightarrow \infty} \frac{f(u)}{u} \leq -\delta$, $\frac{f(u)}{u} \leq -\frac{\delta}{2}$, se $|u| \geq M$ para algum M .
Então

$$\begin{aligned} \frac{u^2 f(u)}{u} &\leq -\frac{\delta}{2}|u|^2 \quad |u| \geq M \\ \Rightarrow u f(u) &\leq -\frac{\delta}{2}|u|^2 \quad |u| \geq M \\ \Rightarrow u f(u) &\leq -\frac{\delta}{2}|u|^2 + \hat{C}_{\delta} \leq \hat{C}_{\delta} \quad \forall u \in \mathbb{R}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

onde $\hat{C}_{\delta}$ é tal que $u f(u) \leq \hat{C}_{\delta}$ se $|u| \leq M$. Segue que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 &= \int_{\Omega} f(u) u \leq \tilde{C}_{\delta} |\Omega| := C_{\delta}^2 \quad \text{e} \\ \|u\|_{X^{1/2}} &\leq C_{\delta}, \end{aligned} \tag{3.10}$$

ou seja, o conjunto dos pontos de equilíbrio é limitado.

Portanto, o problema (3.4) define um semigrupo $T(t)$ contínuo, limitado, de classe $\mathcal{AK}$ que possui uma função de Liapunov $\mathcal{L}$, e além disso, o conjunto $\mathcal{Z} = \{z : T(t)z = z \quad \forall t \geq 0\}$ é limitado. Logo, pelo Teorema 2.5, $T(t)$ possui um atrator global compacto, e todas as afirmações do Teorema 2.3 valem.

Bibliografia

- [1] J. ARRIETA, A. N. CARVALHO, J. K. HALE *A Damped Hyperbolic Equation whit Critical Exponent*, Commun. in Partial Differential Equations, 17(5& 6), 841-866, [1992].
- [2] H. BRÉZIS *Análisis Funcional Teoría y Aplicaciones*, Alianza Editorial, S. A., Madrid, [1984].
- [3] J. K. HALE *Asymptotic Behavior of Dissipative Systems*, Math. Surveys and Monographs 25, Am. Math. Soc., [1988], Providence, RI.
- [4] D. HENRY *Evolution Equations in Banach Spaces*, Notas não publicadas, IME, USP, [1981], São Paulo, SP.
- [5] O. LADYZHENSKAYA *Attractors for Semigroups and Evolution Equations*, Cambridge University Press, [1991].
- [6] A. PAZY *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*, Applied Mathematical Sciences 44, Springer-Verlag, [1983].