I.C.M.S.C.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS DE SÃO CARLOS

TEOREMA DE ROHLIN:
GENERALIZAÇÃO E APLICAÇÕES

EDSON DE OLIVEIRA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SÃO CARLOS - SÃO PAULO
BRASIL

TEOREMA DE ROHLIN:
GENERALIZAÇÃO E APLICAÇÕES

EDSON DE OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS DE SÃO CARLOS
DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, PARA OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE
"MESTRE EM MATEMÁTICA"

ORIENTADOR: Prof. Dr. JANEY ANTONIO DACCACH

São Carlos
-1978-

Class. -	<u>T</u>
Cut. -	<u>0485</u>
	<u>2-2</u>
Tombo -	<u></u>

TEOREMA DE ROHLIN: GENERALIZAÇÃO E APLICAÇÕES

EDSON DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ORIENTADOR: PROF. DR. JANEY ANTONIO DACCACH
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A

MÁRCIA,

MELISSA

E A MEUS

PAIS

AGRADECIMENTOS

Ao nosso orientador e amigo Professor Dr. Janey Antonio Daccach, pela confiança em mim depositada e pela orientação neste trabalho.

Aos Professores Alice Kimie Miwa Libardi, Pedro Luiz Queiroz Pergher e Nelio Baldin pelo apoio amigo e pelos vários seminários realizados.

Aos Professores e colegas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, pelo incentivo constante nesta primeira etapa.

Este trabalho dependeu parcialmente de auxílios das seguintes entidades: CAPES, CNPq, FAPESP e FINEP.

Theorem of Rohlin: Generalization and Applications

Edson de Oliveira

Adviser: Janey Antonio Daccach

The object of this work is to prove the following Theorem of Rohlin: "Let M^4 be a compact oriented differentiable 4-manifold with Stiefel-Whitney class w_2 equal to zero. Then the signature $I(M^4)$ is congruent to zero modulo 16", and also, the Theorem of Kervaire and Milnor: "Let M^4 be a compact oriented differentiable 4-manifold. Let $\xi \in H^2(M, \mathbb{Z})$ be dual to the Stiefel-Whitney classe $w_2(M)$. If ξ is represented by a differentiably imbedded 2-sphere in M then, the self-intersection number $\xi \cdot \xi$ must be congruent to $I(M)$ modulo 16".

Applications and examples is shown in the last chapter of this work.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

§1. Fibrados Vetoriais	1
§2. Produtos: Cup e Cap	2
§3. Classes de Stiefel-Whitney	4
§4. Fibrado de Hopf	6
§5. Cobordismo	7
§6. Fibrados Orientados e o Isomorfismo de Thom	8
§7. Classe de Euler	10
§8. Fibrados de Stiefel	12
§9. Obstrução e Classes de Chern	13
§10. Classes de Pontrjagin	15
§11. O isomorfismo de Hurewicz	16
§12. Dualidade de Poincaré e de Lefschetz	17
§13. Classificação de Fibrados	18

CAPÍTULO 2

§1. Índice de uma Variedade	19
§2. Espaços de Eilenberg-MacLane	21
§3. Representação de $\pi_n H^2(M, \mathbb{Z})$ por uma subvariedade	25

CAPÍTULO 3

§1. Teorema de Rohlin	28
§2. Teorema de Kervaire e Milnor	52

CAPÍTULO 4

§1. Sequência Multiplicativa 57

§2. Exemplos de Subvariedades que satisfazem
o Teorema de Rohlin 68

§3. Aplicações do Teorema de Kervaire e Mil-
nor 71

BIBLIOGRAFIA 74

INTRODUÇÃO

Em 1952, Rohlin demonstrou o seguinte teorema: "Se M é uma variedade diferenciável compacta e orientada de dimensão 4, com classe de Stiefel-Whitney $w_2(M) = 0$, então o índice de M é congruente a zero módulo 16".

Em 1958, Kervaire e Milnor apresentaram a demonstração desse teorema no artigo "Bernoulli Numbers, homotopy groups and a theorem of Rohlin".

Posteriormente, em 1961, eles apresentaram no artigo "On 2-spheres in 4-manifolds", a seguinte versão generalizada do teorema demonstrado por Rohlin: "Seja M uma variedade diferenciável compacta e orientada de dimensão 4 e, suponhamos $\xi \in H^2(M, \mathbb{Z})$ dual à classe de Stiefel-Whitney $w_2(M)$. Se ξ é representada por um mergulho diferenciável da esfera S^2 em M , então o número de intersecções $\xi \cdot \xi$ deve ser congruente ao índice de M módulo 16".

O objetivo desta dissertação é detalhar, na medida do possível, os artigos de Kervaire e Milnor. A compreensão dos mesmos não é fácil e envolvem o estudo de diversos outros trabalhos.

No capítulo 1 do nosso trabalho, estão os pré-requisitos necessários para a leitura do mesmo.

No capítulo 2, apresentamos a definição do índice de uma variedade e algumas de suas propriedades; a definição

e a construção dos espaços de Eilenberg-MacLane e a representação de uma classe $\eta \in H^2(M, \mathbb{Z})$, por uma subvariedade.

O capítulo 3 trata da demonstração do teorema de Rohlin e do teorema de Kervaire e Milnor.

No capítulo 4, encontram-se exemplos de variedades que satisfazem o teorema de Rohlin e algumas aplicações do teorema de Kervaire e Milnor.

CAPÍTULO 1

Neste capítulo foram colocadas noções preliminares e notações que serão utilizadas nos demais capítulos.

§1. Fibrados Vetoriais

1.1. Variedades Diferenciáveis:

A palavra variedade diferenciável indica diferenciável de classe C^∞ .

Uma função entre duas variedades diferenciáveis será suposta diferenciável de classe C^∞ .

O bordo de uma variedade diferenciável M , com bordo, será denotado por ∂M .

O fibrado tangente de uma variedade diferenciável M será denotado por τ_M .

1.2. Fibrado Normal de uma Imersão:

Dada uma imersão $f: M \rightarrow N$ é possível construir um fibrado vetorial ν_f sobre M , chamado fibrado normal da imersão f e, cujo espaço total também será denotado por ν_f , com a seguinte propriedade:

$$\tau_N \oplus \nu_f \cong f^*(\tau_N)$$

onde $f^*(\tau_N)$ denota o fibrado induzido através de f pelo fi

brado tangente de N .

1.3. Teorema:

Se $f: M^n \rightarrow N^n$ é transversal a N'^k , então $f^{-1}(N'^k)$ é uma subvariedade diferenciável de M de dimensão $m-(n-k)$. Além disso, o fibrado normal de $f^{-1}(N')$ em M é induzido do fibrado normal de N' em N ((13), pag 23, apêndice 2).

§2. Produtos: Cup e Cap

1.4. Definição do Produto Cup:

Dadas as cocadeias $a \in C^p(X)$ e $b \in C^q(X)$, o produto cup $a.b = a \cup b \in C^{p+q}(X)$ é definido como segue:

Seja $\sigma: \Delta_{p+q} \rightarrow X$ um simplexo singular. Consideremos as composições $\sigma \circ F_p: \Delta_p \rightarrow X$ onde

$$F_p(t_0, t_1, \dots, t_p) = (t_0, t_1, \dots, t_p, 0, \dots, 0) \quad e$$

$$\sigma \circ B_q: \Delta_q \rightarrow X \quad \text{onde}$$

$$B_q(t_p, t_{p+1}, \dots, t_{p+q}) = (0, \dots, 0, t_p, t_{p+1}, \dots, t_{p+q}).$$

Então, definimos $a \cup b = a.b$ como a $(p+q)$ -cocadeia que a todo $\sigma \in C_{p+q}(X)$ associa:

$$\langle a \cup b, (\sigma) \rangle = (-1)^{p \cdot q} \langle a, \sigma \circ F_p \rangle \cdot \langle b, \sigma \circ B_q \rangle$$

Como $\delta(a \cup b) = (\delta a) \cup b + (-1)^p a \cup (\delta b)$, existe uma operação correspondente:

$$H^p(X) \otimes H^q(X) \rightarrow H^{p+q}(X)$$

também chamada produto cup e denotada por $\cup$.

1.5. Definição do Produto Cap:

Para todo espaço topológico X e para todo anel de coeficientes R , existe uma aplicação bilinear:

$$\cap : C^i(X, R) \otimes C_n(X, R) \rightarrow C_{n-i}(X, R)$$

caracterizada como segue. Para cada cocadeia $b \in C^i(X, R)$ e para cada cadeia $\xi \in C_n(X, R)$ o produto cap $b \cap \xi$ é o único elemento de $C_{n-i}(X, R)$ tal que $\langle a, b \cap \xi \rangle = \langle a \cdot b, \xi \rangle$ para todo $a \in C^{n-i}(X)$.

Como $\partial(b \cap \xi) = (\delta b) \cap \xi + (-1)^{\dim b} b \cap \partial \xi$, existe uma operação correspondente:

$$H^i(X, R) \otimes H_n(X, R) \rightarrow H_{n-i}(X, R)$$

também chamada produto cap e denotada por $\cap$.

Maiores detalhes das definições acima se encontram em (9), apêndice A.

Observação: Sejam $f: X \rightarrow Y$ tal que $f(A_1) \subset B_1$ e $f(A_2) \subset B_2$, $\mu \in H^q(Y, B_1)$ e $Z \in H_n(X, A_1 \cup A_2)$. Sejam $f_1: (X, A_1) \rightarrow (Y, B_1)$, $f_2: (X, A_2) \rightarrow (Y, B_2)$ e $\tilde{f}: (X, A_1 \cup A_2) \rightarrow (Y, B_1 \cup B_2)$ aplicações definidas por f . Então em $H_{n-q}(Y, B_2)$, temos que:

$$f_{2*}(f_1^* \mu \cap Z) = \mu \cap \tilde{f}_* Z$$

((11), pag 254)

§3. Classes de Stiefel-Whitney

O material deste parágrafo pode ser encontrado em (9), §4.

1.6. Definição das Classes de Stiefel-Whitney:

Para cada fibrado vetorial real ξ sobre um espaço base paracompacto $B(\xi)$, corresponde uma sequência de classes de cohomologia $w_i(\xi) \in H^i(B(\xi), \mathbb{Z}_2)$, $i = 0, 1, 2, \dots$ chamadas as classes de Stiefel-Whitney de ξ , satisfazendo os axiomas a seguir.

A classe $w_0(\xi)$ é igual ao elemento unidade 1 e pertence a $H^0(B(\xi), \mathbb{Z}_2)$ e, as classes $w_i(\xi)$ são nulas para $i > n$ se ξ é um fibrado vetorial real de fibra $\mathbb{R}^n$.

SW₁ Axioma da Naturalidade - se $f: B(\xi) \rightarrow B(\eta)$ é cober

ta por uma aplicação fibrada de ξ em η então

$$w_i(\xi) = f^*(w_i(\eta)), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

SW₂-Axioma do Produto de Whitney -

$$w_j(\xi \oplus \eta) = \sum_{i=0}^j w_i(\xi) \cdot w_{j-i}(\eta)$$

SW₃-Para o Fibrado Canônico γ_1^1 de dimensão 1, sobre a circunferência $S^1 \cong \mathbb{RP}(1)$, a classe de Stiefel-Whitney $w_1(\gamma_1^1) \in H^1(S^1, \mathbb{Z}_2)$ é não nula.

A classe total de Stiefel-Whitney de um fibrado veto rial real ξ de dimensão n é:

$w(\xi) = 1 + w_1(\xi) + w_2(\xi) + \dots + w_n(\xi) + 0 + \dots \in H^*(B(\xi), \mathbb{Z}_2)$ onde $B(\xi)$ é o espaço base de ξ .

O axioma do produto de Whitney pode ser expresso por $w(\xi \oplus \eta) = w(\xi) \cdot w(\eta)$.

A classe total de Stiefel-Whitney de ξ possui um ele mento inverso em relação ao produto cup, denotado por $\bar{w}(\xi) = 1 + \bar{w}_1(\xi) + \bar{w}_2(\xi) + \dots$ que pode ser construída indu tivamente pelo algoritmo:

$$\bar{w}_i(\xi) = w_1(\xi) \bar{w}_{i-1}(\xi) + w_2(\xi) \bar{w}_{i-2}(\xi) + \dots + w_i(\xi)$$

As classes de Stiefel-Whitney de uma variedade dife renciável M são por definição, as classes de Stiefel-

-Whitney do fibrado tangente τ_M .

1.7. Definição dos Números de Stiefel-Whitney:

Seja M uma variedade diferenciável, compacta, de di mensão n . Sejam $r_1, r_2, \dots, r_n$, números inteiros não negati vos tais que $r_1 + 2r_2 + \dots + nr_n = n$. Um números de Stiefel-Whitney de M é:

$$w_1(M)^{r_1} \dots w_n(M)^{r_n} (M) \in Z_2$$

onde (M) é a classe fundamental de homologia de M .

1.8. Teorema:

Uma variedade diferenciável M^n compacta e sem bordo, é bordo de uma variedade diferenciável W^{n+1} compacta se, e somente se, os números de Stiefel-Whitney de M são nulos. ((9), pag 53).

§4. Fibrado de Hopf

1.9. Definição do Fibrado de Hopf:

Seja $S^{2n+1} = \{(Z_0, Z_1, \dots, Z_n) \in C^{n+1} \mid \sum_{i=0}^n |Z_i|^2 = 1\}$. Se

ja $CP(n)$ o espaço projetivo complexo, representado como as $(n+1)$ -uplas de números complexos não todos nulos, com a re

lação de equivalência:

$$(Z_0, Z_1, \dots, Z_n) \sim (\lambda Z_0, \lambda Z_1, \dots, \lambda Z_n) \quad \text{onde } \lambda \in \mathbb{C} \text{ e } \lambda \neq 0$$

A aplicação de Hopf $H: S^{2n+1} \rightarrow CP(n)$ é definida por $H(Z_0, Z_1, \dots, Z_n) = (Z_0, Z_1, \dots, Z_n)$ para cada $(Z_0, Z_1, \dots, Z_n) \in S^{2n+1}$.

S^{2n+1} se fibra sobre $CP(n)$ com fibra S^1 , relativamente a H . ((12), pag.106,107,108).

Esse fibrado $S^1 \hookrightarrow S^{2n+1}$ é chamado fibrado de Hopf.
 $\downarrow H$
 $CP(n)$

Em particular quando $n = 1$, $CP(1)$ pode ser identificado com a esfera S^2 e o fibrado de Hopf fica:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \hookrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow H \\ & & S^2 \end{array}$$

§5. Cobordismo

1.10. Definição de União Disjunta:

Sejam M e N espaços topológicos tais que $M \cap N = \emptyset$.

Definimos a união disjunta de M e N , denotada por $M + N$, como sendo o espaço topológico constituído pelo conjunto $M \cup N$ com a seguinte topologia:

$U \subset M + N$ é aberto $\iff U \cap M$ é aberto em M e $U \cap N$ é aberto em N .

É claro que M e N conservam suas próprias topologias e são abertos em $M + N$.

Se τ e τ' definem uma estrutura diferenciável em M e N respectivamente, então $\tau \cup \tau'$ define uma estrutura diferenciável em $M + N$.

1.11. Definição de Cobordismo:

Sejam M e N variedades diferenciáveis compactas de dimensão n . Diremos que elas são cobordantes, ou que pertencem à mesma classe de cobordismo não orientado se, existe uma variedade compacta W de dimensão $n + 1$ tal que ∂W é difeomorfa a $M + N$.

O cobordismo é uma relação de equivalência sobre o conjunto das variedades diferenciáveis compactas sem bordo de mesma dimensão.

Duas variedades diferenciáveis M e N compactas e orientadas de dimensão n , pertencem à mesma classe de cobordismo orientado se, existe uma variedade diferenciável W compacta de dimensão $n + 1$ orientada, com bordo, tal que $\partial W = M + (-N)$ onde $-N$ é N com orientação oposta.

§6. Fibrados Orientados e o Isomorfismo de Thom.

1.12. Definição de Fibrado Orientado:

Um fibrado vetorial real orientado ξ de dimensão n ,

é um fibrado vetorial real E munido de uma orientação π pa
 $\downarrow \pi$
 B

ra cada fibra, tal que essas orientações são localmente compatíveis no seguinte sentido: para cada ponto b_0 do es
paço base existe uma vizinhança N e n seções $c_1, c_2, \dots, c_n: N \rightarrow E$, tal que para cada $b \in N$ os vetores $c_1(b), \dots, c_n(b)$ for
mam uma base para a fibra F_b que é compatível com a dada
orientação de F_b .

Em termos de cohomologia, isto significa que pa
ra cada fibra F existe associado um gerador pré-fixado $u_F \in H^n(F, F_0, Z)$ onde $F_0 = E_0 \cap F$ e E_0 é o conjunto de todos os elementos não nulos de E .

A condição de compatibilidade local implica que para todo ponto da base, existe uma vizinhança N e uma classe de cohomologia $u \in H^n(\pi^{-1}(N), \pi^{-1}(N)_0, Z)$ de modo que para to
da fibra F sobre B , a restrição de $u|_{(F, F_0)} \in H^n(F, F_0, Z)$ é igual a u_F .

1.13. Teorema:

Um fibrado ξ é orientado se, e somente se, $w_1(\xi) = 0$
((12), pag 199).

1.14. Classe de Thom:

Seja ξ um fibrado vetorial real orientado de dimen
são n , com espaço total E . Então $H^i(E, E_0, Z) = 0$ para $i < n$

e $H^n(E, E_0, Z)$ contém uma, e somente uma classe de cohomologia μ , chamada classe de Thom cuja restrição $\mu|_{F, F_0} \in H^n(F, F_0, Z)$ é o gerador escolhido μ_F para cada fibra F . ((9), pag 110).

1.15. Teorema do Isomorfismo de Thom:

Seja ξ um fibrado vetorial real orientado de dimen são n com espaço base B , espaço total E e projeção $\pi: E \rightarrow B$. Então os homomorfismos:

$$\phi: H^r(B) \rightarrow H^{r+n}(E, E_0), \quad \phi(x) = \pi^*(x) \cup \mu, \quad x \in H^r(B)$$

e

$$\psi: H_{r+n}(E, E_0) \rightarrow H_r(B), \quad \psi(x) = \pi_*(\mu \cap x), \quad x \in H_{r+n}(E, E_0)$$

são isomorfismos. ((14), pag 309).

§7. Classes de Euler

1.16. Definição da Classe de Euler:

A classe de Euler de um fibrado vetorial real ξ o rientado de dimensão n , com espaço total E , espaço base B e projeção $\pi: E \rightarrow B$, é a classe de cohomologia $e(\xi) \in H^n(B, Z)$ que corresponde a $\mu|_E$ pelo isomorfismo canônico $\pi^*: H^n(B, Z) \rightarrow H^n(E, Z)$ induzido pela projeção π , onde μ é a classe de Thom.

Ou seja, se considerarmos o homomorfismo

$$\begin{aligned} i^*: H^n(E, E_0, Z) &\rightarrow H^n(E, Z) \\ \mu &\rightarrow \mu|_E \end{aligned}$$

induzido pela inclusão $i: E \rightarrow E, E_0$ e se $e(\xi)$ for a classe de Euler do fibrado ξ , então: $\pi^*(e(\xi)) = \mu|_E = i^*(u)$

$$\begin{array}{ccc} H^n(B, Z) & \xrightarrow{\pi^*} & H^n(E, Z) \\ & & \uparrow i^* \\ & & H^n(E, E_0, Z) \end{array}$$

1.17. Propriedade (Naturalidade):

Se $f: B(\xi) \rightarrow B(\eta)$ é coberta por uma aplicação fibra da que preserva a orientação de ξ em η , então $e(\xi) = f^*(e(\eta))$.

1.18. Teorema:

O homomorfismo redução módulo 2:

$$H^n(B, Z) \rightarrow H^n(B, Z_2)$$

leva a classe de Euler $e(\xi)$ na classe de Stiefel-Whitney $w_n(\xi)$. ([9], pag 99).

1.19. Teorema:

Se M é uma variedade diferenciável compacta e orien

tada então, o índice de Kronecker $e(\tau_m).(M)$, usando coeficientes racionais ou inteiros, é igual à característica de Euler $X(M)$. ((9), pag 130).

§8. Fibrados de Stiefel

1.20. Definição:

Seja ξ um fibrado vetorial real de dimensão n , com espaço base B . Para cada $r < n$, temos associado um fibrado $\tilde{V}_{n,n-r}(\xi)$ com espaço base B e fibra a variedade de Stiefel $Y^r = V_{n,n-r} = \frac{O(n)}{O(r)}$, consistindo de todas as $(n-r)$ -uplas de vetores ortonormais no espaço R^n .

Esse fibrado $\tilde{V}_{n,n-r}(\xi)$ é chamado fibrado de Stiefel associado à variedade de Stiefel Y^r .

Por definição o espaço total de $\tilde{V}_{n,n-r}(\xi)$ consiste de todos os pares $(x, (v_1, v_2, \dots, v_{n-r}))$ onde $(v_1, v_2, \dots, v_{n-r})$ é uma $(n-r)$ -upla de vetores ortonormais na fibra sobre x .

1.21. Teorema:

A variedade de Stiefel Y^r é conexa por caminho e $\pi_i(Y^r) = 0$ para $i < r$ e:

$$\pi_r(Y^r) = \begin{cases} Z & \text{se } r \text{ é par ou } n-r = 1 \\ Z_2 & \text{se } r \text{ é ímpar e } n-r > 1 \end{cases}$$

((12), pag 132).

1.22. Teorema:

Sejam $Y'^q = V'_{n,n-q} = \frac{U(n)}{U(q)}$ as variedades de Stiefel complexas, consistindo das $(n-q)$ -uplas de vetores ortonormais no espaço complexo C^n .

$$\text{Então, } \pi_i(Y'^q) = \begin{cases} 0, & \text{se } i < 2q + 1 \\ Z, & \text{se } i = 2q + 1 \end{cases}$$

((12), pag 133).

§9. Obstrução e Classes de Chern

A teoria de Obstrução, se encontra em (12), capítulo 3.

Enunciaremos apenas o seguinte teorema, bastante utilizado em nosso trabalho.

1.23. Teorema:

Seja ξ um fibrado $Y \hookrightarrow B$ onde K é um complexo finito

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ K \end{array}$$

(como definido em (12), pag 100) e Y é q -simples. Seja L um sub-complexo de K e seja f uma seção de ξ restrita a $L \cup K^q$; K^q indica o q -esqueleto de K .

Suponhamos $\pi_q(Y) \neq 0$. Então, o anulamento da classe de obstrução $c(f, \xi) \in H^{q+1}(K, L, \pi_q(Y))$ é condição necessá

ria e suficiente para que haja uma extensão de f em LUK^{q+1} .

1.24. As Classes de Chern Definidas como Obstrução:

Seja η um fibrado vetorial complexo de dimensão m com espaço base um complexo celular K . Consideremos η' o fibrado em esferas S^{m-1} associado.

Seja η'_q o fibrado de Stiefel associado, que tem como fibra a variedade de Stiefel $Y'^q = \frac{U(m)}{U(q)}$.

Como $U(0) \subset U(1) \subset \dots \subset U(m-1)$, temos as projeções naturais:

$$U(m) = Y'^0 \rightarrow Y'^1 \rightarrow \dots \rightarrow Y'^{m-1} = S^{2m-1}$$

e Y'^{q-1} é um fibrado vetorial complexo em esferas S^{2q-1} , sobre Y'^q .

Essas projeções induzem projeções entre os espaços totais:

$$B'^0 \rightarrow B'^1 \rightarrow \dots \rightarrow B'^{m-1} \rightarrow K$$

e, qualquer composição delas é a projeção de um fibrado sobre K , com fibra uma variedade de Stiefel ([12], pag 210).

Por exemplo, a composição $B'^q \rightarrow B'^{q+1} \rightarrow \dots \rightarrow K$ é a projeção do fibrado η'_q .

De acordo com o teorema 1.22., temos que

$$\pi_{4q-1}(Y'^{2q-1}) = Z$$

é o primeiro grupo de homotopia não nulo de Y'^{2q-1} . Existe uma seção f de η'_{2q-1} restrita ao $(4q-1)$ -esqueleto e, portanto, a obstrução $c(\eta'_{2q-1}, f)$ para a extensão de f ao $4q$ -esqueleto de K é um elemento de $H^q(K, \pi_{4q-1}(Y'^{2q-1})) \simeq H^{4q}(K, \mathbb{Z})$

Definimos a classe de Chern $C_{2q}(\eta') \in H^{4q}(K, \mathbb{Z})$ como sendo a obstrução $c(\eta'_{2q-1}, f)$.

Analogamente, usando o grupo $O(m)$ em vez de $U(m)$, podemos definir as classes de Stiefel-Whitney como obstruções.

§10. Classes de Pontrjagin

1.25. Definição das Classes de Pontrjagin:

Seja ξ um fibrado vetorial real de dimensão n com espaço base B .

Seja $\xi_c = \xi \otimes \mathbb{C}$ o fibrado complexificação de ξ .

A i -ésima classe de Pontrjagin $p_i(\xi) \in H^{4i}(B, \mathbb{Z})$ é definida por:

$$p_i(\xi) = (-1)^i C_{2i}(\xi_c)$$

A classe total de Pontrjagin é:

$$p(\xi) = 1 + p_1(\xi) + \dots + p_{\left(\frac{n}{2}\right)}(\xi),$$

onde $\left(\frac{n}{2}\right)$ indica o maior inteiro menor ou igual a $\frac{n}{2}$.

1.26. Teorema:

- i) Se ε^k é o fibrado vetorial trivial de dimensão k , então $p(\xi \oplus \varepsilon^k) = p(\xi)$.
- ii) Se ξ e η são fibrados vetoriais reais, $p(\xi \oplus \eta) = p(\xi) \cdot p(\eta) + (\text{elementos de ordem } 2)$
- iii) Se ξ é um fibrado vetorial real orientado de dimensão $2k$, então $p_k(\xi) = e(\xi) \cdot e(\xi)$. ((9), pag 174, 175, 179).

1.27. Lema (Naturalidade):

Se $f: B \rightarrow B'$ é coberta por uma aplicação fibrada entre os fibrados vetoriais ξ e η , então $f^*p(\eta) = p(\xi)$.

1.28. Lema:

Seja $CP(n)$ o espaço projetivo complexo.

Então, $p(CP(n)) = (1 + \alpha^2)^{n+1}$ onde $\alpha \in H^2(CP(n), \mathbb{Z})$ é gerador. Em outras palavras, $p_k(CP(n)) = \binom{n+1}{k} \alpha^{2k}$ ((9), pag 177).

§11. O Isomorfismo de Hurewicz

1.29. Teorema:

Seja X um espaço conexo com $\pi_i(X) = 0$ para todo

$i < n$ ($n \geq 2$). Então, $H_i(X) = 0$ para todo $i < n$ e $\pi_n(X) \cong H_n(X, \mathbb{Z})$ ((10), pag 78).

§12. Dualidade de Poincaré e Lefschetz

1.30. Teorema de Dualidade:

Seja M uma variedade sem bordo diferenciável compacta e orientada de dimensão n e seja (A, B) um par de subvariedades compactas de M . Então,

$$D: H_q(M-B, M-A) \rightarrow H^{n-q}(A, B)$$

é um isomorfismo ((11), pag 296).

1.31. Corolário (Dualidade de Poincaré):

Se M for uma variedade diferenciável compacta (sem bordo) orientada de dimensão n , então:

$$D: H^i(M) \rightarrow H_{n-i}(M)$$

definida por $D(\alpha) = \alpha \cap (M)$ é um isomorfismo. ((11), pag 297).

1.32. Teorema da Dualidade de Lefschetz:

Se Ω^n é uma variedade diferenciável compacta e orientada

tada, com bordo, então:

$$H_r(\Omega) \cong H^{n-r}(\Omega, \partial\Omega)$$

((16), pag 156).

§13. Classificação de Fibrados

1.33. Teorema:

As classes de equivalência de fibrados η sobre S^n com grupo G , estão em correspondência biunívoca com as classes de equivalência de $\pi_{n-1}(G)$ sob as operações de $\pi_0(G)$. Tal correspondência é dada por $\eta \rightarrow X(\alpha)$ onde α é um gerador de $\pi_n(S^n)$ e $X: \pi_n(S^n) \rightarrow \pi_{n-1}(G)$ é um homomorfismo característico de η . ((12), pag 99).

CAPÍTULO 2

Neste capítulo, definiremos o índice de uma variedade e enunciaremos algumas de suas propriedades. Dentre elas demonstraremos a seguinte:

$$I(M \# N) = I(M) + I(N)$$

Definiremos ainda os espaços de Eilenberg MacLane $K(G, n)$ e mostraremos a sua construção. Como exemplo, construiremos o complexo $CW, K(Z, 2)$.

Em seguida demonstraremos que: dada uma classe $\eta \in H^2(M^4, Z)$, onde M^4 é uma variedade diferenciável compacta e orientada, existe um mergulho $g: N^2 \rightarrow M^4$ tal que $g_*(N^2) = \eta \cap (M^4)$.

§1. Índice de uma Variedade

2.1. Definição:

O índice de uma variedade diferenciável M^n compacta e orientada, denotado por $I(M)$, é definido como:

- a) $I(M) = 0$ se $n \neq 4k$ para algum inteiro k .
- b) Se $n = 4k$ então $I(M)$ é o índice da forma bilinear simétrica não singular:

$$\phi: H^{2k}(M, \mathbb{R}) \times H^{2k}(M, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow \phi(x, y) = \langle x \cup y, [M] \rangle$$

2.2. Propriedades do Índice:

a) $I(M+N) = I(M) + I(N); I(-M) = -I(M).$

b) $I(M \times N) = I(M) \cdot I(N).$

c) Se M é uma variedade diferenciável compacta e orientada então, $I(M) = X(M) \bmod 2$ ([16], pag 170).

d) $I(\mathbb{C}P(2k)) = 1$

e) Se M é uma variedade diferenciável de dimensão $(4n+1)$, compacta e orientada então, $I(\partial M) = 0$ ([16], 169).

f) $I(M \# N) = I(M+N) = I(M) + I(N).$

Demonstração de f:

Antes, vamos definir a variedade de $X(M, \phi)$. Dada uma variedade M de dimensão $n-1$ e um mergulho $\phi: S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda} \rightarrow M$, seja $M' = M - \phi(S^{\lambda-1} \times 0)$ e $W' = M' \cup (D^{\lambda} \times S^{n-\lambda-1})$. Definamos em W' uma relação de equivalência E , identificando $\phi(u, \theta v)$ com $(\theta u, v)$ para cada $u \in S^{\lambda-1}$, $v \in S^{n-\lambda-1}$, $0 < \theta < 1$.

Seja $W = \frac{W'}{E}$. Denotaremos $W = X(M, \phi)$ e diremos que W foi obtida de M por meio de uma cirurgia do tipo $(\lambda, n-\lambda)$.

Seja Q a união disjunta das variedades M e N , denotada

por $M + N$. Se considerarmos o mergulho $\phi: \overset{0}{S} \times \overset{0}{D}^{n-1} \rightarrow Q$ tal que:

$$\phi(-1 \times \overset{0}{D}^{n-1}) \subset M \quad \text{e} \quad \phi(1 \times \overset{0}{D}^{n-1}) \subset N.$$

então,

$$X(Q, \phi) = \frac{Q - \phi(\overset{0}{S} \times 0) \cup (\overset{0}{D}^1 \times S^{n-2})}{E} = M \# N$$

Como $M + N$ é uma variedade diferenciável e $M \# N$ é obtida de $M + N$ por uma cirurgia então, $M + N$ e $M \# N$ são cobordantes ((2), pag 33).

Desde que variedades cobordantes tem o mesmo índice, segue que $I(M \# N) = I(M+N) = I(M) + I(N)$.

§2. Espaços de Eilenberg-MacLane

2.3. Definição:

Seja G um grupo abeliano. Um complexo CW é chamado espaço de Eilenberg-MacLane do tipo (G, n) e, é denotado por $K(G, n)$, se:

$$\pi_i(K(G, n)) = \begin{cases} 0, & i \neq n \\ G, & i = n \end{cases}$$

2.4. Construção:

Consideremos um grupo abeliano G e um número inteiro

$n, n \geq 2$. Vamos construir um complexo CW, $K(G, n)$.

Seja $0 \rightarrow R \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ uma resolução livre de G , isto é, uma sequência exata onde R e F são grupos abelianos livres. Sejam $\{a_i\}_{i \in I}$ e $\{b_j\}_{j \in J}$ bases de R e F respectivamente. Seja X o espaço obtido da reunião por um ponto, das n -esferas S_j^n , $j \in J$. Para cada a_i , tomemos uma $(n+1)$ -célula e_i , e consideremos o espaço Y que se obtém colando cada uma dessas $(n+1)$ -células a X , através da aplicação $f_i: \dot{e}_i \rightarrow X$, onde $(f_i) = a_i \in \pi_n(X) = F$ e, $\dot{e}_i$ denota o bordo de e_i . Temos que $\pi_n(Y) \cong G$.

Estamos assim, no seguinte estágio:

$$\pi_i(Y) = \begin{cases} 0 & \text{se } i < n \\ G & \text{se } i = n \end{cases}$$

Para que Y seja um $K(G, n)$, é necessário que $\pi_j(Y) = 0$ para todo $j > n$.

Suponhamos que $\pi_r(Y) \neq 0$ para algum $r > n$. Então existe $f: S^r \rightarrow Y$ representando $(f) \in \pi_r(Y)$. Seja $Y' = Y \cup_f e^{r+1}$, onde e^{r+1} é uma $(r+1)$ -célula. Fazendo isto para todos os geradores de $\pi_r(Y)$, obteremos o espaço $\bar{Y}$ tal que $\pi_r(\bar{Y}) = 0$ e $\pi_i(Y) \cong \pi_i(\bar{Y})$ para todo $i < r$.

2.5. Exemplos:

Como aplicação de 2.4., vamos construir o complexo CW, $K(Z, 2)$.

Consideremos a sequência $0 \rightarrow 0 \rightarrow Z \xrightarrow{\text{id}} Z \rightarrow 0$ que é uma resolução livre de Z e, seja $\{a_1\}$ uma base de Z .

Temos então que $Y = S^2 \cong \mathbb{C}P(1)$ e, portanto,

$$\pi_i(\mathbb{C}P(1)) = \begin{cases} 0 & \text{se } i = 1 \\ Z & \text{se } i = 2 \end{cases}$$

Conhecemos que $\pi_3(S^2) \cong Z(h_1)$, onde h_1 é a fibração de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^3$.
 $\downarrow h_1$
 S^2

Chamemos de $Y_1 = S^2 \cup_{h_1} e^4$. Sabemos que $Y_1 = \mathbb{C}P(2)$.

Considerando o fibrado de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^5$, temos a
 $\downarrow h_2$
 $\mathbb{C}P(2)$

sequência exata de homotopia:

$$\dots \rightarrow \pi_2(S^5) \rightarrow \pi_2(\mathbb{C}P(2)) \rightarrow \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_1(S^5) \rightarrow \dots$$

Desde que $\pi_2(S^5) \cong \pi_1(S^5) = 0$ então, $\pi_2(\mathbb{C}P(2)) \cong \pi_1(S^1)$.

Como $\pi_1(S^1) \cong Z$, concluímos que $\pi_2(\mathbb{C}P(2)) \cong Z$.

Analogamente decorre da sequência exata de homotopia acima que:

$$\pi_1(\mathbb{C}P(2)) = 0, \pi_3(\mathbb{C}P(2)) = 0, \pi_4(\mathbb{C}P(2)) = 0, \pi_5(\mathbb{C}P(2)) \cong Z(h_2).$$

Portanto ,

$$\pi_i(\mathbb{C}P(2)) = \begin{cases} Z & \text{se } i = 2 \\ 0 & \text{se } i \leq 4 \text{ e } i \neq 2 \end{cases}$$

Chamemos $Y_2 = CP(2) \cup_{h_2} e^6$. Sabemos que $Y_2 \cong CP(3)$.

Considerando o fibrado de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^7$, temos a sequência exata de homotopia:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \hookrightarrow & S^7 \\ \downarrow h_3 & & \\ CP(3) & & \end{array}$$

$$\dots \rightarrow \pi_2(S^7) \rightarrow \pi_2(CP(3)) \rightarrow \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_1(S^7) \rightarrow \dots$$

Desde que $\pi_2(S^7) = 0$ e $\pi_1(S^7) = 0$ então $\pi_2(CP(3)) \cong \pi_1(S^1)$

Como $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, concluímos que $\pi_2(CP(3)) \cong \mathbb{Z}$.

Analogamente decorre da sequência acima que:

$$\begin{aligned} \pi_1(CP(3)) &= 0, \pi_3(CP(3)) = 0, \pi_4(CP(3)) = 0, \pi_5(CP(3)) = 0, \\ \pi_6(CP(3)) &= 0, \pi_7(CP(3)) \cong \mathbb{Z}(h_3). \end{aligned}$$

Assim,

$$\pi_i(CP(3)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } i = 2 \\ 0 & \text{se } i \leq 6 \text{ e } i \neq 2. \end{cases}$$

Repetindo esse raciocínio sucessivamente, obteremos o complexo CW, $CP(\infty)$, tal que:

$$\pi_i(CP(\infty)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{se } i = 2 \\ 0 & \text{se } i \neq 2 \end{cases}$$

Portanto, $CP(\infty)$ é um espaço Eilenberg MacLane do tipo $K(\mathbb{Z}, 2)$.

2.6. Exemplo:

$RP(\infty)$ é um espaço de Eilenberg MacLane do tipo $K(\mathbb{Z}_2, 1)$.

2.7. Exemplo:

S^1 é um espaço de Eilenberg MacLane do tipo $K(\mathbb{Z}, 1)$.

§3. Representação de $\eta \in H^2(M, \mathbb{Z})$ Por uma Subvariedade

2.8. Teorema:

Existe uma correspondência biunívoca:

$$(X, K(\pi, n)) \leftrightarrow H^n(X, \pi)$$

dada por $(f) \leftrightarrow f^*(l_n)$ onde, $l_n \in H^n(K(\pi, n), \pi)$ é uma classe fundamental de $K(\pi, n)$. ((10), pag 3).

2.9. Teorema:

Seja M^4 uma variedade diferenciável compacta, orientada e seja $\eta \in H^2(M, \mathbb{Z})$. Então, existe um mergulho $g: N^2 \rightarrow M^4$ tal que $g_*(N) = \eta \cap (M)$.

Neste caso, dizemos que N é uma variedade dual de η .

Demonstração:

Por 2.8., existe uma correspondência biunívoca

$$H^2(M, \mathbb{Z}) \leftrightarrow (M, K(\mathbb{Z}, 2)) \cong (M, CP(\infty))$$

Como $\eta \in H^2(M, \mathbb{Z})$, existe $f: M \rightarrow CP(\infty)$ tal que $f^*(\alpha') = \eta$ onde $\alpha' \in H^2(CP(\infty), \mathbb{Z})$ é um gerador.

Desde que M é compacta, $\text{im } f \subset CP(N)$ para algum N .

Temos então $f: M \rightarrow CP(N)$ com $f^*(\alpha'') = \eta$ onde,

$\alpha'' \in H^2(CP(N), \mathbb{Z})$ é um gerador.

Sendo $CP(N-1)$ uma subvariedade fechada de $CP(N)$, de co dimensão 2, existe $h: M \rightarrow CP(N)$ diferenciável, transversal a $CP(N-1)$ e homotópica a f . ((14), pag 224).

Assim, $h^*(\alpha'') = \eta$. Logo $h^{-1}(CP(N-1)) = N^2$ é uma subvariedade compacta de M , de dimensão 2, e assim, existe um mergulho $g: N^2 \rightarrow M$.

Falta demonstrar que $g_*(N) = \eta \cap (M)$.

Como M e $CP(N)$ são complexos CW, decorre que h é homotópica a uma aplicação celular $q: M \rightarrow CP(2)$. ((14), pag 91).

Consideremos $\begin{matrix} \nu_g \\ \downarrow \pi \\ N \end{matrix}$ o fibrado normal de N em M e seja

$g': N \rightarrow \nu_g$ a seção nula de ν_g .

Podemos então, formar o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 (\nu_g, \partial \nu_g) & \xrightarrow{e} & (M, M-N) \\
 \uparrow j & \searrow & \uparrow j_M \\
 \nu_g & \xrightarrow{i} & M \\
 \downarrow \pi & \nearrow g & \\
 N & &
 \end{array}$$

(Note: The diagram includes curved arrows indicating commutativity: from $(\nu_g, \partial \nu_g)$ to M via j and i ; from N to M via g and g' followed by π .)

onde j , j_M , e , i , são inclusões naturais.

O teorema do isomorfismo de Thom, garante que a aplicação

$$\psi: H_4(\nu_g, \partial \nu_g) \rightarrow H_2(N)$$

dada por $\psi(Z) = \pi_*(\mu \cap Z)$ onde $\mu \in H^2(v_g, \partial v_g)$ é a classe de Thom, é um isomorfismo.

Assim, denotando por $()$ o gerador de $H_4(v_g, \partial v_g)$, temos que $\psi(()) = \pi_*(\mu \cap ()) = (N)$. Logo,

$$g_* \pi_*(\mu \cap ()) = g_*(N),$$

Como $g = i \circ g'$, então: $i_* g'_* \pi_*(\mu \cap ()) = g_*(N)$ ou seja, $i_*(\mu \cap ()) = g_*(N)$.

O isomorfismo excisão $e^*: H^2(M, M-N) \rightarrow H^2(v_g, \partial v_g)$, nos fornece que $\mu = e^*(\mu_M)$ onde, $\mu_M \in H^2(M, M-N)$.

Portanto, $i_*(e^* \mu_M \cap ()) = g_*(N)$.

Da definição de produto cap (ver observação de 1.6.) , decorre que:

$$\mu_M \cap e_* () = g_*(N).$$

Como $j_{M*}: H_4(M) \rightarrow H_4(M, M-N)$ é também um isomorfismo (a demonstração deste fato não é óbvia), temos em decorrência que $e_*() = j_{M*}(M)$.

$$\text{Logo, } \mu_M \cap j_{M*}(M) = g_*(N)$$

ou seja,

$$j_M^*(\mu_M) \cap (M) = g_*(N).$$

Da naturalidade da classe de Thom, segue que $j_M^*(\mu_M) = \eta$.

Assim,

$$g_*(N) = \eta \cap (M)$$

e o teorema está provado.

CAPÍTULO 3

Neste capítulo apresentaremos a demonstração do teorema de Rohlin e do teorema de Kervaire e Milnor.

Todas as variedades consideradas neste parágrafo, serão supostas orientadas.

§1. Teorema de Rohlin

3.1. Proposição:

Seja M^4 uma variedade diferenciável compacta com $w_2(M^4) = 0$. Então, M^4 é quase paralelizável.

Demonstração:

Seja τ_M o fibrado tangente da variedade M . Considere
 $\begin{array}{c} \tau_M \\ \downarrow \\ M \end{array}$
mos $\tilde{V}_{4,4-r}(\tau_M)$, $0 \leq r < 4$, o fibrado de Stiefel associado, com fibra a variedade de Stiefel $Y^r = V_{4,4-r}$.

Para $r = 1$ temos, por 1.21. que Y^1 é o-conexo e portanto, existe uma seção do fibrado $\tilde{V}_{4,3}(\tau_M)$ sobre o 1-esqueleto K^1 de M .

Essa seção se estende ao 2-esqueleto de M se, e somente se, a obstrução $c(\tau_M) \in H^2(M, \pi_1(Y^1))$ for nula.

Como $\pi_1(Y^1) = \mathbb{Z}_2$ então $\pi_1(Y^1)$ é canonicamente isomor

fo a Z_2 . Desde que M é orientável, o fibrado de coeficientes é trivial e por conseguinte, $c(\tau_M) = w_2(M) \in H^2(M, Z_2)$.

Da hipótese, temos que $w_2(M) = 0$; então $c(\tau_M) = 0$.

Logo, o fibrado τ_M admite um campo de tres vetores linearmente independentes sobre o 2-esqueleto K^2 de M e portanto, $\tau_M|_{K^2} \cong \xi^1 \oplus \theta^3$ onde θ^3 é trivial.

Assim $w_1(\tau_M|_{K^2}) = w_1(\xi^1 \oplus \theta^3) = w_1(\xi^1)$.

O fato de $\tau_M|_{K^2}$ ser orientável $\Rightarrow w_1(\tau_M|_{K^2}) = 0 \Rightarrow w_1(\xi^1) = 0 \Rightarrow \xi^1$ é orientável e, como consequência, o grupo estrutural de ξ^1 é um grupo com um só elemento; disso resulta que ξ^1 é trivial. Como implicação desse fato, temos que $\tau_M|_{K^2}$ é trivial. Podemos então construir o fibrado η sobre K^3/K_2 , colapsando K^2 .

Mas K^3/K_2 é um bouquet finito de esferas S^3 , digamos $S_1^3, S_2^3, \dots, S_n^3$ unidas por um ponto e η é trivial se, e somente se, as restrições $\eta_i = \eta|_{S_i^3}$ são triviais. Por outro lado $\eta|_{S_i^3}$ é trivial se, e somente se, o fibrado principal associado:

$$\begin{array}{ccc} SO(4) & \hookrightarrow & \tilde{\eta}_i \\ & & \downarrow \\ & & S_i^3 \end{array} \quad \text{é trivial}$$

Pelo teorema 1.33., as classes de equivalência dos fibrados sobre S^3 com grupo $SO(4)$, estão em correspondência

biunívoca com as classes de equivalência dos elementos de $\pi_2(SO(4))$. Porém, $\pi_2(SO(4)) = 0$ ([12], pag 118).

Logo, $\tau_M|_{K^3}$ é trivial.

Como $M-x$ tem o mesmo tipo de homotopia de um subcomplexo do 3-esqueleto de M então $\tau_M|_{M-x}$ é trivial e assim, M é quase paralelizável.

3.2. Definição de Join:

Sejam X e Y dois espaços topológicos e $I = (0,1)$. O Join de X e Y , denotado por $X * Y$, é o espaço quociente $\frac{X \times I \times Y}{\sim}$ onde $\sim$ é a relação de equivalência $(x,0,y) \sim (x',0,y)$, $(x,1,y) \sim (x,1,y')$ para todo $x,x' \in X$ e todo $y,y' \in Y$.

A classe de equivalência de (x,y,t) será denotada por $\langle x,t,y \rangle$.

Podemos então pensar do Join $X * Y$ como sendo o espaço parametrizado por t onde, para $t = 0$ temos Y , para $t = 1$ temos X e, para $0 < t < 1$ temos $X \times Y$.

Exemplo: $S^n * S^n \cong S^{n+m+1}$

3.3. Definição de Suspensão:

Seja $I = (0,1)$. Para qualquer espaço topológico X a suspensão de X , indicada por SX , é o quociente $\frac{X \times I}{\sim}$ onde $\sim$ é a relação de equivalência $(x,0) \sim (x',0)$, $(x,1) \sim (x',1)$

para todo $x, x' \in X$.

A classe de equivalência de (x, t) será denotada por $\langle x, t \rangle$.

Exemplo: $S(S^n) \cong S^{n+1}$

3.4. Construção Hopf:

Dada uma função $f: X \times Y \rightarrow Z$, a construção de Hopf associada a f é a função: $H(f): X * Y \rightarrow SZ$, definida por $H(f)\langle x, t, y \rangle = \langle f(x, y), t \rangle$.

3.5. Definição:

O J-homomorfismo é um homomorfismo

$$J: \pi_r(SO(n)) \rightarrow \pi_{r+n}(S^n)$$

definido da seguinte maneira:

Seja $\alpha \in \pi_r(SO(n))$ representada por uma função $f: S^r \rightarrow SO(n)$.

$SO(n)$ atua em R^n com uma ação $\theta: SO(n) \times R^n \rightarrow R^n$ dada por $\theta(A, v) = A.v$. Esta ação se restringe a uma ação,

$$\begin{aligned} \bar{\theta}: SO(n) \times S^{n-1} &\rightarrow S^{n-1} \\ (A, v) &\rightarrow A.v \end{aligned}$$

Temos então uma função bem definida:

$$\tilde{f}: S^r \times S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$$

dada por $\tilde{f}(x,y) = f(x) \cdot y$

A construção de Hopf associada a $\tilde{f}$ nos fornece

$$H(\tilde{f}): S^r * S^{n-1} \cong S^{r+n} \rightarrow S(S^{n-1}) \cong S^n$$

Seja $(H(\tilde{f})) \in \pi_{r+n}(S^n)$ a classe de homotopia de $H(\tilde{f})$.

Definimos $J(\alpha) = (H(\tilde{f}))$ ((5), pag , 212).

3.6. Observação:

Sejam $i: V^{k-1} \rightarrow R^{m+k-1}$ um mergulho de uma variedade diferenciável compacta V^{k-1} no espaço euclidiano R^{m+k-1} e ν^m o fibrado normal de V^{k-1} em R^{m+k-1} .

Então ν^m admite um campo de vetores ortonormais $F_m = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$.

Um ponto $Z \in R^{m+k-1}$ numa vizinhança tubular B de V , de raio ρ , pertence a um plano π normal a V^{k-1} em R^{m+k-1} , tal que $\pi \cap V^{k-1} = \{x\}$.

Sejam $Z_1, Z_2, \dots, Z_m$ as coordenadas de Z em relação aos vetores $v_1(x), v_2(x), \dots, v_m(x)$, $\sum_{i=1}^m (Z_i)^2 \leq \rho^2$. Podemos então associar a (V^{k-1}, F_m) uma aplicação:

$$\phi: S^{m+k-1} \rightarrow S^m, \quad \text{definida por:}$$

$$\phi(sZ) = (1-2y^2, 2y_1(1-y^2)^{1/2}, \dots, 2y_m(1-y^2)^{1/2}) \text{ para } Z \in B$$

$$\phi(S^{m+k-1} - sB) = (-1, 0, \dots, 0)$$

onde $y_i = \frac{1}{\rho} z_i$, $y^2 = \sum_{i=1}^m (y_i)^2$ e $s: R^{m+k-1} \rightarrow S^{m+k-1}$ é de

finida por:

$$s(t_1, t_2, \dots, t_{m+k-1}) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t_1}{1+t^2}, \dots, \frac{2t_{m+k-1}}{1+t^2} \right) \quad \text{com}$$

$$t^2 = \sum_{i=1}^{m+k-1} (t_i)^2$$

3.7. Observação:

ϕ é homotopia a zero se, e somente se, existe uma va
riedade diferenciável Q^k , com bordo V^{k-1} , mergulhada em
 R^{m+k-1} , tal que:

- i) a restrição a V^{k-1} do mergulho de Q^k é o mergu
lho $i: V^{k-1} \rightarrow R^{m+k-1}$.
- ii) Q^k encontra R^{m+k-1} ortogonalmente de modo que, a
restrição a V^{k-1} do fibrado normal de Q^k em
 R^{m+k} , é exatamente o fibrado normal de V^{k-1} em
 R^{m+k-1} .
- iii) a seção f pode ser estendida a Q^k como uma seção
 F do fibrado principal associado ao fibrado nor
mal de Q^k em R^{m+k} .

Esses fatos seguem de [15], capítulo I e lemas IV-5 e
IV-5'.

3.8. Proposição:

Seja $\alpha \in \pi_{k-1}(SO(m))$. Consideremos $M^k \subset R^{m+k}$ uma variedade diferenciável quase paralelizável e ν o fibrado normal de M^k em R^{m+k} . Seja f uma seção do fibrado principal associado ao fibrado normal ν restrito a $M-x_0$, tal que $c(\nu, f) = \alpha$ onde $c(\nu, f)$ é a obstrução para a extensão de f .

Então $J\alpha = 0$.

Demonstração:

Sejam M^k uma variedade diferenciável mergulhada em R^{m+k} e f uma seção do fibrado normal de M^k em R^{m+k} , restrita a $M^k - x_0$.

Modificando esse mergulho por um difeomorfismo de R^{m+k} , podemos assumir que alguma vizinhança de x_0 em M^k é um hemisfério num dos semi-espacos determinados pelo hiperplano R^{m+k-1} , enquanto que a parte restante de M^k está contida no outro lado do hiperplano R^{m+k-1} .

Removendo essa vizinhança, obtemos uma variedade $Q^k \subset R^{m+k}$ com bordo $S^{k-1} \subset R^k \subset R^{m+k-1}$, cuja restrição a S^{k-1} é o mergulho $i: S^{k-1} \rightarrow R^{m+k-1}$.

A seção f restrita a S^{k-1} , nos fornece uma aplicação $q: S^{k-1} \rightarrow SO(m)$ que representa a classe de homotopia $c(\nu, f) = \alpha$, isto é, $(q) = \alpha \in \pi_{k-1}(SO(m))$.

A interpretação do J-homomorfismo

$$J: \pi_{k-1}(SO(m)) \rightarrow \pi_{m+k-1}(S^n)$$

dada em (6), §1. pag 349, nos fornece $Jc(v,f) = [\phi]$ onde $\phi: S^{m+k-1} \rightarrow S^m$ é a aplicação definida na observação 3.6.

Como Q^k é uma variedade diferenciável que satisfaz as condições i,ii,iii da observação 3.7., segue que ϕ é homotópica a zero, ou seja: $J\alpha = Jc(v,f) = 0$.

3.9. Observação:

Seja ξ um fibrado com fibra F , grupo estrutural G , espaço base K e projeção p . Seja a aplicação $h: F \rightarrow H$, onde H é um G -espaço e h é equivariante.

Então, é possível construir o fibrado associado ξ' com fibra H , espaço base K e projeção p' . Podemos supor que os fibrados ξ e ξ' tem as mesmas vizinhanças coordenadas $U_j, j \in J$. Para cada $j \in J$ sejam $\phi_j: U_j \times F \rightarrow p^{-1}(U_j)$ e $\phi'_j: U_j \times H \rightarrow p'^{-1}(U_j)$ as funções coordenadas de ξ e ξ' respectivamente.

Nessas condições, temos uma aplicação $\bar{h}$ do espaço total de ξ no espaço total de ξ' , definida por $\bar{h} = \phi'_j \circ g \circ \phi_j^{-1}$ onde $g(x) = (x, h(x))$, tal que o diagrama abaixo comuta:

$$\begin{array}{ccc}
 U_j \times F & \xrightarrow{g=(i,h)} & U_j \times H \\
 \downarrow \phi_j & \searrow & \downarrow \phi'_j \\
 \xi & \xrightarrow{\bar{h}} & \xi' \\
 \downarrow p & \searrow & \downarrow p' \\
 & K &
 \end{array}$$

Seja f uma seção de ξ restrita ao r -esqueleto de K e $c(\xi, f)$ a obstrução para a extensão de f ao $(r+1)$ -esqueleto de K . A aplicação $f' = \bar{h} \circ f$ é uma seção de ξ' restrita ao r -esqueleto de K . Se $c(\xi', f')$ é a obstrução para a extensão de f' , temos:

3.10. Proposição:

$h_* c(\xi, f) = c(\xi', f')$, onde h_* é um homomorfismo na cohomologia de K induzido pelo homomorfismo $\tilde{h}: \pi_r(F) \rightarrow \pi_r(H)$ e onde $\tilde{h}$ é o homomorfismo induzido em homotopia pela aplicação $h: F \rightarrow H$.

Demonstração:

Seja σ uma r -célula do r -esqueleto de K . Os fibrados ξ e ξ' restritos a σ são triviais. Assim, temos aplicações fibradas:

$$\phi_\sigma: \sigma \times F \rightarrow \xi_\sigma \quad \text{e} \quad \phi'_\sigma: \sigma \times H \rightarrow \xi'_\sigma$$

e aplicações

$$p_\sigma: \xi_\sigma \rightarrow F \quad \text{e} \quad p'_\sigma: \xi'_\sigma \rightarrow H$$

tais que:

$$\phi_\sigma(p(b), p_\sigma(b)) = b \quad \text{para} \quad b \in \xi_\sigma$$

$$\phi'_\sigma(p'(b'), p'_\sigma(b')) = b' \quad \text{para} \quad b' \in \xi'_\sigma$$

Então:

$$(p(b), p_\sigma(b)) = \phi_\sigma^{-1}(b) \quad \text{e} \quad (p'(b'), p'_\sigma(b')) = \phi'_\sigma{}^{-1}(b')$$

Sendo π_2 a projeção no segundo fator, temos que:

$$p_\sigma(b) = \pi_2 \circ \phi_\sigma^{-1}(b) \quad \text{e} \quad p'_\sigma(b') = \pi_2 \circ \phi'_\sigma{}^{-1}(b')$$

Se $b = f(x)$ e $b' = f'(x)$, onde $x \in \sigma$ e $\dot{\sigma}$ denota o bordo de σ então,

$$p_\sigma f(x) = \pi_2 \circ \phi_\sigma^{-1} f(x) \quad \text{e} \quad p'_\sigma f'(x) = \pi_2 \circ \phi'_\sigma{}^{-1} f'(x).$$

Portanto, podemos escrever o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 F & \xrightarrow{h} & H \\
 \pi_2 \uparrow & \curvearrowright & \uparrow \pi_2 \\
 \sigma \times F & \xrightarrow{g=(i,h)} & \sigma \times H \\
 \phi_\sigma \downarrow & \curvearrowright & \downarrow \phi'_\sigma \\
 \xi_\sigma & \xrightarrow{\bar{h}} & \xi'_\sigma \\
 \downarrow f & \swarrow p & \nwarrow p' \\
 & \sigma &
 \end{array}$$

ou seja, $h \circ \pi_2 \circ \phi_\sigma^{-1} \circ f = \pi_2 \circ \phi'_\sigma{}^{-1} \circ f'$

Desde que $c(\xi, f) = (p_\sigma \circ f / \dot{\sigma})$ e $c(\xi', f') = (p'_\sigma \circ f' / \dot{\sigma})$.

então:

$$\begin{aligned} h_* c(\xi, f) &= h_* (p_\sigma \circ f / \dot{\sigma}) = (h \circ p_\sigma \circ f / \dot{\sigma}) = (h \circ \pi_2 \circ \phi_\sigma^{-1} \circ f / \dot{\sigma}) = \\ &= (\pi_2 \circ \phi_\sigma^{-1} \circ f / \dot{\sigma}) = (p'_\sigma \circ f' / \dot{\sigma}') = c(\xi', f'). \end{aligned}$$

3.11. Proposição:

Seja ξ um fibrado com fibra $SO(m)$ e espaço base uma variedade diferenciável compacta K de dimensão $4n < m$.

Seja f uma seção de ξ restrita ao $(4n-1)$ esqueleto de K .

Então a classe de obstrução $c(\xi, f) \in H^{4n}(K, \pi_{4n-1}(SO(m)))$ relaciona-se com a classe de Pontrjagin $p_n(\xi)$, através da identidade:

$$p_n(\xi) = \pm a_n(2n-1)! c(\xi, f)$$

onde a_n é igual a 1 se n for par e a_n é igual a 2 se n for ímpar.

Demonstração:

Consideremos o fibrado complexo ξ' com fibra $U(m)$ e espaço base K associado a ξ . Denotemos por ξ'' o fibrado com fibra $\frac{U(m)}{U(2n-1)}$ e espaço base K associado a ξ' .

Seja $h: SO(m) \rightarrow U(m)$ a inclusão natural e $q: U(m) \rightarrow \frac{U(m)}{U(2n-1)}$ a projeção natural.

Pela proposição 3.10., a seção f induz seções f' e f'' restritas ao $(4n-1)$ esqueleto de K , tais que $h_*c(\xi, f) = c(\xi', f')$ e $q_*c(\xi', f') = c(\xi'', f'')$ ou seja, $q_*h_*c(\xi, f) = c(\xi'', f'')$ onde h_* e q_* são homomorfismos na cohomologia de K , induzidos pelos homomorfismos

$$h: \pi_{4n-1}(SO(m)) \rightarrow \pi_{4n-1}(U(m)) \quad e$$

$$\tilde{q}: \pi_{4n-1}(U(m)) \rightarrow \pi_{4n-1}\left(\frac{U(m)}{U(2n-1)}\right)$$

respectivamente.

De acordo com a definição 1.24., a classe de Chern $c_{2n}(\xi')$ é igual à obstrução $c(\xi'', f'')$ ou seja,

$$c_{2n}(\xi') = c(\xi'', f'').$$

Por definição, $p_n(\xi) = \pm c_{2n}(\xi')$. Logo,

$$p_n(\xi) = \pm q_*h_*c(\xi, f).$$

$SO(m)$ é um subgrupo de $U(m)$. Considerando o quociente

$$\begin{array}{ccc} \frac{U(m)}{SO(m)} & , \text{ temos o fibrado } SO(m) \hookrightarrow U(m) & \\ & \downarrow p & \\ & \frac{U(m)}{SO(m)} & \end{array}$$

Seja:

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow \pi_{4n-1}(SO(m)) &\xrightarrow{\tilde{h}} \pi_{4n-1}(U(m)) \xrightarrow{p\#} \pi_{4n-1}\left(\frac{U(m)}{SO(m)}\right) \rightarrow \\ &\rightarrow \pi_{4n-2}(SO(m)) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

a sequência exata de homotopia desse fibrado.

Usando as computações de R. Bott:

$$\pi_{4n-1}(U(m)) \cong \mathbb{Z}, \pi_{4n-2}(SO(m)) = 0, \pi_{4n-1}\left(\frac{U(m)}{SO(m)}\right) \cong \mathbb{Z}_{a_n} \text{ onde}$$

$a_n = 1$ se n for ímpar e $a_n = 2$ se n for par, temos que a aplicação p_* é sobrejetora. Portanto, $\tilde{h}$ é a multiplicação por a_n .

Também, $U(2n-1)$ é um subgrupo de $U(m)$. Considerando o quociente $\frac{U(m)}{U(2n-1)}$ temos o fibrado $U(2n-1) \hookrightarrow U(m)$

$$\downarrow q$$

$$\frac{U(m)}{U(2n-1)}$$

Seja:

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow \pi_{4n-1}(U(m)) \xrightarrow{\tilde{q}} \pi_{4n-1}\left(\frac{U(m)}{U(2n-1)}\right) \xrightarrow{\Delta} \pi_{4n-2}(U(2n-1)) \rightarrow \\ \rightarrow \pi_{4n-2}(U(m)) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

a sequência exata de homotopia desse fibrado.

Usando as computações de R. Bott:

$$\pi_{4n-2}(U(2n-1)) \cong \mathbb{Z}_{(2n-1)!}, \pi_{4n-2}(U(m)) = 0, \text{ temos que a}$$

aplicação Δ é sobrejetora. Portanto, $\tilde{q}$ é a multiplicação por $(2n-1)!$

Podemos então formar o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} H^{4n}(K, \pi_{4n-1}(SO(m))) \cong \pi_{4n-1}(SO(m)) \cong \mathbb{Z} & & \\ \downarrow h_* & & \downarrow \tilde{h} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} H^{4n}(K, \pi_{4n-1}(U(m))) \cong \pi_{4n-1}(U(m)) \cong \mathbb{Z} & & \\ \downarrow q_* & & \downarrow \tilde{q} \end{array}$$

$$H^{4n}(K, \pi_{4n-1}(\frac{U(m)}{U(2n-1)})) \cong \pi_{4n-1}(\frac{U(m)}{U(2n-1)}) \cong \mathbb{Z}$$

e concluir que $q_* h_* c(\xi, f) = a_n(2n-1)! c(\xi, f)$.

Assim, $p_n(\xi) = \pm a_n(2n-1)! c(\xi, f)$ onde $a_n = 1$ se n for ímpar e $a_n = 2$ se n for par.

3.12. Definição:

Definimos j_n como sendo a ordem do grupo cíclico finito $J\pi_{4n-1}(SO(m))$, $m > 4n$.

3.13. Teorema:

O número de Pontrjagin $p_1(M)$ de uma variedade diferenciável compacta quase paralelizável M de dimensão 4, é divisível por 48.

Demonstração:

A variedade M^4 pode ser mergulhada diferenciavelmente em R^{4+m} , $m \geq 5$.

Seja ν o fibrado normal de M^4 em R^{4+m} e f uma seção do fibrado principal associado ao fibrado normal restrito a $M-x_0$.

Pela proposição 3.8., $Jc(\nu, f) = 0$ onde $c(\nu, f) \in \pi_3(SO(m)) \cong Z$ é a obstrução para a extensão de f . Logo $c(\nu, f)$ é divisível por j_1 , onde j_1 é a ordem do grupo ciclico finito $J\pi_3(SO(m)) = \pi_{m+3}(S^m)$.

Desde que $m > 5$, temos que $\pi_{m+3}(S^m) \cong Z_{24}$. ([4], pag 330).

Logo, $c(\nu, f)$ é divisível por 24.

Pela proposição 3.11., decorre que:

$$p_1(\nu) = \pm a_1 c(\nu, f)$$

Sendo $a_1 = 2$, pois 1 é ímpar, segue que $p_1(\nu)$ é divisível por 48.

Sabemos que $\tau_m \oplus \nu$ é trivial. Então $p(\tau_m \oplus \nu) = 1$. Como $p_1(\tau_m \oplus \nu) \in H^4(M, Z) \cong Z$ e Z é um grupo sem torção, temos que $p_1(M) = -p_1(\nu)$.

Portanto, $p_1(M)$ é divisível por 48.

3.14. Teorema de Rohlin:

Seja M^4 uma variedade diferenciável compacta de dimensão 4. Se a classe de Stiefel-Whitney $w_2(M)$ é nula, então $I(M) \equiv 0 \pmod{16}$.

Demonstração:

Sendo M variedade orientável com $w_2(M) = 0$, temos pela proposição 3.1. que M é quase paralelizável.

Pelo teorema 3.13, temos que $p_1(M)$ é divisível por 48. Como $I(M) = \frac{1}{3} p_1(M)$ (esse fato segue do teorema 4.7 e do corolário 4,6 que serão demonstrados no capítulo 4), então $I(M)$ é divisível por 16, isto é, $I(M) \equiv 0 \pmod{16}$.

§2. Teorema de Kervaire e Milnor

3.15. Definição:

Seja M uma variedade diferenciável compacta de dimensão 4. Consideremos o homomorfismo redução módulo 2:

$$\rho_2: H^2(M, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(M, \mathbb{Z}_2)$$

Diremos então que uma classe de homologia $\xi \in H^2(M, \mathbb{Z})$ é dual à classe de Stiefel-Whitney $w_2(M) \in H^2(M, \mathbb{Z}_2)$ se, e somente se, $\rho_2(\xi) = w_2(M)$.

3.16. Lema:

Sejam $\xi \in H^2(M, \mathbb{Z})$ dual à classe de Stiefel - Whitney $w_2(M) \in H^2(M, \mathbb{Z}_2)$ e $g: N^2 \rightarrow M^4$ um mergulho diferenciável representando ξ . Seja B vizinhança tubular de N^2 em M^4 .

Então $w_2(M-B) = 0$.

Demonstração:

A inclusão $i: M-B \rightarrow M$ é coberta por uma aplicação fibrada $\tau_{M-B} \rightarrow \tau_M$ entre os fibrados tangentes τ_{M-B} e τ_M .

Pela naturalidade das classes de Stiefel-Whitney $i^*(w_2(M)) = w_2(M-B)$.

A hipótese nos fornece que $\rho_2(\xi) = w_2(M)$ e $g_*(N) = \xi \cap (M)$.

Então $g_*(N) = w_2(M) \cap (M)$ com coeficientes em Z_2 .

As inclusões $M-B \xrightarrow{i} M \xrightarrow{j} (M, M-B)$ induzem a sequência exata

$$\begin{array}{ccccc} \dots \rightarrow H^2(M, M-B, Z_2) & \xrightarrow{j^*} & H^2(M, Z_2) & \xrightarrow{i^*} & H^2(M-B, Z_2) \rightarrow \dots \\ \downarrow D_1 & & \downarrow D_2 & & \downarrow D_3 \\ \rightarrow H_2(B, Z_2) & \xrightarrow{k_*} & H_2(M, Z_2) & \xrightarrow{\ell_*} & H_2(M, B, Z_2) \rightarrow \dots \end{array}$$

onde D_1, D_2, D_3 são os isomorfismos fornecidos pelo Teorema de Dualidade.

Portanto, $D_3 i^*(w_2(M)) = \ell_* D_2(w_2(M))$ ou seja $D_3(w_2(M-B)) = \ell_*(w_2(M) \cap (M))$.

Como N e B têm o mesmo tipo de homotopia, temos que $k_*(B) = g_*(N) = w_2(M) \cap (M)$. Logo, $D_3(w_2(M-B)) = \ell_* k_*(B)$.

O fato da segunda sequência do diagrama acima ser exata, implica que $\ell_* k_*(B) = 0$.

Assim, $D_3(w_2(M-B)) = 0$. Sendo D_3 um isomorfismo, temos em decorrência que $w_2(M-B) = 0$.

3.17. Lema:

O complementar de um disco aberto D^{2n+2} em $CP(N+1)$ é o espaço total de um fibrado sobre $CP(N)$, com fibra D^2 .

Demonstração:

Por 1.9., sabemos que S^{2n+1} se fibra sobre $CP(N)$ com fibra S^1 relativamente a H , onde H é a aplicação de Hopf.

Seja $A = S^{2n+1} \times I \cup_H CP(N)$, onde H é a fibração de Hopf no nível 0 e $I = (0,1)$. Definamos $\tilde{H}: A \rightarrow CP(N)$ por $\tilde{H}(x,t) = H(x)$.

Então, $D^2 \hookrightarrow A$ é o fibrado em disco associado do

$$\begin{array}{c} \downarrow \tilde{H} \\ CP(N) \end{array}$$

fibrado: $S^1 \hookrightarrow S^{2n+1} \simeq \partial A$.

$$\begin{array}{c} \downarrow H \\ CP(N) \end{array}$$

Se mostrarmos que A é o complementar de D^{2n+2} em $CP(N+1)$ ou seja, se mostrarmos que $A \cup_i D^{2n+2} \cong CP(N+1)$ onde $i: S^{2n+1} \rightarrow S^{2n+1} \times \{1\}$, o lema estará provado.

Colemos D^{2n+2} a $S^{2n+1} \times I$ usando i ; obtemos assim, uma variedade difeomorfa ao disco D^{2n+2}

Em seguida, colemos tal disco a $CP(N)$ via $H: S^{2n+1} \times \{0\} \rightarrow CP(N)$.

Obtemos assim o espaço $CP(N) \cup_H D^{2n+2}$ tal que $CP(N) \cup_H D^{2n+2} \cong CP(N+1)$.

Logo, $A \cup_i D^{2n+2} \cong CP(N+1)$

3.18. Proposição:

Sejam ξ_1 e ξ_2 dois fibrados sobre S^2 com fibra S^1 e grupo estrutural S^1 . Então ξ_1 é equivalente a ξ_2 se, e somente se, as classes de Euler dos fibrados em disco associados são iguais.

Demonstração:

Pelo teorema 1.33., as classes de equivalência dos fibrados sobre S^2 com grupo S^1 , estão em correspondência biunívoca com as classes de equivalência dos elementos de $\pi_1(S^1) \cong Z$. Essa correspondência é dada por $\xi \rightarrow X(\alpha)$ onde α é um gerador de $\pi_2(S^2) \cong Z$ e $X: \pi_2(S^2) \rightarrow \pi_1(S^1)$ é o homomorfismo característico do fibrado

$$S^1 \xrightarrow{k} \xi$$

$$\downarrow$$

$$S^2.$$

No caso em questão, X se identifica com o homomorfismo Δ da sequência exata de homotopia:

$$\dots \rightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow{\Delta} \pi_1(S^1) \xrightarrow{k_*} \pi_1(\xi) \longrightarrow \pi_1(S^2).$$

Seja $D^2 \hookrightarrow \bar{\xi}$ o fibrado em disco associado ao fibrado ξ .

$$\downarrow$$

$$S^2$$

Pela dualidade de Lefschetz, $H_2(\bar{\xi}, Z) \cong H^2(\bar{\xi}, \partial\bar{\xi}=\xi, Z) \cong Z$.

A classe de Thom é definida como sendo a única classe $\mu \in H^2(\bar{\xi}, \xi, Z)$, cuja restrição $\mu|_{(D^2, S^1)} \in H^2(D^2, S^1, Z)$ é o gerador escolhido μ_{D^2} para cada fibra D^2 de $\bar{\xi}$.

Seja $\tilde{i}^*: H^2(\bar{\xi}, \xi, Z) \longrightarrow H^2(D^2, S^1, Z)$,

$$\mu \longrightarrow \tilde{i}^*(\mu) = \mu_{D^2}$$

induzido pela inclusão da fibra $\tilde{i}: (D^2, S^1) \longrightarrow (\bar{\xi}, \xi)$.

Desde que $H^2(D^2, S^1, Z) \cong Z$ e $\tilde{i}^*(\mu) = \mu_{D^2}$ onde μ_{D^2} é gerador de $H^2(D^2, S^1, Z)$ então $\tilde{i}^*$ é sobrejetora.

Assim, μ é um gerador de $H^2(\bar{\xi}, \xi, Z)$.

As inclusões $\xi \xrightarrow{i} \bar{\xi} \xrightarrow{j} (\bar{\xi}, \xi)$ induzem a sequência exata:

$$\dots H^1(\xi, Z) \rightarrow H^2(\bar{\xi}, \xi, Z) \xrightarrow{j^*} H^2(\bar{\xi}, Z) \xrightarrow{i^*} H^2(\xi, Z) \rightarrow H^3(\bar{\xi}, \xi, Z) \rightarrow \dots$$

Pela dualidade de Lefschetz temos que $H^3(\bar{\xi}, \xi, Z) \cong H_1(\bar{\xi}, Z) = 0$. Logo, i^* é sobrejetora e a sequência acima se resume em:

$$\dots \rightarrow H^2(\bar{\xi}, \xi, Z) \xrightarrow{j^*} H^2(\bar{\xi}, Z) \xrightarrow{i^*} H^2(\xi, Z) \rightarrow 0$$

Analisemos mais adequadamente a sequência exata de homotopia do fibrado ξ :

$$\dots \rightarrow \pi_2(S^1) \rightarrow \pi_2(\xi) \rightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow{\Delta} \pi_1(S^1) \xrightarrow{k^*} \pi_1(\xi) \rightarrow 0$$

Sendo $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ e k^* sobrejetora, temos que $\pi_1(\xi)$ é abeliano e mais ainda, $\pi_1(\xi) \cong \mathbb{Z}_n$ para algum n .

Sabemos que o quociente de $\pi_1(\xi)$ pelo seu subgrupo comutador é isomorfo a $H_1(\xi, \mathbb{Z})$. Então, $\pi_1(\xi) \cong H_1(\xi, \mathbb{Z})$.

Pela dualidade de Poincaré temos que $H^2(\xi, \mathbb{Z}) \cong H_1(\xi, \mathbb{Z})$. Logo, $H^2(\xi, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_n$ para algum inteiro n e portanto j^* é multiplicação por n ou seja, $j^*(\mu) = n\alpha$ onde α é um gerador de $H^2(\xi, \mathbb{Z})$.

A menos do isomorfismo de Hurewicz $h: H_2(S^2, \mathbb{Z}) \leftrightarrow \pi_2(S^2)$, o homomorfismo Δ é um elemento pertencente ao $\text{Hom}(H_2(S^2, \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$ que pelo teorema dos coeficientes universais é isomorfo a $H^2(S^2, \mathbb{Z})$.

$$\begin{array}{ccc} \pi_2(S^2) & \xrightarrow{\Delta} & \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \\ h \updownarrow & \nearrow & \\ H_2(S^2, \mathbb{Z}) & & \end{array}$$

Decorre ainda da sequência exata de homotopia do fibrado ξ que $\frac{\pi_1(S^1)}{\ker k^*} \cong \pi_1(\xi) \cong \mathbb{Z}_n$. Como $\ker k^* = \text{im } \Delta$ então

$\Delta(\gamma) = n$ onde $\gamma \in \pi_2(S^2)$ é um gerador.

Se provarmos que $\Delta oh = e(\bar{\xi})$ onde $e(\bar{\xi})$ é a classe de Euler do fibrado $\bar{\xi}$, estará provado que o fibrado ξ sobre S^2 com fibra S^1 e grupo estrutural S^1 , podem ser classificados pelas classes de Euler dos respectivos fibrados $\bar{\xi}$ em disco associados isto é, se ξ_1 e ξ_2 são fibrados com fibra S^1 e grupo estrutural S^1 sobre S^2 então, eles são equivalentes $\Leftrightarrow e(\bar{\xi}_1) = e(\bar{\xi}_2)$.

Provemos pois que $\Delta oh = e(\bar{\xi})$. Para isto, basta avaliar ambas as classes num gerador de $H_2(S^2, \mathbb{Z})$.

Antes, observemos que $e(\bar{\xi}) = \phi^* j^*(\mu)$ onde ϕ^* é o inverso do isomorfismo $p^*: H^2(S^2, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(\bar{\xi}, \mathbb{Z})$, induzido pela projeção $p: \bar{\xi} \rightarrow S^2$.

Assim, $e(\bar{\xi}) = \phi^* j^*(\mu) = \phi^*(n\alpha) = n\phi^*(\alpha) = n\alpha'$ onde α' é um gerador $H^2(S^2, \mathbb{Z})$.

$$\begin{array}{ccc}
 H^2(S^2, \mathbb{Z}) & \xleftarrow{\phi^*} & H^2(\bar{\xi}, \mathbb{Z}) \\
 \nearrow & \xrightarrow[p^*]{} & \downarrow j^* \\
 & & H^2(\bar{\xi}, \xi, \mathbb{Z})
 \end{array}$$

Portanto, $\langle e(\bar{\xi}), (S^2) \rangle = \langle n\alpha', (S^2) \rangle = n$.

Sendo $(S^2) \in H_2(S^2, \mathbb{Z})$ um gerador e h um isomorfismo, temos que $h(S^2) = \gamma$ onde γ é um gerador de $\pi_2(S^2)$.

Logo, $\Delta oh(S^2) = \Delta(\gamma) = n$.

3.19. Lema:

Consideremos o mergulho $i: CP(N) \rightarrow CP(N+1)$, $N \geq 1$. Se $\alpha \in H^2(CP(N+1), \mathbb{Z})$ é um gerador então:

a) $i^*(\alpha) = e(v_i)$ onde $e(v_i)$ denota a classe de Euler do fibrado normal de $CP(N)$ em $CP(N+1)$.

b) $e(v_i) \in H^2(CP(N), \mathbb{Z})$ é um gerador.

Demonstração:

Consideremos v_i o fibrado normal de $CP(N)$ em $CP(N+1)$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ CP(N) \end{array}$$

cujos bordo ∂v_i , considerado como fibrado normal em esferas, é a fibração de Hopf.

Do lema 3.17, temos que $CP(N+1) - D^{2n+2} \cong \mathbb{O}^{2n+2}$ é o fibrado em

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ CP(N) \end{array}$$

disco associado ao fibrado de Hopf. Assim, $v_i \cong CP(N+1) - D^{2n+2}$

Se $e(v_i)$ é a classe de Euler do fibrado normal de $CP(N)$ em $CP(N+1)$ então por definição, $e(v_i) = \pi^{*-1} j^*(\mu)$ onde $\mu \in H^2(v_i, \partial v_i, \mathbb{Z}) \cong H^2(CP(N+1), \mathbb{Z})$ é a classe de Thom e $j^*: H^2(v_i, \partial v_i, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(v_i, \mathbb{Z})$ é o homomorfismo induzido pela inclusão natural $j: v_i \rightarrow (v_i, \partial v_i)$.

Desde que a aplicação $c: (v_i, \partial v_i) \rightarrow \frac{v_i}{\partial v_i}$ induz o isomorfismo $c^*: H^2(v_i, \partial v_i, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(\frac{v_i}{\partial v_i}, \mathbb{Z})$, podemos formar

o diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 H^2(CP(N), Z) & \xrightarrow{\pi^*} & H^2(v_i, Z) \\
 & \nearrow i^* & \uparrow j^* \\
 & & H^2(v_i, \partial v_i, Z) \\
 & \nearrow & \uparrow c^* \\
 & & H^2(\frac{v_i}{\partial v_i}, Z) \simeq H^2(CP(N+1), Z)
 \end{array}$$

Assim, se $\alpha \in H^2(CP(N+1), Z)$ é um gerador então:

$$i^*(\alpha) = \pi^{*-1} j^* c^*(\alpha) = \pi^{*-1} j^*(\mu) = e(v_i)$$

Falta mostrar que $e(v_i) \in H^2(CP(N), Z)$ é um gerador.

Consideremos as inclusões:

$$CP(N) \xrightarrow{i} CP(N+1) \xrightarrow{k} (CP(N+1), CP(N))$$

Elas induzem em nível de cohomologia a sequência exata:

$$\dots \rightarrow H^2(CP(N+1), CP(N)) \xrightarrow{k^*} H^2(CP(N+1)) \xrightarrow{i^*} H^2(CP(N)) \rightarrow$$

$$\rightarrow H^3(CP(N+1), CP(N)) \rightarrow \dots$$

Temos que:

$$H^2(\mathbb{CP}(N+1), \mathbb{CP}(N)) \cong H^2\left(\frac{\mathbb{CP}(N+1)}{\mathbb{CP}(N)}\right) \cong H^2\left(\frac{\mathbb{CP}(N) \cup_H D^{2n+2}}{\mathbb{CP}(N)}\right) \cong$$

$$H^2(S^{2n+2}) = 0.$$

$$H^3(\mathbb{CP}(N+1), \mathbb{CP}(N)) \cong H^3(S^{2n+2}) = 0$$

Portanto, i^* é um isomorfismo. Como $\alpha \in H^2(\mathbb{CP}(N+1), \mathbb{Z})$ é um gerador e i^* leva gerador em gerador, concluímos que $e(v_i)$ é um gerador de $H^2(\mathbb{CP}(N), \mathbb{Z})$.

3.20. Teorema de Kervaire e Milnor:

Seja M uma variedade diferenciável compacta de dimensão 4. Seja $\xi \in H^2(M, \mathbb{Z})$ a classe de homologia dual à classe de Stiefel-Whitney $w_2(M) \in H^2(M, \mathbb{Z}_2)$. Se ξ é representada por um mergulho diferenciável de esfera S^2 em M então, o número de auto-intersecções $\xi \cdot \xi$ deve ser congruente a $I(M)$ módulo 16.

Demonstração:

Suponhamos $\xi \cdot \xi$ não positivo. Podemos supor isso pois se $\xi \cdot \xi > 0$, consideramos $\tilde{M} = -M$.

Chamemos $s = -\xi \cdot \xi$. Seja $L = \mathbb{CP}_1(2) \# \dots \# \mathbb{CP}_{s+1}(2)$ a soma conexa de $(s+1)$ cópias do $\mathbb{CP}(2)$, com $\alpha_i \in H^2(\mathbb{CP}_i(2), \mathbb{Z})$

um gerador. Seja $M_1 = M \# L$.

Para cada $CP_i(2)$, temos um mergulho da esfera S^2 em $CP_i(2)$ representando α_i . Assim, temos um mergulho da esfera S^2 em L representando $\alpha_1 \oplus \dots \oplus \alpha_{s+1}$. Por hipótese, ξ é representada por um mergulho da esfera S^2 em M .

Conectemos essas duas esferas por uma vizinhança tubular de um caminho que as une. Usando o isomorfismo natural:

$$t: H^2(M, \mathbb{Z}) \oplus H^2(CP_1(2), \mathbb{Z}) \oplus \dots \oplus H^2(CP_{s+1}(2), \mathbb{Z}) \rightarrow$$

$H^2(M_1, \mathbb{Z})$ seja $\eta = t(\xi \oplus \alpha_1 \oplus \dots \oplus \alpha_{s+1})$. Notemos

$$\text{que } \eta \cdot \eta = \xi \cdot \xi + \sum_{i=1}^{s+1} \alpha_i^2 = -s + s + 1 = 1.$$

Assim, concluímos que η pode ser representada por um mergulho diferenciável $g: S^2 \rightarrow M_1$.

Consideremos o mergulho $S^2 \cong CP(1) \xrightarrow{i} CP(2)$ e seja ν_i o fibrado normal de $CP(1)$ em $CP(2)$ cujo bordo $\partial \nu_i$, com
 $\downarrow$
 $CP(1)$

siderado como o fibrado normal em esferas S^1 , é a fibração de Hopf.

Do lema 3.17., temos que $CP(2) \cong D^4$ se fibra sobre $CP(1)$ com fibra D^2 e que, o fibrado em esferas associado, é

a fibração de Hopf.

Então $v_i \cong \mathbb{CP}(2) - \overset{0}{D}^4$.

Seja v_g o fibrado normal de S^2 em M_1 . Afiramos que

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ S^2 \end{array}$$

a classe de Euler $e(v_g) \in H^2(S^2, \mathbb{Z})$ é um gerador.

De fato, pelo lema 3.19., temos que $i^*(\alpha) = e(v_i)$; pelo teorema 2.9., temos que $g_*(S^2) = \eta \cap (M_1)$ e pelo teorema 1.3. que, $j^*(e(v_i)) = e(v_g)$.

Assim, $e(v_g) = j^*(e(v_i)) = j^*(i^*(\alpha)) = (ioj)^*(\alpha) =$
 $= (qog)^*(\alpha) = g^*q^*(\alpha) = g^*(\eta)$. isto é,

$e(v_g)(S^2) = g^*(\eta)(S^2) = \langle g^*(\eta), (S^2) \rangle = \langle \eta, g_*(S^2) \rangle =$

$= \langle \eta, \eta \cap (S^2) \rangle = \langle \eta, \eta, (S^2) \rangle = 1$.

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \xrightarrow{q} & \mathbb{CP}(2) \\ g \uparrow & & \uparrow i \\ S^2 & \xrightarrow{j} & \mathbb{CP}(1) \cong S^2 \end{array}$$

Agora, pela proposição 3.18., concluímos que o fibrado normal em esferas S^1 associado a v_g é a fibração de Hopf.

Logo, $v_g \cong \mathbb{CP}(2) - \overset{0}{D}^4$.

Seja $M_2 = (M_1 - \overset{0}{v}_g) \cup_{I_{S^3}} \overset{0}{D}^4$. Temos que:

$M_2 \# \mathbb{CP}(2) \cong (M_2 - \overset{0}{D}^4) \cup (\mathbb{CP}(2) - \overset{0}{D}^4) \cong (M_2 - \overset{0}{D}^4) \cup \overset{0}{v}_g \cong M_1$ ou

seja, M_1 é difeomorfa à soma conexa $M_2 \# CP(2)$.

Então, $I(M_1) = I(M_2) + 1$, pois $I(CP(2)) = 1$.

A inclusão $k: M_1 - \overset{0}{V}_g \rightarrow M_2$ é coberta por uma aplicação fibrada de $\tau_{M_1 - \overset{0}{V}_g}$ em τ_{M^2} .

$$\begin{array}{ccc} \tau_{M_1 - \overset{0}{V}_g} & \xrightarrow{\quad} & \tau_{M_2} \\ \downarrow & \curvearrowright & \downarrow \\ M_1 - \overset{0}{V}_g & \xrightarrow{k} & M^2 \end{array}$$

Pela naturalidade das classes de Stiefel-Whitney, $k^*(w_2(M_2)) = w_2(M_1 - \overset{0}{V}_g)$.

Pelo lema 3.16., temos que $w_2(M_1 - \overset{0}{V}_g) = 0$. Assim, $k^*(w_2(M_2)) = 0$.

Consideremos a sequência exata:

$$\dots \rightarrow H^1((M_1 - \overset{0}{V}_g) \cap D^4) \rightarrow H^2((M_1 - \overset{0}{V}_g) \cup_{I_{S^3}} D^4) \xrightarrow{k^*} H^2(M_1 - \overset{0}{V}_g) \rightarrow \dots$$

Como $H^1((M_1 - \overset{0}{V}_g) \cap D^4) \cong H^1(S^3) = 0$, segue que k^* é injetiva. Por conseguinte, $w_2(M_2) = 0$.

Portanto, pelo teorema de Rohlin, $I(M_2) \equiv 0 \pmod{16}$ e daí $I(M_1) \equiv 1 \pmod{16}$.

Sendo $M_1 = M \# L$ e L a soma conexa de $s + 1$ cópias do espaço projetivo complexo, temos que:

$$I(M_1) = I(M) + s + 1 = I(M) - \xi\xi + 1$$

ou seja, $I(M) - \xi\xi + 1 \equiv 1 \pmod{16}$, isto é,

$$\xi\xi \equiv I(M) \pmod{16} \qquad \text{c.q.d.}$$

CAPÍTULO 4

Neste capítulo apresentaremos exemplos de variedades que satisfazem o Teorema de Rohlin e faremos algumas aplicações do Teorema de Kervaire e Milnor.

Antes, porém, reuniremos alguns fatos básicos sobre sequência multiplicativa, os quais constituem ferramentas básicas para o desenvolvimento deste capítulo.

§1. Sequência Multiplicativa

4.1. Definição:

Seja A um anel comutativo com elemento unidade. Sejam $p_0 = 1$ e $p_1, p_2, \dots$ indeterminadas.

Consideremos $\mathcal{A} = A(p_1, p_2, \dots)$ o anel de polinômios nas indeterminadas $p_1, p_2, \dots$ com coeficientes em A .

O produto $p_1^{j_1} p_2^{j_2} \dots p_r^{j_r}$ tem peso $j_1 + 2j_2 + \dots + rj_r$ e $\mathcal{A} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{A}_k$ onde $\mathcal{A}_k$ é o grupo aditivo desses polinômios que contêm somente termos de peso k e $\mathcal{A}_0 = A$. O grupo $\mathcal{A}_k$ é um módulo sobre A , cujo posto é igual ao número $\pi(k)$ de partições de k .

4.2. Definição:

Seja $\{K_j\}$ uma sequência de polinômios nas indeterminadas p_i com $K_0 = 1$ e $K_j \in \mathcal{A}_j (j=0,1,\dots)$. A sequência $\{K_j\}$ é chamada uma sequência multiplicativa (ou m-sequência), se toda igualdade:

$$1 + p_1 Z + p_2 Z^2 + \dots = (1 + p'_1 Z + p'_2 Z^2 + \dots)(1 + p''_1 Z + p''_2 Z^2 + \dots)$$

com Z , p'_i , p''_i indeterminadas, implicar na igualdade

$$\sum_{r=0}^{\infty} K_r(p_1, \dots, p_r) Z^r = \sum_{i=0}^{\infty} K_i(p'_1, \dots, p'_i) Z^i \cdot \sum_{j=0}^{\infty} K_j(p''_1, \dots, p''_j) Z^j$$

Numa notação abreviada, podemos escrever:

$$K\left(\sum_{j=0}^{\infty} p_j Z^j\right) = \sum_{j=0}^{\infty} K_j(p_1, \dots, p_j) Z^j$$

4.3. Definição:

A série de potências $K(1+Z) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i Z^i$ ($b_0 = 1, b_i = K_i(1, 0, \dots, 0) \in A$) é chamada série de potências característica da m-sequência $\{K_j\}$.

4.4. Lema:

A m-sequência $\{K_j\}$ é completamente determinada por sua série de potências característica $Q(Z) = K(1+Z)$.

Demonstração:

Consideremos a fatorização:

$$1 + p_1 Z + \dots + p_m Z^m = \prod_{i=1}^m (1 + \beta_i Z^m).$$

Os elementos p_i são pois, olhados como funções simétricas elementares em $\beta_1, \dots, \beta_m$. O anel $\mathcal{A}$ é então o anel de todos os polinômios simétricos em $\beta_1, \dots, \beta_m$ com coeficientes em A .

Temos que:

$$\sum_{j=0}^m K_j(p_1, \dots, p_j) Z^j + \sum_{j=m+1}^{\infty} K_j(p_1, \dots, p_m, 0, \dots, 0) Z^j.$$

$$\begin{aligned} & 1 + K_1(p_1)Z + K_2(p_1, p_2)Z^2 + \dots + K_m(p_1, \dots, p_m)Z^m + \\ & + K_{m+1}(p_1, \dots, p_m, 0)Z^{m+1} + K_{m+2}(p_1, \dots, p_m, 0, 0)Z^{m+2} + \dots = \\ & K(1 + p_1 Z + p_2 Z^2 + \dots + p_m Z^m + 0Z^{m+1} + 0Z^{m+2} + \dots) = \end{aligned}$$

$$= K\left(\sum_{i=1}^m p_i Z^i\right) = K\left(\prod_{i=1}^m (1 + \beta_i Z)\right) = \prod_{i=1}^m K(1 + \beta_i Z) = \prod_{i=1}^m Q(\beta_i Z)$$

Assim, qualquer polinômio K_j com $j \leq m$ é determinada como um polinômio simétrico em β_i e assim como um polinômio simétrico em p_i . Isso vale para todo m .

Logo, a prova está completa.

4.5. Lema:

Para toda série de potências $Q(Z) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i Z^i$ ($b_0 = 1$, $b_i \in A$), existe uma m -sequência $\{K_j\}$ associada, com $K(1+Z) = Q(Z)$.

Demonstração:

Consideremos a fatorização: $1 + p_1 Z + p_2 Z^2 + \dots + p_m Z^m = \prod_{i=1}^m (1 + \beta_i Z)$ e o produto $\prod_{i=1}^m Q(\beta_i Z)$.

O coeficiente de Z^j neste produto é simétrico nos β_i e homogêneo de peso j . Então, pode ser expresso como um polinômio $K_j^{(m)}(p_1, \dots, p_j)$ de peso j , de um único modo. Como K_j^m não depende de m para $m \geq j$, definimos $K_j = K_j^m$ para $m \geq j$. A sequência $\{K_j\}$ é a sequência multiplicativa procurada.

(para maior detalhes, consultar (3), pag 10).

Observação:

Os lemas 4.4 e 4.5, mostram que existe uma correspondência biunívoca entre as m -sequências e as séries de potências com primeiro termo constante e igual a 1.

4.6. Corolário:

Dada a série de potências:

$$Q(Z) = \frac{\sqrt{Z}}{\operatorname{tgh}\sqrt{Z}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{K-1} \frac{2^{2K}}{(2K)!} B_K Z^K =$$

$$= 1 + 2B_1 Z - \frac{2}{3} B_2 Z^2 + \frac{4}{45} B_3 Z^3 - \frac{2}{315} B_4 Z^4 + \dots \text{ onde os}$$
 coeficientes B_K são os números de Bernoulli: $B_1 = \frac{1}{6}$,
 $B_2 = \frac{1}{30}$, $B_3 = \frac{1}{42}$, $B_4 = \frac{1}{30}$, $B_5 = \frac{5}{66}$, etc ... então,
 existe uma e somente uma sequência multiplicativa com $Q(Z)$
 como série de potências característica. Essa sequência mul-
 tiplicativa é denotada por $\{L_j(p_1, \dots, p_j)\}$ e os quatro
 primeiros termos dela são:

$$L_1 = \frac{1}{3} p_1$$

$$L_2 = \frac{1}{45} (7p_2 - p_1^2)$$

$$L_3 = \frac{1}{3^3 \cdot 5 \cdot 7} (62p_3 - 13p_2 p_1 + 2p_1^3)$$

$$L_4 = \frac{1}{3^4 \cdot 5^2 \cdot 7} (381p_4 - 71p_3 p_1 - 19p_2^2 + 22p_2 p_1^2 - 3p_1^4)$$

Demonstração:

A existência e unicidade da sequência multiplicativa
 $\{L_j(p_1, \dots, p_j)\}$ decorrem imediatamente dos lemas 4.4 e 4.5.

Vamos usar o lema 4.5, e calcular os dois primeiros

termos L_1 e L_2 da m-sequência $\{L_j\}$.

Seja $m = 1$. Então $L_j = L_j^1$ para $1 \geq j$, isto é $L_1 = L_1^1$.

Considerando a fatorização $1 + p_1 Z = 1 + \beta_1 Z$, temos que:

$$1 + L_1(p_1)Z + \sum_{j=2}^{\infty} L_j(p_1, 0, \dots, 0)Z^j = Q(\beta_1 Z) = Q(p_1 Z) =$$

$$= 1 + 2B_1 p_1 Z - \frac{2}{3} B_2 p_1^2 Z^2 + \dots$$

Então $L_1(p_1) = 2B_1 p_1 = 2 \cdot \frac{1}{6} p_1$ e portanto $L_1(p_1) = \frac{1}{3} p_1$

Seja $m = 2$. Então $L_j = L_j^2$ para $2 \geq j$, isto é, $L_1 = L_1^2$, $L_2 = L_2^2$.

Considerando a fatorização $1 + p_1 Z + p_2 Z^2 = (1 + \beta_1 Z)(1 + \beta_2 Z)$

temos:

$$1 + L_1(p_1)Z + L_2(p_1, p_2)Z^2 + \sum_{j=3}^{\infty} L_j(p_1, p_2, 0, \dots, 0)Z^j =$$

$$= Q(\beta_1 Z)Q(\beta_2 Z) =$$

$$= (1 + 2B_1 \beta_1 Z - \frac{2}{3} B_2 \beta_1^2 Z^2 + \dots)(1 + 2B_1 \beta_2 Z - \frac{2}{3} B_2 \beta_2^2 Z^2 + \dots) =$$

$$= 1 + 2B_1(\beta_1 + \beta_2)Z + (-\frac{2}{3} B_2 \beta_1^2 + 4B_1^2 \beta_1 \beta_2 - \frac{2}{3} B_2 \beta_2^2) + \dots$$

Então,

$$L_1 = 2B_1(\beta_1 + \beta_2) = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot (\beta_1 + \beta_2) = \frac{1}{3} (\beta_1 + \beta_2)$$

e

$$L_2 = -\frac{2}{3} B_2 \beta_1^2 + 4B_1^2 \beta_1 \beta_2 - \frac{2}{3} B_2 \beta_2^2 = -\frac{2}{3} B_2 (\beta_1^2 + \beta_2^2) + 4B_1^2 \beta_1 \beta_2 =$$

$$= -\frac{1}{45} (\beta_1^2 + \beta_2^2) + \frac{1}{9} \beta_1 \beta_2.$$

Sendo $1 + p_1 Z + p_2 Z^2 = (1 + \beta_1 Z)(1 + \beta_2 Z) = 1 + (\beta_1 + \beta_2)Z +$
 $+ \beta_1 \beta_2 Z^2$, temos:

$$\begin{cases} p_1 = \beta_1 + \beta_2 \\ p_2 = \beta_1 \cdot \beta_2 \end{cases}$$

Isso implica que $\beta_1^2 + \beta_2^2 = p_1^2 - 2p_2$.

Como $L_1 = \frac{1}{3} (\beta_1 + \beta_2)$ então $L_1 = \frac{1}{3} p_1$

e

como $L_2 = -\frac{1}{45} (\beta_1^2 + \beta_2^2) + \frac{1}{9} \beta_1 \beta_2$ então

$$L_2 = -\frac{1}{45} (p_1^2 - 2p_2) + \frac{1}{9} p_2$$

ou seja, $L_2 = \frac{1}{45} (7p_2 - p_1^2)$.

4.7. Teorema do Índice de Hirzebruch:

Seja $\{L_j(p_1, \dots, p_2)\}$ a sequência multiplicativa cuja série de potências característica é $Q(Z) = \frac{\sqrt{Z}}{\operatorname{tgh} \sqrt{Z}}$. Então o índice $I(M^{4k})$ de uma variedade diferenciável compacta e

orientada M^{4k} é dado por: $I(M^{4k}) = L_k(p_1, \dots, p_k)(M^{4k})$

onde p_i é i -ésima classe de Pontrjagin da variedade M .
((9), pag 225).

4.8. Teorema:

Sejam M^n uma variedade diferenciável compacta e orientada e $j: V^{n-2} \rightarrow M^n$ um mergulho de uma subvariedade orientada V^{n-2} de M^n . Seja $v \in H^2(M^n, \mathbb{Z})$ a classe de cohomologia dual da classe de homologia representada por V^{n-2} ou seja, $j_*(V^{n-2}) = v \cap (M^n)$. Então:

$$I(V^{n-2}) = x^n(\text{tgh } v \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(M^n), \dots, p_i(M^n)))$$

onde x^n é definido por $x^n(\mu) = \mu^n(M^n)$ e μ^n é a n -ésima componente de um elemento $\mu \in \sum_{k=0}^{\infty} H^k(M^n, \mathbb{Z})$.

Demonstração:

Se $\tau_{V^{n-2}}$ e τ_{M^n} são os fibrados tangentes de V^{n-2} e M^n respectivamente e ν é o fibrado normal de V^{n-2} em M^n , então: $j^* \tau_{M^n} = \tau_{V^{n-2}} \oplus \nu$.

Sejam $p(V^{n-2})$ e $p(M^n)$ as classes de Pontrjagin (total) de V^{n-2} e M^n respectivamente.

De 1.26, temos que $p_1(\nu) = e^2(\nu)$. Como $p(\nu) = 1 + p_1(\nu)$

segue que $p(v) = 1 + e^2(v)$.

Desde que $j^*v = e(v)$ ([3], pag 69) então, $p(v) = 1 + e^2(v) = 1 + (j^*v)^2 = j^*(1+v^2)$.

Portanto, $j^*p(M^n) = p(V^{n-2}) \cdot j^*(1+v^2)$.

isto é,

$$p(V^{n-2}) = j^*((1+v^2)^{-1} \cdot p(M^n)).$$

Sendo $\{L_j(p, \dots, p_j)\}$ uma m-sequência que corresponde à série de potências $\frac{\sqrt{Z}}{\operatorname{tgh}\sqrt{Z}}$, a definição de m-sequência

implica que:

$$L\left(\sum_{i=0}^{\infty} p_i(V^{n-2})\right) = j^*(L(1+v^2)^{-1} \cdot L\left(\sum_{i=0}^{\infty} p_i(M)\right))$$

isto é,

$$\sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(V^{n-2}), \dots, p_i(V^{n-2})) = j^*\left(\frac{\operatorname{tgh}v}{v} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(M), \dots, p_i(M))\right)$$

O mergulho $j: V^{n-2} \hookrightarrow M^n$ induz o homomorfismo $j^*: H^{n-2}(M, \mathbb{Z}) \rightarrow H^{n-2}(V^{n-2}, \mathbb{Z})$.

Assim,

$$\langle j^*(x), (V^{n-2}) \rangle = \langle x, j_*(V^{n-2}) \rangle = \langle x, v \cap \{M^n\} \rangle = \langle v \cdot x, \{M^n\} \rangle$$

isto é, $j^*(x)(V^{n-2}) = v \cdot x(M^n)$.

Portanto,

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(V^{n-2}), \dots, p_i(V^{n-2}))(V^{n-2}) = \\
& = j^* \left(\frac{tghv}{v} \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(M), \dots, p_i(M))(V^{n-2}) \right) = \\
& = v \cdot \left(\frac{tghv}{v} \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(M), \dots, p_i(M))(M^n) \right) = \\
& = (tghv \cdot \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(M), \dots, p_i(M))(M^n)).
\end{aligned}$$

Então, pelo teorema do índice de Hirzebruch:

$$I(V^{n-2}) = x^n (tghv \cdot \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1(M^n), \dots, p_i(M^n)))$$

4.9. Observação:

Se $n = 6$, então $I(V^4) = \frac{1}{3} (-v^3 + p_1(v))(M^6)$. onde $v \in H^2(M, \mathbb{Z})$ e $p_1 \in H^4(M, \mathbb{Z})$.

De fato,

$$\begin{aligned}
I(V^4) &= x^6 (tghv \cdot \sum_{i=0}^{\infty} L_i(p_1, \dots, p_i)) = \\
&= x^6 \left((v - \frac{1}{3} v^3 + \frac{2}{15} v^5 - \dots) (1 + L_1(p_1) + L_2(p_1, p_2) + \dots) \right)
\end{aligned}$$

Por 4.6. temos que $L_1(p_1) = \frac{1}{3} p_1$ e $L_2(p_1, p_2) = \frac{1}{45} (7p_2 - p_1^2)$.

Então,

$$\begin{aligned} I(V^4) &= x^6 \left\{ \left(v - \frac{1}{3} v^3 + \frac{2}{15} v^5 \dots \right) \left(1 + \frac{1}{3} p_1 + \frac{1}{45} (7p_2 - p_1^2) + \dots \right) \right\} = \\ &= x^6 \left(v - \frac{1}{3} v^3 + \dots + \frac{1}{3} p_1 v - \frac{1}{9} p_1 v^3 + \dots \right) = \left(-\frac{1}{3} v^3 + \frac{1}{3} p_1 v \right) (M^6) \end{aligned}$$

ou seja, $I(V^4) = \frac{1}{3} (p_1 v - v^3) (M^6)$.

4.10. Definição:

Seja $CP(3)$ o espaço projetivo complexo.

Chamaremos de $V(n)$ as subvariedades $V(n) \hookrightarrow CP(3)$ de dimensão 4, tais que $j_*(V(n)) = n\alpha \cap (CP(3))$ onde

$$\alpha \in H^2(CP(3), \mathbb{Z})$$

é um gerador.

4.11. Teorema:

O índice de $V(n)$ é dado por:

$$I(V(n)) = \frac{n(4-n^2)}{3}$$

Demonstração:

Pela observação 4.9.,

$$I(V(n)) = \frac{1}{3} (p_1(CP(3))n\alpha - n^3\alpha^3)(CP(3))$$

Sabemos que:

$$p_1(\mathbb{CP}(3)) = 4\alpha^2 \quad \text{onde} \quad \alpha \in H^2(\mathbb{CP}(3), \mathbb{Z})$$

é um gerador.

Assim,

$$I(V(n)) = \frac{1}{3} (4n\alpha^3 - n^3\alpha^3)(\mathbb{CP}(3)) = \frac{1}{3} n(4-n^2)\alpha^3(\mathbb{CP}(3)).$$

Portanto,

$$I(V(n)) = \frac{1}{3} n(4-n^2)$$

§2. Exemplos de Variedades que Satisfazem o Teorema de Rohlin:

4.12. Proposição:

As variedades $V(n)$, com n par, satisfazem o Teorema de Rohlin:

Demonstração:

Mostremos primeiramente que, se n é par então

$$w_2(V(n)) = 0$$

Sejam $\tau_{V(n)}$ e $\tau_{\mathbb{CP}(3)}$ os fibrados tangentes de $V(n)$ e $\mathbb{CP}(3)$ respectivamente. Seja ν o fibrado normal de $V(n)$ em $\mathbb{CP}(3)$. Então, $j^* \tau_{\mathbb{CP}(3)} = \tau_{V(n)} \oplus \nu$.

Sejam $w(V(n))$ e $w(CP(3))$ as classes de Stiefel-Whitney (total) de $V(n)$ e $CP(3)$ respectivamente.

Assim, $j^* w(CP(3)) = w(V(n)) \cdot w(v)$.

Desde que $j^*(n\alpha) = e(v)$ segue que, $j^*(1+n\alpha) = 1+e(v)$.

Como a redução módulo 2 leva a classe de Euler $e(v)$ na classe de Stiefel-Whitney $w_2(v)$, temos que,

$$\rho_2 j^*(1+n\alpha) = 1 + w_2(v)$$

Desde que v é orientado, $w_1(v) = 0$ e por conseguinte, $w(v) = 1 + w_2(v) = \rho_2 j^*(1+n\alpha) = j^* \rho_2(1+n\alpha)$.

Portanto, $j^* w(CP(3)) = w(V(n)) \cdot j^* \rho_2(1+n\alpha)$ e então, $w(V(n)) = j^*(\rho_2(1+n\alpha)^{-1} \cdot w(CP(3)))$.

Sendo $w(CP(3)) = 1$, segue que:

$$w(V(n)) = j^* \rho_2(1+n\alpha)^{-1} = j^* \rho_2(1+n\alpha+n^2\alpha^2+n^3\alpha^3)$$

Logo, $w_2(V(n)) = j^* \rho_2(n\alpha)$ e daí temos que, se n é par então $w_2(V(n)) = 0$.

Mostremos agora que, se n é par então $I(V(n)) \equiv 0 \pmod{16}$.

De 4.11. segue que $I(V(n)) = \frac{1}{3} n(4-n^2)$. Como n é par, então $n = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$. Portanto, $I(V(n)) = \frac{1}{3} \cdot 2k(4-4k^2) = \frac{1}{3} \cdot 8k(1-k^2) = \frac{1}{3} \cdot 8k \cdot (1-k)(1+k)$.

Se k é par, é imediato que $I(V(n)) \equiv 0 \pmod{16}$.

Se k é ímpar então $k+1$ é par e também para esse caso, $I(V(n)) \equiv 0 \pmod{16}$.

Assim, para todo n par temos $I(V(n)) \equiv 0 \pmod{16}$.

Como consequência dos resultados acima, podemos exibir exemplos de variedades diferenciáveis $V(n)$ que bordam uma variedade diferenciável não orientável Ω^5 compacta, mas, que não bordam uma variedade diferenciável compacta Ω^5 orientável. Assim, temos :

4.13. Corolário:

Se n é par, então $V(n)$ é bordo de uma variedade diferenciável compacta Ω^5 de dimensão 5. Para $n \neq 2$, Ω^5 é necessariamente não orientável.

Demonstração:

Sejam $n_1 = w_1^4(V(n))$, $n_2 = w_1^2 \cdot w_2(V(n))$, $n_3 = w_1 \cdot w_3(V(n))$, $n_4 = w_2^2(V(n))$ e $n_5 = w_4(V(n))$ os números de Stiefel-Whitney tney da variedade $V(n)$.

Como $V(n)$ é orientada, então $w_1(V(n)) = 0$. Logo, $n_1 = n_2 = n_3 = 0$.

Na proposição 4.12. foi visto que, se n é par então $w_2(V(n)) = 0$.

Por hipótese, n é par; assim $n_4 = 0$.

Por 1.19. temos que $e(V(n))(V(n)) = \chi(V(n))$. Como a redução módulo 2 leva a classe de Euler $e(V(n))$ na classe de Stiefel-Whitney $w_4(V(n))$ então, $w_4(V(n))(V(n)) = \chi(V(n)) \pmod{2}$ isto é, $n_5 = \chi(V(n)) \pmod{2}$. Por 2.2.c, temos que

$I(V(n)) \equiv \chi(V(n)) \pmod{2}$. Desde que por hipótese n é par, segue de 4.12 que $I(V(n)) \equiv 0 \pmod{16}$. Portanto, $n_5 = 0$.

Assim, se n é par temos que $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = 0$ e pelo teorema 1.8. podemos concluir que $V(n)$ é bordo de uma variedade diferenciável compacta de dimensão 5.

Sabemos que $I(V(n)) = \frac{1}{3} n(4-n^2)$. Se n é par e $n \neq 2$, então $I(V(n)) \neq 0$. Logo, pela propriedade 2.2.e., concluimos que Ω^5 é necessariamente não orientável.

§3. Aplicações do Teorema de Kervaire e Milnor

4.14. Proposição:

Não existe mergulho diferenciável $S^2 \xrightarrow[e]{\hookrightarrow} CP(2)$ representando a classe 3α .

Demonstração:

Como $w_2(CP(2)) = \alpha \in H^2(CP(2), \mathbb{Z}_2)$ e $\rho_2(3\alpha) = \alpha = w_2(CP(2))$ temos que, 3α é classe de homologia dual da classe de Stiefel-Whitney $w_2(CP(2)) \in H^2(CP(2), \mathbb{Z}_2)$.

Desde que $I(CP(2)) = 1$ e $\xi.\xi(CP(2)) = \langle 3\alpha \cup 3\alpha, (CP(2)) \rangle = \langle 9\alpha^2, (CP(2)) \rangle = 9$, então:

$$\xi.\xi \not\equiv I(CP(2)) \pmod{16}.$$

Assim, pelo teorema de Kervaire e Milnor, a classe 3α não pode ser representada por qualquer mergulho diferen

ciável $e: S^2 \hookrightarrow CP(2)$.

4.15. Proposição:

A classe de homologia $\xi = 5\alpha \in H^2(CP(2), \mathbb{Z})$ não pode ser representada por qualquer mergulho diferenciável $e: S^2 \hookrightarrow CP(2)$.

Demonstração:

Temos que $\xi = 5\alpha$ é classe de homologia dual da classe de Stiefel-Whitney $w_2(CP(2)) \in H^2(CP(2), \mathbb{Z}_2)$, pois $w_2(CP(2)) = \alpha = \rho_2(5\alpha)$.

Como $I(CP(2)) = 1$ e $\xi \cdot \xi(CP(2)) = \langle 5\alpha \cup 5\alpha, (CP(2)) \rangle = \langle 25\alpha^2, (CP(2)) \rangle = 25$ então $\xi \cdot \xi \not\equiv I(CP(2)) \pmod{16}$.

Portanto, pelo teorema de Kervaire e Milnor, segue a tese.

Observação:

A classe de homologia $\xi = 7\alpha \in H^2(CP(2), \mathbb{Z})$ é dual da classe de Stiefel-Whitney $w_2(CP(2)) \in H^2(CP(2), \mathbb{Z}_2)$ pois, $\rho_2(7\alpha) = \alpha = w_2(CP(2))$.

Sendo $I(CP(2)) = 1$ e $\xi \cdot \xi(CP(2)) = \langle 7\alpha \cup 7\alpha, (CP(2)) \rangle = \langle 49\alpha^2, (CP(2)) \rangle = 49$, então:

$$\xi \cdot \xi \equiv I(CP(2)) \pmod{16}.$$

Neste caso, no entanto, o teorema de Kervaire e Milnor não nos permite concluir nada.

BIBLIOGRAFIA

- (1) BOTT, R. - The Stable Homotopy of the Classical Groups,
Proc.Nat. Acad. Sci. Wash. 43,933-935,1957.
- (2) DACCACH, J.A. - Cirugia e Aplicações. Tese apresentada
ao ICM de São Carlos, USP, para obtenção do
título de Mestre, 1974.
- (3) HIRZEBRUCH. F. - Topological Methods in Algebraic Geometry, Springer-Verlog, N. York, 1966.
- (4) HU, S.T. - Homotopy Theory - Academic Press, 1959.
- (5) HUSEMOLLER, D. - Fibre Bundles, Mcgraw Hill, Series in
Higher Mathematics, N.Y., 1966.
- (6) Kervaire, M.A. - An interpretation of G.Whitehead's Generalization of Hopf's invariant. Ann
Math (2), 69,345-365, 1959.
- (7) Kervaire, M.A. and MILNOR, J. - On 2-Spheres in 4-manifolds, Proc.Nat. Acad. Sci,47(1961), 1651-
-1657.
- (8) MILNOR, J.and Kervaire, M.A. - Bernoulli, Numbers,homotopy groups and a Theorem of Rohlin. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Edinburgh, 1958.

- (9) MILNOR, J. and STASHEFF, J.D. - Characterist Classes, Princeton University Press, N.J., 1974.
- (10) MOSHER-TANGORA. Cohomology Operations and Applications in Homotopy Theory, Harper's Series in Modern Mathematics, Harper and Row Publisher, 1968.
- (11) SPANIER, E.H. - Algebraic Topology, McGraw Hill Book Company, N.Y. 1966.
- (12) STEENROD, N. - The Topology of fibre bundles, Princeton University Press, N.J., 1951.
- (13) STONG, R.E. - Notes on Cobordism Theory, Princeton University Press, N.J., 1968.
- (14) SWITZER, R.M. - Algebraic Topology: Homotopy and Homology, Springer-Verlag, 1957.
- (15) THOM, R. - Quelques propriétés globales des variétés différentiables. Comment. Math. Helvet. 28, 17-86(1954).
- (16) VICK, J. - Homology Theory, N. York and London Academic Press, 1973.