SOBRE REVESTIMENTOS CÍCLICOS E
RAMIFICADOS DE ENLAÇAMENTOS

Pedro Luiz Fagundes

Orientador: *Prof. Dr. Oziride Manzoli Neto*

Dissertação apresentada ao Instituto de
Ciências Matemáticas de São Carlos, da
Universidade de São Paulo, para a obten
ção do Título de Mestre em Matemática.

SÃO CARLOS
1987

*Dedico esta Dissertação aos
meus pais, Luiz e Odeth ; à
minha noiva Simone e aos
meus irmãos Paulo e Maira.*

- A G R A D E C I M E N T O S -

- A Deus por mais esta realização em minha vida.
- Ao Prof. Oziride Manzoli Neto pela dedicação, incentivo e apoio constantes na orientação deste trabalho, sem os quais, não teria condições de concluí-lo.
- Aos Professores do Departamento de Matemática, do ICMSC, da UFSCar, principalmente aos Professores Janey Antonio Daccach, Pedro Luiz de Queiroz Pergher e Brasil Terra Leme, pela dedicação nos tempos de graduação.
- A todas pessoas que colaboraram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho, particularmente à Profª Marilda Erhardt Domingos.
- Finalmente, à Secretaria de Trabalhos Científicos do ICMSC, pelo excelente trabalho datilográfico.

- Este trabalho contou com o apoio financeiro do CNPq e FAPESP em sua fase inicial.

CICLIC AND BRANCHED COVERINGS OF LINKS

Pedro Luiz Fagundes

Adviser: *Oziride Manzoli Neto*

A B S T R A C T

The purpose of this work is to present some relationship between the cyclic and the branched coverings of links.

We focus attention on k -splittable and q -simple links, proving that the homology of those coverings have special properties.

Í N D I C E

INTRODUÇÃO	i
CAP. I - PRELIMINARES	1
I.1 - Material Básico de Topologia Algébrica	1
I.2 - Material Básico da Teoria de Nós e Enlaçamentos ..	11
I.3 - Requisitos Algébricos	13
CAP. II - REVESTIMENTOS CÍCLICO E RAMIFICADO	15
II.1 - Revestimento Cíclico de um Nó	15
II.2 - Revestimento Cíclico de um Enlaçamento	25
II.3 - Relacionamento entre $\hat{X}$ e $\hat{X}^k$	26
II.4 - Relacionamento entre $\tilde{X}^k$ e $\overline{\tilde{X}}^k$	26
CAP. III - ENLAÇAMENTOS k-ESPLITÁVEIS E q-SIMPLES	31
III.1 - Enlaçamento k-Esplitável	31
III.2 - Enlaçamento q-Simples	42
CAP. IV - UMA GENERALIZAÇÃO DO RESULTADO DE CROWELL	51
BIBLIOGRAFIA	62

I N T R O D U Ç Ã O

Em teoria de nós, os espaços de revestimentos são muitos úteis para o cálculo de alguns invariantes do tipo de nó. As homologias desses espaços tornam-se módulos sobre certos anéis e, o relacionamento geométrico entre eles reflete nos módulos correspondentes de forma natural. Isto nos permite, através do conhecimento prévio da álgebra destes módulos, a tirar conclusões úteis no estudo dos nós.

Isto, também pode ser feito, com um pouco mais de dificuldade, para enlaçamentos (links).

Apresentaremos no Capítulo I, definições e resultados básicos que serão utilizados ao longo do trabalho.

No Capítulo II, apresentaremos as definições dos espaços de revestimentos cíclicos infinito, finito e ramificado com os quais iremos trabalhar, bem como alguns dos relacionamentos entre eles, em especial um resultado análogo ao provado por Crowell [3] que nos fornece uma relação entre os espaços de revestimento cíclico finito e ramificado para o caso de nós.

No Capítulo III, daremos as definições de duas classes particulares de enlaçamentos, (K -esplítavel e q -simples), bem como alguns resultados sobre a homologia dos espaços de revestimentos dos seus complementares.

No Capítulo IV, faremos uma generalização do resultado de Crowell para os enlaçamentos definidos no Capítulo III, bem como o relacionamento entre as homologias dos espaços de revestimentos cíclico finito e ramificado em dimensões maiores que 1.

CAPÍTULO I

PRELIMINARES

I.1 - MATERIAL BÁSICO DE TOPOLOGIA ALGÉBRICA

A - GRUPOS DE HOMOTÓPIA

Seja (X, x_0) um par, onde X é um espaço topológico e $x_0 \in X$.

Denotaremos por $\pi_1(X, x_0)$ o grupo fundamental do espaço X com ponto base x_0 . Os elementos deste grupo são as classes de homotopia de aplicações

$$f: (S^1, p_0) \rightarrow (X, x_0),$$

isto é, aplicações contínuas $f: S^1 \rightarrow X$ tais que $f(p_0) = x_0$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, denotaremos por $\pi_n(X, x_0)$ o n -ésimo grupo de homotopia de X com ponto base x_0 , o qual é constituído pelas classes de homotopia de aplicações

$$f: (S^n, p_0) \rightarrow (X, x_0).$$

Se x_0 e x_1 pertencem à mesma componente conexa de X , então temos que

$$\pi_1(X, x_0) \approx \pi_1(X, x_1) ,$$

assim se X é um espaço conexo por caminhos, para quaisquer pontos básicos, x_0 e x_1 , em X , temos

$$\pi_1(X, x_0) \approx \pi_1(X, x_1) ,$$

desse modo, para facilitar a notação, sempre que X for um espaço conexo por caminhos, denotaremos seu grupo fundamental por $\pi_1(X)$.

Diremos que um espaço X conexo por caminhos é simplesmente conexo se $\pi_1(X) \approx 0$.

TEOREMA I.1.1

$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \approx \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ e, além disso, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $\pi_n(X, x_0)$ é sempre abeliano.

Consideremos, agora, dois pares de espaços $(X, x_0), (Y, y_0)$ e uma aplicação $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$, isto é, uma aplicação contínua $f: X \rightarrow Y$ tal que $f(x_0) = y_0$, definimos $f_{\#}(S^n, p_0) \rightarrow (Y, y_0)$ como a composta

$$\begin{array}{ccc} (S^n, p_0) & \longrightarrow & (X, x_0) \\ & \searrow f_{\#} & \downarrow f \\ & & (Y, y_0) \end{array}$$

desse modo, toda aplicação contínua $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ induz um homomorfismo $f_{\#}: \pi_n(X, x_0) \rightarrow \pi_n(Y, y_0)$, para todo $n \geq 1$.

Diremos que dois espaços topológicos X e Y têm o mesmo tipo de homotopia ($X \sim Y$) se existirem aplicações contínuas

$$f: X \rightarrow Y, \quad g: Y \rightarrow X$$

tais que

$$f \circ g \simeq I_Y \quad \text{e} \quad g \circ f \simeq I_X$$

onde " $I_M: M \rightarrow M$ " é a aplicação identidade do espaço " M ", f e g são chamadas equivalências de homotopia; decorre desta definição que se $f: X \rightarrow Y$ é uma equivalência de homotopia, então

$$f_*: \pi_n(X, x_0) \rightarrow \pi_n(Y, y_0)$$

é um isomorfismo.

Dada uma aplicação contínua $f: X \rightarrow Y$, o "Mapping Cylinder" de f é o espaço $I \times X \cup_h Y$, onde

$$h: 1 \times X \rightarrow Y$$

$$(1, x) \rightarrow f(x) .$$

Este espaço será denotado por I_f , e decorre desta definição que $I_f \sim X$.

Por um par de espaços (X, A) , entendemos um espaço topológico X junto com um subconjunto $A \subseteq X$, e por uma tripla de espaços (X, A, B) , entendemos um espaço topológico X junto com dois subconjuntos $B \subseteq A \subseteq X$.

TEOREMA I.1.2

A todo par de espaços (X, A) , corresponde uma sequência longa exata em homotopia

$$\dots \rightarrow \pi_{n+1}(X, A) \xrightarrow{\delta} \pi_n(A) \rightarrow \pi_n(X) \rightarrow \pi_n(X, A) \xrightarrow{\delta} \dots$$

chamada, sequência de homotopia do par (X, A) .

TEOREMA I.1.3

Dado uma tripla de espaços (X, A, B) , também associa-se uma sequência longa exata em homotopia

$$\dots \rightarrow \pi_n(A, B) \rightarrow \pi_n(Y, B) \rightarrow \pi_n(X, A) \xrightarrow{\delta'} \pi_{n-1}(A, B) \rightarrow \dots$$

chamada sequência de homotopia da tripla (X, A, B) .

B - HOMOLOGIA SINGULAR

Iremos trabalhar somente com os grupos de homologia integrais, ou seja, com coeficientes no anel dos números inteiros.

TEOREMA I.1.4 (Hurewicz Theorem - Whitehead [18], pág. 178)

Seja X um espaço simplesmente conexo. As seguintes afirmações são equivalentes:

$$\begin{aligned} \cdot \quad \pi_j(X) &\approx 0, \quad 1 \leq j \leq n-1 \\ \cdot \quad H_j(X) &\approx 0, \quad 1 \leq j \leq n-1. \end{aligned}$$

No caso de uma das duas condições acima estar verificada, temos:

$$\dots \quad H_n(X) \approx \pi_n(X).$$

TEOREMA I.1.5

$$H_1(X) \approx \frac{\pi_1(X)}{[\pi_1(X), \pi_1(X)]},$$

onde $[\pi_1(X), \pi_1(X)]$ é o subgrupo comutador de $\pi_1(X)$.

TEOREMA I.1.6 (Fórmula de Kunneth - Vick [17], pág. 108)

$$H_q(X \times Y) \approx \left[\bigoplus_{p+n=q} H_p(X) \otimes H_n(Y) \right] \oplus \left[\bigoplus_{r+s=q-1} \text{Tor}(H_r(X), H_s(Y)) \right].$$

COROLÁRIO I.1.7

Se todos os módulos de homologia de Y (ou de X) forem livres, para dimensões menores que q , então:

$$H_q(X \times Y) \cong \bigoplus_{p+n=q} H_p(X) \otimes H_n(Y).$$

Temos que toda aplicação contínua $f: X \rightarrow Y$ induz um homomorfismo $f_*: H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$ para todo $q \geq 0$.

Sejam $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow Z$ aplicações contínuas tais que $g \circ f: X \rightarrow Z$ esteja definida, então $g \circ f$ induz um homomorfismo em homologia

$$(g \circ f)_*: H_q(X) \rightarrow H_q(Z)$$

e, além disso, $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

Sejam $f, g: X \rightarrow Y$ homotopias, então $f_* = g_*$ e, desse modo, se $f: X \rightarrow Y$ é uma equivalência de homotopia, então $f_*: H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$ é um isomorfismo, para todo $q \geq 0$.

TEOREMA I.1.8 (Sequência de Mayer Vietoris - Vick [17], pág. 25)

Sejam A e B subconjuntos do espaço topológico X tais que $X = \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$, então podemos definir um homomorfismo natural

$$\partial: H_q(X) \rightarrow H_{q-1}(A \cap B), \quad \forall q \geq 1,$$

e obtemos uma sequência exata

$$\dots \xrightarrow{\partial} H_q(A \cap B) \xrightarrow{\phi} H_q(A) \oplus H_q(B) \xrightarrow{\psi} H_q(X) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(A \cap B) \xrightarrow{\phi} \dots$$

onde

$$\phi: H_q(A \cap B) \rightarrow H_q(A) \oplus H_q(B)$$

é definida por $\phi(x) = (i_*(x), -j_*(x))$, e

$$\psi: H_q(A) \oplus H_q(B) \rightarrow H_q(X)$$

é definida por $\psi(y, z) = k_*(y) + \ell_*(z)$ e as aplicações

$$i: A \cap B \rightarrow A, \quad j: A \cap B \rightarrow B, \quad k: A \rightarrow X \quad \text{e} \quad \ell: B \rightarrow X$$

são inclusões naturais.

C - HOMEOMORFISMO LOCAL E LEVANTAMENTOS

Por um homeomorfismo local, entenderemos uma aplicação aberta $f: X \rightarrow Y$, entre espaços topológicos, tal que, para cada $x \in X$ exista um aberto $U \subset X$ com $x \in U$ e $f|_U: U \rightarrow f(U) \subset Y$ um homeomorfismo. Podemos mostrar que para cada $y \in Y$, $f^{-1}(y) \subset X$ é um subconjunto discreto de X e além disso se pedirmos X compacto e Y de Hausdorff, então $f^{-1}(y)$ será finito.

Dadas duas funções contínuas $f: X \rightarrow Y$ e $g: Z \rightarrow Y$, por um levantamento de g (relativamente a f), entenderemos uma aplicação contínua $\tilde{g}: Z \rightarrow X$ que comute o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow \tilde{g} & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

ou seja, $f \circ \tilde{g} = g$. Podemos provar que se f é um homeomorfismo local, X é um espaço de Hausdorff e Z é conexo, então dois levantamentos $\tilde{g}$, $\hat{g}$ de g , ou são iguais, ou não coincidem em nenhum ponto.

D - ESPAÇOS DE REVESTIMENTOS

Neste parágrafo, vamos assumir que todos os espaços topológicos são conexos, localmente conexos por caminhos e de Hausdorff, salvo menção em contrário.

Uma aplicação $p: \tilde{X} \rightarrow X$ é um revestimento se:

- i) Para cada $x \in X$, existe um aberto $V \subset X$, com $x \in V$ tal que $p^{-1}(V) = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$ é uma reunião de abertos U_{α} , dois a dois disjuntos.
- ii) $p|_{U_{\alpha}}: U_{\alpha} \rightarrow V$ é um homeomorfismo sobre a imagem para cada α .

Os abertos U_{α} 's são chamados vizinhanças elementares, o espaço $\tilde{X}$ é o espaço de revestimento de X , X é o espaço base e para cada $x \in X$, o conjunto $p^{-1}(x)$ é a fibra sobre x .

Vê-se logo da definição que um revestimento é um homeomorfismo local de $\tilde{X}$ sobre X , logo para cada $x \in X$, a fibra $p^{-1}(x)$ é um espaço discreto e, além disso, se $\tilde{X}$ for compacto, então $p^{-1}(x)$ é finito. Podemos mostrar que o número cardinal de qualquer fibra é sempre igual e chamaremos a este número, o número de folhas do revestimento. É fácil ver que se $\tilde{X}$ é compacto ele tem um número de folhas finito e, neste caso, $X = p(\tilde{X})$ é compacto.

Além disso, podemos mostrar que se $\tilde{X}$ tem um número finito de folhas e X é compacto, então $\tilde{X}$ é compacto.

E - REVESTIMENTO E SUBGRUPO DE π_1

Diremos que um revestimento $p: \tilde{X} \rightarrow X$ é universal se $\tilde{X}$ for simplesmente conexo.

Podemos mostrar que, se X tem uma cobertura $\{U_{\alpha}\}$, por

subconjuntos abertos, conexos por caminhos tais que, cada inclusão

$$\pi_1(U_\alpha) \rightarrow \pi_1(X)$$

é nula, então X tem um espaço de revestimento universal. Observe que no caso em que X é uma variedade conexa, então X satisfaz, naturalmente, a propriedade anterior.

TEOREMA I.1.9

Se X tem um revestimento Universal e $G = \pi_1(X, x_0)$ é um subgrupo, então existe um revestimento $p: \tilde{X} \rightarrow X$ e um ponto base $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ tal que:

$$p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)) \cong G.$$

Observe que, neste caso, p_* é injetivo. Dizemos que tal revestimento é determinado pelo subgrupo G .

Seja, agora, $p: \tilde{X} \rightarrow X$ um revestimento e A um subespaço de X localmente conexo por caminhos.

Seja $\tilde{A}$ uma componente conexa por caminhos de $p^{-1}(A)$. Desse modo, $(\tilde{A}, p|_{\tilde{A}})$ é um revestimento de A . Sejam $\tilde{a} \in \tilde{A}$, $a = p(\tilde{a})$, $p' = p|_{\tilde{A}}: \tilde{A} \rightarrow A$ e $i: A \rightarrow X$ a aplicação inclusão. Com estas hipóteses temos

TEOREMA I.1.10 (Massey [11], pág. 178)

$p^{-1}(A)$ é conexo (isto é, $p^{-1}(A) = \tilde{A}$), se e somente se, o subgrupo $i_*(\pi_1(A, a))$ encontra todas as classes laterais do subgrupo $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{a}))$.

Seja $p: \tilde{X} \rightarrow X$ um revestimento, um homeomorfismo $\tau: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ será chamado um automorfismo de revestimento (ou translação) se comutar o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tau} & \tilde{X} \\ p \searrow & & \swarrow p \\ & X & \end{array}$$

Podemos provar que τ é determinado por sua ação a qualquer ponto de $\tilde{X}$, em particular, por sua ação sobre uma fibra. A menos que $\tau = I_{\tilde{X}}$, ele não tem pontos fixos.

Exemplo: (Rolfsen [13], pág. 362)

O seguinte espaço de revestimento de $S^1 \vee S^1$ não tem automorfismo de revestimento diferente de $I_{\tilde{X}}$.

Um espaço de revestimento $\tilde{X}$ é dito regular, se para algum $x \in X$ e $\tilde{x} \in p^{-1}(x)$, o subgrupo $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}))$ é normal em $\pi_1(X, x)$, esta definição independe do ponto base.

TEOREMA I.1.11

Um espaço de revestimento X é regular, se e somente se, para quaisquer dois pontos $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ na fibra $p^{-1}(x)$, existir um automorfismo de revestimento τ , tal que

$$\tau(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2 .$$

Consideremos, agora, a seguinte situação geométrica. Seja X um cw-complexo e $\tilde{X}$ um revestimento de X determinado pelo núcleo de algum homomorfismo

$$\phi : \pi_1(X) \longrightarrow Z ,$$

do grupo fundamental de X sobre Z , o grupo cíclico infinito.

Tal revestimento será chamado, revestimento cíclico infinito de X associado ao epimorfismo ϕ . Assim Z atua livremente como o grupo de transformações de revestimento do complexo infinito $\tilde{X}$, e o complexo quociente $\tilde{X}/Z$ pode ser identificado com X .

Exemplo: (Milnor [12], pág. 117)

Se $X = S^1 \vee S^n$, então $\tilde{X}$ pode ser visualizado como uma reta com infinitas n -esferas acopladas.

A transformação de revestimento $t \in Z$ leva cada esfera sobre a próxima.

TEOREMA I.1.12

Seja $\tilde{X}$ o revestimento de X associado ao epimorfismo ϕ . Seja $A \subset X$ um subespaço de X , então $p^{-1}(A)$ é conexo se, e somente se, a aplicação $\phi_* i_* : \pi_1(A) \rightarrow Z$ for um epimorfismo.

A prova segue de I.1.10.

I.2 - MATERIAL BÁSICO DA TEORIA DE NÓ E ENLAÇAMENTOS

Um link (ou enlaçamento) L^n , é a imagem de uma aplicação C^∞

$$L : \bigsqcup_{i=1}^{\mu} S_i^n \rightarrow S^k,$$

de uma reunião disjunta de μ , n -esferas na k -esfera S^k , que é um homeomorfismo sobre L^n . A imagem de cada S_i^n é chamada uma componente de L^n . No caso em que $\mu = 1$, temos um nó, o qual iremos denotar por K^n . É possível mostrar que se $k = n+1$ ou $k \geq n+3$, então o grupo fundamental do complementar $X = S^k - L^n$ é nulo, desse modo nosso estudo se restringirá ao caso em que $k = n+2$.

Diremos que dois links L_1^n, L_2^n são equivalentes se existir um difeomorfismo $h : S^{n+2} \rightarrow S^{n+2}$ tal que $h(L_1^n) = L_2^n$ e, além disso, dada uma indexação dos componentes de L_1^n e L_2^n , h deve preservar a ordem fixada. No caso de nós, basta que

$h(K_1^n) = K_2^n$. Chamaremos a classe de equivalência de um link ou nó de tipo de link ou tipo de nó.

O grupo do link L^n é o grupo fundamental do complementar $X = S^{n+2} - L^n$. Podemos mostrar que cada link $L^n \subset S^{n+2}$ possui uma vizinhança tubular $V(L^n)$ a qual é imagem de um mergulho $t: L^n \times D^2 \rightarrow S^{n+2}$ tal que $t(x,0) = x$, $\forall x \in L^n$.

Assim, como existe uma retração

$$r: S^{n+2} - L^n \rightarrow S^{n+2} - V(L^n)$$

temos $\pi_1(X) \approx \pi_1(S^{n+2} - V(L^n))$ e

neste caso, $S^{n+2} - V(L^n)$ é uma variedade diferenciável. Como S^{n+2} é homeomorfo a $\mathbb{R}^{n+2}$ à menos de um ponto, vemos que

$$\pi_1(S^{n+2} - L^n) \approx \pi_1(\mathbb{R}^{n+2} - L^n),$$

se considerarmos $L^n \subset \mathbb{R}^{n+2}$.

Diremos que um subconjunto $X \subset Y$ possui colarinho duplo (isto é, X tem um bicolar), se existir um mergulho $b: X \times [-1,1] \rightarrow Y$ tal que $b(x,0) = x$, $\forall x \in X$. Uma variedade compacta conexa $M^{n+1} \subset S^{n+2}$, possuindo colarinho duplo tal que $\partial M^{n+1} = L^n$, será chamada uma superfície de Seifert do link L^n , a existência de tal variedade está provada em [Levine [8], pág. 11] e, da definição, concluímos que existe um mergulho $J: M^{n+1} \times [-1,1] \rightarrow S^{n+2}$.

Por último, temos:

Se L^n é um link com μ componentes, então

$$H_j(S^{n+2} - L^n) \approx \begin{cases} \mathbb{Z}^\mu & , \text{ se } j = 1 \\ 0 & , \text{ se } j > 1 \text{ e } j \neq n+1 \\ \mathbb{Z}^{\mu-1} & , \text{ se } j = n+1 \end{cases}.$$

Como está demonstrado em [Saab [15], pág. 16] .

I.3 - REQUISITOS ALGÉBRICOS

Estaremos trabalhando sobre o anel $\Lambda = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$, isto é, o anel dos polinômios de Laurent na variável t com coeficientes inteiros.

Sejam K^n um n.º e $X = S^{n+2} - K^n$ seu complementar, seja $\tilde{X}$ um revestimento de X associado ao kernel da aplicação abelianização $A: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X) \cong \mathbb{Z}$ então $H_q(\tilde{X})$ é um Λ -módulo finitamente gerado como pode ser visto em Levine [6], pág. 2 .

Definição: Matriz Apresentação de um Módulo:

Consideremos um grupo abeliano A , que é finitamente gerado como um Λ -módulo. Uma matriz $M = (m_{ij}(t))_{m \times n}$, com elementos em Λ , é dita apresentar A como um módulo, se existir uma sequência exata de Λ -módulos

$$F_2 \xrightarrow{d} F_1 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

onde F_1 e F_2 são livres sobre os elementos $(x_1, \dots, x_n)$ e $(r_1, \dots, r_m)$ respectivamente, e

$$d(r_i) = \sum_{j=1}^n m_{ij}(t)x_j .$$

LEMA I.3.1 (Lema da "cobra" - Bourbaki [1], pág. 19)

Suponhamos que, no diagrama comutativo a seguir, as linhas sejam sequências exatas de Λ -módulos:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c \\
 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Consideremos, agora, o diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \ker(a) & \xrightarrow{u_1} & \ker(b) & \xrightarrow{v_1} & \ker(c) & \\
 & i \downarrow & & j \downarrow & & k \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c \\
 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \longrightarrow 0 \\
 & & p \downarrow & & q \downarrow & & r \downarrow \\
 & \text{cok}(a) & \xrightarrow{u_2} & \text{cok}(b) & \xrightarrow{v_2} & \text{cok}(c) &
 \end{array}$$

onde, i, j e k são as inclusões naturais, p, q e r projeções naturais, u_1, v_1 (u_2, v_2) induzidas de u, v (u', v') respectivamente, tais que o diagrama acima se torne comutativo, então existe um homomorfismo

$$d: \ker(c) \longrightarrow \text{cok}(a)$$

satisfazendo a propriedade: se $x \in \ker(c)$, $y \in B$ e $t' \in A'$ tais que $v(y) = k(x)$ e $u'(t') = b(y)$ então $d(x) = p(t')$ e, além disso, a sequência

$$\ker(a) \xrightarrow{u_1} \ker(b) \xrightarrow{v_1} \ker(c) \xrightarrow{d} \text{cok}(a) \xrightarrow{u_2} \text{cok}(b) \xrightarrow{v_2} \text{cok}(c)$$

é exata.

CAPÍTULO II

REVESTIMENTOS CÍCLICO E RAMIFICADO

Neste capítulo daremos as definições dos espaços de revestimentos que iremos utilizar, bem como suas construções geométricas. As equivalências entre as descrições algébricas e geométricas podem ser vistas em Marar [10] Cap. II. Além disso, mostraremos alguns relacionamentos entre eles.

Por simplicidade denotaremos um link $L^n \subset S^{n+2}$ por L , lembrando que a co-dimensão é sempre dois e quando quisermos ressaltar suas componentes o denotaremos como uma união disjunta de μ nós de dimensão n , ou seja,

$$L = K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_\mu, \quad K_i^n \subset S^{n+2}, \quad i = 1, 2, \dots, \mu.$$

II.1 - REVESTIMENTO CÍCLICO DE UM NÓ

A - REVESTIMENTO CÍCLICO INFINITO

Seja $K \subset S^{n+2}$ um nó e $X = S^{n+2} - K$. Como vimos $H_1(X) \cong \mathbb{Z}$. Consideremos a seguinte sequência exata:

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \pi_1(X) \xrightarrow{A} H_1(X) \longrightarrow 0$$

$\cong$
 $\mathbb{Z}$

onde A é a abelianização e $N = \ker A$ é o subgrupo comutador $[\pi_1(X), \pi_1(X)]$.

O espaço de revestimento $\tilde{X}$, associado ao subgrupo N , é chamado, espaço de revestimento cíclico infinito do nó K . Observe que $\tilde{X}$ é o espaço de revestimento abeliano universal de X e neste caso o seu grupo de automorfismos de revestimento é isomorfo a $H_1(X) \cong \mathbb{Z}$.

A.1 - CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA DE $\tilde{X}$

Seja $K \subset S^{n+2}$ um nó e $X = S^{n+2} - K$.

Seja M^{n+1} uma superfície de Seifert para K em S^{n+2} , como no Capítulo I. Seja $V(K)$ uma vizinhança tubular de K em S^{n+2} .

Consideremos a parte de M até tocar $V(K)$, conforme ilustrada na figura 1. Cortemos X ao longo de M , obtendo assim um espaço Y que possui no bordo duas cópias de M , as quais denotaremos por M^+ e M^- (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Consideremos, agora, infinitas cópias da tripla (Y_i, M_i^-, M_i^+) indexadas nos inteiros (Fig. 3).

Desse modo, $\tilde{X}$ é o espaço obtido pela identificação de $M_i^- \subset Y_i$ com $M_{i+1}^+ \subset Y_{i+1}$, $i \in \mathbb{Z}$. Veja ilustração abaixo (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4

Denotaremos cada folha de $\tilde{X}$ por $\tilde{X}_i$ (a i -ésima folha de $\tilde{X}$).

Exemplo:

Seja K o nó trivial em S^3 . Tomaremos como superfície de Seifert o disco M (Fig. 5).

Fig. 5

$V(K)$ é um toro sólido trivialmente mergulhado, donde $X = S^3 - V(K)$ é também um toro sólido (Fig. 6).

Cortemos X ao longo de M , obtendo assim um cilindro finito (Fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7

Assim o espaço $\tilde{X}$ será um cilindro infinito (Fig. 8).

Fig. 8

B - REVESTIMENTO CÍCLICO FINITO

Seja $K \subset S^{n+2}$ um nó e $X = S^{n+2} - K$.

Consideremos a seguinte sequência:

$$\pi_1(X) \xrightarrow{A} H_1(X) \xrightarrow{p} Z_k$$

$\cong$
 Z

onde A é a abelianização e $p: H_1(X) \rightarrow Z_k$ é a projeção natural de Z em Z_k .

O espaço de revestimento associado ao Kernel da aplicação composta

$$p \circ A: \pi_1(X) \rightarrow Z_k$$

é chamado, espaço de revestimento cíclico de k folhas de K e será denotado por $\tilde{X}^k$.

B.1 - CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA DE $\tilde{X}^k$

Basicamente a construção é a mesma que a de $\tilde{X}$, a única alteração é que tomamos apenas um número finito de cópias da tripla (Y_i, M_i^-, M_i^+) , $i = 0, 1, 2, \dots, k-1$. Obtemos, então, $\tilde{X}^k$ identificando $M_i^- \subset Y_i$ com $M_{i+1}^+ \subset Y_{i+1}$ para todo $0 \leq i < k-1$ e identificamos M_{k-1}^- com M_0^+ , conforme ilustração abaixo.

Exemplo:

No caso anterior, onde K é o não trivial em S^3 , temos que $\tilde{X}^k$ é um toro sólido, $\forall k \geq 2$ (Fig. 9).

Fig. 9

C - REVESTIMENTO CÍCLICO E RAMIFICADO

C.1 - REVESTIMENTO RAMIFICADO

Sejam M^{n+2} e N^{n+2} variedades compactas com subvariedades próprias $A^n \subset M$ e $B^n \subset N$.

Uma função contínua $f: M \rightarrow N$ é um revestimento ramificado, com conjunto de ramificação A em cima e B embaixo se:

- i) Componentes das pré-imagens de abertos de N formarem uma base para a topologia de M ;
- ii) $f(A) = B$, $f(M-A) = N-B$ e, além disso, $f|_{M-A}: M-A \rightarrow N-B$ é um revestimento, chamado revestimento associado.

OBS.: Como M é compacto, este revestimento ramificado tem sempre finitas folhas. Cada ponto de ramificação $a \in A$ tem um índice de ramificação k , no sentido em que f é k a 1 prô

ximo de a . Este número é constante sobre as componentes de A .

Exemplo: (Rolfesen [13], pág. 293)

Consideremos a aplicação complexa $z \rightarrow z^k$, com a qual o disco unitário complexo recobre a si mesmo k vezes, ramificado com índice k na origem.

Uma aplicação análoga é $z \rightarrow \frac{z^k}{|z^{k-1}|}$ a qual, portanto, preserva norma. Esta mesma aplicação se estende a um revestimento ramificado de S^2 , $C + \infty \rightarrow C + \infty$, ramificado sobre dois pontos, cada um com índice k (Fig. 10).

(Cada "gomo" é "esticado" até dar uma volta toda em S^2)

Fig. 10

Vamos, agora, desenvolver uma construção de um revestimento ramificado, cujo conjunto de ramificação embaixo seja um da do $n\tilde{o}$ K^n e em cima um novo $n\tilde{o}$ ou link.

C.2 - CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA DO REVESTIMENTO CÍCLICO RAMIFICADO DE UM $N\tilde{O}$

Como vimos, dado $X = S^{n+2} - K$, podemos construir o revestimento cíclico de k folhas $\tilde{X}^k$ de X , iremos, a seguir, mostrar que a prē-imagem do bordo ∂X , que é um "toro" $S^n \times S^1$, também é um "toro" $S^n \times S^1$, tal que as longitudes de ∂X são revestidas por k longitudes de $\partial \tilde{X}^k$ enquanto que um meridiano é revestido k vezes por um meridiano de $\partial \tilde{X}^k$.

Mostrado isso, podemos colar um "toro sólido" $S^n \times D^2$ em $\tilde{X}^k$, bordo $\tilde{\text{a}}$ bordo, de tal maneira que um meridiano $* \times S^1$ cole com a prē-imagem de um meridiano em ∂X^k .

O espaço assim construído é o revestimento cíclico ramificado de S^{n+2} com k folhas, onde o conjunto de ramificação embaixo é o $n\tilde{o}$ K dado e em cima um novo $n\tilde{o}$ ou link, em alguma variedade de dimensão $(n+2)$.

Denotaremos este revestimento por $\tilde{X}^k$.

Sejam $K \subset S^{n+2}$ um $n\tilde{o}$ e $\tilde{X}^k$ o revestimento cíclico de k folhas de $X = S^{n+2} - K$, X é uma variedade compacta com $\partial X \approx S^n \times S^1$. Vamos mostrar que a prē-imagem $p^{-1}(\partial X)$ é também um "toro" $S^n \times S^1$ em $\tilde{X}^k$, onde $p: \tilde{X} \rightarrow X$ é a projeção de revestimento.

Seja $p' = p|_{\partial \tilde{X}^k}: \partial \tilde{X}^k \rightarrow \partial X$, sabemos que $\partial \tilde{X}^k$ é um revestimento de ∂X , como $\tilde{X}^k$ é finito então $\partial \tilde{X}^k$ é finito e assim, $\partial \tilde{X}^k$ ou é um "toro" $S^n \times S^1$ ou é desconexo.

Consideremos o diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & \pi_1(X) & \xrightarrow{A} & H_1(X) \longrightarrow 0 \\
 & & & & \uparrow i_* & \searrow \phi & \\
 & & & & \pi_1(\partial X) \approx Z & &
 \end{array}
 \quad \begin{array}{c} Z \\ \approx \\ \end{array}$$

onde $N = \ker A$ é tal que $p_*(\pi_1(\tilde{X})) \approx N$ e i_* é a induzida da inclusão $i: \partial X \rightarrow X$.

Observemos que ϕ é um epimorfismo, uma vez que pela abelianização, $A: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X) \approx Z$, o gerador α de $\pi_1(\partial X)$ atinge o gerador de $H_1(X)$. Desse modo, pelo teorema I.1.12, $p^{-1}(\partial X)$ é conexo, o que conclui nossa afirmação.

Vamos, agora, descrever a colagem do "toro" $S^n \times D^2$, bordo $\tilde{X}^k$ com $\tilde{X}^k$.

Como vimos, $\partial \tilde{X}^k \approx S^n \times S^1 = p^{-1}(\partial X)$.

Geometricamente, o revestimento $p': \partial \tilde{X}^k \rightarrow \partial X$ é dado da maneira esquematizada abaixo:

Fig. 11

Cada curva horizontal, na Fig. 11, é recoberta por k curvas horizontais distintas e cada curva vertical é recoberta k vezes por uma curva vertical, ou seja, se α é um meridiano, então $p^{-1}(\alpha)$ é um meridiano que o reveste k vezes, se β é um paralelo, então $p^{-1}(\beta)$ são k paralelos disjuntos. Podemos ver isso geometricamente, pois uma curva horizontal (paralelo) em ∂X é onde a superfície de Seifert M de K toca o bordo ∂X , assim temos em $\tilde{X}^k$, k cópias de M tocando o bordo $\partial \tilde{X}^k$ em, portanto, k curvas horizontais distintas. Agora, uma curva vertical (meridiano) corta M em um ponto, logo seu levantamento deve cortar cada cópia de M em um ponto, por outro lado, ela representa um laço α em $\pi_1(X, a)$ que, quando incluído em $\pi_1(\tilde{X}^k, \tilde{a})$, para algum $\tilde{a} \in p^{-1}(a)$, se inclui de maneira natural e permanece em $H_1(\tilde{X}^k, \tilde{a})$, logo ela é fechada.

Para obtermos o revestimento cíclico ramificado $\tilde{X}^k$ de k folhas, com conjunto de ramificação K embaixo, iremos colar um "toro sólido" $S^n \times D^2$ ao longo de seu bordo $S^n \times S^1$ em $\partial \tilde{X}^k$. Para isso, consideremos o toro aberto como um cilindro e vamos dividir seu bordo em k partes (Fig. 12).

Fig. 12

Cada parte do bordo deve ser identificada em uma das partes de $p^{-1}(\partial X)$, correspondentes a cada secção da construção descrita anteriormente.

É possível mostrar que tal colagem pode ser feita de maneira C^∞ , ou seja, o resultado ainda é uma variedade diferen

ciável M^{n+2} que reveste a esfera S^n com conjunto de ramificação embaixo sendo o nó K dado, com um número k de folhas.

II.2 - REVESTIMENTO CÍCLICO DE UM ENLAÇAMENTO

A - REVESTIMENTO CÍCLICO INFINITO

Seja $X = S^{n+2} - L$, onde L é um n -link de multiplicidade μ .

Este revestimento que, também é chamado revestimento do número total de enlaçamentos, é o espaço de revestimento associado ao Kernel M da aplicação composta

$$\begin{array}{c} \Sigma \circ A: \pi_1(X) \longrightarrow Z \\ \pi_1(X) \xrightarrow{A} H_1(X) \xrightarrow{\Sigma} Z \\ \quad \quad \quad \cong \\ \quad \quad \quad Z^\mu \end{array}$$

onde A é a abelianização e Σ é a somatória das coordenadas.

Este espaço será denotado por $\hat{X}$.

B - REVESTIMENTO CÍCLICO FINITO

Da mesma forma que em $\tilde{X}^k$, definimos o revestimento cíclico de k folhas de X , $\hat{X}^k$, como sendo aquele associado a aplicação composta

$$p_k \circ \Sigma \circ A: \pi_1(X) \longrightarrow Z_k,$$

onde A e Σ são como acima e $p_k: Z \rightarrow Z_k$ é a projeção natural de Z sobre Z_k .

A construção geométrica de $\hat{X}(\hat{X}^k)$ é a mesma que a construção geométrica de $\tilde{X}(\tilde{X}^k)$, construindo os espaços Y_i , $i \in Z$ ($i = 0, 1, \dots, k-1$), onde cada Y_i é uma cópia de X aberta ao longo de uma superfície de Seifert de L e colados de maneira conveniente.

Note que, $\partial\hat{X}$ é uma união disjunta de μ variedades homeomorfas a $S^n \times \mathbb{R}$, fazendo uma colagem adequada de μ "toros" $S^n \times D^2$, bordo a bordo a $\hat{X}^k$ (como fizemos para obter $\bar{\bar{X}}^k$ a partir de $\tilde{X}^k$), obtemos o espaço de revestimento cíclico de k folhas de X ramificado ao longo de L que será denotado por $\bar{\bar{X}}^k$.

OBS.: Se $\mu = 1$, então L é um nó e, neste caso, $\Sigma = I_Z$ e assim $\hat{X} \approx \tilde{X}$, $\hat{X}^k \approx \tilde{X}^k$ e $\bar{\bar{X}}^k \approx \bar{\bar{X}}^k$.

II.3 - RELACIONAMENTO ENTRE $\hat{X}$ E $\hat{X}^k$ (MILNOR [12], pág. 118)

A sequência exata

$$0 \longrightarrow C_*(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} C_*(\hat{X}) \longrightarrow C_*(\hat{X}^k) \longrightarrow 0,$$

entre os complexos simpliciais de $\hat{X}$ e $\hat{X}^k$, induz a sequência longa em homologia

$$\dots \longrightarrow H_i(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} H_i(\hat{X}) \longrightarrow H_i(\hat{X}^k) \xrightarrow{\Delta} H_{i-1}(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} \dots$$

II.4 - RELACIONAMENTO ENTRE $\tilde{X}^k$ e $\bar{\bar{X}}^k$ (UM RESULTADO DE CROWELL)

Neste parágrafo vamos dar uma prova "geométrica" de que, para um nó $K \subset S^{n+2}$, existe a sequência exata

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow H_1(\tilde{X}^k) \longrightarrow H_1(\bar{X}^k) \longrightarrow 0 ,$$

além disso, esta sequência cinde.

Daremos, também, uma interpretação do gerador do $Z \subset H_1(\bar{X}^k)$.

Uma demonstração mais rigorosa pode ser encontrada em Crowell [3].

Como vimos, na construção geométrica de $\bar{X}^k$, colamos, de maneira adequada, um "toro sólido" $S^n \times D^2$ ao longo do bordo do revestimento $\tilde{X}^k$.

Um gerador de $H_1(\tilde{X}^k)$ é um dos meridianos deste bordo que, como vimos é um "toro" $S^n \times S^1$.

Este gerador é obtido, na construção $\tilde{X}^k$ da seguinte maneira.

Temos o gerador α' de $H_1(S^{n+2} - T)$ onde T é uma vizinhança tubular de K em S^{n+2} (Fig. 13).

Quando cortamos, ao longo da superfície de Seifert, abrimos este gerador que passa a ser um segmento. Tomamos, então, k cópias deste espaço (Fig. 14) e identificamos a última com a primeira. Neste ponto temos k segmentos obtidos de α' que, através da última identificação, se torne um laço α em $\tilde{X}^k$, que recobre k vezes α' e, além disso, é um gerador de $H_1(\tilde{X}^k)$ (Fig. 15).

Ao efetuarmos a colagem, α passa a ser bordo de um disco $* \times D^2$ em $\bar{X}^k = \tilde{X}^k \cup (S^n \times D^2)$.

Consideremos a sequência de Mayer Vietoris do par $(\tilde{X}^k, S^n \times D^2)$:

$$H_2(\bar{X}^k) \rightarrow H_1(\tilde{X}^k \cap (S^n \times D^2)) \rightarrow H_1(\tilde{X}^k) \oplus H_1(S^n \times D^2) \rightarrow H_1(\bar{X}^k) \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccc} \cong & & \cong \\ H_1(S^n \times S^1) \cong Z = [\alpha'] & & 0 \end{array}$$

Desse modo, o gerador α' de $H_1(\tilde{X}^k \cap (S^n \times D^2))$, "atinge" um gerador α de $H_1(\bar{X}^k)$, logo a sequência:

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{i} H_1(\tilde{X}^k) \xrightarrow{j} H_1(\bar{X}^k) \longrightarrow 0$$

é exata.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Crowell [3], mostra que a seguinte sequência exata,

$$0 \longrightarrow H_1(\bar{X}^k) \xrightarrow{\psi} H_1(\tilde{X}^k) \xrightarrow{\partial_*} Z \longrightarrow 0, \quad (1)$$

$\xleftarrow{h} \quad \quad \quad \xleftarrow{g}$

cinde, onde $Z \subset H_0(A_1 \cap B_1)$ (Ver esquema abaixo).

Logo existem

$$g: Z \longrightarrow H_1(\tilde{X}^k) \quad \text{e} \quad h: H_1(\tilde{X}^k) \longrightarrow H_1(\bar{X}^k)$$

tais que $\partial_* \circ g = I_Z$ e $h \circ \psi = I_{H_1(\bar{X}^k)}$.

Desse modo, a sequência

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{g} H_1(\tilde{X}^k) \xrightarrow{h} H_1(\bar{X}^k) \longrightarrow 0$$

cinde.

Vamos definir a aplicação $g: Z \rightarrow H_1(\tilde{X}^k)$, tal que $\partial_* \circ g = I_Z$ de tal forma que $\text{Im } g = \text{Im } i$ e assim $\text{Im } h = \text{Im } j$ e nossa sequência exata, cinde.

Seja $g: Z \rightarrow H_1(\tilde{X}^k)$ definida por: $g((1, -1)) = [\alpha]$, onde α foi descrito anteriormente.

Precisamos mostrar que $\partial_* \circ g = I_Z$.

Como em [3] sejam A_1 e B_1 esquematizados abaixo:

Logo A_1 tem o mesmo tipo de homotopia que $\tilde{X}_0$ e B_1 o mesmo tipo de homotopia que $\tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2 \cup \dots \cup \tilde{X}_{k-1}$.

$\partial_*([\alpha])$ em A_1 são dois pontos, P_1 e P_2 ; um em cada cópia da superfície de Seifert do nó K , que é homeomorfa a $A_1 \cap B_1$, uma com valor $+$ e outra com valor $-$, conforme esquemmatizado abaixo:

Além disso, $\partial_*([\alpha])$ em B_1 , também é dois pontos com sinais trocados em relação ao $\partial_*([\alpha])$ em A_1 .

Assim $\partial_*([\alpha]) = (1, -1)$, (ou $\partial_*([\alpha]) = (-1, 1)$), em Z e, desse modo, $\partial_* \circ g = I_Z$.

Temos, então, que esta função $g: Z \rightarrow H_1(\bar{X}^k)$ é um dos possíveis homomorfismos que faz cindir a sequência (1) e, neste caso, $\text{Im } g = \text{Im } i$.

Logo a sequência exata

$$0 \longrightarrow Z \xrightarrow{i} H_1(\tilde{X}^k) \xrightarrow{j} H_1(\bar{X}^k) \longrightarrow 0$$

cinde.

CAPÍTULO III

ENLAÇAMENTOS k -ESPLITÁVEIS E q -SIMPLES

Neste capítulo definiremos duas classes particulares de n -links e veremos alguns resultados, obtidos através do revestimento cíclico infinito.

Estaremos sempre trabalhando sobre o anel $\Lambda = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ e com a homologia integral.

III.1 - LINK k -ESPLITÁVEL

Um n -link $L = K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_\mu$ de multiplicidade μ é dito ser geometricamente k -esplitável ($0 \leq k \leq \mu-1$) se existir $B = B_1^{n+2} \cup B_2^{n+2} \cup \dots \cup B_k^{n+2}$, uma coleção de k sub-bolas de S^{n+2} mutuamente disjuntas satisfazendo:

- i) $B_i^{n+2} \cap L \neq \emptyset$, $1 \leq i \leq k$,
- ii) $\partial B \cap L = \emptyset$,
- iii) $S^{n+2} - (B \cap L) \neq \emptyset$,
- iv) k é maximal com respeito às propriedades acima.

Se $k = \mu - 1$, dizemos que L é completamente esplitável e, se $k = 0$, dizemos que L é não esplitável.

Além disso, dizemos que:

$$L_i = L \cap B_i^{n+2}, \quad 1 \leq i \leq k$$

$$L_{k+1} = L \cap (S^{n+2} - B)$$

são os componentes não esplitáveis de L .

LEMA III.1.1

Sejam $X = X_1 \vee X_2 \vee S^{n+1}$ com $H_1(X_1) \cong H_1(X_2) \cong Z$, $\hat{X}$ o espaço de revestimento de X associado ao homomorfismo

$$\Sigma \circ A: \pi_1(X) \rightarrow Z,$$

então $\hat{X}$ consiste de uma cópia de $\hat{X}_1$ e uma cópia de $\hat{X}_2$ identificadas ao longo do levantamento $\hat{*}$ do ponto $*$ dado no wedge $X_1 \vee X_2 \vee S^{n+1}$, com Z cópias de S^{n+1} cada uma colada em cada um dos pontos $\hat{*}$, conforme esquematizado abaixo:

Prova:

Sejam $i_1 : X_1 \rightarrow X$ e $i_2 : X_2 \rightarrow X$ as inclusões naturais, é fácil observar que $\Sigma \circ A \circ i_{1*} : \pi_1(X_1) \rightarrow Z$ e $\Sigma \circ A \circ i_{2*} : \pi_1(X_2) \rightarrow Z$ são epimorfismos, uma vez que, pela abelianização, atingem, respectivamente, a primeira e a segunda componente de $H_1(X) \approx Z \oplus Z$.

Logo, sendo $p : \hat{X} \rightarrow X$ a aplicação de revestimento, pelo Teorema I.1.12, temos que $p^{-1}(X_1)$ e $p^{-1}(X_2)$ são conexos e revestem, respectivamente, X_1 e X_2 .

Seja $p' = p|_{p^{-1}(X_1)} : p^{-1}(X_1) \rightarrow X_1$ o revestimento de X_1 .

Vamos mostrar que este espaço de revestimento é o correspondente à aplicação:

$$\pi_1(X_1) \xrightarrow{A'} H_1(X_1) \approx Z$$

e portanto $p^{-1}(X_1) = \hat{X}_1$, onde $A' = A|_{\pi_1(X_1)} : \pi_1(X_1) \rightarrow H_1(X_1)$.

Observemos o seguinte diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(X_1) & \xhookrightarrow{j} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ X_1 & \xhookrightarrow{i_1} & X \end{array}$$

Seja K_1 o núcleo da aplicação

$$A' : \pi_1(X_1) \longrightarrow H_1(X_1)$$

Vamos mostrar que $p'_*(\pi_1(p^{-1}(X_1))) = K_1$.

Temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 \pi_1(p^{-1}(X_1)) & \xrightarrow{j_*} & \pi_1(\hat{X}) & & \\
 \downarrow p'_* & & \downarrow p_* & & \\
 \pi_1(X_1) & \xrightarrow{i_{1*}} & \pi_1(X) & \xrightarrow{A} & H_1(X) \approx Z \oplus Z \\
 & \searrow A' & & & \downarrow \Sigma \\
 & & & & Z \approx H_1(X_1)
 \end{array}$$

Seja $\alpha \in \pi_1(p^{-1}(X_1)) \Rightarrow p'_*(\alpha) \in \pi_1(X_1)$, desse modo, por i_{1*} , $p'_*(\alpha)$ é levado à primeira componente de $\pi_1(X) \approx \pi_1(X_1) * \pi_1(X_2)$ e por A é levado à primeira componente de $H_1(X) \approx Z \oplus Z$. Como $\alpha \in \pi_1(p^{-1}(X_1))$ tem que $p'_*(\alpha) \in \ker A' = K_1$ e assim $A'(p'_*(\alpha)) = 0$. Como o diagrama é comutativo temos, $\Sigma \circ A \circ i_{1*}(p'_*(\alpha)) = 0$, logo $A(i_{1*}(p'_*(\alpha))) = 0$ e assim $i_{1*}(p'_*(\alpha)) \in \pi_1(X_1)$ é um elemento em $K = \ker A$, donde $i_{1*}(p'_*(\alpha)) \in K_1 \Rightarrow f'_*(\alpha) \in K_1$.

Logo $p'_*(\pi_1(p^{-1}(X_1))) \subset K_1$.

Seja $\lambda \in K_1 \Rightarrow i_{1*}(\lambda) \in \pi_1(X_1)$, mais precisamente à "primeira componente" de $\pi_1(X) \approx \pi_1(X_1) * \pi_1(X_2)$, analogamente ao caso anterior, temos que $\Sigma \circ A(i_{1*}(\lambda)) = 0$, logo $i_{1*}(\lambda) \in K$, assim ele se levanta a um laço α pertencente a $\pi_1(\hat{X})$, levantado sobre X_1 , logo existe um laço $\alpha' \in \pi_1(p^{-1}(X_1))$ tal que $j_*(\alpha') = \alpha$ e assim, como $p' = p|_{p^{-1}(X_1)}$ temos que $p'_*(\alpha') = \lambda$ e portanto,

$$K_1 \subset f'_*(\pi_1(p^{-1}(X_1)))$$

Analogamente mostramos para X_2 . Assim, como

$$\hat{X} = p^{-1}(X_1) \cup p^{-1}(X_2) \cup p^{-1}(S^{n+1}) \cup p^{-1}(*) \quad \text{e} \quad \pi_1(S^{n+1}) = 0,$$

donde $p^{-1}(S^{n+1})$ é desconexo, o resultado segue

Seja $L = K_1 \cup K_2$ um n -link de multiplicidade 2.

Seja $X = S^{n+2} - L$ e $\hat{X}$ o revestimento cíclico infinito de X .

Seja $X_i = S^{n+2} - K_i$ e $\hat{X}_i$ o revestimento cíclico infinito de X_i , $i = 1, 2$.

TEOREMA III.1.2

Se L de duas componentes, como acima, é completamente esplitável, então:

$$H_i(\hat{X}) \cong_{\Lambda} H_i(\hat{X}_1) \oplus H_i(\hat{X}_2), \quad 2 \leq i \leq n;$$

$$H_1(\hat{X}) \cong_{\Lambda} H_1(\hat{X}_1) \oplus H_1(\hat{X}_2) \oplus \Lambda;$$

$$H_{n+1}(\hat{X}) \cong_{\Lambda} H_{n+1}(\hat{X}_1) \oplus H_{n+1}(\hat{X}_2) \oplus \Lambda.$$

Prova:

Vamos mostrar que $S^{n+2} - L \sim X_1 \vee X_2 \vee S^{n+1}$.

Seja T_2 uma vizinhança tubular de K_2 em S^{n+2} .

Como L é completamente esplitável, podemos considerar uma bola $B_1^{n+2} \subset S^{n+2} - T_2$, contendo K_1 e C um colar sobre ∂B_1^{n+2} contido em $S^{n+2} - B_1^{n+2}$, tal que $C \cap T_2 = \emptyset$.

Vamos denotar o bordo exterior de C por ∂C e B_1^{n+2} por B_1 .

Podemos conectar ∂T_2 com ∂C por um arco λ de forma que seu interior esteja inteiramente contido em $S^{n+2} - (T_2 \cup C \cup B_1)$.

Seja T_λ uma vizinhança tubular de λ , do ∂T_2 até ∂C , de tal forma que:

- i) $T_\lambda \cap \partial C \approx D^{n+1}$,
- ii) $T_\lambda \cap \partial T_2 \approx D^{n+1}$ e
- iii) $T_\lambda \subset S^{n+2} - (B_1 \cup C \cup T_2)$ sobre os pontos interiores de λ .

Conectemos, agora, ∂C ao ∂B_1 por um arco $\lambda_1 \subset C$. Vamos mostrar que tal configuração tem o mesmo tipo de homotopia que $S^{n+2} - K_2$.

Consideremos as seguintes figuras:

$$S^{n+2} - T_2 \sim S^{n+2} - K_2$$

$$S^{n+2} - (T_2 \cup T_\lambda)$$

$$S^{n+2} - (T_2 \cup T_\lambda \cup (C - \lambda_1))$$

$$(S^{n+2} - T_2) \vee B_1^{n+2}$$

Desse modo, $X_2 \vee B_1 \sim S^{n+2} - T_2$.

Vamos mostrar, agora, que $B_1^{n+2} - K_1 \sim X_1 \vee S^{n+1}$.

Primeiro, lembremos que $X_1 \vee S^{n+1} \sim X_1 \vee (S^{n+1} \times I)$.

Observemos as figuras abaixo:

Ao centro temos uma B_2^{n+2} "oca". Esta configuração tem o mesmo tipo de homotopia que a configuração abaixo, que nada mais é que $X_1 - B_2^{n+2}$.

$$\text{Mas } X_1 - B_2^{n+2} \sim B_1^{n+2} - T_1 .$$

$$\begin{aligned} \text{Ent\~ao, se } L \text{ for esplit\~avel, } X = S^{n+2} - L = (S^{n+2} - T_2) - T_1 = \\ = X_2 - T_1 \sim (X_2 \vee B_1^{n+2}) - T_1 \sim X_2 \vee (B_1^{n+2} - T_1) \sim X_2 \vee X_1 - B_2^{n+2} \sim X_2 \vee X_1 \vee S^{n+1} . \end{aligned}$$

Denotaremos por $*$ o ponto base neste Wedge. Logo, pelo Lema III.1.1, $\hat{X}$ consiste de uma c\~opia de $\hat{X}_1$, uma c\~opia de $\hat{X}_2$ identificados ao longo do levantamento $\hat{*}$ sobre $*$ junto com Z c\~opias de S^{n+1} , cada uma colada em um dos pontos $\hat{*}$.

Sejam, $W_1 = \hat{X}_1 \cup_{\hat{*}} \bigcup_{i \in Z} S_i^{n+1}$ e $W_2 = \hat{X}_2$. Desse modo $\hat{X} = W_1 \cup_{\hat{*}} W_2$. Consideremos a sequ\~encia de Mayer-Vietoris da triada $(\hat{X}, W_1, W_2)$:

$$\dots \longrightarrow H_i(\hat{*}) \longrightarrow H_i(W_1) \oplus H_i(W_2) \longrightarrow H_i(\hat{X}) \longrightarrow \dots$$

$$\text{Se } 2 \leq i \leq n \implies H_i(\hat{*}) \approx 0 \quad \text{logo}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_i(W_1) \oplus H_i(W_2) & \longrightarrow & H_i(\hat{X}) \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots \\ & & \cong & & & & \cong \\ & & H_i(\hat{*}) & & & & H_{i-1}(\hat{*}) \end{array}$$

donde

$$H_i(\hat{X}) \approx H_i(W_1) \oplus H_i(W_2) \approx H_i(\hat{X}_1 \cup_{\hat{*}} \bigcup_{i \in Z} S_i^{n+1}) \oplus H_i(\hat{X}_2) \approx H_i(\hat{X}_1) \oplus H_i(\hat{X}_2)$$

e a primeira parte est\~a provada.

Se $i = n+1$ temos:

$$H_{n+1}(\hat{*}) = 0 ,$$

$$H_{n+1}(W_2) = H_{n+1}(\hat{X}_2) \quad \text{e}$$

$$H_{n+1}(W_1) = H_{n+1}(\hat{X}_1 \cup_{\hat{*}} \bigcup_{i \in Z} S_i^{n+1}) \approx H_{n+1}(\hat{X}_1) \oplus Z[Z] \approx H_{n+1}(\hat{X}_1) \oplus \Lambda$$

$$\text{Logo, } H_{n+1}(\hat{X}) \approx H_{n+1}(\hat{X}_1) \oplus H_{n+1}(\hat{X}_2) \oplus \Lambda .$$

$$\text{Se } i = 1 .$$

Consideremos a sequência exata abaixo:

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} \Lambda \longrightarrow Z \longrightarrow 0 .$$

Como Z é um domínio, A deve ser um ideal primo em Λ .
Seja $\lambda \in \Lambda$ tal que $A = (\lambda)$.

Segundo (Oziride [9]) os únicos ideais primos em Λ são do tipo:

- i) (0)
- ii) $(p(t))$, onde $p(t)$ é irredutível
- iii) $(p, g(t))$ onde $p \in Z$ é um número primo e $g(t) \in \Lambda$ é tal que $g(t) \in Z_p[t, t^{-1}]$ é irredutível em $Z_p[t, t^{-1}]$.

Se $A = 0$ então teríamos, pela sequência, $\Lambda/0 \cong Z$ o que é um absurdo.

Se $A = (p, g(t))$ então Λ/A seria finito mas $\Lambda/A \cong Z$ que é infinito.

Logo $A = (p(t))$ onde $p(t)$ é irredutível em Λ . Mas $(\lambda) \cong_{\Lambda} \Lambda$, como um Λ -módulo, basta considerar a aplicação

$$\begin{aligned} f_1 : \Lambda &\longrightarrow (\lambda) \\ 1 &\longrightarrow \lambda \end{aligned}$$

Assim a imagem de f em Λ é um Λ gerado por $p(t)$.

Voltando ao nosso Teorema, se $i = 1$ temos:

$$H_1(\hat{*}) \longrightarrow H_1(W_1) \oplus H_1(W_2) \longrightarrow H_1(\hat{X}) \longrightarrow H_0(\hat{*}) \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

$\cong$
 Λ

desse modo, pelo que acabamos de demonstrar, podemos desviar esta

sequência do seguinte modo:

$$\begin{array}{ccccccc} H_1(\hat{*}) & \rightarrow & H_1(\hat{X}_1 \overset{\cup}{\underset{\cong}{*}} \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} S_i^{n+1}) & \oplus & H_1(X_2) & \rightarrow & H_1(\hat{X}) \rightarrow \Lambda \rightarrow 0, \\ 0 & & H_1(\hat{X}_1) & & & & \end{array}$$

como Λ é um módulo livre sobre Λ temos:

$$H_1(\hat{X}) \cong H_1(\hat{X}_1) \oplus H_1(\hat{X}_2) \oplus \Lambda$$

e nosso teorema está demonstrado.

OBS.: Na verdade o λ acima visto é $(t-1)$.

Vamos, agora, supor L um n -link de multiplicidade μ , geometricamente k -esplitável e sejam L_i , $1 \leq i \leq k+1$ os componentes não esplitáveis de L , $X = S^{n+2} - L$, $X_i = S^{n+2} - L_i$, $\hat{X}_i$ o revestimento cíclico sobre X_i , $1 \leq i \leq k+1$ e suponhamos que o resultado anterior seja válido para

$$\hat{X}' = \hat{X}_1 \cup \hat{X}_2 \cup \dots \cup \hat{X}_{k-1},$$

ou seja,

$$H_i(\hat{X}') \cong_{\Lambda} H_i(\hat{X}_1) \oplus H_i(\hat{X}_2) \oplus \dots \oplus H_i(\hat{X}_{k-1}), \quad 2 \leq i \leq n;$$

$$H_1(\hat{X}') \cong_{\Lambda} H_1(\hat{X}_1) \oplus H_1(\hat{X}_2) \oplus \dots \oplus H_1(\hat{X}_{k-1}) \oplus (k-1)\Lambda;$$

$$H_{n+1}(\hat{X}') \cong_{\Lambda} H_{n+1}(\hat{X}_1) \oplus H_{n+1}(\hat{X}_2) \oplus \dots \oplus H_{n+1}(\hat{X}_{k-1}) \oplus (k-1)\Lambda.$$

Sejam B_i^{n+2} , $i = 1, 2, \dots, k+1$, dadas pela k -esplitabilidade de L e λ_i , $i = 1, 2, \dots, k$ arcos contidos em $S^{n+2} - \bigcup_{i=1}^{k+1} B_i$ tais que λ_i conecte B_i a B_{i+1} e $\lambda_i \cap \lambda_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$.

Conectemos, assim, as $k-1$ primeiras bolas B_i^{n+2} , $i = 1, \dots, k-1$.

Tomemos uma vizinhança tubular T_{λ_i} , $i = 1, 2 \dots k-2$ do ∂B_i até ∂B_{i+1} , como na demonstração do teorema anterior. Este novo espaço é uma bola B^{n+1} e estamos, novamente, no caso do teorema anterior e assim, denotando $\hat{X}^* = \hat{X}_1 \cup \hat{X}_2 \cup \dots \cup \hat{X}_{k-1} \cup \hat{X}_k$ temos:

$$i) \quad H_j(\hat{X}^*) = \left[\left(\bigoplus_{i=1}^{k-1} H_j(\hat{X}_i) \oplus (k-1)\Lambda \right) \oplus H_j(\hat{X}_k) \right] \oplus \Lambda \approx \\ \approx \bigoplus_{i=1}^k H_j(\hat{X}_i) \oplus k\Lambda, \quad 2 \leq j \leq n.$$

Analogamente:

$$ii) \quad H_1(\hat{X}^*) \approx \bigoplus_{i=1}^k H_1(\hat{X}_i) \oplus k\Lambda \quad e$$

$$iii) \quad H_{n+1}(\hat{X}^*) \approx \bigoplus_{i=1}^k H_{n+1}(\hat{X}_i) \oplus k\Lambda.$$

Seja, agora, uma única bola B^{n+1} contendo $L_1 \cup L_2 \cup \dots \cup L_k$ e uma outra bola B'^{n+1} contendo L_{k+1} , segue o seguinte resultado:

COROLÁRIO III.1.3

Se L , como acima, for k -esplitável, então:

$$H_j(\hat{X}) \approx \bigoplus_{i=1}^{k+1} H_j(\hat{X}_i), \quad 2 \leq j \leq n$$

$$H_1(\hat{X}) \approx \bigoplus_{i=1}^{k+1} H_1(\hat{X}_i) \oplus k\Lambda$$

$$H_{n+1}(\hat{X}) \approx \bigoplus_{i=1}^{k+1} H_{n+1}(\hat{X}_i) \oplus k\Lambda$$

III.2 - LINK q -SIMPLES

Seja L um n -link de multiplicidade μ , L é chamado

q -simples ($q \geq 0$) se $\pi_i(X) \approx \pi_i(C_{\mu,n})$, para $i \leq q$, onde

$$C_{\mu,n} = \left(\bigvee_{i=1}^{\mu} S_i^1 \right) \vee \left(\bigvee_{j=1}^{\mu-1} S_j^{n+1} \right).$$

Observe que todo link $\bar{e}$ 0 -simples. O link trivial $\bar{e}$ q -simples para todo $q \geq 0$.

LEMA III.2.1

Se um n -link L de multiplicidade μ $\bar{e}$ q -simples, $q \geq 1$, então:

- i) $H_1(\hat{X}) \approx (\mu-1)\Lambda$;
- ii) Se $2 \leq q \leq n$, então, $H_i(\hat{X}) = 0$, $2 \leq i \leq q$;
- iii) Se $q \geq n+1$, então, $H_{n+1}(\hat{X}) \approx (\mu-1)\Lambda$.

Prova:

Seja $C_{\mu} = \bigvee_{j=1}^{\mu} S_j^1$, como esquematizado abaixo:

Vamos construir $f: C_{\mu} \rightarrow X$, geometricamente, como segue:

Como $q \geq 1 \Rightarrow \pi_1(X) \cong \pi_1(C_\mu)$, assim, a cada círculo S_j^1 de C_μ , fazemos associar um meridiano λ_j da vizinhança tubular T_j , correspondente à componente L_j de L , $j=1,2,\dots,\mu$, o ponto base $*$ do Wedge C_μ , acima esquematizado, é levado em algum ponto interior de X e cada segmento α_j , levado a um caminho em X , ligando a imagem do ponto $*$ ao meridiano λ_j , $j = 1,2,\dots,\mu$.

Assim $f: C_\mu \rightarrow X$ induz um isomorfismo

$$f_*: \pi_1(C_\mu) \longrightarrow \pi_1(X)$$

Seja M o "Mapping Cylinder" de f , $M = I_f$. Desse modo $M \sim X$, $\pi_1(M, C_\mu) = 0$ e $\pi_i(M, C_\mu) = \pi_i(X)$, $i \geq 2$.

Seja, agora, $\hat{M}$ o revestimento cíclico infinito de M , temos assim, induzidos os revestimentos $\hat{C}_\mu$ de C_μ e $\hat{X}$ de X .

Sabemos que $H_1(\hat{C}_\mu) \cong (\mu-1)\mathbb{A}$ e $H_i(\hat{C}_\mu) = 0$, $i \geq 2$, além disso, a inclusão $i_*: \pi_1(\hat{C}_\mu) \rightarrow \pi_1(\hat{X})$ é um isomorfismo, donde $H_1(\hat{C}_\mu) \xrightarrow{i_*} H_1(X)$ é um isomorfismo, pois se dois grupos são isomorfos, então seus abelianizados também o são e assim provamos i).

Se $2 \leq q \leq n$, então $\pi_1(\hat{M}, \hat{C}_\mu) = 0$, $\forall i \leq q$, pois sendo $i \geq 2$ temos, no diagrama abaixo, onde cada linha é exata, que as aplicações p_* são isomorfismos:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \dots & \rightarrow & \pi_{i+1}(\hat{C}_\mu) & \rightarrow & \pi_{i+1}(\hat{M}) & \rightarrow & \pi_{i+1}(\hat{M}, \hat{C}_\mu) & \rightarrow & \pi_i(\hat{C}_\mu) & \rightarrow & \pi_i(\hat{M}) & \rightarrow & \dots \\
 & & \downarrow p_* & & \downarrow p_* & & \downarrow p'_* & & \downarrow p_* & & \downarrow p_* & & \\
 \dots & \rightarrow & \pi_{i+1}(C_\mu) & \rightarrow & \pi_{i+1}(M) & \rightarrow & \pi_{i+1}(M, C_\mu) & \rightarrow & \pi_i(C_\mu) & \rightarrow & \pi_i(M) & \rightarrow & \dots \\
 & & & & & & \cong & & & & & & \\
 & & & & & & \pi_{i+1}(X) & & & & & &
 \end{array}$$

logo, pelo lema dos cinco, (Vick [16], pág. 53)

$$p'_* : \pi_{i+1}(\hat{M}, \hat{C}_\mu) \longrightarrow \pi_{i+1}(M, C_\mu) \approx \pi_{i+1}(X)$$

é um isomorfismo, ou seja,

$$\pi_i(\hat{M}, \hat{C}_\mu) = 0, \quad 2 \leq i \leq q, \quad 2 \leq q \leq n, \quad \text{donde}$$

$$H_i(\hat{M}, \hat{C}_\mu) = 0, \quad 2 \leq i \leq q.$$

Consideremos a sequência do par $(\hat{M}, \hat{C}_\mu)$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & 0 & & 0 & & \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \\ \dots \rightarrow H_i(\hat{C}) \rightarrow H_i(\hat{M}) \rightarrow H_i(\hat{M}, \hat{C}_\mu) \rightarrow H_{i-1}(\hat{C}_\mu) \rightarrow H_{i-1}(\hat{M}) \rightarrow \dots \end{array}$$

Logo, $H_i(\hat{M}) = 0, \quad 2 \leq i \leq q \Rightarrow H_i(\hat{X}) = 0, \quad 2 \leq i \leq q$
e ii) está provado.

Se $q \geq n+1$, seja $M = I_f$ onde $f: C_{\mu, n} \rightarrow X$ é geometricamente definido da seguinte maneira:

Como, $\pi_i(X) \approx \pi_i(C_{\mu, n}), \quad i \leq q$ e $q \geq n+1$, $\pi_{n+1}(X) \approx \pi_{n+1}(C_{\mu, n}) \approx Z^{\mu-1}$ gerado por aplicações de $(\mu-1)$ esferas S_i^{n+1} , $i = 1, 2, \dots, \mu-1$, em X , denotemos estas aplicações por $h_i: S^{n+1} \rightarrow X$, $i = 1, 2, \dots, \mu-1$.

No 1-esqueleto, f associa cada círculo do $\text{Wedge } \bigvee_{i=1}^{\mu-1} S_i^1$ sobre um dos μ -geradores do grupo livre não abeliano, $\pi_1(X) \approx Z^\mu$, e no $(n+1)$ -esqueleto, f aplica cada $(n+1)$ -esfera de $C_{\mu, n}$, segundo a aplicação h_i , f assim definida induz um isomorfismo entre $\pi_i(C_{\mu, n})$ e $\pi_i(X)$, $i \leq n+1 \leq q$.

Temos, então, o seguinte diagrama, onde cada linha é uma sequência exata:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \dots \rightarrow \pi_{n+2}(\hat{M}) & \rightarrow & \pi_{n+2}(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n}) & \xrightarrow{\delta} & \pi_{n+1}(\hat{C}_{\mu, n}) & \xrightarrow{\approx} & \pi_{n+1}(\hat{M}) \rightarrow \dots \\
 \downarrow & & \downarrow h & & \downarrow g & & \downarrow \\
 \dots \rightarrow H_{n+2}(\hat{M}) & \rightarrow & H_{n+2}(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n}) & \xrightarrow{j_*} & H_{n+1}(\hat{C}_{\mu, n}) & \xrightarrow{i_*} & H_{n+1}(\hat{M}) \rightarrow \dots
 \end{array}$$

Segundo Whitehead ([18], pág. 178) h é um epimorfismo. Vamos mostrar que i_* é um isomorfismo.

O par $(M, C_{\mu, n})$ é $n+1$ conexo, assim sendo, no diagrama comutativo abaixo, onde cada linha é uma sequência exata,

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \dots \rightarrow & \pi_{n+1}(\hat{C}_{\mu, n}) & \rightarrow & \pi_{n+1}(\hat{M}) & \rightarrow & \pi_{n+1}(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n}) & \rightarrow & \pi_n(\hat{C}_{\mu, n}) & \rightarrow & \pi_n(\hat{M}) & \rightarrow & \dots \\
 & \downarrow a_* & & \downarrow b_* & & \downarrow p_* & & \downarrow a_* & & \downarrow b_* & & \\
 \dots \rightarrow & \pi_{n+1}(C_{\mu, n}) & \rightarrow & \pi_{n+1}(M) & \rightarrow & \pi_{n+1}(M, C_{\mu, n}) & \rightarrow & \pi_n(C_{\mu, n}) & \rightarrow & \pi_n(M) & \rightarrow & \dots \\
 & & & & & \approx & & & & & & \\
 & & & & & 0 & & & & & &
 \end{array}$$

as aplicações $a_* = (P|_{\hat{C}_{\mu, n}})_*$ e $b_* = (P|_{\hat{M}})_*$ são isomorfismos (Whitehead, [18] pág. 178), pelo lema dos cinco, p_* é um isomorfismo, logo $\pi_{n+1}(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n}) \approx 0$, ou seja, $(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n})$ é $n+1$ conexo, donde $i_*: H_{n+1}(C_{\mu, n}) \rightarrow H_{n+1}(M)$ é sobre.

Seja $\alpha \in \ker(i_*)$, então $\exists \beta \in H_{n+2}(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n})$ tal que $\alpha = j_*(\beta)$, como h é sobre, $\exists \gamma \in \pi_{n+2}(\hat{M}, \hat{C}_{\mu, n})$ com $h(\gamma) = \beta$, mas δ é a aplicação nula, uma vez que $\pi_{n+1}(\hat{C}_{\mu, n}) \approx \pi_{n+1}(\hat{M})$, assim $\delta(\gamma) = 0 \Rightarrow g(\delta(\gamma)) = 0$. Como o diagrama comuta, temos

$$0 = g(\delta(\gamma)) = j_*(h(\gamma)) = \alpha$$

Logo $i_*: H_{n+1}(\hat{C}_{\mu, n}) \rightarrow H_{n+1}(\hat{M})$ é injetora donde é um isomorfismo e, com isso, obtemos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \pi_{n+1}(\hat{X}) & & \\
 & & & \nearrow \hat{f}_* & \downarrow \approx & & \\
 0 & \longrightarrow & \pi_{n+1}(\hat{C}_{\mu,n}) & \xrightarrow{\approx} & \pi_{n+1}(\hat{M}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow g & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & H_{n+1}(\hat{C}_{\mu,n}) & \xrightarrow[i_*]{\approx} & H_{n+1}(\hat{M}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \searrow \hat{f}_\# & & \uparrow \approx & & \\
 & & & & H_{n+1}(\hat{X}) & &
 \end{array}$$

Como $f: C_{\mu,n} \rightarrow X$ induz um isomorfismo de $\pi_{n+1}(C_{\mu,n})$ sobre $\pi_{n+1}(X)$ então seu levantamento $\hat{f}_*: \pi_{n+1}(\hat{C}_{\mu,n}) \rightarrow \pi_{n+1}(\hat{X})$ é um isomorfismo, segundo Whitehead ([18], pág. 181), temos $\hat{f}_\#: H_{n+1}(\hat{C}_{\mu,n}) \rightarrow H_{n+1}(\hat{X})$ um isomorfismo. Desse modo,

$$\pi_{n+1}(\hat{X}) \approx \pi_{n+1}(\hat{M}) \quad \text{e} \quad H_{n+1}(\hat{X}) \approx H_{n+1}(\hat{M}) \approx (\mu-1) \Lambda$$

e iii) está provado.

TEOREMA III.2.2

Suponha L um n -link de multiplicidade μ , q -simples. Seja $\hat{X}^k$ o revestimento cíclico de k folhas de $X = S^{n+2} - L$. Então:

- i) $H_1(\hat{X}^k) \approx_{\mathbb{Z}} \text{cok}(t^k-1) \oplus \mathbb{Z}$, onde $(t^k-1): H_1(\hat{X}) \rightarrow H_1(\hat{X})$.
- ii) Se $q \geq 1 \Rightarrow H_1(\hat{X}^k) \approx [k(\mu-1) + 1]\mathbb{Z}$.
- iii) Se $2 \leq q \leq n \Rightarrow H_i(\hat{X}^k) = 0$, $2 \leq i \leq q$.
- iv) Se $1 \leq q \leq n \Rightarrow H_{q+1}(\hat{X}^k) \approx \text{cok}(t^k-1)$,
onde $(t^k-1): H_{q+1}(\hat{X}) \rightarrow H_{q+1}(\hat{X})$.

$$v) \text{ Se } q \geq n+1 \Rightarrow H_{n+1}(\hat{X}^k) \approx K(\mu-1)Z.$$

Prova:

Como vimos no capítulo II, parágrafo 2, temos a sequência longa exata:

$$\dots \longrightarrow H_i(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} H_i(\hat{X}) \longrightarrow H_i(\hat{X}^k) \longrightarrow \dots$$

Se $i = 1$, temos:

$$\dots \longrightarrow H_1(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} H_1(\hat{X}) \longrightarrow H_1(\hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} \overset{Z}{\approx} H_0(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} \overset{Z}{\approx} H_0(\hat{X}) \longrightarrow \overset{Z}{\approx} H_0(\hat{X}^k) \longrightarrow 0.$$

Logo $(t^{k-1}) : H_0(\hat{X}) \rightarrow H_0(\hat{X})$ é o homomorfismo nulo donde temos a sequência

$$\dots \longrightarrow H_1(\hat{X}) \xrightarrow{t^{k-1}} H_1(\hat{X}) \longrightarrow H_1(\hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} \underset{\substack{\approx \\ Z}}{H_0(\hat{X})} \longrightarrow 0$$

e assim, como $H_0(\hat{X}) \approx Z$ é livre sobre Z , esta sequência cinde, donde

$$H_1(\hat{X}^k) \approx_Z \text{cok}(t^{k-1}) \oplus Z \text{ e assim provamos i) .}$$

Se $q \geq 1$ temos, pelo Lema III.2.1

$$0 \longrightarrow (\mu-1)\Lambda \xrightarrow{t^{k-1}} (\mu-1)\Lambda \longrightarrow H_1(\hat{X}^k) \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

ou seja

$$0 \longrightarrow \underset{\substack{\approx \\ k(\mu-1)Z}}{\frac{(\mu-1)\Lambda}{t^{k-1}}} \longrightarrow H_1(\hat{X}^k) \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

desse modo

$$H_1(\hat{X}^k) \approx k(\mu-1)Z \oplus Z = [k(\mu-1) + 1]Z \text{ e ii) está provado.}$$

Como $H_i(\hat{X}) = 0$, $2 \leq i \leq q$, pelo Lema III.2.1 temos a sequência exata:

$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \\ & " & & " & & " & & " \\ \dots \rightarrow & H_i(\hat{X}) & \xrightarrow{t^{k-1}} & H_i(\hat{X}) & \rightarrow & H_i(\hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_{i-1}(\hat{X}) & \xrightarrow{t^{k-1}} & H_{i-1}(\hat{X}) & \rightarrow \dots \end{array}$$

donde $H_i(\hat{X}^k) = 0$, $\forall 3 \leq i \leq q$.

Se $i = 2$, temos:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & & & & \text{cok}(t^{k-1}) \oplus \mathbb{Z} & & \\ & & & & & & & & \cong & & \\ H_2(\hat{X}) & \xrightarrow{t^{k-1}} & H_2(\hat{X}) & \longrightarrow & H_2(\hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_1(\hat{X}) & \xrightarrow{t^{k-1}} & H_1(\hat{X}) & \longrightarrow & H_1(\hat{X}^k) \\ " & & " & & & & & & & & \downarrow \\ 0 & & 0 & & & & & & & & \mathbb{Z} \\ & & & & & & & & & & \downarrow \\ & & & & & & & & & & 0 \end{array}$$

então a sequência se reduz a :

$$0 \longrightarrow H_2(\hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} 0 \quad \therefore \quad H_2(\hat{X}^k) = 0$$

e iii) foi provada.

Provemos agora iv). Basta mostrar para $q = 1$, pois para $q \geq 2$ segue da parte iii).

Se $q = 1$, então $(t^{k-1}) : H_1(\hat{X}) \rightarrow H_1(\hat{X})$ é injetora e assim temos que na sequência exata:

$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & & & & & \\ & " & & & & & \\ \dots \rightarrow & H_3(\hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_2(\hat{X}) & \xrightarrow{t^{k-1}} & H_2(\hat{X}) & \longrightarrow & H_2(\hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_1(\hat{X}) & \xrightarrow{t^{k-1}} & H_1(\hat{X}) & \longrightarrow \dots \end{array}$$

∂ é o homomorfismo nulo, donde

$$H_2(\hat{X}^k) \text{ é isomorfo ao } \text{cok}(t^{k-1}),$$

e isto prova iv).

Se $q \geq n+1$, pelo Lema III.2.1 , temos:

$$H_{n+1}(\hat{X}) \approx (\mu-1)\Lambda$$

Como $(t^k-1): H_{n+1}(\hat{X}) \rightarrow H_{n+1}(\hat{X})$ é injetora, temos a se
quência exata:

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow (\mu-1)\Lambda \xrightarrow{t^k-1} (\mu-1)\Lambda \longrightarrow H_{n+1}(\hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} H_n(\hat{X}) \longrightarrow \dots$$

$\approx$
0

Logo $H_{n+1}(\hat{X}^k) \approx \frac{(\mu-1)\Lambda}{t^k-1} \approx k(\mu-1)Z$, o que prova v) .

C A P Í T U L O I V

UMA GENERALIZAÇÃO DO RESULTADO DE CROWELL

Neste Capítulo faremos uma generalização do resultado de Crowell visto em II.4, para n -links L de multiplicidade μ , em função de L ser completamente esplitável ou q -simples.

LEMA IV.1

Seja L um n -link de multiplicidade μ e sejam $\hat{X}^k$ e $\bar{X}^k$ os revestimentos de k folhas cíclico e cíclico ramificado de L , respectivamente. Então:

i) $H_i(\bar{X}^k, \hat{X}^k) \simeq \mu \mathbb{Z}$ para $i = 2$ e $i = n+2$ e $H_i(\bar{X}^k, \hat{X}^k) \simeq 0$ nas outras dimensões.

ii) Na sequência exata de pares:

$$\dots \rightarrow H_2(\bar{X}^k) \rightarrow H_2(\bar{X}^k, \hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} H_1(\hat{X}^k) \rightarrow H_1(\bar{X}^k) \rightarrow 0$$

∂ é um monomorfismo.

Prova:

Consideremos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & & & 0 & \\
 & \approx & & & & \approx & \\
 \dots \rightarrow H_2(S^n \times D^2) & \rightarrow & H_2(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) & \xrightarrow[\approx]{\partial'} & H_1(\partial \hat{X}^k) & \rightarrow & H_1(S^n \times D^2) \rightarrow \dots \\
 & & \approx \int \text{Exis\~ao} & & \downarrow i_* & & \\
 \dots \rightarrow H_2(\bar{X}^k) & \rightarrow & H_2(\bar{X}^k, \hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_1(\hat{X}^k) & \rightarrow & H_1(\bar{X}^k) \rightarrow \dots
 \end{array}$$

Como $i_* : H_1(\partial \hat{X}^k) \rightarrow H_1(\hat{X}^k)$ é injetora, temos que ∂ é injetora, e provamos ii) onde a Exis\~ao é feita no aberto $\overset{\circ}{X}^k$.

Além disso, temos:

$$\begin{array}{ccccccc}
 H_2(\bar{X}^k, \hat{X}^k) & \approx & H_2(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) & \xrightarrow[\approx]{\partial'} & H_1(\partial \hat{X}^k) & \approx & \mu \mathbb{Z} \\
 \downarrow & & & & & & \\
 & \text{exis\~ao} & & & & &
 \end{array}$$

analogamente,

$$\begin{array}{ccccccc}
 H_{n+2}(\bar{X}^k, \hat{X}^k) & \approx & H_{n+2}(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) & \xrightarrow[\approx]{\partial'} & H_{n+1}(\partial \hat{X}^k) & \approx & \mu \mathbb{Z} \\
 \downarrow & & & & & & \\
 & \text{exis\~ao} & & & & &
 \end{array}$$

Vamos verificar nas demais dimensões. Consideremos a sequência do par $(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k)$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \dots \rightarrow H_2(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) & \rightarrow & H_1(\partial \hat{X}^k) & \rightarrow & H_1(S^n \times D^2) & \rightarrow & H_1(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) \rightarrow \dots \\
 & & & & \approx & & \\
 & & & & 0 & & \\
 \rightarrow & H_0(\partial \hat{X}^k) & \xrightarrow[\approx]{i_*} & H_0(S^n \times D^2) & \rightarrow & H_0(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) & \rightarrow 0 \\
 & \approx & & \approx & & & \\
 & \mathbb{Z} & & \mathbb{Z} & & &
 \end{array}$$

Como $H_1(S^n \times D^2) \approx 0$ e $i_* : H_0(\partial \hat{X}^k) \rightarrow H_0(S^n \times D^2)$ é um isomorfismo, temos que $H_1(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) \approx 0$ e $H_0(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k) \approx 0$.

Para $2 < j \leq n+1$ temos $H_j(S^n \times D^2) \approx 0$ e $H_{j-1}(\partial \hat{X}^k) \approx 0$.

Logo, da sequência a seguir:

$$\dots \rightarrow H_j(S^n \times D^2) \rightarrow H_j\left(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k\right) \rightarrow H_{j-1}(\partial \hat{X}^k) \rightarrow \dots$$

concluimos que $H_j\left(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k\right) \approx 0$.

Para $j > n+2$ temos:

$$H_j(S^n \times D^2) \approx 0 \quad \text{e} \quad H_{j-1}(\partial \hat{X}^k) \approx 0.$$

Logo, da sequência abaixo:

$$\dots \rightarrow H_j(S^n \times D^2) \rightarrow H_j\left(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k\right) \rightarrow H_{j-1}(\partial \hat{X}^k) \rightarrow \dots$$

concluimos que $H_j\left(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k\right) \approx 0$.

Como por Exisção,

$$H_j(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \approx H_j\left(\bigsqcup_{i=1}^{\mu} S^n \times D^2, \partial \hat{X}^k\right), \quad \forall j \geq 0,$$

o resultado segue.

□

TEOREMA IV.2

Seja L um n -link de multiplicidade μ e $\hat{X}^k, \bar{\hat{X}}^k$ os revestimentos cíclico e cíclico ramificado de k -folhas, de $X = S^{n+2} - L$, respectivamente. Então:

- i) $0 \rightarrow \mu\mathbb{Z} \rightarrow H_1(\hat{X}^k) \rightarrow H_1(\bar{\hat{X}}^k) \rightarrow 0$ é exata, e cinde se L é completamente esplitável ou 1-simples,
- ii) $i_*: H_i(\hat{X}^k) \rightarrow H_i(\bar{\hat{X}}^k)$ é um isomorfismo para $2 \leq i \leq n$,
- iii) $0 \rightarrow (\mu-1)\mathbb{Z} \rightarrow H_{n+1}(\hat{X}^k) \rightarrow H_{n+1}(\bar{\hat{X}}^k) \rightarrow 0$ é exata, e cinde se L é completamente esplitável ou $(n+1)$ -simples.

Prova:

Seja L um n -link completamente esplitável de multiplicidade μ , observemos o diagrama comutativo abaixo:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i) & \xrightarrow{a} & H_1(\hat{X}) & \xrightarrow{b} & (\mu-1)\Lambda \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow t^{k-1} & \searrow \wr & \downarrow t^{k-1} & \searrow \wr & \downarrow t^{k-1} \\
 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i) & \xrightarrow{a} & H_1(\hat{X}) & \xrightarrow{b} & (\mu-1)\Lambda \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow c & \searrow \wr & \downarrow c & \searrow \wr & \downarrow c_* \\
 & & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) & \xrightarrow{a_*} & H_1(\hat{X}^k) & \xrightarrow{b_*} & k(\mu-1)Z \\
 & & & & & & \downarrow \\
 & & & & & & 0
 \end{array}$$

Onde as duas linhas são sequências exatas dadas pelo Corolário III.1.3, a primeira coluna é uma soma de μ sequências exatas vistas em II.3 e a segunda coluna também é uma sequência exata vista em II.3.

Pelo Lema da "cobra" I.3.1 temos que a seguinte sequência é exata

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) \xrightarrow{a_*} H_1(\hat{X}^k) \xrightarrow{b_*} k(\mu-1)Z.$$

Mostremos que $b_* : H_1(\hat{X}^k) \rightarrow k(\mu-1)Z$ é sobre.

Seja $\alpha \in k(\mu-1)Z$, como c_* é sobre, $\exists \beta \in (\mu-1)\Lambda$ tal que $c_*(\beta) = \alpha$, como b é sobre $\exists \gamma \in H_1(\hat{X})$ tal que $b(\gamma) = \beta$ assim como o diagrama é comutativo temos $b_*(c(\gamma)) = \alpha$.

Logo, temos a sequência exata:

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) \xrightarrow{a_*} H_1(\hat{X}^k) \xrightarrow{b_*} k(\mu-1)Z \longrightarrow 0$$

Como L é completamente esplitável, cada componente é um $n\bar{o}$ isolado por uma bola B^{n+1} das outras componentes. Para construirmos seu revestimento ramificado procedemos da mesma forma colando um "toro sólido" $S^n \times D^2$, bordo a bordo, em cada variedade $\hat{X}_i^k$ e tal colagem não perturba a geometria dos demais componentes, pois é tudo feito isoladamente (dentro da bola B^{n+1} dada pela esplitabilidade). Desse modo, em cada componente, o meridiano de $\partial\hat{X}_i^k$, que era um dos geradores de $H_1(\hat{X}_i^k)$, se torna bordo de um disco D^2 e vai a zero em $H_1(\bar{\hat{X}}_i^k)$, do mesmo modo que no caso de um único $n\bar{o}$. Assim temos a seguinte sequência exata:

$$0 \longrightarrow \mu Z \longrightarrow H_1(\hat{X}^k) \longrightarrow H_1(\bar{\hat{X}}^k) \longrightarrow 0.$$

Vamos, agora, considerar o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & \ker b_{\#} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \ker f_* & \longrightarrow & \mu Z & \xrightarrow{f_*} & \mu Z & \xrightarrow{g_*} & \text{cok } f_* \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow b_* & \wr & \downarrow b & \wr & \downarrow b_{\#} \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) & \xrightarrow{f} & H_1(\hat{X}^k) & \xrightarrow{g} & k(\mu-1)Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow a_* & \wr & \downarrow a & \wr & \downarrow a_{\#} \\ \ker f_{\#} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\bar{\hat{X}}^k) & \xrightarrow{f_{\#}} & H_1(\bar{\hat{X}}^k) & \xrightarrow{g_{\#}} & \text{cok } f_{\#} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & \text{cok } b_{\#} \end{array}$$

Sendo L completamente esplitável, pela descrição ante

rior, vemos que $f_*: \mu Z \rightarrow \mu Z$ é um isomorfismo assim, $\ker f_* = 0$ e $\operatorname{cok} f_* = 0$.

Como as duas primeiras colunas (à esquerda) são exatas, pelo Lema da "cobra" I.3.1, temos que a seguinte sequência é exata:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & 0 & & & & \\ \text{"} & & \text{"} & & & & \\ \ker f_* \longrightarrow 0 \longrightarrow \ker f_{\#} \longrightarrow \operatorname{cok} f_{\#} \xrightarrow{b_{\#}} k(\mu-1)Z \xrightarrow{a_{\#}} \operatorname{cok} f_{\#} \end{array}$$

Assim nosso diagrama se transforma em:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 \longrightarrow & \mu Z & \xrightarrow{f_*} & \mu Z & \xrightarrow{g_*} & 0 & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow b_* & \circlearrowleft & \downarrow b & \circlearrowleft & \downarrow b_{\#} & \\ 0 \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) & \xrightarrow{f} & H_1(\hat{X}^k) & \xrightarrow{g} & k(\mu-1)Z & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow a_* & \circlearrowleft & \downarrow a & \circlearrowleft & \downarrow a_{\#} & \\ 0 \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\bar{X}_i^k) & \xrightarrow{f_{\#}} & H_1(\bar{X}^k) & \xrightarrow{g_{\#}} & \operatorname{cok} f_{\#} & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & 0 & & 0 & & \operatorname{cok} b_{\#} & \end{array}$$

Logo $a_{\#}$ é um monomorfismo. Vamos mostrar que ele é um epimorfismo.

Seja $\alpha \in \operatorname{cok} f_{\#} \Rightarrow \exists \beta \in H_1(\bar{X}^k)$ com $g_{\#}(\beta) = \alpha$ logo existe $\gamma \in H_1(\hat{X}^k)$ com $a(\gamma) = \beta$ e assim temos $a_{\#}(g(\gamma)) = \alpha$, pela comutatividade do diagrama, assim $a_{\#}$ é um isomorfismo e pelo Lema da "cobra" I.3.1 a sequência abaixo é exata:

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) \xrightarrow{f} H_1(\hat{X}^k) \xrightarrow{g} k(\mu-1)Z \longrightarrow 0.$$

E assim, temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mu Z & \longrightarrow & \mu Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\hat{X}_i^k) & \longrightarrow & H_1(\hat{X}^k) & \longrightarrow & k(\mu-1)Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_1(\bar{\hat{X}}_i^k) & \longrightarrow & H_1(\bar{\hat{X}}^k) & \longrightarrow & k(\mu-1)Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

A primeira coluna (à esquerda) é uma soma direta de μ seqüências que cindem, conforme II.4, e assim a coluna do meio que é uma seqüência exata, conforme o que acabamos de provar, cinde.

Como no Lema III.2.1, temos a aplicação

$$i: C_{\mu} \longrightarrow X \quad \text{tal que} \quad i_*: \pi_1(C_{\mu}) \longrightarrow \pi_1(X)$$

é um isomorfismo, logo $H_1(\hat{C}_{\mu}^k) \xrightarrow{\hat{i}_*} H_1(\hat{M}^k) \approx H_1(\hat{X}^k)$ é um isomorfismo onde $M = I_i$.

$\pi_1(\hat{C}_{\mu}^k)$ é um grupo livre com $k \cdot \mu$ geradores, escolhendo um ponto base no levantamento $\hat{*}$ do ponto $*$ do Wedge $\hat{C}_{\mu}$ e escolhendo μ geradores de $\pi_1(\hat{C}_{\mu}^k)$ que são exatamente os dados pelas seqüências de "segmentos" que recobrem cada gerador de C_{μ} . No desenho a seguir esquematizado, são caminhos que dão a volta acompanhando θ .

Assim fixado $\hat{*}_0$ como ponto base de $\hat{C}_\mu^k$ temos um outro Wedge de círculos C_μ^1 em $\hat{C}_\mu^k$ tal que cada círculo S_i^1 de C_μ^1 reveste k -vezes um dos círculos de C_μ . Na construção de $\bar{\hat{X}}^k$, ao colarmos os μ "toros" $S^n \times D^2$, temos que cada S_i^1 , assim descrito, torna-se um bordo de um disco D^2 , logo anulam-se em $H_1(\bar{\hat{X}}^k)$.

Desse modo, ao abelianizarmos $\pi_1(\hat{C}_\mu^k) \approx \pi_1(\hat{M}^k)$, este subgrupo livre com μ geradores de $\pi_1(\hat{M}^k)$ será um somando direto de $H_1(\hat{X}^k)$ que é abeliano livre com $\mu.k$ geradores, exatamente a imagem da inclusão $\mu Z \rightarrow H_1(\hat{X}^k)$ obtida na sequência exata

$$0 \longrightarrow \mu Z \longrightarrow H_1(\hat{X}^k) \longrightarrow H_1(\bar{\hat{X}}^k) \longrightarrow 0.$$

Assim, esta sequência cinde, e i) está provada.

Se $2 \leq i \leq n$, na sequência do par $(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k)$,

$$\begin{array}{ccccccc} H_{n+2}(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_{n+1}(\hat{X}^k) & \longrightarrow & H_{n+1}(\bar{\hat{X}}^k) & \longrightarrow & H_{n+1}(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} \\ \approx & & & & & & \approx \\ \mu Z & & & & & & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \xrightarrow{\partial} & H_n(\hat{X}^k) & \longrightarrow & H_n(\bar{\hat{X}}^k) & \longrightarrow & H_n(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \longrightarrow \dots \longrightarrow & H_3(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} \\ & & & & & \approx & \approx \\ & & & & & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \xrightarrow{\partial} & H_2(\hat{X}^k) & \longrightarrow & H_2(\bar{\hat{X}}^k) & \longrightarrow & H_2(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \xrightarrow{\partial} & H_1(\hat{X}^k) \longrightarrow H_1(\bar{\hat{X}}^k) \longrightarrow \dots \\ & & & & & \approx & \\ & & & & & \mu Z & \end{array}$$

E do Lema IV.1,

$$H_i(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) = \begin{cases} \mu Z, & i = 2, n+2 \\ 0 & \text{nas outras dimensões} \end{cases}$$

temos $H_i(\hat{X}^k) \approx H_i(\hat{X}^k)$, $3 \leq i \leq n$, além disso, pelo Lema IV.1, a aplicação $\partial: H_2(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \rightarrow H_1(\hat{X}^k)$ é um monomorfismo, logo $H_2(\bar{\hat{X}}^k) \approx H_2(\hat{X}^k)$ e ii) está provado.

$\bar{\hat{X}}^k$ é uma variedade orientável $(n+2)$ -dimensional, desse modo $H_{n+2}(\bar{\hat{X}}^k) \approx \mathbb{Z}$ tem como gerador a classe da soma de todas as células de dimensão $n+2$, pelo lema anterior, $H_{n+2}(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) \approx \mu\mathbb{Z}$, temos assim o diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H_{n+2}(\bar{\hat{X}}^k) & \xrightarrow{j_*} & H_{n+2}(\bar{\hat{X}}^k, \hat{X}^k) & \xrightarrow{\partial} & H_{n+1}(\hat{X}^k) \xrightarrow{i_*} H_{n+1}(\bar{\hat{X}}^k) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \approx & & \downarrow \approx & & \nearrow \\ & & \mathbb{Z} & \xrightarrow{(1, 1 \dots 1)} & \mu\mathbb{Z} \approx \mathbb{Z} \oplus (\mu-1)\mathbb{Z} & & \end{array}$$

donde temos a seguinte sequência exata:

$$0 \longrightarrow (\mu-1)\mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_{n+1}(\hat{X}^k) \xrightarrow{i_*} H_{n+1}(\bar{\hat{X}}^k) \longrightarrow 0 \quad (1)$$

Suponhamos que L é completamente esplitável, então

$$H_{n+1}(\hat{X}^k) \approx \bigoplus_{i=1}^{\mu} H_{n+1}(\hat{X}_i^k) \oplus k(\mu-1)\mathbb{Z}$$

onde, ao decompormos nosso espaço num produto Wedge, como no capítulo anterior, o somando direto $k(\mu-1)\mathbb{Z}$ de $H_{n+1}(\hat{X}^k)$ é gerado pelo levantamento do Wedge $\bigvee_{r=1}^{\mu-1} S_r^{n+1}$ em $\hat{X}^k$. Além disso, como cada componente do link está no "interior" de uma S_j^{n+1} , pela esplitabilidade de L , temos que o bordo de $\hat{X}_i^k$ é homólogo a classe, $[S_{i,1}^{n+1} + S_{i,2}^{n+1} + \dots + S_{i,k}^{n+1}]$, onde $S_{i,j}^{n+1}$ são os levantamentos da esfera $S_i^{n+1} \in \bigvee_{r=1}^{\mu-1} S_r^{n+1}$; cada $S_{i,j}^{n+1}$ na j -ésima folha de $\hat{X}^k$, além disso, sendo incluídos em $\bar{\hat{X}}^k$, colocamos $S^n \times D^2$ à cada componente do bordo, como na construção de $\bar{\hat{X}}^k$ no caso de $N\bar{O}$, ou seja, $i_*([S_{i,1}^{n+1} + S_{i,2}^{n+1} + \dots + S_{i,k}^{n+1}]) = 0$

em $H_{n+1}(\hat{X}^k)$, logo estas classes estão na $\text{Im } \partial$ e representam $(\mu-1)Z$ do somando direto $k(\mu-1)Z$ de $H_{n+1}(\hat{X}^k)$, donde a sequência (1) cinde. No caso de L ser $(n+1)$ -simples, sabemos que existe uma aplicação $f: C_{\mu,n} \rightarrow X$ que induz isomorfismos nos π_i , $1 \leq i \leq n+1$ e temos $H_{n+1}(\hat{C}_{\mu,n}^k) \cong H_{n+1}(\hat{X}^k) \cong k(\mu-1)Z$, segundo o Lema III.2.2.

Agora, a soma $S_{i,1}^{n+1} + S_{i,2}^{n+1} + \dots + S_{i,k}^{n+1}$ é de geradores livres em $\hat{C}_{\mu,n}^k$, para cada $1 \leq i \leq \mu-1$, logo $\text{Im } \partial$ é um $(\mu-1)Z$ somando direto de $H_{n+1}(\hat{X}^k)$ que é livre e assim a sequência (1) cinde.

Este teorema generaliza, portanto, para o caso de links o resultado de Crowell feito para o caso de Nós.

B I B L I O G R A F I A

- [1] Bourbaki, N. - Algèbre Commutative. Elements de Mathématique, fascicule XXVII, Hermann, #1290, Hermann Paris; 1961.
- [2] Cowsik, R.C. and Swarup, C.A. - "A Remark on infinite cyclic covers" Journal of pure and applied algebra, Vol.11, pp. 131-138 ; 1977.
- [3] Crowell, R.H. - " H_2 of subgroups of knot groups" Illinois J. Math., Vol.14, pp. 665-673 ; 1970.
- [4] Fox, R.H. - "The homology characters of the cyclic coverings of the knots of genus one" Ann. of Math. (1) , Vol.71, pp. 187-196; 1960.
- [5] Greenberg, M. - Lectures on Algebraic Topology. Mathematics lecture notes series. N.A. Benjamin, I.N.C. ; 1976.
- [6] Levine, J. - "Knot Modules $I^{(1)}$ ". Transactions of the American Mathematical Society, Vol.229 ; 1977.
- [7] Levine, J. - "Polynomial invariants of knots of codimension two". Ann. of Math. (2), Vol.84, pp. 537-554 , 1966.
- [8] Levine, J. - Unknotting Spheres in codimension two. Topology Vol.4 , pp. 9-16 .
- [9] Manzoli Neto, O. - "Total Linking Number Modules" P.h. D. Thesis, Brandeis University, U.S.A. ; 1982.
- [10] Marar, W.L. - "Espaços de Revestimentos e Aplicações à Teoria de Nós". Tese de Mestrado, ICMSC-USP; 1983.

- [11] Massey, W. - Algebraic Topology (An Introduction). G.T.M. #56, Springer-Verlag; 1977.
- [12] Milnor, J.W. - "Infinite Cyclic Coverings". Conference on the topology of manifolds, Prindle Weber and Schmidt, Boston, Mass., pp. 115-133, MR 39, #3497, 1968.
- [13] Rolfsen, D. - Knots and Links. Mathematics lecture notes series #7, Publish or perish, I.N.C., 1976.
- [14] Shinohara, Y. and Summers, D.W. - "Homology Invariants of cyclic covering with application to links". Transactions of the American Mathematical Society, Vol.163; 1972.
- [15] Saab, M.R. - "Módulos de ϕ_r -Links de Bordo de Codimensão 2". Tese de Livre-Docência, ICMSC-USP, 1984.
- [16] Spanaier, E. - Algebraic Topology Mc Graw-Hill. Séries in Higher Math., Mc Graw-Hill, 1966.
- [17] Vick, J.M. - Homology Theory (An introduction to algebraic topology) Pure and Applied Mathematics #53. Academic Press, 1973.
- [18] Whitehead, G.W. - Elements of homotopy theory, G.T.M., #61, Springer-Verlag, 1978.