HIPOELITICIDADE GLOBAL
PARA OPERADORES DE
SEGUNDA ORDEM

Sérgio Luís Zani

Orientador: *Prof. Dr. Adalberto Panobianco Bergamasco*

Dissertação apresentada ao Instituto de
Ciências Matemáticas de São Carlos, da
Universidade de São Paulo, para a obten
ção do Título de Mestre em Matemática.

SÃO CARLOS
1988

Aos meus
país.

- A G R A D E C I M E N T O S -

- Ao Prof. Dr. Adalberto Panobianco Bergamasco pela orientação e pelo apoio sempre presentes.
- Aos Professores do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos e do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, principalmente ao Prof. Dr. Hermano de Souza Ribeiro e ao Prof. Dr. Arnaldo Simal do Nascimento.
- Aos amigos e colegas de graduação e pós-graduação.
- Ao excelente trabalho de datilografia realizado pela Secretaria de Trabalhos Científicos do ICMSC-USP.

- Este trabalho contou parcialmente com o apoio financeiro do CNPq.

A B S T R A C T

Our main aim in this work is to study the regularity of the periodic solutions of differential equations (especially second order ones) using the characterization of periodic distributions and of smooth periodic functions by means of their Fourier series.

Í N D I C E

INTRODUÇÃO	i
CAPÍTULO I	1
I.1. - P_T : O Espaço das Funções Testes Periódicas	2
I.2. - P_T' : O Espaço das Distribuições Periódicas	9
I.3. - T-Convolução	28
I.4. - A Álgebra $(P_T', *, +)$	44
I.5. - A Série de Fourier	47
I.6. - A Série Parcial de Fourier	69
CAPÍTULO II	84
II.1. - Resolubilidade de Equações Lineares de T-Convolução	85
II.2. - Hipoeliticidade Global	89
II.3. - Exemplos de Operadores Globalmente Hipoelíticos	95
II.4. - Um Exemplo de Operador Diferencial Parcial a Coeficientes Variáveis Globalmente Hipoelítico ..	106
II.5. - Outros Exemplos	112
APÊNDICE	116
BIBLIOGRAFIA	122

INTRODUÇÃO

Este trabalho de Mestrado tem como objetivo principal o estudo da hipoeliticidade global de certos operadores diferenciais parciais lineares. Para chegar a isto fizemos no Capítulo I um estudo sobre distribuições periódicas procurando tratá-las de maneira que não fosse preciso ter um conhecimento prévio da teoria das distribuições, visando com isso torná-lo mais acessível. Ainda neste capítulo estudamos as séries de Fourier das distribuições periódicas e das funções periódicas infinitamente diferenciáveis de n variáveis reais.

Após terminarmos a redação deste trabalho tomamos conhecimento do livro Equações Diferenciais Parciais: Uma Introdução, de Rafael Iório e Valéria Iório, Projeto Euclides - 1988, o qual trata este assunto no caso de uma variável.

Os resultados obtidos neste capítulo foram a ferramenta básica para o Capítulo II, que contém a parte principal do trabalho. Neste capítulo estudamos a influência dos termos de ordem mais baixa de um operador diferencial parcial linear a coeficientes constantes de 2ª ordem através de exemplos. Isto é, adicionamos a certos operadores homogêneos de ordem 2 outros homogêneos de ordem 1 e de ordem 0 e comparamos a hipoeliticidade do operador resultante com aquela de cada uma das parcelas.

Mostramos a hipoeliticidade do operador P dado por

$$Pu = - \frac{\partial^2}{\partial x^2} u - \phi^2(x) \frac{\partial^2}{\partial y^2} u + a(x) \frac{\partial u}{\partial y} \quad \text{onde } a \text{ e } \phi \text{ são funções}$$

2π -periódicas de classe C^∞ , $\phi(0) \neq 0$ e $\phi(x) = 0$ se $\frac{\pi}{2} \leq |x| \leq \pi$. No caso em que $a \equiv 0$, $\phi(x) \equiv 1$ se $|x| < \frac{\pi}{2}$ e $\phi(x) = 0$ se $\frac{3\pi}{4} \leq |x| \leq \pi$ o operador $\tilde{P}$ é o mesmo que foi estudado por Fujiwara e Omori ([4]).

Por fim, verificamos que para quase todo $a \in [0,1]$ os operadores das famílias

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} - a \frac{\partial}{\partial y} \right)_{a \in [0,1]} \quad \text{e} \quad \left(\sum_{1 \leq |\alpha| \leq 2} a_\alpha D^\alpha + a \right)_{a \in [0,1]}$$

são globalmente hipoelíticos.

O Teorema 4 da seção 2 e o Teorema 1 da seção 3 do Capítulo II são de Greenfield e Wallach [5].

CAPÍTULO I

O objetivo deste capítulo é caracterizar as funções periódicas infinitamente diferenciáveis e as distribuições periódicas com suas séries de Fourier.

Na primeira seção será feito um breve estudo envolvendo as funções periódicas infinitamente diferenciáveis.

Na segunda seção serão definidas as distribuições periódicas e apresentadas algumas de suas propriedades mais importantes.

Na terceira seção será definido um tipo de convolução (T-convolução) para funções e distribuições periódicas. Um fato interessante é que esta convolução fica definida para quaisquer pares de distribuições periódicas, fato que não ocorre com as distribuições e convolução usuais.

Na quarta seção será dada uma condição necessária e suficiente para a resolubilidade de uma equação linear da T-convolução.

A quinta seção será dedicada ao estudo da série de Fourier tanto das funções periódicas infinitamente deriváveis como das distribuições periódicas. Será mostrada a caracterização de cada um destes objetos com seqüências numéricas apropriadas.

Na sexta seção serão estudadas as séries parciais de Fourier para funções periódicas infinitamente diferenciáveis e distribuições periódicas.

1. P_T : O ESPAÇO DAS FUNÇÕES TESTES PERIÓDICAS

Sejam $T > 0$ e $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^n$.

DEFINIÇÃO 1. Seja

$$P_T(\mathbb{R}^n) = \{ \theta \in C^\infty(\mathbb{R}^n) ; \theta(x) = \theta(x - Tm), \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall m \in \mathbb{Z}^n \}.$$

$P_T(\mathbb{R}^n)$ ou, simplesmente, P_T é um espaço vetorial chamado de espaço das funções testes periódicas.

DEFINIÇÃO 2. Uma seqüência $(\theta_j)_{j \in \mathbb{N}}$ onde $\theta_j \in P_T, j \in \mathbb{N}$, converge em P_T se existir $\theta \in P_T$ tal que $D^\alpha \theta_j$ converge uniformemente para $D^\alpha \theta$, para cada $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$.

Existe uma métrica em P_T em relação a qual as seqüências convergentes são as da Definição 2. A saber:

$$d(\theta, \phi) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(\theta - \phi)}{2^k(1 + p_k(\theta - \phi))},$$

onde

$$p_k(\theta) = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq k}} |D^\alpha \theta(x)|$$

é uma semi-norma.

TEOREMA 1. θ_j converge para θ em P_T se, e somente se, $p_k(\theta_j - \theta) \rightarrow 0$ para cada $k = 1, 2, \dots$.

DEMONSTRAÇÃO:

Se $\theta_j \rightarrow \theta$ em P_T , então, para cada k ,

$$p_k(\theta_j - \theta) = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq k}} |D^\alpha \theta_j(x) - D^\alpha \theta(x)| \rightarrow 0.$$

Se $p_k(\theta_j - \theta) \rightarrow 0$ então para cada $\alpha \in \mathbb{N}^n$,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \theta_j(x) - D^\alpha \theta(x)| &\leq \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq k}} |D^\alpha \theta_j(x) - D^\alpha \theta(x)| = \\ &= p_k(\theta_j - \theta) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Para cada $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ defina $\theta(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - Tm)$.

θ está bem definida pois, existe $C > 0$ tal que $\phi(x) = 0$ para todo x de $\mathbb{R}^n$ tal que $|x| \geq C$.

Assim, se $x \in \mathbb{R}^n$ e $|x| \leq a$ para algum $a > 0$ então

$$\phi(x - Tm) \neq 0 \Rightarrow 0 \Rightarrow |x - Tm| < C \Rightarrow |x_i - Tm_i| < C,$$

$$i = 1, \dots, n \Rightarrow -C < Tm_i - x_i < C, \quad i = 1, \dots, n.$$

Como $-a \leq x_i \leq a$ temos

$$-C - a \leq -C + x_i < Tm_i < C + x_i \leq C + a, \quad i = 1, \dots, n.$$

Logo, $|m_i| \leq \frac{C+a}{T}$, $i = 1, \dots, n$. Como existe apenas um número finito de n -uplas m que satisfazem esta última condição, podemos escrever

$$\theta(x) = \phi(x - Tm_1) + \dots + \phi(x - Tm_k)$$

desde que $|x| \leq a$.

Mostremos que $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

Seja $m \in \mathbb{Z}^n$

$$\begin{aligned}\theta(x - Tm) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - Tm - Tk) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - T(m+k)) = \\ &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - T\ell) = \theta(x) .\end{aligned}$$

Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$, seja $a > 0$ tal que $|x_0| < a$. Assim,

$$\theta(x) = \phi(x - Tm_1) + \dots + \phi(x - Tm_k), \quad |x| < a$$

e vemos que θ é infinitamente diferenciável em x_0 . Logo, $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

Além do mais,

$$D^\alpha \theta(x) = D^\alpha \phi(x - Tm_1) + \dots + D^\alpha \phi(x - Tm_k)$$

e como $\phi(x - Tm) \equiv 0$ se $|x| < a$ e $m \neq m_i$, $i = 1, \dots, k$, temos também que

$$D^\alpha \phi(x - Tm) \equiv 0 \quad \text{se} \quad |x| < a \quad \text{e} \quad m \neq m_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Desse modo podemos escrever

$$D^\alpha \theta(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} D^\alpha \phi(x - Tm) .$$

PROPOSIÇÃO 1. Seja $(\phi_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$, $\phi_\ell \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\ell \in \mathbb{N}$ tal que ϕ_ℓ converge para ϕ em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Então, a sequência $(\theta_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ de $P_T(\mathbb{R}^n)$ definida por $\theta_\ell(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_\ell(x - Tm)$ converge em $P_T(\mathbb{R}^n)$ para $\theta(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - Tm)$.

DEMONSTRAÇÃO:

Existe $a > 0$ tal que $S(\phi_\ell) \subset B[0, a]$, para todo $\ell \in \mathbb{N}$ e $D^\alpha \phi_\ell$ converge para $D^\alpha \phi$ uniformemente para todo $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

Sejam $\alpha \in \mathbb{N}^n$ e $\varepsilon > 0$.

Como $D^\alpha(\phi_\ell - \phi) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ existem $m_1, \dots, m_{k_\ell}$ tais que

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm) = D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_1) + \dots + D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_{k_\ell}),$$

$$x \in [0, T]^n.$$

Mas $\phi_\ell(x) \equiv 0$ se $x \notin B[0, a]$, $\ell \in \mathbb{N}$.

Logo, se $\phi_\ell(x - Tm) \neq 0$ então $|x - Tm| \leq a$ e isto implica em $x_i - a \leq Tm_i \leq a + x_i$.

Como $x \in [0, T]^n$, vem que

$$-a - T \leq -a \leq Tm_i \leq a + x_i \leq a + T$$

e, portanto

$$|m_i| \leq \frac{a}{T} + 1.$$

Como a independe de $\ell \in \mathbb{N}$, concluímos que só existe um número finito de índices m tal que $\phi_\ell(x - Tm) \neq 0$ para todo $\ell \in \mathbb{N}$.

Desse modo, podemos escrever

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm) = D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_1) + \dots$$

$$+ \dots + D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_{k_\ell}), \quad \forall \ell \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in [0, T]^n.$$

Como $D^\alpha \phi_\ell$ converge para $D^\alpha \phi$ uniformemente, existe $\ell_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\ell \geq \ell_0$ implica em

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \phi_\ell(x) - D^\alpha \phi(x)| < \frac{\varepsilon}{k}.$$

Logo, se $\ell \geq \ell_0$ e $x \in [0, T]^n$

$$\begin{aligned} |D^\alpha \theta_\ell(x) - D^\alpha \theta(x)| &= |D^\alpha(\theta_\ell - \theta)(x)| = \\ &= |D^\alpha(\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\phi_\ell - \phi)(x - Tm))| = |\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm)| : \\ &= |D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_1) + \dots + D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_k)| \leq \\ &\leq |D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_1)| + \dots + |D^\alpha(\phi_\ell - \phi)(x - Tm_k)| < \\ &< \frac{\varepsilon}{k} + \dots + \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Considere

$$U_T(\mathbb{R}^n) = \{ \xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi(x - Tm) = 1, \forall x \in \mathbb{R}^n \}.$$

Se $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$ diremos que ξ é unitária.

Um exemplo de função unitária é $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\xi(t) = \begin{cases} \frac{\int_{|t|}^1 \exp(\frac{-1}{x(1-x)}) dx}{\int_0^1 \exp(\frac{-1}{x(1-x)}) dx} & \text{se } |t| < 1 \\ 0 & \text{se } |t| \geq 1 \end{cases}$$

Verifica-se que $\xi \in C^\infty(\mathbb{R})$ e $S(\xi) = [-1, 1]$.

Dado $t \in \mathbb{R}$ seja $n_0 \in \mathbb{Z}$ tal que $n_0 \leq t \leq n_0 + 1$.

isto é, $0 \leq t - n_0 \leq 1$ ou $-1 \leq n_0 - t \leq 0$.

Se $n \geq n_0 + 2$ então $t \leq n$ e

$$|t-n| = n-t \geq n_0 - t + 2 \geq -1 + 2 = 1$$

logo, $\xi(t-n) = 0$.

Se $n \leq n_0 - 1$ então $n < t$ e

$$|t-n| = t-n \geq t+1-n_0 = (t-n_0) + 1 \geq 1$$

logo, $\xi(t-n) = 0$.

Assim,

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \xi(t-n) &= \xi(t-n_0) + \xi(t-n_0-1) = \\ &= \left(\int_0^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx \right)^{-1} \cdot \left[\int_{t-n_0}^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx + \right. \\ &+ \left. \int_{1+n_0-t}^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx \right] = \left(\int_0^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx \right)^{-1} \cdot \\ &\cdot \left[\int_{t-n_0}^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx - \int_{t_0-n_0}^0 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx \right] = \\ &= \left(\int_0^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx \right)^{-1} \cdot \left(\int_0^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) dx \right) = 1. \end{aligned}$$

Se $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$ então $\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e como visto

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} D^\alpha \xi(x - Tm) = D^\alpha \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi(x - Tm) = D^\alpha 1 = 0.$$

PROPOSIÇÃO 2 . Se (θ_j) converge para θ em $P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$ então $(\xi \cdot \theta_j)$ converge para $\xi \cdot \theta$ em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

DEMONSTRAÇÃO:

$$i) \quad S(\xi \cdot \theta_j) \subset S(\xi)$$

ii) Dado $\alpha \in \mathbb{N}^n$ temos que

$$D^\alpha(\xi \cdot \theta_j) = \sum_{\gamma + \beta = \alpha} \frac{\alpha!}{\gamma! \beta!} D^\gamma \xi \cdot D^\beta \theta_j$$

converge uniformemente para

$$\sum_{\gamma + \beta = \alpha} \frac{\alpha!}{\gamma! \beta!} D^\gamma \xi \cdot D^\beta \theta = D^\alpha(\xi \cdot \theta)$$

pois θ_j converge para θ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

A proposição seguinte mostra que é sempre possível escrever uma função θ de P_T na forma $\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - Tm)$ com $\phi \in C_c^\infty$.

PROPOSIÇÃO 3 . A aplicação

$$\tilde{T} : C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow P_T(\mathbb{R}^n)$$

$$\phi \longmapsto \tilde{T} \phi$$

onde $\tilde{T} \phi(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - Tm)$ é sobrejetora.

DEMONSTRAÇÃO:

Dada $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ defina $\phi = \xi \cdot \theta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ onde $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$.

Assim,

$$\begin{aligned}
 (T\phi)(x) &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi(x - Tm) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi(x - Tm) \cdot \theta(x - Tm) = \\
 &= \theta(x) \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi(x - Tm) = \theta(x) .
 \end{aligned}$$

Logo,

$$T\phi = \theta .$$

Note ξ é uma função unitária arbitrária.

2. P_T' : O ESPAÇO DAS DISTRIBUIÇÕES PERIÓDICAS

DEFINIÇÃO 1. Um funcional linear $f : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$ é dito contínuo (ou seqüencialmente contínuo) se (θ_j) converge para 0 em P_T implica que $f(\theta_j)$ convirja para 0 em $\mathbb{C}$.

DEFINIÇÃO 2. O espaço vetorial $P_T'(\mathbb{R}^n) = \{ f ; f \text{ é funcio} \}$ nal linear contínuo de $P_T(\mathbb{R}^n)$ } é chamado de espaço das dis_ tribuições periódicas e f é dita uma distribuição periódica.

Se $f \in P_T'$ e $\theta \in P_T$ usaremos a seguinte notação:

$$f(\theta) = (f, \theta) .$$

TEOREMA 1 : Seja $f : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$ um funcional linear. São e quivalentes:

- i) f é contínuo;

ii) Existem $C > 0$ e $m \in \mathbb{N}$ tais que

$$|(f, \theta)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \theta(x)| ,$$

para toda θ de P_T .

DEMONSTRAÇÃO:

Suponha que (ii) seja válido. Se (θ_j) vai a 0 em P_T então $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \theta_j(x)|$ tende a zero para todo $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

Logo, a soma

$$\sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \theta_j(x)|$$

também tende a zero quando j tende a infinito.

Portanto, usando a desigualdade em (ii) concluímos que f é contínuo.

Suponha agora que f é contínuo.

Se $f \equiv 0$ a implicação é imediata. Admitamos que (ii) seja falso e $f \neq 0$.

Então, para cada $m \in \mathbb{N}$, podemos encontrar $\tilde{\theta}_m \in P_T$ tal que

$$|(f, \tilde{\theta}_m)| > m \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \tilde{\theta}_m(x)|$$

Definindo $\theta_m = \frac{\tilde{\theta}_m}{|(f, \tilde{\theta}_m)|}$ temos que

$$|(f, \theta_m)| = 1 > m \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \theta_m(x)|$$

E daí,

$$0 < \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha \theta_m(x)| < \frac{1}{m}$$

Assim, θ_m converge para 0 em P_T , porém (f, θ_m) não converge a zero em $\mathbb{T}$. Absurdo.

DEFINIÇÃO 3. Diremos que uma seqüência (f_n) de distribuições T-periódicas é convergente em $P'_T(\mathbb{R}^n)$ se existir $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ tal que para toda $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ a seqüência (f_n, θ) converge para (f, θ) .

O próximo teorema mostra que existe uma identificação entre o $P'_T(\mathbb{R}^n)$ e o subespaço vetorial e topológico (munido da topologia induzida de $D'(\mathbb{R}^n)$) definido por:

$$D'_T(\mathbb{R}^n) = \{ u \in D'(\mathbb{R}^n) ; u = u_{Tm}, \forall m \in \mathbb{Z}^n \}$$

onde $\langle u_{Tm}, \phi \rangle = \langle u, \phi_{-Tm} \rangle$ e $\phi_{Tm}(x) = \phi(x - Tm)$.

TEOREMA 2. Existe um homeomorfismo linear entre $P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $D'_T(\mathbb{R}^n)$.

DEMONSTRAÇÃO:

Seja $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Para cada $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ considere

$$\theta = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm} \in P_T(\mathbb{R}^n)$$

Podemos definir

$$u : C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{por} \quad u(\phi) = (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = (f, \theta) .$$

Mostremos que $u \in D'_T(\mathbb{R}^n)$.

Linearidade: Se $\phi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ então

$$\begin{aligned} u(\phi + \psi) &= (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\phi + \psi)_{Tm}) = \\ &= (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm} + \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \psi_{Tm}) = \\ &= (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) + (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \psi_{Tm}) = u(\phi) + u(\psi) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} u(\lambda\phi) &= (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\lambda\phi)_{Tm}) = (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \lambda\phi_{Tm}) = \\ &= (f, \lambda \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = \lambda (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = \lambda u(\phi) . \end{aligned}$$

Continuidade: Se ϕ_j converge para zero em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, a Proposição 1 da seção anterior garante que $\theta_j = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\phi_j)_{Tm}$ converge para $\theta = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} 0_{Tm} = 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

Desse modo, $u(\phi_j) = (f, \theta_j)$ converge para 0 em $\mathbb{C}$. Logo, $u \in D'_T(\mathbb{R}^n)$. Usaremos a notação $u(\phi) = \langle u, \phi \rangle$.

Periodicidade: Se $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $m \in \mathbb{Z}^n$ então

$$\begin{aligned} \langle u_{Tm}, \phi \rangle &= \langle u, \phi_{-Tm} \rangle = (f, \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} (\phi_{-Tm})_{Tk}) = \\ &= (f, \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \phi_{T(k-m)}) = (f, \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tk}) = \langle u, \phi \rangle , \end{aligned}$$

isto é, $u_{Tm} = u$.

Portanto, $u \in D'_T(\mathbb{R}^n)$.

Seja

$$A : P'_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow D'_T(\mathbb{R}^n)$$

$$f \longmapsto u = T(f)$$

onde $\langle u, \phi \rangle = (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm})$, $\phi \in C^\infty_c(\mathbb{R}^n)$.

Mostremos que A é linear e contínuo.

Linearidade: Se $f, g \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ então, para toda $\phi \in C^\infty_c(\mathbb{R}^n)$ temos

$$\begin{aligned} \langle A(f+g), \phi \rangle &= (f+g, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = \\ &= (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) + (g, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = \\ &= \langle A(f), \phi \rangle + \langle A(g), \phi \rangle = \langle A(f) + A(g), \phi \rangle \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \langle A(\lambda f), \phi \rangle &= \langle \lambda f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm} \rangle = \lambda \langle f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm} \rangle = \\ &= \lambda \langle A(f), \phi \rangle = \langle \lambda A(f), \phi \rangle . \end{aligned}$$

Continuidade: Seja (f_j) , $f_j \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ tal que f_j tende a zero em $P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Dada $\phi \in C^\infty_c(\mathbb{R}^n)$, temos que

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \langle A(f_j), \phi \rangle = \lim_{j \rightarrow \infty} (f_j, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = 0 .$$

Logo, $A(f_j)$ tende a zero em $D'_T(\mathbb{R}^n)$.

Vamos agora, a partir de $u \in D'_T(\mathbb{R}^n)$, definir uma única

distribuição T -periódica f de modo que esta aplicação seja a inversa de A .

Seja $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$. Para cada $u \in D'_T(\mathbb{R}^n)$ definamos

$$f_\xi : P_T(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \longmapsto \langle u, \xi \cdot \theta \rangle .$$

Mostremos que $f_\xi \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Linearidade: Sejam $\theta, \beta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad f_\xi(\theta + \beta) &= \langle u, \xi(\theta + \beta) \rangle = \langle u, \xi\theta + \xi\beta \rangle = \langle u, \xi\theta \rangle + \langle u, \xi\beta \rangle = \\ &= f_\xi(\theta) + f_\xi(\beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad f_\xi(\lambda\theta) &= \langle u, \xi(\lambda\theta) \rangle = \langle u, \lambda\xi\theta \rangle = \langle \lambda u, \xi\theta \rangle = \lambda \langle u, \xi\theta \rangle = \\ &= \lambda f_\xi(\theta) . \end{aligned}$$

Continuidade: Seja (θ_j) , $\theta_j \in P_T(\mathbb{R}^n)$ tal que θ_j tende a zero em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

A Proposição 2 da seção anterior nos diz que $(\xi\theta_j)$ tende a zero em $C^\infty_C(\mathbb{R}^n)$.

Como $u \in D'_T(\mathbb{R}^n)$ temos que $f_\xi(\theta_j) = \langle u, \xi\theta_j \rangle \rightarrow 0$.

Logo, $f_\xi \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Mostremos que a definição de f_ξ independe da escolha de ξ , isto é, se $\xi, \eta \in U_T(\mathbb{R}^n)$ então $f_\xi = f_\eta$.

Mostremos antes que

$$u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (u\eta)_{Tm} .$$

Seja $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Então

$$\begin{aligned} \langle u - \sum_{|m| \leq k} (u\eta)_{Tm}, \phi \rangle &= \langle u - \sum_{|m| \leq k} u_{Tm} \eta_{Tm}, \phi \rangle = \\ &= \langle u - \sum_{|m| \leq k} u \eta_{Tm}, \phi \rangle = \langle u(1 - \sum_{|m| \leq k} \eta_{Tm}), \phi \rangle = \\ &= \langle u, \phi \cdot (1 - \sum_{|m| \leq k} \eta_{Tm}) \rangle \end{aligned}$$

converge para zero pois, $1 - \sum_{|m| \leq k} \eta_{Tm}$ tende a zero em $P_T(\mathbb{R}^n)$ e pela Proposição 2 da seção anterior $\phi \cdot (1 - \sum_{|m| \leq k} \eta_{Tm})$ tende a zero em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Além do mais, como

$$\langle \sum_{|m| \leq k} (u\eta)_{Tm}, \phi \rangle = \sum_{|m| \leq k} \langle (u\eta)_{Tm}, \phi \rangle$$

temos que

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle (u\eta)_{Tm}, \phi \rangle = \langle \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (u\eta)_{Tm}, \phi \rangle.$$

Provemos agora que $f_\xi = f_\eta$.

Dada $\theta \in P_T$ tome $\phi = \xi\theta$ então

$$\begin{aligned} f_\xi(\theta) &= \langle u, \xi\theta \rangle = \langle \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (u\eta)_{Tm}, \xi\theta \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle (u\eta)_{Tm}, \xi\theta \rangle = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u\eta, (\xi\theta)_{-Tm} \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u\eta, \theta\xi_{-Tm} \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u, \eta\theta\xi_{-Tm} \rangle = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u\xi_{-Tm}, \eta\theta \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle (u\xi)_{-Tm}, \eta\theta \rangle = \\ &= \langle \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (u\xi)_{-Tm}, \eta\theta \rangle = \langle u, \eta\theta \rangle = f_\eta(\theta). \end{aligned}$$

Passaremos a escrever somente

$$f_{\xi} = f .$$

Definamos

$$H : D_T'(\mathbb{R}^n) \rightarrow P_T'(\mathbb{R}^n)$$

$$u \longmapsto H(u)$$

$$\text{onde } H(u) : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \longmapsto \langle u, \xi \theta \rangle$$

$$\text{e } \xi \in U_T .$$

H é linear pois, dados $u, v \in D_T'(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ temos para todo $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad (H(u+v), \theta) &= \langle u+v, \xi \theta \rangle = \langle u, \xi \theta \rangle + \langle v, \xi \theta \rangle = \\ &= (H(u), \theta) + (H(v), \theta) = (H(u) + H(v), \theta) ; \end{aligned}$$

$$\text{ii)} \quad (H(\lambda u), \theta) = \langle \lambda u, \xi \theta \rangle = \lambda \langle u, \xi \theta \rangle = (\lambda H(u), \theta) .$$

H é contínuo pois, se $u_j \rightarrow 0$ em $D_T'(\mathbb{R}^n)$ então para cada $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$

$$(H(u_j), \theta) = \langle u_j, \xi \theta \rangle \rightarrow 0 .$$

Portanto, $H(u_j) \rightarrow 0$ em $P_T'(\mathbb{R}^n)$.

Mostremos que H é a inversa de A .

Sejam $u \in D_m'(\mathbb{R}^n)$, $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\xi \in U_m(\mathbb{R}^n)$.

Observe que se $a > 0$ é tal que $S(\xi) \subset B[0, a]$ então

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \xi(x) \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi(x) \phi_{Tm}(x) = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\phi \cdot \xi_{-Tm})_{Tm}(x) = 0\end{aligned}$$

se $|x| > a$ e, se $|x| \leq a$ então

$$\psi(x) = \xi(x) (\phi(x - Tm_1) + \dots + \phi(x - Tm_k))$$

para certos $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{Z}^n$.

Deste modo, para todo $x \in \mathbb{R}^n$ a série

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi \phi_{Tm} = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\phi \xi_{-Tm})_{Tm} \text{ é finita.}$$

Tendo em vista isto, obtemos

$$\begin{aligned}\langle A(H(u)), \phi \rangle &= (H(u), \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}) = \langle u, \xi \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm} \rangle = \\ &= \langle u, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\phi \xi_{-Tm})_{Tm} \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u, (\phi \xi_{-Tm})_{Tm} \rangle = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u, \phi \xi_{-Tm} \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle u \xi_{-Tm}, \phi \rangle = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle (u\xi)_{-Tm}, \phi \rangle = \langle \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (u\xi)_{-Tm}, \phi \rangle = \langle u, \phi \rangle\end{aligned}$$

onde as duas últimas igualdades são válidas em virtude da observação feita antes de demonstrarmos que $f_\eta = f_\xi$.

Agora, para $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$, $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}(H(A(f)), \theta) &= \langle A(f), \xi \theta \rangle = (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (\xi \theta)_{Tm}) = \\ (f, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi_{Tm} \theta) &= (f, \theta \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi_{Tm}) = (f, \theta) .\end{aligned}$$

Portanto, $H = A^{-1}$, o que demonstra o teorema.

De agora em diante não distinguiremos mais u e f . Apenas quando julgarmos que possa haver dúvidas faremos alguma menção.

Mas como o nosso propósito é tratar distribuições periódicas como funcionais lineares contínuos de P_T procuraremos usar a notação de P_T' .

Vejamos agora alguns exemplos de distribuições periódicas.

EXEMPLO 1 :

Seja $g \in L^1([0, T]^n)$.

Defina $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$f(x + Tm) = g(x), \quad x \in [0, T]^n, \quad m \in \mathbb{Z}^n.$$

Se $\xi \in U_T(\mathbb{R}^n)$ e $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ então $f \cdot \xi \cdot \theta \in L^1(\mathbb{R}^n)$ e podemos definir

$L_f : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$L_f(\theta) = \int_{\mathbb{R}^n} f \theta \xi(x) dx$$

Vê-se que L_f é linear e, além do mais, se $\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$ então $f \cdot \xi \cdot \theta_j \rightarrow 0$ quase sempre e

$$\begin{aligned} |(f \cdot \xi \cdot \theta_j)(x)| &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\theta_j(x)| \cdot |(f \cdot \xi)(x)| \leq \\ &\leq C |(f \cdot \xi)(x)| \in L^1(\mathbb{R}^n) \end{aligned}$$

pois como $\theta_j \rightarrow 0$ em P_T existe $C > 0$ tal que

$$|\sup \theta_j(x)| \leq C \quad \text{para todo } j \in \mathbb{N}.$$

Assim, pelo Teorema da Convergência Dominada

$$L_f(\theta_j) = \int_{\mathbb{R}^n} f \xi \theta_j \rightarrow 0$$

Portanto, $L_f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Além do mais, se $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ temos

$$\begin{aligned} (L_f, \theta) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \xi(x) \theta(x) dx = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \int_{\prod_{i=1}^n [a_i + Tm_i, a_i + Tm_i + T]} f(x) \xi(x) \theta(x) dx = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \int_{\prod_{i=1}^n [a_i, a_i + T]} f(y + Tm) \xi(y + Tm) \theta(y + Tm) dy = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \int_{\prod_{i=1}^n [a_i, a_i + T]} f(y) \theta(y) \xi(y + Tm) dy = \\ &= \int_{\prod_{i=1}^n [a_i, a_i + T]} f(y) \theta(y) \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \xi(y + Tm) dy = \\ &= \int_{\prod_{i=1}^n [a_i, a_i + T]} f(y) \theta(y) dy . \end{aligned}$$

EXEMPLO 2 :

Seja

$$\delta : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \longmapsto \theta(0) .$$

Linearidade: Para todas $\theta_1, \theta_2 \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ temos:

$$i) \quad \delta(\theta_1 + \theta_2) = (\theta_1 + \theta_2)(0) = \theta_1(0) + \theta_2(0) = \delta(\theta_1) + \delta(\theta_2) ;$$

$$ii) \quad \delta(\lambda\theta_1) = (\lambda\theta_1)(0) = \lambda\theta_1(0) = \lambda\delta(\theta_1) .$$

Continuidade: Se $\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$ então $\delta(\theta_j) = \theta_j(0) \rightarrow 0$ em $\mathbb{C}$. Portanto, δ é contínua.

Deste modo $\delta \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Vejamos qual é o correspondente de δ em $D'_T(\mathbb{R}^n)$.

Pelo Teorema 2 sabemos que tal correspondente, digamos $\tilde{\delta}$, é definido por

$$\langle \tilde{\delta}, \phi \rangle = \left(\delta, \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm} \right) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_{Tm}(0) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi(Tm) .$$

δ é chamada de distribuição δ de Dirac T-periódica, ou δ de Dirac concentrada em Tm , $m \in \mathbb{Z}^n$.

Vejamos agora como podemos definir em P'_T algumas operações.

Sejam $f, g \in P'_T(\mathbb{R}^n)$, $\theta, \theta_1, \theta_2 \in P_T(\mathbb{R}^n)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ e $\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

i) Adição

Defina $f + g : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$

$$\theta \longmapsto (f, \theta) + (g, \theta)$$

Linearidade: $(f+g)(\theta_1 + \theta_2) = (f, \theta_1 + \theta_2) + (g, \theta_1 + \theta_2) = (f, \theta_1) + (f, \theta_2) + (g, \theta_1) + (g, \theta_2) = (f, \theta_1) + (g, \theta_1) + (f, \theta_2) + (g, \theta_2) = (f+g)(\theta_1) + (f+g)(\theta_2)$

$$\begin{aligned}
 (f+g)(\lambda\theta) &= (f, \lambda\theta) + (g, \lambda\theta) = \lambda(f, \theta) + \lambda(g, \theta) = \\
 &= \lambda[(f, \theta) + (g, \theta)] = \lambda(f+g)(\theta) .
 \end{aligned}$$

Continuidade :

$$(f+g)(\theta_j) = (f, \theta_j) + (g, \theta_j) \rightarrow 0 .$$

Logo, $f+g \in P_T'(\mathbb{R}^n)$.

ii) Multiplicação por $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

Defina $\phi f : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$

$$\theta \longmapsto (f, \phi\theta)$$

Linearidade:

$$\begin{aligned}
 (\phi f)(\theta_1 + \theta_2) &= (f, \phi(\theta_1 + \theta_2)) = (f, \phi\theta_1 + \phi\theta_2) = \\
 &= (f, \phi\theta_1) + (f, \phi\theta_2) = \phi f(\theta_1) + \phi f(\theta_2)
 \end{aligned}$$

$$(\phi f)(\lambda\theta) = (f, \lambda\phi\theta) = \lambda(f, \phi\theta) = \lambda(\phi f)(\theta)$$

Continuidade:

$$(\phi f)(\theta_j) = (f, \phi\theta_j) \rightarrow 0 ,$$

pois para cada $\alpha \in \mathbb{N}^n$

$$|D^\alpha \phi \theta_j(x)| \leq \sup_{|\beta| \leq |\alpha|} |D^\beta \phi(x)| \sum_{|\beta| \leq |\alpha|} C_\beta |D^\beta \theta_j(x)| \rightarrow 0$$

uniformemente para cada α .

Logo, $\phi f \in P_T'(\mathbb{R}^n)$.

iii) Translação

Seja $h \in \mathbb{R}^n$. Defina $f_h : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$

$$\theta \longmapsto (f, \theta_{-h})$$

onde $\theta_{-h}(x) = \theta(x+h)$.

Linearidade:

$$\begin{aligned} f_h(\theta_1 + \theta_2) &= (f, (\theta_1 + \theta_2)_{-h}) = (f, (\theta_1)_{-h} + (\theta_2)_{-h}) = \\ &= (f, (\theta_1)_{-h}) + (f, (\theta_2)_{-h}) = (f, (\theta_1)_{-h}) + \\ &+ (f, (\theta_2)_{-h}) = f_h(\theta_1) + f_h(\theta_2) \end{aligned}$$

$$f_h(\lambda\theta) = (f, (\lambda\theta)_{-h}) = (f, \lambda\theta_{-h}) = \lambda(f, \theta_{-h}) = \lambda f_h(\theta)$$

Continuidade:

$$f_h(\theta_j) = (f, (\theta_j)_{-h}) \rightarrow 0 \text{ em } \mathbb{C} \text{ pois para cada } \alpha \in \mathbb{N}^n$$

$$D^\alpha(\theta_j)_{-h}(x) = D^\alpha\theta_j(x+h) \rightarrow 0 \text{ uniformemente.}$$

Logo, $f_h \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

iv) Reflexão

Defina $\overset{v}{f} : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$

$$\theta \longmapsto (f, \overset{v}{\theta})$$

onde $\overset{v}{\theta}(x) = \theta(-x)$.

Linearidade:

$$\overset{v}{f}(\theta_1 + \theta_2) = (f, (\theta_1 + \theta_2)^\vee) = (f, \overset{v}{\theta}_1 + \overset{v}{\theta}_2) = (f, \overset{v}{\theta}_1) + (f, \overset{v}{\theta}_2) =$$

$$= \overset{v}{f}(\theta_1) + \overset{v}{f}(\theta_2)$$

$$\overset{v}{f}(\lambda\theta) = (f, (\lambda\theta)^\vee) = (f, \lambda \overset{v}{\theta}) = \lambda (f, \overset{v}{\theta}) = \lambda \overset{v}{f}(\theta) .$$

Continuidade:

$$\overset{v}{f}(\theta_j) = (f, \overset{v}{\theta}_j) \rightarrow 0 \text{ em } \mathbb{C} \text{ pois, para cada } \alpha \in \mathbb{N}^n$$

$$\sup |D^\alpha \theta_j(x)| = \sup |D^\alpha \theta_j(x)|$$

e desse modo $\overset{v}{\theta}_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$:

$$\text{Logo, } \overset{v}{f} \in P'_T(\mathbb{R}^n) .$$

v) Derivação

Para cada $\alpha \in \mathbb{N}^n$ defina

$$D^\alpha f : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \longmapsto (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta)$$

Linearidade:

$$\begin{aligned} D^\alpha f(\theta_1 + \theta_2) &= (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (\theta_1 + \theta_2)) = \\ &= (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta_1 + (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta_2) = \\ &= (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta_1) + (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta_2) = \\ &= D^\alpha f(\theta_1) + D^\alpha f(\theta_2) . \end{aligned}$$

$$D^\alpha (\lambda\theta) = (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \lambda\theta) = \lambda (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) = \lambda D^\alpha f(\theta)$$

Continuidade:

$$D^\alpha f(\theta_j) = (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta_j) \rightarrow 0 \text{ em } \mathbb{C} .$$

Logo, $D^\alpha f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Notemos que

$$D^\alpha : P'_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow P'_T(\mathbb{R}^n)$$

$$f \longmapsto D^\alpha f$$

é linear e contínuo.

Linearidade: Se $f, g \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ então para toda $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ temos

$$\begin{aligned} (D^\alpha (f+g), \theta) &= (f+g, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) = \\ &= (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) + (g, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) = \\ &= (D^\alpha_f, \theta) + (D^\alpha_g, \theta) = (D^\alpha f + D^\alpha g, \theta) \end{aligned}$$

e também

$$\begin{aligned} (D^\alpha (\lambda f), \theta) &= (\lambda f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) = \\ &= \lambda (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) = \lambda (D^\alpha_f, \theta) = (\lambda D^\alpha f, \theta). \end{aligned}$$

Continuidade: Se $f_j \rightarrow 0$ em $P'_T(\mathbb{R}^n)$ então, para cada $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$

$$(D^\alpha f_j, \theta) = (f_j, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta) \rightarrow 0$$

Notemos ainda que se $f \in P_T(\mathbb{R}^n)$ então

$$\begin{aligned} (D^\alpha f, \theta) &= \int_{\prod_{j=1}^n [a_j, a_j+T]} D^\alpha f(x) \cdot \theta(x) dx = \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\prod_{j=1}^n [a_j, a_j+T]} f(x) \cdot D^\alpha \theta(x) dx = \end{aligned}$$

$$= \int_{\prod_{j=1}^n [a_j, a_j+T]} f(x) \cdot (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta(x) dx = (f, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta).$$

Isto torna mais claro o motivo do fator $(-1)^{|\alpha|}$.

TEOREMA 3. Seja $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que

$$\int \phi = 1, \quad \phi \geq 0 \quad \text{e} \quad S(\phi) \subset [0, T]^n.$$

Seja

$$\theta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi\left(\frac{x - Tm}{\varepsilon}\right) \in P_T(\mathbb{R}^n), \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

Se f é contínua e T -periódica então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{[0, T]^n} f(x-y) \theta_\varepsilon(y) dy$$

pertence a $P_T(\mathbb{R}^n)$ e $f_\varepsilon \rightarrow f$ uniformemente.

DEMONSTRAÇÃO:

Se $x \in [0, T]^n$ então para todo $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^n$, $m \neq 0$ existe $m_i \neq 0$ tal que

$$-\frac{Tm_i}{\varepsilon} \leq \frac{x_i - Tm_i}{\varepsilon} \leq T \frac{(1-m_i)}{\varepsilon}$$

Se $m_i \geq 1$ então $\frac{x_i - Tm_i}{\varepsilon} \leq 0$ e, desse modo,
 $\phi\left(\frac{x - Tm}{\varepsilon}\right) = 0$.

Se $m_i \leq -1$ então $-\frac{Tm_i}{\varepsilon} \geq \frac{T}{\varepsilon} \geq T$ e, portanto,
 $\phi\left(\frac{x - Tm}{\varepsilon}\right) = 0$.

Assim, $\theta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$, se $x \in [0, T]^n$.

Agora,

$$\begin{aligned} f_\varepsilon(x) &= \int_{[0, T]^n} f(x-y) \theta_\varepsilon(y) dy = \varepsilon^{-n} \int_{[0, T]^n} f(x-y) \phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) dy = \\ &= \int_{[0, T/\varepsilon]^n} f(x-\varepsilon z) \phi(z) dz = \int_{[0, T]^n} f(x-\varepsilon z) \phi(z) dz = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\varepsilon z) \phi(z) dz = \varepsilon^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} f(u) \phi\left(\frac{x-u}{\varepsilon}\right) du \end{aligned}$$

pois,

$$S(\phi) \subset [0, T]^n \subset [0, T/\varepsilon]^n.$$

A igualdade

$$f_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) dy$$

permiti-nos escrever

$$f_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \int_{K_x} f(y) \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) dy$$

onde

$$\begin{aligned} K_x &= \left\{ y \in \mathbb{R}^n; \quad 0 \leq \frac{x_i - y_i}{\varepsilon} \leq T, \quad i = 1, \dots, n \right\} = \\ &= \left\{ y \in \mathbb{R}^n; \quad x_i - \varepsilon T \leq y_i \leq x_i, \quad i = 1, \dots, n \right\} \end{aligned}$$

K_x é um compacto.

Dados $x, x' \in \mathbb{R}^n$, seja K um compacto tal que $K_x \cup K_{x'} \subset K$. Então existe $C > 0$ tal que

$$|f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(x')| \leq \varepsilon^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \left| \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \phi\left(\frac{x'-y}{\varepsilon}\right) \right| dy \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \varepsilon^{-n} \cdot \sup |f(u)| \int_K \left| \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \phi\left(\frac{x'-y}{\varepsilon}\right) \right| dy \leq \\ &\leq \varepsilon^{-n-1} \cdot \int_K dy \cdot \sup |f(u)| \cdot |x - x'|. \end{aligned}$$

Logo, f_ε é contínua.

Para provar que f_ε é diferenciável qualquer número de vezes, basta derivar sob o sinal de integração a função ϕ na expressão de f_ε usada acima e repetir o procedimento acima usando $D^\alpha \phi$ ao invés de ϕ .

Agora,

$$\begin{aligned} |f(x) - f_\varepsilon(x)| &= \left| \int_{[0,T]^n} f(x) \phi(z) dz - \right. \\ &- \left. \int_{[0,T]^n} f(x-\varepsilon z) \phi(z) dz \right| \leq \int_{[0,T]^n} |f(x) - f(x-\varepsilon z)| \phi(z) dz \leq \\ &\leq \sup_{z \in [0,T]^n} |f(x) - f(x-\varepsilon z)|. \end{aligned}$$

Como f é contínua e periódica, é uniformemente contínua.

Assim, dado $\eta > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Como $z \in [0,T]^n$, $|z| \leq \sqrt{n} T$ e para todo $0 < \varepsilon < \frac{\delta}{\sqrt{n} T}$ e $x \in \mathbb{R}^n$ temos

$$|x - (x-\varepsilon z)| = \varepsilon |z| < \delta. \text{ Logo,}$$

$$|f(x) - f(x-\varepsilon z)| < \eta$$

$$\sup_{z \in [0,T]^n} |f(x) - f(x-\varepsilon z)| < \eta.$$

Isto prova que $f_\epsilon \rightarrow f$ uniformemente.

TEOREMA 4. Se f e g são funções contínuas e periódicas em $\mathbb{R}^n$ e $\frac{\partial f}{\partial x_j} = g$ no sentido de distribuições periódicas então f é diferenciável em relação a x_j e $\frac{\partial f}{\partial x_j} = g$ como funções.

DEMONSTRAÇÃO:

Usando a notação do teorema anterior

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} f_\epsilon(x) &= \epsilon^{-n} \int_{[0,T]^n} f(y) \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\phi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) \right] dy = \\ &= -\epsilon^{-n} \int_{[0,T]^n} f(y) \frac{\partial}{\partial y_j} \left[\phi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) \right] dy = \\ &= \epsilon^{-n} \int_{[0,T]^n} g(y) \phi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) dy = g_\epsilon(x). \end{aligned}$$

Como $f_\epsilon \rightarrow f$ e $g_\epsilon \rightarrow g$ uniformemente segue que $\frac{\partial f}{\partial x_j} = g$.

3. T - CONVOLUÇÃO

DEFINIÇÃO 1. Se $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ defina a convolução de f por θ como a função

$$f * \theta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{dada por} \quad (f * \theta)(a) = (f, \overset{v}{\theta}_a)$$

onde

$$\overset{v}{\theta}_a(x) = \theta(a-x) .$$

EXEMPLO 1 :

Seja f como no exemplo 1 da seção anterior.

Se $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ temos,

$$(f * \theta)(a) = (f, \overset{v}{\theta}_a) = \int_{\prod_{i=1}^n [b_i, b_i+T]} f(x) \theta(a-x) dx$$

onde substituímos a notação L_f do exemplo 1 da seção anterior pela própria f .

EXEMPLO 2 :

Seja $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

$$(\delta * \theta)(a) = (\delta, \overset{v}{\theta}_a) = \overset{v}{\theta}_a(0) = \theta(a).$$

EXEMPLO 3 :

Sejam $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $h \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} (\delta_h * \theta)(a) &= (\delta_h, \overset{v}{\theta}_a) = (\delta, (\overset{v}{\theta}_a)_{-h}) = (\overset{v}{\theta}_a)_{-h}(0) = \\ &= \overset{v}{\theta}_a(h) = \theta(a-h). \end{aligned}$$

EXEMPLO 4 :

Sejam $\alpha \in \mathbb{N}^n$ e $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} (D^\alpha \delta * \theta)(a) &= (D^\alpha \delta, \overset{v}{\theta}_a) = (\delta, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \overset{v}{\theta}_a) = \\ &= (\delta, (-1)^{|\alpha|}) \cdot (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \theta_a = D^\alpha \theta(a) \end{aligned}$$

portanto

$$D_\delta^\alpha * \theta = D^\alpha \theta.$$

TEOREMA 1 . Sejam $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$. Então

$$f * \theta \in P_T(\mathbb{R}^n) \quad \text{e} \quad D^\alpha(f * \theta) = D^\alpha f * \theta = f * D^\alpha \theta .$$

DEMONSTRAÇÃO:

Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e uma seqüência (a_j) tal que $a_j \rightarrow a$.

Para provar a continuidade de $f * \theta$ basta provar que $\theta_{a_j} \rightarrow \theta_a$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$, pois daí,

$$(f * \theta)(a_j) = (f, \overset{v}{\theta}_{a_j}) \rightarrow (f, \overset{v}{\theta}_a) = (f * \theta)(a) .$$

Mostremos, então, que $\overset{v}{\theta}_{a_j} \rightarrow \overset{v}{\theta}_a$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

Dado $\alpha \in \mathbb{N}^n$, sabemos que, devido às derivadas de θ serem limitadas, existe $C > 0$ tal que

$$|D^\alpha \overset{v}{\theta}_{a_j}(x) - D^\alpha \overset{v}{\theta}_a(x)| = |D^\alpha \theta(a_j - x) - D^\alpha \theta(a - x)| \leq C|a_j - a| .$$

Como $a_j \rightarrow a$, segue-se o resultado.

Seja e_i o i -ésimo vetor da base canônica do $\mathbb{R}^n$.

Dada uma seqüência (h_j) , $h_j \neq 0$ tal que $h_j \rightarrow 0$ temos

$$\begin{aligned} & [(f * \theta)(a + h_j e_i) - (f * \theta)(a)] \cdot h_j^{-1} = \\ & = [(f, \overset{v}{\theta}_{a+h_j e_i}) - (f, \overset{v}{\theta}_a)] \cdot h_j^{-1} = \\ & = [(f_{h_j e_i}, \overset{v}{\theta}_a) - (f, \overset{v}{\theta}_a)] \cdot h_j^{-1} = \\ & = ((f_{h_j e_i} - f) \cdot h_j^{-1}, \overset{v}{\theta}_a) \end{aligned}$$

Mostremos que $g_j = (f_{h_j e_i} - f) \cdot h_j^{-1}$ converge para $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ em P'_T .

Dada $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ temos

$$\begin{aligned} (g_j, \phi) &= ((f_{h_j e_i} - f) \cdot h_j^{-1}, \phi) = \\ &= (f, (\phi - \phi_{-h_j e_i}) \cdot h_j^{-1}) \end{aligned}$$

Resta, assim, mostrarmos que

$$(\phi - \phi_{-h_j e_i}) \cdot h_j^{-1} \rightarrow -\frac{\partial}{\partial x_i} \phi \quad \text{em } P_T.$$

Para cada $\alpha \in \mathbb{N}^n$ temos

$$\begin{aligned} & \left| \partial^\alpha ((\phi - \phi_{-h_j e_i}) h_j^{-1} + \frac{\partial}{\partial x_i} \phi)(x) \right| = \\ &= \left| (\partial^\alpha \phi(x) - \partial^\alpha \phi(x + h_j e_i)) h_j^{-1} + \frac{\partial}{\partial x_i} \partial^\alpha \phi(x) \right| = \\ &= \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \partial^\alpha \phi(x) - (\partial^\alpha \phi(x + h_j e_i) - \partial^\alpha \phi(x)) h_j^{-1} \right| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

uniformemente, pois $\frac{\partial}{\partial x_i} \partial^\alpha \phi$ é periódica e contínua, e

$$(\partial^\alpha \phi(x + h_j e_i) - \partial^\alpha \phi(x)) h_j^{-1}$$

converge pontualmente para $\frac{\partial}{\partial x_i} \partial^\alpha \phi(x)$.

Logo, $\frac{\partial}{\partial x_i} (f * \theta) = \frac{\partial f}{\partial x_i} * \theta$; como $\frac{\partial f}{\partial x_i} * \theta$ é contínua temos que $f * \theta \in C^1(\mathbb{R}^n)$.

Também,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} * \theta \right)(a) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}, \overset{v}{\theta}_a \right) = \left(f, -\frac{\partial}{\partial x_i} \overset{v}{\theta}_a \right) = \\ &= \left(f, \left(\frac{\partial \theta}{\partial x_i} \right)_a^v \right) = \left(f * \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \right)(a) \end{aligned}$$

Portanto,

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (f * \theta) = \frac{\partial f}{\partial x_i} * \theta = f * \frac{\partial \theta}{\partial x_i} .$$

Usando o princípio da indução vemos que se $\partial^\alpha (f * \theta) = \partial^\alpha f * \theta = f * \partial^\alpha \theta$ é contínua então, colocando $\beta = \alpha + e_i$ temos que

$$\partial^\beta (f * \theta) = \frac{\partial}{\partial x_i} \partial^\alpha (f * \theta) = \frac{\partial}{\partial x_i} (\partial^\alpha f * \theta) = \partial^\beta f * \theta$$

e, portanto, $\partial^\beta (f * \theta)$ também é contínua.

Ainda,

$$\begin{aligned} (\partial^\beta f * \theta)(a) &= (\partial^\beta f, \overset{v}{\theta}_a) = (-1)^{|\beta|} (f, \partial^\beta \overset{v}{\theta}_a) = \\ &= (f, (\partial^\beta \theta)_a^v) = (f * \partial^\beta \theta)(a) . \end{aligned}$$

A periodicidade de $f * \theta$ se verifica através de

$$(f * \theta)(a + Tm) = (f, \overset{v}{\theta}_{a+Tm}) = (f, \overset{v}{\theta}_a) = (f * \theta)(a)$$

TEOREMA 2. Se $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $\theta, \rho \in P_T(\mathbb{R}^n)$ então

$$(f * \theta) * \rho = f * (\theta * \rho)$$

DEMONSTRAÇÃO:

Seja $a \in \mathbb{R}^n$.

Para cada $k = 1, 2, \dots$ tome $\varepsilon = \frac{T}{k}$ e defina

$$S_\varepsilon(x) = \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} \theta(x - (a + \varepsilon m)) \rho(a + \varepsilon m) \cdot \varepsilon^n .$$

S_ε é a soma de Riemann da função $g(y) = \theta(x-y)\rho(y)$ sobre o cubo $\prod_{j=1}^n [a_j, a_j + T]$.

Mostremos que $S_\varepsilon \rightarrow \theta * \rho$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

Dado $\alpha \in \mathbb{N}^n$ existem $C > 0$ e $M > 0$ tais que

$$|D^\alpha \theta(x)| \leq C, \quad |\rho(x)| \leq C$$

$$|D^\alpha \theta(x) - D^\alpha \theta(y)| \leq M|x-y| \quad e$$

$$|\rho(x) - \rho(y)| \leq M|x-y|$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Defina $B_{\varepsilon, i} = \prod_{j=1}^n [a_j + \varepsilon(m_i - 1), a_j + \varepsilon m_i]$

Assim,

$$|D^\alpha S_\varepsilon(x) - D^\alpha(\theta * \rho)(x)| = \left| \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} D^\alpha \theta(x - (a + \varepsilon m)) \rho(a + \varepsilon m) \right.$$

$$\left. - \varepsilon^n \int_{\prod_{j=1}^n [a_j, a_j + T]} D^\alpha \theta(x - y) \rho(y) dy \right| =$$

$$= \left| \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} \int_{B_{\varepsilon, i}} D^\alpha \theta(x - (a + \varepsilon m)) \rho(a + \varepsilon m) dy - \right.$$

$$\left. - \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} \int_{B_{\varepsilon, i}} D^\alpha \theta(x - y) \rho(y) dy \right| \leq$$

$$\leq \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} \int_{B_{\varepsilon, i}} |D^\alpha \theta(x - (a + \varepsilon m)) \rho(a + \varepsilon m) - D^\alpha \theta(x - y) \rho(y)| dy \leq$$

$$\leq \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} \int_{B_{\varepsilon, i}} (|D^\alpha \theta(x - (a + \varepsilon m)) - D^\alpha \theta(x - y)| |\rho(a + \varepsilon m)| +$$

$$+ |D^\alpha \theta(x - y)| |\rho(y) - \rho(a + \varepsilon m)|) dy \leq$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} M \left(\left| \rho(a+\epsilon m) \right| \int_{B_{\epsilon,i}} \left| y - (a+\epsilon m) \right| dy + \right. \\
&\quad \left. + \int_{B_{\epsilon,i}} \left| D^\alpha \theta(x-y) \right| \left| y - (a+\epsilon m) \right| dy \right) \leq \\
&\leq C M \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} \left(\sqrt{n} \epsilon \int_{B_{\epsilon,i}} dy + \sqrt{n} \epsilon \int_{B_{\epsilon,i}} dy \right) = \\
&= 2 C M \epsilon^{n+1} \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} 1 = 2 C M k^n \epsilon^{n+1} = \frac{2 C M T^{n+1}}{k} \rightarrow 0 .
\end{aligned}$$

Como $S_\epsilon(x + Tm) = S_\epsilon(x)$ temos que $S_\epsilon \rightarrow \theta * \rho$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$ e, portanto, $(S_\epsilon)_x^V \rightarrow (\theta * \rho)_x^V$. Logo

$$\begin{aligned}
(f * (\theta * \rho))(x) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (f * S_\epsilon)(x) = \\
&= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^n \sum_{\substack{1 \leq m_i \leq k \\ 1 \leq i \leq n}} (f * \theta)(x - (a + \epsilon m)) \rho(a + \epsilon m) = \\
&= \int_{\prod_{j=1}^n [a_j, a_j + T]} (f * \theta)(x-y) \rho(y) dy = (f * \theta) * \rho(x) .
\end{aligned}$$

TEOREMA 3. Seja $F : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow P_T(\mathbb{R}^n)$ um operador linear contínuo tal que para todo $h \in \mathbb{R}^n$ e toda $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$

$$[T_h F(\theta)](x) = F(\theta)(x-h) = F(\theta_h)(x) = F(T_h \theta)(x) .$$

Então existe uma única $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ tal que $F(\theta) = f * \theta$ para toda $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

DEMONSTRAÇÃO:

Defina $f : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$

$$\theta \longmapsto (F\theta)^\vee(0)$$

A linearidade de f é imediata.

Se $\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$ então, por continuidade de F , $F\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$ e, conseqüentemente, $(F\theta_j)^\vee(0) \rightarrow 0$ em $\mathbb{C}$.

Logo $f \in P_T'(\mathbb{R}^n)$.

Para todo $h \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} (F\theta)(h) &= (T_{-h}(F\theta))(0) = ((T_{-h}F)\theta)(0) = (F(T_{-h}\theta))(0) = \\ &= (f, (T_{-h}\theta)^\vee) = (f, \theta_h^\vee) = (f * \theta)(h) \end{aligned}$$

pois, $(T_{-h}\theta)^\vee(x) = (T_{-h}\theta)(-x) = \theta(-x+h) = \theta_h^\vee(x)$.

Unicidade: Sejam $f, g \in P_T'(\mathbb{R}^n)$ tais que $F(\theta) = f * \theta = g * \theta$ para toda $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

Então,

$$(f, \theta) = (f * \theta)^\vee(0) = (g * \theta)^\vee(0) = (g, \theta).$$

Logo, $f = g$.

DEFINIÇÃO 2. Sejam $f, g \in P_T'(\mathbb{R}^n)$.

Definimos $h = f * g$ como sendo a única distribuição periódica tal que

$$f * (g * \theta) = h * \theta, \quad \theta \in P_T(\mathbb{R}^n).$$

h é chamada de T-convolução de f por g .

Para verificar que a definição é possível, mostremos que

$$F : P_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow P_T(\mathbb{R}^n)$$

$$\theta \longmapsto f * (g * \theta)$$

é linear-contínuo e comuta com as translações T_h .

Linearidade: Se $\theta, \rho \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ então

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad F(\theta + \rho) &= f * (g * (\theta + \rho)) = f * (g * \theta + g * \rho) = \\ &= f * (g * \theta) + f * (g * \rho) = F(\theta) + F(\rho). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad F(\lambda\theta) &= f * (g * (\lambda\theta)) = f * (\lambda(g * \theta)) = \\ &= \lambda f * (g * \theta) = \lambda F(\theta). \end{aligned}$$

Continuidade: Seja $\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

Dado $\alpha \in \mathbb{N}^n$ existem $C_1, C_2 > 0$ $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ tais que

$$\begin{aligned} |D^\alpha(F(\theta_j))(a)| &= |f * D^\alpha(g * \theta_j)(a)| = \\ &= |(f, (D^\alpha(g * \theta_j))_a^v)| \leq C_1 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x |D^\beta(D^\alpha(g * \theta_j))_a^v| = \\ &= C_1 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x |(D^{\beta+\alpha}(g * \theta_j))_a^v| = \\ &= C_1 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x |(g * D^{\beta+\alpha}\theta_j)(a-x)| = \\ &= C_1 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x |(g, (D^{\beta+\alpha}\theta_j)_{a-x}^v)| \leq \\ &\leq C_1 C_2 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x \left| \sum_{|\gamma| \leq m_2} \sup_y |D^\gamma(D^{\beta+\alpha}\theta_j)_{a-x-y}^v| \right| = \\ &= C_1 C_2 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x \left| \sum_{|\gamma| \leq m_2} \sup_y D^{\gamma+\beta+\alpha}\theta_j(a-x-y) \right| = \end{aligned}$$

$$= C_1 C_2 \sum_{|\beta| \leq m_1} \sup_x | \sum_{|\gamma| \leq m_2} \sup_z D^{\gamma+\beta+\alpha} \theta_j(z-x) | \rightarrow 0$$

uniformemente.

Portanto, F é contínuo.

Comutatividade: Sejam $h \in \mathbb{R}^n$ e $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} T_h(F\theta)(a) &= T_h(f * (g * \theta))(a) = (f * (g * \theta))(a-h) = \\ &= (f, (g * \theta)^\vee_{a-h}) = (f, (T_h(g * \theta))^\vee_a) = \\ &= (f * T_h(g * \theta))(a) = (f * (g * T_h\theta))(a) = F(T_h\theta)(a). \end{aligned}$$

Justificativa da igualdade $T_h(g * \theta) = g * T_h(\theta)$:

$$\begin{aligned} T_h(g * \theta)(a) &= g * \theta(a-h) = (g, \theta^\vee_{a-h}) = \\ &= (g, (T_h\theta)^\vee_a) = (g * T_h\theta)(a). \end{aligned}$$

Antes de mostrarmos algumas propriedades da T -convolução vejamos o seguinte lema:

LEMA 1. Seja $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi = 1, \quad \phi \geq 0 \quad \text{e} \quad S(\phi) \subset [0, T]^n.$$

Seja $\theta_\epsilon(x) = \epsilon^{-n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi\left(\frac{x - Tm}{\epsilon}\right)$ onde $0 < \epsilon < 1$. Observe que $\theta_\epsilon \in P_T(\mathbb{R}^n)$. Então, se $\psi \in P_T(\mathbb{R}^n)$, $\psi * \theta_\epsilon \rightarrow \psi$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

DEMONSTRAÇÃO:

Seja $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

$$\begin{aligned}
D^\alpha(\psi * \theta_\varepsilon)(a) &= \int_{[0,T]^n} D^\alpha\psi(a-x) \theta_\varepsilon(x) dx = \\
&= \varepsilon^{-n} \int_{[0,T]^n} D^\alpha\psi(a-x) \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx
\end{aligned}$$

pois, se $x \in [0,T]^n$ então para todo $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^n$, $m \neq 0$ existe $m_i \neq 0$ tal que

$$-\frac{Tm_i}{\varepsilon} \leq \frac{x_i - Tm_i}{\varepsilon} \leq \frac{T(1-m_i)}{\varepsilon}$$

$$\text{Se } m_i \geq 1 \text{ então } \frac{x_i - Tm_i}{\varepsilon} \leq 0 \text{ e então } \phi\left(\frac{x - Tm}{\varepsilon}\right) = 0.$$

$$\text{Se } m_i \leq -1 \text{ então } -\frac{Tm_i}{\varepsilon} \geq \frac{T}{\varepsilon} \geq T \text{ e então}$$

$$\phi\left(\frac{x - Tm}{\varepsilon}\right) = 0.$$

$$\text{Deste modo } \theta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \text{ se } x \in [0,T]^n.$$

Também,

$$\begin{aligned}
\varepsilon^{-n} \int_{[0,T]^n} D^\alpha\psi(a-x) \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx &= \int_{[0,T/\varepsilon]^n} D^\alpha\psi(a-\varepsilon y) \phi(y) dy = \\
&= \int_{[0,T]^n} D^\alpha\psi(a-\varepsilon y) \phi(y) dy
\end{aligned}$$

pois

$$S(\phi) \subset [0,T]^n \subset [0, \frac{T}{\varepsilon}]^n.$$

Assim,

$$\begin{aligned}
|D^\alpha\psi(a) - (D^\alpha\psi * \theta_\varepsilon)(a)| &= \left| \int_{[0,T]^n} (D^\alpha\psi(a) - \right. \\
&- D^\alpha\psi(a-\varepsilon x)) \phi(x) dx \left| \leq \int_{[0,T]^n} \phi(x) dx \cdot \sup |D^\alpha\psi(a) - \right. \\
&- D^\alpha\psi(a-\varepsilon x)| \leq C \cdot \sup_{x \in [0,T]^n} |\varepsilon x| = \sqrt{n} C T \cdot \varepsilon.
\end{aligned}$$

Logo, $\psi * \theta_\varepsilon \rightarrow \psi$ em $P_T(\mathbb{R}^n)$.

LEMA 2. Sejam $f, g \in P_T'(\mathbb{R}^n)$. Então, $f = g$ se, e somente se, $f * \theta = g * \theta$ para toda $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

DEMONSTRAÇÃO:

Se $f = g$ então

$$(f * \theta)(a) = (f, \overset{V}{\theta}_a) = (g, \overset{V}{\theta}_a) = (g * \theta)(a).$$

Se $g * \theta = f * \theta$ então

$$(f, \theta) = (f * \overset{V}{\theta})(0) = (g * \overset{V}{\theta})(0) = (g, \theta).$$

TEOREMA 4. Se $f, g, h \in P_T'(\mathbb{R}^n)$ então

$$i) \quad (f * g) * h = f * (g * h)$$

$$ii) \quad f * g = g * f$$

DEMONSTRAÇÃO:

Seja $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} i) \quad & ((f * g) * h) * \theta = (f * g) * (h * \theta) = f * (g * (h * \theta)) = \\ & = f * ((g * h) * \theta) = (f * (g * h)) * \theta. \end{aligned}$$

Usando o Lema 2 concluímos que

$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

ii) Seja θ_ε como no Lema 1.

Provemos primeiramente que $\theta_\varepsilon * \theta = \theta * \theta_\varepsilon$.

$$\begin{aligned}
(\theta_\varepsilon * \theta)(a) &= \int_{[0,T]^n} \theta_\varepsilon(a-x) \theta(x) dx = \\
&= \int_n \prod_{j=1}^n [a_j, a_j+T] \theta_\varepsilon(y) \theta(a-y) dy = \\
&= \int_n \prod_{j=1}^n [a_j, a_j+T] \theta(a-y) \theta_\varepsilon(y) dy = (\theta * \theta_\varepsilon)(a) .
\end{aligned}$$

Agora,

$$\begin{aligned}
(f * g) * (\theta * \theta_\varepsilon) &= f * (g * (\theta * \theta_\varepsilon)) = f * ((g * \theta) * \theta_\varepsilon) = \\
&= f * (\theta_\varepsilon * (g * \theta)) = (f * \theta_\varepsilon) * (g * \theta) .
\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}
(g * f) * (\theta * \theta_\varepsilon) &= (g * f) * (\theta_\varepsilon * \theta) = g * (f * (\theta_\varepsilon * \theta)) = \\
&= g * ((f * \theta_\varepsilon) * \theta) = g * (\theta * (f * \theta_\varepsilon)) = \\
&= (g * \theta) * (f * \theta_\varepsilon) = (f * \theta_\varepsilon) * (g * \theta) .
\end{aligned}$$

Comparando,

$$(f * g) * (\theta * \theta_\varepsilon) = (g * f) * (\theta * \theta_\varepsilon)$$

Quando $\varepsilon \rightarrow 0$, pelo Lema 1, $\theta * \theta_\varepsilon \rightarrow \theta$ em P_T . Logo

$$(f * g) * \theta = (g * f) * \theta .$$

Pelo Lema 2, $f * g = g * f$.

TEOREMA 5. Sejam $f, g \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ e $a \in \mathbb{R}^n$.

Então

- i) $(f * g)_a = f_a * g = f * g_a$
- ii) $D^\alpha(f * g) = D^\alpha f * g = f * D^\alpha g, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n.$

Mostremos primeiramente que se $\theta \in P_T$ então $f_a * \theta = f * \theta_{-a}.$

Observe que isto não contradiz i), pois, se $L\theta$ é o representante da função θ como distribuição periódica então,

$$L\theta_{-a} = (L\theta)_a. \quad \text{De fato,}$$

$$\begin{aligned} (f_a * \theta)(x) &= (f_a, \overset{v}{\theta}_x) = (f, (\overset{v}{\theta}_x)_{-a}) = (f, \overset{v}{\theta}_{x+a}) = \\ &= (f, (\overset{v}{\theta}_{-a})_x) = (f * \theta_{-a})(x). \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} (f * g)_a * \theta &= (f * g) * \theta_{-a} = f * (g * \theta_{-a}) = \\ &= f * (g_a * \theta) = (f * g_a) * \theta. \end{aligned}$$

Portanto,

$$(f * g)_a = f * g_a.$$

Também,

$$\begin{aligned} (f * g)_a * \theta &= (g * f)_a * \theta = (g * f) * \theta_{-a} = g * (f * \theta_{-a}) = \\ &= g * (f_a * \theta) = (g * f_a) * \theta = (f_a * g) * \theta. \end{aligned}$$

Mostremos agora ii)

$$\begin{aligned} (D^\alpha(f * g) * \theta)(a) &= (D^\alpha(f * g), \overset{v}{\theta}_a) = (f * g, (-1)^{|\alpha|} D^\alpha(\overset{v}{\theta}_a)) = \\ &= (f * g, (D^\alpha \theta)_a^\vee) = ((f * g) * D^\alpha \theta)(a) = (f * (g * D^\alpha \theta))(a) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (f * (g, (D^\alpha \theta)_x^V)) (a) = (-1)^{|\alpha|} (f * (g, D^\alpha (\theta_x^V))) (a) = \\
&= (f * (D^\alpha g, \theta_x^V)) (a) = (f * (D_g^\alpha * \theta)) (a) = \\
&= ((f * D^\alpha g) * \theta) (a) .
\end{aligned}$$

Portanto,

$$D^\alpha (f * g) = f * D^\alpha g .$$

Por comutatividade obtêm-se a outra igualdade.

EXEMPLO 5 :

Sejam $f \in P_T^1(\mathbb{R}^n)$ e $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

$$(f * \delta, \theta) = (f * \delta * \theta^V)(0) = (f * \theta^V)(0) = (f, \theta) .$$

Logo $f * \delta = f$.

EXEMPLO 6 :

Sejam $\alpha \in \mathbb{N}^n$ e $f \in P_T^1(\mathbb{R}^n)$.

$$D^\alpha f = D^\alpha (f * \delta) = D^\alpha f * \delta = f * D^\alpha \delta .$$

EXEMPLO 7 :

Seja $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha$ um operador diferencial linear parcial a coeficientes constantes. Se $f \in P_T^1(\mathbb{R}^n)$ então

$$\begin{aligned}
P(D) f &= \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha f = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha f * D^\alpha \delta = \\
&= \sum_{|\alpha| \leq m} f * (c_\alpha D^\alpha \delta) = f * \left(\sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha \delta \right) = f * (P(D) \delta) .
\end{aligned}$$

Assim, toda equação diferencial parcial linear com coeficientes constantes

$$P(D)u = f, \quad \text{onde } u, f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$$

pode ser expressa como uma equação da T-convolução

$$u * u_0 = f,$$

onde

$$u_0 = P(D)\delta.$$

EXEMPLO 8 :

Uma equação linear de diferenças com coeficientes constantes pode ser expressa como uma equação da T-convolução.

Vejamos

$$\begin{aligned} \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha f_{T\alpha} &= \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha (f * \delta)_{T\alpha} = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha f * \delta_{T\alpha} = \\ &= f * \left(\sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \delta_{T\alpha} \right). \end{aligned}$$

TEOREMA 6 . Seja $C : P'_T(\mathbb{R}^n) \times P'_T(\mathbb{R}^n) \rightarrow P'_T(\mathbb{R}^n)$

$$(f, g) \longmapsto f * g$$

C é seqüencialmente contínuo em cada variável.

DEMONSTRAÇÃO:

Como C é simétrico, basta demonstrar em uma variável.

Como C é linear, basta verificar que se $f_j \rightarrow 0$ em P'_T então

$$C(f_j, g) = f_j * g \rightarrow 0 \quad \text{em} \quad P_T'.$$

Seja $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

$$(C(f_j, g), \theta) = (f_j * g, \theta) = (f_j * (g * \overset{V}{\theta})) (0)$$

Como $g * \overset{V}{\theta} \in P_T$ e $f_j \rightarrow 0$ em P_T' segue-se que

$$(f_j * (g * \overset{V}{\theta})) (0) = (f_j, (g * \overset{V}{\theta})^\vee) \rightarrow 0.$$

4. A ÁLGEBRA $(P_T', *, +)$

O espaço vetorial $P_T'(\mathbb{R}^n)$ munido das operações T-convolução e adição possui uma estrutura de álgebra comutativa com elemento neutro δ em relação à T-convolução. Designaremos esta álgebra por álgebra da T-convolução.

O próximo teorema nos dará uma condição necessária e suficiente para que possamos encontrar u em P_T' tal que

$$f * u = g,$$

onde f e g são distribuições periódicas conhecidas anteriormente.

Antes disso, definamos o inverso (segundo a T-convolução) de um elemento de P_T' .

DEFINIÇÃO 1. $f \in P_T'$ é dito inversível se existir $g \in P_T'$ tal que

$$f * g = g * f = \delta.$$

Uma g deste tipo é dita inversa de f .

TEOREMA 1. Se existir inversa de uma distribuição periódica ela é única.

DEMONSTRAÇÃO:

Sejam g e h inversas de f então,

$$g = g * \delta = g * (f * h) = (g * f) * h = \delta * h = h.$$

Denotemos por f^{-1} o inverso de f , quando existir.

Nem todos os elementos de P_T' possuem inverso, como é o caso de qualquer $\theta \in P_T$. Pois, como visto no Teorema 1 da seção anterior, $f * \theta \in P_T$ para toda $f \in P_T'$. Logo, é impossível encontrar $f \in P_T'$ tal que $f * \theta = \delta$, já que $\delta \notin P_T$, pois, se assim fosse teríamos

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} \delta(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} (\delta(x + h e_j) - \delta(x)) h^{-1} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^{-1} (\delta_{x + h e_j} - \delta_x, \delta)) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^{-1} ((\delta_x)_{h e_j} - \delta_x), \delta) \rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \delta_x, \delta \right) = \\ &= (\delta_x, - \frac{\partial}{\partial x_j} \delta) = - \frac{\partial}{\partial x_j} \delta(x). \end{aligned}$$

Logo, $\frac{\partial}{\partial x_j} \delta(x) = 0$, i.é., δ é constante.

Como $(\delta, e^{iwx}) = 1$ e $(\delta, 0) = 0$ vemos que a suposição foi absurda.

TEOREMA 2 . Seja $f \in P_T'(\mathbb{R}^n)$.

Uma condição necessária e suficiente para que a equação

$$f * u = g$$

tenha, para cada $g \in P_T'(\mathbb{R}^n)$, uma solução em $P_T'(\mathbb{R}^n)$ é que exista f^{-1} .

No caso afirmativo a solução é única e dada por $f^{-1} * g$.

DEMONSTRAÇÃO:

Necessidade: Existe $u \in P_T'(\mathbb{R}^n)$ tal que

$$f * u = \delta \quad . \quad \text{Logo,} \quad u = f^{-1} \quad .$$

Suficiência: Suponha que exista f^{-1} .

Tome $u = f^{-1} * g$. Então,

$$f * u = f * (f^{-1} * g) = (f * f^{-1}) * g = \delta * g = g \quad .$$

Se $f * v = g$ então

$$f^{-1} * (f * v) = f^{-1} * g$$

$$(f^{-1} * f) * v = f^{-1} * g$$

$$v = f^{-1} * g$$

É importante observar que o teorema diz respeito à existência e unicidade de solução da equação de T-convolução $f * u = g$ quando a resolvemos para toda $g \in P_T'(\mathbb{R}^n)$.

Vejamos o seguinte exemplo:

EXEMPLO 1 :

Seja $f = 1$ e $u_n(t) = e^{iwn t}$ onde $w = \frac{2\pi}{T}$, $n \in \mathbb{Z}^*$ e $t \in \mathbb{R}$.

Então,

$$(f * u_n)(t) = \int_a^{a+T} f(t-s) u_n(s) ds = \int_a^{a+T} e^{iwn s} ds = 0.$$

Assim, a equação $f * u = 0$ possui infinitas soluções.

5. A SÉRIE DE FOURIER

DEFINIÇÃO 1. Seja $(f_m)_{m \in \mathbb{Z}^k}$ uma seqüência em $P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Dizemos que a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^k} f_m$ é convergente em $P'_T(\mathbb{R}^n)$ se a seqüência $s_\ell = \sum_{|m| \leq \ell} f_m$ for convergente em $P'_T(\mathbb{R}^n)$.

TEOREMA 1. Se $f = \sum_{m \in \mathbb{Z}^k} f_m \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ então $D^\alpha f = \sum_{m \in \mathbb{Z}^k} D^\alpha f_m$.

DEMONSTRAÇÃO:

Dados $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $\varepsilon > 0$ existe $\ell_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $\ell \geq \ell_0$ tem-se

$$\left| \left(f - \sum_{|m| \leq \ell} f_m, D^\alpha \theta \right) \right| < \varepsilon.$$

Deste modo,

$$\begin{aligned}
& \left| (D^\alpha f - \sum_{|m| \leq \ell} D^\alpha f_m, \theta) \right| = \left| (D^\alpha (f - \sum_{|m| \leq \ell} f_m), \theta) \right| = \\
& = \left| (f - \sum_{|m| \leq \ell} f_m, D^\alpha \theta) \right| < \varepsilon .
\end{aligned}$$

As definições a seguir serão úteis para caracterizarmos os elementos de P_T e P_T' .

DEFINIÇÃO 2. Uma seqüência numérica é dita rapidamente decrescente se para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ existir $C > 0$ tal que:

$$|c_m| \leq \frac{C}{|m|^k} \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n, \quad m \neq 0 .$$

Equivalentemente, (c_m) é rapidamente decrescente se para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ existir $C > 0$ tal que $|c_m| \leq \frac{C}{(1+|m|)^k}$ para todo $m \in \mathbb{Z}^n$. Pois, se para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ existir $C > 0$ tal que

$$|c_m| \leq \frac{C}{|m|^k}, \quad m \neq 0, \quad m \in \mathbb{Z}^n .$$

então, se $m \neq 0$, $1 + |m| \leq 2|m|$ e

$$|c_m| \leq \frac{C}{|m|^k} \leq \frac{2^k C}{(1+|m|)^k} .$$

Colocando $M = \max \{ 2^k C, |C| \}$ obtemos

$$|c_m| \leq \frac{M}{(1+|m|)^k}, \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n .$$

Agora, se para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ existir $C > 0$ tal que

$$|c_m| \leq \frac{C}{(1+|m|)^k}, \quad m \in \mathbb{Z}^n .$$

então, como para $m \neq 0$ vale

$$\frac{1}{(1+|m|)^k} \leq \frac{1}{|m|^k}$$

chegamos a

$$|c_m| \leq \frac{C}{|m|^k}, \quad m \in \mathbb{Z}^n, \quad m \neq 0.$$

O espaço das seqüências de decrescimento rápido será denotado por $s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ ou simplesmente s .

DEFINIÇÃO 3. Uma seqüência numérica $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^n}$ é dita de crescimento lento se existirem constantes $M > 0$ e $k \in \mathbb{Z}^+$ tais que

$$|c_m| \leq M|m|^k \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n, \quad m \neq 0.$$

A definição acima é equivalente a existirem constantes $M > 0$ e $k \in \mathbb{Z}^+$ tais que

$$|c_m| \leq M(1+|m|)^k \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n.$$

Pois, se M e k são como na definição então

$$|c_m| \leq M|m|^k \leq M(1+|m|)^k \leq M'(1+|m|)^k$$

onde $M' = \max\{M, |c_0|\}$.

Agora, se existem $M > 0$ e $k \in \mathbb{Z}^+$ tais que

$$|c_m| \leq M(1+|m|)^k \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n,$$

temos que, se $m \neq 0$ então $|m| \geq 1$ e

$$|c_m| \leq M(1+|m|)^k \leq M(|m|+|m|)^k = 2^k M|m|^k.$$

O espaço das seqüências de crescimento lento será denotado por $s'(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ ou, simplesmente, s' .

TEOREMA 2. Seja $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^n}$ uma seqüência rapidamente decrescente.

Então $f = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m$ pertence a $P_T(\mathbb{R}^n)$.

OBS. $e_m(x) = e^{iwm \cdot x}$, $x \in \mathbb{R}^n$.

DEMONSTRAÇÃO:

Considere $s_p(x) = \sum_{|m| \leq p} c_m e_m(x)$.

Como (c_m) é de decrescimento rápido existe $M_1 > 0$ tal que

$$|c_m e_m(x)| = |c_m| < \frac{M_1}{(1+|m|)^{n+1}} \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n.$$

Pelo critério de Weierstrass s_p é uniformemente convergente e $f(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m(x)$ é contínua.

É claro que f é periódica.

Agora,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} s_p(x) = \sum_{|m| \leq p} i w m_j c_m e^{iwm \cdot x}$$

Novamente, existe $M_2 > 0$ tal que

$$\begin{aligned} |i w m_j c_m e_m(x)| &= w |m_j| |c_m| \leq w (1+|m|) |c_m| \leq \\ &\leq (1+|m|) M_2 (1+|m|)^{-n-2} = M_2 (1+|m|)^{-n-1}. \end{aligned}$$

Assim, $g_j(x) = \lim \frac{\partial}{\partial x_j} s_p(x)$ é contínua. (a convergência é uniforme).

Sejam $x, h \in \mathbb{R}^n$ e $\gamma : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $\gamma(t) = x + th$.
Então,

$$\begin{aligned} s_p(x+h) - s_p(x) &= s_p(\gamma(1)) - s_p(\gamma(0)) = \int_0^1 (s_p \circ \gamma)'(t) dt = \\ &= \int_0^1 \langle \text{grad } s_p(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_0^1 \langle \text{grad } s_p(x+th), h \rangle dt . \end{aligned}$$

Defina $g = (g_1, \dots, g_n)$.

Então, quando $p \rightarrow \infty$, vem:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \int_0^1 \langle g(x+th), h \rangle dt = \\ &= \sum_{j=1}^n h_j \int_0^1 g_j(x+th) dt = \sum_{j=1}^n h_j g_j(x) + \\ &+ \sum_{j=1}^n h_j \int_0^1 (g_j(x+th) - g_j(x)) dt . \end{aligned}$$

Agora, se $h \neq 0$, temos

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^n h_j \int_0^1 (g_j(x+th) - g_j(x)) dt \right| \cdot \|h\|^{-1} \leq \\ & \leq \sum_{j=1}^n |h_j| \cdot \|h\|^{-1} \max |g_j(x+th) - g_j(x)| \leq \\ & \leq \sum_{j=1}^n \max |g_j(x+th) - g_j(x)| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

quando $h \rightarrow 0$.

Logo, f é diferenciável e $\text{grad } f(x) = g(x)$. Daí, concluimos que

$$f \in C^1 \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial x_j} = g_j .$$

Usando indução segue a tese.

TEOREMA 3 . Seja $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$. Então

$$c_m(\phi) = T^{-n} \int_{[0,T]^n} e^{-imx} \phi(x) dx$$

forma uma seqüência rapidamente decrescente e

$$\phi(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(\phi) e_m(x) .$$

DEMONSTRAÇÃO:

$$\begin{aligned} T^n m_j c_m(\phi) &= \int_{[0,T]^n} m_j e^{-imwx} \phi(x) dx = \\ &= -\frac{1}{w} \int_{[0,T]^n} D_j e^{-imwx} \phi(x) dx = \\ &= \frac{1}{w} \int_{[0,T]^n} e^{-imwx} D_j \phi(x) dx = \frac{T^n}{w} c_m(D_j \phi) . \end{aligned}$$

Usando indução sobre $|\alpha|$ podemos obter

$$m^\alpha c_m(\phi) = \left(\frac{1}{w}\right)^{|\alpha|} c_m(D^\alpha \phi) .$$

Assim, para cada $\ell \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} |m|^\ell |c_m(\phi)| &= \sum_{|\alpha|=\ell} \frac{\ell!}{\alpha!} |m^\alpha c_m(\phi)| = \\ &= \frac{1}{w^\ell} \sum_{|\alpha|=\ell} \frac{\ell!}{\alpha!} |c_m(D^\alpha \phi)| = \\ &= \frac{1}{w^\ell} \sum_{|\alpha|=\ell} \frac{\ell!}{\alpha!} \left| \int_{[0,T]^n} D^\alpha \phi(x) e^{-imwx} dx \right| \leq \\ &\leq \frac{T^n}{w^\ell} \sum_{|\alpha|=\ell} \frac{\ell!}{\alpha!} \sup |D^\alpha \phi| = M . \end{aligned}$$

Como M não depende de m , $(c_m(\phi)) \in s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$.

Seja $\psi = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(\phi) e_m$. Pelo teorema anterior $\psi \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} c_m(\psi) &= \frac{1}{T^n} \int_{[0,T]^n} \psi(x) e^{-iwmx} dx = \\ &= \frac{1}{T^n} \int_{[0,T]^n} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} c_\ell(\phi) e^{i\ell w(m-\ell)x} dx = \\ &= \frac{1}{T^n} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} c_\ell(\phi) \int_{[0,T]^n} e^{i\ell w(m-\ell)x} dx = \frac{c_m(\phi)}{T^n} \int_{[0,T]^n} dx = \\ &= c_m(\phi). \end{aligned}$$

Deste modo, se provarmos que se $c_m(\phi) = c_m(\psi)$ implicar em $\phi = \psi$ o teorema estará demonstrado.

O próximo lema diz isto.

LEMA 1. (Unicidade). Seja $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ tal que $c_m(\phi) = 0$ para todo m em $\mathbb{Z}^n$. Então $\phi = 0$.

DEMONSTRAÇÃO:

Suponha que tenhamos demonstrado o lema para toda

$$\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \psi \in P_T(\mathbb{R}^n).$$

Se $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ então

$$\psi = \phi + \bar{\phi} = 2 \operatorname{Re}(\phi) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

é tal que

$$c_m(\psi) = c_m(\phi) + c_m(\bar{\phi}) = c_m(\psi) + \overline{c_{-m}(\phi)} = 0.$$

Assim, $\psi = 0$ e, portanto, $\phi = i\xi$ onde $\xi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\xi \in P_T(\mathbb{R}^n)$. Mas

$$c_m(\xi) = i c_m(\phi) = 0 .$$

$$\text{Logo, } \phi = i\xi = 0 .$$

Com isto podemos supor, sem perda de generalidade, que ϕ assume valores reais.

Se $p(x) = \sum_{j=1}^k a_j e^{i w m_j x}$, onde $a_j \in \mathbb{C}$, então

$$\begin{aligned} \int_{B_T(a)} \phi p &= \int_{B_T(a)} \phi \sum_{j=1}^k a_j e_{m_j} = \sum_{j=1}^k a_j \int_{B_T(a)} \phi e_{m_j} = \\ &= T^n \sum_{j=1}^k a_j c_{-m_j}(\phi) = 0 . \end{aligned}$$

Observe que se mostrarmos que $\phi(0) = 0$ então teremos mostrado que $\phi(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, pois,

$$\begin{aligned} T^n c_m(T_{-x}\phi) &= \int_{[0,T]^n} (T_{-x}\phi)(y) e^{-i w m y} dy = \\ &= \int_{[0,T]^n} \phi(x+y) e^{-i w m y} dy = \int_{B_T(x)} \phi(z) e^{-i w m(z-x)} dz = \\ &= T^n e^{i w m x} \cdot c_m(\phi) = 0 . \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } (T_{-x}\phi)(0) = 0 , \text{ i.é,}$$

$$\phi(x) = 0 .$$

Mostremos, enfim, que $\phi(0) = 0$.

Suponha que $\phi(0) = c \neq 0$.

Sem perda de generalidade, podemos supor $c > 0$ pois,

$$c_m(-\phi) = -c_m(\phi)$$

e

$$(-\phi)(0) = 0 \iff \phi(0) = 0.$$

Como ϕ é contínua, existe $\delta > 0$ tal que $0 < \delta < \frac{T}{2}$ e $x \in [-\delta, \delta]^n$ implica em $\phi(x) > \frac{c}{2} > 0$.

$$\text{Defina } p : [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \longmapsto 1 + \cos wt - \cos w\delta.$$

Se $\delta \leq |t| \leq \frac{T}{2}$ então caso $\delta \leq t \leq \frac{T}{2}$ temos

$$0 < w\delta \leq wt \leq \pi$$

$$-1 \leq \cos wt \leq \cos w\delta < 1$$

$$-1 - \cos w\delta \leq \cos wt - \cos w\delta \leq 0 < 1 - \cos w\delta$$

$$-1 < -\cos w\delta \leq p(t) \leq 1 < 2 - \cos w\delta.$$

Como $p(t) = p(-t)$ segue-se que $|p(t)| \leq 1$, $\delta \leq |t| \leq \frac{T}{2}$.

Se $0 \leq |t| \leq \delta$ então

$$0 \leq |wt| \leq w\delta < \pi$$

e

$$\cos wt = \cos |wt| \geq \cos w\delta.$$

$$\text{Logo, } p(t) = 1 + \cos wt - \cos w\delta \geq 1.$$

Para cada $a > 1$ defina

$$p_a(t) = p\left(\frac{t}{a}\right) = 1 + \cos \frac{wt}{a} - \cos w\delta.$$

Sejam

$$q_a = 1 + \cos\left(\frac{w\delta}{a}\right) - \cos w\delta = \max_{-\frac{\delta}{a} \leq t \leq \frac{\delta}{a}} p(t)$$

e

$$k = \max_{-\delta \leq t \leq \delta} p(t) = 2 - \cos w\delta > 1.$$

Como

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} q_a = 2 - \cos w\delta = k > 1 \quad (1)$$

então

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{k}{q_a} = 1$$

e, para $n \geq 1$

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\frac{k}{q_a}\right)^{2(n-1)} = 1 \quad (2)$$

Por (1) existe a_1 tal que $a \geq a_1$ implica em $q_a > k - \frac{k-1}{2} = \frac{k+1}{2}$ e por (2) existe a_2 tal que $a \geq a_2$ implica em $\left(\frac{k}{q_a}\right)^{2(n-1)} < 1 + \frac{k-1}{2} = \frac{k+1}{2}$.

Seja $a_0 = \max\{a_1, a_2\}$.

Então para $a \geq a_0$ vale

$$\left(\frac{k}{q_a}\right)^{2(n-1)} < \frac{k+1}{2} < q_a.$$

$$\text{Logo, } \frac{k}{q_a} < q_a^{\frac{1}{2(n-1)}}, \text{ i.é., } k < q_a^{1 + \frac{1}{2(n-1)}}$$

Deste modo,

$$p(t) \leq k \leq q_a^{1 + \frac{1}{2(n-1)}} \text{ para todo } t \in [-\delta, \delta] \text{ e se}$$

$$t \in \left[-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right] \quad \text{vale} \quad q_a \leq p(t) \leq q_a^{1 + \frac{1}{2(n-1)}}.$$

Fixemos $a, a \geq a_0$.

Considere

$$\begin{aligned} P(x) &= p(x_1) \dots p(x_n) = \\ &= (1 + \cos wx_1 - \cos w\delta) \dots (1 + \cos wx_n - \cos w\delta) = \\ &= \left(1 + \frac{e^{iwx_1} - e^{-iwx_1}}{2} - \cos w\delta\right) \dots \\ &\dots \left(1 + \frac{e^{iwx_n} - e^{-iwx_n}}{2} - \cos w\delta\right). \end{aligned}$$

Para cada $N \in \mathbb{N}$ defina

$$P_N(x) = (P(x))^N.$$

$$P_N \text{ é da forma } \sum_{j=1}^k a_j e^{iwm_j x}.$$

Temos

$$\int_{[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]^n} \phi P_N = \int_{[-\delta, \delta]^n} \phi P_N + \int_K \phi P_N + \int_Q \phi P_N$$

onde $K \subset [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]^n$ é dado por: $x \in K \iff |x_j| \geq \delta$,

$\forall j = 1, \dots, n$ e $Q \subset [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]^n$ é dado por: $x \in Q \iff \exists i_1, i_2$ tais que $|x_{i_1}| \leq \delta$ e $|x_{i_2}| > \delta$. (No caso $n=1$, $Q = \emptyset$)

Vale que $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]^n = [-\delta, \delta]^n \cup K \cup Q$, união disjunta.

(a menos de conjuntos de medida nula).

Se $x \in [-\delta, \delta]^n$ então $P_N(x) = p^N(x_1) \dots p^N(x_n) \geq 1^{nN} = 1$

e $\phi(x) \geq \frac{c}{2}$. Logo , $\phi P_N > 0$ e

$$\int_{[-\delta, \delta]^n} \phi P_N \geq \int_{[-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}]^n} \phi P_N \geq \frac{c}{2} \cdot q_a^{nN} \cdot \left(\frac{2\delta}{a}\right)^n .$$

Se $x \in K$ então $\frac{T}{2} \geq |x_j| \geq \delta$ para todo $j = 1, \dots, n$.

Assim $|p(x_j)| \leq 1$, $j = 1, \dots, n$.

Logo, $|P_N(x)| \leq 1$ e

$$\int_K \phi P_N \geq - \int_K |\phi P_N| = - \int_K |\phi| |P_N| \geq - \sup |\phi| \cdot T^n .$$

Se $x \in Q$ existem i_1 e i_2 tais que

$$|x_{i_1}| \leq \delta_1 \quad \text{e} \quad |x_{i_2}| > \delta .$$

Então, $|p(x_{i_2})| \leq 1$ e

$$\begin{aligned} |P_N(x)| &= |p(x_1)|^N \dots |p(x_n)|^N \leq \\ &\leq |p(x_1)|^N \dots |p(x_{i_2-1})| \cdot |p(x_{i_2+1})|^N \dots |p(x_n)|^N \leq \\ &\leq q_a^{\left(1 + \frac{1}{2(n-1)}\right)(n-1)N} = q_a^{\left(n - \frac{1}{2}\right)N} , \end{aligned}$$

pois, se $x_j \in [-\delta, \delta]$ então $|p(x_j)| \leq q_a^{1 + \frac{1}{2(n-1)}}$ e

se $x_j \in [-\frac{T}{2}, -\delta] \cup [\delta, \frac{T}{2}]$ então $|p(x_j)| \leq 1 \leq q_a^{1 + \frac{1}{2(n-1)}}$.

Assim,

$$\int_Q \phi P_N \geq - \int_Q |\phi| |P_N| \geq - \sup |\phi| \cdot q_a^{\left(n - \frac{1}{2}\right)N} T^n .$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\int_{[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]^n} \phi P_N &\geq \frac{c}{a} \left(\frac{2\delta}{a}\right)^n q_a^{nN} - T^n \sup|\phi| - \\
&- T^n \sup|\phi| q_a^{(n-\frac{1}{2})N} = \\
&= q_a^{nN} \left(\frac{c}{2} \left(\frac{2\delta}{a}\right)^n - \frac{\sup|\phi| \cdot T^n}{q_a^{nN}} - \frac{\sup|\phi| T^n}{q_a^{N/2}} \right) .
\end{aligned}$$

Como $q_a > 1$ temos:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} q_a^{nN} \left(\frac{c}{2} \left(\frac{2\delta}{a}\right)^n - \frac{\sup|\phi| \cdot T^n}{q_a^{nN}} - \frac{\sup|\phi| \cdot T^n}{q_a^{N/2}} \right) = \infty .$$

Logo, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\int_{[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]^n} \phi P_N \geq 1$.

Absurdo.

Os Teoremas 2 e 3 permitem escrever um isomorfismo entre $s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ e $P_T(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned}
A : s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C}) &\rightarrow P_T(\mathbb{R}^n) \\
(c_m) &\longmapsto \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m
\end{aligned}$$

A linearidade é imediata.

A sobrejetividade é dada pelo Teorema 3, visto que, para cada $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ a seqüência $c = (c_m(\phi))$ é tal que $c \in s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ e $A(c) = \phi$.

Para se verificar a injetividade observe que se $A(c) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m = 0$ então

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{1}{T^n} \int_{[0,T]^n} \left(\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m \right) e_{-\ell} = \\
&= \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m \int_{[0,T]^n} e_{m-\ell} = c_\ell .
\end{aligned}$$

Antes de fazermos a caracterização das distribuições periódicas com as seqüências de crescimento lento, mostremos que P_T' é completo no seguinte sentido:

TEOREMA 4 . Se $(f_j)_{j \in \mathbb{N}}$ é uma seqüência em P_T' tal que dados $\theta \in P_T$ e $\varepsilon > 0$ existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $j, k \geq j_0$ implica que $|(f_j - f_k, \theta)| < \varepsilon$ então $f_j \rightarrow f$ em P_T' , i.é., existe $f \in P_T'$ tal que $(f_j, \theta) \rightarrow (f, \theta)$ para cada $\theta \in P_T$.

DEMONSTRAÇÃO:

Mostremos antes que se (θ_j) , $\theta_j \in P_T$ é de Cauchy então $\theta_j \rightarrow \theta$ em P_T para alguma θ .

Como para cada $p \in \mathbb{N}$

$$P_k(\theta_{j+p} - \theta_j) = \sum_{|\alpha| \leq k} \sup |D^\alpha \theta_{j+p} - D^\alpha \theta_j| \rightarrow 0 ,$$

quando $j \rightarrow \infty$ para todo $k \in \mathbb{N}$, $D^\alpha \theta_j$ converge uniformemente para uma função T-periódica contínua θ_α .

Para cada $\psi \in P_T$

$$\begin{aligned}
(D^\alpha \theta_0, \psi) &= (-1)^{|\alpha|} (\theta_0, D^\alpha \psi) = (-1)^{|\alpha|} \int_{[0,T]^n} \theta_0 D^\alpha \psi = \\
&= \lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{[0,T]^n} \theta_j D^\alpha \psi = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{[0,T]^n} D^\alpha \theta_j \psi = \\
&= \int_{[0,T]^n} \theta_\alpha \psi = (\theta_\alpha, \psi) .
\end{aligned}$$

Usando o Teorema 4 da seção 2 repetidas vezes concluímos que $\theta_\alpha \in P_T$ e $D^\alpha \theta_0 = \theta_\alpha$.

Concluimos então que $D^\alpha \theta_j \rightarrow D^\alpha \theta_0$ uniformemente para cada α , isto é,

$$\theta_j \rightarrow \theta \quad \text{em } P_T.$$

Considere a seqüência (ρ_j) de funções contínuas, definidas em P_T , dadas por

$$\rho_j(\theta) = |(f_j, \theta)|, \quad j = 1, 2, \dots$$

Por uma aplicação do teorema de Baire [ver [1], [7]] existe uma bola aberta em P_T , $B(\theta_1, r) = \{\theta \in P_T; d(\theta, \theta_1) < r\}$ onde ρ_j é uniformemente limitada, i.é., existe $M > 0$ tal que

$$|\rho_j(\theta)| \leq M \quad \text{para toda } \theta \in B(\theta_1, r) \text{ e } j \in \mathbb{N}.$$

Se $-\theta \in B(\theta_1, r)$ então $\rho_j(\theta) = \rho_j(-\theta) \leq M$.

Seja $\theta \in B(0, r)$.

Escreva

$$\theta = \frac{1}{2} [(\theta + \theta_1) + (\theta - \theta_1)]$$

Temos

$$d(\theta + \theta_1, \theta_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k(\theta)}{2^k(1+p_k(\theta))} = d(\theta, 0) < r$$

e

$$d(-(\theta - \theta_1), \theta_1) = d(\theta_1 - \theta, \theta_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_k(\theta)}{2^k(1+p_k(\theta))} = d(\theta, 0) < r$$

Sendo assim,

$$\begin{aligned}
\rho_j(\theta) &= \left| (f_j, \frac{1}{2} [(\theta+\theta_1) + (\theta-\theta_1)]) \right| \leq \\
&\leq \frac{1}{2} [|(f_j, \theta+\theta_1)| + |(f_j, \theta-\theta_1)|] = \\
&= \frac{1}{2} [\rho_j(\theta+\theta_1) + \rho_j(\theta-\theta_1)] \leq M
\end{aligned}$$

pois $\theta + \theta_1$ e $-(\theta - \theta_1)$ e $B(\theta_1, r)$.

Defina $f : P_T \rightarrow \mathbb{C}$ por $f(\theta) = \lim_{j \rightarrow \infty} (f_j, \theta)$. f está bem definida pois, para cada $\theta \in P_T$, a sequência (f_j, θ) é de Cauchy. Mostremos que $f \in P'_T$.

Seja $\theta_\ell \rightarrow 0$ em P_T .

Para cada $\varepsilon > 0$ tomemos $\ell_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{2M\theta_\ell}{\varepsilon} \in B(0, r)$ sempre que $\ell \geq \ell_0$.

Dessa forma

$$\rho_j\left(\frac{2M\theta_\ell}{\varepsilon}\right) = \frac{2M}{\varepsilon} |(f_j, \theta_\ell)| \leq M$$

sempre que $\ell \geq \ell_0$, $j = 1, 2, \dots$, ou seja, para todo $j \in \mathbb{N}$ e $\ell \geq \ell_0$

$$|(f_j, \theta_\ell)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $f(\theta_\ell) = \lim_{j \rightarrow \infty} (f_j, \theta_\ell)$, para cada $\ell \geq \ell_0$ existe j_ℓ tal que

$$|f(\theta_\ell) - (f_{j_\ell}, \theta_\ell)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Assim, para $\ell \geq \ell_0$

$$|f(\theta_\ell)| \leq |f(\theta_\ell) - (f_{j_\ell}, \theta_\ell)| + |(f_{j_\ell}, \theta_\ell)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Portanto, $f \in P'_T$.

TEOREMA 5 . Seja $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^n}$ uma seqüência de crescimento lento.

Então a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e^{iwm \cdot x}$, $w = \frac{2\pi}{T}$ é convergente em $P_T'(\mathbb{R}^n)$ e se

$$f = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m, \text{ onde } e_m(x) = e^{iwm \cdot x}, \text{ temos que}$$

$$c_m = \frac{1}{T^n} (f, e_{-m}) = c_m(f).$$

DEMONSTRAÇÃO:

Seja $\theta \in P_T(\mathbb{R}^n)$.

Para cada $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^n$ temos

$$\begin{aligned} m_j(e_m, \theta) &= \int_{[0, T]^n} m_j e^{iwmx} \theta(x) dx = \frac{1}{w} \int_{[0, T]^n} D_j(e^{iwmx}) \theta(x) dx = \\ &= -\frac{1}{w} \int_{[0, T]^n} e^{iwmx} D_j \theta(x) dx. \end{aligned}$$

$$\text{Obtemos } m_j(e_m, \theta) = \frac{1}{w} (D_j e_m, \theta) = -\frac{1}{w} (e_m, D_j \theta).$$

Usando indução sobre $|\alpha|$ podemos ver que

$$m^\alpha(e_m, \theta) = \frac{1}{w^{|\alpha|}} (D^\alpha e_m, \theta) = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{w^{|\alpha|}} (e_m, D^\alpha \theta).$$

Como $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^n}$ é de crescimento lento, existem $M > 0$ e $k \in \mathbb{N}$ tais que

$$|c_m| \leq M |m|^k, \quad m \in \mathbb{Z}^n, \quad m \neq 0.$$

Assim,

$$\begin{aligned}
&= \sum_{|\alpha|=k+n+1} \frac{k!}{\alpha!} \cdot \frac{1}{w^{|\alpha|}} | (e_m, D^\alpha \theta) | \leq \sum_{|\alpha|=k+n+1} \frac{k!}{\alpha!} \cdot \frac{1}{w^{|\alpha|}} \\
&\cdot \int_{[0,T]^n} |e^{iwm x} D^\alpha \theta(x)| dx = \sum_{|\alpha|=k+n+1} \frac{k!}{\alpha!} \cdot \frac{1}{w^{|\alpha|}} \\
&\cdot \int_{[0,T]^n} |D^\alpha \theta(x)| dx = C .
\end{aligned}$$

Observe que C não depende de m e se $\theta_j \rightarrow 0$ em P_T então para cada $k \in \mathbb{N}$ $|m|^{k+n+1} |(e_m, \theta_j)| \rightarrow 0$, para todo $m \in \mathbb{Z}^n$.

$$\begin{aligned}
|c_m(e_m, \theta)| &= |c_m| |(e_m, \theta)| \leq M |m|^k \cdot \frac{C}{|m|^{k+n+1}} = \\
&= \frac{MC}{|m|^{n+1}} = \frac{\tilde{C}}{|m|^{n+1}}, \quad m \in \mathbb{Z}^n, \quad m \neq 0.
\end{aligned}$$

Considere a reduzida

$$s_j(x) = \sum_{|m| \leq j} c_m e^{iwm x}.$$

Para cada $p \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
|(s_{j+p} - s_j, \theta)| &= |(\sum_{j+1 \leq |m| \leq j+p} c_m e_m, \theta)| \leq \\
&\leq \sum_{j+1 \leq |m| \leq j+p} |c_m(e_m, \theta)| \leq \sum_{j+1 \leq |m| \leq j+p} \frac{1}{|m|^{n+1}}.
\end{aligned}$$

Como a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{1}{|m|^{n+1}}$ é convergente, é de Cauchy.

Logo, s_j também é de Cauchy e como P'_T é completo, existe

$f \in P'_T$ tal que

$$f = \lim_{j \rightarrow \infty} s_j = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m$$

Ainda,

$$\frac{1}{T^n} (f, e_{-m}) = \frac{1}{T^n} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} c_\ell \int_{[0, T]^n} e^{i w(\ell - m) x} dx$$

Mas,

$$\int_{[0, T]^n} e^{i w(\ell - m) x} dx = \begin{cases} 0 & \text{se } \ell \neq m \\ T^n & \text{se } \ell = m \end{cases}.$$

Então

$$c_m = \frac{1}{T^n} (f, e_{-m}).$$

O que o teorema acima diz é que toda série trigonométrica tendo coeficientes de crescimento lento é convergente em P'_T .

Já o seguinte nos diz que toda distribuição periódica pode ser representada como uma série trigonométrica com coeficientes de crescimento lento.

TEOREMA 6. Seja $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$. Se $c_m(f) = \frac{1}{T^n} (f, e_{-m})$ então $(c_m(f))$ é de crescimento lento e

$$f = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(f) e_m \quad \text{em } P'_T(\mathbb{R}^n).$$

DEMONSTRAÇÃO:

Como $f \in P'_T$ existem $c > 0$ e $k \in \mathbb{N}$ tais que

$$\begin{aligned}
|c_m(f)| &= \frac{1}{T^n} |(f, e_m)| \leq \frac{C}{T^n} \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_x |D^\alpha e_m(x)| = \\
&= \frac{C}{T^n} \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_x |w^{|\alpha|} \cdot m^\alpha \cdot e_m(x)| = \\
&= \frac{C}{T^n} \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_x |w^{|\alpha|} \cdot m^\alpha| \leq \frac{C \cdot \max\{1, w^k\}}{T^n} \cdot \sum_{|\alpha| \leq k} |m^\alpha| \leq \\
&\leq C' \sum_{|\alpha| \leq k} (1 + |m|)^{|\alpha|} \leq C'' (1 + |m|)^k,
\end{aligned}$$

para todo m de $\mathbb{Z}^n$.

Portanto $c_m(f)$ é de crescimento lento.

Pelo teorema anterior existe $g \in P_T'$ tal que

$$g = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(f) e_m.$$

Resta-nos mostrar que $g = f$.

Para isto, mostremos primeiramente que $\delta = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} e_m$.

Para cada $\theta \in P_T$ temos

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{T^n} \sum_{|m| \leq j} e_m - \delta, \theta \right) &= \frac{1}{T^n} \sum_{|m| \leq j} \int_{[0, T]^n} e_m(x) \theta(x) dx - \\
&- \theta(0) = \frac{1}{T^n} \sum_{|m| \leq j} \int_{[0, T]^n} e_m(x) \theta(x) dx - \\
&- \frac{\theta(0)}{T^n} \sum_{|m| \leq j} \int_{[0, T]^n} e_m(x) dx = \\
&= \frac{1}{T^n} \sum_{|m| \leq j} \int_{[0, T]^n} e_m(x) (\theta(x) - \theta(0)) dx = \\
&= \frac{1}{T^n} \sum_{|m| \leq j} \int_{[0, T]^n} (\theta(x) - \theta(0)) e_{-m}(x) dx =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{|m| \leq j} c_m (\theta - \theta(0)) = \sum_{|m| \leq j} c_m (\theta - \theta(0)) e_m(0) \rightarrow \\
&\rightarrow (\theta - \theta(0))(0) = \theta(0) - \theta(0) = 0.
\end{aligned}$$

Usando a continuidade sequencial em cada variável da T-convolução chegamos a

$$\begin{aligned}
(f, \theta) &= (f * \delta, \theta) = \left(\frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} f * e_m, \theta \right) = \\
&= \left(\frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (f, (e_m)_a^v), \theta(a) \right) = \\
&= \left(\frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (f, e_{-m}) \cdot e_m(a), \theta(a) \right) = \\
&= \left(\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(f) e_m(a), \theta(a) \right) = (g, \theta).
\end{aligned}$$

Portanto, $f = g$.

Estes dois últimos teoremas mostram que é possível estabelecer um isomorfismo entre $s'(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ e $P'_T(\mathbb{R}^n)$.

Defina

$$B : s'(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C}) \rightarrow P'_T(\mathbb{R}^n)$$

$$c = (c_m) \longmapsto \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m$$

A linearidade de B é trivial.

A sobrejetividade decorre do último teorema, pois, para cada $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ tome $c = (c_m(f))$ e, então, $B(c) = f$.

A injetividade:

Se $B(c) = \sum_{m=0} c_m e_m = 0$ então o Teorema 5 diz que $c_m = (0, e_{-m}) = 0$, i.é., $c = 0$.

EXEMPLO 1 :

Já sabemos que $\delta = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} e_m$; calculemos a série de $D^\alpha \delta$.

$$\begin{aligned} c_m(D^\alpha \delta) &= \frac{1}{T^n} (D^\alpha \delta, e_{-m}) = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{T^n} (\delta, D^\alpha e_{-m}) = \\ &= \frac{(-1)^{|\alpha|}}{T^n} (\delta, (-1)^{|\alpha|} w^{|\alpha|} m^\alpha e_{-m}) = \frac{w^{|\alpha|}}{T^n} m^\alpha. \end{aligned}$$

Logo,

$$D^\alpha \delta = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} w^{|\alpha|} m^\alpha e_m.$$

TEOREMA 7. Se $f, g \in P'_T$ então

$$f * g = T^n \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(f) \cdot c_m(g) e_m.$$

DEMONSTRAÇÃO:

$$\begin{aligned} c_m(f * g) &= \frac{1}{T^n} (f * g, e_{-m}) = \frac{1}{T^n} (f * g * e_m)(0) = \\ &= \frac{1}{T^n} (f * (g * e_m))(0) = \frac{1}{T^n} (f(x), (g * e_m)^V(x)) = \\ &= \frac{1}{T^n} (f(x), (g * e_m)(-x)) = \frac{1}{T^n} (f(x), (g(a), e_m(-x-a))) = \\ &= \frac{1}{T^n} (f(x), (g(a), e_{-m}(a)) \cdot e_{-m}^V(x)) = \\ &= \frac{1}{T^n} (f(x), e_{-m}(x)) (g(a), e_{-m}(a)) = T^n c_m(f) \cdot c_m(g). \end{aligned}$$

Logo,

$$f * g = T^n \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(f) \cdot c_m(g) e_m$$

6. SÉRIE PARCIAL DE FOURIER

6.1. A SÉRIE PARCIAL DE FOURIER EM P_T

Sejam p, q e n em $\mathbb{N}$ tais que

$$n = p + q.$$

Considere a soma direta $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^p \oplus \mathbb{R}^q$.

Escreveremos $(x, y) \in \mathbb{R}^n$ para indicar que $x \in \mathbb{R}^p$ e $y \in \mathbb{R}^q$.

Dada $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ considere para cada $x \in \mathbb{R}^p$ a função

$$\psi_x : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{C}$$

$$y \longmapsto \phi(x, y)$$

$\psi_x \in P_T(\mathbb{R}^q)$ e, portanto,

$$\phi(x, y) = \psi_x(y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} c_m(\psi_x) e^{iwm_y}$$

onde

$$\begin{aligned} c_m(\psi_x) &= \frac{1}{T^q} \int_{[0, T]^q} \psi_x(y) e^{-iwm_y} dy = \\ &= \frac{1}{T^q} \int_{[0, T]^q} \phi(x, y) e^{-iwm_y} dy. \end{aligned}$$

Defina $\phi_m(x) = c_m(\psi_x)$.

Assim, $\phi(x,y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x) e^{i\omega_m y}$.

É claro que ϕ_m é T-periódica.

ϕ_m é contínua pois, se $x_j \rightarrow x_0$ em $\mathbb{R}^p$ então
 $\lim_{j \rightarrow \infty} \phi(x_j, y) e^{-i\omega_m y} = \phi(x_0, y) e^{-i\omega_m y}$ e como $\phi(x_j, y) e^{-i\omega_m y}$
é mensurável e $|\phi(x_j, y) e^{-i\omega_m y}| = |\phi(x_j, y)| \leq C$ (onde C
não depende de j, pois ϕ é limitada), pelo Teorema da Con
vergência Dominada temos que

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \phi_m(x_j) &= T^{-q} \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{[0, T]^q} \phi(x_j, y) e^{-i\omega_m y} dy = \\ &= T^{-q} \int_{[0, T]^q} \phi(x_0, y) e^{-i\omega_m y} dy = \phi_m(x_0) . \end{aligned}$$

Para verificarmos que ϕ_m é C^1 considere uma sequência
 (h_j) , $h_j \in \mathbb{R}^*$, $h_j \rightarrow 0$.

Temos que

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \left[\frac{\phi(x + h_j e_k, y) - \phi(x, y)}{h_j} \right] \cdot e^{-i\omega_m y} &= \\ &= \frac{\partial}{\partial x_k} \phi(x, y) e^{-i\omega_m y} \end{aligned}$$

e

$$\left| \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x_k} e^{-i\omega_m y} \right| = \left| \frac{\partial \phi}{\partial x_k}(x, y) \right| \leq C, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^n .$$

Deste modo, a sequência

$$\frac{\phi(x + h_j e_k, y) - \phi(x, y)}{h_j} \cdot e^{-i\omega_m y}$$

também é limitada para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^n$.

Pelo Teorema da Convergência Dominada segue-se que

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\phi_m(x + h_j e_k) - \phi_m(x)}{h_j} &= \\ &= T^{-q} \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{[0, T]^q} \frac{\phi(x + h_j e_k, y) - \phi(x, y)}{h_j} \cdot e^{-i\omega m y} dy = \\ &= T^{-q} \int_{[0, T]^q} \frac{\partial}{\partial x_k} \phi(x, y) e^{-i\omega m y} dy . \end{aligned}$$

Isto é,

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \phi_m(x) = T^{-q} \int_{[0, T]^q} \frac{\partial}{\partial x_k} \phi(x, y) e^{-i\omega m y} dy .$$

Como $\frac{\partial}{\partial x_k} \phi(x, y)$ é contínua, podemos usar o mesmo raciocínio feito na prova de que ϕ_m é contínua para concluirmos que $\frac{\partial}{\partial x_k} \phi_m(x)$ também é.

Através de indução sobre a ordem da derivada concluimos que

$$\phi_m \in P_T(\mathbb{R}^n) .$$

TEOREMA 1 . Seja $(\phi_m)_{m \in \mathbb{Z}^q}$ uma seqüência de funções de $P_T(\mathbb{R}^P)$ tal que para cada $\alpha \in \mathbb{N}^P$ e $N \in \mathbb{N}$ existe $C > 0$ tal que

$$|D^\alpha \phi_m(x)| \leq \frac{C}{(1 + |m|)^N} ,$$

para todo $m \in \mathbb{Z}^q$ e $x \in \mathbb{R}^P$.

Então, a função $\psi : \mathbb{R}^{P+q} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$\psi(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x) e^{iwm y}$ está bem definida e pertence a $P_T(\mathbb{R}^n)$.

DEMONSTRAÇÃO:

Como para cada $x \in \mathbb{R}^p$.

$\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x) e^{iwm y}$ é convergente, ψ está bem definida.

Seja $\psi_x : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{C}$

$$y \longmapsto \psi(x, y)$$

ψ_x é evidentemente periódica.

ψ_x pertence a $P_T(\mathbb{R}^q)$, pois, dado $N \in \mathbb{N}$, existe $C > 0$ tal que

$$|c_m(\psi_x)| = |\phi_m(x)| \leq \frac{C}{(1+|m|)^N}.$$

Mostremos que ψ é contínua.

Seja $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} |\psi(x, y) - \psi(x_0, y_0)| &= \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} (\phi_m(x) e^{iwm y} - \phi_m(x_0) e^{iwm y_0}) \right| = \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} [(\phi_m(x) - \phi_m(x_0)) \cdot e^{iwm y} + \phi_m(x_0) (e^{iwm y} - e^{iwm y_0})] \right| \leq \\ &\leq \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} |\phi_m(x) - \phi_m(x_0)| + \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x_0) \cdot (e^{iwm y} - e^{iwm y_0}) \right| = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} |\phi_m(x) - \phi_m(x_0)| + \\ &+ |\psi_{x_0}(y) - \psi_{x_0}(y_0)|. \end{aligned}$$

Como existe $C > 0$ tal que

$$|\phi_m(x) - \phi_m(x_0)| \leq \frac{C}{(1+|m|)^{q+1}}, \quad m \in \mathbb{Z}^q, \quad \text{a função}$$

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} |\phi_m(x) - \phi_m(x_0)|$$

é contínua.

Como ψ_{x_0} também é, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|(x, y)| < \delta$ implica que

$$|\psi(x, y) - \psi(x_0, y_0)| \leq \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} |\phi_m(x) - \phi_m(x_0)| +$$

$$+ |\psi_{x_0}(y) - \psi_{x_0}(y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vejamos agora que ψ é C^1

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\psi(x_0 + h e_j, y_0) - \psi(x_0, y_0)}{h} - \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x_0) e^{i w m y_0} \right| = \\ & = \left| \frac{\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_m(x_0 + h e_j) e^{i w m y_0} - \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \phi_m(x_0) e^{i w m y_0}}{h} - \right. \end{aligned}$$

$$\left. - \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x_0) e^{i w m y_0} \right| = \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \left[\frac{\phi_m(x_0 + h e_j) - \phi_m(x_0)}{h} - \right. \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x_0) \right] e^{i w m y_0} \right| \leq \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \left| \frac{\phi_m(x_0 + h e_j) - \phi_m(x_0)}{h} - \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x_0) \right| = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \left| \frac{\partial \phi_m}{\partial x_j}(x_0 + \xi_m e_j) - \frac{\partial \phi_m}{\partial x_j}(x_0) \right| =$$

onde

$$|\zeta_m| < |\xi_m| < |h| .$$

Existe $C > 0$ tal que

$$\left| \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} \phi_m(x_0 + \zeta e_j) \right| \leq \frac{C}{(1+|m|)^{q+1}} , \quad m \in \mathbb{Z}^q .$$

Sendo assim, dado $\varepsilon > 0$ tome

$$\delta = \varepsilon \cdot \left(C \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \frac{1}{(1+|m|)^{q+1}} \right)^{-1}$$

e se $|h| < \delta$ então $|\xi_m| < \delta$ e, portanto,

$$\begin{aligned} & \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \left| \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} \phi_m(x_0 + \zeta e_j) \right| |\xi_m| < \\ & < \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \left| \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} \phi_m(x_0 + \zeta e_j) \right| \delta \leq C \delta \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \frac{1}{(1+|m|)^{q+1}} = \varepsilon . \end{aligned}$$

Ou seja,

$$\frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x_0, y_0) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x_0) e^{i w m y_0} .$$

Como

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x) e^{i w m y} \right| = \left| \frac{\partial}{\partial x_j} \phi_m(x) \right| \leq \frac{cte}{(1+|m|)^{q+1}} , \quad m \in \mathbb{Z}^q$$

segue-se que $\frac{\partial \psi}{\partial x_j}$ é contínua, já que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\psi(x_0, y_0 + h e_j) - \psi(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\psi_{x_0}(y_0 + h e_j) - \psi_{x_0}(y_0)}{h} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial}{\partial y_j} \psi_{x_0}(y_0) = \frac{\partial}{\partial y_j} \left[\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x_0) e^{iwm y} \right] \Big|_{y=y_0} = \\
&= iw \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} m_j \phi_m(x_0) e^{iwm y_0}
\end{aligned}$$

e

$$|m_j \phi_m(x_0) e^{iwm y_0}| = |m_j \phi_m(x_0)| \leq \frac{cte}{(1+|m|)^{q+1}}, \quad m \in \mathbb{Z}^q.$$

Mostremos por indução sobre a ordem das derivadas que $\psi \in C$.

Suponha que $\partial^{(\alpha, \beta)}$ é contínua e que

$$\partial^{(\alpha, \beta)} \psi(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \partial^\alpha \phi_m(x) (iwm)^\beta e^{iwm y}.$$

Defina $\alpha_j = \alpha + e_j$ e $\alpha_{jj} = \alpha_j + e_j$

$$\left| \frac{\partial^{(\alpha, \beta)} \psi(x_0 + h e_j, y_0) - \partial^{(\alpha, \beta)} \psi(x_0, y_0)}{h} - \right.$$

$$\left. - \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0) (iwm)^\beta e^{iwm y_0} \right| =$$

$$= \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \left[\frac{1}{h} (\partial^\alpha \phi_m(x_0 + h e_j) - \partial^\alpha \phi_m(x_0)) - \right. \right.$$

$$\left. - \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0) \right] (iwm)^\beta e^{iwm y_0} \right| \leq$$

$$\leq \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \left| \frac{1}{h} (\partial^\alpha \phi_m(x_0 + h e_j) - \partial^\alpha \phi_m(x_0)) - \right.$$

$$\left. - \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0) \right| |(iwm)^\beta| =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \left| \left(\partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0 + \xi_m e_j) - \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0) \right) \right| \left| (iwm)^\beta \right| = \\
&= \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \left| \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0 + \zeta_m e_j) \right| \left| \xi_m \right| \left| (iwm)^\beta \right|
\end{aligned}$$

onde $|\zeta_m| < |\xi_m| < |h|$.

Como existe $C > 0$ tal que

$$\left| \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0 + \xi_m e_j) \right| \left| (iwm)^\beta \right| \leq \frac{C}{(1+|m|)^{q+1}},$$

para todo $m \in \mathbb{Z}^q$, tome, para cada $\varepsilon > 0$,

$$\delta = \varepsilon \left(C \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \frac{1}{(1+|m|)^{q+1}} \right)^{-1}.$$

Então, se h é tal que $|h| < \delta$ temos

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \left| \partial^{\alpha_j} \phi_m(x_0 + \zeta_m e_j) \right| \left| \xi_m \right| \left| (iwm)^\beta \right| < \varepsilon.$$

Dessa forma,

$$\partial^{(\alpha_j, \beta)} \psi(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \partial^{\alpha_j} \phi_m(x) e^{iwm y} \cdot (iwm)^\beta$$

e como

$$\begin{aligned}
&\left| \partial^{\alpha_j} \phi_m(x) \cdot e^{iwm y} (iwm)^\beta \right| = \\
&= \left| \partial^{\alpha_j} \phi_m(x) (iwm)^\beta \right| \leq \frac{cte}{(1+|m|)^{q+1}}, \quad m \in \mathbb{Z}^q
\end{aligned}$$

segue-se que

$\partial^{(\alpha_j, \beta)} \psi$ é contínua.

Defina $\beta_j = \beta + e_j$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} [\partial^{(\alpha, \beta)} \psi(x_0, y_0 + h e_j) - \partial^{(\alpha, \beta)} \psi(x_0, y_0)] h^{-1} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [h^{-1} \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \partial^\alpha \phi_m(x_0) (iwm)^\beta e^{iwm y_0} (e^{iwh m e_j} - 1)] = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \partial^\alpha \phi_m(x_0) (iwm)^\beta (iwm)_j e^{iwm y_0} = \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \partial^\alpha \phi_m(x_0) (iwm)^{\beta_j} e^{iwm y_0} . \end{aligned}$$

Deste modo, existe $\partial^{(\alpha, \beta_j)} \psi$ e é contínua.

A periodicidade de ψ é imediata.

No início desta seção vimos que se $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ então

$$\phi(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x) e^{iwm y}$$

onde $\phi_m \in P_T(\mathbb{R}^p)$ e

$$\phi_m(x) = \frac{1}{T^q} \int_{[0, T]^q} \phi(x, y) e^{-iwm y} dy .$$

O teorema a seguir mostra que (ϕ_m) é uma sequência de decrescimento rápido.

TEOREMA 2 . Se $\phi \in P_T(\mathbb{R}^n)$ então

$$\phi(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m(x) e^{iwm y} ,$$

onde

$$\phi_m \in P_T(\mathbb{R}^p) \quad , \quad \phi_m(x) = \frac{1}{T^q} \int_{[0,T]^q} \phi(x,y) e^{-iwm y} dy$$

e dado $k \in \mathbb{N}$ e $\alpha \in \mathbb{N}^p$ existe $C > 0$ tal que

$$|D^\alpha \phi_m(x)| \leq \frac{C}{(1+|m|)^k} \quad ,$$

para todo $m \in \mathbb{Z}^q$ e $x \in \mathbb{R}^p$.

DEMONSTRAÇÃO:

Só resta demonstrar a última parte do teorema.

Sejam $\alpha \in \mathbb{N}^p$ e $\beta \in \mathbb{N}^q$

$$\begin{aligned} T^q |m^\beta D^\alpha \phi_m(x)| &= \left| \int_{[0,T]^q} D^{(\alpha,0)} \phi(x,y) m^\beta e^{-iwm y} dy \right| = \\ &= \frac{1}{w^{|\beta|}} \left| \int_{[0,T]^q} D^{(\alpha,0)} \phi(x,y) \cdot D^\beta e^{-iwm y} dy \right| = \\ &= \frac{1}{w^{|\beta|}} \left| \int_{[0,T]^q} D^{(\alpha,\beta)} (\phi(x,y)) e^{-iwm y} dy \right| . \end{aligned}$$

Dado $k \in \mathbb{N}$, temos

$$\begin{aligned} |m|^k |D^\alpha \phi_m(x)| &= \left(\sum_{|\beta|=k} \frac{k!}{\beta!} |m^\beta| \right) |D^\alpha \phi_m(x)| = \\ &= \sum_{|\beta|=k} \left| \frac{k!}{\beta!} m^\beta \cdot D^\alpha \phi_m(x) \right| = \\ &= \sum_{|\beta|=k} \frac{k!}{\beta!} \cdot \frac{1}{w^{|\beta|}} \left| \frac{1}{T^q} \int_{[0,T]^q} D^{(\alpha,\beta)} (\phi(x,y)) e^{-iwm y} dy \right| \\ &\leq \frac{1}{w^k} \sum_{|\beta|=k} \frac{k!}{\beta!} \sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^n} |D^{(\alpha,\beta)} \phi(x,y)| = C(k,\phi) . \end{aligned}$$

Observe que $C(k, \phi)$ não depende de $m \in \mathbb{Z}^q$ e que se $\phi_j \rightarrow 0$ em P_T então $C(k, \phi_j) \rightarrow 0$ para cada $k \in \mathbb{N}$.

Estes dois teoremas caracterizam também as funções de P_T através dos coeficientes (neste caso funções) de Fourier.

6.2. A SÉRIE PARCIAL DE FOURIER PARA DISTRIBUIÇÕES PERIÓDICAS.

Seja $u \in P'_T(\mathbb{R}^p \oplus \mathbb{R}^q)$, $p + q = n$.

Para cada $\gamma \in P_T(\mathbb{R}^p)$ defina

$$v_\gamma : P_T(\mathbb{R}^q) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \longmapsto v_\gamma(\theta) = (u, \gamma \otimes \theta)$$

onde

$$\gamma \otimes \theta : \mathbb{R}^p \oplus \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y) \longmapsto \gamma(x) \cdot \theta(y) .$$

Afirmção: v_γ é linear, pois, para quaisquer $\theta_1, \theta_2 \in P_T(\mathbb{R}^q)$ e $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ vale:

$$\begin{aligned} v_\gamma(a_1 \theta_1 + a_2 \theta_2) &= (u, \gamma \otimes (a_1 \theta_1 + a_2 \theta_2)) = \\ &= (u, a_1 \gamma \otimes \theta_1 + a_2 \gamma \otimes \theta_2) = a_1 (u, \gamma \otimes \theta_1) + a_2 (u, \gamma \otimes \theta_2) = \\ &= a_1 v_\gamma(\theta_1) + a_2 v_\gamma(\theta_2) . \end{aligned}$$

v_γ é contínuo. Seja $\theta_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^q)$. Então para todo $(\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^p \times \mathbb{N}^q$

$$\begin{aligned}
|D^{(\alpha, \beta)} \gamma \otimes \theta_j(x, y)| &= |D^{(\alpha, \beta)} \gamma(x) \theta_j(y)| = \\
&= |D^\alpha \gamma(x) \cdot D^\beta \theta_j(y)| \leq \sup |D^\alpha \gamma(x)| \cdot \sup |D^\beta \theta_j(y)| \rightarrow 0
\end{aligned}$$

uniformemente.

$$\text{Logo, } v_\gamma(\theta_j) = (u, \gamma \otimes \theta_j) \rightarrow 0 \text{ em } \mathbb{C}.$$

Assim, $v_\gamma \in P'_T(\mathbb{R}^q)$ e, desta forma,

$$v_\gamma = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} c_m(v_\gamma) e_m$$

onde

$$c_m(v_\gamma) = \frac{1}{T^q} (v_\gamma, e_{-m}) = \frac{1}{T^q} (u, \gamma \otimes e_{-m}).$$

$$\text{Defina } u_m : P_T(\mathbb{R}^p) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\gamma \longmapsto c_m(v_\gamma)$$

u_m é linear.

$$\begin{aligned}
u_m(a_1 \gamma_1 + a_2 \gamma_2) &= \frac{1}{T^q} (u, (a_1 \gamma_1 + a_2 \gamma_2) \otimes e_{-m}) = \\
&= \frac{a_1}{T^q} (u, \gamma_1 \otimes e_{-m}) + \frac{a_2}{T^q} (u, \gamma_2 \otimes e_{-m}) = \\
&= a_1 u_m(\gamma_1) + a_2 u_m(\gamma_2),
\end{aligned}$$

para todos $\gamma_1, \gamma_2 \in P_T(\mathbb{R}^q)$ e $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$.

Afirmção: u_m é contínuo. Seja $\gamma_j \rightarrow 0$ em $P_T(\mathbb{R}^p)$. Então, para todo $(\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^p \times \mathbb{N}^q$,

$$\begin{aligned}
|D^{(\alpha, \beta)} \gamma_j \otimes e_{-m}(x, y)| &= |D^\alpha \gamma_j(x) D^\beta e_{-m}(y)| \leq \\
&\leq \sup |D^\beta e_{-m}(y)| \cdot \sup |D^\alpha \gamma_j(x)| \rightarrow 0
\end{aligned}$$

uniforme, quando $j \rightarrow \infty$, para cada $m \in \mathbb{Z}^q$.

Logo,

$$u_m(\gamma_j) = \frac{1}{T^q} (u, \gamma_j \otimes e_{-m}) \rightarrow 0.$$

Assim, $u_m \in P_T'(\mathbb{R}^p)$, para todo $m \in \mathbb{Z}^q$,

e

$$v_\gamma = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} (u_m, \gamma) e_m$$

$$(u, \gamma \otimes \theta) = \left(\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} (u_m, \gamma) e_m, \theta \right).$$

Note que esta expressão já é suficiente para que u fi que bem definida, bastando tomar $\gamma(x) = e^{-iwm_1x}$ e $\theta(y) = e^{-iwm_2y}$, onde $m = m_1 + m_2 \in \mathbb{Z}^n$, $m_1 \in \mathbb{Z}^p$ e $m_2 \in \mathbb{Z}^q$.
Daí,

$$c_m(u) = (u, \gamma \otimes \theta).$$

Vejamos agora como é o crescimento da sequência (u_m) .

Como $u \in P_T'(\mathbb{R}^{p+q})$ existem $C_0 > 0$ e $k_0 \in \mathbb{N}$ tais que, para todo $\gamma \in P_T(\mathbb{R}^p)$

$$\begin{aligned} |(u_m, \gamma)| &= \frac{1}{T^q} |(u, \gamma \otimes e_{-m})| \leq \\ &\leq C_0 \sum_{|(\alpha, \beta)| \leq k_0} |D^{(\alpha, \beta)}(\gamma(x) \cdot e_{-m}(y))| = \\ &= C_0 \sum_{|(\alpha, \beta)| \leq k_0} \sup |D^\alpha \gamma(x) (-iwm)^\beta e^{-iwm y}| = \\ &= C_0 \sum_{|(\alpha, \beta)| \leq k_0} \sup |D^\alpha \gamma(x)| \cdot |(wm)^\beta|. \end{aligned}$$

Então, para algum $C_1 > 0$

$$| (u_m, \gamma) | \leq C_1 p_{k_0}(\gamma) (1 + |m|)^{k_0}$$

onde

$$p_{k_0}(\gamma) = \sum_{|\alpha| \leq k_0} \sup |D^\alpha \gamma| .$$

Provamos o seguinte teorema

TEOREMA 3 . Se $u \in P'_T(\mathbb{R}^P \oplus \mathbb{R}^Q)$ então

$$u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^Q} u_m e_m \quad \text{onde} \quad u_m \in P'_T(\mathbb{R}^P)$$

é dada por $(u_m, \gamma) = c_m(v_\gamma)$ e

$$c_m(v_\gamma) = \frac{1}{T^Q} (u, \gamma \otimes e_{-m}) , \quad \gamma \in P_T(\mathbb{R}^P) .$$

Além do mais, para cada $\gamma \in P_T(\mathbb{R}^n)$, (u_m, γ) é uma sequência de crescimento lento.

TEOREMA 4 . Seja $(u_m)_{m \in \mathbb{Z}^Q}$ uma sequência de $P'_T(\mathbb{R}^P)$ que satisfaz a seguinte condição:

Existe $C > 0$ e $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$| (u_m, \phi) | \leq C p_{k_0}(\phi) (1 + |m|)^{k_0} ,$$

para toda ϕ de $P_T(\mathbb{R}^P)$ e todo m de $\mathbb{Z}^Q$.

Então $u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^Q} u_m e_m$ pertence a $P'_T(\mathbb{R}^{P+Q})$.

DEMONSTRAÇÃO:

Para cada $\theta \in P_T(\mathbb{R}^{p+q})$ considere a seqüência

$$\begin{aligned} s_j &= \sum_{\substack{|m| \leq j \\ m \in \mathbb{Z}^q}} (u_m(x) e_m(y), \theta(x, y)) = \\ &= \sum_{\substack{|m| \leq j \\ m \in \mathbb{Z}^q}} (u_m(x), \int_{[0, T]^q} e_m(y) \theta(x, y) dy) = \\ &= \sum_{\substack{|m| \leq j \\ m \in \mathbb{Z}^q}} (u_m(x), \theta_m(x)) . \end{aligned}$$

Para cada $p \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} |s_{j+p} - s_j| &\leq \sum_{\substack{j < |m| \leq j+p \\ m \in \mathbb{Z}^q}} |(u_m, \theta_m)| \leq \\ &\leq C \sum_{j < |m| \leq j+p} p_{k_0}(\theta_m) (1 + |m|)^{k_0} . \end{aligned}$$

Porém, como visto, θ_m é rapidamente decrescente; sendo assim,

$$\begin{aligned} p_{k_0}(\theta_m) &= \sum_{|\alpha| \leq k_0} \sup |D^\alpha \theta_m(x)| \leq \sum_{|\alpha| \leq k_0} c_\alpha (1 + |m|)^{-k_0 - q - 1} \leq \\ &\leq C' (1 + |m|)^{-k_0 - q - 1} . \end{aligned}$$

Assim,

$$|s_{j+p} - s_j| \leq CC' \sum_{\substack{j < |m| \leq j+p \\ m \in \mathbb{Z}^q}} (1 + |m|)^{-q-1} \rightarrow 0$$

quando $j \rightarrow \infty$.

Deste modo, s_j é convergente, e $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} u_m e_m$ pertence a $P'_-(\mathbb{R}^{p+q})$.

C A P Í T U L O   I I

Neste capítulo serão utilizadas basicamente as caracterizações feitas no capítulo anterior (dos elementos de P_T e P'_T com seus coeficientes de Fourier) para se analisar a regularidaa de (hipoeliticidade global) de alguns operadores diferenciais parciais lineares.

Na primeira seção será apresentada uma condição necessária e suficiente para que uma equação de T-convolução tenha sempre uma solução. Estaremos assim incluindo a resolubilidade dos operadores diferenciais parciais lineares com coeficientes constantes.

Na segunda seção será mostrada uma condição necessária e suficiente para que um operador diferencial parcial linear a coeficientes constantes seja globalmente hipoelítico.

Com base neste resultado, a terceira seção será dedicada a operadores diferenciais globalmente hipoelíticos. Nesta seção serão vistos outros exemplos de como fica afetada a regularidaa de de alguns operadores pela adição de outros de ordem mais baixa.

A quarta seção diz respeito a um exemplo de operador globalmente hipoelítico com coeficientes variáveis.

Por fim, na quinta seção será demonstrada hipoeliticidade global de certos operadores utilizando-se uma técnica diferente das usadas nas seções anteriores.

1. RESOLUBILIDADE DE EQUAÇÕES LINEARES DE T-CONVOLUÇÃO

Na seção 4 do capítulo anterior vimos que dada $f \in P'_T$, a equação $f * u = g$ tem, para cada $g \in P'_T$, uma solução em P'_T se, e somente se, existe a inversa de f na T-convolução, isto é, $f * u = \delta$ tem solução em P'_T .

O próximo teorema dá condições necessárias e suficientes sobre os coeficientes de Fourier de uma distribuição periódica para que ela possua uma inversa.

TEOREMA 1. Seja $f \in P'_T(\mathbb{R}^n)$. Então, f é inversível se, e somente se, $c_m(f) \neq 0$ para todo m de $\mathbb{Z}^n$ e $(\frac{1}{c_m(f)})$ formar uma seqüência de crescimento lento, i.é., existem $k \in \mathbb{N}$ e $C > 0$ tais que

$$|c_m(f)| \geq C(1 + |m|)^{-k}, \quad m \in \mathbb{Z}^n.$$

Antes da demonstração observemos que esta última condição sobre $c_m(f)$ diz que estes não podem decrescer rapidamente, i.é., $c_m(f) \notin s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$.

DEMONSTRAÇÃO:

Suponha que exista f^{-1} . Assim,

$$c_m(\delta) = \frac{1}{T^n} = T^n \cdot c_m(f) \cdot c_m(f^{-1}).$$

Desta forma, $c_m(f) \neq 0$, para todo $m \in \mathbb{Z}^n$.

Como $(c_m(f^{-1}))$ é de crescimento lento, pois $f^{-1} \in P'_T$,

vemos que $\frac{1}{c_m(f)} = \frac{c_m(f^{-1})}{T^{2n}}$ também o é.

Suponha agora que $c_m(f) \neq 0$ e que $(\frac{1}{c_m(f)})$ seja de crescimento lento.

Defina $g = \frac{1}{T^{2n}} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{1}{c_m(f)} \cdot e_m$, $g \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ pois,
 $(c_m(g)) = (\frac{1}{T^{2n}} \cdot \frac{1}{c_m(f)}) \in s'(\mathbb{Z}^n; \mathbb{R})$.

Então,

$$c_m(f * g) = T^n c_m(f) \cdot c_m(g) = T^n c_m(f) \cdot \frac{1}{T^{2n} c_m(f)} = \frac{1}{T^n} = c_m(\delta)$$

Logo, $f * g = \delta$.

Por este teorema e o comentário que lhe precede, a equação $f * u = g$ tem uma solução para cada $g \in P'_T$ se, e somente se, $c_m(f) \neq 0$ e $(\frac{1}{c_m(f)})$ é de crescimento lento.

Além do mais, já sabemos que caso exista a solução, ela é dada por $u = f^{-1} * g$.

Porém,

$$c_m(u) = T^n c_m(f^{-1}) \cdot c_m(g) = \frac{1}{T^n} \frac{c_m(g)}{c_m(f)}$$

e daí,

$$u = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{c_m(g)}{c_m(f)} e_m.$$

Note que se $A = \{m \in \mathbb{Z}^n; c_m(f) = 0\}$ então a equação $f * u = g$ pode ter solução, dependendo da g .

Por exemplo, se $c_m(g) = 0$ para todo $m \in A$ defina

$$u = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n \setminus A} \frac{c_m(g)}{c_m(f)} e_m .$$

$$\text{Então, } c_m(u) = \begin{cases} \frac{c_m(g)}{T^n \cdot c_m(f)} & \text{se } m \notin A \\ 0 & \text{se } m \in A \end{cases} .$$

Logo, $f * u = g$.

Neste caso não há unicidade de solução pois, basta acrescentar à u qualquer $\tilde{u} \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ da forma

$$\tilde{u} = \sum_{j=1}^k e_{m_j} , \quad \text{onde } m_j \in A , \quad j = 1, \dots, k .$$

já que

$$c_m(f * \tilde{u}) = T^n c_m(f) \cdot c_m(\tilde{u}) = 0$$

pois, $c_m(f) = 0$ se $m = m_j$, $j = 1, \dots, k$ e $c_m(\tilde{u}) = 0$ se $m \neq m_j$, $j = 1, \dots, k$.

Assim,

$$f * \tilde{u} = 0 \quad \text{e} \quad f * (u + \tilde{u}) = f * u + f * \tilde{u} = g .$$

No caso em que $c_m(f) \neq 0$ para todo $m \in \mathbb{Z}^n$ e $(\frac{1}{c_m(f)})$ não é de crescimento lento, a equação $f * u = g$ pode ter solução desde que $(\frac{c_m(g)}{c_m(f)})$ seja uma seqüência de crescimento lento. Neste caso, a solução será dada por:

$$u = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{c_m(g)}{c_m(f)} e_m .$$

Por exemplo, se $f \in P_T(\mathbb{R}^n)$ e $c_m(f) \neq 0$ então $(\frac{1}{c_m(f)})$

não é de crescimento lento, porém, $f * \delta = f$.

Já vimos que, se $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha D^\alpha$, $a_\alpha \in \mathbb{C}$ for um operador diferencial parcial linear a coeficientes constantes, a equação $P(D)u = g$, onde $g \in P'_T(\mathbb{R}^n)$ pode ser transformada em

$$u * P(D)\delta = g.$$

Usando o Teorema 1 desta seção vemos que a equação admite uma única solução para cada g se, e somente se, $c_m(P(D)\delta) \neq 0$, para todo m de $\mathbb{Z}^n$ e $(\frac{1}{c_m(f)})$ for uma seqüência de crescimento lento.

Note que, definindo $p(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha \xi^\alpha$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, o símbolo de $P(D)$, temos:

$$\begin{aligned} T^n c_m(P(D)\delta) &= T^n c_m\left(\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha D^\alpha \delta\right) = \\ &= c_m\left(\sum_{|\alpha| \leq k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} a_\alpha w^{|\alpha|} \ell^\alpha e_\ell\right) = \\ &= c_m\left(\sum_{\ell \in \mathbb{Z}^n} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha w^{|\alpha|} \ell^\alpha\right) e_\ell\right) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha w^{|\alpha|} m^\alpha = \\ &= \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha w^{|\alpha|} m^\alpha = p(wm). \end{aligned}$$

No caso de existência de solução ela será dada por

$$u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{c_m(q)}{p(wm)} e_m.$$

EXEMPLO 2 :

Considere

$$P(D)u = u - \Delta u ,$$

onde

$$\Delta = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^2$$

Temos

$$p(\xi) = 1 + |\xi|^2 \geq 1$$

e

$$\frac{1}{p(wm)} = \frac{1}{w^2 |m|^2 + 1} \leq 1$$

Então, para cada $g \in P'_T$

$$u = \frac{1}{T^n} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{c_m(g)}{w^2 |m|^2 + 1} e_m$$

é solução de $u - \Delta u = g$.

2. HIPOELITICIDADE GLOBAL

DEFINIÇÃO 1 . Seja P um operador diferencial parcial com coeficientes em P_T . P é dito globalmente hipoelítico se $u \in P'_T$ e

$$Pu = f \in P_T \quad \text{então} \quad u \in P_T .$$

TEOREMA 1 . No caso em que P é um operador diferencial par

cial linear a coeficientes constantes de ordem k então a Definição 1 é equivalente a :

Se $u \in C_T^k$ e $Pu = f \in P_T$ então $u \in P_T$.

DEMONSTRAÇÃO:

Suponha que P satisfaz a Definição 1.

Se $u \in C_T^k$ e $Pu = f \in P_T$ então $u \in P_T$ pois, $C_T^k \subset P_T$.

Suponha que $P = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha D^\alpha$ não satisfaz a Definição 1, isto é, existe

$$u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m \in P_T' \setminus P_T$$

tal que

$$Pu = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} c_m m^\alpha a_\alpha \right) e_m = f \in P_T$$

Como $u \in P_T' \setminus P_T$ existem $L, M_1, M_2 > 0$ e uma sequência $(m_k)_k \in \mathbb{N}$ tais que

$$\frac{k}{(1 + |m_k|^2)^{M_1}} \leq |c_{m_k}|$$

e

$$|c_m| \leq L (1 + |m|^2)^{M_2}, \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n.$$

Como $f \in P_T$, para cada $M \in \mathbb{N}$ existe $K > 0$ tal que

$$\left| \sum_{|\alpha| \leq k} c_m m^\alpha a_\alpha \right| \leq \frac{K}{(1 + |m|^2)^M}.$$

Então, para todo k de $\mathbb{N}$

$$\frac{k}{(1 + |m_k|^2)^{M_1+M_2+p}} \leq \frac{|c_{m_k}|}{(1 + |m_k|^2)^{M_2+p}}$$

e

$$\frac{|c_m|}{(1 + |m|^2)^{M_2+p}} \leq \frac{L}{(1 + |m|^2)^p} \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n.$$

A primeira desigualdade garante que $v \notin P_T$ e a segunda, para p suficientemente grande, que $v \in C_T^k$.

Assim,

$$P(v) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \frac{c_m m^\alpha a_\alpha}{(1 + |m|^2)^{M_2+p}} \right) e_m = g.$$

Afirmção: $g \in P_T$.

De fato, se $M \in \mathbb{N}$ então

$$\begin{aligned} |c_m(g)| &= \left| \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{c_m m^\alpha a_\alpha}{(1 + |m|^2)^{M_2+p}} \right| = \\ &= \frac{1}{(1 + |m|^2)^{M_2+p}} \left| \sum_{|\alpha| \leq k} c_m m^\alpha a_\alpha \right| \leq \\ &\leq \left| \sum_{|\alpha| \leq k} c_m m^\alpha a_\alpha \right| \leq \frac{K}{(1 + |m|^2)^M}. \end{aligned}$$

TEOREMA 2. Sejam P_1 e P_2 operadores globalmente hipoelíticos. Então $P_1 \circ P_2$ também o é.

DEMONSTRAÇÃO:

Se $u \in P_T'$ e $(P_1 \circ P_2)(u) = P_1(P_2(u)) = f \in P_T$ então, por P_1 ser globalmente hipoelítico, $P_2 u \in P_T$. Por P_2 ser globalmente hipoelítico, $u \in P_T$.

TEOREMA 3. Sejam P_1 e P_2 operadores diferenciais parciais com coeficientes em P_T .

Então,

- a) Se P_2 não é globalmente hipoelítico então $P_1 \circ P_2$ também não é.
- b) Se P_1 não é globalmente hipoelítico e P_2 é resolúvel então $P_1 \circ P_2$ não é globalmente hipoelítico.

DEMONSTRAÇÃO:

- a) Existe $u \in P_T' \setminus P_T$ tal que $P_2 u = f \in P_T$.

Como P_1 tem coeficientes em P_T , $P_1(P_2(u)) = P_1 f \in P_T$.

Logo $P_1 \circ P_2$ não é globalmente hipoelítico.

- b) Como P_1 não é globalmente hipoelítico existe $u \in P_T' \setminus P_T$ tal que

$$P_1 u = f \in P_T.$$

Como P_2 é resolúvel, existe $v \in P_T'$ tal que $P_2 v = u$.

Note que $v \notin P_T$ pois, caso contrário $u = P_2 v \in P_T$.

Logo,

$$v \in P_T' \setminus P_T \quad \text{e} \quad (P_1 \circ P_2)v = f \in P_T.$$

TEOREMA 4 . Seja $P = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha D^\alpha$, $a_\alpha \in \mathbb{C}$.

P é globalmente hipoeolítico (GH) se, e somente se, existem números reais positivos tais que

$$(LM) \quad |P(m)| \geq \frac{L}{(m_1^2 + \dots + m_n^2)^M}$$

para $|m|$ suficientemente grande, onde $P(m) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha m^\alpha$.

Antes da demonstração note que a condição (LM) é equivalente a

$$|P(m)| \geq \frac{L}{|m|^{2M}} \quad , \quad \text{para} \quad |m| = |m_1| + \dots + |m_n|$$

suficientemente grande.

Pois,

$$\begin{aligned} m_1^2 + \dots + m_n^2 &\leq m_1^2 + \dots + m_n^2 + 2 \sum_{\substack{i=1 \\ i < j \leq n}}^{n-1} |m_i| |m_j| = \\ &= |m|^2 \leq m_1^2 + \dots + m_n^2 + \sum_{\substack{i=1 \\ i < j \leq n}}^{n-1} (m_i^2 + m_j^2) = n(m_1^2 + \dots + m_n^2) . \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO:

Suponha que existam b , L e M positivos tais que

$$|P(m)| \geq \frac{L}{|m|^{2M}} \quad \text{se} \quad |m| \geq b .$$

Assim, se $P(m) = 0$ implica que $m \in \{ m \in \mathbb{Z}^n ; |m| < b \} = A$ que é finito.

Seja $u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(u) e_m \in P_T'$ tal que $Pu = f \in P_T$.

Assim,

$$c_m(u) P(m) = c_m(f).$$

Dado $k \in \mathbb{N}$, para todo $m \in \mathbb{Z}^n$ tal que $|m| \geq b$, existe $C > 0$ tal que

$$|c_m(u)| = \left| \frac{c_m(f)}{P(m)} \right| \leq |c_m(f)| \cdot \frac{|m|^{2M}}{L} \leq C \cdot |m|^{-k}$$

pois, $c_m(f)$ é de decrescimento rápido.

Seja

$$C' = \max_{0 < |m| < b} \{ C, |m|^k \cdot |c_m(u)| \}.$$

Então

$$|c_m(u)| \leq C' |m|^{-k}, \quad \text{para todo } m \in \mathbb{Z}^n, m \neq 0.$$

Portanto, $u \in P_T$.

Suponha que a condição (LM) seja falsa. Isto é, existe uma sequência (m_j) e $\mathbb{Z}^n$ tal que

$$|P(m_j)| \leq \frac{1}{|m_j|^{2j}}$$

e

$$|m_j^i| \rightarrow \infty \quad \text{para cada } i = 1, \dots, n.$$

$$\text{Seja } u = \sum_{j=1}^{\infty} e_{m_j}.$$

Como

$$c_m(u) = \begin{cases} 1 & \text{se } m = m_j, \text{ para algum } j \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{se } m \neq m_j, j \in \mathbb{N} \end{cases},$$

vemos que $u \in P_T'$.

Além do mais, $u \notin P_T$, já que a subsequência $(c_{m_j}(u))$ não é de decrescimento rápido.

Porém,

$$P(u) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(u) P(m) e_m = \sum_{j=1}^n P(m_j) e_{m_j} = f$$

e

$$c_m(f) = \begin{cases} 0 & \text{se } m \neq m_j, j \in \mathbb{N} \\ P(m_j) & \text{se } m = m_j, \text{ para algum } j \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

Assim, dado $k \in \mathbb{N}$ temos, para todo $m \in \mathbb{Z}^n, m \neq 0$ que:

$$|c_m(f)| = 0 \quad \text{ou} \quad |c_m(f)| = |P(m)| \leq \frac{1}{|m|^{2k}}.$$

De qualquer forma

$$|c_m(f)| \leq \frac{1}{|m|^{2k}}.$$

Portanto, $f \in P_T$.

3. EXEMPLOS DE OPERADORES GLOBALMENTE HIPOELÍTICOS

Considere o operador diferencial parcial

$$P = D_1 - \alpha D_2, \quad \alpha \in \mathbb{C}, \quad D_j = \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial x_j} \quad j = 1, 2.$$

TEOREMA 1.

- a) Se $\alpha = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$ então P é globalmente hipoelítico.
- b) Se $\alpha \in \mathbb{Q}$ então P não é globalmente hipoelítico.
- c) Se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ então P é globalmente hipoelítico se, e somente se, α não é um número de Liouville.

OBSERVAÇÃO: Um número $\alpha \in \mathbb{R}$ é de Liouville se para todo $N \in \mathbb{N}$ existe $K > 0$ e uma infinidade de pares $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$ tais que $|\alpha - \frac{n}{m}| < \frac{K}{m^N}$.

DEMONSTRAÇÃO:

- a) Para todo $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ tal que $|n| \geq \frac{1}{|b|}$ temos

$$\begin{aligned} |P(m, n)|^2 &= |m - (a + ib)n|^2 = |m - an - ibn|^2 = \\ &= (m - an)^2 + b^2 n^2 \geq b^2 n^2 \geq 1. \end{aligned}$$

Pelo Teorema 4 da seção anterior segue-se que P é globalmente hipoelítico.

- b) Seja $\alpha = \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

Então, para qualquer inteiro ℓ ,

$$P(\ell m, \ell n) = \ell m - \frac{m}{n} \cdot \ell n = 0.$$

Como P tem uma infinidade de zeros, pelo Teorema 4 segue-se que P não é globalmente hipoelítico.

c) Se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ é de Liouville então para todo $N \in \mathbb{N}$ existe $K > 0$ e uma seqüência $(n_j, m_j) \in \mathbb{Z}^2$ onde podemos supor $m_j > 0$ e $m_j \rightarrow +\infty$, tais que

$$\left| \alpha - \frac{n_j}{m_j} \right| < \frac{K}{m_j^N}.$$

Assim,

$$|P(n_j, m_j)| = |\alpha m_j - n_j| < \frac{K}{m_j^{N-1}}. \quad (*)$$

Como $m_j \rightarrow +\infty$ quando $j \rightarrow \infty$, podemos supor que $\frac{K}{m_j^N} < 1$.

Desse modo,

$$|n_j| - |\alpha| m_j \leq |\alpha m_j - n_j| < \frac{K}{m_j^{N-1}} = m_j \frac{K}{m_j^N} < m_j.$$

Logo,

$$|n_j| \leq (1 + |\alpha|) m_j.$$

Dai,

$$n_j^2 + m_j^2 \leq [1 + (1 + |\alpha|)^2] m_j^2,$$

$$(n_j^2 + m_j^2)^{\frac{N-1}{2}} \leq [1 + (1 + |\alpha|)^2]^{\frac{N-1}{2}} \cdot m_j^{N-1}$$

e

$$\frac{1}{m_j^{N-1}} \leq \frac{[1 + (1 + |\alpha|)^2]^{\frac{N-1}{2}}}{(n_j^2 + m_j^2)^{\frac{N-1}{2}}}.$$

De (*) segue que

$$|P(n_j, m_j)| < \frac{K \cdot [1 + (1 + |\alpha|)^2]^{\frac{N-1}{2}}}{(m_j^2 + n_j^2)^{\frac{N-1}{2}}}. \quad (**)$$

Assim, dados $L, M > 0$ tome $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{N-3}{2} > M$ e j suficientemente grande para que ocorra

$$\frac{K}{L} \cdot \frac{[1 + (1 + |\alpha|)^2]^{\frac{N-1}{2}}}{(m_j^2 + n_j^2)^{\frac{N-1}{2}}} < 1.$$

Deste modo, por (**)

$$\begin{aligned} |P(n_j, m_j)| &< \frac{K}{L} \cdot \frac{[1 + (1 + |\alpha|)^2]^{\frac{N-1}{2}}}{(m_j^2 + n_j^2)^{\frac{N-1}{2}}} \cdot \frac{L}{(m_j^2 + n_j^2)^{\frac{N-3}{2}}} < \\ &< 1 \cdot \frac{L}{(m_j^2 + n_j^2)^{\frac{N-3}{2}}} \leq \frac{L}{(m_j^2 + n_j^2)^M}. \end{aligned}$$

Portanto, P não é globalmente hipoelítico.

Suponha agora que P não seja globalmente hipoelítico, i.é., P não satisfaz a condição (LM) do Teorema 4 da seção anterior.

Então, para todo $L > 0$ e $M \in \mathbb{N}$ existe $(n_M, m_M) \in \mathbb{Z}^2$ tal que $|n_M| \rightarrow \infty$, $m_M > 0$ e $m_M \rightarrow \infty$ quando $M \rightarrow \infty$ e

$$|P(n_M, m_M)| < \frac{L}{(n_M^2 + m_M^2)^M} \leq \frac{L}{m_M^{2M}}.$$

Logo,

$$|\alpha m_M - n_M| < \frac{L}{m_M^{2M}}$$

isto é,

$$\left| \alpha - \frac{n_M}{m_M} \right| < \frac{L}{m_M^{2M-1}}$$

ou seja, α é de Liouville.

TEOREMA 2. Seja $P = \sum_{j=0}^m a_j \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{m-j} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^j$, $a_j \in \mathbb{C}$ um operador diferencial parcial a coeficientes constantes. Temos:

a) Se $a_0 = a_m = 0$ então P não é globalmente hipoeolítico.

b) Se $a_0 \neq 0$ (ou $a_m \neq 0$) então P se escreve como

$$P = a_0 \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_1 \frac{\partial}{\partial y} \right) \dots \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_m \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\left(\text{ou } P = a_m \left(\frac{\partial}{\partial y} - \beta_1 \frac{\partial}{\partial x} \right) \dots \left(\frac{\partial}{\partial y} - \beta_m \frac{\partial}{\partial x} \right) \right)$$

e P não é globalmente hipoeolítico se, e somente se, existe α_i (ou existe β_i) tal que $\alpha_i \in \mathbb{Q}$ (ou $\beta_i \in \mathbb{Q}$) ou α_i (ou β_i) $\in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e é de Liouville.

DEMONSTRAÇÃO:

$$a) \quad P = \sum_{j=1}^{m-1} a_j \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{m-j} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^j .$$

Seja $u = |\cos x| \in P'_{2\pi}(\mathbb{R}^2) \setminus P_{2\pi}(\mathbb{R}^2)$ como $1 \leq j \leq m-1$ temos

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{m-j} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^j |\cos x| = 0 .$$

Logo

$$Pu = 0 \in P_{2\pi}(\mathbb{R}^2) .$$

b) Se $a_0 \neq 0$ então

$$\begin{aligned}
 P(\xi, \eta) &= \sum_{j=0}^m a_j \xi^{m-j} \eta^j = \eta^m \sum_{j=0}^m a_j \left(\frac{\xi}{\eta}\right)^{m-j} = \\
 &= \eta^m \left[a_0 \left(\frac{\xi}{\eta}\right)^m + a_1 \left(\frac{\xi}{\eta}\right)^{m-1} + \dots + a_m \right] = \\
 &= \eta^m a_0 \left(\frac{\xi}{\eta} - \alpha_1\right) \dots \left(\frac{\xi}{\eta} - \alpha_m\right) = a_0 (\xi - \alpha_1 \eta) \dots (\xi - \alpha_m \eta) .
 \end{aligned}$$

e

$$P = a_0 \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_1 \frac{\partial}{\partial y} \right) \dots \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_m \frac{\partial}{\partial y} \right) .$$

Seja $\alpha_i \in \mathbb{Q}$ ou $\alpha_i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ de Liouville.

Como

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_i \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_j \frac{\partial}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_j \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

temos:

$$\begin{aligned}
 P &= \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_i \frac{\partial}{\partial y} \right) \dots \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_{i-1} \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_{i+1} \frac{\partial}{\partial y} \right) \dots \\
 &\dots \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_m \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_i \frac{\partial}{\partial y} \right) .
 \end{aligned}$$

Existe $u \in P'_T \setminus P_T$ tal que

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_i \frac{\partial}{\partial y} \right) u = g \in P_T .$$

Desse modo,

$$\begin{aligned}
 Pu &= \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_1 \frac{\partial}{\partial y} \right) \dots \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_{i-1} \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_{i+1} \frac{\partial}{\partial y} \right) \dots \\
 &\dots \left(\frac{\partial}{\partial x} - \alpha_m \frac{\partial}{\partial y} \right) g = f \in P_T .
 \end{aligned}$$

Assim P não é globalmente hipoelítico. Agora, se para todo $i = 1, \dots, n$ tivéssemos $\alpha_i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ou $\alpha_i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ não de Liouville então $P_i = \frac{\partial}{\partial x} - \alpha_i \frac{\partial}{\partial y}$ seria globalmente hipoelítico. Como a composição de operadores globalmente hipoelíticos resulta num operador globalmente hipoelítico (Teorema 3 da seção anterior) teríamos

$$P = P_1 \circ \dots \circ P_m$$

globalmente hipoelítico.

Em alguns dos exemplos que seguiremos usaremos o fato de que se p é um primo então $\alpha = \sqrt{p}$ é um irracional não de Liouville, pois, α é um número algébrico [ver: [3]] .

EXEMPLO 1 :

Seja $\alpha = \sqrt{p}$, p primo.

Como os operadores

$$P_1 = \alpha \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \quad \text{e} \quad P_2 = \alpha \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$$

são globalmente hipoelíticos, temos que

$$P = P_1 \circ P_2 = \alpha^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

também o é.

EXEMPLO 2 :

Sejam $P_2 = \alpha^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, $\alpha^2 = p$ primo e $P_0 = -1$.

Então $P = P_2 + P_0 = \alpha^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - 1$ não é (GH) .

De fato, $P(m,n) = n^2 - \alpha^2 m^2 - 1 = 0$ (equação de Pell)
tem infinitas soluções [ver: [6]] .

Por exemplo, se $\alpha = \sqrt{2}$

$$n_k = \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ par}}}^k \binom{k}{j} 3^{k-j} 2^{\frac{3j}{2}}$$

$$m_k = \sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ ímpar}}}^k \binom{k}{j} 3^{k-j} 2^{\frac{3j-1}{2}}$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

Este exemplo ilustra o fato de que se a um operador globalmente hipoeelítico de segunda ordem for adicionado um operador de ordem zero, o resultado pode ser um operador não regular.

EXEMPLO 3 :

Sejam $P_2 = \alpha^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, $\alpha^2 = p$, primo $P_1 = 2i \frac{\partial}{\partial y}$.

Então $P = P_2 + P_1$ não é globalmente hipoeelítico. De fato,

$$P(m,n) = -\alpha^2 m^2 + n^2 - 2n = (n-1)^2 - \alpha^2 m^2 - 1 = 0$$

tem infinitas soluções.

No caso $\alpha = \sqrt{2}$

$$n_k = 1 + \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ par}}}^k \binom{k}{j} 3^{k-j} 2^{\frac{3j}{2}}$$

$$m_k = \sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ ímpar}}}^k \binom{k}{j} 3^{k-j} 2^{\frac{3k-1}{2}}$$

$$k = 1, 2, \dots$$

Assim, se adicionarmos a um operador globalmente hipoelítico de segunda ordem um operador de primeira ordem, o resultado poderá ser não globalmente hipoelítico.

EXEMPLO 4 :

Seja P_N um operador diferencial parcial linear a coeficientes constantes reais, homogêneo, de ordem par e GH.

Se $P_1 = \alpha_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \alpha_n \frac{\partial}{\partial x_n}$, $\alpha_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, 2, \dots, n$ então $P = P_N + P_1$ é globalmente hipoelítico.

De fato, usando a condição (LM) do Teorema 4 da seção anterior, temos:

$$P(m) = P_N(m) + i(\alpha_1 m_1 + \dots + \alpha_n m_n)$$

$$|P(m)| = \sqrt{(P_N(m))^2 + (\alpha_1 m_1 + \dots + \alpha_n m_n)^2} \geq$$

$$\geq |P_N(m)| \geq \frac{L}{|m|^{2M}}$$

para $|m|$ grande.

Logo, P é globalmente hipoelítico.

Os dois exemplos que seguem mostram como que a soma de operadores de ordem um podem afetar a não hipoeliticidade global de um certo operador diferencial parcial.

EXEMPLO 5 :

$$\text{Sejam } P_2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \text{ e } P_1 = -i \frac{\partial}{\partial y} .$$

P_2 não é globalmente hipoelítico, pois,

$$P_2 |\cos y|^3 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} |\cos y|^3 = 0 \in P_{2\pi}$$

e

$$|\cos y|^3 \in P'_{2\pi} \setminus P_{2\pi} .$$

$$\text{Seja } P = P_2 + P_1 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - i \frac{\partial}{\partial y} .$$

Afirmação: P não é globalmente hipoelítico.

De fato,

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} \cos nx \, e^{in^2 y} \in P'_{2\pi} \setminus P_{2\pi} ,$$

pois a seqüência dos coeficientes da série parcial de Fourier é de crescimento lento e não decresce rapidamente.

$$\begin{aligned} Pu &= - \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \cos nx \, e^{in^2 y} - i \sum_{n=0}^{\infty} in^2 \cos nx \, e^{in^2 y} = \\ &= 0 \in P_{2\pi} . \end{aligned}$$

EXEMPLO 6 :

$$\text{Sejam } P_2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \text{ e } P_1 = \alpha \frac{\partial}{\partial y} , \quad \alpha \in \mathbb{R}^* .$$

Então, $P = P_2 + P_1$ é globalmente hipoelítico.

De fato,

$$P(m, n) = -m^2 + i\alpha n$$

$$|P(m,n)| = m^4 + \alpha^2 n^2 \geq m^2 + \alpha^2 n^2 \geq \min\{1, \alpha^2\} |(m,n)|^2 .$$

O Exemplo 1 serviu para nos mostrar um operador hiperbólico que é globalmente hipoeĺítico. Os Exemplos 2 e 3 mostraram que a adiço de operadores de ordem 0 e 1, respectivamente, ao operador do Exemplo 1 pode resultar em um operador no globalmente hipoeĺítico. Vejamos agora que se um operador eltico isto no pode acontecer, i.., qualquer operador eltico globalmente hipoeĺítico (quando somamos a um operador eltico de ordem N um operador de ordem menor do que N o operador resultante ser, ainda, eltico).

Seja $P = P_m + P_{m-1}$ um operador diferencial parcial eltico, onde P_m homogneo de ordem m e P_{m-1} de ordem no mximo m-1.

Como P eltico temos que:

$$\inf_{|\xi|=1} |P_m(\xi)| = c_0 > 0 \quad \text{e se} \quad \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

ento

$$|P_m(\xi)| \geq c_0 |\xi|^m .$$

Tambm existe $M > 0$ tal que

$$|P_{m-1}(\xi)| \leq M |\xi|^{m-1} \quad \text{se} \quad |\xi| \geq 1 .$$

$$\text{Seja} \quad C = \max\left\{1, \frac{2M}{c_0}\right\} .$$

Assim, se $|\xi| \geq C$

$$|P(\xi)| \geq |P_m(\xi)| - |P_{m-1}(\xi)| \geq c_0 |\xi|^m - |P_{m-1}(\xi)| .$$

Mas

$$\begin{aligned}
 - |P_{m-1}(\xi)| &\geq -M|\xi|^{m-1} = -\frac{c_0}{2} \cdot \frac{2M}{c_0} |\xi|^{m-1} \geq \\
 &\geq -\frac{c_0}{2} \cdot c |\xi|^{m-1} \geq -\frac{c_0}{2} |\xi|^m.
 \end{aligned}$$

Logo, se $|\xi| \geq C$ temos que

$$|P(\xi)| \geq \frac{c_0}{2} |\xi|^m.$$

Assim, se $\ell \in \mathbb{Z}^n$ e $|\ell| \geq C$ então

$$|P(\ell)| \geq \frac{c_0}{2} |\ell|^m.$$

Logo, P é globalmente hipoelítico.

4. UM EXEMPLO DE OPERADOR DIFERENCIAL PARCIAL A COEFICIENTES VARIÁVEIS GLOBALMENTE HIPOELÍTICO

Sejam $\phi, a \in P_{2\pi}(\mathbb{R})$ a valores reais tais que:

- i) $\phi(0) \neq 0$
- ii) $\phi(x) = 0$ se $x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}] \cup [\frac{\pi}{2}, \pi]$.

Então o operador P , dado por

$$Pu = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \phi^2(x) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a(x) \frac{\partial u}{\partial y}$$

é globalmente hipoelítico.

Tomemos as séries parciais de Fourier, com respeito a y , de u e f .

$$u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e_n u_n \quad \text{e} \quad f(x, y) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n(x) e^{iny}$$

onde $u_n \in P'_{2\pi}(\mathbb{R})$ e $f_n \in P_{2\pi}(\mathbb{R})$.

Lembremos que $(f_n^{(k)})_{n \in \mathbb{Z}}$ é de decrescimento rápido para todo $k \in \mathbb{N}$.

Agora,

$$\begin{aligned} P(u) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} [-u_n''(x) + (n^2 \phi^2(x) + i n a(x)) u_n(x)] e^{iny} = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n(x) e^{iny}. \end{aligned}$$

Logo,

$$L u_n = [-u_n'' + (n^2 \phi^2(x) + i n a(x)) u_n(x)] = f_n(x).$$

Como o operador diferencial ordinário L é hipoelítico, temos que $u_n \in P_{2\pi}(\mathbb{R})$.

Para provarmos que $u \in P_{2\pi}(\mathbb{R}^2)$, faremos estimativas sobre o crescimento de (u_n) .

Escrevamos

$$u_n(x) = u_n(t) + \int_t^x u_n'(s) ds,$$

onde $t \in [-\delta, \delta]$ e $\delta > 0$ é tal que: se $t \in [-\delta, \delta]$ então $\phi^2(t) \geq \frac{\phi^2(0)}{2} > 0$.

Assim,

$$\begin{aligned}
|u_n(x)|^2 &= |u_n(t)|^2 + \left| \int_t^x u'_n(s) ds \right|^2 + 2 |u_n(t)| \cdot \left| \int_t^x u'_n(s) ds \right| \\
&\leq 2 |u_n(t)|^2 + 2 \left| \int_t^x u'_n(s) ds \right|^2 \leq \\
&\leq 2 |u_n(t)|^2 + 2 \left(\int_t^x |u'_n(s)| ds \right)^2 \leq 2 |u_n(t)|^2 + \\
&+ 2 \left(\int_{-\pi}^{\pi} |u'_n(s)| ds \right)^2 \leq |u_n(t)|^2 + 2 \int_{-\pi}^{\pi} ds \int_{-\pi}^{\pi} |u'_n(s)|^2 ds \leq \\
&\leq 4\pi (|u_n(t)|^2 + \int_{-\pi}^{\pi} |u'_n(s)|^2 ds) .
\end{aligned}$$

Integrando em t sobre $[-\delta, \delta]$ temos:

$$\begin{aligned}
2\delta |u_n(x)|^2 &\leq 4\pi \left(\int_{-\delta}^{\delta} |u_n(t)|^2 dt + 2\delta \int_{-\pi}^{\pi} |u'_n(s)|^2 ds \right) \leq \\
&\leq 4\pi \left(\frac{2}{\phi^2(0)} \int_{-\delta}^{\delta} |u_n(t)|^2 \phi^2(t) dt + 2\delta \int_{-\pi}^{\pi} |u'_n(s)|^2 ds \right) \leq \\
&\leq 4\pi \left(\frac{2}{\phi^2(0)} \int_{-\pi}^{\pi} |u_n(t)|^2 \phi^2(t) dt + 2\delta \int_{-\pi}^{\pi} |u'_n(s)|^2 ds \right) \leq \\
&\leq \text{cte} \int_{-\pi}^{\pi} (|u_n(t)|^2 \phi^2(t) + |u'_n(t)|^2) .
\end{aligned}$$

Se chamarmos

$$\|u_n\|_{\phi} = \left(\int_{-\pi}^{\pi} (|u_n(t)|^2 \phi^2(t) + |u'_n(t)|^2) dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

então poderemos dizer que existe $C > 0$ tal que

$$|u_n(x)| \leq C \|u_n\|_{\phi} .$$

Se multiplicamos a equação $Lu_n = f_n$ por $\bar{u}_n$ e integramos sobre $[-\pi, \pi]$ obteremos:

$$\begin{aligned}
& - \int_{-\pi}^{\pi} u_n''(x) \overline{u_n}(x) dx + n^2 \int_{-\pi}^{\pi} \phi^2(x) |u_n(x)|^2 dx + \\
& + i n \int_{-\pi}^{\pi} a(x) |u_n(x)|^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} f_n(x) \overline{u_n}(x) dx \quad (*)
\end{aligned}$$

Mas,

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} u_n''(x) \overline{u_n}(x) dx &= u_n'(x) \overline{u_n}(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} u_n'(x) \overline{u_n'(x)} dx = \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} |u_n'(x)|^2 dx .
\end{aligned}$$

Assim, (*) se reescreve como:

$$\|u_n\|_{\phi}^2 + i n \int_{-\pi}^{\pi} a(x) |u_n(x)|^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} f_n(x) \overline{u_n}(x) dx .$$

Definamos $\|g\|_2 = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$ e observemos que existe $C > 0$ tal que

$$\|g\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx \leq C \|g\|_{\phi}^2 \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi C \|g\|_{\phi}^2 .$$

Podemos escrever

$$\begin{aligned}
\|u_n\|_{\phi}^4 &\leq \|u_n\|_{\phi}^4 + n^2 \left(\int_{-\pi}^{\pi} a(x) |u_n(x)|^2 dx \right)^2 = \\
&= \left| \|u_n\|_{\phi}^2 + i n \int_{-\pi}^{\pi} a(x) |u_n(x)|^2 dx \right|^2 = \\
&= \left| \int_{-\pi}^{\pi} f_n(x) \overline{u_n}(x) dx \right|^2 \leq \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f_n(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |u_n(x)|^2 dx \right)^2 = \\
&= \|f_n\|_2^2 \|u_n\|_2^2 \leq C^2 \|f_n\|_2^2 \cdot \|u_n\|_{\phi}^2 \quad \text{para algum } C > 0 .
\end{aligned}$$

Logo, se $u_n \neq 0$,

$$\|u_n\|_{\phi} \leq C \|f_n\|_2.$$

Estamos agora em condições de mostrar que (u_n) é de de crescimento rápido.

Seja $k \in \mathbb{N}$ então

$$|u_n(x)| \leq \text{cte} \|u_n\|_{\phi} \leq \text{cte} \|f_n\|_2 \leq \frac{\text{cte}}{(1 + |n|)^k}.$$

Pois, como f_n é de decrescimento rápido,

$$\|f_n\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f_n(x)|^2 dx \leq \frac{\text{cte}}{(1 + |n|)^{2k}} \int_{-\pi}^{\pi} dx = \frac{\text{cte}}{(1 + |n|)^{2k}}.$$

Mostremos agora que (u'_n) é de decrescimento rápido.

Seja $v_n = u'_n$.

Então,

$$\begin{aligned} L v_n(x) &= -v_n''(x) + (n^2 \phi^2(x) + i n a(x)) v_n(x) = \\ &= -u_n'''(x) + (n^2 \phi^2(x) + i n a(x)) u_n'(x) = \\ &= \frac{d}{dx} [-u_n''(x) + (n^2 \phi^2(x) + i n a(x)) u_n(x)] - \\ &\quad - [2n^2 \phi(x) \phi'(x) + i n a'(x)] u_n(x) = \\ &= f_n'(x) - [2n^2 \phi(x) \phi'(x) + i n a'(x)] u_n(x). \end{aligned}$$

Mas,

$$|[2n^2 \phi(x) \phi'(x) + i n a'(x)] u_n(x)| \leq C \cdot n^2 \cdot |u_n(x)|$$

e como $(n^2 u_n)$ e (f'_n) são de decrescimento rápido, segue-se que

$$g_n(x) = f'_n(x) - [2n^2 \phi(x) \phi'(x) + ina'(x)] \cdot u_n(x)$$

também é de decrescimento rápido.

Logo, v_n é tal que $Lv_n = g_n$, onde g_n é de decrescimento rápido.

Portanto, usando o mesmo argumento que foi utilizado para mostrar que u_n era de decrescimento rápido, concluímos que v_n decresce rapidamente.

Para mostrar que $u_n^{(k)}$ é de decrescimento rápido procedemos por indução sobre $k \in \mathbb{N}$.

Notemos que, se $v_n = u_n^{(k)}$ então

$$\begin{aligned} Lv_n(x) &= -u_n^{(k+2)}(x) + (n^2 \phi^2(x) + ina(x)) u_n^{(k)}(x) = \\ &= \left(\frac{d}{dx}\right)^k [-u_n''(x) + (n^2 \phi^2(x) + ina(x)) u_n(x)] - \\ &- \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} \left(\frac{d}{dx}\right)^{k-j} (n^2 \phi^2(x) + ina(x)) \left(\frac{d}{dx}\right)^j u_n(x) = \\ &= f_n^{(k)}(x) - \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} \left(\frac{d}{dx}\right)^{k-j} (n^2 \phi^2(x) + ina(x)) \left(\frac{d}{dx}\right)^j u_n(x) = \\ &= g_n(x). \end{aligned}$$

Se admitirmos que $\left(\frac{d}{dx}\right)^j u_n(x)$ é de decrescimento rápido para $j = 0, 1, \dots, k-1$ então g_n também o será.

Assim $Lv_n = g_n$, g_n de decrescimento rápido.

Usando as estimativas

$$|v_n(x)| \leq \text{cte} \|v_n\|_\phi \leq \text{cte} \|g_n\|_2 \leq \text{cte} (1 + |n|)^{-p}$$

para cada $p \in \mathbb{N}$ e todo $n \in \mathbb{N}$ concluímos que $u_n^{(k)} = v_n$ decresce rapidamente.

$$\text{Logo, } U(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u_n(x) e^{iny} \text{ é de classe } C^\infty.$$

5. OUTROS EXEMPLOS

Nesta seção apresentaremos duas famílias de operadores diferenciáveis parciais lineares, ambas indexadas em $[0, 1]$, cujos elementos são quase sempre globalmente hipoelíticos.

EXEMPLO 1 :

Considere a família

$$(P_\alpha)_{\alpha \in [0, 1]} \quad \text{onde} \quad P_\alpha = \frac{\partial}{\partial x} - \alpha \frac{\partial}{\partial y}.$$

Já sabemos que P_α é globalmente hipoelítico se, e somente se, $\alpha \in [0, 1]$ é irracional não de Liouville.

Como o conjunto dos números de Liouville tem medida nula [ver: [8]] concluímos que P_α é globalmente hipoelítico para quase todo α .

EXEMPLO 2 :

$$\text{Seja } Q = \sum_{1 \leq |\alpha| \leq 2} a_\alpha D^\alpha, \quad a_\alpha \in \mathbb{R}.$$

Então para quase todo $a \in [0,1]$ $P = Q + a$ é globalmente hipoelítico.

Se $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$ é tal que $|Q(m,n)| \geq 2$ então

$$|P(m,n)| = |Q(m,n) + a| \geq |Q(m,n)| - |a| \geq 1.$$

Seja

$$A = \{ (m,n) \in \mathbb{Z}^2 ; |Q(m,n)| < 2 \} = \{ (m_j, n_j) \in \mathbb{Z}^2 , j \in \mathbb{N} \}$$

onde

$$|m_j| + |n_j| \leq |m_{j+1}| + |n_{j+1}|$$

Considere

$$f_k(a) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|} (n_j^2 + m_j^2)^2}.$$

Para cada $(m_j, n_j) \in A$ a função $g_j(a) = \frac{1}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|}}$ é integrável em $[0,1]$, pois, se $Q(m_j, n_j) \notin [-1,0]$ ela é contínua e, caso contrário,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{da}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|}} &= \lim_{b \rightarrow -Q(m_j, n_j)-} \int_0^b \frac{da}{\sqrt{-Q(m_j, n_j) - a}} + \\ &+ \lim_{b \rightarrow -Q(m_j, n_j)+} \int_b^1 \frac{da}{\sqrt{a + Q(m_j, n_j)}} = \\ &= 2 [\sqrt{-Q(m_j, n_j)} + \sqrt{1 + Q(m_j, n_j)}]. \end{aligned}$$

Também, para todo j vale:

$$\left| \int_0^1 \frac{da}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|}} \right| \leq 2 [\sqrt{Q(m_j, n_j)} + \sqrt{|1 + Q(m_j, n_j)|}].$$

Temos que

$$f_k(a) \nearrow \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|} (m_j^2 + n_j^2)^2}$$

Pelo Teorema da Convergência Monôtona

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|} (m_j^2 + n_j^2)^2} \right) da = \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{da}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|} (m_j^2 + n_j^2)^2} \leq \\ &\leq 2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\sqrt{|1 + Q(m_j, n_j)|} + \sqrt{|Q(m_j, n_j)|}}{(m_j^2 + n_j^2)^2} \leq \\ &\leq 2(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \sum \frac{1}{(m_j^2 + n_j^2)^2} \leq 2(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(m^2 + n^2)^2} < \infty . \end{aligned}$$

Pois,

$$|Q(m_j, n_j)| < 2 \quad \text{e} \quad |1 + Q(m_j, n_j)| < 3 .$$

Assim, para quase todo $a \in [0, 1]$ a série

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|} (m_j^2 + n_j^2)^2}$$

é finita.

Logo, existe $M_a > 0$ tal que

$$\frac{1}{\sqrt{|a + Q(m_j, n_j)|} (m_j^2 + n_j^2)^2} \leq M_a .$$

Ou seja,

$$|P(m_j, n_j)| = |a + Q(m_j, n_j)| \geq \frac{1}{M_a^2 (m_j^2 + n_j^2)^4}.$$

Seja $L_a = (\max\{M_a^2, 1\})^{-1}$. Então, se $(m, n) \neq (0, 0)$

$$|P(m, n)| \geq 1 \geq L_a |(m, n)|^{-8} \quad \text{se} \quad (m, n) \notin A$$

$$|P(m, n)| \geq L_a |(m, n)|^{-8} \quad \text{se} \quad (m, n) \in A.$$

Logo,

$$|P(m, n)| \geq L_a |(m, n)|^{-8}, \quad \forall (m, n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

A P Ê N D I C E

Vimos na seção 5 do Capítulo I que $s = s(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ é isomorfo a $P_T = P_T(\mathbb{R}^n)$ e que $s' = s'(\mathbb{Z}^n; \mathbb{C})$ é isomorfo a $P'_T = P'_T(\mathbb{R}^n)$. Neste apêndice mostraremos que s é homeomorfo a P_T bem como s' a P'_T .

Consideraremos em s as semi-normas

$$p_k(c) = \sup_{m \in \mathbb{Z}^n} (1 + |m|)^k |c_m| ,$$

onde $c = (c_m) \in s$ e $k = 0, 1, 2, \dots$.

s é metrizável através da distância

$$d(c, b) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(c-b)}{2^k (1 + p_k(c-b))} .$$

Em P_T usaremos as semi-normas usuais

$$p_k(\phi) = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq k}} |D^\alpha \phi(x)| .$$

Considere o isomorfismo algébrico $A : s \rightarrow P_T$ dado por

$$A(c) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m e_m .$$

Seja $(c_j)_{j \in \mathbb{N}}$ uma seqüência em s , onde

$c_j = (c_{m,j})_{m \in \mathbb{Z}^n}$, tal que $c_j \rightarrow 0$ em s , i.é., para cada $k \in \mathbb{N}$ $p_k(c_j) \rightarrow 0$ quando $j \rightarrow \infty$.

Sejam $\varepsilon > 0$ e $k \in \mathbb{N}$.

Assim, se $|\alpha| \leq k$

$$\begin{aligned} |D^\alpha A(c_j)| &= \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} m^\alpha c_{m,j} e_m \right| \leq \\ &\leq \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} |m^\alpha| |c_{m,j}| \leq \text{cte} \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} (1 + |m|)^k |c_{m,j}|. \end{aligned}$$

Porém, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $j \geq j_0$ então

$$(1 + |m|)^{n+1+k} |c_{m,j}| \leq P_{n+1+k}(c_j) < \varepsilon.$$

Logo, para $j \geq j_0$

$$|D^\alpha A(c_j)| \leq \text{cte} \varepsilon \cdot \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \frac{1}{(1 + |m|)^{n+1}}.$$

Portanto, $P_k(A(c_j)) \rightarrow 0$ quando $j \rightarrow \infty$.

Assim, A é contínuo.

Mostremos agora que

$$A^{-1} : P_T \rightarrow \mathcal{S}$$

$$\phi \longmapsto (c_m(\phi)) \quad \text{é contínuo.}$$

Seja (ϕ_j) uma seqüência de P_T tal que $\phi_j \rightarrow 0$ em P_T .

Para cada $\alpha \in \mathbb{N}^n$ temos

$$\begin{aligned} |m^\alpha c_m(\phi_j)| &= \left| \frac{1}{T^n} \int_{[0,T]^n} \phi_j(x) m^\alpha e^{iwmx} dx \right| = \\ &= \frac{1}{T^n w^{|\alpha|}} \left| \int_{[0,T]^n} \phi_j(x) D^\alpha e^{iwmx} dx \right| = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{T^n w^{|\alpha|}} \left| \int_{[0,T]^n} D^\alpha \phi_j(x) \cdot e^{iwmx} dx \right| \leq \\
&\leq \frac{1}{T^n w^{|\alpha|}} \int_{[0,T]^n} |D^\alpha \phi_j(x)| dx \leq \\
&\leq \frac{1}{w^{|\alpha|}} \sup |D^\alpha \phi_j(x)| .
\end{aligned}$$

Assim, se $|\alpha| \leq k$

$$\begin{aligned}
(1 + |m|)^k |c_m(\phi_j)| &= \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} |m|^\ell |c_m(\phi_j)| = \\
&= \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} \left(\sum_{|\beta|=\ell} \frac{\ell!}{\beta!} |m^\beta| \right) |c_m(\phi_j)| = \\
&= \sum_{\ell=0}^k \sum_{|\beta|=\ell} \binom{k}{\ell} \frac{\ell!}{\beta!} |m^\beta| |c_m(\phi_j)| \leq \\
&\leq \sum_{\ell=0}^k \sum_{|\beta|=\ell} \binom{k}{\ell} \frac{\ell!}{\beta!} \frac{1}{w^{|\beta|}} \sup |D^\beta \phi_j| \rightarrow 0
\end{aligned}$$

quando $j \rightarrow \infty$.

Logo, $p_k(A^{-1}(\phi_j)) \rightarrow 0$ quando $j \rightarrow \infty$ e, portanto, A^{-1} é contínuo.

Antes de mostrarmos que s' é homeomorfo a P_T' mostremos que s' é homeomorfo a s^* , o dual de s .

Considere a aplicação

$$L : s' \rightarrow s^*$$

$$c \mapsto L(c)$$

dada por $\langle L(c), d \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m d_m$ onde $c = (c_m) \in s'$ e $d = (d_m) \in s$.

$L(c)$ está bem definido pois existe $C > 0$ e $k \in \mathbb{N}$ tais que $|c_m| \leq C(1 + |m|)^k$. Também existe $C' > 0$ tal que $|d_m| \leq C'(1 + |m|)^{-k-n-1}$.

Logo, $|c_m d_m| \leq C \cdot C' (1 + |m|)^{-n-1}$.

É fácil verificar que L é linear.

L é sobrejetora pois, se $f \in s^*$ considere $c_m = \langle f, \tilde{e}_m \rangle$ e $c = (c_m)$, onde $\tilde{e}_m = (\tilde{e}_{m,j})$ e $\tilde{e}_{m,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } m=j \\ 0 & \text{se } m \neq j \end{cases}$.

Como $f \in s^*$, i.é., $f : s \rightarrow \mathbb{C}$ é linear e contínuo existe semi-norma p_k de s tal que $|\langle f, d \rangle| \leq C \cdot p_k(d)$ para $C > 0$ para toda $d \in s$.

Assim,

$$|c_m| = |\langle f, \tilde{e}_m \rangle| \leq C \cdot p_k(\tilde{e}_m) = C \cdot \sup_{j \in \mathbb{N}^n} (1 + |j|)^k.$$

$$|\tilde{e}_{m,j}| = C \cdot (1 + |m|)^k.$$

Logo $c \in s'$ e

$$\langle L(c), d \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m d_m = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle f, \tilde{e}_m \rangle d_m = \langle f, d \rangle.$$

L é injetora pois, se $c \in s'$ e $c = (c_m) \neq 0$ então $c_m \neq 0$ para algum $m \in \mathbb{Z}^n$. Assim,

$$\langle L(c), \tilde{e}_m \rangle = c_m \neq 0, \text{ i.é., } L(c) \neq 0.$$

Portanto, L é um isomorfismo entre s' e s^* .

$$\begin{aligned}
| (\tilde{B}(f_j), \theta) | &= | (\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \langle f_j, \tilde{e}_m \rangle e_m, \theta) | = \\
&= | \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} f_{m,j} (e_m, \theta) | = T^n | \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} f_{m,j} c_m(\theta) | = \\
&= T^n q_d(f_j) \rightarrow 0
\end{aligned}$$

quando $j \rightarrow \infty$.

Logo, $Q_\theta(\tilde{B}(f_j)) \rightarrow 0$ quando $j \rightarrow \infty$ e, portanto, $\tilde{B}$ é contínuo.

Mostremos que

$$\tilde{B}^{-1} : P_T' \rightarrow s^*$$

$$u \mapsto f$$

onde, para cada $d = (d_m)$ e s

$$\langle \tilde{B}^{-1}(u), d \rangle = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(u) d_m \quad \text{é contínuo.}$$

Seja $u_j \rightarrow 0$ em P_T' .

Para cada $d \in s$ existe $\theta \in P_T$ tal que $d_m = c_m(\theta)$.

Assim,

$$\begin{aligned}
q_d(\tilde{B}^{-1}(u_j)) &= | \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(u_j) d_m | = \\
&= T^n | \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(u_j) (\theta, e_m) | = \\
&= T^n | (\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} c_m(u_j) e_m, \theta) | = T^n | (u_j, \theta) | = \\
&= T^n Q_\theta(u_j) \rightarrow 0 \quad \text{quando } j \rightarrow \infty.
\end{aligned}$$

Logo, $\tilde{B}^{-1}$ é contínuo.

B I B L I O G R A F I A

- [1] DUGUNDJI, J. - "Topology", Allyn and Bacon, Inc., Boston .
- [2] EDWARDS, R.E. - "Fourier Series - A Modern Introduction",
vol. I,II, Holt, Rinehart and Winton, Inc., EUA, 1967.
- [3] FIGUEIREDO, D.G. - "Números Irracionais e Transcendentes",
IMPA, Rio de Janeiro, 1985.
- [4] FUJIWARA, D. and OMORI, H. - "An Example of a Globally
Hypoelliptic Operator" , Hokkaido Mathematical Journal,
12 (1983), 293-297.
- [5] GREENFIELD, S.J. and WALLACH, N.R.-"Global Hypoellipticity
and Liouville Numbers",Proc. Amer. Math. Soc., 31 (1972),
112-114.
- [6] GRIFFIN, H. - "Elementary Theory of Numbers", Mc. Graw-
-Hill Book Co., N. York, 1954, 172-176.
- [7] HOUNIE, J. - "Teoria Elementar das Distribuições", 12º Co
lôquio Brasileiro de Matemática, IMPA, Rio de Janeiro ,
1979.
- [8] MAÑÉ, R. - "Introdução à Teoria Ergódica" , Projeto Eucli
des, IMPA, Rio de Janeiro, 1984.
- [9] SANTOS NETO, C. - "Distribuições Periódicas e Hipoelitic
idade", Dissertação de Mestrado, ICMSC, 1985.
- [10] SCHWARTZ, L. - "Méthodes Mathématiques pou les sciences
physiques", 2ª ed., Hermann, Paris, 1965.
- [11] ZEMANIAN, A.H. - "Distribution Theory and Transform Analy
sis", Mc. Graw-Hill, N. York.