AÇÕES DE $\mathbb{R}^n$ SOBRE T^n -FIBRAÇÕES

FRANCISCO DUTENHEFNER

Orientador:

PROF. DR. JOSÉ LUIS ARRAUT VERGARA

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos da Universidade de São Paulo - USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de "Mestre em Ciências - Área de Matemática".

USP - São Carlos
Maio de 1996

Dedico esta dissertação aos meus pais, Miguel e Edy, que com afinho, lutaram para a realização de meus estudos. Amo muito vocês.

Dedico aos meus queridos irmãos Cláudio, Fernando e Sérgio pelo incentivo, carinho e apoio. Dedico também ao nosso grande amigo Wilson que tem ajudado, em muito, todas as nossas conquistas.

Dedico especialmente à Patricia por estar sempre presente nos momentos difíceis e por me mostrar que a vida não é só matemática. Adoro você.

Dedico a todos aqueles que tem contribuído para o meu desenvolvimento espiritual.

Dedico esta dissertação ao saudoso, e sempre carinhosamente lembrado, **Miro** que nos faz muita falta.

Agradecimentos

Ao Prof. Dr. José Luis Arraut Vergara pelo incentivo, paciência e conhecimentos transmitidos durante este período.

Ao Prof. Dr. Nicolau Saldanha pelas inúmeras dúvidas esclarecidas no decorrer deste trabalho.

Ao Prof. Dr. Janey Daccach pelas conversas que contribuíram para uma melhora deste trabalho.

Aos professores Biasi, Cidinha e Janey pela oportunidade e confiança dadas nas monitorias. Ao Dide pela simpatia, amizade e orientação com que me recepcionou na minha chegada ao departamento. Ao Herminio pela ajuda computacional que permitiu a realização deste trabalho.

Aos professores do departamento de matemática da UFSCar, que sempre estiveram dispostos e souberam colaborar com a minha formação acadêmica e pela convivência amiga. Em particular, gostaria de agradecer à Alice Libardi e ao Dirceu Penteado pelas excelentes orientações nas minhas iniciações científicas e ao professor César Rogério pela confiança depositada em mim no final de minha graduação.

Aos professores do departamento de matemática do ICMSC por contribuírem na evolução da minha formação.

Ao Prof. Dr. Nicolai Goussevskii pelos ensinamentos transmitidos no verão de 1996 na UFMG e por todo seu incentivo em relação à minha pessoa.

Aos funcionários do instituto, cuja ação nos dá condições de desenvolver nosso trabalho. Em particular agradeço às funcionárias da Biblioteca e às funcionárias da limpeza por transmitirem carinho e solidariedade e à Beth e à Laura, pela eficiência com que tratam os nossos assuntos acadêmicos.

Agradeço, do fundo do coração, aos meus amigos que me suportaram e tornaram agradáveis todos estes anos. Em particular, à Lucimara e ao Marcão pela excelente convivência em nossa república.

Agradeço a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para o bom andamento deste trabalho. Peço desculpas àqueles que injusta e involuntariamente tenham sido omitidos.

À CAPES pelo apoio financeiro concedido.

Abstract

Let X be a smooth fibre bundle with typical fibre the torus $\mathbb{T}^n$ over a smooth compact connected manifold M^m . Since the compact orbits of an locally free action of $\mathbb{R}^n$ are tori it is natural to ask if there exists a smooth locally free action of $\mathbb{R}^n$ over X with orbits equal to the fibres. In the original paper [23], Nicolau Saldanha studied this problem and gave necessary and sufficient conditions for the existence of such an action. He also proved that the desired action exists if X and M are orientable, $n \leq 2$ and $m \leq 2$ but may not exist if any of this three conditions is dropped. This paper was the object of our study. Here, we make a detailed exposition of the contents of this paper.

Resumo

Seja X um fibrado diferenciável com fibra típica o toro $\mathbb{T}^n$ sobre uma variedade compacta e conexa M^m . Como as órbitas compactas de uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ são toros, é natural perguntar se existe uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ em X com órbitas iguais as fibras. No artigo original [23], Nicolau Saldanha estudou este problema e apresentou condições necessárias e suficientes para a existência de uma tal ação. Ele também demonstrou que a desejada ação existe se X e M são orientáveis, $n \leq 2$ e $m \leq 2$ mas pode não existir se qualquer uma destas três hipóteses é retirada. Este artigo é o objeto do nosso estudo. Aqui, apresentamos uma detalhada exposição dos conteúdos deste artigo.

Índice

Introdução	1
1 Preliminares	5
1.1 O grupo $SL(n, \mathbb{R})$	5
1.2 Os grupos $SL(n, \mathbb{R})$ e $SL(n, \mathbb{Z})$	9
1.3 Dois lemas principais	11
2 Superfícies de Riemann	22
2.1 Definições e exemplos	22
2.2 Coordenadas isotérmicas	25
2.3 Topologia das superfícies de recobrimento	26
2.4 Uniformização de superfícies de Riemann	32
2.5 Estruturas complexas no toro	36
3 Estruturas Afins	41
3.1 Espaços fibrados	41
3.2 Estruturas afins	43
3.3 Fibras coerentemente orientadas	45
3.4 Existência de estruturas afins	45
4 Teorema A	50
5 Teorema B	60
Bibliografia	69
Índice Remissivo	71

Introdução

Ao longo desta dissertação suporemos que as variedades são fechadas, conexas e as aplicações são de classe C^∞ as quais chamaremos de diferenciáveis.

Uma **ação** de $\mathbb{R}^n$ numa variedade X é uma aplicação $\varphi : \mathbb{R}^n \times X \rightarrow X$ tal que $\varphi(0, p) = p$ e $\varphi(t_1 + t_2, p) = \varphi(t_1, \varphi(t_2, p))$, para quaisquer $t_1, t_2 \in \mathbb{R}^n$ e $p \in X$. A **órbita** de um ponto $p \in X$ pela ação φ é o conjunto $\mathcal{O}_p(\varphi) = \{\varphi(t, p), t \in \mathbb{R}^n\}$.

Para $n = 1$ φ também é chamada um **fluxo** em X . A um fluxo φ associa-se um campo de vetores diferenciável $\mathcal{X}$ definindo-se $\mathcal{X}(p) = \frac{d}{dt}\varphi(t, p)|_{t=0}$. Reciprocamente, pode-se integrar cada campo diferenciável de vetores tangentes $\mathcal{X}$ dando origem a um fluxo $\mathcal{X}_t(p) = \varphi(t, p)$.

Uma ação $\varphi : \mathbb{R}^n \times X \rightarrow X$ é gerada por n campos de vetores em X . Com efeito, seja $\{v_1, \dots, v_n\}$ uma base de $\mathbb{R}^n$. Para cada $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, define-se fluxos em X por $\varphi_i(t, p) = \varphi(tv_i, p)$. Tais fluxos induzem campos $\mathcal{X}^i$ em X tais que:

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n t_i v_i, p\right) = \mathcal{X}_{t_1}^1 \circ \mathcal{X}_{t_2}^2 \circ \dots \circ \mathcal{X}_{t_n}^n(p)$$

Estes campos de vetores são chamados **geradores infinitesimais** da ação φ . Como a soma em $\mathbb{R}^n$ é comutativa eles satisfazem $[\mathcal{X}^i, \mathcal{X}^j] = 0$, para todo i, j . Assim, diz-se que eles são dois a dois **comutativos**.

Uma ação $\varphi : \mathbb{R}^n \times X \rightarrow X$ é **localmente livre** se, para todo $p \in X$, a órbita $\mathcal{O}_p(\varphi)$ tiver dimensão n .

Portanto existem duas perguntas naturais: X admite alguma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$? Qual o maior n para o qual existe ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ em X ? Define-se então o **posto** de uma variedade X como o maior inteiro n tal que existe ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ em X , o que é equivalente a dizer que n é o número máximo de campos de vetores em X , dois a dois comutativos e linearmente independentes em todos os pontos.

Como pode ser lido em [16], J. Milnor definiu o posto de uma variedade em 1963 e colocou a pergunta de calcular-se o posto das esferas S^{2n+1} , $n \geq 1$. Esta pergunta

foi respondida (para $n = 3$) por E. L. Lima [16] o qual mostrou que uma variedade fechada de dimensão três com grupo fundamental finito tem posto um. Ele também provou o seguinte resultado para variedades de dimensão dois: uma variedade fechada X de dimensão dois admite uma ação de $\mathbb{R}^2$ sem pontos fixos (órbitas de dimensão zero) se, e somente se, a característica de Euler de X é igual de zero. [15]

A pergunta de J. Milnor pode ser generalizada ao problema de se classificar (diferenciavelmente) o posto de todas as variedades. Por exemplo, a única variedade n -dimensional de posto n é o toro $\mathbb{T}^n$ pois, uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ em X^n (conexa) possui uma órbita que é simultaneamente um subconjunto aberto e fechado de X e é portanto igual à X . Existe uma classificação completa do posto para variedades de dimensão menor ou igual a três.

Dimensão 1: S^1 tem posto 1.

Dimensão 2: O toro $\mathbb{T}^2$ tem posto 2, a garrafa de Klein tem posto 1 e todas as outras tem posto 0.

Dimensão 3: No artigo [21] encontra-se a seguinte classificação: uma variedade fechada orientável de dimensão três tem posto 2 se, e somente se, ela é um fibrado não trivial sobre $\mathbb{T}^1$ com fibras $\mathbb{T}^2$. Como toda variedade fechada orientável de dimensão três admite um campo de vetores não nulo, conclui-se que aquelas que não são fibrados de toros $\mathbb{T}^2$ sobre $\mathbb{T}^1$ tem posto 1 e o toro $\mathbb{T}^3$ tem posto 3.

Concentraremos agora nossa atenção para variedades X fechadas, conexas orientáveis de dimensão 4. Como vimos acima $\mathbb{T}^4$ é a única de posto 4. Por isso excluimos este caso daqui para frente. G. Chatelet, H. Hosenberg e D. Tischler provaram em [7] e [27] que se X tem posto 3 então X é um fibrado sobre S^1 com fibras $\mathbb{T}^3$ e reciprocamente, se X é um fibrado sobre S^1 com fibras $\mathbb{T}^3$ então X é homeomorfo a uma variedade de posto 3. Logo, este resultado exhibe uma classificação topológica das variedades de dimensão 4 com posto 3.

O artigo de N. C. Saldanha [23], o qual é o objeto de estudo desta dissertação, exhibe informações positivas sobre as variedades X com posto igual a $\dim(X) - 2$. No referido artigo são demonstrados os seguintes teoremas:

Teorema A: *Seja X um fibrado diferenciável com fibras T^n sobre uma variedade compacta e conexa M^m . Suponhamos que as fibras de X estejam coerentemente orientadas. Então existe uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ sobre X com órbitas iguais às fibras se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:*

1. *é possível definir uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X .*
2. *o fibrado vetorial Y sobre M com fibras $H_1(T^n, \mathbb{R})$ é trivial.*

Teorema B: *Seja X um fibrado diferenciável com fibras T^n sobre uma variedade compacta e conexa M^m . Suponhamos que as fibras de X estejam coerentemente orientadas. Se*

$$n \leq 2, \quad m \leq 2 \quad \text{e} \quad M \text{ é orientável}$$

então existe uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ sobre X com órbitas iguais às fibras. Mais ainda, se qualquer uma destas três hipóteses é suprimida a conclusão não necessariamente será verdadeira.

Do Teorema B conclui-se que se uma variedade X de dimensão 4 for um fibrado sobre uma variedade orientável M^2 com fibras T^2 então X tem posto maior ou igual a dois. Nota-se que se M for uma variedade orientável de dimensão 3 então $M \times S^1$ também tem posto maior ou igual a dois. Para se concluir a classificação do posto das variedades orientáveis de dimensão 4 ficam então abertas as seguintes questões:

1. Classificar as variedades de dimensão 4 de posto 2.
2. Apresentar uma classificação diferenciável para as de posto 3.

Observa-se que se estas duas questões são respondidas, o posto das variedades de dimensão 4 fica totalmente classificado. Isto porque a característica de Euler exibe uma classificação para as de posto 0 e as de posto 1 ficam determinadas então por exclusão.

Uma propriedade importante do Teorema B é a seguinte: como foi visto acima, fibrados de toros estavam sendo os espaços “modelos” para a classificação do posto das variedades de dimensão menor que 4. O Teorema B mostra que existem tais fibrados para os quais não existe ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$, se $\dim(X) > 4$. Logo, estes

espaços não podem ser considerados como modelos para a classificação do posto das variedades de dimensão maior ou igual a 4.

Nesta dissertação são apresentados os resultados de [23], fazendo-se primeiro uma exposição dos temas que o autor do artigo trata como pré-requisitos à sua leitura e depois as demonstrações dos teoremas com alguns detalhes a mais que os apresentados no original.

No capítulo 1 apresenta-se alguns preliminares algébricos principalmente concernentes aos grupos $SL(n, \mathbb{Z}) \subset SL(n, \mathbb{R})$ e $\widetilde{SL}(n, \mathbb{Z}) \subset \widetilde{SL}(n, \mathbb{R})$. Estes grupos tem papel fundamental nas demonstrações dos Teoremas A e B.

No capítulo 2 revisa-se a definição de superfícies de Riemann, apresenta-se o teorema de uniformização de superfícies de Riemann e classifica-se as estruturas complexas no toro. Este resultado é necessário porque ele permite definir uma estrutura afim para as fibras de um fibrado de toros.

No capítulo 3 revisa-se os conceitos básicos de espaços fibrados, define-se estruturas afins para as fibras de um fibrado de toros e apresentam-se condições suficientes para a existência destas estruturas.

Finalmente, os capítulos 4 e 5 dedicam-se às demonstrações dos Teoremas A e B, respectivamente.

Capítulo 1

Preliminares

1.1 O grupo $SL(n, \mathbb{R})$

Veremos nos capítulos seguintes que as demonstrações dos Teoremas A e B dependem do estudo do grupo $SL(n, \mathbb{Z})$ e do grupo $\widetilde{SL}(n, \mathbb{Z})$. Mas, para tratar destes grupos, precisamos destacar algumas propriedades dos seguintes grupos:

$$\begin{aligned}GL(n, \mathbb{R}) &= \{\text{matrizes } n \times n \text{ reais com } \det \neq 0\} \\GL(n, \mathbb{R})^+ &= \{\text{matrizes } n \times n \text{ reais com } \det > 0\} \\SL(n, \mathbb{R}) &= \{\text{matrizes } n \times n \text{ reais com } \det = 1\} \\SO(n) &= \{\text{matrizes } n \times n \text{ reais, ortogonais com } \det = 1\} \\SL(n, \mathbb{Z}) &= \{\text{matrizes } n \times n \text{ inteiras com } \det = 1\}\end{aligned}$$

Nesta seção utilizaremos os grupos fundamentais destes grupos para provar alguns resultados que serão importantes nas próximas seções.¹

Proposição 1.1 *Os grupos $SL(n, \mathbb{R})$ e $SO(n)$ tem o mesmo tipo de homotopia.*

Dem: Existe um homeomorfismo entre $GL(n, \mathbb{R})^+$ e $\mathbb{R}^+ \times SL(n, \mathbb{R})$. Este homeomorfismo é definido do seguinte modo: se uma matriz $A \in GL(n, \mathbb{R})^+$ possuir colunas $A_1, A_2, \dots, A_n$ então a imagem de A por este homeomorfismo é o par $(\det A, B)$ onde B a matriz com colunas $A_1, A_2, \dots, (A_n/\det A)$. Pela decomposição polar de um operador linear [12, página 286] sabe-se que toda matriz em $GL(n, \mathbb{R})^+$ pode ser escrita unicamente como um produto de uma matriz simétrica definida positiva por uma matriz em $SO(n)$. Portanto obtemos um homeomorfismo $GL(n, \mathbb{R})^+ \simeq \mathbb{R}^+ \times SO(n)$, onde

¹As noções básicas de grupo fundamental podem ser encontradas em [17]

P denota o conjunto das matrizes reais $n \times n$ simétricas definidas positivas. Como $\mathbb{R}^+$ e P são conjuntos convexos, logo contráteis, o resultado segue. ■

Logo, se I_n denota a matriz identidade $n \times n$, obtemos o isomorfismo:

$$\pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \simeq \pi_1(SO(n), I_n) \quad (1.1)$$

Observamos que, como estes espaços são conexos por caminhos, muitas vezes não mencionaremos os pontos bases destes grupos fundamentais, mas estes sempre serão entendidos como I_n .

Para o cálculo do grupo fundamental de $SO(n)$, deve-se proceder do seguinte modo: para $n = 2$ temos o homeomorfismo $SO(2) \simeq S^1$. Logo $\pi_1(SO(2)) \simeq \mathbb{Z}$, e um gerador para este grupo é o seguinte laço:

$$\alpha(t) = \begin{bmatrix} \cos 2\pi t & -\sin 2\pi t \\ \sin 2\pi t & \cos 2\pi t \end{bmatrix}$$

Para $n \geq 3$ devemos utilizar a estrutura de espaço fibrado destes grupos.

Seja $\pi : SO(n) \rightarrow S^{n-1}$, ($n \geq 2$) a aplicação que associa a cada matriz $T \in SO(n)$ o vetor unitário $\pi(T) = T(e_1) \in S^{n-1}$, igual à primeira coluna da matriz T .

Proposição 1.2 *A aplicação $\pi : SO(n) \rightarrow S^{n-1}$ define uma fibração de $SO(n)$ sobre S^{n-1} com fibra típica $SO(n-1)$.*

Proposição 1.3 *Seja $\pi : E \rightarrow B$ uma fibração. Se a fibra típica F é conexa por caminhos, se a base B é simplesmente conexa e se $\pi_2(B) = 0$ então o grupo fundamental de E é isomorfo ao grupo fundamental de F .*

As demonstrações destes resultados podem ser encontradas em [17, página 91 e página 97].

Na demonstração da proposição 1.3 prova-se o seguinte: se $x_0 \in E$, $y_0 = \pi(x_0)$, $F = \pi^{-1}(y_0)$ e $i : F \rightarrow E$ é a inclusão então o homomorfismo induzido $i_\# : \pi_1(F, x_0) \rightarrow \pi_1(E, x_0)$ é um isomorfismo.

Por indução finita sobre n prova-se que a fibração da proposição 1.2 satisfaz as hipóteses da proposição 1.3 se $n \geq 4$. Logo,

$$\pi_1(SO(3), I_3) \simeq \pi_1(SO(n), I_n) \quad \text{para todo } n \geq 3$$

Agora simplesmente precisamos calcular $\pi_1(SO(3), I_3)$. Isto é feito utilizando-se a estrutura dos números quatérnios como é ilustrado abaixo.

Considere $\mathbb{R}^4$ como sendo o conjunto dos quatérnios $w = t + xi + yj + zk$, $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}^4$ o conjunto dos quatérnios reais, $\mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}^4$ o conjunto dos quatérnios imaginários puros e $S^3 \subset \mathbb{R}^4$ o conjunto dos quatérnios de norma 1.

Proposição 1.4 *Existe um homomorfismo contínuo sobrejetivo $\eta : S^3 \rightarrow SO(3)$ cujo núcleo é $\{1, -1\}$. Mais ainda, η é uma aplicação de recobrimento.*

Tal homomorfismo η é definido do seguinte modo: para cada $u \in S^3$, $\eta(u) = \eta_u$ é a transformação linear $\eta_u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $\eta_u(w) = u \cdot w \cdot u^{-1}$ (multiplicação de quatérnios). Para mais detalhes sobre a aplicação η veja [17, proposição 14, página 86].

Como $\ker \eta = \{1, -1\}$ temos que $\eta(u) = \eta(u') \Leftrightarrow u = \pm u'$. Logo η define em S^3 a mesma relação de equivalência que é utilizada para se definir P^3 . Assim podemos passar η ao quociente para obter um homeomorfismo $\bar{\eta} : P^3 \rightarrow SO(3)$.

$$\begin{array}{ccc} S^3 & \xrightarrow{\eta} & SO(3) \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\eta} & \\ P^3 & & \end{array}$$

Daí segue que $\pi_1(SO(3)) \simeq \pi_1(P^3) \simeq \mathbb{Z}_2$.

Finalmente concluímos:

$$\pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \simeq \pi_1(SO(n), I_n) \simeq \mathbb{Z}_2 \text{ para todo } n \geq 3. \quad (1.2)$$

Utilizando o recobrimento 1.4 acima, podemos exibir um gerador para $\pi_1(SO(3))$ do seguinte modo. Seja $\tilde{a} : I \rightarrow S^3$ o caminho definido por $\tilde{a}(s) = \cos \pi s + \sin \pi s \cdot k$. Tal caminho é aberto em S^3 , $\tilde{a}(0) = 1$ e $\tilde{a}(1) = -1$. Logo $a = \eta \circ \tilde{a} : I \rightarrow SO(3)$ é um caminho fechado em $SO(3)$ não homotópico a uma constante, veja [17, corolário 2, página 149]. Como $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$, temos que $[a] [a] = 0 \Rightarrow [a]$ é um gerador para $\pi_1(SO(3))$. Finalmente, verifica-se que, matricialmente, o caminho a é dado por:

$$a(s) = \begin{bmatrix} \cos 2\pi s & -\sin 2\pi s & 0 \\ \sin 2\pi s & \cos 2\pi s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

Agora, utilizando a proposição 1.3 podemos encontrar um gerador para $\pi_1(SO(n))$ para $n \geq 3$. Ilustremos o caso $n = 4$.

Pela proposição 1.2 temos uma fibração $\pi : SO(4) \rightarrow S^3$ cuja fibra típica é $SO(3)$. Seja $x_0 = I_4 \in SO(4)$, $y_0 = \pi(x_0) = e_1$ e $F = \pi^{-1}(y_0) = \pi^{-1}(e_1)$. Pela construção da fibração π temos que F é da seguinte forma:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & SO(3) & & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

Como vimos acima, se $i : F \rightarrow SO(4)$ é a inclusão então $i_\# : \pi_1(F) \rightarrow \pi_1(SO(4))$ é um isomorfismo. Como F é canonicamente homeomorfo a $SO(3)$, utilizando o gerador 1.3 de $\pi_1(SO(3))$ encontramos um gerador para $\pi_1(F)$, e como $i_\#$ é um isomorfismo segue que o caminho abaixo é um gerador para $\pi_1(SO(4))$:

$$b(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\pi s & -\sin 2\pi s & 0 \\ 0 & \sin 2\pi s & \cos 2\pi s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De um modo geral, utilizando o mesmo raciocínio, provamos que o caminho

$$a(s) = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \begin{pmatrix} \cos 2\pi s & -\sin 2\pi s & 0 \\ \sin 2\pi s & \cos 2\pi s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \end{bmatrix}_{n \times n} \quad (1.4)$$

define um gerador para $\pi_1(SO(n)) \simeq \mathbb{Z}_2$, $n \geq 3$.

Concluimos aqui o estudo do grupo fundamental dos espaços $SL(n, \mathbb{R})$. Agora começaremos a estudar o recobrimento universal destes espaços.²

²As noções básicas de espaço de recobrimento podem ser encontradas em [17]

1.2 Os grupos $\widetilde{SL}(n, \mathbb{R})$ e $\widetilde{SL}(n, \mathbb{Z})$

Sabe-se que $SL(n, \mathbb{R})$ é conexo e é uma variedade diferenciável. Logo $SL(n, \mathbb{R})$ é conexo, localmente conexo por caminhos e semi-localmente simplesmente conexo. Logo, existe um recobrimento universal de $SL(n, \mathbb{R})$, veja [17, Corolário, página 173]. Denotaremos este recobrimento universal por:

$$p : \widetilde{SL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$$

Tal espaço de recobrimento é construído do seguinte modo: seja $a : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ um caminho em $SL(n, \mathbb{R})$ começando na identidade I_n . Denotaremos por $\langle a \rangle$ a classe dos caminhos em $SL(n, \mathbb{R})$ homotópicos a a com extremos fixos, isto é,

$$\langle a \rangle = \{ b : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R}) / b(0) = I_n, b(1) = a(1) \text{ e } a \cong b \}$$

Então:

$$\widetilde{SL}(n, \mathbb{R}) = \{ \langle a \rangle / a : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R}) \text{ com } a(0) = I_n \}$$

e $p : \widetilde{SL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ é dada por $p(\langle a \rangle) = a(1)$, para qualquer $a \in \langle a \rangle$.

Logo $\widetilde{SL}(n, \mathbb{R})$ é o conjunto dos caminhos em $SL(n, \mathbb{R})$, que começam em I_n e terminam em algum ponto de $SL(n, \mathbb{R})$, onde caminhos homotópicos devem ser identificados.

Como $SL(n, \mathbb{R})$ é um grupo topológico, podemos induzir em $\widetilde{SL}(n, \mathbb{R})$ uma estrutura de grupo que torna a aplicação de recobrimento p um homomorfismo. A existência de uma tal estrutura é garantida em [17, proposição 5, página 157]. Diretamente ela é definida do seguinte modo: denotemos por e_{I_n} o caminho constante em $SL(n, \mathbb{R})$ igual a I_n , e consideremos a classe de homotopia $\tilde{I}_n = \langle e_{I_n} \rangle$. Se $\langle a \rangle$ e $\langle b \rangle \in \widetilde{SL}(n, \mathbb{R})$, definimos:

$$\langle a \rangle \langle b \rangle = \langle ab \rangle \tag{1.5}$$

onde $a \cdot b : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ é o caminho definido por $(a \cdot b)(t) = a(t)b(t)$, que é a multiplicação de matrizes.

O elemento neutro deste grupo é a classe $\tilde{I}_n$ e se $\langle a \rangle \in \widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$ o inverso de $\langle a \rangle$ em $\widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$ é a classe $\langle a \rangle^{-1} = \langle a^{-1} \rangle$, onde $a^{-1} : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ é o caminho $a^{-1}(t) = a(t)^{-1}$, que é uma inversão de matriz.

Um espaço que aparece naturalmente nesta construção é o $\ker p = \pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n)$. De um modo geral, a descrição deste subgrupo pode ser encontrada em [17, corolário, página 158].

Se denotarmos por $\varphi : \pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \rightarrow \widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$ a inclusão, podemos escrever então a seguinte sequência exata.

$$1 \longrightarrow \pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \xrightarrow{\varphi} \widetilde{SL(n, \mathbb{R})} \xrightarrow{p} SL(n, \mathbb{R}) \longrightarrow 1$$

Como veremos nas próximas seções, não é bem o grupo $SL(n, \mathbb{R})$ que nos interessa, mas sim um subgrupo discreto dele. Estudaremos agora as relações entre o grupo $SL(n, \mathbb{Z})$ e o recobrimento que definimos acima.

Se se define $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} = p^{-1}(SL(n, \mathbb{Z}))$, verifica-se facilmente que $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ é um subgrupo de $\widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$ e que a restrição $p : \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} \rightarrow SL(n, \mathbb{Z})$ é um homomorfismo. Como φ é a inclusão do grupo fundamental de $SL(n, \mathbb{R})$, que é precisamente $\ker p$, ainda está bem-definida a sua restrição $\varphi : \pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \rightarrow \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$. Deste modo podemos formar a seguinte sequência exata:

$$1 \longrightarrow \pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \xrightarrow{\varphi} \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} \xrightarrow{p} SL(n, \mathbb{Z}) \longrightarrow 1$$

Utilizando 1.2 podemos escrever então as seguintes sequências exatas:

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} \xrightarrow{p} SL(2, \mathbb{Z}) \longrightarrow 1 \quad (1.6)$$

e para $n \geq 3$,

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\varphi} \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} \xrightarrow{p} SL(n, \mathbb{Z}) \longrightarrow 1 \quad (1.7)$$

Da descrição de $\widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$ podemos encontrar uma descrição para o grupo $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$. Como $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} = p^{-1}(SL(n, \mathbb{Z}))$, temos que $\langle a \rangle \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} \Leftrightarrow a(1) \in SL(n, \mathbb{Z})$.

Assim $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ é o conjunto dos caminhos em $SL(n, \mathbb{R})$, que começam em I_n e terminam em algum ponto em $SL(n, \mathbb{Z})$, onde caminhos homotópicos devem ser identificados.

Para terminar esta seção, responderemos uma pergunta importante feita para todos os espaços de recobrimentos: como se calcula o levantamento de um caminho relativamente a aplicação $p : \widetilde{SL(n, \mathbb{R})} \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$?

Para responder esta pergunta considere um caminho $a : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ com $a(0) = I_n$ e defina, para cada $t \in \mathbb{R}$, $a_t : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ por $a_t(s) = a(st)$. Então a_t é um caminho em $SL(n, \mathbb{R})$ de I_n até $a(t)$. Defina $\tilde{a} : I \rightarrow \widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$ por: $\tilde{a}(t) = \langle a_t \rangle$. Assim temos:

$$\tilde{a}(0) = \langle a_0 \rangle = \langle e_{I_n} \rangle = \tilde{I}_n$$

$$p \circ \tilde{a}(t) = p(\langle a_t \rangle) = a_t(1) = a(t)$$

Como o levantamento é único, conclui-se que $\tilde{a}$ é o levantamento de a relativamente a p começando em $\tilde{I}_n$.

1.3 Dois lemas principais

Os principais resultados que utilizaremos sobre os grupos discutidos neste capítulo são os dois lemas abaixo.

Lema 1.5 Para $n > 2$, seja $g \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ a imagem do elemento não nulo de $\mathbb{Z}_2$ por φ na sequência exata 1.7. Então g é um comutador³ de $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$.

Dem: Como φ é a inclusão de $\pi_1(SL(n, \mathbb{R}))$ em $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$, tem-se que g é um gerador de $\pi_1(SL(n, \mathbb{R}))$. Logo somente precisamos mostrar que existem elementos $a_1, a_2 \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ tal que seu comutador $[a_1, a_2] = a_1^{-1} a_2^{-1} a_1 a_2$ seja um caminho em $SL(n, \mathbb{R})$, fechado em I_n , e não homotópico a uma constante. Provemos isto em dois casos:

1º Caso: ($n = 3$) Pela proposição 1.4 temos um recobrimento universal homomórfico $\eta : (S^3, 1) \rightarrow (SO(3), I_3)$. Logo, um caminho em $SO(3)$ é homotópico a uma constante se, e somente se, algum (todos) dos seus levantamentos é fechado em S^3 , veja [17,

³Se G é um grupo, um **comutador** em G é um elemento da forma $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$, $a, b \in G$. O subgrupo de G gerado por todos os seus comutadores é denotado por G' . O quociente $\frac{G}{G'}$ é chamado de **abelianização** de G .

Corolário 2, página 149]. Deste modo, para provar que g é um comutador em $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ basta encontrar um comutador em $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ cujo levantamento por $\eta : S^3 \rightarrow SO(3)$ seja aberto.

Da definição da aplicação η , temos que se $u = t + xi + yj + zk \in S^3$ então $\eta_u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ satisfaz:

$$\begin{aligned}\eta_u(i) &= (t^2 + x^2 - y^2 - z^2)i + (2tz + 2xy)j + (2xz - 2ty)k \\ \eta_u(j) &= (2xy - 2tz)i + (t^2 - x^2 + y^2 - z^2)j + (2tx + 2yz)k \\ \eta_u(k) &= (2ty + 2xz)i + (2yz - 2tx)j + (t^2 - x^2 - y^2 + z^2)k\end{aligned}$$

Consideremos agora os seguintes caminhos em S^3 :

$$\begin{aligned}\tilde{a}_1(s) &= \cos \frac{\pi}{2}s + k \cdot \sin \frac{\pi}{2}s & \tilde{a}_2(s) &= \cos \frac{\pi}{2}s + i \cdot \sin \frac{\pi}{2}s \\ \tilde{a}_1^{-1}(s) &= \cos \frac{\pi}{2}s - k \cdot \sin \frac{\pi}{2}s & \tilde{a}_2^{-1}(s) &= \cos \frac{\pi}{2}s - i \cdot \sin \frac{\pi}{2}s\end{aligned}$$

Considere as projeções destes caminhos em $SO(3)$ por η . Matricialmente, em termos de bases canônicas, elas são dadas por:

$$a_1(s) = \eta \circ \tilde{a}_1(s) = \begin{bmatrix} \cos(\pi s) & -\sin(\pi s) & 0 \\ \sin(\pi s) & \cos(\pi s) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_1^{-1}(s) = \eta \circ \tilde{a}_1^{-1}(s) = \begin{bmatrix} \cos(\pi s) & \sin(\pi s) & 0 \\ -\sin(\pi s) & \cos(\pi s) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_2(s) = \eta \circ \tilde{a}_2(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\pi s) & -\sin(\pi s) \\ 0 & \sin(\pi s) & \cos(\pi s) \end{bmatrix}$$

$$a_2^{-1}(s) = \eta \circ \tilde{a}_2^{-1}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\pi s) & \sin(\pi s) \\ 0 & -\sin(\pi s) & \cos(\pi s) \end{bmatrix}$$

Assim as classes de homotopia dos caminhos a_1 e a_2 são elementos de $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$. Podemos calcular seu comutador escolhendo os representantes descritos acima. Este será a

classe do caminho em $SO(3)$ dado por: $c(s) = [a_1, a_2](s) = a_1(s)^{-1} a_2(s)^{-1} a_1(s) a_2(s)$. As colunas de $c(s)$ são os vetores:

$$\begin{aligned} C_1(s) &= \begin{pmatrix} \cos^2 \pi s + \sin^2 \pi s \cos \pi s \\ -\sin \pi s \cos \pi s + \sin \pi s \cos^2 \pi s \\ -\sin^2 \pi s \end{pmatrix} \\ C_2(s) &= \begin{pmatrix} -\sin \pi s \cos^2 \pi s + \sin \pi s \cos^3 \pi s + \sin^3 \pi s \\ 2\sin^2 \pi s \cos \pi s + \cos^4 \pi s \\ -\sin \pi s \cos^2 \pi s + \sin \pi s \cos \pi s \end{pmatrix} \\ C_3(s) &= \begin{pmatrix} 2\sin^2 \pi s \cos \pi s - \sin^2 \pi s \cos^2 \pi s \\ -\sin^3 \pi s - \sin \pi s \cos^3 \pi s + \sin \pi s \cos^2 \pi s \\ \sin^2 \pi s \cos \pi s + \cos^2 \pi s \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.8)$$

Claramente este é um caminho fechado em I_3 . Afirmamos que ele não é homotópico a uma constante em $SO(3)$. Isto porque seu levantamento em S^3 é um caminho aberto de 1 até -1 . De fato, como η é um homomorfismo, seu levantamento é dado por: $\tilde{c}(s) = \tilde{a}_1^{-1}(s) \tilde{a}_2^{-1}(s) \tilde{a}_1(s) \tilde{a}_2(s)$. Verifica-se facilmente que $\tilde{c}(0) = 1$ e $\tilde{c}(1) = -1$.

Isto demonstra que a classe de homotopia não nula de $\pi_1(SL(3, \mathbb{R}))$ pode ser expressa como um comutador de $\widetilde{SL(3, \mathbb{Z})}$, o que é suficiente para demonstrar o lema para o caso $n = 3$.

2º Caso: ($n > 3$) Decorre imediatamente por indução finita sobre n , observando-se a estrutura de espaço fibrado destes grupos exibida na proposição 1.2. ■

Observação 1.6 A demonstração acima independe da escolha dos caminhos feitos. Com isto queremos dizer o seguinte: se $\tilde{a}_1, \tilde{a}_2 : I \rightarrow S^3$ são caminhos quaisquer em S^3 que começam em 1, terminam, por exemplo, em $\tilde{a}_1(1) = k$ e $\tilde{a}_2(1) = i$ e se $a_1 = \eta \circ \tilde{a}_1$ e $a_2 = \eta \circ \tilde{a}_2$ então o comutador $[a_1, a_2](t) = a_1(t)^{-1} a_2(t)^{-1} a_1(t) a_2(t)$ é não homotópico a zero em $SO(3)$. De fato, seu levantamento em S^3 é um caminho aberto, começando em 1 e terminando em $(-k)(-i)ki = j^2 = -1$. (Observe que podemos trocar k e i por outros geradores de $\mathbb{R}^4$ nesta observação).

Reciprocamente, se $a_1, a_2 : I \rightarrow SO(3)$ são caminhos começando em I_3 e terminando, por exemplo, em $a_1(1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $a_2(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ então o

comutador $[a_1, a_2]$ é não homotópico a zero em $SO(3)$. De fato, como $\eta(k) = \eta(-k) = a_1(1)$ e $\eta(i) = \eta(-i) = a_2(1)$, seu levantamento em S^3 começando em 1 termina em $[\pm k, \pm i] = -1$.

Pela estrutura de espaço fibrado de $SO(n)$, esta observação se generaliza naturalmente para dimensões maiores.

Lema 1.7 *Se $g \in \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ é um produto de comutadores de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ e g é transformado na identidade de $SL(2, \mathbb{Z})$ via a projeção p , então g é o elemento identidade de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$.*

Dem: Sabe-se que $SL(2, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}_4 *_{\mathbb{Z}_2} \mathbb{Z}_6$, onde do lado direito desta igualdade temos o produto amalgamado⁴. Uma demonstração elegante para este fato pode ser dada utilizando-se a teoria dos grafos. Esta demonstração pode ser encontrada em [25, página 35]. Uma demonstração mais clássica deste resultado, pode ser encontrada em [18, seção III.1]. Mais ainda, podemos exhibir geradores para estes grupos: $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_6$ e $\mathbb{Z}_2$ são respectivamente gerados pelas matrizes:

$$a = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Logo, em termos de geradores e relações, podemos escrever:

$$\mathbb{Z}_4 = \langle a \mid a^4 = e \rangle \quad \mathbb{Z}_6 = \langle b \mid b^6 = e \rangle$$

e assim: $SL(2, \mathbb{Z}) = \langle a, b \mid a^4 = e, b^6 = e, a^2 = b^3 \rangle$, a qual pode ser simplificada para a seguinte apresentação:

$$SL(2, \mathbb{Z}) = \langle a, b \mid a^2 = b^3, b^6 = e \rangle$$

O nosso objetivo agora é encontrar uma apresentação para $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} = p^{-1}(SL(2, \mathbb{Z}))$. Seja $\alpha(t) = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2}t & -\sin \frac{\pi}{2}t \\ \sin \frac{\pi}{2}t & \cos \frac{\pi}{2}t \end{bmatrix}$ um caminho em $SL(2, \mathbb{R})$ da identidade I_2 até a matriz a . Portanto α representa um elemento de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ sobre o ponto a .

⁴Uma boa abordagem do produto amalgamado pode ser encontrada em [22].

Facilmente verifica-se que $\alpha^2(t) = \begin{bmatrix} \cos \pi t & -\operatorname{sen} \pi t \\ \operatorname{sen} \pi t & \cos \pi t \end{bmatrix}$, que é a rotação de π e que $\alpha^4(t) = \begin{bmatrix} \cos 2\pi t & -\operatorname{sen} 2\pi t \\ \operatorname{sen} 2\pi t & \cos 2\pi t \end{bmatrix}$ é um gerador de $\pi_1(SL(2, \mathbb{R}))$. Portanto α^4 não representa o elemento neutro de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$.

Afirmamos que para qualquer outro caminho $\beta : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$ com $\beta(0) = I_2$ e $\beta(1) = b$, os elementos de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ representados por α e β , que serão denotados também por α e β , geram $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. Isto segue do fato de $\pi_1(SL(2, \mathbb{R}))$ agir transitivamente sobre as fibras do recobrimento $p : SL(2, \mathbb{R}) \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$ e do fato de α^4 gerar $\pi_1(SL(2, \mathbb{R}))$.

Precisamos de um caminho $\beta : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$, $\beta(0) = I_2$, $\beta(1) = b$ para demonstrar que $\alpha^2 = \beta^3$. Provemos este fato de duas maneiras diferentes.

1º modo: A matriz b é a matriz de uma rotação de $\frac{\pi}{3}$ quando, em $\mathbb{R}^2$, é considerada uma base diferente da canônica. Basta considerarmos em $\mathbb{R}^2$ a base $\mathcal{B} = \{ e_1 = (1, 0), e_2 = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) \}$. O caminho β então pode ser definido como um caminho de rotações, da identidade até a rotação de $\frac{\pi}{3}$. Portanto β^3 é a rotação de π , que é igual à α^2 , como afirmado acima.

2º modo: Considerando em $\mathbb{R}^2$ a base canônica, poderíamos pensar em $\beta(t)$ como sendo o caminho:

$$\begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2}t & -t \\ \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}t & 1 \end{bmatrix}$$

que tem um apelo geométrico muito grande para ser definido assim. Mas, este caminho tem determinante $\Delta(t) = \cos \frac{\pi}{2}t + t \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}t$ diferente de um e nunca nulo. Logo, definimos o caminho $\beta(t)$ como:

$$\beta(t) = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2}t & \frac{-t}{\Delta(t)} \\ \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}t & \frac{1}{\Delta(t)} \end{bmatrix}$$

Vejamos que $\alpha^2 = \beta^3$. Para isto, entenderemos os caminhos $\alpha^2(t)$ e $\beta^3(t)$ como caminhos de referenciais em $\mathbb{R}^2$, olhando para as colunas destas matrizes como vetores de uma base em $\mathbb{R}^2$. Desta maneira temos:

$$\alpha^2(t) = [\alpha_1(t), \alpha_2(t)] \quad \beta^3(t) = [\beta_1(t), \beta_2(t)]$$

$$\alpha_1(t) = \begin{pmatrix} \cos \pi t \\ \sin \pi t \end{pmatrix} \quad \beta_1(t) = \begin{pmatrix} \cos^3 \frac{\pi}{2} t - \frac{2t \cos \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta(t)} - \frac{t \sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta^2(t)} \\ \cos^2 \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi}{2} t - \frac{t \sin^2 \frac{\pi}{2} t}{\Delta(t)} + \frac{\cos \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta(t)} + \frac{\sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta^2(t)} \end{pmatrix}$$

$$\alpha_2(t) = \begin{pmatrix} -\sin \pi t \\ \cos \pi t \end{pmatrix} \quad \beta_2(t) = \begin{pmatrix} \frac{-t \cos^2 \frac{\pi}{2} t}{\Delta(t)} - \frac{t \cos \frac{\pi}{2} t}{\Delta^2(t)} + \frac{t^2 \sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta^2(t)} - \frac{t}{\Delta^3(t)} \\ \frac{-t \cos \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta(t)} - \frac{2t \sin \frac{\pi}{2} t}{\Delta^2(t)} + \frac{1}{\Delta^3(t)} \end{pmatrix}$$

Agora observe o traço das curvas planas $\alpha_1(t)$, $\beta_1(t)$ e $\alpha_2(t)$, $\beta_2(t)$ impressas aos pares na figura abaixo:

Visualmente verificamos que $\alpha_1(t), \beta_1(t)$ são homotópicas e que $\alpha_2(t), \beta_2(t)$ também são homotópicas. Mais ainda, os gráficos acima nos indicam que uma homotopia entre $\alpha^2(t)$ e $\beta^3(t)$ pode ser definida por:

$$H(s, t) = \frac{\alpha^2(t) - s(\alpha^2(t) - \beta^3(t))}{\det(\alpha^2(t) - s(\alpha^2(t) - \beta^3(t)))}$$

Portanto, provamos que as classes α^2 e β^3 são iguais em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$, e como vimos acima, elas são iguais à rotação de π . Logo, β^6 é a rotação de 2π , o qual é um gerador de $\pi_1(SL(2, \mathbb{R}))$.

Queremos mostrar que $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} = \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2 = \beta^3 \rangle$. Observe primeiramente que $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ herda todas as relações de $SL(2, \mathbb{Z})$ via o homomorfismo p . Assim, em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ não podem aparecer mais relações que aquelas já existentes em $SL(2, \mathbb{Z})$. Com isto queremos dizer o seguinte: se

$$G_1 = \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2 = \beta^3 \rangle$$

$$G_2 = SL(2, \mathbb{Z}) = \langle a, b \mid a^2 = b^3, b^6 = e \rangle$$

e H é o subgrupo de G_1 gerado por β^6 então $G_2 = \frac{G_1}{H}$ e $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} = \frac{G_1}{H_1}$ onde H_1 é um subgrupo de H , uma vez que já verificamos que a relação $a^2 = b^3$ é preservada em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. Finalmente, para se verificar a apresentação de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ precisamos mostrar que β^{6n} não é a identidade de $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ para todo $n > 0$. Como β^6 é a rotação de 2π , temos que β^{6n} é a classe de homotopia do caminho que gira n voltas no sentido anti-horário, o que implica que eles são diferentes da identidade em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$.

Portanto provamos que $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} = \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2 = \beta^3 \rangle$.

Com estas apresentações podemos obter as abelianizações dos grupos $SL(2, \mathbb{Z})$ e $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. Seja $SL(2, \mathbb{Z})'$ o subgrupo de $SL(2, \mathbb{Z})$ gerado por todos os comutadores de $SL(2, \mathbb{Z})$. A abelianização de $SL(2, \mathbb{Z})$ é, por definição, o quociente $\frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'}$. Em termos de geradores e relações elas são dadas por:

$$\frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'} = \langle a, b \mid a^2 = b^3, b^6 = e, a^{-1}b^{-1}ab = e \rangle$$

$$\frac{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}}{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}'} = \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2 = \beta^3, \alpha^{-1}\beta^{-1}\alpha\beta = e \rangle$$

Aplicando transformações de Tietze [13, página 46] nestas apresentações verificamos que:

$$\frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'} = \langle ab^{-1} \mid (ab^{-1})^{12} = e \rangle$$

$$\frac{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}}{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}'} = \langle \alpha\beta^{-1} \mid \rangle$$

Portanto,

$$\frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'} \simeq \mathbb{Z}_{12} \quad \text{e} \quad \frac{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}}{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}'} \simeq \mathbb{Z}.$$

Também temos que a projeção $p : \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} \rightarrow SL(2, \mathbb{Z})$ pode ser passada naturalmente ao quociente:

$$\bar{p} : \frac{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}}{SL(2, \mathbb{Z})'} \longrightarrow \frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'}$$

$$\bar{p}(\gamma \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}') = p(\gamma)SL(2, \mathbb{Z})' = \gamma(1)SL(2, \mathbb{Z})'$$

ou, em termos das apresentações acima:

$$\bar{p}((\alpha\beta^{-1})^n) = (ab^{-1})^n$$

Isto significa que $\bar{p} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ é a projeção natural de $\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Z}_{12}$.

Assim, podemos construir o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\varphi} & \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})} & \xrightarrow{p} & SL(2, \mathbb{Z}) \\ & \searrow \psi & \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ & & \frac{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}}{SL(2, \mathbb{Z})'} & \xrightarrow{\bar{p}} & \frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'} \end{array}$$

A composição $\psi = \pi \circ \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é a natural multiplicação por 12. De fato, seja $\gamma(t) = \begin{bmatrix} \cos 2\pi t & -\sin 2\pi t \\ \sin 2\pi t & \cos 2\pi t \end{bmatrix}$ o gerador de $\mathbb{Z} = \pi_1(SL(2, \mathbb{R}))$. Pelo diagrama comutativo acima vemos que:

$$\bar{p} \circ \pi(\varphi(\gamma)) = \pi \circ p(\varphi(\gamma)) = \pi(I_2) = 0 \in \frac{SL(2, \mathbb{Z})}{SL(2, \mathbb{Z})'}$$

Portanto, $\pi(\varphi(\gamma)) = \psi(\gamma)$ é um múltiplo de 12. Como γ é o gerador de $\mathbb{Z} = \pi_1(SL(2, \mathbb{R}))$ segue que ψ é uma multiplicação por 12. Logo, ψ é uma aplicação injetiva.

Finalmente, seja $g \in \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ um produto de comutadores de $SL(2, \mathbb{Z})$ tal que $p(g) = I_2 \in SL(2, \mathbb{Z})$. Esta última condição nos diz que g é uma classe de homotopia de caminhos fechados em I_2 . Logo $g \in \pi_1(SL(2, \mathbb{R})) = \mathbb{Z}$. Como g é um produto de

comutadores segue que $\psi(g) = \pi \circ \varphi(g) = \pi(g)$ é a identidade de $\frac{\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}}{SL(2, \mathbb{Z})} = \mathbb{Z}$. Como ψ é injetora segue finalmente que g é o elemento identidade do grupo $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. ■

Para terminar este capítulo, vamos comparar a demonstração deste último lema com a construção feita para $SL(n, \mathbb{Z})$, $n > 2$.

Afirmamos que $\frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})'} \simeq \mathbb{Z}_2$, $n > 2$.

Dem: Sabe-se (e pode ser encontrado em [22, página 159, teorema 8.12]) que $SL(n, \mathbb{R})$ é gerado por todas as matrizes $B_{ij}(\lambda)$ com $i \neq j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $\lambda \in \mathbb{R}^*$, onde $B_{ij}(\lambda)$ é igual à matriz identidade mas com λ na entrada i, j . Daí temos que $SL(n, \mathbb{Z})$ é gerado por todas as matrizes do tipo $B_{ij}(\lambda)$ com $\lambda \in \mathbb{Z}^*$. Finalmente verifica-se que $SL(n, \mathbb{Z})$ é gerado por todas as matrizes $B_{ij}(1)$ e $B_{ij}(-1)$.

Sabe-se também que, se $n > 2$, todas as matrizes $B_{ij}(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}^*$ são conjugadas uma às outras em $SL(n, \mathbb{R})$, veja [22, página 168, teorema 8.23]. Mas este resultado não é verdadeiro para $n = 2$. Deste resultado concluímos que todas as matrizes $B_{ij}(\pm 1)$ são conjugadas em $SL(n, \mathbb{Z})$. Isto significa que todas as matrizes $B_{ij}(\pm 1)$ determinam a mesma classe de equivalência em $\frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})'}$.

Agora, se $A \in SL(n, \mathbb{Z})$ não é a identidade, então existem $t_1, t_2, \dots, t_m$ do tipo $B_{ij}(\pm 1)$, não necessariamente distintas, tais que $A = t_1 t_2 \cdots t_m$. Portanto:

$$\begin{aligned} A SL(n, \mathbb{Z})' &= (t_1 t_2 \cdots t_m) SL(n, \mathbb{Z})' \\ &= (t_1 SL(n, \mathbb{Z})') (t_2 SL(n, \mathbb{Z})') \cdots (t_m SL(n, \mathbb{Z})') \\ &= (B_{12}(1) SL(n, \mathbb{Z})') \cdots (B_{12}(1) SL(n, \mathbb{Z})') \text{ } m \text{ vezes} \\ &= (B_{12}(1) SL(n, \mathbb{Z})')^m \end{aligned}$$

Portanto a classe de $B_{12}(1)$ gera $\frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})'}$. Finalmente observamos que:

$$B_{12}(1)^2 = B_{12}(1)B_{12}(1) = B_{12}(-1)^{-1}B_{12}(1)$$

Como todas as matrizes $B_{ij}(\pm 1)$ determinam a mesma classe de equivalência em $\frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})'}$ temos que $B_{12}(1)^2 \in SL(n, \mathbb{Z})'$.

Isto significa que $\frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})'} \simeq \mathbb{Z}_2$. ■

Também afirmamos que $\frac{\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}}{SL(n, \mathbb{Z})} \simeq \mathbb{Z}_2$, $n > 2$.

Dem: Como vimos acima as matrizes $B_{ij}(\pm 1)$ geram $SL(n, \mathbb{Z})$. Agora definimos os caminhos $\alpha_{ij}, \beta_{ij} : I \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ por:

$$\alpha_{ij}(t) = B_{ij}(t) \quad \beta_{ij}(t) = B_{ij}(-t)$$

Logo, as classes de homotopia destes caminhos, que serão denotadas com os mesmos nomes, são elementos de $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ sobre as matrizes $B_{ij}(1)$ e $B_{ij}(-1)$ respectivamente. Do mesmo modo que fizemos para $n = 2$ temos que estas classes α_{ij} e β_{ij} geram $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$.

Como todas as matrizes da forma $B_{ij}(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}^*$ são conjugadas em $SL(n, \mathbb{R})$, vemos que todos os caminhos α_{ij} e β_{ij} são conjugados em $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$. Logo, todos estes caminhos determinam a mesma classe de equivalência em $\frac{\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}}{SL(n, \mathbb{Z})}'$. É fácil ver que cada um destes elementos tem ordem 2 pois, $\alpha_{ij}^2 = \alpha_{ij}\alpha_{ij} = (\beta_{ij}^{-1})\alpha_{ij} \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}'$.

Isto mostra que $\frac{\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}}{SL(n, \mathbb{Z})}' \simeq \mathbb{Z}_2$ com um gerador sendo qualquer classe determinada por α_{ij} ou por β_{ij} . ■

Neste caso, também temos que a projeção $p : \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} \rightarrow SL(n, \mathbb{Z})$ passa naturalmente ao quociente:

$$\bar{p} : \frac{\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}}{SL(n, \mathbb{Z})}' \longrightarrow \frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})}'$$

$$\bar{p}(\gamma \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}') = p(\gamma)SL(n, \mathbb{Z})' = \gamma(1)SL(n, \mathbb{Z})'$$

Pela descrição acima, como estes dois grupos são $\mathbb{Z}_2$, $\bar{p} : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ é a aplicação identidade pois $\bar{p}$ leva gerador em gerador.

Também podemos construir o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z}_2 & \xrightarrow{\varphi} & \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} & \xrightarrow{p} & SL(n, \mathbb{Z}) \\ & \searrow \psi & \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ & & \frac{\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}}{SL(n, \mathbb{Z})}' & \xrightarrow{\bar{p}} & \frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})}' \end{array}$$

onde a composição $\psi = \pi \circ \varphi$ é o homomorfismo nulo. De fato, se $a(t)$ é um gerador de $\pi_1(SL(n, \mathbb{Z})) \simeq \mathbb{Z}_2$ como em 1.4, então a representa o elemento não nulo de $\mathbb{Z}_2$. Agora, da comutatividade do diagrama acima, concluímos que: $\varphi(a) \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})} \Rightarrow \bar{p} \circ \pi(\varphi(a)) = \pi \circ p(\varphi(a)) = \pi(I_n) = 0 \in \frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})}$. Como $\bar{p}$ é um isomorfismo temos que $\pi(\varphi(a)) = 0 = \psi(a) \in \frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})}$. Logo ψ é o homomorfismo nulo.

Finalmente, se $g \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$ é a imagem do elemento não nulo de $\mathbb{Z}_2$ por φ , como ψ é o homomorfismo nulo, segue que $\pi(g) = 0 \in \frac{SL(n, \mathbb{Z})}{SL(n, \mathbb{Z})}$. Portanto g é um produto de comutadores em $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$.

Deste modo, conseguimos demonstrar novamente o lema 1.5 utilizando o mesmo argumento da demonstração do lema 1.7.

Capítulo 2

Superfícies de Riemann

2.1 Definições e exemplos

Antes de definir superfície de Riemann, vamos formalizar uma definição geral da teoria das funções de uma variável complexa.

Definição 2.1 *Seja $U \subset \mathbb{C}$ um aberto e seja $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ uma aplicação de classe C^1 . Dizemos que f é **conforme** se f preserva ângulos e preserva a orientação do plano. Também dizemos que f é **anti-conforme** se f preserva ângulos mas f inverte a orientação do plano.*

Sabe-se que uma aplicação holomorfa injetora é sempre uma aplicação conforme.

Definição 2.2 *Seja S uma variedade de dimensão real dois. Uma **carta complexa** em S é um homeomorfismo $\varphi : U \rightarrow V$ de um conjunto aberto $U \subset S$ sobre um aberto $V \subset \mathbb{C}$.*

Definição 2.3 *Um **atlas complexo** em S é um sistema $\mathcal{A} = \{\varphi_i : U_i \rightarrow V_i, i \in I\}$ formado por cartas complexas em S tais que os abertos U_i formam uma cobertura de S e se $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ para algum i, j então a **mudança de cartas**:*

$$\varphi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$$

é uma aplicação analítica complexa.

Num atlas complexo todas as mudanças de cartas são biholomorfas, isto é, elas e suas inversas são analíticas complexas, pois $\varphi_{ij}^{-1} = \varphi_{ji}$. Mais ainda, todas as mudanças

de cartas são aplicações conformes do plano.

Dizemos que dois atlas complexos $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ em S são **analiticamente equivalentes** se sua união ainda for um atlas complexo em S .

Definição 2.4 Uma estrutura complexa para S é uma classe de equivalência de atlas complexos para S .

Deste modo, uma estrutura complexa para S pode ser dada através da escolha de um atlas complexo em S .

Definição 2.5 Uma superfície de Riemann é um par $(S, \mathcal{A})$ onde S é uma variedade conexa de dimensão real dois e $\mathcal{A}$ é uma estrutura complexa para S .

Usualmente denotaremos uma superfície de Riemann $(S, \mathcal{A})$ simplesmente por S . Pela observação acima, para se especificar um superfície de Riemann $(S, \mathcal{A})$ é suficiente escolher um atlas complexo para S pertencente a $\mathcal{A}$, o qual também será denotado por $\mathcal{A}$.

Observe que todas as superfícies de Riemann são variedades orientáveis pois o determinante da matriz Jacobiana de uma aplicação biholomorfa sempre é positivo.

Vejamos agora alguns exemplos de superfícies de Riemann.

Exemplo 2.6 O plano complexo $\mathbb{C}$.

Exemplo 2.7 Domínios: subconjuntos abertos e conexos de uma superfície de Riemann.

Exemplo 2.8 A esfera de Riemann $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Aqui, um atlas complexo pode ser dado através de duas projeções estereográficas.

Exemplo 2.9 (Toros) Suponhamos que $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ são vetores linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$. Defina:

$$\Gamma = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{n\omega_1 + m\omega_2, n, m \in \mathbb{Z}\}$$

O conjunto Γ é denominado **lattice** gerado por ω_1 e ω_2 .

Dizemos que dois números complexos z, z' são equivalentes mod Γ se $z - z' \in \Gamma$. Isto define uma relação de equivalência em $\mathbb{C}$, o conjunto das classes de equivalência será denotado por $\mathbb{C}/\Gamma$ e a projeção canônica por $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Gamma$. Em $\mathbb{C}/\Gamma$ colocamos a topologia quociente que torna π contínua e aberta e torna $\mathbb{C}/\Gamma$ um espaço de Hausdorff conexo. Também temos que $\mathbb{C}/\Gamma$ é compacto pois ele é a imagem, via a aplicação contínua π , do conjunto compacto $\{\lambda\omega_1 + \mu\omega_2 : \lambda, \mu \in [0, 1]\}$.

Uma estrutura complexa para $\mathbb{C}/\Gamma$ pode ser definida do seguinte modo: seja $V \subset \mathbb{C}$ um conjunto aberto que não contem pontos equivalentes por Γ . Deste modo, se $U = \pi(V) \subset \mathbb{C}/\Gamma$ então $\pi|_V : V \rightarrow U$ é um homeomorfismo. Definimos sua inversa $\varphi : U \rightarrow V$ como sendo uma carta complexa para $\mathbb{C}/\Gamma$.

Precisamos mostrar que $\mathcal{A} = \{(U, \varphi) : U \text{ definido como acima}\}$ define um atlas complexo para $\mathbb{C}/\Gamma$. Claramente a união de todos tais conjuntos U cobrem $\mathbb{C}/\Gamma$. Assim é suficiente mostrar que se (U_i, φ_i) e (U_j, φ_j) estão em $\mathcal{A}$, então a aplicação $\varphi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$ é analítica complexa. Se $z \in \varphi_j(U_i \cap U_j)$ então $\pi(\varphi_{ij}(z)) = \pi(\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}(z)) = \varphi_j^{-1}(z) = \pi(z)$. Assim $\varphi_{ij}(z)$ é equivalente a z mod Γ . Logo, para todo $z \in \varphi_j(U_i \cap U_j)$, $\varphi_{ij}(z) - z \in \Gamma$. Visto que Γ é discreto e que φ_{ij} é contínua segue que $\varphi_{ij}(z) - z$ é constante em cada componente conexa de $\varphi_j(U_i \cap U_j)$. Isto implica que φ_{ij} é analítica.

Observação 2.10 Seja $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ a esfera unitária. A aplicação que associa a cada ponto de $\mathbb{C}/\Gamma$ representado por $\lambda\omega_1 + \mu\omega_2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ o ponto

$$(e^{2\pi i \lambda}, e^{2\pi i \mu}) \in S^1 \times S^1$$

é um homeomorfismo de $\mathbb{C}/\Gamma$ sobre o toro canônico $S^1 \times S^1$.

Também observamos que, apesar destes toros $\mathbb{C}/\Gamma$ serem homeomorfos, eles não são isomorfos no sentido de superfícies de Riemann. Este fato será demonstrado nas próximas seções.

Definição 2.11 Sejam $(S_1, \mathcal{A}_1)$ e $(S_2, \mathcal{A}_2)$ duas superfícies de Riemann. Uma aplicação contínua $f : S_1 \rightarrow S_2$ é **analítica** em $p \in S_1$ se existirem cartas complexas $(U_1, \varphi_1) \in \mathcal{A}_1$ e $(U_2, \varphi_2) \in \mathcal{A}_2$ ao redor de p e $f(p)$ respectivamente, tais que a aplicação:

$$\varphi_2 \circ f \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(f^{-1}(f(U_1) \cap U_2)) \rightarrow \varphi_2(f(U_1) \cap U_2)$$

seja uma aplicação analítica complexa.

Mais ainda, dizemos que $f : S_1 \rightarrow S_2$ é **analítica** se ela for analítica em todos os pontos de S_1 . Uma **equivalência conforme** entre S_1 e S_2 é um homeomorfismo analítico $f : S_1 \rightarrow S_2$.

Definição 2.12 Dizemos que duas superfícies de Riemann são **conformalmente equivalentes** se existir uma equivalência conforme entre elas.

Localmente uma superfície de Riemann S não é nada mais que um conjunto aberto do plano complexo pois, todo ponto $p \in S$ está contido no domínio de uma carta complexa $\varphi : U \rightarrow V$ de S , que é uma equivalência conforme. Entretanto, este ponto p pode estar no domínio de muitas cartas de S e nenhuma destas pode ser distinguida das outras. Por esta razão, somente podemos carregar para uma superfície de Riemann aquelas noções de análise complexa do plano $\mathbb{C}$ às quais se mantêm invariantes por equivalências conformes, isto é, aquelas noções que não dependem da escolha de uma carta particular. Por exemplo, o seguinte teorema ilustra uma destas noções.

Teorema 2.13 (teorema da identidade) Suponhamos que X e Y sejam superfícies de Riemann e sejam $f_1, f_2 : X \rightarrow Y$ duas aplicações analíticas que coincidem num conjunto A tendo um ponto de acumulação $a \in X$. Então f_1 e f_2 são identicamente iguais em X .

A demonstração deste teorema pode ser encontrada em [11, página 6].

2.2 Coordenadas isotérmicas

Uma questão natural que aparece na teoria das superfícies de Riemann é saber como fazer uma variedade diferenciável orientável de dimensão real dois uma superfície de Riemann. Isto é feito com a introdução de coordenadas isotérmicas na variedade.

Daqui para frente chamaremos de uma **superfície** uma variedade diferenciável conexa de dimensão real dois.

Seja $(S, \tilde{g})$ uma superfície munida de uma métrica Riemanniana $\tilde{g}$. Seja $\varphi : U \subset S \rightarrow V \subset \mathbb{R}^2$ uma carta local de S . Como φ é um difeomorfismo C^∞ , a métrica $\tilde{g}$ induz uma métrica g em V . Dizemos que a carta (U, φ) é uma **carta isotérmica** de S se a métrica g for proporcional à métrica euclidiana. Isto é, se existir alguma função $\lambda : V \rightarrow \mathbb{R}^*$ tal que:

$$\forall p \in V, \forall w_1, w_2 \in T_p V, g_p(w_1, w_2) = \lambda^2(p) \langle w_1, w_2 \rangle$$

ou, se denotarmos por $ds_p^2 = g_p$ e por $|dz|^2 = dx^2 + dy^2$, teremos:

$$ds_p^2 = \lambda^2(p) |dz|^2$$

Deste modo, se (U_i, φ_i) e (U_j, φ_j) são duas cartas isotérmicas de S tais que $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ então a mudança de cartas $\varphi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$ é uma aplicação

conforme ou anti-conforme do plano $\mathbb{C}$, dependendo se φ_{ij} preservar ou reverter a orientação do plano.

O próximo lema então, é de fundamental importância para a construção de superfícies de Riemann.

Lema 2.14 *Seja (S, g) uma superfície de classe C^k , $k > 1$, munida de uma métrica de classe C^1 . Então, numa vizinhança de cada ponto de S , podemos definir uma carta isotérmica para S .*

“A prova da existência de um sistema de coordenadas isotérmicas para uma superfície regular é delicada...”, [6, página 227]. Por esta razão não apresentaremos a demonstração desta existência aqui. Para superfícies em $\mathbb{R}^3$ ela pode ser encontrada em [4, páginas 15-35] e para variedades em [8].

Com este lema e com a construção descrita acima podemos enunciar a seguinte proposição:

Proposição 2.15 *Seja (S, g) uma superfície orientável munida com uma métrica de classe C^1 . Então existe uma estrutura complexa em S que a torna uma superfície de Riemann.*

Dem: Pelo lema acima, numa vizinhança de cada ponto de S , podemos construir uma carta isotérmica. Como vimos acima, a mudança de cartas, entre duas tais cartas, é uma aplicação conforme ou anti-conforme. Da orientabilidade de S segue que estas mudanças de cartas podem ser escolhidas conformes. Logo construímos um atlas complexo para S . ■

2.3 Topologia das superfícies de recobrimento

Como veremos nas próximas seções, a relação entre a teoria abstrata de superfícies de Riemann e análise complexa do plano complexo é dada através de superfícies de recobrimento.¹

Definição 2.16 *Seja S uma superfície. Uma superfície de recobrimento de S é um par (W, f) onde W é uma superfície e $p : W \rightarrow S$ é uma aplicação de recobrimento no sentido de [17]. A aplicação p é chamada **projeção**.*

¹O material exposto nesta seção está inteiramente contido em [14, capítulo IV, seção 2]. Como o tratamento dado nesse livro é um pouco mais geral, adaptamos suas definições e seus resultados para o contexto que serão utilizados aqui.

De acordo com [17, proposição 12, página 138], segue que a projeção $p : W \rightarrow S$ é um homeomorfismo local com a propriedade de levantamento único de caminhos.

Com esta definição todas as definições e todos os resultados do livro [17] podem ser aproveitados para superfícies de recobrimento. Somente temos problemas com os teoremas de existência de recobrimentos. Por exemplo, podemos garantir que toda superfície S possui um espaço de recobrimento universal $p : W \rightarrow S$. Mas não podemos garantir que esta é uma superfície de recobrimento universal pois não sabemos se W é uma superfície. Em [14, capítulo IV, seção 2] os teoremas de existência de recobrimentos são demonstrados no caso de superfícies de recobrimento. Em particular destacamos os seguintes resultados:

Teorema 2.17 *Seja S uma superfície. Dado $x_0 \in S$ e dado um subgrupo $H \subset \pi_1(S, x_0)$, existem uma superfície de recobrimento $p : W \rightarrow S$ e um ponto $\tilde{x}_0 \in W$ tais que $p_*(\pi_1(W, \tilde{x}_0)) = H$.*

Corolário 2.18 *Toda superfície S admite uma superfície de recobrimento $p : W \rightarrow S$ onde W é simplesmente conexo. Um tal recobrimento é chamado **superfície de recobrimento universal**.*

Um outro tipo de resultado que deve ser adaptado para o caso de superfícies de recobrimento é aquele que trata da ação de um grupo propriamente descontínuo de homeomorfismos de uma superfície W . Relembre que se W é um espaço topológico e G é um grupo de homeomorfismos de W então dizemos que G é **propriamente descontínuo**², veja [17, página 123], se todo ponto $w \in W$ possuir uma vizinhança aberta U em W tal que $g(U) \cap U = \emptyset$ para todo $g \in G$ diferente da identidade. Daí, se G é propriamente descontínuo então nenhum homeomorfismo $g \in G \setminus \{id\}$ tem pontos fixos. Para exprimir esta propriedade diremos que o grupo G é **livre de pontos fixos**. Também chamaremos uma tal vizinhança U de uma **vizinhança conveniente de G** .

De um modo geral, se G é um grupo de homeomorfismos do espaço W , dizemos que dois pontos $w, w' \in W$ são **equivalentes por G** se existir $g \in G$ tal que $g(w) = w'$. Isto define uma relação de equivalência em W . Denotaremos o espaço quociente desta relação, munido com a topologia quociente por W/G . Ele é chamado **espaço orbital de G** . Denotaremos por $p : W \rightarrow W/G$ a projeção quociente.

Proposição 2.19 *Seja W um espaço topológico conexo e conexo por caminhos. Seja G um grupo de homeomorfismos de W propriamente descontínuo. Então:*

1. $p : W \rightarrow W/G$ é uma aplicação de recobrimento regular.
2. o grupo dos automorfismos do recobrimento $p : W \rightarrow W/G$ é precisamente o grupo G .

²Também dizemos que G age propriamente descontinuamente em W .

Dem: Veja [17, proposição 5, página 127], [17, exemplo 3, página 151] e [17, exemplo 9, página 160]. ■

Relembre que se $p : W \rightarrow S$ é um espaço de recobrimento, um homeomorfismo $g : W \rightarrow W$ é um **automorfismo de recobrimento** se $p \circ g = p$. Assim, um automorfismo de recobrimento leva cada fibra $p^{-1}(x)$ nela mesma. Denotaremos o conjunto dos automorfismos do recobrimento $p : W \rightarrow S$ por $G(W|S)$.

Proposição 2.20 *Sejam W e S espaços e $p : W \rightarrow S$ uma aplicação de recobrimento.*

1. *Um espaço de recobrimento $p : W \rightarrow S$ é regular se, e somente se, $G(W|S)$ age transitivamente nas fibras de p .*
2. *Todo ponto de W possui uma vizinhança aberta na qual não existem dois pontos equivalentes pelo grupo $G(W|S)$.*
3. *Se W é conexo então $G(W|S)$ é um grupo propriamente descontínuo e daqui é livre de pontos fixos.*
4. *Se $p : W \rightarrow S$ é um recobrimento universal, o grupo $G(W|S)$ é isomorfo ao grupo fundamental de S e age transitivamente nas fibras de p . Mais ainda, $W/G(W|S)$ é homeomorfo à S .*

Dem:

1. Veja [17, página 166].
2. Como p é um homeomorfismo local, todo ponto $w \in W$ possui uma vizinhança onde p é injetora. Logo, nesta vizinhança, não existem dois pontos de uma mesma fibra de p . Portanto, nesta vizinhança, não existem pontos equivalentes por G .
3. Dado $w \in W$, seja V uma vizinhança distinguida de $x = p(w)$ e seja U uma vizinhança de w tal que $p|_U : U \rightarrow V$ seja um homeomorfismo. Se o automorfismo $g : W \rightarrow W$ for diferente da identidade, então $g(w') \neq w'$ para todo $w' \in U$. Mais ainda, como w' e $g(w')$ pertencem à mesma fibra do recobrimento p e $p|_U$ é injetora, segue que $p(w') \notin U$, para todo $w' \in U$. Logo $g(U) \cap U = \emptyset$ para todo $g \in G(W|S)$ diferente da identidade.
4. Veja [17, corolário 2, página 168] e [17, proposição 11, página 171]. ■

Observe agora o seguinte teorema:

Teorema 2.21 [14, Teorema 2.2, página 138] *Seja S uma superfície e seja $p : W \rightarrow S$ uma superfície de recobrimento de S de tal modo que $G(W|S)$ age transitivamente nas fibras de p . Logo o quociente $W/G(W|S)$ é homeomorfo à S .*

Portanto, começando de uma superfície S , via uma superfície de recobrimento $p : W \rightarrow S$, obtemos um grupo $G = G(W|S)$ de homeomorfismos de W . O teorema acima nos diz que, em certas condições, podemos recuperar a superfície S de W e de G , no sentido que o quociente W/G é homeomorfo à S .

Por outro lado, poderíamos começar o raciocínio acima em um outro ponto. Poderíamos começar de uma superfície W e de um grupo G de homeomorfismos de W e perguntar se o quociente W/G é uma superfície. Relembre, que pela proposição 2.19, se o grupo G for propriamente descontínuo, então a projeção quociente canônica $p : W \rightarrow W/G$ é uma aplicação de recobrimento. Portanto poderíamos pensar que esta hipótese já é suficiente para garantir que W/G é uma superfície. De fato, esta hipótese não é suficiente para garantir este fato. Como ilustrado no exemplo abaixo, existem grupos propriamente descontínuos G cujo espaço quociente não é Hausdorff.

Exemplo 2.22 [17, exemplo 12, páginas 125-128] *Seja $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ e seja $G = \mathbb{Z}$ o grupo dos homeomorfismos lineares de $\mathbb{R}^2$ gerado por $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Logo $f(x, y) = (2x, \frac{1}{2}y)$. Este grupo é um grupo propriamente descontínuo de homeomorfismos de W cujo espaço quociente W/G não é um espaço de Hausdorff. Por exemplo, não é possível se separar a órbita de um ponto (x, y) e a órbita de um ponto $(x, 0)$.*

Portanto uma condição mais forte precisa ser imposta ao grupo G para que o quociente seja uma superfície. Uma tal condição é descrita na definição abaixo.

Definição 2.23 [14, página 140] *Seja W um espaço e seja G um grupo de homeomorfismos de W . Dizemos que G é **propriamente descontínuo(lehto)** se para quaisquer conjuntos compactos $A, B \subset W$, tivermos $g(A) \cap B \neq \emptyset$ apenas para uma quantidade finita de homeomorfismos $g \in G$.*

Diferentemente de um grupo propriamente descontínuo, um propriamente descontínuo(lehto) não necessariamente precisa ser livre de pontos fixos.

Observamos que, de um modo geral, a definição de um grupo ser propriamente descontínuo não é equivalente a definição dele ser propriamente descontínuo(lehto). O exemplo anterior ilustra um caso onde G é propriamente descontínuo mas G não é propriamente descontínuo(lehto). As duas proposições abaixo são colocadas, então, para exibir relações entre estes dois conceitos.

Proposição 2.24 [14, página 140] *Sejam W uma superfície e G um grupo de homeomorfismos de W . Se G é propriamente descontínuo(lehto) e livre de pontos fixos então G é propriamente descontínuo.*

Dem: Provemos que todo ponto $w \in W$ tem uma vizinhança na qual não existem pontos equivalentes por G .

Por absurdo, suponhamos que exista um aberto A de W contido num compacto $K \subset W$ e existam duas sequências de pontos distintos a_n e b_n em A tais que $\lim a_n = \lim b_n = w \in W$ e $b_n = g_n(a_n)$ para certas aplicações $g_n \in G$. Logo $g_n(K) \cap K \neq \emptyset$. Se existissem uma quantidade infinita de tais g_n então G não seria propriamente descontínuo(lehto). Se existisse apenas uma quantidade finita de tais g_n então um deles deveria aparecer uma quantidade infinita de vezes na sequência. Para este homeomorfismo w seria um ponto fixo. ■

Proposição 2.25 [14, Teorema 2.5, página 140] *Seja S uma superfície e seja $p : W \rightarrow S$ uma superfície de recobrimento de S . Se o grupo $G(W|S)$ dos automorfismos deste recobrimento agir transitivamente nas fibras de p então $G(W|S)$ é propriamente descontínuo(lehto).*

Dem: Observe primeiramente, pela proposição 2.20 item 3, que nestas condições $G(W|S)$ é propriamente descontínuo.

Dados dois conjuntos compactos $A, B \subset W$ provemos que $g(A) \cap B \neq \emptyset$ apenas para uma quantidade finita de homeomorfismos $g \in G(W|S)$.

Considere o conjunto $C = \{ (a, b) \in A \times B \mid p(a) = p(b) \} \subset A \times B$. Afirmamos que o complementar de C em $A \times B$ é aberto em $A \times B$. De fato, se $(x, y) \in A \times B$ e $p(x) \neq p(y)$, visto que S é um espaço de Hausdorff, existem abertos V_x e V_y de S , contendo respectivamente $p(x)$ e $p(y)$ tais que $V_x \cap V_y = \emptyset$. Como p é um homeomorfismo local, existem abertos U_x e U_y de W , contendo respectivamente x e y tais que $p : U_x \rightarrow V_x$ e $p : U_y \rightarrow V_y$ são homeomorfismos. Logo $(U_x \times U_y) \cap (A \times B)$ é um aberto de $A \times B$, contendo (x, y) e inteiramente contido no complementar de C em $A \times B$. Portanto C é um conjunto fechado em $A \times B$ e assim C é compacto.

Para cada $g \in G(W|S)$ considere o seguinte conjunto: $U_g = \{ (a, b) \in C \mid b = g(a) \}$. Cada conjunto U_g é aberto em C pois p é um homeomorfismo local. Os conjuntos U_g são disjuntos pois $G(W|S)$ é livre de pontos fixos. Mais ainda, como $G(W|S)$ age transitivamente nas fibras de p , temos que a união de todos os conjuntos U_g é igual à C . Pela compacidade de C , concluímos que apenas um número finito de abertos U_g são não vazios, pois eles são disjuntos. Portanto, para apenas uma quantidade finita

de $g \in G$, podemos ter $g(A) \cap B \neq \emptyset$. ■

Agora podemos enunciar um resultado que exhibe condições para um quociente W/G ser uma superfície.

Teorema 2.26 [14, Teorema 2.6, página 141] *Seja W uma superfície e seja G um grupo propriamente descontínuo(lehto) de homeomorfismos de W livre de pontos fixos. Se $p : W \rightarrow W/G$ é a projeção canônica então:*

1. W/G é uma superfície.
2. $p : W \rightarrow W/G$ é uma superfície de recobrimento regular.
3. o grupo dos automorfismos deste recobrimento é precisamente o grupo G . Mais ainda, este grupo age transitivamente sobre as fibras de p .

Dem:

1. Vamos provar que W/G é uma superfície onde ela está munida com a topologia quociente. Primeiramente vejamos que W/G é um espaço de Hausdorff.

Sejam $a, b \in W$ tais que $p(a)$ e $p(b)$ sejam pontos distintos de W/G . Visto que G é propriamente descontínuo(lehto), existe um compacto B de W tal que $b \in \text{int}(B)$ e tal que B não contém nenhum ponto da forma $g(a)$, para $g \in G$. Daí também podemos concluir a existência de um compacto A de W , $a \in \text{int}(A)$ tal que $A \cap g(B) = \emptyset$ para todo $g \in G$. Então $g_1(A) \cap g_2(B) = \emptyset$ para todo $g_1, g_2 \in G$. Isto mostra que $p(\text{int}(A))$ e $p(\text{int}(B))$ são dois abertos de W/G separando $p(a)$ e $p(b)$. Logo W/G é um espaço de Hausdorff.

Como W/G é a imagem de W via a aplicação contínua p , segue facilmente que W/G é conexo e tem base enumerável para sua topologia. Agora vamos exibir coordenadas locais para W/G . Fixemos $w \in W$ e seja U uma vizinhança conveniente de G contendo w . Deste modo temos que $p|_U : U \rightarrow p(U)$ é um homeomorfismo. Se restringirmos U podemos supor que U é o domínio de uma carta $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^2$ de W . Então $\psi = \varphi \circ (p|_U)^{-1} : p(U) \rightarrow V$ é um homeomorfismo do aberto $p(U)$ de W/G sobre o aberto V de $\mathbb{R}^2$. Verifica-se facilmente que o conjunto de tais aplicações define um atlas diferenciável para W/G . Logo W/G é uma superfície.

2. Segue do item 1. da proposição 2.19 e do item 1. deste teorema.
3. Segue do item 2. da proposição 2.19 e da proposição 2.20 item 1. ■

2.4 Uniformização de superfícies de Riemann

Os resultados das seções anteriores serão aplicados agora para o caso de superfícies de Riemann.

Teorema 2.27 *Seja S uma superfície de Riemann e seja $p : W \rightarrow S$ um superfície de recobrimento de S . Então existe uma única estrutura complexa em W que torna a projeção p uma aplicação analítica.*

Dem: Seja $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i) : i \in I\}$ um atlas complexo em S . Para cada $w \in W$, como p é um homeomorfismo local existe um aberto $A \subset W$, com $w \in A$, tal que $p : A \rightarrow U_i \subset S$ é um homeomorfismo onde U_i pode ser considerado o domínio de uma carta local $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i \subset \mathbb{C}$ de S . Sejam $\tilde{U}_i = A$ e $\tilde{\varphi}_i = \varphi_i \circ p : \tilde{U}_i \rightarrow V_i$. Os conjuntos $\tilde{U}_i$ formam uma cobertura aberta de W e a coleção $\tilde{\mathcal{A}} = \{(\tilde{U}_i, \tilde{\varphi}_i)\}$ forma um atlas complexo para W de tal forma que $p : W \rightarrow S$ é analítica.

Dizemos que esta estrutura complexa em W é obtida **por levantamento** da estrutura complexa de S .

Para provar a unicidade, suponhamos que W esteja munido com uma estrutura complexa $\mathcal{A}_1 = \{(A_j, \psi_j) : j \in J\}$ que torna a projeção analítica. Então devemos mostrar que $\tilde{\mathcal{A}} \cup \mathcal{A}_1$ ainda define um atlas complexo para S . Para isto, precisamos analisar as mudanças de cartas entre uma carta $(A_j, \psi_j) \in \mathcal{A}_1$ e uma carta $(U_i, \tilde{\varphi}_i) \in \tilde{\mathcal{A}}$, com $A_j \cap \tilde{U}_i \neq \emptyset$. Temos:

$$\tilde{\varphi}_i \circ \psi_j^{-1} = \varphi_i \circ p \circ \psi_j^{-1}$$

$$\psi_j \circ \tilde{\varphi}_i^{-1} = \psi_j \circ p^{-1} \circ \varphi_i^{-1}$$

que são expressões locais da aplicação analítica p . Logo, elas são analíticas, o que é suficiente para provar a unicidade da estrutura complexa de W que torna p analítica. ■

No que segue, numa superfície de recobrimento $p : W \rightarrow S$ de uma superfície de Riemann S , sempre entenderemos W como sendo uma superfície de Riemann com estrutura complexa levantada de S .

Corolário 2.28 *Seja S uma superfície de Riemann e seja $p : W \rightarrow S$ uma superfície de recobrimento de S . Então todos os automorfismos de recobrimento são equivalências conformes $g : W \rightarrow W$.*

Dem: Se $(\widetilde{U}_1, \widetilde{\varphi}_1)$ e $(\widetilde{U}_2, \widetilde{\varphi}_2)$ são duas cartas complexas de W como na definição 2.11, a expressão local de g é da forma:

$$\widetilde{\varphi}_2 \circ g \circ \widetilde{\varphi}_1^{-1} = (\varphi_2 \circ p) \circ g \circ (\varphi_1 \circ p)^{-1} = \varphi_2 \circ (p \circ g) \circ p^{-1} \circ \varphi_1^{-1} = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$$

que é uma aplicação analítica complexa pois é uma mudança de cartas da superfície S . ■

Teorema 2.29 *Sejam W uma superfície de Riemann, G um grupo propriamente descontinuo(lehto) de equivalências conformes de W e $p : W \rightarrow W/G$ a projeção canônica. Então a superfície W/G possui uma única estrutura complexa que se levanta para a estrutura complexa original de W .*

Dem: No teorema 2.26 vimos que um atlas diferenciável para W/G pode ser dado como $\{(U, \psi) : \psi = \varphi \circ (p|_U)^{-1}, \text{ onde } \varphi \text{ é carta complexa para } W\}$. É claro que tal atlas é um atlas complexo em W/G e que ele se levanta para o atlas original de W . A unicidade deste atlas também é imediata. ■

Sempre que estivermos no caso do teorema acima, diremos que a estrutura complexa de W/G é obtida através da **projeção** de W . Se W é uma superfície de Riemann, sempre entenderemos o quociente W/G como uma superfície de Riemann munida desta estrutura complexa.

Os teoremas das seções anteriores nos fornecem uma representação fundamental de uma superfície de Riemann, quando eles são combinados com o teorema de uniformização de Riemann

Teorema 2.30 (Riemann Mapping Theorem) *Toda superfície de Riemann simplesmente conexa é conformalmente equivalente a um, e somente um, dos seguintes domínios planos:*

(i) o disco unitário aberto $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

(ii) o plano complexo $\mathbb{C}$.

(iii) o plano estendido $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

onde estas superfícies estão munidas com suas estruturas complexas canônicas.

Observamos que a demonstração deste teorema é extremamente complexa, mas ela pode ser encontrada, por exemplo, em [1, capítulo 10] ou [10, páginas 179-188]. Também indicamos o seguinte artigo para uma leitura complementar sobre o Teorema de Uniformização e o grupo de Transformações de Möbius: [24].

Representação de uma superfície de Riemann

Seja S uma superfície de Riemann arbitrária e seja $p : \tilde{S} \rightarrow S$ sua superfície de recobrimento universal. Visto que $\tilde{S}$ é simplesmente conexo, pelo Teorema de Uniformização de Riemann, existe uma equivalência conforme $f : \tilde{S} \rightarrow W$ onde W é o disco unitário D , ou o plano $\mathbb{C}$ ou o plano estendido $\hat{\mathbb{C}}$. Então $p \circ f^{-1} : W \rightarrow S$ também é uma superfície de recobrimento universal de S . Daqui provamos o seguinte fato importante:

Teorema 2.31 *Toda superfície de Riemann admite como sua superfície de recobrimento universal o disco unitário D , ou o plano complexo $\mathbb{C}$ ou o plano estendido $\hat{\mathbb{C}}$.*

Deste teorema e do corolário 2.28 segue diretamente:

Corolário 2.32 *Seja S uma superfície de Riemann e seja $p : W \rightarrow S$ uma superfície de recobrimento universal onde $W = D$ ou $\mathbb{C}$ ou $\hat{\mathbb{C}}$. Então todos os automorfismos de recobrimento de p são transformações de Möbius.*

Isto segue porque estas são as equivalências conformes destes espaços. (veja por exemplo [3])

Finalmente obtemos a seguinte representação de uma superfície de Riemann.

Teorema 2.33 *Dada uma superfície de Riemann S seja $p : W \rightarrow S$ sua superfície de recobrimento universal onde $W = D$ ou $\mathbb{C}$ ou $\hat{\mathbb{C}}$. Se G é o grupo de automorfismos deste recobrimento então S é conformalmente equivalente à superfície de Riemann W/G .*

Dem: Das proposições 2.20 e 2.25 temos que G é um grupo de homeomorfismos de W propriamente descontínuo, propriamente descontínuo(lehto), livre de pontos fixos e agindo transitivamente nas fibras de p . Pelo teorema 2.29 temos que W/G é uma superfície de Riemann com estrutura complexa projetada. Pela proposição 2.20 temos um homeomorfismo de W/G sobre S . Mas este homeomorfismo também é uma equivalência conforme pois a estrutura complexa de W também é obtida pelo levantamento de S . De fato, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
 & W & \\
 \bar{p} \swarrow & & \searrow p \\
 W/G & \xrightarrow{h} & S
 \end{array}$$

onde $\bar{p} : W \rightarrow W/G$ é a projeção canônica e $h : W/G \rightarrow S$ é o homeomorfismo definido por $h([w]) = p(w)$, onde $[w]$ é a classe de equivalência que determina a órbita de w . ■

Teorema 2.34 *Seja S uma superfície de Riemann e seja $p : \tilde{S} \rightarrow S$ uma superfície de recobrimento universal de S . Então:*

$$\begin{aligned}\tilde{S} \simeq \hat{\mathbb{C}} &\Leftrightarrow S \simeq \hat{\mathbb{C}} \\ \tilde{S} \simeq \mathbb{C} &\Leftrightarrow S \simeq \mathbb{C}, S \simeq \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ ou } S \simeq T^2\end{aligned}$$

onde T^2 denota um toro e $\simeq$ significa equivalência conforme.

Dem: Suponhamos que $\tilde{S} \simeq \hat{\mathbb{C}}$. Pela classificação das superfícies, sabemos que S pode somente ser $\hat{\mathbb{C}}$ ou o plano projetivo P^2 . Como uma superfície de Riemann é orientável segue que $G(\tilde{S}|S)$ é o grupo trivial e assim:

$$S \simeq \frac{\hat{\mathbb{C}}}{\{id_{\hat{\mathbb{C}}}\}} \simeq \hat{\mathbb{C}}$$

Suponhamos agora que $\tilde{S} \simeq \mathbb{C}$. Como $G(\tilde{S}|S)$ é um subgrupo das aplicações de Möbius do plano $\mathbb{C}$, agindo propriamente descontinuamente em $\mathbb{C}$, todo elemento $g \in G(\tilde{S}|S)$ é da forma

$$g(z) = az + b, \quad a, b \in \mathbb{C}, \quad a \neq 0.$$

Como g não tem pontos fixos devemos ter $a = 1$. Logo todo elemento $g \in G(\tilde{S}|S)$ é da forma $g(z) = z + b$, $b \in \mathbb{C}$. Provamos então que $G(\tilde{S}|S)$ é um subgrupo das translações de $\mathbb{C}$. Identificaremos a translação $g(z) = z + b$ com o elemento $b \in \mathbb{C}$.

Se $G(\tilde{S}|S) = \{id_{\mathbb{C}}\}$ então $S \simeq \mathbb{C}$. Por outro lado, se $G(\tilde{S}|S) \neq \{id_{\mathbb{C}}\}$ definimos $u \in G(\tilde{S}|S)$ por:

$$u \in G(\tilde{S}|S), \quad |u| = \inf\{|b|, b \in G(\tilde{S}|S) \setminus \{id_{\mathbb{C}}\}\}$$

Temos que u existe porque $G(\tilde{S}|S)$ é propriamente descontínuo. Se $G(\tilde{S}|S) \setminus u\mathbb{Z} = \emptyset$ então $G(\tilde{S}|S) = u\mathbb{Z}$ e daqui,

$$S \simeq \frac{\mathbb{C}}{G(\tilde{S}|S)} \simeq \frac{\mathbb{C}}{u\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

via a aplicação conforme $z \mapsto e^{\frac{2\pi i}{u}z}$, a qual é invariante pelo grupo $u\mathbb{Z}$ e tem imagem $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Se $G(\tilde{S}|S) \setminus u\mathbb{Z} \neq \emptyset$, definimos:

$$v \in G(\tilde{S}|S), \quad |v| = \inf\{ |b|, b \in G(\tilde{S}|S) \setminus u\mathbb{Z} \}$$

O grupo das translações geradas por u e por v formam um subgrupo de $G(\tilde{S}|S)$. Pela própria construção vemos que u e v são linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$. Mais ainda, u e v geram $G(\tilde{S}|S)$ pois, caso contrário, encontraríamos elementos não nulos de $G(\tilde{S}|S)$ com norma menor que $|u|$, o que contraria a definição de u .

Daí deduzimos que $G(\tilde{S}|S) = \{z \mapsto z + nu + mv : n, m \in \mathbb{Z}\}$, e assim:

$$S \simeq \frac{\mathbb{C}}{u\mathbb{Z} \oplus v\mathbb{Z}} \simeq T^2$$

onde T^2 é topologicamente um toro. ■

Corolário 2.35 $\tilde{S} \simeq D$ se, e somente se, S não é conformalmente equivalente a $\mathbb{C}$, $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, T^2 , ou $\hat{\mathbb{C}}$.

2.5 Estruturas complexas no toro

A translação $T(z) = z + b - a$ é uma equivalência conforme entre $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ e $\mathbb{C} \setminus \{b\}$, quando estes estão com suas estruturas conformes canônicas. O teorema de uniformização garante que a esfera $\hat{\mathbb{C}}$ possui uma única estrutura complexa. Mas o que podemos dizer a respeito dos toros? Isto é, ainda estão abertas as seguintes questões:

Duas superfícies de Riemann homeomorfas a um toro são conformalmente equivalentes?

Podemos munir um toro com duas estruturas complexas distintas?

Para responder estas questões considere duas superfícies de Riemann M_1 e M_2 homeomorfas a um toro e sejam Γ_1 e Γ_2 os subgrupos das transformações de Möbius do plano tais que $M_i \simeq \mathbb{C}/\Gamma_i$. Da demonstração do teorema 2.34 segue que Γ_i é gerado por duas translações independentes.

Suponhamos que $M_1 \simeq M_2$ e que $f : M_1 \rightarrow M_2$ é uma equivalência conforme. Sabemos que f se levanta a uma aplicação $\tilde{f} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que faz o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathbb{C} \\
\pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\
\frac{\mathbb{C}}{\Gamma_1} & \xrightarrow{f} & \frac{\mathbb{C}}{\Gamma_2}
\end{array}$$

Como f é uma equivalência conforme temos que $\tilde{f}$ é uma equivalência conforme. Mais ainda, se $g_1 \in \Gamma_1$, então:

$$(\pi_2 \circ \tilde{f}) \circ g_1(z) = (f \circ \pi_1) \circ g_1(z) = f(\pi_1 \circ g_1(z)) = f(\pi_1(z)) = \pi_2(\tilde{f}(z))$$

Logo os pontos $\tilde{f}(z)$ e $\tilde{f} \circ g_1(z)$ são pontos de uma mesma fibra de π_2 . Portanto existe um único automorfismo de recobrimento $g_2 \in \Gamma_2$ tal que:

$$\forall z \in \mathbb{C}, \tilde{f}(g_1(z)) = g_2(\tilde{f}(z)).$$

Assim provamos:

$$\forall g_1 \in \Gamma_1, \text{ existe um único } g_2 \in \Gamma_2 \text{ tal que } g_1 = \tilde{f}^{-1} \circ g_2 \circ \tilde{f}$$

E do mesmo modo:

$$\forall g_2 \in \Gamma_2, \text{ existe um único } g_1 \in \Gamma_1 \text{ tal que } g_2 = \tilde{f} \circ g_1 \circ \tilde{f}^{-1}$$

o que demonstra que os grupos Γ_1 e Γ_2 são conjugados por $\tilde{f}$.

Portanto podemos concluir o seguinte: dois toros M_1 e M_2 são conformalmente equivalentes se, e somente se, existe uma equivalência conforme de $\mathbb{C}$ mandando Γ_1 sobre Γ_2 . Finalmente podemos demonstrar o importante resultado:

Teorema 2.36 *Seja $F \subset \mathbb{C}$ o seguinte conjunto:*

$$F = \left\{ w \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(w) > 0, |w| \geq 1, \operatorname{Re}(w) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \text{ se } |w| = 1 \Rightarrow \operatorname{Re}(w) \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \right\}$$

Seja $\Gamma(u, v)$ um lattice de $\mathbb{R}^2$ gerado pelos vetores u, v linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$. Então existe um, e somente um, $w \in F$ tal que os toros com grupos $\Gamma(1, w)$ e $\Gamma(u, v)$ são conformalmente equivalentes.

Dem: Seja $\Gamma(u, v)$ um lattice de $\mathbb{R}^2$ gerado pelos vetores u e v , linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$. Identificaremos dois tais lattices Γ_1 e Γ_2 se existir uma equivalência conforme de $\mathbb{C}$ mandando Γ_1 sobre Γ_2 . Neste caso, denotaremos $\Gamma_1 \simeq \Gamma_2$.

Pela demonstração do teorema 2.34, vemos que, mudando um pouco os sistemas de geradores de $\Gamma(u, v)$,

$$|u| = \inf\{ |a|, a \in \Gamma(u, v) \setminus \{0\} \}$$

$$|v| = \inf\{ |a|, a \in \Gamma(u, v) \setminus u\mathbb{Z} \}$$

Pela transformação conforme $z \mapsto \frac{z}{u}$ de $\mathbb{C}$, vemos que:

$$\Gamma(u, v) \simeq \Gamma(1, \frac{v}{u}) = \Gamma(1, w)$$

onde $w = \frac{v}{u}$. Mais ainda, é claro que $\Gamma(1, w) = \Gamma(1, -w)$, e daqui podemos supor sempre que $\text{Im}(w) > 0$.

Por construção, vemos que $|w| = \inf\{ |a|, a \in \Gamma(1, w) \setminus \mathbb{Z} \}$, e assim $\text{Re}(w) \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $|w| \geq 1$.

Vejamos que podemos supor $\text{Re}(w) \neq -\frac{1}{2}$. De fato, se $\text{Re}(w) = -\frac{1}{2}$ então $\text{Re}(w + 1) = \frac{1}{2}$ e $|w| = |w + 1|$. Portanto $\Gamma(1, w) = \Gamma(1, w + 1)$ e assim podemos supor que $\text{Re}(w) \neq -\frac{1}{2}$.

Agora suponhamos que $|w| = 1$ e que $\operatorname{Re}(w) \in (-\frac{1}{2}, 0]$. A transformação conforme $g(z) = \frac{z}{w}$ satisfaz: $g(1) = \frac{1}{w}$ e $g(w) = 1$. Logo:

$$\Gamma(1, w) \simeq \Gamma\left(\frac{1}{w}, 1\right) = \Gamma\left(1, -\frac{1}{w}\right) = \Gamma(1, -\bar{w})$$

onde temos $|\bar{w}| = 1$ e $\operatorname{Re}(-\bar{w}) \in [0, \frac{1}{2}]$.

Juntando todos os casos acima concluímos que

$$\Gamma(u, v) \simeq \Gamma(1, w) \text{ para algum } w \in F.$$

Para concluir a demonstração do teorema falta somente mostrar que se w, w' são dois vetores distintos de F então $\Gamma(1, w)$ e $\Gamma(1, w')$ não são conformalmente equivalentes. Então suponhamos que $w, w' \in F$ e que $\Gamma(1, w)$ e $\Gamma(1, w')$ são conformalmente equivalentes. Logo existe uma equivalência conforme $f(z) = az + b$ enviando $\Gamma(1, w)$ sobre $\Gamma(1, w')$. Como $f(0) = b$ está em $\Gamma(1, w')$, utilizando a translação por $-b$, a qual mantém $\Gamma(1, w')$ fixo, podemos supor que a imagem de 0 por f é nula, isto é,

$$b = f(0) = 0 \Rightarrow f(z) = az$$

Mais ainda, temos que $|a| = 1$, pois:

$$\begin{aligned} 1 &= \inf\{ |u'|, u' \in \Gamma(1, w') \setminus \{0\} \} \\ &= \inf\{ |au|, u \in \Gamma(1, w) \setminus \{0\} \} \\ &= |a| \inf\{ |u|, u \in \Gamma(1, w) \setminus \{0\} \} = |a| \end{aligned}$$

Se considerarmos a aplicação conforme $T(z) = -z$ podemos supor que $\operatorname{Re}(a) \geq 0$.

Também temos, como $f(0) = 0$ e como f manda $\Gamma(1, w)$ sobre $\Gamma(1, w')$ preservando a orientação, os únicos casos abaixo:

- (1) $f(1) = 1$ e $f(w) = w'$
- (2) $f(1) = w'$ e $f(w) = -1$
- (3) $f(1) = \bar{w}'$ e $f(w) = 1$.

Do caso (1) concluímos que $a = f(1) = 1$ e assim $w = w'$.

Do caso (2), $a = w'$, $aw = -1 \Rightarrow ww' = -1 \Rightarrow w' = -\bar{w}$. Daí $\operatorname{Re}(w') = -\operatorname{Re}(w)$, que, em F , tem como única solução $w = w' = i$.

Do caso (3), $a = \bar{w}'$, $aw = 1 \Rightarrow w\bar{w}' = 1 \Rightarrow w = w'$.

Como nos três casos acima concluímos que $w = w'$, acabamos a demonstração. ■

Corolário 2.37 (1) *Se M é um toro conforme então existe um, e somente um, $w \in F$ tal que M é conformalmente equivalente à $\frac{\mathbb{C}}{\Gamma(1,w)}$.*

(2) *Se w_1, w_2 são dois vetores distintos em F então os toros $\frac{\mathbb{C}}{\Gamma(1,w_1)}$ e $\frac{\mathbb{C}}{\Gamma(1,w_2)}$ são conformalmente distintos.*

Este corolário segue diretamente do teorema anterior e ele classifica todas as estruturas complexas nos toros.

Capítulo 3

Estruturas Afins

Neste capítulo definimos estruturas afins num fibrado de toros e apresentamos condições suficientes para a existência destas estruturas.

3.1 Espaços fibrados

Com a finalidade de estabelecer notações que serão utilizadas no decorrer deste trabalho, nesta seção revisaremos os conceitos básicos de espaços fibrados. Alguns resultados básicos também são enunciados. Estas definições e resultados podem ser encontrados em [26].

Definição 3.1 *Um espaço fibrado (X, π, M, T, G) consiste em um espaço topológico X , espaço total, um espaço topológico M , chamado base, um espaço topológico T , chamado fibra típica, uma projeção $\pi : X \rightarrow M$ contínua e sobrejetora e um grupo efetivo G de homeomorfismos de T , chamado grupo estrutural com as seguintes propriedades: existe uma cobertura aberta $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de M e existem homeomorfismos $\varphi_\alpha : U_\alpha \times T \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ com $p \circ \varphi_\alpha(x, y) = x$. Mais ainda, para cada $x \in U_\alpha$ podemos definir o homeomorfismo $\varphi_{\alpha, x} : T \rightarrow \pi^{-1}(x)$, $\varphi_{\alpha, x}(y) = \varphi_\alpha(x, y)$ e se $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, então o homeomorfismo $g_{\alpha\beta}(x) = \varphi_{\alpha, x}^{-1} \circ \varphi_{\beta, x} : T \rightarrow T$ deve coincidir com um (único) elemento de G , e a aplicação $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ assim definida deve ser contínua.*

Em geral, denotaremos o fibrado (X, π, M, T, G) simplesmente por X . Os abertos U_α são as vizinhanças coordenadas de X , os homeomorfismos φ_α são as funções coordenadas e as aplicações $g_{\alpha\beta}(x)$ são as transformações de coordenadas de X .

Uma seção para o fibrado X é uma aplicação contínua $\sigma : M \rightarrow X$ tal que $\pi \circ \sigma(x) = x$.

Segue diretamente da definição de fibrados que se $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ então $g_{\alpha\beta}(x) \circ g_{\beta\gamma}(x) = g_{\alpha\gamma}(x)$. Daí, $g_{\alpha\alpha}(x)$ é a identidade de G e $g_{\alpha\beta}(x)^{-1} = g_{\beta\alpha}(x)$.

Agora vamos definir o que chamaremos de fibrados equivalentes.

Definição 3.2 *Sejam $\mathcal{B} = (X, \pi, M, T, G)$ e $\mathcal{B}' = (X', \pi', M', T, G)$ dois fibrados tendo a mesma fibra e o mesmo grupo estrutural. Uma aplicação $h : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ entre os fibrados $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ é uma aplicação contínua $h : X \rightarrow X'$ entre os seus espaços totais com a seguinte propriedade: h transforma fibras $T_x = \pi^{-1}(x)$ de $\mathcal{B}$ homeomorficamente sobre fibras de $\mathcal{B}'$, induzindo assim uma aplicação contínua $\bar{h} : M \rightarrow M'$ tal que $\pi' h = \bar{h} \pi$. Mais ainda, se $x \in U_\alpha \cap \bar{h}^{-1}(U'_\beta)$ e $h_x : T_x \rightarrow T_{x'}$ é o homeomorfismo induzido por h , $x' = \bar{h}(x)$, então a aplicação*

$$\bar{g}_{\beta\alpha}(x) = \varphi'^{-1}_{\beta,x'} \circ h_x \circ \varphi_{\alpha,x} : T \rightarrow T$$

deve coincidir com um elemento de G e a aplicação $\bar{g}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap \bar{h}^{-1}(U'_\beta) \rightarrow G$ assim definida deve ser contínua.

Dizemos que os fibrados $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ são **equivalentes** quando eles tiverem a mesma base, a mesma fibra, o mesmo grupo e se existir uma aplicação $h : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ induzindo a aplicação identidade entre os seus espaços bases. Tem-se que se dois fibrados são equivalentes então seus espaços totais são homeomorfos.

Lema 3.3 *Sejam $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ dois fibrados com o mesmo espaço base, a mesma fibra, o mesmo grupo estrutural e as mesmas vizinhanças coordenadas. Sejam $g_{\alpha\beta}$ e $g'_{\alpha\beta}$ suas transformações de coordenadas. Então $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ são equivalentes se, e somente se, existirem aplicações contínuas $\lambda_\alpha : U_\alpha \rightarrow G$ tais que:*

$$g'_{\alpha\beta}(x) = \lambda_\alpha(x)^{-1} \circ g_{\alpha\beta}(x) \circ \lambda_\beta(x)$$

para todo $x \in U_\alpha \cap U_\beta$.

Uma construção importante para espaços fibrados que usaremos neste trabalho é o teorema de construção o qual enunciaremos agora. Como os demais resultados desta seção, sua demonstração pode ser encontrada em [26].

Seja G um grupo topológico e M um espaço. Um **sistema de transformações de coordenadas** em M com valores em G é uma cobertura aberta $\{U_\alpha\}$ de M e uma coleção de aplicações contínuas $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ tais que $g_{\alpha\beta}(x) \circ g_{\beta\gamma}(x) = g_{\alpha\gamma}(x)$, sempre que $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$. Vimos acima que todo espaço fibrado define um sistema de transformações de coordenadas e veremos agora que a recíproca também é verdadeira.

Teorema 3.4 (Teorema de construção) *Sejam G um grupo de homeomorfismos de T e $\{U_\alpha\}$, $\{g_{\alpha\beta}\}$ um sistema de transformações de coordenadas em um espaço M com valores em G . Então existe um fibrado $\mathcal{B}$ com espaço base M , fibra T , grupo estrutural G , vizinhanças coordenadas $\{U_\alpha\}$ e transformações de coordenadas $\{g_{\alpha\beta}\}$. Mais ainda, quaisquer dois tais fibrados são equivalentes.*

O **fibrado produto** é um fibrado do tipo produto cartesiano $M \times T$. Um **fibrado trivial** é um fibrado equivalente a um fibrado produto. Apresentaremos agora uma condição para um fibrado ser trivial.

Seja X um fibrado com grupo estrutural H onde H é um subgrupo de G . Podemos considerar X como um fibrado com grupo estrutural G . Este fibrado é a **G-imagem** de X . Quando este for um fibrado trivial diremos que X é **G-equivalente** ao fibrado produto.

Lema 3.5 *Seja X um fibrado com grupo H e transformações de coordenadas $\{g_{\alpha\beta}\}$ onde H é um subgrupo de G . Então X é G -equivalente ao fibrado produto se, e somente se, existirem aplicações contínuas $\lambda_\alpha : U_\alpha \rightarrow G$ tais que $g_{\alpha\beta}(x) = \lambda_\alpha(x) \circ \lambda_\beta(x)^{-1}$, para todo $x \in U_\alpha \cap U_\beta$.*

Definição 3.6 *Um fibrado $\mathcal{B}$ tal que sua fibra T é um espaço vetorial real e seu grupo estrutural G é um grupo de transformações lineares é chamado um **fibrado vetorial**.*

Num fibrado vetorial pode-se induzir uma estrutura de espaço vetorial para cada uma de suas fibras $T_x = \pi^{-1}(x)$. Mais ainda, o conjunto de todas as seções de um fibrado vetorial define um espaço vetorial. Também, se o espaço vetorial T tiver dimensão n , então $\mathcal{B}$ é trivial se, e somente se, $\mathcal{B}$ possui n seções linearmente independentes em cada fibra, ou equivalentemente, se é possível definir bases variando continuamente para as suas fibras, veja [20, teorema 2.2, página 18].

Um **fibrado diferenciável** é um fibrado onde todos os espaços envolvidos são variedades diferenciáveis e todas as aplicações são diferenciáveis (C^∞).

3.2 Estruturas afins

Começamos este capítulo definindo estrutura afim para uma variedade diferenciável. Veremos que todos os toros admitem estruturas afins e depois definiremos estruturas afins variando diferenciavelmente para as fibras de um fibrado de toros.

Definição 3.7 *Dizemos que uma variedade diferenciável X^n admite uma **estrutura afim** quando X admitir um atlas diferenciável cujas mudanças de cartas forem restrições de aplicações afins de $\mathbb{R}^n$.*

Exemplo 3.8 Todos os toros admitem estruturas afins.

Exemplo 3.9 Uma superfície conexa e fechada admite uma estrutura afim se, e somente se, sua característica de Euler é zero.[24, página 189]

Definição 3.10 Sejam $(X_1^n, \mathcal{A}_1)$ e $(X_2^n, \mathcal{A}_2)$ variedades com estruturas afins $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$. Dizemos que uma aplicação contínua $f: X_1 \rightarrow X_2$ é uma **aplicação afim** quando sua representação em coordenadas locais for uma restrição de uma aplicação afim entre abertos de $\mathbb{R}^n$.

Por exemplo, quando $\mathbb{T}^n = \frac{\mathbb{R}^n}{\mathbb{Z}^n}$ está munido com sua estrutura afim canônica $\mathcal{A}_0$, uma aplicação afim de $\mathbb{T}^n$ é uma aplicação induzida por uma aplicação afim de $\mathbb{R}^n$ pela projeção canônica $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$.

Seja X um fibrado diferenciável com fibra típica $\mathbb{T}^n$ sobre M , como em 3.1.

Definição 3.11 As fibras de X possuem uma **estrutura afim variando diferenciavelmente** quando for possível obter uma redução do grupo estrutural de X ao grupo dos difeomorfismos afins de $(\mathbb{T}^n, \mathcal{A}_0)$, de tal modo que as mudanças de coordenadas sejam aplicações diferenciáveis, onde $\mathcal{A}_0$ é a estrutura afim canônica de $\mathbb{T}^n$.

Mais especificamente, quando pudermos definir novas cartas para o fibrado X $\psi_\alpha: U_\alpha \times \mathbb{T}^n \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$, de tal forma que as mudanças de coordenadas $h_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Afim}(\mathbb{T}^n)$ tenham valores no grupo $\text{Afim}(\mathbb{T}^n)$ e estas sejam aplicações diferenciáveis.

Se as fibras de um fibrado X admitirem uma estrutura afim variando diferenciavelmente, então podemos definir estruturas afins para cada uma de suas fibras. De fato, suponhamos que $\psi_\alpha: U_\alpha \times \mathbb{T}^n \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ sejam as cartas de X da definição acima com mudanças de coordenadas $h_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Afim}(\mathbb{T}^n)$. Seja $x \in M$ com $x \in U_\alpha$. Na variedade diferenciável $\pi^{-1}(x)$ podemos definir uma estrutura afim $\mathcal{A}_\alpha$ induzida de $\mathcal{A}_0$ pelo difeomorfismo $\psi_{\alpha,x}$. A pergunta que deve ser respondida então é a seguinte: se $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ então $\mathcal{A}_\alpha = \mathcal{A}_\beta$? De fato estas duas estruturas afins são iguais porque as mudanças de coordenadas do fibrado X , $h_{\alpha\beta}$, são aplicações afins de $\mathbb{T}^n$, de modo que a aplicação identidade $id: (\pi^{-1}(x), \mathcal{A}_\beta) \rightarrow (\pi^{-1}(x), \mathcal{A}_\alpha)$ é uma equivalência afim entre estas duas estruturas, como é ilustrado no diagrama abaixo.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{T}^n, \mathcal{A}_0) & \xrightarrow{\psi_{\beta,x}} & (\pi^{-1}(x), \mathcal{A}_\beta) \\ h_{\alpha\beta}(x) \downarrow & & \downarrow id \\ (\mathbb{T}^n, \mathcal{A}_0) & \xrightarrow{\psi_{\alpha,x}} & (\pi^{-1}(x), \mathcal{A}_\alpha) \end{array}$$

Portanto quando um fibrado de toros X possuir uma estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras, podemos definir estruturas afins para cada fibra de X de tal modo que estas estruturas afins variem diferenciavelmente de fibra para fibra.

3.3 Fibras coerentemente orientadas

Seja X um fibrado diferenciável com fibra típica $\mathbb{T}^n$ sobre M^m .

Definição 3.12 Dizemos que as fibras de X estão **coerentemente orientadas** quando o fibrado tangente às fibras de X for um fibrado orientável.

Mais especificamente, para cada $p \in X$ considere a derivada $d\pi_p : T_p X \rightarrow T_x M$, onde $x = \pi(p)$. Seja $\Sigma_p = \ker d\pi_p$. Logo, Σ_p é o subespaço de $T_p X$ tangente, em p , à fibra de X que passa por p . Assim a aplicação Σ definida por $\Sigma(p) = \Sigma_p$ define um campo de n -planos em X :

$$\Sigma_p = T_p \left(\pi^{-1}(x) \right)$$

Portanto, dizemos que as fibras de X estão coerentemente orientadas quando o campo de n -planos Σ for orientável no sentido de [5, página 35].

3.4 Existência de estruturas afins

Como foi visto nos enunciados dos Teoremas A e B, precisamos investigar a existência de estruturas afins em fibrados de toros. Esta existência é caracterizada nesta seção.

Lema 3.13 *Seja X um fibrado diferenciável sobre M com fibras coerentemente orientadas $\mathbb{T}^2$. Então é possível definir uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X .*

Dem: Seja X um fibrado diferenciável como em 3.1. Consideremos uma métrica Riemanniana ds em X . Para cada carta $\varphi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$, por restrição, temos uma métrica Riemanniana ds em $\pi^{-1}(U_\alpha)$. Se $x \in U_\alpha$, via o difeomorfismo $\varphi_{\alpha,x} : \mathbb{T}^2 \rightarrow \pi^{-1}(x)$, temos uma métrica Riemanniana ds em $\pi^{-1}(x)$ e uma métrica Riemanniana induzida em $\mathbb{T}^2$, a qual será denotada por $ds_{\alpha,x}$. Pela proposição 2.15 podemos induzir uma estrutura complexa em $(\mathbb{T}^2, ds_{\alpha,x})$ que o torna uma superfície de Riemann. Pelo corolário 2.37 existe uma equivalência conforme entre este $(\mathbb{T}^2, ds_{\alpha,x})$ e o toro $\frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\alpha(x))}$, $f_{\alpha,x} : \frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\alpha(x))} \rightarrow (\mathbb{T}^2, ds_{\alpha,x})$.

$$\frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\alpha(x))} \xrightarrow{f_{\alpha,x}} (\mathbb{T}^2, ds_{\alpha,x}) \xrightarrow{\varphi_{\alpha,x}} \pi^{-1}(x)$$

Definimos a seguinte aplicação afim:

$$a_{\alpha,x} : \mathbb{T}^2 \longrightarrow \frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\alpha(x))}$$

$$a_{\alpha,x}([t]) = [t_1 e_1 + t_2 v_\alpha(x)]_\alpha$$

onde $e_1 = (1, 0) \in \mathbb{R}^2$, $t = (t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2$ e $[]_\alpha$ denota as classes de equivalência em $\frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\alpha(x))}$.

Definimos as novas cartas do fibrado X por:

$$\psi_{\alpha,x} : \mathbb{T}^2 \longrightarrow \pi^{-1}(x)$$

$$\psi_{\alpha,x} = \varphi_{\alpha,x} \circ f_{\alpha,x} \circ a_{\alpha,x}$$

Como a métrica varia diferenciavelmente para as fibras de X vemos que a aplicação:

$$U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x \mapsto v_\alpha(x)$$

é diferenciável. Mais ainda, as cartas $\psi_{\alpha,x}$ podem ser definidas em abertos:

$$\psi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \longrightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$$

$$\psi_\alpha(x, [t]) = \varphi_{\alpha,x} \circ f_{\alpha,x} \circ a_{\alpha,x}([t])$$

Vejamos que as transformações de coordenadas são aplicações afins do toro. Para isto suponhamos que $x \in U_\alpha \cap U_\beta$. Observe que as aplicações $\varphi_{\alpha,x} : (\mathbb{T}^2, ds_{\alpha,x}) \rightarrow \pi^{-1}(x)$ e $\varphi_{\beta,x} : (\mathbb{T}^2, ds_{\beta,x}) \rightarrow \pi^{-1}(x)$ são isometrias. Logo a aplicação $\varphi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_{\beta,x} : (\mathbb{T}^2, ds_{\beta,x}) \rightarrow (\mathbb{T}^2, ds_{\alpha,x})$ é uma isometria de $\mathbb{T}^2$ e assim é uma aplicação conforme ou anti-conforme, mas de qualquer forma $\varphi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_{\beta,x}$ é afim. Como as aplicações $f_{\alpha,x}^{-1}$ e $f_{\beta,x}$ são equivalências conformes segue que

$$f_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_{\beta,x} \circ f_{\beta,x} : \frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\beta(x))} \longrightarrow \frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(1, v_\alpha(x))}$$

é uma aplicação conforme ou anti-conforme. Finalmente, como as aplicações $a_{\alpha,x}$ e $a_{\beta,x}$ são afins segue que $\psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x} = a_{\alpha,x}^{-1} \circ f_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_{\beta,x} \circ f_{\beta,x} \circ a_{\beta,x}$ é uma aplicação afim de $\mathbb{T}^2$.

Pelo teorema de construção de fibrados 3.4 podemos construir um fibrado X' com vizinhanças coordenadas $\{U_\alpha\}$ e transformações de coordenadas $g'_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Afim}(\mathbb{T}^2)$, $g'_{\alpha\beta}(x) = \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}$. Afirmamos que este fibrado é equivalente a X , de modo que a construção acima descreve apenas uma redução do grupo estrutural de X , do grupo dos difeomorfismos de $\mathbb{T}^2$ para o grupo dos difeomorfismos afins. Para provar isto usaremos a caracterização de fibrados equivalentes exibida em 3.3. É suficiente definir as aplicações:

$$\lambda_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \text{Afim}(\mathbb{T}^2)$$

$$\lambda_\alpha(x) = f_{\alpha,x} \circ a_{\alpha,x}$$

Logo, $g'_{\alpha\beta}(x) = \lambda_\alpha(x)^{-1} \circ g_{\alpha\beta}(x) \circ \lambda_\beta(x)$. Portanto os fibrados X e X' são equivalentes e assim a construção acima descreve uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X . ■

Como veremos a seguir este fato não se generaliza para dimensões maiores.

Seja G_d^n o grupo dos difeomorfismos preservando a orientação de $\mathbb{T}^n$ e seja $G_a^n \subset G_d^n$ o subgrupo dos difeomorfismos **afins** preservando a orientação de $\mathbb{T}^n$. A inclusão $i : G_a^n \rightarrow G_d^n$ induz homomorfismos $i_\# : \pi_k(G_a^n) \rightarrow \pi_k(G_d^n)$. Vamos construir uma retração $r : G_d^n \rightarrow G_a^n$ ($r \circ i = i$). Fixemos $x_0 \in \mathbb{T}^n$ qualquer. Seja $f : \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$ difeomorfismo qualquer em G_d^n . Sabemos que $H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^n$ e $H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$. Também temos que f induz uma aplicação linear $f_* : H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}) \rightarrow H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R})$, $f_* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $f_*(\mathbb{Z}^n) \subset \mathbb{Z}^n$. Como f é inversível temos que $f_*(\mathbb{Z}^n) = \mathbb{Z}^n$, e assim podemos passar f_* ao quociente para obter um difeomorfismo $\bar{f}_* : \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$, $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$. Observe que $\bar{f}_*$ é um difeomorfismo “linear” de $\mathbb{T}^n$ tal que $\bar{f}_*([0]) = [0]$. Logo não podemos definir $r(f) = \bar{f}_*$ pois este não está fixando os elementos de G_a^n . Devemos definir então $r(f)([t]) = [f_*(t) + \widetilde{f(x_0)} - \widetilde{f_*(x_0)}]$, onde $\widetilde{f(x_0)}$ é qualquer fixado ponto de $\mathbb{R}^n$ sobre $f(x_0)$. Observe que $r(f)$ é o único difeomorfismo afim de $\mathbb{T}^n$ homotópico a f e tal que $r(f)(x_0) = f(x_0)$.

Como $r \circ i = i$ temos que os homomorfismos $i_\# : \pi_k(G_a^n) \rightarrow \pi_k(G_d^n)$ são injetivos para todo $k \geq 0$ e assim podemos considerar $\pi_k(G_a^n)$ como subgrupo de $\pi_k(G_d^n)$.

Lema 3.14 *Se para todo $k \geq 0$ tivermos $\pi_k(G_a^n) = \pi_k(G_d^n)^1$ então qualquer fibrado diferenciável X sobre qualquer CW-complexo M com fibras coerentemente orientadas $\mathbb{T}^n$ admite uma estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras.*

Inversamente, se $\pi_{k_0}(G_a^n) \neq \pi_{k_0}(G_d^n)^2$ para algum $k_0 \geq 0$ então existe um fibrado diferenciável X sobre a esfera S^{k_0+1} com fibras coerentemente orientadas $\mathbb{T}^n$ para o qual não existe estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras.

Dem: Seja A^n o espaço de todas as estruturas afins em $\mathbb{T}^n$. O fibrado X induz um outro fibrado X_A sobre M com fibra A^n , onde X_A é o conjunto das estruturas afins para fibras de X . Claramente X admite uma estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras se, e somente se, o fibrado X_A admite uma seção diferenciável.

Afirmamos que G_d^n é homeomorfo à $G_a^n \times A^n$. De fato, fixemos um ponto base $x_0 \in \mathbb{T}^n$ e a estrutura afim canônica de $\mathbb{T}^n$, $\mathcal{A}_0$. A cada difeomorfismo $f \in G_d^n$ associamos o par $(r(f), f(\mathcal{A}_0))$ onde $r(f)$ foi definido acima e $f(\mathcal{A}_0)$ é a estrutura afim de $\mathbb{T}^n$ induzida por $\mathcal{A}_0$ e por f . Afirmamos também que tal aplicação é uma bijeção porque ela é inversível: se $(r(f), f(\mathcal{A}_0)) \in G_a^n \times A^n$ definimos $f \in G_d^n$ como sendo o único difeomorfismo homotópico à $r(f)$, satisfazendo $f(x_0) = r(f)(x_0)$ e $f : (\mathbb{T}^n, \mathcal{A}_0) \rightarrow (\mathbb{T}^n, f(\mathcal{A}_0))$ é afim. Daí temos que $\pi_k(G_d^n) = \pi_k(G_a^n) \times \pi_k(A^n)$ para todo $k \geq 0$.

Se $\pi_k(G_d^n) = \pi_k(G_a^n)$ para todo $k \geq 0$ então $\pi_k(A^n)$ é trivial para todo k . Agora podemos utilizar a estrutura celular de M para definir uma seção diferenciável do fibrado X_A . Primeiramente escolhemos arbitrários pontos (estruturas afins) sobre as 0-células de M . Visto que $\pi_0(A^n) = 1$ A^n é conexo por caminhos, e assim podemos estender esta seção para a parte do fibrado X_A sobre o 1-esqueleto de M . Para cada 2-célula de M , a construção acima nos descreve uma aplicação $S^1 \rightarrow A^n$. Como $\pi_1(A^n)$ é trivial, a seção acima pode ser estendida sobre a 2-célula considerada. Logo podemos construir uma seção de X_A sobre o 2-esqueleto de M . Visto que $\pi_k(A^n) = 1$ para todo $k \geq 0$, esta seção pode ser estendida indutivamente sobre M .

Inversamente, suponhamos que $\pi_{k_0}(G_a^n) \neq \pi_{k_0}(G_d^n)$ para algum $k_0 \geq 0$. Considere uma aplicação $f : S^{k_0} \rightarrow G_d^n$ que não se deforma a uma aplicação de S^{k_0} em G_a^n . Use esta aplicação para identificar pelo bordo dois fibrados triviais $\mathbb{T}^n \times D^{k_0+1}$, onde D^{k_0+1} é o disco unitário fechado de dimensão $k_0 + 1$. Este fibrado, assim definido, não admite nenhuma estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras, visto que, uma tal estrutura nos daria uma homotopia entre a aplicação $f : S^{k_0} \rightarrow G_d^n$ e uma com imagem em G_a^n , o que contraria a hipótese. ■

¹Queremos dizer com esta igualdade que todos os homomorfismos injetivos $i_{\#} : \pi_k(G_a^n) \rightarrow \pi_k(G_d^n)$ são sobrejetivos.

²Aqui o homomorfismo injetivo $i_{\#} : \pi_{k_0}(G_a^n) \rightarrow \pi_{k_0}(G_d^n)$ não é sobrejetivo.

Observação 3.15 O lema 3.13 segue do lema 3.14 uma vez que G_a^2 é retrato por deformação de G_d^2 . Este fato é bem conhecido e sua demonstração pode ser encontrada em [9]. Apresentaremos aqui uma demonstração direta deste fato, utilizando o mesmo método utilizado na demonstração do lema 3.13.

Dem: Precisamos definir uma homotopia $H : I \times G_d^2 \rightarrow G_d^2$ tal que $H(0, f) = f$, $H(1, f) = r(f)$ e $H(t, f) = f$ se $f \in G_a^2$.

Seja $f : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ um difeomorfismo qualquer em G_d^2 . Consideremos no domínio de f a métrica canônica $\langle, \rangle$ de $\mathbb{T}^2$ e no contra-domínio de f a métrica induzida por f , $f \langle, \rangle$:

$$f : (\mathbb{T}^2, \langle, \rangle) \rightarrow (\mathbb{T}^2, f \langle, \rangle)$$

Portanto f se torna uma isometria. Vamos obter um caminho contínuo em G_d^2 ligando f à $r(f)$. Considere a métrica em $\mathbb{T}^2$ induzida pelo difeomorfismo afim $r(f)$. Como f e $r(f)$ são homotópicos, existe um caminho contínuo de métricas m_t ligando a métrica $f \langle, \rangle$ à métrica induzida por $r(f)$.

Fixemos um ponto $x_0 \in \mathbb{T}^2$.

Para cada uma destas métricas m_t , pelo corolário 2.37, obtemos um toro conforme, quociente de $\mathbb{C}$ por um lattice $\Gamma(1, v_t)$.

Como temos um ponto x_0 fixado em $\mathbb{T}^2$, existe uma única equivalência conforme $\frac{\mathbb{C}}{\Gamma(1, v_t)} \rightarrow (\mathbb{T}^2, m_t)$ que induz um difeomorfismo $f_t : (\mathbb{T}^2, \langle, \rangle) \rightarrow (\mathbb{T}^2, m_t)$ tal que $f_t(x_0) = f(x_0)$. Deste modo, podemos definir a desejada homotopia por $H(t, f) = f_t$.

Isto demonstra que G_a^2 é retrato por deformação de G_d^2 . Logo $\pi_k(G_a^2) = \pi_k(G_d^2)$ para todo $k \geq 0$ e assim o lema 3.13 segue do lema 3.14. ■

Observação 3.16 É bem conhecido o fato que, se $n \geq 6$, nem todo difeomorfismo de $\mathbb{T}^n$ é isotópico a um difeomorfismo afim. Logo $\pi_0(G_a^n) \neq \pi_0(G_d^n)$ se $n \geq 6$. Também sabe-se que, para $n \geq 7$, as componentes conexas de G_a^n e G_d^n não são homotopicamente equivalentes [2, Teorema C]. Logo a correspondente afirmação do lema 3.13 para $\mathbb{T}^n$ é falsa se $n \geq 6$.

Capítulo 4

Teorema A

Este capítulo é dedicado exclusivamente à demonstração do Teorema A.

4.1 Teorema A

Teorema 4.1 *Seja X um fibrado diferenciável com fibras $\mathbb{T}^n$ sobre uma variedade compacta e conexa M^m . Suponhamos que as fibras de X estejam coerentemente orientadas. Então existe uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ em X cujas órbitas são iguais às fibras se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:*

1. *é possível definir uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X ,*
2. *o fibrado vetorial Y sobre M com fibra $H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R})$ é trivial.*

Observamos primeiramente que a hipótese das fibras de X estarem coerentemente orientadas é uma condição necessária para a existência de uma tal ação pois, um conjunto de geradores infinitesimais para a ação define uma orientação para o campo de n -planos Σ , onde este é o campo formado pelos espaços tangentes às fibras de X .

Antes de passar para a demonstração deste Teorema, vamos apresentar a construção do fibrado vetorial Y .

Seja X um fibrado diferenciável com fibra típica $\mathbb{T}^n$ sobre M^m , como em 3.1. Sejam $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Diff}(\mathbb{T}^n)$ as mudanças de coordenadas de X . Portanto, para cada $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, $g_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$ é um difeomorfismo de $\mathbb{T}^n$. Portanto este difeomorfismo induz um homomorfismo em homologia:

$$g'_{\alpha\beta}(x) : H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}) \rightarrow H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R})$$

Como $H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$, então $g'_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma aplicação linear. Pelo Teorema de Construção de Fibrados, 3.4, podemos construir um fibrado vetorial Y com as mesmas vizinhanças coordenadas de X , espaço base M e transformações de coordenadas as aplicações lineares $g'_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Como $H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^n \subset \mathbb{R}^n$ e como $g_{\alpha\beta}(x)$ são difeomorfismos temos que $g'_{\alpha\beta}(x)(\mathbb{Z}^n) = \mathbb{Z}^n$. Isto quer dizer que se pode dar à Y o grupo estrutural discreto $SL(n, \mathbb{Z})$.

Agora suponhamos que as fibras de X admitam uma estrutura afim variando diferenciavelmente, onde em X estão definidas novas cartas ψ_α e novas mudanças de coordenadas $h_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Afim}(\mathbb{T}^n)$. Portanto, para cada $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, podemos escrever:

$$h_{\alpha\beta}(x) \cdot [\mathbf{t}] = [A_{\alpha\beta}(x) \cdot \mathbf{t} + s_{\alpha\beta}(x)]$$

onde $[\]$ denota a classe de equivalência (elementos) de $\mathbb{T}^n = \frac{\mathbb{R}^n}{\mathbb{Z}^n}$.

Daí as induzidas em homologias são as aplicações lineares:

$$h'_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$h'_{\alpha\beta}(x) \cdot \mathbf{t} = A_{\alpha\beta}(x) \cdot \mathbf{t}$$

e este é o fibrado Y considerado no enunciado do Teorema A. Passemos agora a demonstração deste Teorema.

Dem:

IDA: Denotaremos a ação citada no enunciado por $F : \mathbb{R}^n \times X \rightarrow X$ e consideraremos X um fibrado como em 3.1.

1. Procurando obter uma maior clareza na exposição, suponhamos que $n = 2$. O caso geral é provado de maneira inteiramente análoga.

Seja $\varphi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ uma carta de X . A ação F induz, por restrição, uma ação em $\pi^{-1}(U_\alpha)$, $F : \mathbb{R}^2 \times \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$. Pelo difeomorfismo φ_α temos então uma ação em $U_\alpha \times \mathbb{T}^2$:

$$F_\alpha : \mathbb{R}^2 \times (U_\alpha \times \mathbb{T}^2) \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{T}^2$$

$$F_\alpha(\mathbf{t}, x, y) = \varphi_\alpha^{-1} \circ F(\mathbf{t}, \varphi_\alpha(x, y))$$

Agora suponhamos que φ_α e φ_β são duas cartas de X tais que $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Neste caso, podemos definir as ações F_α e F_β nesta intersecção e, como verifica-se facilmente, temos:

$$F_\alpha(t, x, y) = \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\beta \circ F_\beta(t, \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\alpha(x, y))$$

Como $\mathbb{T}^2$ é o toro canônico $S^1 \times S^1$ vamos considerá-lo como o espaço base do recobrimento universal canônico $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$. Fixemos pontos bases $0 \in \mathbb{R}^2$ e $o = p(0) \in \mathbb{T}^2$. Deste modo, se definirmos a relação de equivalência em $\mathbb{R}^2$, $t \sim t'$ se e somente se $t - t' \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, então teremos:

$$\mathbb{T}^2 = \frac{\mathbb{R}^2}{\sim} = \frac{\mathbb{R}^2}{\Gamma(e_1, e_2)}$$

Seja $\mathcal{I}_{(x,o)}(F_\alpha)$ o subgrupo de isotropia¹ de (x, o) pela ação F_α . Logo, sabemos que $\frac{\mathbb{R}^2}{\mathcal{I}_{(x,o)}(F_\alpha)} \simeq \{x\} \times \mathbb{T}^2$. Portanto, temos que $\mathcal{I}_{(x,o)}(F_\alpha)$ é gerado por dois vetores linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$, digamos $v_{\alpha,1}(x)$ e $v_{\alpha,2}(x)$. Mais ainda, é claro que podemos escolher estes vetores de tal forma que as aplicações $v_{\alpha,1}, v_{\alpha,2} : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^2$ sejam diferenciáveis. Observe que, como o fibrado X possui fibras coerentemente orientadas, podemos escolher todas as bases $\{v_{\alpha,1}(x), v_{\alpha,2}(x)\}$ com a mesma orientação.

Em $U_\alpha \times \mathbb{R}^2$ definimos a seguinte relação de equivalência:

$$(x, t) \sim_\alpha (x', t') \Leftrightarrow x = x' \text{ e } t - t' \in \mathcal{I}_{(x,o)}(F_\alpha)$$

¹Se G é um grupo de Lie e se $\varphi : G \times X \rightarrow X$ é uma ação então o subgrupo de G , $\mathcal{I}_x(\varphi) = \{g \in G : \varphi(g, x) = x\}$, é chamado **subgrupo de isotropia** de $x \in X$. Sabe-se que a aplicação $\varphi_x : G \rightarrow X$ pode ser passada ao quociente para definir um difeomorfismo $\bar{\varphi}_x : \frac{G}{\mathcal{I}_x(\varphi)} \rightarrow \mathcal{O}_x(\varphi)$.

A classe de equivalência de $(x, \mathbf{t})$ será denotada por $[x, \mathbf{t}]_\alpha$ e a projeção quociente por $p_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \frac{U_\alpha \times \mathbb{R}^2}{\sim_\alpha}$.

Portanto podemos construir o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} U_\alpha \times \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & U_\alpha \times \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \\ \text{id} \times p \downarrow & & p_\alpha \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ U_\alpha \times \mathbb{T}^2 & \longrightarrow & \frac{U_\alpha \times \mathbb{R}^2}{\sim_\alpha} & \longrightarrow & U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \end{array}$$

onde as setas horizontais são definidas por:

$$\begin{array}{ccccc} U_\alpha \times \mathbb{R}^2 & \rightarrow & U_\alpha \times \mathbb{R}^2 & \rightarrow & U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \\ (x, \mathbf{t}) & \mapsto & (x, t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x)) & & \\ & & (x, \mathbf{t}) & \mapsto & F_\alpha(\mathbf{t}, (x, o)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} U_\alpha \times \mathbb{T}^2 & \rightarrow & \frac{U_\alpha \times \mathbb{R}^2}{\sim_\alpha} & \rightarrow & U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \\ (x, [\mathbf{t}]) & \mapsto & [x, t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x)]_\alpha & & \\ & & [x, \mathbf{t}]_\alpha & \mapsto & F_\alpha(\mathbf{t}, (x, o)) \end{array}$$

onde $\mathbf{t} = (t_1, t_2)$. Agora considere as composições indicadas por estes dois diagramas:

$$G_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{T}^2$$

$$G_\alpha(x, \mathbf{t}) = F_\alpha(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), (x, o))$$

$$\bar{G}_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{T}^2$$

$$\bar{G}_\alpha(x, [\mathbf{t}]) = F_\alpha(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), (x, o))$$

Portanto o diagrama abaixo comuta:

$$\begin{array}{ccc} U_\alpha \times \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{G_\alpha} & U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \\ \text{id} \times p \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ U_\alpha \times \mathbb{T}^2 & \xrightarrow{\bar{G}_\alpha} & U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \end{array}$$

Agora estamos prontos para definir as novas cartas de X , as quais induzirão a estrutura afim procurada:

$$\psi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \longrightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$$

$$\begin{aligned}\psi_\alpha(x, [t]) &= \varphi_\alpha \circ \bar{G}_\alpha(x, [t]) \\ &= \varphi_\alpha \circ F_\alpha(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), (x, o)) \\ &= F(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), \varphi_\alpha(x, o))\end{aligned}$$

Claramente temos que $\pi \circ \psi_\alpha(x, [t]) = x$.

Precisamos analisar a mudança de coordenadas entre duas tais cartas. Primeiramente vamos investigar a aplicação $\psi_{\alpha,x}^{-1} : \pi^{-1}(x) \rightarrow \mathbb{T}^2$, onde $\psi_{\alpha,x}([t]) = \psi_\alpha(x, [t])$.

Como $\psi_{\alpha,x}$ é um difeomorfismo, se $p \in \pi^{-1}(x)$ então existe um único $[t] \in \mathbb{T}^2$ tal que $p = \varphi_\alpha \circ F_\alpha(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), (x, o)) = F(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), \varphi_\alpha(x, o))$. Portanto podemos concluir: sempre que um ponto $p \in \pi^{-1}(x)$ estiver escrito numa destas duas formas então $\psi_{\alpha,x}^{-1}(p) = [t]$.

Agora sejam ψ_α e ψ_β duas destas novas cartas tais que $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Se $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, precisamos computar $\psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x} : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$. Temos:

$$\begin{aligned}\psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}([t]) &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_\beta \circ F_\beta(t_1 v_{\beta,1}(x) + t_2 v_{\beta,2}(x), (x, o)) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_\beta \circ \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\alpha \circ F_\alpha(t_1 v_{\beta,1}(x) + t_2 v_{\beta,2}(x), \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\beta(x, o)) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \varphi_\alpha \circ F_\alpha(t_1 v_{\beta,1}(x) + t_2 v_{\beta,2}(x), \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\beta(x, o)) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F(t_1 v_{\beta,1}(x) + t_2 v_{\beta,2}(x), \varphi_\beta(x, o))\end{aligned}$$

Mas observe que podemos definir uma aplicação diferenciável $s_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que:

$$F(s_{\alpha\beta}(x), \varphi_\alpha(x, o)) = \varphi_\beta(x, o)$$

Logo,

$$\begin{aligned} \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}([t]) &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F\left(t_1 v_{\beta,1}(x) + t_2 v_{\beta,2}(x), F(s_{\alpha\beta}(x), \varphi_\alpha(x, o))\right) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F\left(t_1 v_{\beta,1}(x) + t_2 v_{\beta,2}(x) + s_{\alpha\beta}(x), \varphi_\alpha(x, o)\right) \end{aligned}$$

Existe uma aplicação diferenciável $A_{\alpha\beta} : U_\alpha \rightarrow GL(2, \mathbb{R})$ tal que:

$$A_{\alpha\beta}(x) = \begin{bmatrix} A_{\alpha\beta}^{11}(x) & A_{\alpha\beta}^{12}(x) \\ A_{\alpha\beta}^{21}(x) & A_{\alpha\beta}^{22}(x) \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad A_{\alpha\beta}(x)^t \cdot \begin{bmatrix} v_{\alpha,1}(x) \\ v_{\alpha,2}(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\beta,1}(x) \\ v_{\beta,2}(x) \end{bmatrix}$$

Assim, $A_{\alpha\beta}(x)$ é simplesmente a matriz mudança de base, da base $\{v_{\alpha,1}(x), v_{\alpha,2}(x)\}$ para a base $\{v_{\beta,1}(x), v_{\beta,2}(x)\}$. Portanto:

$$\begin{aligned} \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}([t]) &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F\left(t_1 A_{\alpha\beta}^{11}(x) v_{\alpha,1}(x) + t_1 A_{\alpha\beta}^{21}(x) v_{\alpha,2}(x) + \right. \\ &\quad \left. t_2 A_{\alpha\beta}^{12}(x) v_{\alpha,1}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{22}(x) v_{\alpha,2}(x) + s_{\alpha\beta}(x), \varphi_\alpha(x, o)\right) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F\left(\left(t_1 A_{\alpha\beta}^{11}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{12}(x)\right) v_{\alpha,1}(x) + \right. \\ &\quad \left.\left(t_1 A_{\alpha\beta}^{21}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{22}(x)\right) v_{\alpha,2}(x) + s_{\alpha\beta}(x), \varphi_\alpha(x, o)\right) \end{aligned}$$

Também, de modo diferenciável podemos escrever:

$$s_{\alpha\beta}(x) = s_{\alpha\beta}^1(x) v_{\alpha,1}(x) + s_{\alpha\beta}^2(x) v_{\alpha,2}(x)$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}([t]) &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F\left(\left(t_1 A_{\alpha\beta}^{11}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{12}(x) + s_{\alpha\beta}^1(x)\right) v_{\alpha,1}(x) + \right. \\ &\quad \left.\left(t_1 A_{\alpha\beta}^{21}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{22}(x) + s_{\alpha\beta}^2(x)\right) v_{\alpha,2}(x), \varphi_\alpha(x, o)\right) \end{aligned}$$

E assim, pela discussão feita anteriormente sobre a aplicação $\psi_{\alpha,x}^{-1}$, obtemos:

$$\begin{aligned}\psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}([t]) &= [t_1 A_{\alpha\beta}^{11}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{12}(x) + s_{\alpha\beta}^1(x), t_1 A_{\alpha\beta}^{21}(x) + t_2 A_{\alpha\beta}^{22}(x) + s_{\alpha\beta}^2(x)] \\ &= [A_{\alpha\beta}(x) \cdot t + s_{\alpha\beta}(x)]\end{aligned}$$

Seja $h_{\alpha\beta}(x) = \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x}$. Então, temos que $h_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \mathbb{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Mais ainda, como todas as escolhas acima foram feitas de maneira diferenciável, segue que $h_{\alpha\beta}$ é uma aplicação diferenciável e para todo $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ temos que:

$$h_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$$

$$h_{\alpha\beta}(x) \cdot ([t]) = [A_{\alpha\beta}(x) \cdot t + s_{\alpha\beta}(x)]$$

é claramente uma aplicação afim de $\mathbb{T}^2$. Isto define uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X . Portanto, concluímos a demonstração de 1.

2. Vamos construir o fibrado vetorial Y . Para cada $x \in M$, devemos considerar a linearização dos difeomorfismos $h_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$, definidos acima. Isto é, devemos considerar os difeomorfismos lineares:

$$h'_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{onde} \quad h'_{\alpha\beta}(x) \cdot t = A_{\alpha\beta}(x) \cdot t \quad (4.1)$$

Pelo teorema de construção de fibrados 3.4, podemos construir um fibrado vetorial Y com base M , fibra $\mathbb{R}^2$ e transformações de coordenadas $h'_{\alpha\beta}$.

Para mostrar que Y é um fibrado vetorial trivial deve-se encontrar duas seções de Y linearmente independentes em todas as fibras. Como a ação $F : \mathbb{R}^2 \times X \rightarrow X$ é localmente livre, se $\{w_1, w_2\}$ é uma base qualquer de $\mathbb{R}^2$, podemos considerar geradores infinitesimais de F determinados pela base $\{w_1, w_2\}$ que são dois campos de vetores $\mathcal{X}_1$ e $\mathcal{X}_2$ em X linearmente independentes em todos os pontos, comutativos e tangentes às fibras de X . Sabe-se que os fluxos destes campos são definidos por:

$$F_i : \mathbb{R} \times X \rightarrow X$$

$$F_i(s, p) = F(sw_i, p)$$

Agora considere as novas cartas do fibrado X :

$$\psi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$$

Considerando as restrições dos campos $\mathcal{X}_1$ e $\mathcal{X}_2$ a $\pi^{-1}(U_\alpha)$, via o difeomorfismo ψ_α , podemos construir campos $\mathcal{Y}_1$ e $\mathcal{Y}_2$ no produto $U_\alpha \times \mathbb{T}^2$. Os fluxos destes campos são definidos por:

$$f_{\alpha,i} : \mathbb{R} \times (U_\alpha \times \mathbb{T}^2) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{T}^2$$

$$f_{\alpha,i}(s, x, y) = \psi_\alpha^{-1} \circ F(sw_i, \psi_\alpha(x, y))$$

Afirmamos que, neste produto, tais campos de vetores são constantes nas fibras, isto é, eles são definidos por campos constantes nas fibras. Provemos isto.

Fixemos $x \in M$ e consideremos somente as fibras sobre x . Em $\pi^{-1}(x)$ os fluxos dos campos $\mathcal{X}_1$ e $\mathcal{X}_2$ são:

$$F_{i,x} : \mathbb{R} \times \pi^{-1}(x) \rightarrow \pi^{-1}(x)$$

$$F_{i,x}(s, p) = F(sw_i, p)$$

Os fluxos $f_{\alpha,i}$ também induzem fluxos nas fibras de $U_\alpha \times \mathbb{T}^2$:

$$f_{\alpha,i,x} : \mathbb{R} \times \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$$

$$\begin{aligned} f_{\alpha,i,x}(s, [t]) &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F_{i,x}(s, \psi_{\alpha,x}([t])) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F(sw_i, F(t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), \varphi_\alpha(x, o))) \end{aligned}$$

onde $t = (t_1, t_2)$.

Podemos escrever o vetor w_i em termos da base $\{v_{\alpha,1}(x), v_{\alpha,2}(x)\}$:

$$w_i = c_{\alpha,1}^i(x) v_{\alpha,1}(x) + c_{\alpha,2}^i(x) v_{\alpha,2}(x)$$

de tal forma que as aplicações $c_{\alpha,1}^i, c_{\alpha,2}^i : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$ sejam diferenciáveis. Portanto:

$$\begin{aligned} f_{\alpha,i,x}(s, [t]) &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F \left(sc_{\alpha,1}^i(x) v_{\alpha,1}(x) + sc_{\alpha,2}^i(x) v_{\alpha,2}(x) + \right. \\ &\quad \left. t_1 v_{\alpha,1}(x) + t_2 v_{\alpha,2}(x), \varphi_\alpha(x, o) \right) \\ &= \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ F \left((sc_{\alpha,1}^i(x) + t_1) v_{\alpha,1}(x) + (sc_{\alpha,2}^i(x) + t_2) v_{\alpha,2}(x), \varphi_\alpha(x, o) \right) \\ &= [sc_{\alpha,1}^i(x) + t_1, sc_{\alpha,2}^i(x) + t_2] \end{aligned}$$

Isto significa que o fluxo $f_{\alpha,i,x}$ é induzido do seguinte fluxo em $\mathbb{R}^2$:

$$\tilde{f}_{\alpha,i,x} : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\tilde{f}_{\alpha,i,x}(s, t_1, t_2) = (sc_{\alpha,1}^i(x) + t_1, sc_{\alpha,2}^i(x) + t_2)$$

o qual é o fluxo do seguinte campo constante em $\mathbb{R}^2 : (c_{\alpha,1}^i(x), c_{\alpha,2}^i(x))$. Isto demonstra que os campos induzidos nos produtos $U_\alpha \times \mathbb{T}^2$ são constantes em cada fibra, e assim terminamos de provar a afirmação acima.

Observe que, deste modo conseguimos definir duas seções locais de Y sobre U_α :

$$\sigma_{\alpha,i} : U_\alpha \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^2$$

$$\sigma_{\alpha,i}(x) = (x, c_{\alpha,1}^i(x), c_{\alpha,2}^i(x))$$

Observe que elas são linearmente independentes nas fibras.

Afirmamos que, de fato, estas seções podem ser definidas globalmente em Y pois, como as novas transformações de coordenadas de X são aplicações afins de $\mathbb{T}^2$, as seções $\sigma_{\alpha,i}$ e $\sigma_{\beta,i}$ coincidem na intersecção $U_\alpha \cap U_\beta$ e assim elas podem ser estendidas até $U_\alpha \cup U_\beta$. Como M é compacto, podemos definir as requeridas seções de Y .

De fato isto é verdade pois as seções $\sigma_{\alpha,i}$ e $\sigma_{\beta,i}$ são definidas com a ajuda de campos globais definidos em X . Basta observar o diagrama abaixo:

$$U_\alpha \cap U_\beta \times \mathbb{T}^2 \xrightarrow{\psi_\beta} \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \xrightarrow{\psi_\alpha^{-1}} U_\alpha \cap U_\beta \times \mathbb{T}^2$$

para cada $x \in U_\alpha \cap U_\beta$:

$$\mathbb{T}^2 \xrightarrow{\psi_{\beta,x}} \pi^{-1}(x) \xrightarrow{\psi_{\alpha,x}^{-1}} \mathbb{T}^2$$

O teorema de construção de fibrados nos diz que devemos identificar $U_\alpha \cap U_\beta \times \mathbb{T}^2 \subset U_\beta \times \mathbb{T}^2$ com $U_\alpha \cap U_\beta \times \mathbb{T}^2 \subset U_\alpha \times \mathbb{T}^2$ via as transformações de coordenadas $h_{\alpha\beta}$. Como as seções $\sigma_{\beta,i}$ e $\sigma_{\alpha,i}$ são definidas através de campos globais de X , segue que os difeomorfismos $h_{\alpha\beta}$ vão identificar estas seções na intersecção. Logo podemos estender estas seções para a união $U_\alpha \cup U_\beta$.

Como Y tem duas seções linearmente independentes nas fibras segue que Y é um fibrado vetorial trivial.

Aqui terminamos a prova de **2.** e assim a ida do Teorema A.

VOLTA: Sejam $\psi_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{T}^2 \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ as cartas do fibrado X que induzem uma estrutura afim para as suas fibras, com mudanças de coordenadas:

$$h_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Afm}(\mathbb{T}^2)$$

$$h_{\alpha\beta}(x) = \psi_{\alpha,x}^{-1} \circ \psi_{\beta,x} : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$$

$$h_{\alpha\beta}(x) \cdot ([t]) = [A_{\alpha\beta}(x) \cdot t + s_{\alpha\beta}(x)]$$

Do mesmo modo que foi feito anteriormente, podemos considerar apenas a parte linear dos difeomorfismos $h_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ para definir:

$$h'_{\alpha\beta}(x) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$h'_{\alpha\beta}(x) \cdot t = A_{\alpha\beta}(x) \cdot t$$

Pelo teorema de construção 3.4 podemos construir o fibrado vetorial Y com base M , fibra $\mathbb{R}^2$ e transformações de coordenadas $h'_{\alpha\beta}$.

Portanto, sempre que temos uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X podemos construir o fibrado vetorial Y com fibra $\mathbb{R}^2$. O problema é que não se sabe se ele é trivial ou não. Como seções de Y correspondem a campos de vetores de X tangentes às fibras e invariantes por translações temos que Y é trivial se, e somente se, X possui dois campos de vetores linearmente independentes, tangentes às fibras e invariantes por translações. Destes campos de vetores, pode-se construir a ação localmente livre de $\mathbb{R}^2$ em X cujas órbitas são iguais às fibras. ■

Observação 4.2 Na demonstração do Teorema A, estamos considerando $\mathbb{R}^n$ como o recobrimento univocal de $\mathbb{T}^n$, o espaço que fornece o tempo para a ação $F : \mathbb{R}^n \times X \rightarrow X$ localmente livre e como $H_1(\mathbb{T}^n, \mathbb{R})$.

Capítulo 5

Teorema B

Este capítulo é dedicado exclusivamente à demonstração do Teorema B.

5.1 Teorema B

Teorema 5.1 *Seja X um fibrado diferenciável com fibras $\mathbb{T}^n$ sobre uma variedade compacta e conexa M^m . Suponhamos que as fibras de X estejam coerentemente orientadas. Se*

$$n \leq 2, \quad m \leq 2 \quad \text{e} \quad M \text{ é orientável}$$

então existe uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ sobre X com órbitas iguais às fibras. Mais ainda, se qualquer uma destas três hipóteses é suprimida a conclusão não necessariamente será verdadeira.

Para $n = 1$, m qualquer, a desejada ação claramente existe: ela é definida como o fluxo de um campo de vetores não nulo e tangente às fibras de X . Portanto podemos supor que $n = 2$. Pelo lema 3.13 podemos supor que existe uma estrutura afim variando diferenciavelmente para as fibras de X . Pelo Teorema A devemos investigar a trivialidade do fibrado Y .

Como estamos considerando em X uma estrutura afim para suas fibras, as transformações de coordenadas de Y , descritas em 4.1, são linearizações das transformações de coordenadas de X . Portanto elas devem preservar o reticulado canônico de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Com isto queremos dizer que o grupo estrutural de Y é o grupo discreto $SL(2, \mathbb{Z})$. Como um fibrado com grupo estrutural discreto é equivalente a uma suspensão de uma representação de $\pi_1(M)$ em $C^\infty(\mathbb{T}^2)$, ver [5, capítulo V, seção 4], pensaremos em Y desta maneira daqui para frente.

A pergunta que deve ser respondida é a seguinte: Y é um fibrado trivial quando considerado com grupo estrutural $SL(2, \mathbb{R})$? Isto é, devemos analisar se Y é $SL(2, \mathbb{R})$ -equivalente ao fibrado produto.

Para $m = 1$ a resposta desta pergunta é quase imediata. Neste caso X é um fibrado de toros $\mathbb{T}^2$ sobre $\mathbb{T}^1$. Portanto, podemos entender X como o seguinte espaço quociente:

$$X = \frac{[0, 1] \times \mathbb{T}^2}{f}$$

onde $f : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ é um difeomorfismo e estamos identificando $(1, y)$ com $(0, f(y))$. Como X já possui uma estrutura afim, podemos supor que f é um difeomorfismo afim de $\mathbb{T}^2$.

O fibrado Y pode ser considerado como:

$$Y = \frac{[0, 1] \times \mathbb{R}^2}{f_*}$$

onde $f_* : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é a parte linear de f que, como vimos acima, está em $SL(2, \mathbb{Z})$.

Como sabemos, o fibrado vetorial Y é trivial se, e somente se, podemos definir bases para as fibras de Y variando continuamente. Por exemplo, podemos munir a fibra sobre 1 com a base canônica, a qual produzirá o reticulado canônico $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ em $\mathbb{R}^2$. Induzimos na fibra sobre 0 uma base via o difeomorfismo $f_* \in SL(2, \mathbb{Z})$, da base sobre 1. Como estas duas bases podem ser vistas como elementos de $SL(2, \mathbb{Z})$, via a conexão por caminhos de $SL(2, \mathbb{R})$, podemos ligá-las por um caminho contínuo. Este caminho de bases define uma trivialização do fibrado Y quando considerado com grupo estrutural $SL(2, \mathbb{R})$.

Por razões simplesmente expositórias, dividimos o restante da demonstração em três lemas.

Lema 5.2 *Seja X um fibrado orientável com fibras orientadas $\mathbb{T}^2$ e base uma variedade orientável, compacta e conexa M^2 . Então existe uma ação localmente livre de $\mathbb{R}^2$ sobre X cujas órbitas são iguais às fibras.*

Dem: Visto que M é uma superfície orientável compacta, podemos pensar em M como um CW complexo com uma 0-célula, algumas 1-células e uma 2-célula.¹ Isto segue do teorema de classificação das superfícies compactas [19] e [17, página 173], o qual nos diz que M pode ser obtida através da identificação dos lados de um polígono P de $4k$ lados de tal forma que o grupo fundamental de M possui $2k$ geradores, $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_k, \beta_k$ e uma relação $\prod_{i=1}^k [\alpha_i, \beta_i] = 1$.

¹A demonstração deste lema também funcionará para $M = S^2$, embora aqui não tenhamos 1-células.

Devemos provar que o fibrado Y é trivial com grupo estrutural $SL(2, \mathbb{R})$. Para isto definiremos bases para as suas fibras. Claramente podemos definir uma base para a fibra de Y sobre a 0-célula. Mais ainda, podemos entender que esta base corresponde a uma cópia canônica de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, ou à matriz identidade de $SL(2, \mathbb{Z})$.

Vamos estender esta base para a parte do fibrado sobre o 1-esqueleto de M . Para cada 1-célula de M , a qual identificaremos aqui com o intervalo $[0, 1]$, temos dois difeomorfismos de colagem, $f_0, f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, os quais identificarão, pelo bordo, o fibrado trivial $[0, 1] \times \mathbb{R}^2$ com a fibra sobre a 0-célula de M . Como estamos considerando em X uma estrutura afim variando diferenciavelmente para suas fibras, podemos supor que $f_0, f_1 \in SL(2, \mathbb{Z})$. Via estes difeomorfismos, induzimos da base canônica sobre a 0-célula, bases para $\{0\} \times \mathbb{R}^2$ e $\{1\} \times \mathbb{R}^2$, as quais podem ser vistas como matrizes em $SL(2, \mathbb{Z})$. Como $SL(2, \mathbb{R})$ é conexo por caminhos, podemos ligar estas duas bases por um caminho contínuo. Este caminho de bases produz bases para todas as fibras de $[0, 1] \times \mathbb{R}^2$ as quais produzem bases para as fibras de Y sobre a 1-célula de M considerada. Procedendo do mesmo modo, podemos definir bases para as fibras de Y sobre o 1-esqueleto de M . É possível estender estas bases para a 2-célula de M ? Veremos agora que, no nosso caso, tal extensão é possível.

Para responder esta pergunta precisamos analisar com mais detalhes a construção feita sobre o 1-esqueleto de M . Escolha uma orientação para o bordo de P e nomeie os seus vértices como $V_1, V_2, \dots, V_{4k-1}, V_{4k}$ como indicado na figura abaixo:

No fibrado produto $P \times \mathbb{R}^2$, como vimos acima, podemos escolher bases variando continuamente para as fibras do seu bordo. Logo temos uma aplicação $c : S^1 \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$ que define estas bases. Como queremos mostrar a trivialidade do fibrado Y precisamos estender estas bases para o interior da 2-célula de M . Mas, para isto, precisamos estender a aplicação c a uma aplicação do disco D^2 em $SL(2, \mathbb{R})$. Tal extensão é possível se, e somente se, c for um caminho homotópico a zero em $SL(2, \mathbb{R})$.

Provaremos isto agora, mostrando que c pode ser visto como um elemento em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$, fechado em I_2 , e que se escreve como um produto de comutadores em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$, veja lema 1.7.

Pela construção das bases sobre o 1-esqueleto de M precisamos primeiramente definir bases sobre os vértices de P . Sejam $A_1, A_2, \dots, A_{4k-1}, A_{4k}$ estas bases. Sem perda de generalidade podemos supor que $A_1 = I_2$. Como vimos acima, precisamos de caminhos contínuos ligando estas bases. Seja então $c_{i,i} : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$ um caminho começando na identidade e que tem a propriedade de transformar continuamente a base A_i na base A_{i+1} no seguinte sentido: $A_i \cdot c_{i,i}(1) = A_{i+1}$, para $i = 1, 2, \dots, 4k$ ($V_{4k+1} = V_1$).

Definimos o seguinte caminho²:

$$c_1 : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R}) \quad c_1 = \prod_{i=1}^{4k} c_{1,i} = c_{1,1} * c_{1,2} * \dots * c_{1,4k}$$

$$c_{1,j}(t) = A_2, \quad \text{para todo } j \geq 2$$

Observe que este caminho define as bases sobre a aresta de P $[V_1, V_2]$, que foram determinadas anteriormente por c . Também definimos o caminho:

$$c_2 : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R}) \quad c_2 = \prod_{i=1}^{4k} c_{2,i} = c_{2,1} * c_{2,2} * c_{2,3} * \dots * c_{2,4k}$$

$$c_{2,1}(t) = I_2, \quad c_{2,j}(t) = A_3, \quad \text{para todo } j > 2$$

Observe agora o caminho $c_1 \cdot c_2 : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R})$, $(c_1 \cdot c_2)(t) = c_1(t) \cdot c_2(t)$ (multiplicação de matrizes). Claramente tal caminho começa em I_2 e termina em algum ponto de $SL(2, \mathbb{Z})$. Logo sua classe de homotopia $\langle a_1 \cdot a_2 \rangle \in \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ é tal que:

$$\langle c_1 \cdot c_2 \rangle = \langle c_1 \rangle \langle c_2 \rangle = \left\langle \prod_{i=1}^{4k} c_{1,i} \right\rangle \left\langle \prod_{i=1}^{4k} c_{2,i} \right\rangle = \langle c_{1,1} \rangle \langle c_{2,2} \rangle$$

Estes caminhos estão definindo bases para o bordo de $P \times \mathbb{R}^2$ e eles estão reconstruindo o caminho c .

Agora vamos para o terceiro passo:

²O símbolo $*$ significa composição de caminhos

$$c_3 : I \rightarrow SL(2, \mathbb{R}) \quad c_3 = \prod_{i=1}^{4k} c_{3,i} = c_{3,1} * c_{3,2} * c_{3,3} * \cdots * c_{3,4k}$$

$$c_{3,i}(t) = I_2, \quad i < 3 \quad c_{3,j}(t) = A_4, \quad \text{para todo } j > 3$$

Observe que, como as arestas de $P[V_1, V_2]$ e $[V_3, V_4]$ representam elementos inversos de $\pi_1(M)$ devemos ter $c_{3,3}(t) = c_{1,1}(t)^{-1}$. Portanto o caminho $c_1 \cdot c_2 \cdot c_3$ é tal que $\langle c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \rangle \in \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$ e

$$\langle c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \rangle = \langle c_{1,1} \rangle \langle c_{2,2} \rangle \langle c_{1,1} \rangle^{-1}$$

Analogamente seja $c_4 = \prod_{i=1}^{4k} c_{4,i}$, $c_{4,i}(t) = I_2, i < 4$ e $c_{4,j}(t) = A_5$ se $j > 4$. O caminho $c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdot c_4$ reconstrói o caminho c para a parte do fibrado sobre as arestas $[V_1, V_2][V_2, V_3][V_3, V_4][V_4, V_5]$ e é tal que:

$$\langle c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdot c_4 \rangle = \langle c_{1,1} \rangle \langle c_{2,2} \rangle \langle c_{1,1} \rangle^{-1} \langle c_{2,2} \rangle^{-1}$$

é um comutador em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. Procedendo desta maneira, pelo modo de identificação das arestas de P , poderemos escrever o caminho c como um produto de comutadores em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. Basta definir:

$$c_l = \prod_{i=1}^{4k} c_{l,i} \quad c_{l,i}(t) = I_2, \quad i < l \text{ e } c_{l,j}(t) = A_{l+1}, \quad j > l$$

Por construção temos que $c = c_1 \cdot c_2 \cdot \cdots \cdot c_{4k}$ e

$$\langle c \rangle = \langle c_{1,1} \rangle \langle c_{2,2} \rangle \langle c_{1,1} \rangle^{-1} \langle c_{2,2} \rangle^{-1} \cdots \langle c_{4k-3} \rangle \langle c_{4k-2} \rangle \langle c_{4k-1} \rangle \langle c_{4k} \rangle$$

é um produto de comutadores em $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}$. Como este caminho é claramente fechado em I_2 , em vista do lema 1.7, segue que c é homotópico a zero em $SL(2, \mathbb{R})$. Portanto podemos estender as bases para o interior da 2-célula de M , obtendo assim a trivialização de Y em $SL(2, \mathbb{R})$. ■

Lema 5.3 *Seja $n > 2$. Existe um fibrado orientável X com fibras orientadas $\mathbb{T}^n$ e espaço base $\mathbb{T}^2$ para o qual não existe ação localmente livre de $\mathbb{R}^n$ sobre X cujas órbitas coincidam com as fibras.*

Dem: Suponhamos que $n = 3$ pois a construção descrita aqui se generaliza facilmente para os outros casos. O fibrado X é construído pela suspensão de dois difeomorfismos de $\mathbb{T}^3$:

$$\varphi, \psi : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}^3$$

$$\varphi(z_1, z_2, z_3) = (-z_1, -z_2, z_3)$$

$$\psi(z_1, z_2, z_3) = (z_1, -z_2, -z_3)$$

Então X é o espaço obtido de $[0, 1] \times [0, 1] \times \mathbb{T}^3$ pela identificação de $(1, y, z_1, z_2, z_3)$ com $(0, y, -z_1, -z_2, z_3)$ e de $(x, 1, z_1, z_2, z_3)$ com $(x, 0, z_1, -z_2, -z_3)$. Como φ e ψ são difeomorfismos que preservam a orientação de $\mathbb{T}^3$ segue que X é um fibrado orientável sobre $\mathbb{T}^2$ com fibras $\mathbb{T}^3$. Provaremos que este fibrado não admite ação de $\mathbb{R}^3$ com órbitas iguais às fibras mostrando que o fibrado Y sobre $\mathbb{T}^2$ com fibras $\mathbb{R}^3$ não é um fibrado trivial (Teorema A).

Imitando a demonstração do lema anterior, vamos tentar definir bases sobre os esqueletos de $\mathbb{T}^2$. Para a fibra sobre o 0-esqueleto de $\mathbb{T}^2$ podemos considerar a base canônica de $\mathbb{R}^3$, $\{e_1, e_2, e_3\}$. Agora vamos definir bases para as fibras sobre o 1-esqueleto de $\mathbb{T}^2$. Observe que $\mathbb{T}^2$ é obtido através da identificação dos lados de um retângulo P como ilustrado na figura abaixo:

Considere o fibrado trivial $P \times \mathbb{R}^3$. Neste fibrado devemos definir bases coerentes para as fibras do bordo para que elas se identifiquem pelos difeomorfismos de colagem φ e ψ . Por exemplo, para a fibra sobre o vértice A podemos considerar a base canônica $\{e_1, e_2, e_3\}$. Para o vértice B devemos considerar a base $\{-e_1, -e_2, e_3\}$ para esta se colar bem com a base definida para a fibra sobre A pelo difeomorfismo φ . Um caminho contínuo ligando estas duas bases é:

$$c_i(t) = \begin{bmatrix} \cos \pi t & -\operatorname{sen} \pi t & 0 \\ \operatorname{sen} \pi t & \cos \pi t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como vimos na demonstração do teorema anterior, este caminho define bases para as fibras sobre a 1-célula i de P variando continuamente. A base definida para a fibra sobre C deve ser $\{-e_1, e_2, -e_3\}$ para ela identificar-se com a base definida sobre B via o difeomorfismo ψ . Um caminho contínuo ligando a base $\{-e_1, -e_2, e_3\}$ à base $\{-e_1, e_2, -e_3\}$ é:

$$c_j(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi t & -\operatorname{sen} \pi t \\ 0 & \operatorname{sen} \pi t & \cos \pi t \end{bmatrix}$$

Este caminho define bases para as fibras sobre a 1-célula j de P . Analogamente a base definida sobre D deve ser $\{e_1, -e_2, -e_3\}$. Um caminho ligando as bases $\{-e_1, e_2, -e_3\}$ à base $\{e_1, -e_2, -e_3\}$ é:

$$c_i(t)^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \pi t & \operatorname{sen} \pi t & 0 \\ -\operatorname{sen} \pi t & \cos \pi t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Finalmente, precisamos de um caminho contínuo ligando a base $\{e_1, -e_2, -e_3\}$ à base canônica $\{e_1, e_2, e_3\}$ sobre A . Este caminho é:

$$c_j(t)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi t & \operatorname{sen} \pi t \\ 0 & -\operatorname{sen} \pi t & \cos \pi t \end{bmatrix}$$

Portanto, o caminho $c(t) = c_i(t) c_j(t) c_i(t)^{-1} c_j(t)^{-1} = [c_i(t), c_j(t)]$ nos ensina como definir as bases para as fibras sobre o bordo de P (tal caminho c pode ser visto em 1.8). A figura abaixo ilustra a variação contínua destas bases:

Para o fibrado Y ser trivial precisamos estender este caminho $c : S^1 \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ para o disco D^2 . Mas isto somente é possível quando $c(t)$ for um caminho homotópico a zero em $SL(n, \mathbb{R})$. Observe que c é um caminho fechado em I_n , logo $c \in \widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$. Por construção, vimos que c é um comutador em $\widetilde{SL(n, \mathbb{Z})}$, $c = [c_i, c_j]$. Como vimos no lema 1.5 este caminho é um gerador de $\pi_1(SL(n, \mathbb{R}), I_n) \simeq \mathbb{Z}_2$. Portanto c não é homotópico a uma constante o que implica que não se pode definir bases para as fibras de Y variando continuamente. ■

Observação 5.4 Pela observação 1.6 a demonstração acima não depende da escolha particular dos caminhos c_i e c_j . Ela depende somente das bases definidas sobre os vértices de P .

Para construir os últimos dois exemplos precisamos definir o fibrado de linhas sobre o plano real projetivo P^m . (os casos $m = 2$ e $m = 3$ fornecerão os dois exemplos)

O **plano real projetivo** P^m pode ser definido como o conjunto dos pares $\{x, -x\} = \{\pm x\}$ onde $x \in S^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Em P^m colocamos a topologia quociente induzida de S^m . Seja $E(\gamma_m^1) = \{(\{\pm x\}, v) \in P^m \times \mathbb{R}^{m+1} \mid v = tx, t \in \mathbb{R}\}$ e seja $\pi : E(\gamma_m^1) \rightarrow P^m$ a projeção $\pi(\{\pm x\}, tx) = \{\pm x\}$. Assim cada fibra $\pi^{-1}(\{\pm x\})$ pode ser identificada com a reta em $\mathbb{R}^{m+1}$ passando por x e por $-x$. A uma tal reta podemos induzir uma estrutura de espaço vetorial. Como resultado desta construção, obtemos um fibrado vetorial γ_m^1 sobre P^m com fibra $\mathbb{R}$, o qual será chamado **fibrado canônico de linhas** sobre P^m .

Tem-se que γ_m^1 é um fibrado não trivial para todo $m \geq 1$ e que $E(\gamma_1^1)$ é a faixa de Möbius aberta. Observamos que estas definições e as demonstrações destes resultados podem ser encontradas em [20, páginas 15-17].

Para a demonstração do próximo lema estamos supondo todas as definições de classes de Stiefel-Whitney e alguns resultados básicos desta teoria. Estaremos utilizando, na demonstração abaixo, as mesmas notações encontradas em [20], referência básica que indicamos para a consulta sobre esta teoria.

Lema 5.5 *Seja $m \geq 2$. Existe um fibrado X com fibras orientadas $\mathbb{T}^2$ sobre o plano real projetivo P^m para o qual não existe ação localmente livre de $\mathbb{R}^2$ sobre X cujas órbitas coincidam com as fibras.*

Dem: Seja γ_m^1 o fibrado canônico de linhas sobre P^m e seja $Y = \gamma_m^1 \oplus \gamma_m^1$ a soma de Whitney de dois fibrados canônicos γ_m^1 [20, página 27]. O fibrado Y é induzido pela aplicação diagonal $d: P^m \rightarrow P^m \times P^m$, tem base P^m e fibra $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}^2$. Observe que as fibras de Y são orientadas.

Suponhamos que em cada fibra de γ_m^1 está definida a métrica Riemanniana canônica e diferenciável. Denote os vetores unitários em cada fibra por $\pm v$. Sejam u_1 e u_2 dois vetores em Y com o mesmo ponto base. Dizemos que u_1 e u_2 são equivalentes se e somente se $u_1 - u_2 \in \mathbb{Z}v \oplus \mathbb{Z}v$. Note que esta definição independe da escolha do vetor unitário v . Seja X o quociente de Y por esta relação de equivalência. Então X é um fibrado com fibras orientadas $\mathbb{T}^2$ sobre P^m . Afirmamos que este é o fibrado procurado. De fato, somente precisamos mostrar que o fibrado vetorial Y é não trivial. Isto segue da computação da segunda classe de Stiefel-Whitney de Y , $w_2(Y)$. Temos que a classe total de Stiefel-Whitney de γ_m^1 é $w(\gamma_m^1) = 1 + e$, onde e é o elemento não trivial de $H^1(P^m, \mathbb{Z}_2) \simeq \mathbb{Z}_2$, veja [20, exemplo 2, página 43]. Pelo teorema do produto de Whitney [20, página 37, axioma 3] segue que $w(Y) = 1 + e^2$. Assim, $w_2(Y) = e^2 \neq 0$. Portanto Y é um fibrado não trivial [20, proposição 2, página 38]. ■

Como o plano real projetivo P^m é orientável se m é ímpar, os casos $m = 2$ e $m = 3$ exibem os dois contra-exemplos necessários para o encerramento do Teorema B.

Bibliografia

- [1] L. V. Ahlfors. *Conformal Invariants: Topics in Geometric Function Theory*. McGraw-Hill, New York, 1973.
- [2] P. L. Antonelli, D. Burghilea, and P. J. Kahn. The non-finite homotopy type of some diffeomorphism groups. *Topology*, 11:1–49, 1972.
- [3] A. F. Beardon. *The Geometry of Discrete Groups*, volume 91 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1983.
- [4] L. Bers. *Riemann Surfaces*. New York University, Institute of Mathematical Sciences, New York, 1957-1958.
- [5] C. Camacho e A. Lins Neto. *Teoria Geométrica das Folheações*. Projeto Euclides-IMPA, Rio de Janeiro, 1979.
- [6] M. P. Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1976.
- [7] G. Chatelet and H. Rosenberg. Manifolds which admit $\mathbb{R}^n$ actions. *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.*, 43:245–260, 1974.
- [8] S.S. Chern. An elementary proof of the existence of isothermal parameters on a surface. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 6:771–782, 1955.
- [9] C. J. Earle and J. Eells. A fibre bundle description of Teichmüller theory. *Differential Geometry*, 3:19–43, 1969.
- [10] H. M. Farkas e I. Kra. *Riemann Surfaces*, volume 71 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1980.
- [11] O. Forster. *Lectures on Riemann Surfaces*, volume 81 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1981.
- [12] F. R. Gantmacher. *The Theory of Matrices*, volume 1. Chelsea Publishing, New York, 1960.

- [13] D.L. Johnson. *Presentations of groups*, volume 15 of *London Mathematical Society Student Texts*. Cambridge University Press, New York, 1990.
- [14] O. Lehto. *Univalent Functions and Teichmüller Spaces*, volume 109 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1987.
- [15] E. L. Lima. Common singularities of commuting vector fields on 2-manifolds. *Comment. Math. Helv.*, 39:97–110, 1964.
- [16] E. L. Lima. Commuting vectors fields on S^3 . *Annals of Mathematics*, 81(2):71–81, 1965.
- [17] E. L. Lima. *Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento*. Projeto Euclides-IMPA, Rio de Janeiro, 1993.
- [18] W. Magnus. *Noneuclidean Tessellations and Their Groups*, volume 61 of *Pure and Applied Mathematics*. Academic Press, New York, 1974.
- [19] W. S. Massey. *Algebraic Topology: an introduction*. Harcourt, Brace and World, Inc., New York, 1967.
- [20] J. W. Milnor e J. D. Stasheff. *Characteristic Classes*, volume 76 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, 1974.
- [21] H. Rosenberg, R. Roussarie, and D. Weil. A classification of closed orientable 3-manifolds of rank two. *Annals of Mathematics*, 91(3):449–464, May 1970.
- [22] J. J. Rotman. *The Theory of Groups: an introduction*. Allyn and Bacon, Inc., Boston, second edition, 1973.
- [23] N. C. Saldanha. Actions of $\mathbb{R}^n$ over T^n -fibrations. *Pre-print, Informes de Matemática-IMPA*, (Série A-098/94), 1994.
- [24] N. C. Saldanha. An introduction to geometric topology: Geometric structures on manifolds of dimensions 2 and 3. *Contemporary Mathematics*, 161:175–216, 1994.
- [25] J. P. Serre. *Trees*. Springer-Verlag, New York, 1980.
- [26] N. Steenrod. *The Topology of Fibre Bundles*. Princeton University Press, Princeton, 1951.
- [27] D. Tischler. Manifolds M^n of rank $n - 1$. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 94:158–160, May 1985.

Índice Remissivo

- $G(W | S)$, 28
- $\Gamma(\omega_1, \omega_2)$, 24
- $\pi_1(SL(n, \mathbb{R}))$, $n \geq 3$, 7
- $\pi_1(SO(2))$, 6
- $\widetilde{SL(n, \mathbb{R})}$, 9
- $SL(n, \mathbb{Z})$, 10
- órbita, 1
- ação, 1
 - localmente livre, 1
- abelianização, 11
- aplicação
 - afim, 44
 - analítica, 24
 - anti-conforme, 22
 - conforme, 22
- atlas complexo, 22
- automorfismo de recobrimento, 28
- campos comutativos, 1
- carta
 - complexa, 22
 - isotérmica, 25
- comutador, 11
- decomposição polar, 5
- equivalência conforme, 24
- espaço orbital, 27
- estrutura afim, 43
 - variando diferenciavelmente, 44
- estrutura complexa, 23
 - levantada, 32
 - projetada, 33
- fibração
 - de $SO(n)$, 6
- fibrado, 41
 - aplicação entre, 42
 - base, 41
 - diferenciável, 43
 - equivalentes, 42
 - espaço total, 41
 - fibra típica, 41
 - funções coordenadas, 41
 - G-equivalentes, 43
 - G-imagem, 43
 - grupo estrutural, 41
 - produto, 43
 - projeção, 41
 - seção, 41
 - sistema de transformações de coordenadas, 42
 - transformações de coordenadas, 41
 - trivial, 43
 - vetorial, 43
 - vizinhanças coordenadas, 41
- fibrado canônico de linhas, 67
- fibras coerentemente orientadas, 45
- fluxo, 1
- geradores
 - para $\pi_1(SO(2))$, 6
 - para $\pi_1(SO(n))$, $n \geq 3$, 8
- geradores infinitesimais, 1
- grupo
 - livre de pontos fixos, 27
 - propriamente descontínuo, 27

propriamente descontínuo(lehto), 29
grupos clássicos, 5

lattice, 24

mudança de cartas, 22

plano real projetivo, 67
posto, 1

quatérnios, 7

subgrupo de isotropia, 52

superfície, 25

superfície de recobrimento, 26

superfície de Riemann, 23

equivalência conforme, 25

Teorema A, 3

Teorema B, 3

toros, 23

vizinhança conveniente, 27