Resolubilidade global de uma classe de
campos vetoriais

Rafael Borro Gonzalez

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Resolubilidade global de uma classe de campos vetoriais

Rafael Borro Gonzalez

Orientador: *Prof. Dr. Adalberto Panobianco Bergamasco*

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC-USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências - Matemática.
VERSÃO REVISADA.

USP – São Carlos
Fevereiro/2011

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi
e Seção Técnica de Informática, ICMC/USP,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B737r Borro Gonzalez, Rafael
Resolubilidade global de uma classe de campos
vetoriais / Rafael Borro Gonzalez; orientador
Adalberto Panobianco Bergamasco -- São Carlos, 2011.
95 p.

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Matemática) -- Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação, Universidade de São Paulo, 2011.

1. Resolubilidade global. 2. Campos vetoriais. 3.
Soluções periódicas. I. Panobianco Bergamasco,
Adalberto, orient. II. Título.

*Aos meus pais,
Marcos e
Dora.*

Agradecimentos

À Deus, por me abençoar com um trabalho que me faz feliz.

Aos meus pais, Marcos e Dora, que sempre me apoiaram e me incentivaram a estudar.

Agradeço à minha avó Janir, pela acolhida, carinho e pelos cuidados durante os anos de graduação.

Também agradeço à minha avó Levina, por todas as orações.

Sou muitíssimo grato ao meu orientador e amigo Adalberto, pelos valiosos ensinamentos sobre matemática que tem me fornecido durante esses anos que estamos trabalhando juntos.

Também sou grato aos meus amigos Carlos, Andreza, Nelson, Vinícius, Apoenã, Thaís e Alex; foi muito bom construir conhecimento ao lado deles.

Agradeço à minha namorada Ana, pelo amor que tem me dado e pelos momentos de descontração que me proporciona.

Por fim, agradeço o apoio financeiro da FAPESP.

Resumo

O tema em estudo é a resolubilidade global de campos vetoriais em $\mathbb{T}_{(x,t)}^2$ da forma $L = \partial_t + a(x)\partial_x$, onde $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é uma função real. Consideraremos o caso em que o operador L age no espaço de funções e o caso em que L age no espaço de distribuições. Utilizando teoria de distribuições, forneceremos condições necessárias e suficientes para que a imagem de L seja um subespaço fechado, ou seja, para que L seja globalmente resolúvel. O caso mais interessante ocorre quando a função a se anula em algum ponto mas não é identicamente nula; neste caso, L será globalmente resolúvel se, e somente se, $a^{-1}(0)$ contiver apenas zeros de ordem finita. Faremos também o estudo da resolubilidade global de operadores da forma $P = \partial_t + \partial_x(a \cdot)$, os quais são perturbações por um termo de ordem zero dos campos da forma L . Os operadores da forma P surgem quando consideramos o transposto de um operador da forma L .

Abstract

The topic under study is the global solvability of vector fields of the form $\mathbf{L} = \partial_t + a(x)\partial_x$ on the 2-torus $\mathbb{T}_{(x,t)}^2$, where $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ is a real valued function. We consider the operator $\mathbf{L}$ acting on both spaces of functions and distributions. Using distribution theory we give necessary and sufficient conditions for the closedness of the range of $\mathbf{L}$, ie, for $\mathbf{L}$ to be globally solvable. The most interesting case occurs when a vanishes somewhere but not everywhere; in this case, we show that a necessary and sufficient condition for $\mathbf{L}$ to be globally solvable is that each zero of a is of finite order. We also study the global solvability of operators of the form $\mathbf{P} = \partial_t + \partial_x(a\cdot)$, which are perturbations of $\mathbf{L}$ by a term of zero order. The operators $\mathbf{P}$ appear when we consider the transpose operator of $\mathbf{L}$.

Sumário

Introdução	11
1 Preliminares	13
I Espaços vetoriais topológicos	13
2 Teoria das distribuições	19
I Funções-teste	19
II Distribuições	27
III Distribuições no toro	46
IV Série de Fourier e produto tensorial	54
3 Resolubilidade global	59
I Resolubilidade global no espaço de funções	61
II Resolubilidade global no espaço de distribuições	79
A Campos vetoriais com coeficientes constantes no toro bidimensional	87
Referências Bibliográficas	91
Índice Remissivo	93
Índice de Notações	95

Introdução

O estudo da resolubilidade local de EDP lineares de tipo principal (por exemplo, campos vetoriais reais ou complexos) recebeu um grande impulso em 1963 com a publicação do artigo [13] de Nirenberg e Treves; nesse trabalho foi formulada pela primeira vez a condição (P), a qual (conforme foi demonstrado após um bom número de artigos e de anos) é necessária e suficiente para a resolubilidade local de operadores do tipo $L = \partial_t + a(x)\partial_x$, onde $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é uma função real. Na maioria de tais resultados, trata-se da existência de soluções fracas (distribuições) quando o segundo membro é de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Para o estudo da resolubilidade global, interpretaremos um campo vetorial em $\mathbb{T}^2$ como um operador $L : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Assim, o transposto de L será um operador agindo no espaço de distribuições $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Também faz sentido considerar o operador L agindo no espaço das distribuições $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Em ambos os casos, diremos que L será *globalmente resolúvel* quando sua imagem for um subespaço fechado. Utilizando resultados de Análise Funcional, verifica-se que a imagem de L será um subespaço fechado se, e somente se, a imagem de L for um subespaço que contenha o ortogonal ao núcleo do transposto tL . Dessa forma, L será globalmente resolúvel se, e somente se, para cada f que estiver no ortogonal ao núcleo do transposto, existir u tal que $Lu = f$.

Neste trabalho, estudaremos a resolubilidade global de uma determinada classe de campos vetoriais reais em $\mathbb{T}^2_{(x,t)}$, a saber, $L = \partial_t + a(x)\partial_x$, onde $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é uma função real. Se a for a função identicamente nula ou se a for uma função que não se anula em $\mathbb{T}^1$, então o estudo da resolubilidade global de L se reduz ao estudo da resolubilidade global de campos vetoriais com coeficientes constantes. Quando a se anular em algum ponto e não for identicamente nula, L será globalmente resolúvel se, e somente se, os zeros de a forem todos de ordem finita.

Quando calculamos o transposto de um operador da forma $L : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, obtemos ${}^tL : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$, onde ${}^tL = \partial_t + \partial_x(a \cdot)$. Também será interessante analisar a resolubilidade global dos operadores da forma $P = \partial_t + \partial_x(a \cdot)$, os quais são perturbações por um termo de ordem zero dos operadores da forma L . Para a classe de operadores da forma P , obtemos os mesmos resultados que aparecem na resolubilidade global dos operadores da forma L .

Diremos que um operador $L : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ será *fortemente resolúvel* quando sua imagem for um subespaço de codimensão finita. Alguns resultados de Análise Funcional fornecem a seguinte caracterização para a resolubilidade forte (veja comentário após a Definição (1.2) de [4]): um operador $L : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ será fortemente resolúvel se, e somente se, a imagem de L for um subespaço fechado e o núcleo do operador transposto tL for um subespaço de dimensão finita.

Além da resolubilidade global, analisaremos se os operadores das formas L e P são fortemente resolúveis; analisaremos também se tais operadores são sobrejetores.

✓

Preliminares

No presente capítulo, apresentaremos alguns resultados básicos de Análise Funcional, os quais serão utilizados no estudo da resolubilidade global de certos campos vetoriais que realizaremos posteriormente.

I Espaços vetoriais topológicos

Adotaremos a Definição (1.6) da referência [15] para espaços vetoriais topológicos; a saber, um *espaço vetorial topológico* será um espaço vetorial X munido de uma topologia τ que satisfaz as seguintes condições:

(i) Para cada $x \in X$, o conjunto $\{x\}$ é fechado.

(ii) A adição

$$X \times X \ni (x, y) \mapsto x + y \in X$$

e a multiplicação por escalar

$$\mathbb{C} \times X \ni (\alpha, x) \mapsto \alpha x \in X$$

são contínuas, considerando em X a topologia τ e considerando a topologia produto em $X \times X$ e $\mathbb{C} \times X$.

Desta forma, todo espaço vetorial topológico será um espaço de Hausdorff, conforme Teorema (1.12) de [15].

Denotaremos por X' o espaço dual topológico de um espaço vetorial topológico X . Em X' existem algumas topologias canônicas, as quais tornam X' um espaço vetorial topológico localmente convexo (veja a definição de espaço vetorial topológico localmente convexo em [15]).

As duas topologias mais importantes no nosso estudo são as chamadas topologia *fraca** e a topologia *forte*. A definição da topologia *fraca** pode ser consultada no item 3.14 da referência [15] e a definição da topologia *forte* pode ser consultada na página 198 da referência [17]. Observamos que na referência [17] a topologia que chamamos de *fraca** é chamada apenas de topologia *fraca*, a qual está definida na página 197.

Uma base local de vizinhanças da origem na topologia *fraca** é dada pela coleção de conjuntos da forma $V_\epsilon(x_1, \dots, x_n) = \{x' \in X'; |\langle x', x_j \rangle| < \epsilon, j = 1, \dots, n\}$, qualquer que seja $\{x_1, \dots, x_n\}$ um subconjunto finito de X e qualquer que seja $\epsilon > 0$ um número real. Para a topologia *forte*, uma base local de vizinhanças da origem é dada pela coleção de conjuntos da forma $W(B) = \{x' \in X'; \sup_{x \in B} |\langle x', x \rangle| \leq 1\}$, qualquer que seja B um subconjunto limitado de X . O conjunto $W(B)$ é chamado o *polar* de B .

O espaço dual munido da topologia *fraca** será denotado por X'_σ e o espaço dual munido da topologia *forte* será denotado por X'_b .

Pode-se comparar a topologia *fraca** com a topologia *forte*, obtendo que a topologia *forte* é mais fina que a topologia *fraca**.

Dados $M \subset X$ e $N \subset X'$ subespaços vetoriais, definimos os anuladores de M e N por ${}^\circ M = \{x' \in X'; \langle x', x \rangle = 0, \text{ se } x \in M\}$ e $N^\circ = \{x \in X; \langle x', x \rangle = 0, \text{ se } x' \in N\}$, respectivamente.

É fácil ver que $N^\circ \subset X$ é um subespaço vetorial fechado, pois $N^\circ = \bigcap_{x' \in N} x'^{-1}(0)$. Também pode-se provar que ${}^\circ M \subset X'$ é um subespaço vetorial fechado na topologia *fraca**; de fato, se considerarmos a topologia *fraca** em X' , então cada $x'' \in (X'_\sigma)'$ é da forma $J(x) \in X''$, onde $J(x)$ é o funcional linear contínuo dado por $\langle J(x), x' \rangle = \langle x', x \rangle$, para todo $x' \in X'$ (veja 3.14 e o Teorema 3.10 da referência [15]). A identidade ${}^\circ M = \bigcap_{x \in M} \ker J(x)$ implica que ${}^\circ M \subset X'$ é um subespaço fechado na topologia *fraca**.

Quando X for um espaço vetorial localmente convexo, a aplicação $J : X \rightarrow (X'_\sigma)'$ será um isomorfismo linear entre os espaços vetoriais X e $(X'_\sigma)'$. Tal afirmação é dada pela Proposição (35.1) da referência [17].

Segue da Proposição (19.6) da referência [17] que podemos considerar $J : X \rightarrow (X'_b)'$ e pela Proposição (19.7) da referência [17] segue que $J : X \rightarrow (X'_b)'$ será injetora, sempre que X for um espaço vetorial topológico localmente convexo.

Um espaço vetorial topológico localmente convexo X será dito *semireflexivo* quando $J : X \rightarrow (X'_b)'$ for sobrejetora, isto é, quando J for um isomorfismo entre os espaços vetoriais X e $(X'_b)'$. Diremos que um espaço vetorial topológico localmente convexo X será *reflexivo* se J for um homeomorfismo linear (isomorfismo na categoria de espaço vetorial topológico) entre X e $(X'_b)'_b$.

O fecho de um subconjunto $Z \subset X'$ na topologia *fraca** será denotado por $\overline{Z}^{\omega*}$ e o fecho de Z na topologia *forte* será denotado por $\overline{Z}$.

Diretamente da definição de anulador obtemos $M \subset ({}^\circ M)^\circ$ e como $({}^\circ M)^\circ$ é fechado, temos $\overline{M} \subset ({}^\circ M)^\circ$. Por outro lado, se X for localmente convexo, uma aplicação do Teorema de Hanh-Banach (veja (3.5) de [15]) garante que vale a igualdade $\overline{M} = ({}^\circ M)^\circ$, pois se existir $x_0 \in ({}^\circ M)^\circ \setminus \overline{M}$, então existirá $x' \in X'$ com $\langle x', x_0 \rangle \neq 0$ e $x' \in {}^\circ M$, o que é uma contradição.

Também é imediato verificar que $N \subset {}^\circ(N^\circ)$ e como ${}^\circ(N^\circ) \subset X'$ é fechado na topologia *fraca**, daí temos $\overline{N}^{\omega*} \subset {}^\circ(N^\circ)$. Como X' munido da topologia *fraca** é sempre localmente convexo, se existir $x'_0 \in {}^\circ(N^\circ) \setminus \overline{N}^{\omega*}$, segue novamente do Teorema (3.5) de [15] que existirá $J(x) \in X''$ tal que $\langle x'_0, x \rangle = \langle J(x), x'_0 \rangle \neq 0$ e $\langle x', x \rangle = \langle J(x), x' \rangle = 0$, para todo $x' \in N$. Então $x \in N^\circ$ e $\langle x'_0, x \rangle \neq 0$; uma contradição com a hipótese de que $x'_0 \in {}^\circ(N^\circ)$.

As considerações acima demonstram a seguinte proposição.

1.1 Proposição. *Seja X um espaço vetorial topológico. Para quaisquer $M \subset X$ e $N \subset X'$ subespaços vetoriais, temos*

- (i) $\overline{M} \subset ({}^\circ M)^\circ$ e vale a igualdade $\overline{M} = ({}^\circ M)^\circ$ sempre que X for localmente convexo.
- (ii) $\overline{N}^{\omega*} = {}^\circ(N^\circ)$.

Sejam X e Y dois espaços vetoriais topológicos. A cada transformação linear contínua $T : X \rightarrow Y$ podemos associar, de maneira natural, uma transformação linear entre os espaços duais Y' e X' . Tal transformação linear é dita o *transposto* de T e definida por ${}^tT(y') \doteq y' \circ T$, para todo $y' \in Y'$. Vale deixar registrado que tT é uma transformação linear contínua, considerando em ambos os duais Y' e X' a topologia *fraca** ou considerando em ambos os duais a topologia *forte*, conforme o corolário da Proposição (19.5) da referência [17].

A próxima proposição fornece duas relações entre os núcleos e as imagens de T e tT .

1.2 Proposição. *Seja $T : X \rightarrow Y$ uma transformação linear contínua entre os espaços vetoriais topológicos localmente convexos X e Y . Então*

(i) $(\ker {}^tT)^\circ = \overline{\mathcal{R}(T)}$, onde $\mathcal{R}(T)$ denota a imagem da transformação T .

(ii) ${}^\circ(\ker T) = \overline{\mathcal{R}({}^tT)}^{\omega^*}$.

Prova: (i) Das definições de anulador e da definição de transposto segue que $\ker {}^tT = {}^\circ\mathcal{R}(T)$. Pela Proposição (1.1) temos $\ker({}^tT)^\circ = \overline{\mathcal{R}(T)}$.

(ii) O fato de Y ser localmente convexo implica que Y' separa pontos em Y (veja o corolário do Teorema (3.4) da referência [15]). Utilizando tal resultado é possível verificar que $\ker T = \mathcal{R}({}^tT)^\circ$ e da Proposição (1.1) segue que ${}^\circ(\ker T) = \overline{\mathcal{R}({}^tT)}^{\omega^*}$. ■

Quando X for um espaço vetorial topológico, cuja topologia seja induzida por uma métrica invariante e completa, diremos que X será um F -espaço. Se X for um F -espaço localmente convexo, então X será dito um *espaço de Fréchet*.

1.3 Proposição. *Sejam X um F -espaço, Y um espaço de Fréchet e $T : X \rightarrow Y$ uma transformação linear contínua com imagem fechada em Y . Então ${}^tT : Y' \rightarrow X'$ possui imagem fraca* fechada em X' .*

Prova: Segue da Proposição (1.2) que basta demonstrarmos a inclusão

$${}^\circ(\ker T) \subset \mathcal{R}({}^tT).$$

Tomemos então $x' \in {}^\circ(\ker T)$. Nosso objetivo é exibir $y' \in Y'$ tal que ${}^tTy' = x'$; o que ocorre se, e somente se, $\langle y', Tx \rangle = \langle {}^tTy', x \rangle = \langle x', x \rangle$, para todo $x \in X$.

Considere $\Delta : \mathcal{R}(T) \rightarrow \mathbb{C}$ o funcional linear dado por $\Delta Tx = \langle x', x \rangle$, para todo $x \in X$. Note que Δ está bem definido, pois $x' \in {}^\circ(\ker T)$.

Se Δ for um funcional linear contínuo, o fato de Y ser localmente convexo implicará que existe $y' \in Y'$ tal que $y' = \Delta$ em $\mathcal{R}(T)$, conforme o Teorema (3.6) da referência [15], o qual é uma consequência do Teorema de Hahn-Banach. Assim, $\langle {}^tTy', x \rangle = \langle y', Tx \rangle = \Delta Tx = \langle x', x \rangle$, para todo $x \in X$, ou seja, ${}^tTy' = x'$ e então $x' \in \mathcal{R}({}^tT)$.

Verifiquemos agora que Δ é contínuo, ou seja, que Δ é contínuo na origem. Observe que $\mathcal{R}(T)$ é um espaço de Fréchet, pois por hipótese $\mathcal{R}(T)$ é um subespaço fechado do espaço de Fréchet Y . Assim, do Corolário (2.12) da referência [15], o qual é uma consequência do Teorema da Aplicação Aberta, segue que $T : X \rightarrow \mathcal{R}(T)$ é uma aplicação

aberta. Como $x' : X \rightarrow \mathbb{C}$ é contínuo, dado $\epsilon > 0$, existe um aberto $U \subset X$ que contém a origem e satisfaz $x'(U) \subset B(0, \epsilon) \subset \mathbb{C}$, logo $T(U) \subset \mathcal{R}(T)$ é um aberto que satisfaz $0 = T(0) \in T(U)$ e $\Delta(T(U)) = x'(U) \subset B(0, \epsilon)$, o que prova a continuidade de Δ . ■

Algumas vezes será interessante conhecer o bitransposto de uma transformação linear $T : X \rightarrow Y$, onde X e Y são espaços vetoriais topológicos. Podemos considerar o bitransposto de T como o transposto de ${}^tT : Y'_\sigma \rightarrow X'_\sigma$ ou como o transposto de ${}^tT : Y'_b \rightarrow X'_b$. Denotaremos o bitransposto de T por ${}^{tt}T$.

Na próxima proposição, destacaremos uma propriedade envolvendo os anuladores dos núcleos do operador T e do seu bitransposto ${}^{tt}T$.

1.4 Proposição. *Sejam $T : X \rightarrow Y$ uma transformação linear contínua entre espaços vetoriais localmente convexos e ${}^tT : Y'_\sigma \rightarrow X'_\sigma$ seu transposto. Então ${}^{tt}T : (X'_\sigma)' \rightarrow (Y'_\sigma)'$ satisfaz ${}^\circ(\ker T) = (\ker {}^{tt}T)^\circ$.*

Prova: Utilizando o fato de que ambas as aplicações canônicas $J_X : X \rightarrow (X'_\sigma)'$ e $J_Y : Y \rightarrow (Y'_\sigma)'$ são isomorfismos entre espaços vetoriais, obtemos as seguintes propriedades:

- (i) $T = J_Y^{-1} \circ {}^{tt}T \circ J_X$.
- (ii) $\ker(J_Y^{-1} \circ {}^{tt}T \circ J_X) = J_X^{-1}(\ker {}^{tt}T)$.
- (iii) ${}^\circ[\ker(J_Y^{-1} \circ {}^{tt}T \circ J_X)] = (\ker {}^{tt}T)^\circ$.

Por fim, (i) e (iii) implicam que ${}^\circ(\ker T) = (\ker {}^{tt}T)^\circ$. ■

Vale observar que a única propriedade utilizada na demonstração da proposição acima é o fato de que J_X e J_Y são isomorfismos na categoria de espaços vetoriais. Utilizando a mesma demonstração obtemos a proposição a seguir.

1.5 Proposição. *Seja $T : X \rightarrow Y$ uma transformação linear contínua entre espaços vetoriais localmente convexos e semireflexivos. Considere o transposto ${}^tT : Y'_b \rightarrow X'_b$. Então ${}^{tt}T : (X'_b)' \rightarrow (Y'_b)'$ satisfaz ${}^\circ(\ker T) = (\ker {}^{tt}T)^\circ$.*

Teoria das distribuições

A teoria das distribuições é fundamental no estudo da resolubilidade global que desenvolveremos no capítulo seguinte. Neste segundo capítulo, apresentaremos as ferramentas da teoria das distribuições necessárias para tal estudo.

I Funções-teste

Começaremos introduzindo algumas notações que são utilizadas na teoria de distribuições. Um subconjunto aberto arbitrário de $\mathbb{R}^N$ será denotado por Ω e um intervalo aberto arbitrário de $\mathbb{R}$ será denotado por I . Denotaremos por $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ o espaço vetorial formado pelas funções a valores complexos, definidas e infinitamente diferenciáveis em Ω , isto é, $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ se $\partial^\alpha \phi = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \left(\cdots \left(\frac{\partial^{\alpha_N}}{\partial x_N^{\alpha_N}} \phi \right) \right) = \partial_{x_1}^{\alpha_1} (\cdots (\partial_{x_N}^{\alpha_N} \phi))$ existir e for contínua, para cada multi-índice α de inteiros não negativos. O suporte de cada função $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ será denotado por $S(f)$.

O subespaço de $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ formado pelas funções que possuem suporte compacto será denotado por $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ e $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ denotará o subespaço de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ formado pelas funções T -periódicas em cada variável, onde $0 < T \in \mathbb{R}$.

Se $x = (x_1, \dots, x_N) \in \Omega \subset \mathbb{R}^N$, $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ e $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_N)$ são dois multi-índices em $\mathbb{Z}^N$, escrevemos

$\alpha \leq \beta$, se $\alpha_j \leq \beta_j$, para cada $j = 1, \dots, N$,

$$|\alpha| = \sum_{j=1}^N |\alpha_j|,$$

$$x^\alpha = \prod_{j=1}^N x_j^{\alpha_j}.$$

Se $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^N$, escrevemos

$$\alpha! = \prod_{j=1}^N \alpha_j!,$$

$$\binom{\beta}{\alpha} = \frac{\beta!}{\alpha!(\beta - \alpha)!} = \prod_{j=1}^N \binom{\beta_j}{\alpha_j}, \text{ se } \alpha \leq \beta,$$

Vale também destacar duas ferramentas da análise muito utilizadas na teoria das distribuições. A *regra de Leibniz*,

$$\partial^\alpha(\phi\psi) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta \phi)(\partial^{\alpha-\beta} \psi),$$

onde $\phi, \psi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ e a *fórmula de Taylor com resto integral*, dada por

$$\phi(x+y) = \sum_{|\alpha| < k} (\partial^\alpha \phi)(x) y^\alpha / \alpha! + k \int_0^1 (1-t)^{k-1} \sum_{|\alpha|=k} (\partial^\alpha \phi)(x+ty) y^\alpha / \alpha! dt,$$

onde ϕ é uma função $\mathbb{C}^k$ em uma vizinhança do segmento $[x, x+y] \subset \mathbb{R}^N$.

Em cada um dos espaços vetoriais descritos anteriormente existe uma topologia que os tornam espaços vetoriais localmente convexos e completos. Em $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ fixaremos a topologia induzida pela família de seminormas

$$\rho_k(\theta) = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^N \\ |\alpha| \leq k}} |(\partial^\alpha \theta)(x)|,$$

onde $k \in \mathbb{N}$. Segue do Teorema (1.37) da referência [15] que tal topologia é localmente convexa, cada seminorma ρ_k é contínua e uma base local de vizinhanças da origem é dada pelas interseções finitas de conjuntos da forma $V(\rho_k, n) = \{\theta \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N); \rho_k(\theta) < 1/n\}$, com $k, n \in \mathbb{N}$. Do Teorema (1.24) da referência [15] segue que tal topologia é metrizável e da Observação (1.38) (c) de [15] segue que tal topologia coincide com a topologia

induzida pela métrica

$$d(\theta, \tilde{\theta}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\rho_k(\theta - \tilde{\theta})}{2^k(1 + \rho_k(\theta - \tilde{\theta}))}.$$

Verifica-se também que $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ é completo, ou seja, um espaço de Fréchet.

A próxima proposição caracteriza a convergência das sequências em $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$. Sua demonstração pode ser consultada na página 3 da referência [18].

2.1 Proposição. *Uma sequência $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para a função nula em $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ se, e somente se, $(\rho_k(\theta_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge para zero em $\mathbb{C}$, para cada $k \in \mathbb{N}$, isto é, $(\partial^\alpha \theta_n)$ converge uniformemente em $\mathbb{R}^N$ para a função nula, para cada $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$.*

O espaço vetorial $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ também possui uma topologia localmente convexa, metrizável e completa. Seja $(K_j)_{j \in \mathbb{N}}$ uma sequência de conjuntos compactos que forma uma exaustão do aberto $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, isto é, para cada $j \in \mathbb{N}$ temos $K_j \subset K_{j+1}$ e $\Omega = \cup_{j \in \mathbb{N}} K_j$ (a Proposição (4) da página 278 da referência [5] garante que tal exaustão existe). Para cada $j \in \mathbb{N}$, defina a seminorma

$$\sigma_j(\phi) = \sup_{x \in K_j, |\alpha| \leq j} |(\partial^\alpha \phi)(x)|.$$

Como anteriormente, tais seminormas induzem uma topologia localmente convexa e metrizável, com relação a qual cada seminorma σ_j é contínua. Uma base local de vizinhanças da origem é dada pela família de conjuntos da forma $V_j = \{\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega); \sigma_j(\phi) < 1/j\}$ e $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ munido de tal topologia é completo, conforme o Exemplo (1.46) da referência [15].

Existe uma maneira de caracterizar a convergência das sequências em $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$. Se uma sequência $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para a função nula em $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$, a continuidade de cada seminorma σ_j fornece que $(\sigma_j(\phi_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge para zero em $\mathbb{C}$, para cada $j \in \mathbb{N}$. Reciprocamente, suponha que $(\sigma_j(\phi_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge para zero em $\mathbb{C}$, para todo $j \in \mathbb{N}$. Então, para cada vizinhança da origem V_{j_0} , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma_{j_0}(\phi_n) < 1/j_0$, para todo $n \geq n_0$; isto é, $\phi_n \in V_{j_0}$, para todo $n \geq n_0$ e, assim, $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para a função nula em $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$. Por fim, o fato de $(\sigma_j(\phi_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergir para zero em $\mathbb{C}$, para todo $j \in \mathbb{N}$, é equivalente a dizer que cada sequência $(\partial^\alpha \phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente em K para a função nula, quaisquer que sejam $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$ e $K \subset \Omega$ um compacto.

Os argumentos acima demonstram a seguinte proposição.

2.2 Proposição. *Uma sequência $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para a função nula em $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ se, e somente se, para cada $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$, a sequência $(\partial^\alpha \phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente para a função nula em subconjuntos compactos de Ω .*

Descreveremos agora uma topologia em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Considere $(K_j)_{j \in \mathbb{N}}$ uma exaustão de $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ por subconjuntos compactos e seja $\mathcal{C}_c^\infty(K_j)$ o subespaço de $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ formado pelas funções que possuem suporte contido em K_j . Uma sequência de seminormas em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ é dada por

$$\|\phi\|_n = \sup_{\substack{x \in \Omega; \\ |\alpha| \leq n}} |(\partial^\alpha \phi)(x)|, \quad n \in \mathbb{Z}_+.$$

Restringindo a sequência de seminormas $(\|\cdot\|_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ a cada espaço $\mathcal{C}_c^\infty(K_j)$ e considerando em $\mathcal{C}_c^\infty(K_j)$ a topologia induzida por tal sequência de seminormas, obtemos, segundo os resultados (1.46) e (6.2) da referência [15], uma sequência crescente de espaços de Fréchet $\mathcal{C}_c^\infty(K_1) \subset \cdots \subset \mathcal{C}_c^\infty(K_j) \subset \mathcal{C}_c^\infty(K_{j+1}) \subset \cdots$ onde a topologia de $\mathcal{C}_c^\infty(K_j)$ coincide com a topologia induzida de $\mathcal{C}_c^\infty(K_{j+1})$, uma vez que uma base local de vizinhanças da origem em $\mathcal{C}_c^\infty(K_j)$ é dada pela coleção $V_n = \{\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(K_j); \|\phi\|_n < 1/n\}$, $n \in \mathbb{N}$.

Como $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega) = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_c^\infty(K_j)$, existe uma única topologia localmente convexa em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, chamada de topologia limite indutivo (veja Apêndice B.2 da referência [9]), com relação a qual uma base local convexa e equilibrada da origem é dada pela família $\mathcal{B}$ de conjuntos convexos e equilibrados $W \subset \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, tais que $W \cap \mathcal{C}_c^\infty(K_j)$ é um subconjunto aberto de $\mathcal{C}_c^\infty(K_j)$, para todo $j \in \mathbb{N}$ (veja a definição de subconjunto equilibrado na referência [15]). A demonstração de tal afirmação pode ser encontrada em (6.3) e (6.4) da referência [15], uma vez que a família $\mathcal{B}$ coincide com a família formada pelos conjuntos convexos e equilibrados $W' \subset \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ tais que $W' \cap \mathcal{C}_c^\infty(K)$ é aberto em $\mathcal{C}_c^\infty(K)$, para todo compacto $K \subset \Omega$. Segue da demonstração do Teorema (6.5)(a) de [15] que cada inclusão $i_K : \mathcal{C}_c^\infty(K) \rightarrow \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ é contínua. Mais ainda, tal topologia é a topologia localmente convexa mais fina em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ que torna cada inclusão i_K contínua.

A convergência das sequências em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ se caracteriza conforme o teorema abaixo, o qual encontra-se demonstrado no Teorema (6.5) da referência [15].

2.3 Teorema. *Uma sequência $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para a função nula em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ se, e somente se, existe um compacto $K \subset \Omega$ que contém o suporte de cada ϕ_n e cada sequência $(\partial^\alpha \phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente em Ω para a função nula, onde $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$.*

2.4 Observação. A topologia limite indutivo em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ não é metrizável, mas isso não é relevante no que diz respeito à continuidade de um funcional linear definido em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Tal afirmação é uma consequência do Teorema (6.6) da referência [15], que afirma o seguinte: se Y for um espaço localmente convexo e se $T : \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \rightarrow Y$ for uma transformação linear, então T será contínua se, e somente se, $(T(\phi_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergir para zero em Y , para cada sequência $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge para a função nula em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$.

A partir de uma função $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ e um compacto $K \subset \Omega$, podemos obter uma função em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ que coincida com ϕ em uma vizinhança do compacto K . Tal resultado é uma consequência do seguinte lema, conhecido como *lema da função de corte*, cuja demonstração pode ser consultada na página 25 da referência [11].

2.5 Lema. *Seja $K \subset \Omega \subset \mathbb{R}^N$ um compacto. Então existe $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, tal que $0 \leq \phi \leq 1$ e $\phi \equiv 1$ em uma vizinhança de K .*

O próximo teorema fornece uma maneira de escrever uma função $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ como uma soma de funções com suportes menores. Sua demonstração pode ser consultada na página 27 da referência [11].

2.6 Teorema. (i) *Sejam $\{\Omega_j\}_{j \in J}$ uma família de subconjuntos abertos de $\mathbb{R}^N$, $\Omega = \bigcup_{j \in J} \Omega_j$ e $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Para cada $j \in J$, existe $\phi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j)$ com $\phi_j \not\equiv 0$ apenas para um número finito de índices $j \in J$, satisfazendo*

$$\phi = \sum_{j \in J} \phi_j.$$

Se ϕ for não negativa, podemos tomar cada ϕ_j também não negativa.

(ii) *Sejam $\{\Omega_j\}_{j \in J}$ uma família de subconjuntos abertos de $\mathbb{R}^N$ e K um subconjunto compacto de $\bigcup_{j \in J} \Omega_j$. Para cada $j \in J$, existe $0 \leq \phi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j)$, com apenas um número finito não identicamente nula, satisfazendo*

$$\sum_{j \in J} \phi_j \leq 1,$$

com igualdade em uma vizinhança de K .

O próximo teorema é um resultado atribuído a Borel.

2.7 Teorema. *Sejam $(v_j)_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$, $x_0 \in \mathbb{R}$ e $A \subset \mathbb{R}$ um aberto contendo x_0 . Então existe $r > 0$ e uma função $v(x, t)$ em $\mathcal{C}^\infty(A \times \mathbb{R})$ que é 2π -periódica na variável t , satisfaz $S(v) \subset [x_0 - r, x_0 + r] \times \mathbb{R} \subset A \times \mathbb{R}$ e*

$$(\partial_x^j v)(x_0, t) = v_j(t);$$

para todo $t \in \mathbb{R}$ e todo $j \in \mathbb{Z}_+$.

Prova: Utilizando a translação $x \mapsto x - x_0$ se necessário, podemos supor que $x_0 = 0$.

Sejam $r \in (0, 1)$ tal que $[-r, r] \subset A$ e $g \in \mathcal{C}_c^\infty((-r, r))$ constante igual a 1 em uma vizinhança de $[0, \frac{r}{2}]$.

Para cada $j \in \mathbb{Z}_+$ e $(x, t) \in A \times \mathbb{R}$, defina

$$g_j(x, t) = \frac{g(\frac{x}{\epsilon_j})x^j v_j(t)}{j!},$$

onde, a priori, $\epsilon_j \in (0, 1)$.

Cada função g_j pertence a $\mathcal{C}^\infty(A \times \mathbb{R})$, pois existem e são contínuas todas as derivadas parciais. Mais ainda, $S(g_j) \subset (-r\epsilon_j, r\epsilon_j) \times \mathbb{R}$ e $g_j(x, t) = g_j(x, t + 2\pi n)$, para todo $n \in \mathbb{Z}$, já que $v_j \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$.

O próximo passo é estimar $|(\partial^\alpha g_j)(x, t)|$, para $j > 1$ e $\alpha = (\alpha_x, \alpha_t) \in \mathbb{Z}_+^2$ com $|\alpha| < j - 1$. Para $(x, t) \in (-r\epsilon_j, r\epsilon_j) \times \mathbb{R}$, temos

$$\begin{aligned} |(\partial^\alpha g_j)(x, t)| &= \frac{1}{j!} |\partial^{\alpha_t} v_j(t)| \partial^{\alpha_x} (g(x/\epsilon_j) x^j) = \\ &= \frac{1}{j!} |\partial^{\alpha_t} v_j(t)| \cdot \left| \sum_{l \leq \alpha_x} \binom{\alpha_x}{l} \partial^l (x^j) \partial^{\alpha_x - l} (g(x/\epsilon_j)) \right| = \\ &= \frac{1}{j!} |\partial^{\alpha_t} v_j(t)| \cdot \left| \sum_{l \leq \alpha_x} \binom{\alpha_x}{l} \frac{j!}{(j-l)!} x^{j-l} \epsilon_j^{l-\alpha_x} (\partial^{\alpha_x - l} g)(x/\epsilon_j) \right| \leq \\ &\leq \|\partial^{\alpha_t} v_j\|_{\infty} \alpha_x! \sum_{l \leq \alpha_x} r^{j-l} \epsilon_j^{j-\alpha_x} \|\partial^{\alpha_x - l} g\|_{\infty} \leq \\ &\leq \|\partial^{\alpha_t} v_j\|_{\infty} \alpha_x! \epsilon_j^{j-\alpha_x} \sum_{l \leq \alpha_x} \|\partial^{\alpha_x - l} g\|_{\infty} \leq \\ &= C_{\alpha, j} \epsilon_j^{j-\alpha_x}, \end{aligned}$$

em que $C_{\alpha, j}$ é uma constante que independe de $(x, t) \in (-r\epsilon_j, r\epsilon_j) \times \mathbb{R}$ e ϵ_j .

Como $S(g_j) \subset (-r\epsilon_j, r\epsilon_j) \times \mathbb{R}$, temos

$$|(\partial^\alpha g_j)(x, t)| \leq C_{\alpha, j} \epsilon_j^{j-\alpha_x},$$

para $j > 1$, $\alpha = (\alpha_x, \alpha_t) \in \mathbb{Z}_+^2$ com $|\alpha| < j - 1$ e qualquer $(x, t) \in A \times \mathbb{R}$.

Escolhendo cada $\epsilon_j \in (0, 1)$ suficientemente pequeno, obtemos

$$|(\partial^\alpha g_j)(x, t)| \leq 2^{-j},$$

para $j > 1$, $\alpha = (\alpha_x, \alpha_t) \in \mathbb{Z}_+^2$ com $|\alpha| < j - 1$ e qualquer $(x, t) \in A \times \mathbb{R}$.

Segue da estimativa acima que, para cada $\alpha \in \mathbb{Z}_+^2$, a série $\sum_{j=0}^{\infty} (\partial^\alpha g_j)$ é uniformemente convergente em $A \times \mathbb{R}$. Definindo

$$v(x, t) = \sum_{j=0}^{\infty} g_j(x, t),$$

para $(x, t) \in A \times \mathbb{R}$, e utilizando um resultado básico de análise (veja o Teorema (1.1.5) da referência [11]) segue que v é uma função de $\mathcal{C}^\infty(A \times \mathbb{R})$; mais ainda, $S(v) \subset (-r, r) \times \mathbb{R}$ e

$$(\partial_x^j v)(0, t) = \sum_{k=0}^{\infty} (\partial_x^j g_k)(0, t),$$

para todo $t \in \mathbb{R}$ e $j \in \mathbb{Z}_+$.

Utilizando a regra de Leibniz verifica-se que

$$(\partial_x^j g_k)(0, t) = \begin{cases} 0, & \text{se } j < k \\ v_k(t) \cdot g(0) = v_k(t), & \text{se } j = k \\ \binom{j}{k} v_k(t) \epsilon_j^{k-j} (\partial^{j-k} g)(0) = 0, & \text{se } j > k. \end{cases}$$

Assim, a função $v(x, t) \in \mathcal{C}^\infty(A \times \mathbb{R})$ é 2π -periódica na variável t , está suportada em $(-r, r) \times \mathbb{R}$ e satisfaz $(\partial_x^j v)(0, t) = v_j(t)$, para todo $t \in \mathbb{R}$ e $j \in \mathbb{Z}_+$. ■

A ordem de anulamento é um fator importante quando desejamos dividir uma função $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ por uma função $g \in \mathcal{C}^\infty(I)$. As próximas duas proposições consideram o caso em que g possui apenas zeros de ordem finita e fornecem condições suficientes para que possamos dividir f por g .

2.8 Proposição. (i) Se $g \in \mathcal{C}^\infty(I)$ for uma função que se anula apenas em $x_0 \in I$, o qual é um zero de ordem finita $n \geq 1$ e $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ for uma função que se anula em x_0 de ordem maior que n , então existirá $h \in \mathcal{C}^\infty(I)$ satisfazendo $gh = f$, $f^{-1}(0) = h^{-1}(0)$ e a ordem de anulamento de h em cada zero $x \in h^{-1}(0)$ será igual à ordem de anulamento de f menos a ordem de anulamento de g em x .

(ii) Se $g \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R})$ possuir apenas zeros de ordem finita, $f \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R})$ for uma função tal que $g^{-1}(0) \subset f^{-1}(0)$ e se a ordem de anulamento de f em cada $x \in g^{-1}(0)$ for maior que a ordem de anulamento da função g , então existirá $h \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R})$ tal que $gh = f$, $f^{-1}(0) = h^{-1}(0)$ e a ordem de anulamento de h em cada zero $x \in h^{-1}(0)$ será igual à ordem de anulamento de f menos a ordem de anulamento de g em x .

Prova: (i) Utilizando a fórmula de Taylor com resto integral podemos escrever $g(x) = (x - x_0)^n h_n(x)$ e $f(x) = (x - x_0)^m h_m(x)$, para todo $x \in I$, onde $h_n, h_m \in \mathcal{C}^\infty(I)$, h_n não se anula em I , $m > n$ e m é menor ou igual à ordem de anulamento de f em x_0 . Assim, $h(x) \doteq (x - x_0)^{m-n} h_m(x) / h_n(x) \in \mathcal{C}^\infty(I)$ e satisfaz $gh = f$. Observe que $(x - x_0)^{m_1-n} h_{m_1}(x) = (x - x_0)^{m_2-n} h_{m_2}(x) \in \mathcal{C}^\infty(I)$, quaisquer que sejam $m_1, m_2 > n$ e menores ou iguais à ordem de anulamento de f em x_0 . Diretamente da expressão que define h segue que $h^{-1}(0) = f^{-1}(0)$ e que a ordem de anulamento de h em x_0 é igual à ordem de anulamento de f menos a ordem de anulamento de g em x_0 . Por fim, se $y \in h^{-1}(0) \setminus \{x_0\}$, então existe uma vizinhança de y restrita a qual g não se anula e da identidade $h = f/g$ segue que a ordem de anulamento de h em y é igual à ordem de anulamento de f em y .

(ii) Fixe $x_0 \in \mathbb{R} \setminus g^{-1}(0)$ e denote o conjunto $g^{-1}(0) \cap [x_0, x_0 + T]$ por $\{x_1 < \dots < x_r\}$. Defina $x_{r+1} \doteq x_0 + T$ e para $j = 1, \dots, r$ defina $I_j = (x_{j-1}, x_{j+1})$. Segue do item (i) que existe $h_j \in \mathcal{C}^\infty(I_j)$ tal que $gh_j = f$ em I_j , $h_j^{-1}(0) = f^{-1}(0) \cap I_j$ e a ordem de anulamento de h_j em cada $x \in h_j^{-1}(0)$ é igual à ordem de anulamento de f menos a ordem de anulamento de g em x . Definindo $\tilde{h}(x) = h_j(x)$, se $x \in I_j$ e $\tilde{h}(x_0) = \tilde{h}(x_0 + T) = f(x_0)/g(x_0)$, segue que $\tilde{h} \in \mathcal{C}^\infty((x_0, x_0 + T))$, $g\tilde{h} = f$ em $[x_0, x_0 + T]$, $\tilde{h}^{-1}(0) = f^{-1}(0) \cap [x_0, x_0 + T]$ e a ordem de anulamento de $\tilde{h}$ em cada $x \in \tilde{h}^{-1}(0)$ é igual à ordem de anulamento de f menos a ordem de anulamento de g em x . Por fim, a extensão T -periódica da função $\tilde{h}$, isto é, a função definida por $h(x + kT) = \tilde{h}(x)$, para todo $x \in [x_0, x_0 + T]$ e todo $k \in \mathbb{Z}$, satisfaz as condições requeridas. ■

Utilizando a fórmula de Taylor com resto integral também verifica-se a seguinte proposição.

2.9 Proposição. *Seja $f \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^2)$ e seja $g \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R})$ uma função que possua apenas zeros de ordem finita. Se f for flat em $g^{-1}(0) \times \mathbb{R}$, então existirá $h \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^2)$, flat em $g^{-1}(0) \times \mathbb{R}$ e tal que $g(x)h(x, t) = f(x, t)$, para todo $(x, t) \in \mathbb{R}^2$.*

Cada função $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ define uma função em $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$, dada por $\theta(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm)$, a qual se escreve como uma soma finita em cada bola fechada centrada na origem. Mais ainda, se $K \subset \mathbb{R}^N$ for um compacto, então, para cada $r > 0$, existirão multi-índices $m_1^r, \dots, m_n^r \in \mathbb{Z}^N$ tais que $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm) = \phi(x - Tm_1^r) + \dots + \phi(x - Tm_n^r)$ em $B[0, r]$, para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ com $S(\phi) \subset K$. Veja os argumentos nas páginas 3 e 4 da referência [18]. Em particular, a função $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm) \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ satisfaz $(\partial^\alpha (\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm))) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} (\partial^\alpha \phi)(x - Tm)$, para todo $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$.

Considere $\mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N) = \{\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N); 1 \equiv \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm)\} \subset \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. O próximo exemplo ilustra que $\mathcal{U}_T(\mathbb{R})$ é um subespaço não vazio. Utilizando uma função $\xi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R})$, obtemos uma função $\phi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$, dada por $\phi(x_1, \dots, x_N) = \xi(x_1) \cdots \xi(x_N)$.

2.10 Exemplo. Dado $x_0 \in \mathbb{R}$, existe $\xi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R})$ tal que $S(\xi) \subset (x_0 - T, x_0 + T)$ e $\xi(x) = 1$ em uma vizinhança de x_0 .

Prova: Utilizando composição com translações basta demonstrarmos o caso em que $x_0 = 0$.

Fixe s e r tais que $T/2 < s < r < T$. Tome também uma função $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $S(\phi) \subset (-r, r)$, $\phi \geq 0$ e $\phi \equiv 1$ em uma vizinhança de $[-s, s]$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, a soma $\sum_{m \in \mathbb{Z}} \phi(x - Tm)$ é finita em uma vizinhança de x , positiva, T -periódica e $\phi(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \phi(x - Tm)$ em uma vizinhança da origem.

Então, definindo $\xi(x) \doteq \phi(x) / \sum_{m \in \mathbb{Z}} \phi(x - Tm)$ segue que $\xi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R})$, $S(\xi) \subset (-T, T)$ e $\xi(x) \equiv 1$ em uma vizinhança da origem. ■

II Distribuições

De uma maneira geral, uma distribuição em $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ é um funcional linear contínuo, definido em um espaço de funções-teste. Sendo assim, os duais $\mathcal{C}^\infty(\Omega)'$, $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N) \doteq \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)'$ e $\mathcal{D}'(\Omega) \doteq \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)'$ são espaços de distribuições.

Podemos caracterizar as distribuições em $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$ com o seguinte teorema, que encontra-se na página (9) da referência [18].

2.11 Teorema. *Seja $u : \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{C}$ um funcional linear. São equivalentes:*

- (i) *u é contínuo, isto é, $u \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$.*
- (ii) *Existem uma constante $C > 0$ e $m \in \mathbb{Z}_+$ tais que*

$$|\langle u, \theta \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^N} |(\partial^\alpha \theta)(x)|,$$

para toda $\theta \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$.

O menor inteiro não negativo $m \in \mathbb{Z}_+$ que satisfaz a condição (ii) do teorema acima é dito a ordem da distribuição $u \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$.

Com o teorema anterior fica bastante fácil demonstrar que $\delta : \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{C}$, definida por $\langle \delta, \theta \rangle \doteq \theta(0)$, é uma distribuição de $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$, chamada de distribuição *delta de Dirac*.

As distribuições de $\mathcal{C}^\infty(\Omega)'$ se caracterizam pelo Teorema (III.2.2) da referência [12], o qual está enunciado a seguir.

2.12 Teorema. *Seja $u : \mathcal{C}^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ um funcional linear. São equivalentes:*

- (i) *u é contínuo, isto é, $u \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)'$.*
- (ii) *Existem um compacto $K \in \Omega$, uma constante $C > 0$ e $m \in \mathbb{Z}_+$ tais que*

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |(\partial^\alpha \phi)(x)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

O próximo teorema, (III.2.3) da referência [12], caracteriza as distribuições de $\mathcal{D}'(\Omega)$.

2.13 Teorema. *Seja $u : \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ um funcional linear. São equivalentes:*

- (i) *u é contínuo, isto é, $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.*
- (ii) *Para cada compacto $K \in \Omega$, existem uma constante $C > 0$ e $m \in \mathbb{Z}_+$ tais que*

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \Omega} |(\partial^\alpha \phi)(x)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(K)$. Por definição $\mathcal{C}_c^\infty(K)$ é o espaço das funções $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ que possuem suporte contido em K .

Dizemos que uma distribuição $u \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ possui ordem finita se existir $m \in \mathbb{Z}_+$ que satisfaça o item (ii) do teorema anterior para todo compacto $K \in \Omega$. Neste caso, o menor entre tais inteiros é dito a ordem da distribuição $u \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$.

Embora o espaço $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ não seja metrizável, da Observação (2.4) segue que $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ se, e somente se, $(\langle u, \phi_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para zero em $\mathbb{C}$, para toda sequência $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge para a função nula em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$.

Também podemos definir a distribuição *delta de Dirac* em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, onde $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ é um aberto contendo a origem. De fato, segue do teorema anterior que $\delta : \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$, dada por $\langle \delta, \phi \rangle \doteq \phi(0)$, é uma distribuição de $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Como $\mathcal{D}'(\Omega)$ e $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$ são espaços duais, podemos torná-los espaços vetoriais topológicos localmente convexos, considerando a topologia *fraca** ou a topologia *forte*. A próxima proposição trata de uma propriedade das sequências em $\mathcal{D}'(\Omega)$.

2.14 Proposição. *Uma sequência $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ converge na topologia *fraca** se, e somente se, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge na topologia *forte*.*

Prova: Como a topologia *forte* é mais fina que a topologia *fraca**, basta provar que toda sequência que converge na topologia *fraca** também converge na topologia *forte*. Suponha que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ seja uma sequência que converge para a origem em $\mathcal{D}'(\Omega)_\sigma$. Devemos mostrar que cada vizinhança básica da origem em $\mathcal{D}'(\Omega)_b$ contém u_n a partir de algum n_0 . Uma vizinhança básica da origem em $\mathcal{D}'(\Omega)_b$ é da forma

$$\{u \in \mathcal{D}'(\Omega); \sup_{\phi \in B} |\langle u, \phi \rangle| \leq 1\},$$

onde $B \subset \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ é um subconjunto limitado. Do Teorema (6.5) (item c) da referência [15] segue que existe um compacto $K \subset \Omega$, com interior não vazio e tal que $B \subset \mathcal{C}_c^\infty(K)$, o qual é um espaço de Fréchet cuja topologia coincide com a topologia de subespaço induzida de $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ (veja Teorema (6.5) (item b) de [15]). Mais ainda, dos exemplos (6.2) e (1.46) de [15] segue que todo subconjunto fechado e limitado em $\mathcal{C}_c^\infty(K)$ é compacto. Como $B \subset \mathcal{C}_c^\infty(K)$ é um subconjunto limitado, então $\overline{B} \subset \mathcal{C}_c^\infty(K)$ é um compacto. Do Teorema (V.8) da referência [14] segue que a sequência formada pela restrição das distribuições u_n ao subespaço $\mathcal{C}_c^\infty(K)$ converge uniformemente em $\overline{B}$; ou seja, para qualquer $\epsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{\phi \in \overline{B}} |\langle u_n, \phi \rangle| < \epsilon,$$

para todo $n > n_0$. Em particular, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$u_n \in \{u \in \mathcal{D}'(\Omega); \sup_{\phi \in B} |\langle u, \phi \rangle| \leq 1\},$$

para todo $n > n_0$. ■

Existe um subespaço de $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ que é isomorfo a $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$, na categoria de espaços vetoriais topológicos, considerando em ambos os espaços a topologia *fraca** ou considerando a topologia *forte* em ambos. Para estabelecer tal isomorfismo utilizaremos composição de distribuições com difeomorfismos.

Sejam Ω e Ω' subconjuntos abertos do $\mathbb{R}^N$ e $g : \Omega \rightarrow \Omega'$ um difeomorfismo entre eles. Dada uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega')$, definimos a composta $u \circ g \in \mathcal{D}'(\Omega)$ por $\langle u \circ g, \phi \rangle \doteq \langle u, |\det g'|^{-1} \phi \circ g^{-1} \rangle$. No caso em que g é uma translação $g(x) = x - x_0$, denotamos a composição $u \circ g$ por $u(x - x_0)$.

Analogamente podemos definir a translação $v(x - x_0)$ de distribuições em $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$.

Será demonstrado que o subespaço das distribuições periódicas $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ é isomorfo a $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$, onde $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$ é formado pelas distribuições $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ que satisfazem $u = u(x - Tm)$, para todo $m \in \mathbb{Z}^N$.

Defina a aplicação $H : \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ por $H(\phi)(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm)$, para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Dos comentários feitos no final da seção anterior segue que H está bem definida. Mais ainda, H é uma transformação linear contínua, conforme Proposição (1) da página 4 de [18] e Observação (2.4).

Fixando $\xi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$ (ver página 31), podemos definir $\tilde{H} : \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ por $\tilde{H}(\theta) = \theta\xi$, para toda $\theta \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$. Segue da Proposição (2) da página 8 de [18] que $\tilde{H}$ é uma transformação linear contínua.

Como estamos considerando a topologia *fraca** ou a topologia *forte* em ambos os duais $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$, segue que os transpostos ${}^tH : \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ e ${}^t\tilde{H} : \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$ são transformações lineares contínuas, conforme o corolário da Proposição (19.5) de [17]. A próxima proposição assegura que a restrição do operador transposto ${}^t\tilde{H}$ ao subespaço $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$ independe da função $\xi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$.

2.15 Proposição. *Sejam $\xi, \eta \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$ e seja $u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$. Então $\langle u, \xi\theta \rangle = \langle u, \eta\theta \rangle$, para toda $\theta \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$.*

Prova: Se $\sigma \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$, observemos inicialmente que a sequência $\sum_{|m| \leq k} (\sigma u)(x - Tm)$ converge para u em $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$. De fato, como $u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$, temos

$$\langle u - \sum_{|m| \leq k} (\sigma u)(x - Tm), \phi \rangle = \langle u, \phi(x) - \sum_{|m| \leq k} \phi(x) \sigma(x - Tm) \rangle,$$

para cada $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Agora, $\sigma \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$ implica que $\sum_{|m| \leq k} \phi(x) \sigma(x - Tm) = \phi(x)$, $x \in \mathbb{R}^N$, para k suficientemente grande, logo $\sum_{|m| \leq k} \phi(x) \sigma(x - Tm)$ converge para ϕ em $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Assim, $\langle u - \sum_{|m| \leq k} (\sigma u)(x - Tm), \phi \rangle$ converge para zero em $\mathbb{C}$. Por fim, se $\xi, \eta \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$, então

$$\langle u, \xi \theta \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \sum_{|m| \leq k} (\eta u)(x - Tm), \xi \theta \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{|m| \leq k} \langle (\eta u)(x - Tm), \xi \theta \rangle =$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{|m| \leq k} \langle u, \eta(x) \theta(x) \xi(x + Tm) \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{|m| \leq k} \langle \xi(x + Tm) u, \eta \theta \rangle =$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{|m| \leq k} \langle (\xi u)(x + Tm), \eta \theta \rangle = \langle u, \eta \theta \rangle,$$

para toda $\theta \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$. ■

É imediato verificar que ${}^tH(\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)) \subset \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$ e que ${}^t\tilde{H} \circ {}^tH$ é o operador identidade de $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$.

Na verdade tH é um isomorfismo entre os espaços vetoriais topológicos $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$ (considerando em ambos a topologia *fraca** ou considerando em ambos a topologia *forte*), com isomorfismo inverso dado por ${}^t\tilde{H}$. Tal afirmação será provada com o próximo teorema.

O produto de uma função $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ por uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ é a distribuição $fu \in \mathcal{D}'(\Omega)$, dada por $\langle fu, \phi \rangle = \langle u, f\phi \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Analogamente, define-se o produto de uma função $f \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ por uma distribuição $v \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$.

2.16 Teorema. *O operador ${}^tH \circ {}^t\tilde{H}$ é o operador identidade de $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$.*

Prova: Para cada $u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$ e $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, temos

$$\langle ({}^tH \circ {}^t\tilde{H})(u), \phi \rangle = \left\langle {}^t\tilde{H}(u), \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm) \right\rangle = \left\langle u, \xi(x) \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm) \right\rangle.$$

Utilizando que o suporte de ξ é compacto e que a função $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm)$ se escreve como uma soma finita em cada bola fechada, verifica-se que a sequência $\xi(x) \sum_{|m| \leq j} \phi(x - Tm)$ converge para a função $\xi(x) \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm)$ em $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ e, portanto,

$$\left\langle u, \xi(x) \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \phi(x - Tm) \right\rangle = \lim_{j \rightarrow \infty} \left\langle u, \xi(x) \sum_{|m| \leq j} \phi(x - Tm) \right\rangle.$$

Como $u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$, temos

$$\left\langle u, \xi(x) \sum_{|m| \leq j} \phi(x - Tm) \right\rangle = \left\langle u, \phi(x) \sum_{|m| \leq j} \xi(x + Tm) \right\rangle.$$

Como $\xi \in \mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$, temos $\phi(x) \sum_{|m| \leq j} \xi(x + Tm) = \phi(x)$ em $\mathbb{R}^N$, para j suficientemente grande, logo $\phi(x) \sum_{|m| \leq j} \xi(x + Tm)$ converge para ϕ em $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Então

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \left\langle u, \phi(x) \sum_{|m| \leq j} \xi(x + Tm) \right\rangle = \langle u, \phi \rangle$$

e, consequentemente, $\langle ({}^t H \circ {}^t \tilde{H})(u), \phi \rangle = \langle u, \phi \rangle$. ■

A próxima definição trata da noção de suporte no contexto de distribuições. Se Ω e Ω' são subconjuntos abertos do $\mathbb{R}^N$ com $\Omega' \subset \Omega$, então podemos restringir uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ a uma distribuição $v \in \mathcal{D}'(\Omega')$, definindo $\langle v, \phi \rangle \doteq \langle u, \phi \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega')$.

Dizer que duas distribuições u e $v \in \mathcal{D}'(\Omega)$ coincidem significa que $\langle u, \phi \rangle = \langle v, \phi \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, afinal, u e v são funcionais lineares.

Existe também um conceito de localização que determina uma distribuição em $\mathcal{D}'(\Omega)$; a saber, u e $v \in \mathcal{D}'(\Omega)$ coincidem se, e somente se, suas restrições a qualquer subconjunto aberto de Ω coincidem. Tal resultado é uma consequência imediata do seguinte lema.

2.17 Lema. *Se $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ e cada ponto de Ω possui uma vizinhança aberta restrita a qual u é a distribuição nula, então $u = 0$ em $\mathcal{D}'(\Omega)$.*

A demonstração do lema acima pode ser consultada nas referências [11] ou [12].

2.18 Definição. O suporte de uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $S(u)$, é a interseção de todos os fechados de Ω fora dos quais u é nula. Equivalentemente, $S(u)$ é o conjunto dos pontos de Ω que não possuem uma vizinhança restrita a qual u é nula.

Denotaremos por $\mathcal{E}'(\Omega)$ o subespaço de $\mathcal{D}'(\Omega)$ das distribuições que possuem suporte compacto. O teorema abaixo garante que cada distribuição $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$ se estende a um único funcional linear $\tilde{u}$ definido em $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$. Sua demonstração pode ser consultada na página 37 da referência [12].

2.19 Teorema. Para cada $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$, existe um único funcional linear $\tilde{u} : \mathcal{C}^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfaz

$$(i) \quad \langle \tilde{u}, \phi \rangle = \langle u, \phi \rangle, \text{ para toda } \phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega).$$

$$(ii) \quad \langle \tilde{u}, \phi \rangle = 0, \text{ se } \phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega) \text{ e } S(\phi) \cap S(u) = \emptyset.$$

2.20 Observação. Não adotaremos a notação $\tilde{u}$, cometeremos um abuso de notação e continuaremos a denotar por u a extensão de $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$. Assim, $\langle u, \phi \rangle$ fica definido para cada $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$ e $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

Podemos também derivar distribuições em $\mathcal{D}'(\Omega)$ e $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$ no seguinte sentido. Para cada $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$, definimos $\partial^\alpha u$ por $\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{|\alpha|} \phi \rangle$.

A proposição abaixo destaca algumas propriedades dos isomorfismos tH e ${}^t\tilde{H}$.

2.21 Proposição. Os isomorfismos tH e ${}^t\tilde{H}$ possuem as seguintes propriedades:

$$(i) \quad {}^tH(fv) = f {}^tH(v) \text{ e } {}^t\tilde{H}(fu) = f {}^t\tilde{H}(u), \text{ para quaisquer } f \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N), v \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N) \text{ e } u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N).$$

$$(ii) \quad {}^tH(\partial^\alpha v) = \partial^\alpha ({}^tH(v)) \text{ e } {}^t\tilde{H}(\partial^\alpha u) = \partial^\alpha ({}^t\tilde{H}(u)), \text{ quaisquer que sejam } v \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N), u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N) \text{ e } \alpha \in \mathbb{Z}_+^N.$$

$$(iii) \quad {}^tH(v(x - x_0)) = {}^tH(v)(x - x_0) \text{ e } {}^t\tilde{H}(u(x - x_0)) = {}^t\tilde{H}(u)(x - x_0), \text{ para quaisquer } x_0 \in \mathbb{R}^N, v \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N) \text{ e } u \in \mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N).$$

$$(iv) \quad {}^tH1 = 1 \text{ e } {}^t\tilde{H}1 = 1.$$

O próximo teorema é uma espécie de *lema da colagem* para distribuições.

2.22 Teorema. Seja $\{\Omega_j\}_{j \in J}$ uma família de abertos do $\mathbb{R}^N$, $\Omega = \bigcup_{j \in J} \Omega_j$ e $\{u_j\}_{j \in J}$ uma família de distribuições satisfazendo $u_j \in \mathcal{D}'(\Omega_j)$ e $u_j = u_l$ em $\Omega_j \cap \Omega_l$, para cada $j, l \in J$. Então existe uma única distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ cuja restrição a Ω_j é u_j , para cada $j \in J$.

Prova: A unicidade segue diretamente do Lema (2.17).

De acordo com o Teorema (2.6), podemos escrever cada função $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ como uma soma $\phi = \sum_{j \in J} \phi_j$, onde $\phi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j)$ e ϕ_j não é identicamente nula apenas para um número finito de índices. Assim, definimos

$$u(\phi) = \sum_{j \in J} \langle u_j, \phi_j \rangle.$$

Para mostrar que u está bem definida basta tomar $\sum_{j \in J} \phi_j = 0$, com $\phi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j)$ e ϕ_j não identicamente nula apenas para um número finito de índices, e verificar que $\sum_{j \in J} \langle u_j, \phi_j \rangle = 0$

Denote por K a reunião dos suportes das funções ϕ_j . Como K é um compacto, pois é uma reunião finita de compactos, utilizamos novamente o Teorema (2.6) para obter funções $\psi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j)$ satisfazendo $\sum_{j \in J} \psi_j \equiv 1$ em K , com ψ_j não identicamente nula apenas para um número finito de índices.

Para cada $j, l \in J$, temos $\phi_j \psi_l \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j \cap \Omega_l)$ e assim

$$\begin{aligned} \sum_{j \in J} \langle u_j, \phi_j \rangle &= \sum_{j \in J} \langle u_j, \sum_{l \in J} \psi_l \phi_j \rangle = \sum_{j \in J} \sum_{l \in J} \langle u_j, \psi_l \phi_j \rangle = \sum_{j \in J} \sum_{l \in J} \langle u_l, \psi_l \phi_j \rangle = \\ &= \sum_{l \in J} \langle u_l, \psi_l \sum_{j \in J} \phi_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

Direto da definição segue que u é um funcional linear definido em $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$; sendo assim, resta apenas provarmos a continuidade de u .

Seja $K' \subset \Omega$ um compacto. Tome $\psi_j \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega_j)$, $j \in J$, satisfazendo $\sum_{j \in J} \psi_j \equiv 1$ em K' , com ψ_j não identicamente nula apenas para um número finito de índices $j_1, \dots, j_n$. Para cada $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ com $S(\phi) \subset K'$, temos

$$|\langle u, \phi \rangle| = |\langle u, \sum_{j \in J} \phi \psi_j \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |\langle u_{j_i}, \phi \psi_{j_i} \rangle| \leq \sum_{i=1}^n C_i \sum_{|\alpha| \leq m_i} \sup |\partial^\alpha (\phi \psi_{j_i})| \leq$$

$$C \sum_{|\alpha| \leq m = \max\{m_i\}} \sup |\partial^\alpha (\phi)|,$$

onde cada m_i é um natural, cada C_i é um real positivo e C é uma constante que não depende de ϕ , o que mostra que $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ é uma distribuição. ■

2.23 Observação. Nas condições do teorema anterior, se cada u_j for de ordem finita e existir M , um limitante superior para as ordens das distribuições u_j , então a distribuição u será de ordem finita menor ou igual a M . Mais ainda, se cada u_j for de ordem finita e existir M , o máximo das ordens das distribuições u_j , então a distribuição u será de ordem finita igual a M . Tal afirmação pode ser verificada analisando-se a parte final da demonstração anterior.

Considere a distribuição $c\partial^\alpha\delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(\Omega)$, onde $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N$ e $x_0 \in \Omega$. Diretamente da Definição (2.18) verifica-se que $S(c\partial^\alpha\delta(x - x_0)) \subset \{x_0\}$ e utilizando uma função do tipo $\phi(x) = \psi(x)(x - x_0)^\alpha$, onde ψ é uma função de corte, isto é, $\psi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ e $\psi \equiv 1$ em uma vizinhança de $\{x_0\}$, obtemos $S(c\partial^\alpha\delta(x - x_0)) = \{x_0\}$. Mais geralmete, se $u = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta(x - x_0)$, onde $m \in \mathbb{Z}_+$ e $c_\alpha \in \mathbb{C}$, então $S(u) \subset \{x_0\}$. O interessante é que a recíproca desse resultado é verdadeira, conforme veremos no próximo teorema.

Vale deixar registrado que utilizando funções como ϕ , temos $0 = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta(x - x_0)$ se, e somente se, $c_\alpha = 0$ para todo α . Consequentemente, $S(u) = \{x_0\}$ se, e somente se, $c_\alpha \neq 0$, para algum α .

2.24 Teorema. Se $x_0 \in \Omega \subset \mathbb{R}^N$ e $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ satisfaz $S(u) = \{x_0\}$, então

$$u = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta(x - x_0),$$

com $c_\alpha \in \mathbb{C}$, para todo $|\alpha| \leq m$. Mais ainda, o natural m pode ser tomado igual à ordem da distribuição u .

Prova: Suponha inicialmente que $x_0 = 0 \in \Omega$. Tome $\epsilon > 0$ de forma que $B_{3\epsilon} = B(0, 3\epsilon) \subset B[0, 3\epsilon] \subset \Omega$ e escolha $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ satisfazendo $S(\phi) \subset B_1 = B(0, 1)$, $\phi \geq 0$ e $\int_{B_1} \phi = 1$.

Defina

$$\phi_\epsilon(x) = \epsilon^{-N} \int_{B_{2\epsilon}} \phi\left(\frac{x - y}{\epsilon}\right) dy,$$

para cada $x \in \mathbb{R}^N$. Então $\phi_\epsilon \in \mathcal{C}_c^\infty(B_{3\epsilon})$ e $\phi_\epsilon \equiv 1$ em B_ϵ .

Do Teorema (2.19) segue que $\langle u, \psi \rangle = \langle u, \phi_\epsilon \psi \rangle$, para cada $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, pois $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$ e $S(\psi(1 - \phi_\epsilon)) \cap (\{0\} = S(u)) = \emptyset$.

Escolha $r > 0$ tal que $B[0, r] \subset \Omega$. Segue da continuidade de u que existem $C > 0$ e $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$|\langle u, \psi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \Omega} |\partial^\alpha(\phi_\epsilon \psi)|, \quad (.1)$$

para todo $0 < \epsilon < r/3$ e $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, uma vez que $S(\phi_\epsilon) \subset B[0, r]$, se $0 < \epsilon < r/3$. Como $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$, u é uma distribuição de ordem finita e podemos tomar m igual à ordem de u .

Para $\psi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, o desenvolvimento de Taylor de ψ em torno da origem fornece

$$\psi(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha \psi(0) x^\alpha / \alpha! + \left(R_{m+1}(x) \doteq (m+1) \int_0^1 (1-t)^m \sum_{|\alpha|=m+1} \partial^\alpha \psi(tx) x^\alpha / \alpha! dt \right),$$

para todo $x \in B[0, r]$. Utilizando a fórmula de Leibniz e derivação sobre o sinal de integração, verifica-se que

$$|\partial^\beta R_{m+1}(x)| \leq M |x|^{m+1-|\beta|}, \quad (.2)$$

para todo $x \in B[0, r]$ e $|\beta| \leq m+1$, onde M é uma constante que depende de ψ , m e β , mas não depende de $x \in B[0, r]$. Assim,

$$\langle u, \psi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha \psi(0) \langle u, x^\alpha \rangle / \alpha! + \langle u, R_{m+1} \rangle = \left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta, \psi \right\rangle + \langle u, R_{m+1} \rangle.$$

Note que o Teorema (2.19) garante que $\langle u, x^\alpha \rangle$ e $\langle u, R_{m+1} \rangle$ estão bem definidos. Para finalizar a demonstração deste caso basta provarmos que $\langle u, R_{m+1} \rangle = 0$. Segue da desigualdade (.1) que

$$|\langle u, R_{m+1} \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \Omega} |\partial^\alpha (\phi_\epsilon R_{m+1})(x)| = C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in B_{3\epsilon}} |\partial^\alpha (\phi_\epsilon R_{m+1})(x)|,$$

para todo $0 < \epsilon < r/3$. Utilizando a definição de ϕ_ϵ verifica-se que $\sup_{x \in B_{3\epsilon}} |\partial^\beta \phi_\epsilon(x)| \leq \epsilon^{-|\beta|} L_\beta$, onde L_β é uma constante que depende de $\beta \in \mathbb{Z}_+^N$ e não depende de ϵ .

Pela fórmula de Leibniz e pela desigualdade (.2), temos

$$\begin{aligned} |\langle u, R_{m+1} \rangle| &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \alpha! \sum_{\beta \leq \alpha} \sup_{x \in B_{3\epsilon}} |\partial^\beta \phi_\epsilon(x)| \cdot \sup_{x \in B_{3\epsilon}} |\partial^{\alpha-\beta} R_{m+1}(x)| \leq \\ &C \sum_{|\alpha| \leq m} \alpha! \sum_{\beta \leq \alpha} \epsilon^{-|\beta|} L_\beta M (3\epsilon)^{m+1-|\alpha-\beta|} = C \sum_{|\alpha| \leq m} \alpha! \sum_{\beta \leq \alpha} L_\beta M 3^{m+1-|\alpha-\beta|} \epsilon^{m+1-|\alpha|} \leq \\ &\left(C \sum_{|\alpha| \leq m} \alpha! \sum_{\beta \leq \alpha} L_\beta M 3^{m+1-|\alpha-\beta|} \right) \epsilon = \tilde{C} \epsilon, \end{aligned}$$

para todo $\epsilon \in (0, \min\{1, r/3\})$; onde $\tilde{C}$ é uma constante que não depende de ϵ . Assim, obtemos $|\langle u, R_{m+1} \rangle| = 0$.

No caso geral em que $x_0 \in \Omega$, compondo a distribuição u com uma translação obtemos $u(x + x_0) \in \mathcal{D}'(\Omega - x_0)$ com $S(u(x - x_0)) = \{0\}$. Segue do caso anterior que $u(x + x_0) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ em $\mathcal{D}'(\Omega - x_0)$ e compondo ambos os lados da igualdade com a translação inversa, obtemos $u = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta(x - x_0)$ em $\mathcal{D}'(\Omega)$, o que finaliza a demonstração do teorema. ■

O teorema anterior fornece que alguns operadores não modificam a forma de uma distribuição que é escrita como combinação linear de derivadas da delta. Por exemplo, sejam $x_0 \in I \subset \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$ e $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$. Se $u \in \mathcal{D}'(I)$ for uma combinação linear de derivadas de $\delta(x - x_0)$, então $w = (fu)' + iku \in \mathcal{D}'(I)$ também será uma combinação linear de derivadas de $\delta(x - x_0)$, uma vez que $S(w) \subset S(u) \subset \{x_0\}$. Uma pergunta que pode ser feita é saber se para cada $w \in \mathcal{D}'(I)$ que for uma combinação linear de derivadas de $\delta(x - x_0)$, existirá $u \in \mathcal{D}'(I)$ tal que $P_k(u) \doteq (fu)' + iku = w$.

2.25 Proposição. *Sejam $x_0 \in I \subset \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $f \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ tal que $x_0 \in f^{-1}(0)$ e $P_k \doteq d/dx(f \cdot) + (ik \cdot)$. Se*

$$w = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(I),$$

então existe

$$u = \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(I)$$

tal que $P_k(u) = (fu)' + iku = w$.

Prova: Fazendo $j = 0$, temos $f\delta(x - x_0) = 0$ e para $j \geq 1$, temos $f\partial^j \delta(x - x_0) = \sum_{l=0}^j \binom{j}{l} (-1)^l (\partial^l f)(x_0) \partial^{j-l} \delta(x - x_0) = \sum_{l=1}^j \binom{j}{l} (-1)^l (\partial^l f)(x_0) \partial^{j-l} \delta(x - x_0)$. Assim, para $j \geq 1$, temos $(f\partial^j \delta(x - x_0))' = \sum_{l=1}^j \binom{j}{l} (-1)^l (\partial^l f)(x_0) \partial^{j-l+1} \delta(x - x_0)$. Portanto, para

$$u = \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(I),$$

temos

$$P_k u = \sum_{j=0}^r b_j (f\partial^j \delta(x - x_0))' + ik \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0) =$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^r b_j \sum_{l=1}^j \binom{j}{l} (-1)^l (\partial^l f)(x_0) \partial^{j-l+1} \delta(x - x_0) + ik \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0) = \\ \sum_{j=1}^r \left(\sum_{l=j}^r b_l C_{l,l-j+1} (\partial^{l-j+1} f)(x_0) \right) \partial^j \delta(x - x_0) + ik \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0), \end{aligned}$$

onde $C_{j,l} \doteq \binom{j}{l} (-1)^l \in \mathbb{R}$, para $1 \leq j \leq r$ e $1 \leq l \leq r$. Portanto, $P_k u = w$ se, e somente se, $ikb_0 = c_0$ e

$$ikb_j + \sum_{l=j}^r b_l C_{l,l-j+1} (\partial^{l-j+1} f)(x_0) = c_j,$$

para $j = 1, \dots, r$, ou seja, $ikb_0 = c_0$, $[ik + C_{r,1} f'(x_0)]b_r = c_r$ e

$$[ik + C_{j,1} f'(x_0)]b_j = c_j - \sum_{l=j+1}^r b_l C_{l,l-j+1} (\partial^{l-j+1} f)(x_0),$$

para $j = 1, \dots, r-1$. Como as constantes $C_{j,l}$ são reais e a função f é uma função real, utilizamos indução para obter, de maneira única, $b_0, b_r, b_{r-1}, \dots, b_1$ tais que $u = \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0)$ satisfaz $P_k u = w$. ■

Também vale um resultado análogo à proposição anterior para uma outra classe de operadores. A demonstração é bem semelhante à demonstração anterior.

2.26 Proposição. *Sejam $x_0 \in I \subset \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $f \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ tal que $x_0 \in f^{-1}(0)$ e $L_k \doteq f(x)d/dx + (ik\cdot)$. Se*

$$w = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(I),$$

então existe

$$u = \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(I)$$

tal que $L_k(u) = fu' +iku = w$.

Considere $g \in \mathcal{C}^\infty(I)$ uma função que se anula apenas em $x_0 \in I$, o qual é um zero de ordem finita. O próximo resultado caracteriza as soluções de uma equação da forma $gu = 0$, onde $u \in \mathcal{D}'(I)$.

2.27 Teorema. *Seja $g \in \mathcal{C}^\infty(I)$ uma função que se anula apenas em $x_0 \in I \subset \mathbb{R}$, o qual é um zero de ordem finita $r \geq 1$. Se $u \in \mathcal{D}'(I)$ satisfaz $gu = 0$, então*

$$u = \sum_{0 \leq j \leq r-1} c_j \partial^j \delta(x - x_0),$$

onde $c_j \in \mathbb{C}$, para todo $0 \leq j \leq r-1$.

Prova: Como g se anula apenas em x_0 , temos $S(u) \subset \{x_0\}$. Segue do Teorema (2.24) que

$$u = \sum_{0 \leq j \leq n} c_j \partial^j \delta(x - x_0),$$

onde $n \in \mathbb{Z}_+$ e $c_j \in \mathbb{C}$, para $j = 0, \dots, n$. Supondo que $n \geq r$, obtemos da hipótese $gu = 0$ a igualdade

$$0 = \sum_{0 \leq j \leq r-1} c_j (x - x_0)^r \partial^j \delta(x - x_0) + \sum_{r \leq j \leq n} c_j (x - x_0)^r \partial^j \delta(x - x_0).$$

Como $(x - x_0)^r \partial^j \delta(x - x_0) = 0$, se $j < r$ e $(x - x_0)^r \partial^j \delta(x - x_0) = (-1)^r \binom{j}{r} r! \partial^{j-r} \delta(x - x_0)$, se $j \geq r$, temos

$$0 = \sum_{r \leq j \leq n} c_j (-1)^r \binom{j}{r} r! \partial^{j-r} \delta(x - x_0).$$

A independência linear entre a distribuição δ e suas derivadas implica que $c_j = 0$, para todo $r \leq j \leq n$. ■

A definição da multiplicação de uma função infinitamente diferenciável por uma distribuição permite elaborar o problema de dividir uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ por uma função $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, o qual consiste em encontrar outra distribuição $v \in \mathcal{D}'(\Omega)$ tal que $fv = u$. Se $f^{-1}(0) = \emptyset$, então existe uma única solução, dada por $v = f^{-1}u$.

Um problema de divisão também pode possuir mais do que uma solução, bem como não possuir solução alguma. Por exemplo, dividir a distribuição nula por uma função de $\mathcal{C}^\infty(I)$ que se anula apenas em $x_0 \in I$, o qual é um zero de ordem finita, é um problema em que a solução não é única. O Teorema (2.27) fornece todas as soluções de tal problema de divisão.

Faremos algumas considerações a respeito do problema de divisão em uma variável. Inicialmente, mostraremos que se f possuir apenas zeros de ordem finita, então sempre será possível dividir uma distribuição de $\mathcal{D}'(I)$ por f . Depois exibiremos algumas distribuições que não podem ser divididas por funções que possuem anulamentos de ordem infinita.

2.28 Teorema. *Considere $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo aberto e limitado.*

(i) *Seja $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ uma função que se anula apenas em $x_0 \in I$, o qual é um zero de ordem finita igual a n . Dada $u \in \mathcal{D}'(I)$, existe $v \in \mathcal{D}'(I)$ tal que $fv = u$. Mais ainda, se u for de ordem finita menor ou igual a m , então poderemos tomar $v \in \mathcal{D}'(I)$ de ordem finita menor ou igual a $m + n$.*

(ii) *Seja $f \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$ uma função que possua apenas zeros de ordem finita. Dada $u \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$, existe $v \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$ tal que $fv = u$. Mais ainda, se u for de ordem finita menor ou igual a m e M for um limitante superior para a ordem dos zeros de f , então poderemos tomar $v \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$ de ordem finita menor ou igual a $M + m$.*

Prova: (i) Inicialmente demonstraremos o caso em que $f(x) = x - x_0$. Tome $\chi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$, com $0 \leq \chi \leq 1$ e $\chi \equiv 1$ em uma vizinhança de x_0 . Para cada função $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$, temos $\phi(x_0 + x) = \phi(x_0) + \int_0^1 \phi'(x_0 + tx) x dt$, para todo $x \in I - x_0$. Defina $\psi_\phi(x) = \int_0^1 \phi'(x_0 + tx) dt$, para todo $x \in I - x_0$. Como $\psi_\phi(x - x_0) \in \mathcal{C}^\infty(I)$, podemos definir

$$\langle v, \phi \rangle = \langle u, \chi(x) \psi_\phi(x - x_0) \rangle + \langle u, (x - x_0)^{-1} (1 - \chi(x)) \phi(x) \rangle,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$.

Observe que v é um funcional linear definido em $\mathcal{C}_c^\infty(I)$. Mais ainda, para cada $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$, a função $\theta(x) = (x - x_0)\phi(x)$ pertence a $\mathcal{C}_c^\infty(I)$ e satisfaz $\theta(x_0) = 0$; assim, $x\psi_\theta(x) = \theta(x_0 + x) = x\phi(x + x_0)$ e, conseqüentemente, $\psi_\theta(x) = \phi(x + x_0)$, para todo $x \in I - x_0$. Portanto,

$$\langle (x - x_0)v, \phi \rangle = \langle v, (x - x_0)\phi(x) \rangle = \langle v, \theta \rangle = \langle u, \chi(x) \psi_\theta(x - x_0) \rangle +$$

$$\langle u, (x - x_0)^{-1} (1 - \chi(x)) \theta(x) \rangle = \langle u, \chi \phi \rangle + \langle u, (1 - \chi) \phi \rangle = \langle u, \phi \rangle.$$

Então v é um funcional linear definido em $\mathcal{C}_c^\infty(I)$ que satisfaz $(x - x_0)v = u$. Resta provarmos a continuidade de v .

Fixe $K \subset I$ um compacto. Como $u \in \mathcal{D}'(I)$, existem $C > 0$ e $m \in \mathbb{Z}_+$ tais que

$$|\langle u, \psi \rangle| \leq C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in I} |\partial^j \psi(x)|,$$

para toda $\psi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$ com $S(\psi) \subset K \cup S(\chi)$.

Utilizando a fórmula de Leibniz, obtemos

$$|\langle u, \chi \psi_\phi(x - x_0) \rangle| \leq \tilde{C} \sum_{j=0}^m \sup_{x \in I} |\partial^j \psi_\phi(x - x_0)|,$$

onde $\tilde{C} > 0$ é uma constante que independe de $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$. Conseguimos obter tal constante uma vez que χ e todas as suas derivadas são limitadas em I . Note que, para cada $0 \leq j \leq m$, temos $\partial^j \psi_\phi(x - x_0) = \int_0^1 t^j \partial^{j+1} \phi(x_0 + tx) dt$ e, portanto, $\sup_{x \in I} |\partial^j \psi_\phi(x - x_0)| \leq \sup_{y \in I} |\partial^{j+1} \phi(y)|$. Resulta então que

$$|\langle u, \chi \psi_\phi(x - x_0) \rangle| \leq \tilde{C} \sum_{j=0}^{m+1} \sup_{x \in I} |\partial^j \phi(x)|.$$

Como $(x - x_0)^{-1}(1 - \chi)$ e todas as suas derivadas também são limitadas em I , já que I é limitado, obtemos uma constante $\tilde{\tilde{C}} > 0$ que independe de $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(K)$ e satisfaz

$$|\langle u, (x - x_0)^{-1}(1 - \chi)\phi \rangle| \leq \tilde{\tilde{C}} \sum_{j=0}^m \sup_{x \in I} |\partial^j \phi(x)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$ com $S(\phi) \subset K$.

Sendo assim, existem $L > 0$ e $m \in \mathbb{Z}_+$ tais que

$$|\langle v, \phi \rangle| \leq |\langle u, \chi \psi_\phi(x - x_0) \rangle| + |\langle u, (x - x_0)^{-1}(1 - \chi)\phi \rangle| \leq L \sum_{j=0}^{m+1} \sup_{x \in I} |\partial^j \phi(x)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I)$ com $S(\phi) \subset K$, concluindo que $v \in \mathcal{D}'(I)$. Mais ainda, ficou demonstrado que se $u \in \mathcal{D}'(I)$ for de ordem finita menor ou igual a m , então v será de ordem finita menor ou igual a $m + 1$.

Por fim, seja $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ uma função que se anule apenas em $x_0 \in I$, o qual é um zero de ordem finita igual a $n \geq 1$. Utilizando a fórmula de Taylor com resto integral podemos escrever $f(x) = (x - x_0)^n g(x)$, para todo $x \in I$, com $g \in \mathcal{C}^\infty(I)$ e $g^{-1}(0) = \emptyset$. Como a função g não se anula em I , existe $v_0 = (1/g)u \in \mathcal{D}'(I)$ satisfazendo $gv_0 = u$. Pelo caso anterior, existe $v_1 \in \mathcal{D}'(I)$ tal que $(x - x_0)v_1 = v_0$ e assim $(x - x_0)gv_1 = u$. Utilizando o caso anterior indutivamente, obtemos uma distribuição $v_n \in \mathcal{D}'(I)$ satisfazendo $fv_n = (x - x_0)^n gv_n = u$. Se $u \in \mathcal{D}'(I)$ for de ordem finita menor ou igual a m , então a ordem de v_0 será menor ou igual a m e v_i poderá ser escolhida de ordem menor ou igual a $m + i$, para cada $i = 1, \dots, n$.

(ii) Fixe $x_0 \in \mathbb{R} \setminus f^{-1}(0)$ e denote $(x_0, x_0 + 2\pi) \cap f^{-1}(0)$ por $\{x_1 < \dots < x_n\}$. Defina $x_{-1} \doteq x_n - 2\pi$, $x_{n+1} \doteq x_0 + 2\pi$ e $I_j \doteq (x_{j-1}, x_{j+1})$, para $j = 0, \dots, n$.

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, a função f está em $\mathcal{C}^\infty(I_j)$ e se anula apenas em $x_j \in I_j$, o qual é um zero de ordem finita, digamos $n_j \geq 1$. Segue do item (i) que existe $v_j \in \mathcal{D}'(I_j)$ tal que $fv_j = u$ em $\mathcal{D}'(I_j)$. Definindo $v_0 \doteq f^{-1}u \in \mathcal{D}'(I_0)$, temos $fv_0 = u$ em $\mathcal{D}'(I_0)$, $v_j = v_{j+1} = f^{-1}u$ em $\mathcal{D}'(I_j \cap I_{j+1})$, $j = 0, \dots, n-1$, e $v_0(x - 2\pi) = v_n = f^{-1}u$ em $\mathcal{D}'((I_0 + 2\pi) \cap I_n)$.

Observe também que se u for de ordem finita menor ou igual a m , então v_0 será de ordem finita menor ou igual a m e por (i) podemos tomar v_j de ordem finita menor ou igual a $m + n_j$, para cada $j = 1, \dots, n$.

Coloque $I_j^k \doteq I_j + 2k\pi$, para todo $k \in \mathbb{Z}$ e $j = 0, \dots, n$. Então $\mathbb{R} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \bigcup_{j=0}^n I_j^k$ e $fv_j(x - 2k\pi) = u$ em $\mathcal{D}'(I_j^k)$, pois $f \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$ e $u \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$.

Definindo $v_j^k \doteq v_j(x - 2k\pi) \in \mathcal{D}'(I_j^k)$, para todo $k \in \mathbb{Z}$ e $j = 0, \dots, n$; segue do Teorema (2.22) que existe $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ satisfazendo $v = v_j^k$ em $\mathcal{D}'(I_j^k)$ e se u for de ordem finita menor ou igual a m , segue da Observação (2.23) que v possuirá ordem finita menor ou igual a $m + \max\{n_j; j = 1, \dots, n\} \leq m + M$.

Do Lema (2.17) resulta que $fv = u$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Falta apenas verificar que $v \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$ e, para tanto, basta provarmos que $v = v(x - 2\pi)$. Para cada $x \in \mathbb{R}$ existe $j \in \{0, \dots, n\}$ e $k \in \mathbb{Z}$ tais que $x \in I_j^k$; assim, para cada $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(I_j^k)$, temos

$$\begin{aligned} \langle v, \phi \rangle &= \langle v_j^k, \phi \rangle = \langle v_j(x - 2k\pi), \phi \rangle = \langle v_j, \phi(x + 2k\pi) \rangle = \langle v_j, \phi(x + 2\pi + 2(k-1)\pi) \rangle = \\ &= \langle v_j(x - 2(k-1)\pi), \phi(x + 2\pi) \rangle = \langle v_j^{k-1}, \phi(x + 2\pi) \rangle = \langle v, \phi(x + 2\pi) \rangle = \langle v(x - 2\pi), \phi \rangle. \end{aligned}$$

Novamente pelo Lema (2.17) resulta que $v = v(x - 2\pi)$, ou seja, $v \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$. ■

2.29 Observação. Se no item (i) do Teorema (2.28) tivermos $x_0 \in S(u)$, então teremos $S(v) = S(u)$, para toda $v \in \mathcal{D}'(I)$ que satisfaz $fv = u$, pois $S(u) = S(fv) \subset S(f) \cap S(v)$ e $S(v) \setminus \{x_0\} = S(u) \setminus \{x_0\}$. Se no item (ii) tivermos $f^{-1}(0) \subset S(u)$, então teremos $S(v) \subset S(u)$, para toda $v \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$ que satisfaz $fv = u$, logo $S(v) = S(u)$.

Se $v \in \mathcal{D}'(I)$ for uma solução do problema de divisão considerado no item (i) do Teorema (2.28), então segue do Teorema (2.27) que todas as outras soluções serão da forma $v + \sum_{0 \leq j \leq n-1} c_j \partial^j \delta(x - x_0)$.

O próximo teorema exhibe casos em que não é possível efetuar a divisão.

2.30 Teorema. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}$ um aberto.*

- (i) *Se $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ for flat em $x_0 \in \Omega$, não existirá $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ tal que $fu = 1$.*
- (ii) *Se $f \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R})$ for flat em $x_0 \in \mathbb{R}$, não existirá $u \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R})$ tal que $fu = 1$.*
- (iii) *Se $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ for flat em x_0 , não existirá $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ tal que*

$$fu = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0);$$

onde $c_j \in \mathbb{C}$, para todo $0 \leq j \leq r \in \mathbb{Z}_+$ e $c_r \neq 0$.

- (iv) *Se $f \in \mathcal{P}_T(\mathbb{R})$ for flat em $x_0 \in \mathbb{R}$, não existirá $u \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R})$ tal que*

$$fu = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0);$$

onde $c_j \in \mathbb{C}$, para todo $0 \leq j \leq r \in \mathbb{Z}_+$ e $c_r \neq 0$.

Prova: (i) Demonstraremos inicialmente o caso em que $x_0 = 0$.

Suponha que exista $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ satisfazendo $fu = 1$; então $\langle u, f\phi \rangle = \langle 1, \phi \rangle = \int_\Omega \phi$, para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Fixe $0 < \epsilon < 1/4$ tal que $K = [0, 4\epsilon] \subset \Omega$. Pela continuidade de u , existe uma constante $C > 0$ e um inteiro não negativo m tais que

$$\left| \int_\Omega \phi \right| = |\langle u, f\phi \rangle| \leq C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in \Omega} |\partial^j (f\phi)(x)|, \quad (.3)$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(K)$.

Tome $0 \leq \phi_0 \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ com $S(\phi_0) \subset [\epsilon, 4\epsilon]$ e $\phi_0 \equiv 1$ em uma vizinhança de $[2\epsilon, 3\epsilon]$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina $\phi_n(x) = n\phi_0(nx)$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Observe que cada ϕ_n satisfaz $S(\phi_n) \subset [\epsilon/n, 4\epsilon/n]$ e, portanto, $\phi_n \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$.

Como

$$\left| \int_\Omega \phi_n \right| = \int_\Omega n\phi_0(nx) dx \geq n \int_{2\epsilon/n}^{3\epsilon/n} 1 dx = \epsilon,$$

segue de (.3) que

$$\epsilon \leq C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [\epsilon/n, 4\epsilon/n]} |\partial^j (f\phi_n)(x)|, \quad (.4)$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Utilizando que f se anula de ordem $m+2$ em $x = 0$, já que f é flat em $x = 0$, segue da fórmula de Taylor com resto integral que $f(x) = x^{m+2}g(x)$, para todo $x \in [0, 4\epsilon]$;

com $g \in \mathcal{C}^\infty([0, 4\epsilon])$. Assim,

$$\begin{aligned}
C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [\epsilon/n, 4\epsilon/n]} |\partial^j(f\phi_n)(x)| &\leq C \sum_{j=0}^m \sum_{l=0}^j \binom{j}{l} \sup_{x \in [\epsilon/n, 4\epsilon/n]} |\partial^{j-l}(x^{m+2}) \partial^l(g(x)n\phi_0(nx))| \leq \\
C(m+2)! \sum_{j=0}^m nj! \sum_{l=0}^j \sup_{x \in [\epsilon/n, 4\epsilon/n]} \left[|x|^{m+2-j+l} \sum_{k=0}^l \binom{l}{k} |(\partial^k g)(x) n^{l-k} (\partial^{l-k} \phi_0)(nx)| \right] &\leq \\
C(m+2)! \sum_{j=0}^m n(j!)^2 \sum_{l=0}^j \sum_{k=0}^l n^l \sup_{x \in [\epsilon/n, 4\epsilon/n]} |x|^{m+2-j+l} \cdot |(\partial^k g)(x)| \cdot |(\partial^{l-k} \phi_0)(nx)| &\leq \\
C(m+2)! \sum_{j=0}^m n(j!)^2 \sum_{l=0}^j \sum_{k=0}^l (n)^{-m-2+j} \left(\sup_{x \in [0, 4\epsilon]} |(\partial^k g)(x)| \right) \cdot \|\partial^{l-k} \phi_0\|_\infty &\leq \\
C(m+2)! \sum_{j=0}^m (j!)^2 (n)^{-m-2+j+1} \sum_{l=0}^j \sum_{k=0}^l \left(\sup_{x \in [0, 4\epsilon]} |(\partial^k g)(x)| \right) \cdot \|\partial^{l-k} \phi_0\|_\infty &\leq \\
n^{-1} C(m+2)! \sum_{j=0}^m (j!)^2 \sum_{l=0}^j \sum_{k=0}^l \left(\sup_{x \in [0, 4\epsilon]} |(\partial^k g)(x)| \right) \cdot \|\partial^{l-k} \phi_0\|_\infty &
\end{aligned}$$

e, portanto, a sequência $C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in \Omega} |\partial^j(f\phi_n)(x)|$ converge para 0, o que é uma contradição com (4).

Para concluir o caso geral, suponha que exista $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ satisfazendo $fu = 1$. Então $u(x+x_0) \in \mathcal{D}'(\Omega-x_0)$ satisfaz $f(x+x_0)u(x+x_0) = 1$, onde $f(x+x_0) \in \mathcal{C}^\infty(\Omega-x_0)$ é *flat* em $0 \in \Omega-x_0$. Do caso anterior segue que tal u não pode existir.

(ii) Suponha que exista $u \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R})$ satisfazendo $fu = 1$ em $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R})$. Aplicando o isomorfismo tH na identidade anterior obtemos $f{}^tH(u) = {}^tH(fu) = 1$ em $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R})$, o que é uma contradição com o item (i).

(iii) Utilizando composição de distribuições com translações, como foi feito no fim da demonstração do item (i), podemos supor que $x_0 = 0 \in \Omega$. Suponha que exista $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ satisfazendo $fu = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta$; então

$$\langle u, f\phi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta, \phi \right\rangle = \sum_{j=0}^r c_j (-1)^j (\partial^j \phi)(0),$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Fixe $0 < \epsilon < 1$ tal que $[-\epsilon, \epsilon] \subset \Omega$. Segue da continuidade de u que existe uma constante $C > 0$ e um inteiro não negativo m tais que

$$\left| \sum_{j=0}^r c_j (-1)^j (\partial^j \phi)(0) \right| = |\langle u, f\phi \rangle| \leq C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in \Omega} |\partial^j (f\phi)(x)|, \quad (.5)$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ com $S(\phi) \subset [-\epsilon, \epsilon]$.

Seja $\phi_0 \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$, dada por $\phi_0(x) = x^r \psi_0(x)$, onde $\psi_0 \in \mathcal{C}_c^\infty((-\epsilon, \epsilon))$ é uma função de corte constante igual a 1 em uma vizinhança de $[-\epsilon/2, \epsilon/2]$. Então $\phi_0 \in \mathcal{C}_c^\infty((-\epsilon, \epsilon))$, satisfaz $(\partial^j \phi_0)(0) = 0$, se $j \neq r$ e $(\partial^r \phi_0)(0) = r!$. Defina $\phi_n(x) = \phi_0(nx)$, para todo $x \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Então $\phi_n \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ satisfaz $S(\phi_n) \subset [-\epsilon/n, \epsilon/n]$.

Podemos então aplicar a desigualdade (.5) a cada ϕ_n , resultando que

$$|c_r| r! n^r \leq C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [-\epsilon/n, \epsilon/n]} |\partial^j (f\phi_n)(x)|, \quad (.6)$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Utilizando que f se anula de ordem $m+1$ em $x=0$, escrevemos $f(x) = x^{m+1}g(x)$, para todo $x \in (-\epsilon, \epsilon)$, onde $g \in \mathcal{C}^\infty((-\epsilon, \epsilon))$. Assim,

$$C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [-\epsilon/n, \epsilon/n]} |\partial^j (f\phi_n)(x)| = C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [-\epsilon/n, \epsilon/n]} |\partial^j (x^{m+1}g(x)\phi_0(nx))|$$

e efetuando cálculos análogos aos da demonstração do item (i) obtemos

$$\begin{aligned} & C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [-\epsilon/n, \epsilon/n]} |\partial^j (f\phi_n)(x)| \leq \\ & C(m+1)! \sum_{j=0}^m (j!)^2 n^{-m-1+j} \sum_{l \leq j} \sum_{k \leq l} \left(\sup_{x \in [-\epsilon/2, \epsilon/2]} |(\partial^k g)(x)| \right) \cdot \|\partial^{l-k} \phi_0\|_\infty \leq \\ & n^{-1} C(m+1)! \sum_{j=0}^m (j!)^2 \sum_{l \leq j} \sum_{k \leq l} \left(\sup_{x \in [-\epsilon/2, \epsilon/2]} |(\partial^k g)(x)| \right) \cdot \|\partial^{l-k} \phi_0\|_\infty. \end{aligned}$$

Resulta então que a sequência $C \sum_{j=0}^m \sup_{x \in [-\epsilon/n, \epsilon/n]} |\partial^j (f\phi_n)(x)|$ converge para 0, o que é uma contradição com (.6), pois $c_r \neq 0$.

(iv) Suponha que exista $u \in \mathcal{P}'_T(\mathbb{R})$ satisfazendo $fu = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0)$. Aplicando o isomorfismo tH na identidade anterior obtemos $f {}^tH(u) = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j ({}^tH\delta)(x - x_0)$ em $\mathcal{D}'_T(\mathbb{R})$. Restringindo a identidade anterior ao intervalo $(x_0 - T/2, x_0 + T/2)$, obtemos $f {}^tH(u) = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0)$ em $\mathcal{D}'(x_0 - T/2, x_0 + T/2)$, o que é uma contradição com o item (iii). ■

As mesmas técnicas que aparecem na demonstração do teorema anterior são utilizadas para demonstrar as seguintes proposições.

2.31 Proposição. *Sejam (c, d) um intervalo aberto de $\mathbb{R}$, $u \in \mathcal{D}'((c, d))$ e $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ uma função flat em c tal que $fu = 1$ em $\mathcal{D}'((c, d))$. Então, para qualquer $\epsilon > 0$, u não admite extensão $\tilde{u} \in \mathcal{D}'((c - \epsilon, d))$.*

2.32 Proposição. *Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo aberto contendo x_0 e seja $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ uma função flat em x_0 . Então não existe $u \in \mathcal{D}'(I)$ tal que $fu = \delta(x - x_0) + c$, qualquer que seja $c \in \mathbb{C}$.*

III Distribuições no toro

Seja X uma variedade suave N -dimensional. Uma carta local em X será denotada por (U, x) , onde $x = (x_1, \dots, x_N) : U \subset X \rightarrow \mathbb{R}^N$.

Denotaremos por $\mathcal{C}^\infty(X)$ o espaço das funções $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ infinitamente diferenciáveis. Por definição, um campo vetorial complexo e suave em X é uma aplicação $\mathbb{C}$ -linear $L : \mathcal{C}^\infty(X) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(X)$ que satisfaz a regra de Leibniz $L(fg) = fLg + gLf$. O conjunto dos campos vetoriais complexos e suaves em X será denotado por $\mathfrak{X}(X)$.

Se $W \subset X$ for um aberto, a restrição de $L \in \mathfrak{X}(X)$ ao aberto W será o campo $L_W \in \mathfrak{X}(W)$, dado por $L_W f(q) = L\tilde{f}(q)$, onde $\tilde{f} \in \mathcal{C}^\infty(X)$ e $\tilde{f} \equiv f$ em um aberto contendo q .

Verifica-se que a aplicação $\mathbb{C}$ -linear $\partial_{x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} : \mathcal{C}^\infty(U) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(U)$, dada por $\partial_{x_j} f \doteq (\partial_{x_j}(f \circ x^{-1})) \circ x$, é um campo vetorial complexo suave em U . Mais ainda, verifica-se que

$$Lf(q) = \sum_{j=1}^N Lx_j(q) \partial_{x_j} f(q),$$

qualquer que seja $q \in U$. Tal expressão é chamada de representação do campo L nas coordenadas locais (U, x) .

Um campo $L \in \mathfrak{X}(X)$ será dito *real* quando satisfizer $LC^\infty(X, \mathbb{R}) \subset C^\infty(X, \mathbb{R})$.

Considere em $\mathbb{R}^N$ a relação de equivalência $x \sim y$ se, e somente se, $x - y \in 2\pi\mathbb{Z}^N$ e denote o conjunto das classes de equivalência por $\mathbb{R}^N/2\pi\mathbb{Z}^N$.

A aplicação canônica $\mathbf{p} : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N/2\pi\mathbb{Z}^N$, definida por

$$x \rightarrow \mathbf{p}(x) \doteq [x] = \{y \in \mathbb{R}^N; x - y \in 2\pi\mathbb{Z}^N\},$$

é sobrejetora. Consideraremos em $\mathbb{R}^N/2\pi\mathbb{Z}^N$ a topologia quociente induzida por $\mathbf{p}$ e chamaremos tal espaço topológico de *toro*, o qual denotaremos por $\mathbb{T}^N$.

A sobrejeção $\mathbf{p}$ é na verdade um homeomorfismo local, sendo assim, quando tratarmos de propriedades locais faremos um abuso de notação e denotaremos um ponto $q = \mathbf{p}(x_1, \dots, x_N)$ simplesmente por $(x_1, \dots, x_N)$. Também omitiremos a notação $\mathbf{p}$ da imagem de um intervalo $I \subset \mathbb{R}$ de comprimento menor que 2π , denotando $\mathbf{p}(I) \subset \mathbb{T}^1$ apenas por $I \subset \mathbb{T}^1$.

Pode-se verificar que $\mathbb{T}^N$ é uma variedade suave de dimensão N . Certas restrições da aplicação canônica $\mathbf{p}$ formam um atlas N -dimensional C^∞ para $\mathbb{T}^N$.

Com o objetivo de simplificarmos notações, utilizaremos a identificação entre $\mathbb{T}^N$ e a variedade produto $\mathbb{T}^1 \times \dots \times \mathbb{T}^1$ (N -vezes), dada pelo difeomorfismo C^∞ que associa $[(x_1, \dots, x_N)]$ ao ponto $([x_1], \dots, [x_N])$. Assim, denotaremos um ponto de $\mathbb{T}^N$ simplesmente por $(x_1, \dots, x_N)$, onde $x_i \in \mathbb{T}^1$.

Denotaremos por $C^\infty(\mathbb{T}^N)$ o espaço das funções $f : \mathbb{T}^N \rightarrow \mathbb{C}$ que são de classe C^∞ . Cada função f definida em $\mathbb{T}^N$ pode ser identificada com uma única função

$$\Lambda(f) \doteq f \circ \mathbf{p},$$

definida em $\mathbb{R}^N$ e 2π -periódica em cada variável. Como a aplicação quociente $\mathbf{p}$ é uma submersão sobrejetiva C^∞ , segue que $f \in C^\infty(\mathbb{T}^N)$ se, e somente se, $\Lambda(f) \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$. Obtemos assim um isomorfismo entre tais espaços vetoriais, com isomorfismo inverso dado por $\Lambda^{-1}(g)(\mathbf{p}(x)) \doteq g(x)$, para toda $g \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$.

O espaço $L^p(\mathbb{T}^N)$ ($1 \leq p \leq \infty$) é formado pelas funções $f : \mathbb{T}^N \rightarrow \mathbb{C}$ tais que a função $f \circ \mathbf{p} : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{C}$ é Lebesgue mensurável e $f \circ \mathbf{p} \in L^p((0, 2\pi)^N)$.

Sejam $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$, $q \in \mathbb{T}^N$ e $v \in T_q\mathbb{T}^N$ tangente a $\mathbb{T}^N$ em q . A derivada direcional de f na direção de v em q é o vetor $(f \circ c)'(0)$, onde c é uma das curvas que representam v . Assim, se $(U, \mathbf{p}^{-1} = (x_1, \dots, x_N))$ for uma carta local que contém q , então $\partial_{x_j} f(q)$ será a derivada direcional de f na direção do vetor de $T_q\mathbb{T}^N$ representado pela curva $c(t) = \mathbf{p}(\mathbf{p}^{-1}(q) + te_j)$. Mais ainda, $\partial_{x_j} f(q) = \partial_{x_j}(f \circ \mathbf{p})(\mathbf{p}^{-1}(q)) = \partial_{x_j}(\Lambda(f))(\mathbf{p}^{-1}(q))$, isto é $\partial_{x_j} f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ satisfaz $\Lambda(\partial_{x_j} f) = \partial_{x_j}(\Lambda(f))$, para cada $j = 1, \dots, N$.

Fixaremos em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ a topologia metrizável induzida pela sequência de seminormas

$$|\phi|_k \doteq \sup_{\substack{q \in \mathbb{T}^N \\ |\alpha| \leq k}} |(\partial^\alpha \phi)(q)|,$$

onde $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e $k \in \mathbb{Z}_+$. Deste modo, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é um espaço topológico metrizável, localmente convexo e completo, isto é, um espaço de Fréchet. Mais ainda, a transformação linear Λ que foi definida anteriormente é uma isometria entre os espaços topológicos metrizáveis $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$.

Utilizando tal identificação, podemos transportar para as funções de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ alguns resultados da seção I deste capítulo. Por exemplo, como o isomorfismo Λ satisfaz $\Lambda(gh) = \Lambda(g)\Lambda(h)$, segue das proposições (2.8) e (2.9) os seguintes corolários.

2.33 Corolário. *Se $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possuir apenas zeros de ordem finita, $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ for uma função tal que $g^{-1}(0) \subset f^{-1}(0)$ e a ordem de anulamento de f em cada $x \in g^{-1}(0)$ for maior que a ordem de anulamento da função g , então existirá $h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $gh = f$, $f^{-1}(0) = h^{-1}(0)$ e a ordem de anulamento de h em cada zero $x \in h^{-1}(0)$ será igual à ordem de anulamento de f menos a ordem de anulamento de g em x .*

2.34 Corolário. *Se $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possuir apenas zeros de ordem finita e $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ for uma função flat em $g^{-1}(0) \times \mathbb{T}^1$, então existirá $h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ flat em $g^{-1}(0) \times \mathbb{T}^1$ e tal que $g(x)h(x, t) = f(x, t)$, para todo $(x, t) \in \mathbb{T}^2$.*

Utilizando o Teorema (2.7) pode-se demonstrar a seguinte proposição.

2.35 Proposição. *Se $V \subset \mathbb{T}^2$ for um aberto contendo o conjunto $\{x_0\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$ e $(v_j)_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, então existirá $v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ com $S(v) \subset V$ e*

$$(\partial_x^j v)(x_0, \cdot) \equiv v_j,$$

para todo $j \in \mathbb{Z}_+$.

O espaço das distribuições em $\mathbb{T}^N$ será o dual de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e será denotado por $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$.

Das proposições A.2 e A.2' de [7] segue que um funcional linear $u : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N) \rightarrow \mathbb{C}$ será uma distribuição se, e somente se, existirem $C > 0$ e $k \in \mathbb{N}$ tais que

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_{q \in \mathbb{T}^N} |(\partial^\alpha \phi)(q)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$.

Fixaremos em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ a topologia *forte*. Dessa forma, os transpostos ${}^t\Lambda$ e ${}^t\Lambda^{-1}$ fornecem um isomorfismo entre $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e o dual forte de $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$. Consequentemente, $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ munido da topologia forte é isomorfo a $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$, onde $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ é um subespaço do dual forte de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Analogamente, os espaços vetoriais topológicos $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, $\mathcal{P}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ são todos isomorfos, quando consideramos neles a topologia *fraca*^{*}.

A Proposição (2.14) e o isomorfismo entre os duais forte $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ fornecem que uma sequência $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ converge para $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ se, e somente se, $\langle u_n - u, \phi \rangle \rightarrow 0$, qualquer que seja $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$.

É importante observar que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é reflexivo. De fato, como $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é um espaço de Fréchet, da Proposição (8.3) de [17] segue que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é um espaço de Baire. A Proposição (33.2) de [17] prova que todo espaço de Baire é tonelado (veja a definição de espaço tonelado na referência [17]), logo $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é um espaço tonelado. Utilizando as mesmas técnicas que aparecem no Exemplo (1.46) da referência [15], as quais envolvem resultados como o Teorema de Ascoli e o processo de diagonalização de Cantor, verifica-se que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ possui a propriedade de Heine-Borel, ou seja, todo subconjunto fechado e limitado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é compacto. Portanto, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é um espaço de Montel (veja a definição de espaço de Montel na referência [17]). Por fim, o corolário da Proposição (36.9) de [17] afirma que todo espaço de Montel é reflexivo, logo $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é reflexivo.

Analogamente ao que foi feito na seção anterior para as distribuições em $\mathcal{D}'(\Omega)$ e $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$, podemos definir em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ a distribuição *delta de Dirac*, o produto de uma distribuição por uma função de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$, a translação de uma distribuição (a translação de uma função $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ por $x_0 \in \mathbb{T}^N$ é a imagem inversa da translação de $\Lambda\phi$ por um representante de x_0) e podemos também derivar as distribuições em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$. Por fim, utilizamos a medida de Lebesgue em $\mathbb{R}^N$ para definir a integral de uma função $\phi \in L^1(\mathbb{T}^N)$, a qual é dada por $\int_{\mathbb{T}^N} \phi = \int_{[0, 2\pi]^N} (\Lambda\phi)(x) dx$. Dessa forma, cada função $\phi \in L^1(\mathbb{T}^N)$ define uma distribuição em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, dada por $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N) \ni \psi \mapsto \int_{\mathbb{T}^N} \phi \psi$ e denotada por $\phi \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$.

Em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ também vale um teorema de localização análogo ao que existe em $\mathcal{D}'(\Omega)$, o qual é uma consequência da existência de partições da unidade na variedade compacta $\mathbb{T}^N$. Para partições da unidade em variedades citamos a referência [6].

2.36 Teorema. *Se v e w são distribuições em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e cada ponto de $\mathbb{T}^N$ possui uma vizinhança aberta U tal que $\langle v, \phi \rangle = \langle w, \phi \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ tal que $S(\phi) \subset U$, então $v = w$.*

Também definimos o suporte de uma distribuição v em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ como sendo o conjunto de pontos que não possuem uma vizinhança U restrita a qual v se anule, ou seja, tal que $\langle v, \phi \rangle = 0$, para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ com $S(\phi) \subset U$. Equivalentemente, o suporte de v é a interseção de todos os fechados fora dos quais v é a distribuição nula. Utilizando partição da unidade em $\mathbb{T}^N$, verifica-se que a reunião de abertos onde $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ se anula é um aberto onde v se anula, logo existe um maior aberto onde v se anula, que é o complementar do suporte de v .

As distribuições de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ suportadas em um ponto também se escrevem como uma combinação linear de derivadas de delta.

2.37 Teorema. *Se $w \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ e $S(w) \subset \{x_0\}$, então w é uma combinação linear de derivadas de $\delta(x - x_0)$, isto é,*

$$w = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0).$$

Prova: Para cada $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, temos

$$\langle w, \phi \rangle = \langle {}^t H({}^t \Lambda^{-1} w), \xi \Lambda \phi \rangle,$$

qualquer que seja $\xi \in \mathcal{U}_{2\pi}(\mathbb{R})$, conforme Proposição (2.15).

Segue do Exemplo (2.10) que podemos tomar ξ tal que $S(\xi) \subset (x_0 - 2\pi, x_0 + 2\pi)$ e $\xi(x) \equiv 1$ em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}$.

Como $u = {}^t H({}^t \Lambda^{-1} w) \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $u = 0$ em $(x_0, x_0 + 2\pi)$, temos $S(u) \subset \{x_0 + 2m\pi; m \in \mathbb{Z}\}$. Utilizando o Teorema (2.24) no intervalo $(x_0 - 2\pi, x_0 + 2\pi)$, obtemos

$$\begin{aligned} \langle {}^t H({}^t \Lambda^{-1} w), \xi \Lambda \phi \rangle &= \sum_{j=0}^r c_j \langle \partial^j \delta(x - x_0), \xi \Lambda \phi \rangle = \\ &= \sum_{j=0}^r (-1)^j c_j \xi(x_0) (\partial^j \phi)(x_0) = \langle \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0), \phi \rangle, \end{aligned}$$

onde r é a ordem da distribuição $u = {}^tH({}^t\Lambda^{-1}w)$. Portanto,

$$\langle w, \phi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0), \phi \right\rangle,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. ■

Utilizando a mesma técnica da demonstração da Proposição (2.25), obtemos a seguinte proposição.

2.38 Proposição. *Sejam $x_0 \in \mathbb{T}^1$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1, \mathbb{R})$ tal que $x_0 \in f^{-1}(0)$, $P_k \doteq d/dx(f \cdot) + (ik \cdot)$ e $L_k \doteq f(x)d/dx + (ik \cdot)$. Se*

$$w = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1),$$

então existe

$$u = \sum_{j=0}^r b_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$$

e

$$v = \sum_{j=0}^r d_j \partial^j \delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$$

tal que $P_k(u) = w$ e $L_k(v) = w$.

2.39 Corolário. *Se $w \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ e $S(w) \subset \{x_1, x_2\}$, então existem u e v em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$, ambas suportadas em $\{x_1, x_2\}$, tais que $P_k v \doteq (fv)' + ikv = w$ e $L_k u \doteq fu' + iku = w$, onde $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1, \mathbb{R})$ satisfaz $\{x_1, x_2\} \subset f^{-1}(0)$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.*

Prova: Tome $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $S(\psi) \subset \mathbb{T}^1 \setminus \{x_2\}$ e $\psi \equiv 1$ em uma vizinhança de x_1 . Então as distribuições ψw e $(1 - \psi)w$ satisfazem $S(\psi w) \subset \{x_1\}$, $S((1 - \psi)w) \subset \{x_2\}$ e $w = \psi w + (1 - \psi)w$. Segue do Teorema (2.37) que

$$\psi w = \sum_{j=0}^{r_1} c_j \partial^j \delta(x - x_1)$$

e

$$(1 - \psi)w = \sum_{j=0}^{r_2} d_j \partial^j \delta(x - x_2).$$

Da Proposição (2.38) segue que existem

$$v_1 = \sum_{j=0}^{r_1} a_j \partial^j \delta(x - x_1)$$

e

$$v_2 = \sum_{j=0}^{r_2} b_j \partial^j \delta(x - x_2)$$

tais que $P_k v_1 = \psi w$ e $P_k v_2 = (1 - \psi)w$. Assim,

$$v = v_1 + v_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$$

satisfaz $S(v) \subset \{x_1, x_2\}$ e $P_k v = P_k v_1 + P_k v_2 = \psi w + (1 - \psi)w = w$.

A demonstração para o operador L_k é exatamente a mesma. ■

2.40 Observação. Note que as distribuições $u, v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ do Corolário (2.39) satisfazem $\langle u, \phi \rangle = 0 = \langle v, \phi \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ *flat* em $\{x_1, x_2\}$.

2.41 Teorema. *Sejam $w \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ e $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ uma função que se anula apenas em $x_0 \in \mathbb{T}^1$, o qual é um zero de ordem finita $r \geq 1$. Se $gw = 0$, então*

$$w = \sum_{j=0}^{r-1} c_j \partial^j \delta(x - x_0),$$

onde $c_j \in \mathbb{C}$, para $j = 0, \dots, r$.

Prova: Conforme a Proposição (2.15), para cada $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ temos

$$\langle w, \phi \rangle = \langle {}^t H({}^t \Lambda^{-1} w), \xi \Lambda \phi \rangle,$$

qualquer que seja $\xi \in \mathcal{U}_{2\pi}(\mathbb{R})$.

Segue do Exemplo (2.10) que podemos tomar ξ tal que $S(\xi) \subset (x_0 - 2\pi, x_0 + 2\pi)$ e $\xi(x) \equiv 1$ em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}$. Como ${}^t H({}^t \Lambda^{-1} w) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $(\Lambda g)({}^t H({}^t \Lambda^{-1} w)) = {}^t H((\Lambda g)({}^t \Lambda^{-1} w)) = {}^t H({}^t \Lambda^{-1}(gw)) = {}^t H({}^t \Lambda^{-1} 0) = 0$, utilizando o Teorema (2.27) no intervalo $(x_0 - 2\pi, x_0 + 2\pi)$, obtemos

$$\langle {}^t H({}^t \Lambda^{-1} w), \xi \Lambda \phi \rangle = \sum_{j=0}^{r-1} c_j \langle \partial^j \delta(x - x_0), \xi \Lambda \phi \rangle =$$

$$\sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j c_j \xi(x_0) (\partial^j \phi)(x_0) = \left\langle \sum_{j=0}^{r-1} c_j \partial^j \delta(x - x_0), \phi \right\rangle.$$

Portanto,

$$\langle w, \phi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^{r-1} c_j \partial^j \delta(x - x_0), \phi \right\rangle,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. ■

Também é possível dividir uma distribuição de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ por uma função que possua apenas zeros de ordem finita e é impossível dividir uma combinação linear não nula de derivadas de $\delta(x - x_0) \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ por uma função que seja *flat* em x_0 , bem como é impossível dividir uma distribuição constante não nula por uma função que seja *flat* em algum ponto. De fato, utilizando os isomorfismos entre os espaços $\mathcal{P}'_{2\pi}(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ e $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$, podemos obter versões dos teoremas (2.28) e (2.30) em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.

2.42 Teorema. *Seja $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ uma função que possua apenas zeros de ordem finita. Dada $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$, existe $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $fv = u$.*

2.43 Observação. Qualquer $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ que divide u por f , isto é, que satisfaz $fv = u$, está suportada em $S(u) \cup f^{-1}(0)$. Em particular, se $f^{-1}(0) \subset S(u)$, então $S(v) \subset S(u)$.

2.44 Teorema. (i) *Se $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ for flat em algum ponto de $\mathbb{T}^1$, não existirá uma distribuição $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $gv = 1$.*

(ii) *Se $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ for flat em $x_0 \in \mathbb{T}^1$, não existirá $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que*

$$gv = \sum_{j=0}^r c_j \partial^j \delta(x - x_0),$$

onde $c_j \in \mathbb{C}$, para todo $0 \leq j \leq r \in \mathbb{Z}_+$ e $c_r \neq 0$.

As proposições (2.31) e (2.32) também possuem versões em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.

2.45 Proposição. *Sejam $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{T}^1$ um intervalo aberto e $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ uma função flat em α . Não existe $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $\langle fu, \phi \rangle = \langle 1, \phi \rangle$ para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que satisfaz $S(\phi) \subset (\alpha, \beta)$.*

Prova: Suponha que exista $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $fu = 1 \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Utilizando o isomorfismo Λ obtemos $\Lambda f \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$, a qual é uma função *flat* em α ; onde podemos supor

$(\alpha, \beta) \subset [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}$. Mostremos que ${}^tH({}^t\Lambda^{-1}u) \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$ é uma distribuição que satisfaz $(\Lambda f)^tH({}^t\Lambda^{-1}u) = 1$ em (α, β) . De fato, para cada $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ com $S(\phi) \subset (\alpha, \beta)$, temos

$$\begin{aligned} \langle (\Lambda f)^tH({}^t\Lambda^{-1}u), \phi \rangle &= \langle {}^t\Lambda^{-1}u, (\Lambda f)(H\phi) \rangle = \langle fu, \Lambda^{-1}(H\phi) \rangle = \langle 1, \Lambda^{-1}(H\phi) \rangle = \\ &= \int_0^{2\pi} H\phi = \int_\alpha^\beta \phi = \langle 1, \phi \rangle. \end{aligned}$$

Portanto, $(\Lambda f)^tH({}^t\Lambda^{-1}u) = 1$ em (α, β) , uma contradição com a Proposição (2.31). ■

2.46 Proposição. *Seja $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ uma função flat em x_0 . Não existe $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $fu = \delta(x - x_0) + c$, qualquer que seja $c \in \mathbb{C}$.*

Prova: Suponha que exista $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $fu = \delta(x - x_0) + c$. Então a distribuição $(\Lambda f)^tH({}^t\Lambda^{-1}u) \in \mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R})$ é uma distribuição que satisfaz $(\Lambda f)^tH({}^t\Lambda^{-1}u) = {}^tH({}^t\Lambda^{-1}(\delta(x - x_0) + c)) = {}^tH(\delta(x - x_0) + c) = {}^tH\delta(x - x_0) + c = \delta(x - x_0) + c$ em $\mathcal{D}'((x_0 - \pi, x_0 + \pi))$, o que é uma contradição com a Proposição (2.32). ■

IV Série de Fourier e produto tensorial

Nas seções I.5 e I.6 da referência [18], o autor detalhou séries de Fourier em $\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$. Utilizaremos os isomorfismos $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N) \simeq \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N) \simeq \mathcal{P}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ para transportar tais resultados para os espaços $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$. Apesar de utilizarmos o isomorfismo Λ entre $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$, muitas vezes faremos um abuso de notação e denotaremos apenas por $\phi \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ a função $\Lambda\phi$.

Uma sequência numérica $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^N} \subset \mathbb{C}$ será dita *rapidamente decrescente* se para cada $k \in \mathbb{Z}_+$ existir $C > 0$ tal que

$$|c_m| \leq C/|m|^k,$$

para todo $m \in \mathbb{Z}^N \setminus \{0\}$. Diremos que $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^N} \subset \mathbb{C}$ será de *crescimento lento* se existirem constantes $M > 0$ e $k \in \mathbb{Z}_+$ tais que

$$|c_m| \leq M|m|^k,$$

para todo $m \in \mathbb{Z}^N \setminus \{0\}$.

Se $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^N} \subset \mathbb{C}$ for uma sequência rapidamente decrescente, então a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} c_m e_m$, onde $e_m \doteq \Lambda^{-1}(e^{im \cdot x})$, será convergente em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. Por outro lado, para cada função $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$, defina

$$\hat{\phi}(m) \doteq (2\pi)^{-N} \int_{\mathbb{T}^N} \phi e_{-m} = (2\pi)^{-N} \int_{[0, 2\pi]^N} \phi(x) e^{-im \cdot x} dx,$$

para todo $m \in \mathbb{Z}^N$. A sequência numérica $(\hat{\phi}(m))_{m \in \mathbb{Z}^N}$ é rapidamente decrescente e, assim, $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \hat{\phi}(m) e_m$ converge em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. Como vale a unicidade dos coeficientes de Fourier, concluímos que $\phi = \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \hat{\phi}(m) e_m$, com convergência em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. A unicidade dos coeficientes de Fourier garante que se $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e $\hat{\psi}(m) = 0$, para todo $m \in \mathbb{Z}^N$, então $\psi \equiv 0$.

A série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \hat{\phi}(m) e_m$ é chamada de *série de Fourier* da função ϕ e cada coeficiente $\hat{\phi}(m)$ é chamado de *coeficiente de Fourier* da função ϕ .

Suponha agora que $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^N} \subset \mathbb{C}$ seja uma sequência de crescimento lento, então a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} c_m e_m$ será convergente em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e se $u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} c_m e_m$, então

$$c_m = (2\pi)^{-N} \langle u, e_{-m} \rangle \doteq \hat{u}(m),$$

para cada $m \in \mathbb{Z}^N$. Por outro lado, se $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, então $\hat{u}(m) = (2\pi)^{-N} \langle u, e_{-m} \rangle$ forma uma sequência de crescimento lento e $u = \sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \hat{u}(m) e_m$, com convergência em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, uma vez que também vale a unicidade dos coeficientes $\hat{u}(m)$. A série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^N} \hat{u}(m) e_m$ é chamada de *série de Fourier* da distribuição u e cada coeficiente $\hat{u}(m)$ é chamado de *coeficiente de Fourier* da distribuição u .

Considere dois abertos $\Omega \subset \mathbb{R}^p$ e $\Omega' \subset \mathbb{R}^q$. Nas referências [1], [11] e [7], os autores apresentaram o produto direto (ou produto tensorial) entre distribuições de $\mathcal{D}'(\Omega)$ e distribuições de $\mathcal{D}'(\Omega')$. Utilizando o isomorfismo entre $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, obtemos o produto tensorial em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$.

Sejam $p, q \in \mathbb{N}$ e $N = p + q$. Tome $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^p)$, $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^q)$ e $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. Utilizando o isomorfismo $\mathcal{D}'_{2\pi}(\mathbb{R}^N) \simeq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e o Teorema (4.1.1) de [7], verifica-se que a função $\mathbb{T}^p \ni x \rightarrow \langle v, \phi(x, \cdot) \rangle$ pertence a $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ e, analogamente, a função $\mathbb{T}^q \ni y \rightarrow \langle u, \phi(\cdot, y) \rangle$

pertence a $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q)$. Mais ainda, para cada $\alpha \in \mathbb{Z}_+^p$ e $\beta \in \mathbb{Z}_+^q$, temos $\partial^\alpha \langle v, \phi(x, \cdot) \rangle = \langle v, (\partial_x^\alpha \phi)(x, \cdot) \rangle$ e $\partial^\beta \langle u, \phi(\cdot, y) \rangle = \langle u, (\partial_y^\beta \phi)(\cdot, y) \rangle$.

Defina $\langle u \otimes v, \phi \rangle = \langle u, \langle v, \phi(x, \cdot) \rangle \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. Como $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^p)$ e $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^q)$, podemos obter $C > 0$ e $k \in \mathbb{N}$ tais que

$$|\langle u \otimes v, \phi \rangle| \leq C \sum_{\substack{|\alpha| \leq k \\ \alpha \in \mathbb{Z}_+^N}} \sup_{z \in \mathbb{T}^N} |\partial^\alpha \phi(z)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. Assim, $u \otimes v$ é uma distribuição de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, chamada de *produto direto* entre u e v .

Se $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ e $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q)$, defina a função $\phi \otimes \psi$ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^{p+q})$ por $\phi \otimes \psi(x, y) = \phi(x)\psi(y)$. A distribuição $u \otimes v$ é a única que satisfaz $\langle u \otimes v, \phi \otimes \psi \rangle = \langle u, \phi \rangle \cdot \langle v, \psi \rangle$, uma vez que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p) \otimes \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q) \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é um subespaço denso. Em particular, $u \otimes v = v \otimes u$.

A distribuição $u \otimes v$ também satisfaz $\phi(u \otimes v) = (\phi u) \otimes v$ e $\psi(u \otimes v) = u \otimes (\psi v)$, quaisquer que sejam $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ e $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q)$.

Por fim, se $\alpha \in \mathbb{Z}_+^p$ e $\beta \in \mathbb{Z}_+^q$, então $\partial^{(\alpha, \beta)}(u \otimes v) = (\partial^\alpha u) \otimes (\partial^\beta v)$.

Continuaremos com $p, q \in \mathbb{N}$ e $N = p + q$. Diremos que uma sequência de funções $(\phi_m)_{m \in \mathbb{Z}^q} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ será *rapidamente decrescente* se para cada $\alpha \in \mathbb{Z}_+^p$ e $n \in \mathbb{Z}_+$ existir $C > 0$ tal que

$$|\partial^\alpha \phi_m(x)| \leq C/|m|^n,$$

para todo $x \in \mathbb{T}^p$ e $m \in \mathbb{Z}^q \setminus \{0\}$.

Dada $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$, temos $\phi(x, \cdot) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q)$ e, portanto, $\phi(x, \cdot) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \widehat{\phi(x, \cdot)}(m) e_m$.

Assim, $\phi(x, y) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \hat{\phi}_m(x) e_m(y)$, onde $\hat{\phi}_m(x) \doteq \widehat{\phi(x, \cdot)}(m) = (2\pi)^{-q} \int_{\mathbb{T}^q} \phi(x, \cdot) e_{-m} = (2\pi)^{-q} \int_{[0, 2\pi]^q} \phi(x, y) e^{-im \cdot y} dy$.

Verifica-se que $\hat{\phi}_m \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ e que $\partial^\alpha(\hat{\phi}_m)(x) = (2\pi)^{-q} \int_{\mathbb{T}^q} (\partial^{(\alpha, 0)} \phi)(x, \cdot) e_{-m}$, qualquer que seja $\alpha \in \mathbb{Z}_+^p$. Observe também que se $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ for tal que $\hat{\phi}_m \equiv 0$, para todo $m \in \mathbb{Z}^q$, então ϕ será a função identicamente nula.

Um teorema afirma que se $(\phi_m)_{m \in \mathbb{Z}^q} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ for uma sequência rapidamente decrescente de funções, então a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \phi_m e_m$ será convergente em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. Outro teorema afirma que para cada $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$, a sequência $(\hat{\phi}_m)_{m \in \mathbb{Z}^q} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ é rapidamente decrescente, assim, a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \hat{\phi}_m e_m$ converge em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ e a unicidade dos coeficientes implica que $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \hat{\phi}_m e_m$ converge para ϕ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$. A série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \hat{\phi}_m e_m$ é

chamada *série parcial de Fourier* na variável y e os coeficientes $\hat{\phi}_m$ são ditos *coeficientes parciais de Fourier*.

Considere agora $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e para cada $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ defina $u_\phi : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q) \rightarrow \mathbb{C}$ por $\langle u_\phi, \psi \rangle = \langle u, \phi \otimes \psi \rangle$, para toda $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^q)$.

Utilizando os resultados da seção I.6 de [18], verifica-se que $u_\phi \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^q)$, logo $u_\phi = \sum_{m \in \mathbb{Z}^q} \widehat{u_\phi}(m) e_m$ com convergência em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^q)$, onde $\widehat{u_\phi}(m) = (2\pi)^{-q} \langle u, \phi \otimes e_{-m} \rangle$.

Defina $\hat{u}_m : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p) \rightarrow \mathbb{C}$ por $\langle \hat{u}_m, \phi \rangle \doteq \widehat{u_\phi}(m) = (2\pi)^{-q} \langle u, \phi \otimes e_{-m} \rangle$, para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$. Então $\hat{u}_m \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^p)$ e se $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ for tal que $\hat{u}_m = 0$ para todo $m \in \mathbb{Z}^q$, então u será a distribuição nula.

Diremos que uma sequência $(u_m)_{m \in \mathbb{Z}^q} \subset \mathcal{D}'(\mathbb{T}^p)$ será de *crescimento lento* se existirem $C > 0$ e $n \in \mathbb{N}$ tais que

$$|\langle u_m, \phi \rangle| \leq C|m|^n \sum_{|\alpha| \leq n} \sup_{x \in \mathbb{T}^p} |(\partial^\alpha \phi)(x)|,$$

para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^p)$ e $m \in \mathbb{Z}^q \setminus \{0\}$.

Se $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, então $(\hat{u}_m)_{m \in \mathbb{Z}^q} \subset \mathcal{D}'(\mathbb{T}^p)$ será uma sequência de crescimento lento. Por outro lado, se $(u_m)_{m \in \mathbb{Z}^q} \subset \mathcal{D}'(\mathbb{T}^p)$ for uma sequência de crescimento lento, então a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} u_m \otimes e_m$ será convergente em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$ e pela unicidade dos coeficientes seguirá que a série $\sum_{m \in \mathbb{Z}^q} u_m \otimes e_m$ convergirá para u em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$.

Finalizando essa seção, apresentaremos dois resultados que serão utilizados no capítulo seguinte.

2.47 Proposição. *Se $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ for flat em $\{x_0\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$, então $\hat{f}_k \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ será flat em $x_0 \in \mathbb{T}^1$, qualquer que seja $k \in \mathbb{Z}$.*

2.48 Proposição. *Se $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ satisfizer $u' = 0$, então u será constante, isto é, $u = c$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$, onde $c \in \mathbb{C}$.*

Resolubilidade global

O estudo da resolubilidade global de operadores diferenciais parciais lineares consiste em determinar a sua imagem, sendo que a melhor situação ocorre quando o operador em questão é sobrejetor. Quando o operador não for sobrejetor, podemos questionar se sua imagem será um subespaço fechado, ou ainda, se sua imagem será de codimensão finita.

Os operadores que possuem imagem fechada são ditos *globalmente resolúveis* e os operadores que possuem imagem de codimensão finita são ditos *fortemente resolúveis*.

Nosso objetivo é estudar a resolubilidade global de uma classe de campos vetoriais reais em $\mathbb{T}_{(x,t)}^2$, a saber,

$$L \doteq \partial_t + a(x)\partial_x,$$

onde $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é uma função a valores reais. Para tal estudo, vamos tratar um campo da forma L como um operador que age no espaço de funções $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ ou no espaço de distribuições $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$.

Neste capítulo, estabeleceremos condições necessárias e suficientes para que um operador do tipo L possua imagem fechada, isto é, para que L seja *globalmente resolúvel*.

A palavra resolúvel está relacionada com o conceito de solução de equações; o que justifica definir como globalmente resolúveis os operadores que possuem imagem fechada

é a Proposição (1.2). De fato, segue da Proposição (1.2) que L será globalmente resolúvel se, e somente se, para cada $f \in (\ker {}^tL)^\circ$ existir u tal que $Lu = f$.

No caso mais simples em que $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$, já é possível verificar que um operador do tipo L não é sobrejetor (ver Apêndice A). Na verdade, nenhum operador do tipo L que age em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é sobrejetor. Por outro lado, um operador do tipo L agindo em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ é sobrejetor, se e somente se, $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita.

No caso em que $a^{-1}(0) = \emptyset$, veremos que um campo vetorial do tipo L se reduz a um campo vetorial com coeficientes constantes do tipo $\tilde{L} = \partial_x + \mu\partial_t$, onde $\mu \doteq (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a) \in \mathbb{R}$. Neste caso, veremos que L será globalmente resolúvel se, e somente se, μ for um número racional ou um irracional não Liouville.

Dizemos que um número irracional γ é um *número de Liouville* se existe uma sequência $(p_n, q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tal que $q_n \rightarrow \infty$ e $|\gamma - p_n/q_n| < (q_n)^{-n}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

No caso em que $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a resolubilidade global de L está relacionada com a ordem de anulamento dos zeros da função $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1, \mathbb{R})$.

Utilizando as ferramentas desenvolvidas nos capítulos anteriores, detalharemos a demonstração do seguinte teorema.

3.1 Teorema. *Para um operador do tipo $L = \partial_t + a(x)\partial_x$, as seguintes propriedades são equivalentes:*

- (I) $L\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$,
- (II) $L\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$,
- (III) Uma das seguintes situações ocorre:

- (III.1) $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$;
- (III.2) $a^{-1}(0) = \emptyset$ e $\mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a)$ é racional ou irracional não Liouville;
- (III.3) $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e cada $x \in a^{-1}(0)$ é um zero de ordem finita.

No artigo [3] os autores caracterizaram a resolubilidade forte em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ para campos vetoriais do tipo

$$\partial_t + (a(x) + ib(x))\partial_x,$$

onde $a, b \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ são funções reais. Com os argumentos que aparecem em [3] prova-se que $L : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ será fortemente resolúvel se, e somente se, $a^{-1}(0) = \emptyset$ e $\mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a)$ for um número irracional não Liouville.

Ao estudarmos a resolubilidade global de um operador do tipo L , aparece, via transposto, uma outra classe de operadores diferenciais parciais lineares de primeira ordem, formada por perturbações dos campos vetoriais do tipo L , a saber,

$$P \doteq \partial_t + \partial_x(a \cdot).$$

Observe que se considerarmos um operador P agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, então $-{}^tP = L$ e, reciprocamente, se considerarmos L agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, então $-{}^tL = P$. Para a classe de operadores do tipo P também vale um teorema análogo ao Teorema (3.1).

3.2 Teorema. *Para um operador do tipo $P = \partial_t + \partial_x(a \cdot)$, as seguintes propriedades são equivalentes:*

(I) $PC^\infty(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$,

(II) $PD'(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$,

(III) Uma das seguintes situações ocorre:

(III.1) $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$;

(III.2) $a^{-1}(0) = \emptyset$ e $\mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a)$ é racional ou irracional não Liouville;

(III.3) $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e cada $x \in a^{-1}(0)$ é um zero de ordem finita.

I Resolubilidade global no espaço de funções

Nesta seção, trataremos da resolubilidade global no espaço de funções $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Utilizando a Proposição (1.2), a qual caracteriza o fecho da imagem dos operadores L e P , segue que $LC^\infty(\mathbb{T}^2)$ será um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ se, e somente se,

$$LC^\infty(\mathbb{T}^2) \supset (\ker {}^tL)^\circ \doteq \mathcal{E}$$

e $PC^\infty(\mathbb{T}^2)$ será um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ se, e somente se,

$$PC^\infty(\mathbb{T}^2) \supset (\ker {}^tP)^\circ \doteq \mathcal{G}.$$

Podemos então reescrever os teoremas (3.1) e (3.2) da seguinte maneira.

3.3 Teorema. *Para um operador do tipo $L = \partial_t + a(x)\partial_x$, as seguintes propriedades são equivalentes:*

$$(i) \quad LC^\infty(\mathbb{T}^2) \supset (\ker {}^tL)^\circ,$$

(ii) *Uma das seguintes situações ocorre:*

$$(ii.1) \quad a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1;$$

$$(ii.2) \quad a^{-1}(0) = \emptyset \text{ e } \mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a) \text{ é racional ou irracional não Liouville};$$

$$(ii.3) \quad \emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1 \text{ e cada } x \in a^{-1}(0) \text{ é um zero de ordem finita.}$$

3.4 Teorema. *Para um operador do tipo $P = \partial_t + \partial_x(a \cdot)$, as seguintes propriedades são equivalentes:*

$$(i) \quad PC^\infty(\mathbb{T}^2) \supset (\ker {}^tP)^\circ,$$

(ii) *Uma das seguintes situações ocorre:*

$$(ii.1) \quad a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1;$$

$$(ii.2) \quad a^{-1}(0) = \emptyset \text{ e } \mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a) \text{ é racional ou irracional não Liouville};$$

$$(ii.3) \quad \emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1 \text{ e cada } x \in a^{-1}(0) \text{ é um zero de ordem finita.}$$

Consideraremos inicialmente o caso em que a função a é identicamente nula e o caso em que a função a nunca se anula. Veremos que em tais casos ambos os operadores resumem-se a operadores com coeficientes constantes. De fato, se $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$, então ambos os operadores L e P reduzem-se ao operador $Q \doteq \partial_t : C^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow C^\infty(\mathbb{T}^2)$, o qual possui imagem fechada em $C^\infty(\mathbb{T}^2)$, conforme o Teorema (A.1) do Apêndice A.

Agora suponha que $a^{-1}(0) = \emptyset$. Verificar se L agindo em $C^\infty(\mathbb{T}^2)$ possui imagem fechada equivale a verificar se L agindo em $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^2)$ possui imagem fechada. Podemos multiplicar o campo L por $a^{-1} \in C^\infty(\mathbb{T}^1)$, obtendo $(1/a)L = (1/a)\partial_t + \partial_x$ e aplicando a mudança de variáveis $X(x, t) = x, T(x, t) = t + \mu x - \int_0^x 1/a$, o campo $(1/a)L$ se reduz ao campo $\tilde{L} \doteq \partial_X + \mu\partial_T$. De fato, a aplicação $\mathcal{M} : \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R}^2)$, dada por $\mathcal{M}(\phi)(x, t) = \phi(X(x, t), T(x, t)) = \phi(x, t + \mu x - \int_0^x 1/a)$, é um homeomorfismo linear com inverso dado por $\mathcal{M}^{-1}(\psi)(X, T) = \psi(x(X, T), t(X, T)) = \psi(X, T - \mu X + \int_0^X 1/a)$ e tal que $\mathcal{M}^{-1} \circ (1/a)L \circ \mathcal{M} = \tilde{L}$. Assim, L tem imagem fechada se, e somente se, $\tilde{L}$ tem imagem fechada, o que ocorre se, e somente se, μ é racional ou irracional não Liouville, conforme o Teorema (A.1) do Apêndice A.

Analogamente, aplicando a mesma mudança de variáveis para os operadores do tipo P, temos $\mathcal{M}^{-1} \circ P \circ \mathcal{M} = \tilde{L} \circ M_a$, onde $M_a(\phi) \doteq a\phi$ é também um homeomorfismo linear. Assim, P tem imagem fechada se, e somente se, $\tilde{L}$ tem imagem fechada, o que ocorre se, e somente se, μ é racional ou irracional não Liouville.

Portanto, quando $a^{-1}(0) = \emptyset$, os teoremas (3.3) e (3.4) são uma consequência do Teorema (A.1) do Apêndice A.

As considerações feitas no Apêndice A também implicam que quando $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$ ou $a^{-1}(0) = \emptyset$, nenhum campo do tipo L ou do tipo P será sobrejetor. Mais ainda, quando $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$, nenhum campo dos tipos L ou P será fortemente resolúvel e quando $a^{-1}(0) = \emptyset$, um campo do tipo L ou do tipo P será fortemente resolúvel se, e somente se, $\mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a) \in \mathbb{R}$ for um número irracional não Liouville.

Consideremos agora o caso em que $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$. Nosso primeiro objetivo é mostrar que a hipótese de que $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita é uma condição suficiente para que a imagem de um operador do tipo L (ou do tipo P) seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Para cada $f \in \mathcal{E}$ deve existir $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $Lu = f$. Em particular, deve existir $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $Lu - f$ seja *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$. O próximo teorema afirma que sempre existe $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $Lu - f$ é *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$.

3.5 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a possuir apenas zeros de ordem finita e se $f \in \mathcal{E}$, então existirá $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $Lu - f$ será flat em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$.*

Prova: Como a função a possui apenas zeros de ordem finita, o conjunto $a^{-1}(0) = \{x_1, \dots, x_N\} \subset \mathbb{T}^1$ é finito. Assim sendo, para cada $l = 1, \dots, N$, existe V_l , vizinhança aberta do conjunto $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$, tal que $V_l \cap V_k = \emptyset$, se $l \neq k$.

Se mostrarmos que existem funções $u_l \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, $l = 1, \dots, N$, tais que $S(u_l) \subset V_l$ e $L(u_l) - f$ é *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$, então a função $u = u_1 + \dots + u_N$ satisfará a tese do teorema. A existência de tais funções seguirá da Proposição (2.35), o qual é um resultado devido a Borel.

Fixe $x_l \in a^{-1}(0)$ um zero de ordem finita $n \geq 1$. Considere $\mathcal{S}$ o $\mathbb{C}$ -espaço vetorial formado pelas sequências $(v_j)_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. A aplicação $T : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{S}$, dada por $Tv = (v_j)_{j \in \mathbb{Z}_+}$, onde $v_j \equiv (j!)^{-1}(\partial_x^j v)(x_l, \cdot)$, é uma transformação linear que satisfaz $Tv = 0$ se, e somente se, v é *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$.

Denote

$$Ta = ((j!)^{-1}a^{(j)}(x_l))_{j \in \mathbb{Z}_+} \doteq (a_j)_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathbb{R}$$

e

$$Tf = ((j!)^{-1}(\partial_x^j f)(x_l, \cdot))_{j \in \mathbb{Z}_+} \doteq (f_j)_{j \in \mathbb{Z}_+}.$$

Para $v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, temos

$$T(Lv) = \left(v'_j + \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m} \right)_{j \in \mathbb{Z}_+},$$

pois

$$\begin{aligned} (j!)^{-1}(\partial_x^j(\partial_t v + a\partial_x v))(x_l, \cdot) &= \\ \partial_t((j!)^{-1}\partial_x^j v)(x_l, \cdot) + (j!)^{-1} \sum_{m=0}^j \binom{j}{m} a^{(m)}(x_l) (\partial_x^{j+1-m} v)(x_l, \cdot) &= \\ v'_j + \sum_{m=0}^j (j!)^{-1} \binom{j}{m} m! a_m (j+1-m)! v_{j+1-m} &= \\ v'_j + \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m}, \end{aligned}$$

para todo $j \in \mathbb{Z}_+$. Assim,

$$T(Lv - f) = \left(v'_j + \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m} - f_j \right)_{j \in \mathbb{Z}_+}$$

e $Lv - f$ é *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$ se, e somente se,

$$v'_j + \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m} \equiv f_j, \quad (.1)$$

para todo $j \in \mathbb{Z}_+$.

Uma análise da equação (.1) nos direciona a questionar quais funções de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possuem primitivas. Utilizando série de Fourier, verifica-se que uma função $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possui primitiva se, e somente se, $\hat{g}(0) = 0$. Neste caso, uma primitiva de g é dada por $h = \sum_{k \neq 0} (\hat{g}(k)/ik) e_k$; logo g possui primitivas de todas as ordens.

Sendo assim, podemos decompor cada função $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ como uma soma de uma função constante com uma função que possua primitivas de todas as ordens, a saber, $g = g_0 + g_1$, onde $g_0 \equiv \hat{g}(0)$ e $g_1 = \sum_{k \neq 0} \hat{g}(k) e_k$. Utilizaremos tal decomposição para as

funções v_j , f_j e resolveremos (.1) separadamente para $v_{j,0}$ e $v_{j,1}$, isto é, para resolvermos (.1), basta resolvermos as equações

$$v'_{j,0} + \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m,0} = \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m,0} = f_{j,0} \quad (.2)$$

e

$$v'_{j,1} + \sum_{m=0}^j (j+1-m)a_m v_{j+1-m,1} \equiv f_{j,1}, \quad (.3)$$

para todo $j \in \mathbb{Z}_+$.

Como $a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$ e $a_n \neq 0$, pois x_l é um zero de ordem n de a , a equação (.3) é equivalente a

$$v'_{j,1} \equiv f_{j,1}, \quad j = 0, \dots, n-1$$

e

$$v'_{j,1} + (j+1-n)a_n v_{j+1-n,1} + \dots + a_j v_{1,1} \equiv f_{j,1}, \quad j \geq n.$$

Como as funções $f_{j,1}$ possuem primitivas e as funções de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que possuem primitivas, possuem primitivas de todas as ordens, podemos determinar indutivamente $v_{0,1}, v_{1,1}, \dots$ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, de modo que tais funções satisfaçam as equações acima.

Por fim, a equação (.2) é equivalente a

$$0 = f_{j,0}, \quad j = 0, \dots, n-1$$

e

$$(j+1-n)a_n v_{j+1-n,0} + \dots + a_j v_{1,0} = f_{j,0}, \quad j \geq n.$$

Como $a_n \neq 0$, podemos determinar indutivamente $v_{1,0} = f_{n,0}(a_n)^{-1}$ e

$$v_{k+1,0} = [(k+1)a_n]^{-1} (f_{n+k,0} - \sum_{m=n+1}^{n+k} (n+k+1-m)a_m v_{n+k+1-m,0}),$$

para $k \geq 1$. Note que $v_{0,0}$ pode ser escolhida arbitrariamente.

As condições $0 \equiv f_{j,0}$, $j = 0, \dots, n-1$, são chamadas condições de compatibilidade e estão satisfeitas, pois

$$f_{j,0} = \hat{f}_j(0) = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} f_j = (2\pi j!)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (\partial_x^j f)(x_l, \cdot) = (-1)^j (2\pi j!)^{-1} \langle \delta^j(x-x_l) \otimes 1_t, f \rangle,$$

$f \in \mathcal{E} = (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ$ e $\delta^j(x - x_l) \otimes 1_t \in \ker {}^t\mathbf{L}$, para $j = 0, \dots, n-1$. De fato,

$$-{}^t\mathbf{L}(\delta^j(x - x_l) \otimes 1_t) = \delta^j(x - x_l) \otimes \partial_t 1_t + \partial_x(a\delta^j(x - x_l)) \otimes 1_t = \partial_x(a\delta^j(x - x_l)) \otimes 1_t = 0,$$

uma vez que

$$\begin{aligned} \langle \partial_x(a\delta^j(x - x_l)), \phi \rangle &= -\langle \delta^j(x - x_l), a\phi' \rangle = (-1)^{j+1} \langle \delta(x - x_l), \partial^j(a\phi') \rangle = \\ &= (-1)^{j+1} \sum_{m=0}^j \binom{j}{m} a^{(m)}(x_l) \phi^{(j+1-m)}(x_l) = 0, \end{aligned}$$

para $j = 0, \dots, n-1$.

Portanto, existem $(v_{j,0})_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathbb{C}$ e $(v_{j,1})_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que satisfazem (.2) e (.3), respectivamente. Então $(v_j = v_{j,0} + v_{j,1})_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ satisfaz (.1). Segue da Proposição (2.35) que existe $u_l \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $S(u_l) \subset V_l$ e $(\partial_x^j u_l)(x_l, \cdot) \equiv (j!)v_j$, para todo $j \in \mathbb{Z}_+$. Como $(v_j)_{j \in \mathbb{Z}_+}$ satisfaz (.1), segue que $\mathbf{L}(u_l) - f$ é *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$. ■

Para os operadores do tipo P também vale um resultado análogo ao Teorema (3.5). Na sua demonstração utilizaremos o seguinte lema.

3.6 Lema. *Sejam c um número real não nulo e $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. Então existe $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $u' + cu = f$.*

Prova: Utilizando série de Fourier, para $v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, temos $v' + cv = f$ se, e somente se, $\hat{v}(k) = (c + ik)^{-1} \hat{f}(k)$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Agora, $(\hat{f}(k))_{k \in \mathbb{Z}}$ é uma sequência rapidamente decrescente, logo $((c + ik)^{-1} \hat{f}(k))_{k \in \mathbb{Z}}$ também é uma seqência rapidamente decrescente e, portanto, define uma função $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $\hat{u}(k) = (c + ik)^{-1} \hat{f}(k)$, para todo $k \in \mathbb{Z}$, logo $u' + cu = f$. ■

3.7 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a possuir apenas zeros de ordem finita e se $f \in \mathcal{G}$, então existirá $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{P}u - f$ será *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$.*

Prova: Utilizando as mesmas notações e repetindo os mesmos argumentos da demonstração do Teorema (3.5), basta exibir $u_l \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $S(u_l) \subset V_l$ e $\mathbf{P}(u_l) - f$ seja *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$. Para $v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, temos

$$T(\mathbf{P}v - f) = \left(v'_j + (j+1) \sum_{m=0}^{j+1} a_m v_{j-m+1} - f_j \right)_{j \in \mathbb{Z}_+},$$

onde $T : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{S}$ é a aplicação definida na demonstração do Teorema (3.5). Assim, $Pv - f$ é *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$ se, e somente se,

$$v'_j + (j+1) \sum_{m=0}^{j+1} a_m v_{j-m+1} \equiv f_j, \quad (.4)$$

para todo $j \in \mathbb{Z}_+$. Decompondo novamente uma função em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ como uma soma de uma constante com uma função que possui primitivas de todas as ordens, segue que para resolvermos (.4), basta resolvermos

$$(j+1) \sum_{m=0}^{j+1} a_m v_{j-m+1,0} \equiv f_{j,0} \quad (.5)$$

e

$$v'_{j,1} + (j+1) \sum_{m=0}^{j+1} a_m v_{j-m+1,1} \equiv f_{j,1}, \quad (.6)$$

para todo $j \in \mathbb{Z}_+$.

Agora, $a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$ e $a_n \neq 0$, pois x_l é um zero de ordem n de a . Assim, se $n = 1$, a equação (.6) é equivalente a

$$v'_{j,1} + (j+1)[a_1 v_{j,1} + \dots + a_{j+1} v_{0,1}] \equiv f_{j,1}, \quad j \geq 0,$$

a qual pode ser resolvida, pois do Lema (3.6) segue que podemos determinar indutivamente $v_{0,1}, v_{1,1}, \dots$ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tais que $v'_{0,1} + a_1 v_{0,1} \equiv f_{0,1}$ e $v'_{j,1} + (j+1)a_1 v_{j,1} \equiv f_{j,1} - (j+1)[a_2 v_{j-1,1} + \dots + a_{j+1} v_{0,1}]$, para $j \geq 1$.

Se $n > 1$, a equação (.6) é equivalente a

$$v'_{j,1} \equiv f_{j,1}, \quad j = 0, \dots, n-2$$

$$v'_{j,1} + (j+1)[a_n v_{j+1-n,1} + \dots + a_{j+1} v_{0,1}] \equiv f_{j,1}, \quad j \geq n-1.$$

Neste caso, como as funções $f_{j,1}$ possuem primitivas e as funções de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que possuem primitivas, possuem primitivas de todas as ordens, podemos determinar indutivamente $v_{0,1}, v_{1,1}, \dots$ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que satisfazem as equações acima.

Por fim, se $n = 1$, a equação (.5) é equivalente a

$$a_1 v_{j,0} + a_2 v_{j-1,0} + \dots + a_{j+1} v_{0,0} = (j+1)^{-1} f_{j,0}, \quad j \geq 0,$$

a qual pode ser resolvida tomando $v_{0,0} = a_1^{-1}f_{0,0}$ e

$$v_{j,0} = a_1^{-1}[(j+1)^{-1}f_{j,0} - a_2v_{j-1,0} - \cdots - a_{j+1}v_{0,0}],$$

para $j \geq 1$.

Se $n > 1$, a equação (.5) é equivalente a

$$0 = f_{j,0}, \quad j = 0, \dots, n-2$$

e

$$a_nv_{j+1-n,0} + a_{n+1}v_{j-n,0} + \cdots + a_{j+1}v_{0,0} = (j+1)^{-1}f_{j,0}, \quad j \geq n-1,$$

a qual pode ser resolvida tomando $v_{j+1-n,0} = a_n^{-1}[(j+1)^{-1}f_{j,0} - a_{n+1}v_{j-n,0} - \cdots - a_{j+1}v_{0,0}]$, para $j \geq n-1$. As condições de compatibilidade $0 \equiv f_{j,0}$, para $j = 0, \dots, n-2$, estão satisfeitas pois $f \in \mathcal{G} = (\ker {}^t\mathbf{P})^\circ$ e $\delta^j(x - x_l) \otimes 1_t \in \ker {}^t\mathbf{P}$, para $j = 0, \dots, n-2$. Tal fato pode ser verificado procedendo de maneira análoga ao que foi feito na demonstração do Teorema (3.5).

Portanto, existem $(v_{j,0})_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathbb{C}$ e $(v_{j,1})_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que satisfazem (.5) e (.6), respectivamente. Então $(v_j = v_{j,0} + v_{j,1})_{j \in \mathbb{Z}_+} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ satisfaz (.4). Segue da Proposição (2.35) que existe $u_l \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $S(u_l) \subset V_l$ e $(\partial_x^j u_l)(x_l, \cdot) \equiv (j!)v_j$, para todo $j \in \mathbb{Z}_+$. Como $(v_j)_{j \in \mathbb{Z}_+}$ satisfaz (.4), segue que $\mathbf{P}(u_l) - f$ é *flat* em $\{x_l\} \times \mathbb{T}^1 \subset \mathbb{T}^2$. ■

3.8 Observação. Se a função $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possui apenas zeros de ordem 1, então não aparecem as condições de compatibilidade e o teorema anterior vale para qualquer $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a possuir apenas zeros de ordem finita e se $f \in \mathcal{E}$, seguirá do Teorema (3.5) que existe $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}u - f$ é *flat* em $a^{-1}(0)$. Dizemos então que o Teorema (3.5) resolve, módulo funções que são *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$, o problema de encontrar $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}u = f$. Observe que $\mathbf{L}u - f \in \mathcal{E}$, uma vez que $\mathcal{E}$ é um subespaço vetorial e $\mathbf{L}u, f \in \mathcal{E}$. Se existir $v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}v = \mathbf{L}u - f$, então existirá $u - v \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}(u - v) = f$.

Passaremos então a considerar o caso em que o segundo membro de $\mathbf{L}u = f$ é uma função de $\mathcal{E}$, *flat* em $a^{-1}(0)$.

Para cada $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, a série parcial de Fourier na variável t e a continuidade do operador $\mathbf{L}$ fornecem que $\mathbf{L}u = f$ se, e somente se,

$$a(x)\hat{u}'_k(x) + ik\hat{u}_k(x) = \hat{f}_k(x),$$

para todo $x \in \mathbb{T}^1$ e $k \in \mathbb{Z}$. Considere a equação $a(x)\hat{u}'_k(x) + ik\hat{u}_k(x) = \hat{f}_k(x)$ em $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$ e suponha que desejamos resolvê-la no intervalo (x_1, x_2) , onde $x_1 < x_2$ são zeros consecutivos de a . Neste caso, fixemos y_1 e z_1 em (x_1, x_2) . Dividindo a equação pela função a e utilizando fator integrante obtemos

$$\frac{d}{dx} \left(\hat{u}_k(x) \exp\{ik \int_{y_1}^x a^{-1}(y)dy\} \right) = \hat{f}_k(x) a^{-1}(x) \exp\{ik \int_{y_1}^x a^{-1}(y)dy\},$$

para todo $x \in (x_1, x_2)$. Equivalentemente, existe $c \in \mathbb{C}$ tal que

$$\hat{u}_k(x) \exp\{ik \int_{y_1}^x a^{-1}(y)dy\} = c + \int_{z_1}^x \hat{f}_k(y) a^{-1}(y) \exp\{ik \int_{y_1}^y a^{-1}(z)dz\} dy$$

em (x_1, x_2) . Então uma solução da equação $a(x)\hat{u}'_k(x) + ik\hat{u}_k(x) = \hat{f}_k(x)$ no intervalo (x_1, x_2) possui a forma

$$\hat{u}_k(x) = \exp\{-ik \int_{y_1}^x a^{-1}(z)dz\} \left(c + \int_{z_1}^x \hat{f}_k(y) a^{-1}(y) \exp\{ik \int_{y_1}^y a^{-1}(z)dz\} dy \right).$$

Vale notar que qualquer que seja $c \in \mathbb{C}$, a expressão acima satisfaz a equação $a(x)\hat{u}'_k(x) + ik\hat{u}_k(x) = \hat{f}_k(x)$ em (x_1, x_2) .

Desejamos estender suavemente estas soluções a todo o intervalo $[x_1, x_2]$, de modo que elas forneçam uma solução definida em $\mathbb{T}^1$. A próxima proposição irá auxiliar nessa tarefa.

3.9 Proposição. *Seja $b \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ e $x_1 < x_2$ dois zeros de ordem finita de b tais que $(x_1, x_2) \cap b^{-1}(0) = \emptyset$. Defina $B(x) = \int_y^x b^{-1}(z)dz$, para todo $x \in (x_1, x_2)$, onde $y \in (x_1, x_2)$ é um elemento fixado arbitrariamente. Se g for uma função infinitamente diferenciável em uma vizinhança de $[x_1, x_2]$ e flat em $\{x_1, x_2\}$, então a função*

$$h(x) = \begin{cases} \exp\{iB(x)\}g(x), & \text{se } x \in (x_1, x_2) \\ 0, & \text{se } x = x_1 \text{ ou } x = x_2 \end{cases}$$

está em $\mathcal{C}^\infty((x_1, x_2))$ e $h^{(n)}(x_1^+) \doteq \lim_{x \rightarrow x_1^+} h^{(n)}(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_2^-} h^{(n)}(x) \doteq h^{(n)}(x_2^-)$, para todo $n \in \mathbb{Z}_+$.

Prova: Utilizando que $|\exp\{iB(x)\}| \equiv 1$ e que $\lim_{x \rightarrow x_1^+} g(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_2^-} g(x)$, obtemos $h(x_1^+) = 0 = h(x_2^-)$.

Derivando h em (x_1, x_2) obtemos $h'(x) = \exp\{iB(x)\}[g'(x) + ig(x)/b(x)]$. Como g é flat em $\{x_1, x_2\}$ e b se anula de ordem finita, segue da Proposição (2.8) que $h'(x) =$

$\exp\{iB(x)\}\phi_1(x)$, onde ϕ_1 é uma função infinitamente diferenciável em uma vizinhança de $[x_1, x_2]$ e *flat* em $\{x_1, x_2\}$. Pelos mesmos argumentos do parágrafo anterior segue que $h'(x_1^+) = 0 = h'(x_1^-)$.

Analogamente, para $n \geq 2$ obtemos $h^{(n)}(x) = \exp\{iB(x)\}\phi_n(x)$, para $x \in (x_1, x_2)$, onde ϕ_n é uma função infinitamente diferenciável em uma vizinhança de $[x_1, x_2]$ e *flat* em $\{x_1, x_2\}$. Aplicando o mesmo argumento do primeiro parágrafo obtemos $h^{(n)}(x_1^+) = 0 = h^{(n)}(x_2^-)$. ■

3.10 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e a possuir apenas zeros de ordem finita, então para cada $f \in \mathcal{E}$ que for *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$ existirá $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}u = f$.*

Prova: Para cada $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, a série parcial de Fourier na variável t e a continuidade do operador $\mathbf{L}$ fornecem $\mathbf{L}u = f$ se, e somente se,

$$a(x)\hat{u}'_k(x) + ik\hat{u}_k(x) = \hat{f}_k(x), \quad (.7)$$

para todo $x \in \mathbb{T}^1$ e $k \in \mathbb{Z}$. Sendo assim, obter $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}u = f$ é equivalente a obter uma sequência de funções de decrescimento rápido em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que satisfaz (.7).

No caso em que $k = 0$, devemos resolver a equação $a(x)\hat{u}'_0(x) = \hat{f}_0(x)$, onde $x \in \mathbb{T}^1$. Segue da Proposição (2.47) que $\hat{f}_0$ é *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^1$ e como a possui apenas zeros de ordem finita em $\mathbb{T}^1$, segue do Corolário (2.33) que existe $v_0 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $a(x)v_0(x) = \hat{f}_0(x)$. Falta concluir que v_0 é uma função que possui primitiva, o que ocorre se, e somente se, $\langle 1, v_0 \rangle = 0$. Pelo Teorema (2.42) existe $1/a \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $a(1/a) = 1$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Assim,

$$\langle 1, v_0 \rangle = \langle a(1/a), v_0 \rangle = \langle 1/a, \hat{f}_0 \rangle = \langle 1/a, (2\pi)^{-1} \langle 1_t, f(x, \cdot) \rangle \rangle = (2\pi)^{-1} \langle (1/a) \otimes 1_t, f \rangle$$

e como $-{}^t\mathbf{L}((1/a) \otimes 1_t) = (1/a) \otimes \partial_t 1_t + \partial_x(a((1/a) \otimes 1_t)) = (\partial_x 1_x) \otimes 1_t = 0$, segue que $(1/a) \otimes 1_t \in \ker {}^t\mathbf{L}$. Portanto, a hipótese $f \in \mathcal{E} = (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ$ implica que $\langle 1, v_0 \rangle = (2\pi)^{-1} \langle (1/a) \otimes 1_t, f \rangle = 0$. Então existe $\hat{u}_0 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $\hat{u}'_0 = v_0$, logo $\hat{u}_0$ satisfaz $a(x)\hat{u}'_0(x) = a(x)v_0(x) = \hat{f}_0(x)$, $x \in \mathbb{T}^1$.

Consideremos agora o caso em que $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Utilizando as propriedades do isomorfismo entre $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ e $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$, segue que resolver a equação (.7) em $\mathbb{T}^1$ é equivalente a resolver a equação associada em $\mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$. Para facilitar a notação iremos omitir o isomorfismo Λ .

Escolha $x_1 \in a^{-1}(0)$, denote o conjunto $a^{-1}(0) \cap [x_1, x_1 + 2\pi)$ por $\{x_1 < \dots < x_N\}$ e defina $x_{N+1} = x_1 + 2\pi$.

Com base nas ideias que antecedem a Proposição (3.9), fixe $y_j \in (x_j, x_{j+1})$, para $j = 1, \dots, N$ e defina $A_j(x) = \int_{y_j}^x a^{-1}(z)dz$, para $x \in (x_j, x_{j+1})$. Então $A_j \in \mathcal{C}^\infty((x_j, x_{j+1}))$, logo $\exp\{ikA_j\} \in \mathcal{C}^\infty((x_j, x_{j+1}))$ e é limitada. Das proposições (2.47) e (2.8) segue que, para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, existe $h_k \in \mathcal{P}_{2\pi}(\mathbb{R})$, *flat* em $a^{-1}(0)$ e tal que $h_k = \hat{f}_k/a$ em (x_j, x_{j+1}) , para $j = 1, \dots, N$. Da Proposição (3.9) resulta que cada função

$$g_k^j(x) = \begin{cases} \exp\{ikA_j(x)\}\hat{f}_k(x)/a(x), & \text{se } x \in (x_j, x_{j+1}) \\ 0, & \text{se } x = x_j \text{ ou } x = x_{j+1} \end{cases}$$

pertence a $\mathcal{C}^\infty((x_j, x_{j+1}))$ e $(g_k^j)^{(n)}(x_j^+) = 0 = (g_k^j)^{(n)}(x_{j+1}^-)$, para todo $n \in \mathbb{Z}_+$. Sendo assim, se definirmos $x_0 = x_N - 2\pi$, $x_{N+2} = x_2 + 2\pi$ e se mostrarmos que

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} g_k^j(x)dx = 0, \quad (.8)$$

para todo $j = 1, \dots, N$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, então a função

$$G_k^j(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in [x_{j+1}, x_{j+2}) \\ \int_{x_j}^x g_k^j(y)dy, & \text{se } x \in (x_j, x_{j+1}) \\ 0, & \text{se } x \in (x_{j-1}, x_j] \end{cases}$$

será infinitamente diferenciável em uma vizinhança de $[x_j, x_{j+1}]$ e *flat* em $\{x_j, x_{j+1}\}$. Assim, supondo valer (.8), segue da Proposição (3.9) que

$$\hat{u}_k(x) = \begin{cases} \exp\{-ikA_j(x)\} \int_{x_j}^x g_k^j(y)dy, & \text{para } x \in (x_j, x_{j+1}) \text{ e } j = 1, \dots, N \\ 0, & \text{se } x \in \{x_1 < \dots < x_{N+1}\} \end{cases}$$

pertence a $\mathcal{C}^\infty((x_1, x_{N+1}))$, é *flat* em $\{x_2, \dots, x_N\}$ e $\hat{u}_k^{(n)}(x_1^+) = 0 = \hat{u}_k^{(n)}(x_{N+1}^-)$, para todo $n \in \mathbb{Z}_+$. Mais ainda, $\hat{u}_k$ satisfaz a equação (.7) em $[x_1, x_{N+1}]$. Tomando as extensões 2π -periódicas obtemos uma sequência de funções $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que são *flat* em $a^{-1}(0)$ e que satisfazem (.7). Se mostrarmos que $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ é uma sequência de funções rapidamente decrescente, então $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ definirá uma função $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, a qual será dada por $u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{u}_k(x)e^{ikt}$ e satisfará $\mathcal{L}u = f$. Observe que u também será *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$.

Provaremos que $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ decresce rápido na Proposição (3.11). Para concluir a demonstração falta provar as identidades (.8) para cada $j = 1, \dots, N$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, as quais serão uma consequência da hipótese de que $f \in \mathcal{E} = (\ker {}^t\mathcal{L})^\circ$. O que faremos é encontrar certas distribuições em $\ker {}^t\mathcal{L}$ que implicarão as identidades (.8).

A definição de operador transposto fornece que $-{}^t\mathbf{L} = \partial_t + \partial_x(a \cdot)$ e a série parcial de Fourier na variável t fornece que $v \in \ker {}^t\mathbf{L}$ se, e somente se, $\hat{v}_k \otimes e_k \in \ker {}^t\mathbf{L}$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, o que ocorre se, e somente se, $-{}^t\mathbf{L}_k(\hat{v}_k) \doteq (a\hat{v}_k)' + ik\hat{v}_k = 0$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Assim sendo, cada distribuição $v_k \in \ker {}^t\mathbf{L}_k$ define uma distribuição $v = v_k \otimes e_k = \hat{v}_k \otimes e_k \in \ker {}^t\mathbf{L}$, logo $0 = \langle v, f \rangle = 2\pi \langle v_k, \hat{f}_{-k} \rangle$, isto é, $\langle v_k, \hat{f}_{-k} \rangle = 0$.

Relembrando que

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} g_k^j(x) dx = \int_{x_j}^{x_{j+1}} \exp\{ikA_j(x)\} \hat{f}_k(x)/a(x) dx;$$

fixe $j \in \{1, \dots, N\}$ e para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ defina

$$\psi_k(x) = \begin{cases} \exp\{-ikA_j(x)\}, & \text{se } x \in (x_j, x_{j+1}) \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{T}^1 \setminus (x_j, x_{j+1}). \end{cases}$$

Desta maneira obtemos uma distribuição $\psi_k \in L^\infty(\mathbb{T}^1) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Como a ordem de anulamento dos zeros de a é finita, segue do Teorema (2.42) que é possível dividir a distribuição ψ_k pela função a . Mais ainda, uma análise mais cuidadosa permite obter tal divisão $\psi_k/a \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ de maneira que $S(\psi_k/a) \subset S(\psi_k)$. Quando a função a possui apenas um ou dois zeros, então $a^{-1}(0) \subset S(\psi_k)$ e tal afirmação resulta da Observação (2.43). Quando a função a possui mais de dois zeros, tal afirmação é uma consequência da existência de partições da unidade em $\mathbb{T}^1$ (para partições da unidade em variedades citamos a referência 6)

Definindo $w_k \doteq {}^t\mathbf{L}_k(\psi_k/a) = \psi_k' + ik\psi_k/a$ segue que $S(w_k) \subset S(\psi_k) \cup S(\psi_k/a) \subset S(\psi_k) = [x_j, x_{j+1}] \subset \mathbb{T}^1$. Para cada $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ com $S(\phi) \subset (x_j, x_{j+1})$, temos $\langle w_k, \phi \rangle = \langle \psi_k', \phi \rangle + ik\langle \psi_k/a, \phi \rangle = -\langle \psi_k, \phi' \rangle + ik\langle \psi_k/a, \phi \rangle$. Como a função a não se anula em (x_j, x_{j+1}) , segue que $ik\langle \psi_k/a, \phi \rangle = ik\langle a(\psi_k/a), \phi/a \rangle = ik\langle \psi_k, \phi/a \rangle$. Utilizando integração por partes e o fato de que $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty((x_j, x_{j+1}))$, obtemos $\langle \psi_k, \phi' \rangle = ik\langle \psi_k, \phi/a \rangle$. Portanto, $\langle w_k, \phi \rangle = 0$ para toda ϕ suportada em (x_j, x_{j+1}) , logo $S(w_k) \subset \{x_j, x_{j+1}\}$.

Segue do Corolário (2.39) que existe uma distribuição ν_k satisfazendo ${}^t\mathbf{L}_k(\nu_k) = w_k$ e $S(\nu_k) \subset \{x_j, x_{j+1}\}$. Então $\hat{v}_k \doteq \psi_k/a - \nu_k$ pertence ao núcleo de ${}^t\mathbf{L}_k$, logo $0 = \langle \hat{v}_k, \hat{f}_{-k} \rangle = \langle \psi_k/a, \hat{f}_{-k} \rangle - \langle \nu_k, \hat{f}_{-k} \rangle$. Como $\hat{f}_{-k}$ é flat em $a^{-1}(0)$, segue da Observação (2.40) que $\langle \nu_k, \hat{f}_{-k} \rangle = 0$. Assim, segue do Corolário (2.33) que $0 = \langle \psi_k/a, \hat{f}_{-k} \rangle = \langle a(\psi_k/a), \hat{f}_{-k}/a \rangle = \langle \psi_k, \hat{f}_{-k}/a \rangle = \int_{x_j}^{x_{j+1}} \exp\{-ikA_j(x)\} \hat{f}_{-k}(x)/a(x) dx = \int_{x_j}^{x_{j+1}} g_k^j(x) dx$. ■

O resultado a seguir foi utilizado na demonstração do Teorema (3.10).

3.11 Proposição. *A sequência $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, definida na demonstração do Teorema (3.10), é uma sequência rapidamente decrescente.*

Prova: Para $x \in (x_j, x_{j+1})$ e $n \in \mathbb{Z}_+$ temos $\partial^n \hat{u}_k(x) = B_n(x) + D_n(x)$, onde

$$B_n(x) \doteq \partial^n (\exp\{-ikA_j(x)\}) \int_{x_j}^x g_k^j(y) dy$$

$D_0 \equiv 0$ e para $n \geq 1$ $D_n(x) \doteq$

$$\sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{n-1-l} \binom{n}{l} \binom{n-1-l}{m} \partial^l (\exp\{-ikA_j(x)\}) \partial^m (\exp\{ikA_j(x)\}) \partial^{n-1-l-m} (\hat{f}_k/a)(x).$$

Defina $g(x) \doteq ikA_j(x)$. Para cada $r, s \in \mathbb{N}$, denotaremos por $P_s(g^{(1)}(x), \dots, g^{(r)}(x))$ um polinômio da forma

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_+^r, |\alpha| \leq s} c_\alpha (g^{(1)}(x), \dots, g^{(r)}(x))^\alpha$$

e denotaremos por $P_s(a(x), a^{(1)}(x), \dots, a^{(r)}(x))$ um polinômio da forma

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_+^{r+1}, |\alpha| \leq s} c_\alpha (a(x), a^{(1)}(x), \dots, a^{(r)}(x))^\alpha.$$

Verifica-se que $\partial^l (\exp\{-ikA_j(x)\}) = P_{s_l}(g^{(1)}(x), \dots, g^{(l)}(x)) \exp\{-ikA_j(x)\}$ e que $\partial^m (\exp\{ikA_j(x)\}) = P_{s_m}(g^{(1)}(x), \dots, g^{(m)}(x)) \exp\{ikA_j(x)\}$. Assim,

$$\partial^l (\exp\{-ikA_j(x)\}) \partial^m (\exp\{ikA_j(x)\}) = P_{s_{l,m}}(g^{(1)}(x), \dots, g^{(M_{l,m})}(x)),$$

onde $M_{l,m} \doteq \max\{l, m\}$.

Como $g'(x) = ik(A_j)'(x) = ika^{-1}(x)$ e $g^{(n)}(x) = ik(A_j)^{(n)}(x) = ik\partial^{n-1}(1/a)(x) = ika(x)^{-2^{n-1}} P_{s_n}(a(x), a^{(1)}(x), \dots, a^{(n-1)}(x))$, se $n > 1$, obtemos a identidade

$$P_{s_{l,m}}(g^{(1)}(x), \dots, g^{(M_{l,m})}(x)) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_+^{M_{l,m}}, |\alpha| \leq s_{l,m}} c_\alpha (ik)^{|\alpha|} a(x)^{-\sum_{p=1}^{M_{l,m}} \alpha_p 2^{(p-1)}} P_{s_\alpha}(a(x), a'(x), \dots, a^{(M_{l,m})}(x)).$$

Definindo $\phi(x, t) \doteq f(x, t)/a(x)$, se $(x, t) \in \mathbb{T}^2 \setminus a^{-1}(0)$ e $\phi(x, t) = 0$, se $(x, t) \in a^{-1}(0)$, segue do Corolário (2.34) que $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$ e cálculos diretos mostram que $\hat{\phi}_k = \hat{f}_k/a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, para todo $k \in \mathbb{Z}$.

Assim, dado $M \in \mathbb{Z}_+$ temos $|k|^M |D_n(x)| \leq$

$$(n!)^2 \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{n-1-l} \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^{M_{l,m}} \\ |\alpha| \leq s_{l,m}}} C_\alpha |k^{|\alpha|+M} a(x)^{-\sum_{p=1}^{M_{l,m}} \alpha_p 2^{(p-1)}} (\partial^{n-1-l-m} \hat{\phi}_k)(x)|,$$

onde cada constante C_α absorve a constante c_α e a norma $\|P_{s_\alpha}(a(x), \dots, a^{(M_{l,m})}(x))\|_\infty$, logo C_α não depende de x e também não depende de k .

Como

$$|k^{|\alpha|+M} (\partial^{n-1-l-m} \hat{\phi}_k)(x)| = (2\pi)^{-1} \left| \int_0^{2\pi} (\partial^{(n-1-l-m,0)} \phi)(x, t) k^{|\alpha|+M} e^{-ikt} dt \right| \leq$$

$$(2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} |(\partial^{(n-1-l-m, |\alpha|+M)} \phi)(x, t)| dt,$$

temos

$$|k^{|\alpha|+M} a(x)^{-\sum_{p=1}^{M_{l,m}} \alpha_p 2^{(p-1)}} (\partial^{n-1-l-m} \hat{\phi}_k)(x)| \leq$$

$$(2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} |a(x)^{-\sum_{p=1}^{M_{l,m}} \alpha_p 2^{(p-1)}} (\partial^{(n-1-l-m, |\alpha|+M)} \phi)(x, t)| dt \leq$$

$$\|a(x)^{-\sum_{p=1}^{M_{l,m}} \alpha_p 2^{(p-1)}} (\partial^{(n-1-l-m, |\alpha|+M)} \phi)(x, t)\|_\infty,$$

a qual existe pois $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é *flat* em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$ e $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possui apenas zeros de ordem finita.

Portanto, dados $n, M \in \mathbb{Z}_+$, existe $C_1 > 0$ tal que $|k|^M |D_n(x)| \leq C_1$, para todo $x \in (x_j, x_{j+1})$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Utilizando argumentos similares, obtemos $C_2 > 0$ tal que $|k|^M |B_n(x)| \leq C_2$, para todo $x \in (x_j, x_{j+1})$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Em suma, dados $n, M \in \mathbb{Z}_+$, existe $C > 0$ satisfazendo $|k|^M |\partial^n \hat{u}_k(x)| \leq C$, para todo $x \in \mathbb{T}^1$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, o que mostra que a sequência $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é rapidamente decrescente. ■

Os teoremas (3.5) e (3.10) provam que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a hipótese de que $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita é uma condição suficiente para que $\mathcal{LC}^\infty(\mathbb{T}^2) \supset \mathcal{E} = (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ$, ou seja, para que $\mathcal{LC}^\infty(\mathbb{T}^2)$ seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Utilizando as mesmas técnicas presentes na demonstração do Teorema (3.10), conseguimos verificar que tal resultado também é válido para os operadores do tipo P.

3.12 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e se a possuir apenas zeros de ordem finita, então para cada $f \in \mathcal{G}$ que for flat em $a^{-1}(0) \subset \mathbb{T}^2$, existirá $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $Pu = f$.*

Prova: Utilizando série parcial de Fourier na variável t segue que existe $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ satisfazendo $Pu = f$ se, e somente se,

$$(a\hat{u}_k)'(x) + ik\hat{u}_k(x) = \hat{f}_k(x), \quad (.9)$$

para todo $x \in \mathbb{T}^1$ e $k \in \mathbb{Z}$.

No caso em que $k = 0$, devemos resolver a equação $(a\hat{u}_0)'(x) = \hat{f}_0(x)$ em $\mathbb{T}^1$. Sabemos que $\hat{f}_0 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ possui uma primitiva se, e somente se,

$$(2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x, t) dt dx = \int_0^{2\pi} \hat{f}_0(x) dx = 0.$$

Por hipótese, $f \in \ker {}^tP$ e $-{}^tP = L$. Assim, $1_x \otimes 1_t \in \ker {}^tP$ e então $0 = \langle 1_x \otimes 1_t, f \rangle = \langle 1_x, \langle 1_t, f(x, \cdot) \rangle \rangle = 2\pi \langle 1_x, \hat{f}_0 \rangle = 2\pi \int_0^{2\pi} \hat{f}_0(x) dx$. Portanto, existe $v_0 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $v_0' = \hat{f}_0$. Como a é uma função que possui apenas zeros de ordem finita, segue do Teorema (2.42) que existe $\hat{u}_0 = v_0/a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $(a\hat{u}_0)' = v_0' = \hat{f}_0$.

O próximo passo é resolver (.9) para $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Fazendo as mesmas considerações que foram feitas na demonstração do Teorema (3.10), tome $x_1 \in a^{-1}(0)$, denote o conjunto $a^{-1}(0) \cap [x_1, x_1 + 2\pi)$ por $\{x_1 < x_2 < \dots < x_N\}$ e defina $x_{N+1} = x_1 + 2\pi$. Com base nas ideias que antecedem a Proposição (3.9), se $y_j, z_j \in (x_j, x_{j+1})$, então utilizando fator integrante pode-se verificar que a expressão

$$c \exp\left\{-ik \int_{y_j}^x a^{-1}(y) dy\right\} + \exp\left\{-ik \int_{y_j}^x a^{-1}(y) dy\right\} \int_{z_j}^x \hat{f}_k(y) \exp\left\{ik \int_{y_j}^y a^{-1}(z) dz\right\} dy,$$

satisfaz a equação $v_k'(x) + ikv_k(x)/a(x) = \hat{f}_k(x)$ no intervalo (x_j, x_{j+1}) , qualquer que seja $c \in \mathbb{C}$.

Seguindo as ideias acima, escolha $y_j \in (x_j, x_{j+1})$, $j = 1, \dots, N$ e defina $A_j(x) = \int_{y_j}^x a^{-1}(z) dz$, para $x \in (x_j, x_{j+1})$. Então $A_j \in \mathcal{C}^\infty((x_j, x_{j+1}))$ e para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ a função $\exp\{ikA_j\} \in \mathcal{C}^\infty((x_j, x_{j+1}))$ e é limitada. Da Proposição (3.9) resulta que cada função

$$g_k^j(x) = \begin{cases} \exp\{ikA_j(x)\} \hat{f}_k(x), & \text{se } x \in (x_j, x_{j+1}) \\ 0, & \text{se } x = x_j \text{ ou } x = x_{j+1} \end{cases}$$

pertence a $\mathcal{C}^\infty((x_j, x_{j+1}))$ e $(g_k^j)^{(n)}(x_j^+) = 0 = (g_k^j)^{(n)}(x_{j+1}^-)$, para todo $n \in \mathbb{Z}_+$. Sendo assim, se definirmos $x_0 = x_N - 2\pi$, $x_{N+2} = x_2 + 2\pi$ e se mostrarmos que

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} g_k^j(x) dx = 0, \quad (.10)$$

para todo $j = 1, \dots, N$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, então a função

$$G_k^j(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in [x_{j+1}, x_{j+2}) \\ \int_{x_j}^x g_k^j(y) dy, & \text{se } x \in (x_j, x_{j+1}) \\ 0, & \text{se } x \in (x_{j-1}, x_j] \end{cases}$$

será infinitamente diferenciável em uma vizinhança de $[x_j, x_{j+1}]$ e *flat* em $\{x_j, x_{j+1}\}$. Assim, supondo valer (.10), segue da Proposição (3.9) que

$$v_k(x) = \begin{cases} \exp\{-ikA_j(x)\} \int_{x_j}^x g_k^j(y) dy, & \text{para } x \in (x_j, x_{j+1}) \text{ e } j = 1, \dots, N \\ 0, & \text{se } x \in \{x_1 < \dots < x_{N+1}\} \end{cases}$$

pertence a $\mathcal{C}^\infty((x_1, x_{N+1}))$, é *flat* em $\{x_2, \dots, x_N\}$ e $v_k^{(n)}(x_1^+) = 0 = v_k^{(n)}(x_{N+1}^-)$, para todo $n \in \mathbb{Z}_+$. Mais ainda, v_k satisfaz a equação $v_k'(x) + ikv_k(x)/a(x) = \hat{f}_k(x)$ em (x_1, x_{N+1}) . Tomando as extensões 2π -periódicas obtemos uma sequência de funções $(v_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ que são *flat* em $a^{-1}(0)$ e que satisfazem $v_k'(x) + ikv_k(x)/a(x) = \hat{f}_k(x)$. Observe que como a função a possui apenas zeros de ordem finita, existe $v_k/a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ *flat* em $a^{-1}(0)$. Então $\hat{u}_k(x) = v_k(x)/a(x) =$

$$\begin{cases} \exp\{-ikA_j(x)\} a^{-1}(x) \int_{x_j}^x g_k^j(y) dy, & \text{para } x \in (x_j, x_{j+1}) \subset \mathbb{T}^1 \text{ e } j = 1, \dots, N \\ 0, & \text{se } x \in a^{-1}(0) \end{cases}$$

é uma função em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, *flat* em $a^{-1}(0)$ e que satisfaz a equação (.9). Argumentos análogos aos utilizados na demonstração da Proposição (3.11) demonstram que a sequência $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é rapidamente decrescente, logo $(\hat{u}_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ define uma função $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ que satisfaz $\mathbf{P}u = f$.

Para finalizar esta demonstração resta provar as identidades (.10), para cada $j = 1, \dots, N$ e $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Utilizaremos a mesma técnica que foi empregada na demonstração para a classe de operadores do tipo L. Calculando o operador transposto obtemos $-{}^t\mathbf{P} = \partial_t + a(x)\partial_x$ e a série parcial de Fourier na variável t fornece que $v \in \ker {}^t\mathbf{P}$ se, e somente se, $\hat{v}_k \otimes e_k \in \ker {}^t\mathbf{P}$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, o que ocorre se, e somente se, $-{}^t\mathbf{P}_k(\hat{v}_k) \doteq a\hat{v}_k' + ik\hat{v}_k = 0$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Assim, cada distribuição $\nu_k \in \ker {}^t\mathbf{P}_k$ define uma

distribuição $v = \nu_k \otimes e_k = \hat{v}_k \otimes e_k \in \ker {}^t\mathbf{P}$, logo $0 = \langle v, f \rangle = 2\pi \langle \nu_k, \hat{f}_{-k} \rangle$, ou seja $\langle \nu_k, \hat{f}_{-k} \rangle = 0$.

Relembrando que

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} g_k^j(x) dx = \int_{x_j}^{x_{j+1}} \exp\{ikA_j(x)\} \hat{f}_k(x) dx,$$

fixe $j \in \{1, \dots, N\}$ e para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ defina

$$\psi_k(x) = \begin{cases} \exp\{-ikA_j(x)\}, & \text{se } x \in (x_j, x_{j+1}) \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{T}^1 \setminus (x_j, x_{j+1}). \end{cases}$$

Desta maneira obtemos uma distribuição $\psi_k \in L^\infty(\mathbb{T}^1) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ com $S(\psi_k) \subset [x_j, x_{j+1}]$. Então a distribuição $w_k \doteq {}^t\mathbf{P}_k(\psi_k) = a\psi'_k + ik\psi_k$ também satisfaz $S(w_k) \subset [x_j, x_{j+1}]$ e para toda $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ com $S(\phi) \subset (x_j, x_{j+1})$, temos $\langle a\psi'_k, \phi \rangle = -ik\langle \psi_k, \phi \rangle$, assim, $w_k = 0$ em (x_j, x_{j+1}) e conseqüentemente $S(w_k) \subset \{x_j, x_{j+1}\}$. Segue do Corolário (2.39) que existe $h_k \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que ${}^t\mathbf{P}_k h_k = w_k$ e $S(h_k) \subset \{x_j, x_{j+1}\}$. Definindo $\nu_k \doteq \psi_k - h_k$ segue que $\nu_k \in \ker {}^t\mathbf{P}_k$, logo $0 = \langle \nu_k, \hat{f}_{-k} \rangle = \langle \psi_k, \hat{f}_{-k} \rangle - \langle h_k, \hat{f}_{-k} \rangle$. Como $\hat{f}_{-k}$ é flat em $a^{-1}(0)$, segue da Observação (2.40) que $\langle h_k, \hat{f}_{-k} \rangle = 0$, logo $0 = \langle \psi_k, \hat{f}_{-k} \rangle = \int_{x_j}^{x_{j+1}} \exp\{-ikA_j(x)\} \hat{f}_{-k}(x) dx = \int_{x_j}^{x_{j+1}} g_{-k}^j(x) dx$. ■

Os teoremas (3.7) e (3.12) provam que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a hipótese de que $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita é uma condição suficiente para que $\text{PC}^\infty(\mathbb{T}^2) \supset \mathcal{G} = (\ker {}^t\mathbf{P})^\circ$, ou seja, para que $\text{PC}^\infty(\mathbb{T}^2)$ seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Finalizando essa seção mostraremos que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a condição de que $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita é uma condição necessária para que a imagem de um campo vetorial do tipo L seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Para tanto, utilizaremos a seguinte característica de um campo vetorial do tipo L, dada pela proposição abaixo.

3.13 Proposição. *Seja $\mathbf{L}_0 \doteq a(x)d/d_x : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. Se a imagem de $\mathbf{L}$ for um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, então a imagem de $\mathbf{L}_0$ será um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$.*

Prova: Suponha que $\mathbf{L}_0\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ não seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. Segue da Proposição (1.2) que existe $f_0 \in (\ker {}^t\mathbf{L}_0)^\circ \setminus \mathbf{L}_0\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$.

Definindo $f = f_0 \otimes 1_t \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ e utilizando a série parcial de Fourier na variável t de uma distribuição $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$, temos

$$\langle v, f \rangle = \left\langle \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}_k \otimes e_k, f_0 \otimes 1_t \right\rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle \hat{v}_k \otimes e_k, f_0 \otimes 1_t \rangle = \langle 1_t, \langle \hat{v}_0, f_0 \rangle \rangle.$$

Agora, $v \in \ker {}^t\mathbf{L}$ se, e somente se, $ik\hat{v}_k + (a\hat{v}_k)' = 0$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Em particular, $v \in \ker {}^t\mathbf{L}$ implica que $0 = (a\hat{v}_0)' = -{}^t\mathbf{L}_0(\hat{v}_0)$, ou seja, $\hat{v}_0 \in \ker {}^t\mathbf{L}_0$. Portanto, $\langle v, f \rangle = \langle 1_t, \langle \hat{v}_0, f_0 \rangle \rangle = \langle 1_t, 0 \rangle = 0$, para toda $v \in \ker {}^t\mathbf{L}$, resultando que $f \in (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ$. Para concluirmos que $\mathbf{L}\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ não é um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, basta mostrarmos que $f \in (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ \setminus \mathbf{L}\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Suponha que exista $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\mathbf{L}u = f$. Tomando as séries parciais de Fourier na variável t das funções f e u temos $\mathbf{L}u = f$ se, e somente se, $ik\hat{u}_k + a\hat{u}'_k = \hat{f}_k$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Em particular, $\mathbf{L}_0(\hat{u}_0) = a\hat{u}'_0 = \hat{f}_0 = f_0$, ou seja, $f_0 \in \mathbf{L}_0\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, o que é um absurdo. ■

3.14 Teorema. *Se $a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e existe um ponto em $\mathbb{T}^1$ onde a é flat, então o operador $\mathbf{L}_0$ não possui imagem fechada em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$.*

Prova: Pela Proposição (1.2) basta provarmos que $\mathbf{L}_0\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1) \subsetneq (\ker {}^t\mathbf{L}_0)^\circ$. Vamos então exibir uma função em $(\ker {}^t\mathbf{L}_0)^\circ \setminus \mathbf{L}_0\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$.

Calculando o operador transposto de $\mathbf{L}_0$ obtemos $-{}^t\mathbf{L}_0 = d/d_x(a \cdot)$. Se v é uma distribuição que está no núcleo de ${}^t\mathbf{L}_0$, então v satisfaz $(av)' = 0$ e da Proposição (2.48) segue que $av = c$ em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$, onde $c \in \mathbb{C}$ é uma constante. Segue do Teorema (2.44) que $c = 0$, logo $av = 0$ para toda $v \in \ker {}^t\mathbf{L}_0$. Portanto, $\ker {}^t\mathbf{L}_0 = \{v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1); av = 0\}$.

Denote por $\mathcal{F}$ o conjunto dos pontos em que a é flat. Como $\mathcal{F}$ é um subconjunto fechado, não vazio e $\mathcal{F} \neq \mathbb{T}^1$, segue da conexidade de $\mathbb{T}^1$ que $\partial\mathcal{F} \neq \emptyset$.

Fixe $x_1 \in \partial\mathcal{F}$ e defina $g(x) \doteq 1 - \cos(x - x_1) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$. Observe que g se anula apenas em x_1 , o qual é um zero de ordem dois, e a é flat em x_1 , pois $\mathcal{F}$ ser fechado implica que $\partial\mathcal{F} \subset \mathcal{F}$. Segue do Corolário (2.33) que existe $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$, flat em x_1 e tal que $a = fg$.

Mostraremos que $f \in (\ker {}^t\mathbf{L}_0)^\circ$. De fato, para cada $v \in \ker {}^t\mathbf{L}_0$ temos $0 = av = g(fv) = 0$ e pelo Teorema (2.41) segue que $fv = c_0\delta(x - x_1) + c_1\delta'(x - x_1)$. Pelo Teorema (2.44) devemos ter $c_0 = c_1 = 0$, já que f é flat em x_1 . Assim, $fv = 0$ e portanto, $\langle v, f \rangle = 0$, qualquer que seja $v \in \ker {}^t\mathbf{L}_0$.

Por fim, mostraremos que não existe $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ tal que $\mathbf{L}_0u = f$. Se existir, então $au' = f$. Como $x_1 \in \partial\mathcal{F}$, toda vizinhança de x_1 possui um ponto onde a função a não se anula. Assim, existe uma sequência $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{T}^1$ que converge para x_1 e satisfaz $a(y_n) \neq 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Então $f(y_n) \neq 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$ e $f(y_n) = a(y_n)u'(y_n) =$

$f(y_n)g(y_n)u'(y_n)$ implica que $1 = g(y_n)u'(y_n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Pela continuidade das funções g e u' segue que $1 = g(x_1)u'(x_1) = 0$, uma contradição. ■

A Proposição (3.13) e o Teorema (3.14) provam que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a finitude da ordem dos zeros da função a é uma condição necessária para que $\mathcal{LC}^\infty(\mathbb{T}^2) = \mathcal{E} \supset (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ$, ou seja, para que $\mathcal{LC}^\infty(\mathbb{T}^2)$ seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Em suma, os resultados desta seção demonstram o Teorema (3.3). Também demonstram o Teorema (3.4) nos casos em que $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$ e $a^{-1}(0) = \emptyset$. No caso em que $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, ficou demonstrado apenas que $a^{-1}(0)$ conter somente zeros de ordem finita é uma condição suficiente para que $\mathcal{PC}^\infty(\mathbb{T}^2)$ seja um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Vale observar que a parte final da demonstração do Teorema (3.10) mostra que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, o operador transposto ${}^t\mathbf{L}$ não será injetor e, portanto, $\mathbf{L}$ não será sobrejetor. Mais ainda, tal demonstração mostra que $\ker {}^t\mathbf{L}$ será um subespaço de dimensão infinita e, conseqüentemente, a imagem de $\mathbf{L}$ não será de codimensão finita quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ (veja os comentários após a Definição (1.2) de [4]). Por fim, analisando a parte final da demonstração do Teorema (3.12), verifica-se que as mesmas conclusões são válidas para os operadores do tipo $\mathbf{P}$; isto é, se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, então nenhum operador do tipo $\mathbf{P}$ será fortemente resolúvel, tampouco sobrejetor.

II Resolubilidade global no espaço de distribuições

Consideremos agora os operadores do tipo $\mathbf{L}$ agindo no espaço de distribuições $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. O objetivo é caracterizar a resolubilidade global de tais operadores demonstrando o Teorema (3.1), o qual reescrevemos abaixo.

3.15 Teorema. *Para um operador do tipo $\mathbf{L} = \partial_t + a(x)\partial_x$, as seguintes propriedades são equivalentes:*

(i) $\mathbf{L}\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) \supset (\ker {}^t\mathbf{L})^\circ$,

(ii) *Uma das seguintes situações ocorre:*

(ii.1) $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$;

(ii.2) $a^{-1}(0) = \emptyset$ e $\mu = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{T}^1} (1/a)$ é racional ou irracional não Liouville;

(ii.3) $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e cada $x \in a^{-1}(0)$ é um zero de ordem finita.

Novamente, quando $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$, temos um campo vetorial com coeficientes constantes e o teorema anterior segue do Teorema (A.1) do Apêndice A.

Como na seção anterior, no caso em que $a^{-1}(0) = \emptyset$, um operador do tipo L também pode ser reduzido a um operador com coeficientes constantes. Observe que verificar se L agindo em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ possui imagem fechada equivale a verificar se L agindo em $\mathcal{P}'_{2\pi}(\mathbb{R}^2)$ possui imagem fechada. Considerando os transpostos ${}^t\mathcal{M}$ e ${}^t\mathcal{M}^{-1}$ dos homeomorfismos lineares $\mathcal{M}$ e $\mathcal{M}^{-1}$, definidos na seção anterior, temos ${}^t\mathcal{M} \circ L \circ {}^t\mathcal{M}^{-1} = a\tilde{L}$, onde $\tilde{L} = \partial_X + \mu\partial_T$. Como $a^{-1}(0) = \emptyset$, o operador L possui imagem fechada se, e somente se, $\tilde{L}$ possui imagem fechada, o que ocorre se, e somente se, μ é racional ou irracional não Liouville, conforme Teorema (A.1) do Apêndice A. Mais ainda, das considerações feitas no Apêndice A segue que se $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$ ou $a^{-1}(0) = \emptyset$, então L não será sobrejetor.

Utilizando o estudo dos operadores do tipo P efetuado na seção anterior, mostraremos que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a condição de $a^{-1}(0)$ conter apenas zeros de ordem finita será suficiente para que o operador L seja sobrejetor.

3.16 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita, então $L\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) = \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$.*

Prova: Segue dos teoremas (3.7) e (3.12) que $P : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ possui imagem fechada e como $L = -{}^tP$, segue da Proposição (1.3) que $L\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado na topologia *fraca**. Pela Proposição (1.2) segue que ${}^\circ(\ker P) = L\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$.

Por fim, mostraremos que $\ker P = \{0\}$. De fato, tome $u \in \ker P$. Utilizando série parcial de Fourier segue que $Pu = 0$ se, e somente se, $(a\hat{u}_k)' + ik\hat{u}_k = 0$, para todo $k \in \mathbb{Z}$. Como na seção anterior, escolha $x_1 \in a^{-1}(0)$, denote o conjunto $a^{-1}(0) \cap [x_1, x_1 + 2\pi)$ por $\{x_1 < \dots < x_N\}$ e defina $x_{N+1} = x_1 + 2\pi$. Fixe $j \in \{1, \dots, N\}$ e $y_j \in (x_j, x_{j+1})$. Utilizando fator integrante obtemos $(a\hat{u}_k)(x) = c \exp\{-ik \int_{y_j}^x 1/a(y)dy\}$, $x \in (x_j, x_{j+1})$. Em particular, $|a(x)\hat{u}_k(x)| \equiv |c|$ em (x_j, x_{j+1}) e da continuidade das funções a e $\hat{u}_k$ obtemos $c = 0$. Assim, $\hat{u}_k \equiv 0$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, ou seja, $u \equiv 0$. Portanto, $\ker P = \{0\}$ e $L\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) = \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. ■

A próxima etapa será provar que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, então a finitude da ordem dos zeros de a será uma condição necessária para que $L\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ seja um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Para tanto, considere a restrição, L_0 , de L ao subespaço $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \simeq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \otimes 1_t$. Um cálculo direto mostra que

$$L_0 : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$$

é dado por

$$L_0 = a(d/dx).$$

Para saber que a imagem de L não é um subespaço fechado basta saber que a imagem de L_0 não é um subespaço fechado, isto é o conteúdo da próxima proposição.

3.17 Proposição. *Se $LD'(\mathbb{T}^2)$ for um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$, então $L_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ será um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.*

Prova: Suponha que $L_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ não seja um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Segue da Proposição (1.2) que existe $u \in (\ker {}^tL_0)^\circ \setminus L_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. O operador

$$P_0 : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1),$$

dado por

$$P_0 \doteq d/dx(a \cdot),$$

satisfaz ${}^tP_0 = -L_0$ e então ${}^{tt}P_0 = -{}^tL_0$. Como $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é semireflexivo, segue da Proposição (1.5) que $u \in {}^\circ(\ker P_0) \setminus L_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Observe que o operador P_0 é a restrição do operador $P = \partial_t + \partial_x(a \cdot) : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ ao subespaço formado pelas funções que dependem apenas da variável x .

Consideremos $u \otimes 1_t \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Utilizando série parcial de Fourier em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ obtemos

$$\langle u \otimes 1_t, \phi \rangle = \langle u \otimes 1_t, \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{\phi}_k e_k \rangle = \langle u \otimes 1_t, \hat{\phi}_0 e_0 \rangle = \langle 1_t, \langle u, \hat{\phi}_0 \rangle \rangle.$$

Assim, $\langle u \otimes 1_t, \phi \rangle = 0$ para toda $\phi \in \ker P$, uma vez que $\phi \in \ker P$ implica que $\hat{\phi}_0 \in \ker P_0$. Portanto, $u \otimes 1_t \in {}^\circ(\ker P)$ e novamente a Proposição (1.5) implica que ${}^\circ(\ker P) = (\ker {}^{tt}P)^\circ = (\ker {}^tL)^\circ$, uma vez que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é semireflexivo.

Se mostrarmos que $u \otimes 1_t \notin LD'(\mathbb{T}^2)$, seguirá da Proposição (1.2) que $LD'(\mathbb{T}^2)$ não é um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Com efeito, se existir $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ tal que $Lv = u \otimes 1_t$, seguirá da série parcial de Fourier na variável t que $a\hat{v}'_0 = u$ e $a\hat{v}'_k + ik\hat{v}_k = 0$ para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Em particular, $L_0\hat{v}_0 = u$, uma contradição. ■

3.18 Observação. Sem usar que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é semireflexivo, o que se pode obter é que $L_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ será fechado na topologia *fraca** de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$, sempre que $LD'(\mathbb{T}^2)$ for fechado na topologia *fraca** de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Para tanto utiliza-se a Proposição (1.4).

3.19 Teorema. *Se $a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e existir um ponto em $\mathbb{T}^1$ onde a é flat, então a imagem de L_0 não será fechada em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.*

Prova: Vamos exibir uma distribuição em $(\ker {}^t\mathbf{L}_0)^\circ \setminus \mathbf{L}_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Como $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é semireflexivo, os mesmos argumentos da demonstração anterior implicam que basta exibir uma função em ${}^\circ(\ker \mathbf{P}_0) \setminus \mathbf{L}_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$, onde o operador

$$\mathbf{P}_0 : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$$

é dado por

$$\mathbf{P}_0 \doteq d/dx(a \cdot).$$

Para tanto, denote por $\mathcal{F} \subset \mathbb{T}^1$ o conjunto dos pontos onde a é *flat* e seja $G \doteq \mathbb{T}^1 \setminus \mathcal{F}$. Então $\mathcal{F}$ é fechado e, por hipótese, $\emptyset \neq \mathcal{F} \neq \mathbb{T}^1$, logo $\emptyset \neq G \subsetneq \mathbb{T}^1$ é um subconjunto aberto. Assim, as componentes conexas de G são intervalos abertos da forma (α, β) . Fixando uma componente conexa (α, β) de G defina f como a função característica de (α, β) , isto é, $f = \chi_{(\alpha, \beta)}$ vale um em (α, β) e zero em $\mathbb{T}^1 \setminus (\alpha, \beta)$.

Afirmamos que $f \in {}^\circ(\ker \mathbf{P}_0)$. De fato, um cálculo utilizando a hipótese de que $a^{-1}(0) \neq \emptyset$ fornece que $\ker \mathbf{P}_0 = \{g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1); ag = 0\}$. Para cada $g \in \ker \mathbf{P}_0$, a identidade $ag = 0$ e a continuidade de g implicam que $g = 0$ em G , uma vez que os zeros de a em G , se existirem, são todos de ordem finita, logo isolados. Assim, para cada $g \in \ker \mathbf{P}_0$, temos $fg = 0$ (como função) em $\mathbb{T}^1$ e, conseqüentemente, $\langle f, g \rangle = \langle gf, 1 \rangle = 0$. Portanto, $f \in {}^\circ(\ker \mathbf{P}_0)$.

Por fim, o fato de (α, β) ser uma componente conexa de G , logo um conexo maximal, implica que a função a é *flat* em $\{\alpha, \beta\}$. Segue da Proposição (2.45) que não pode existir $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $au = 1$ em (α, β) . Assim, não pode existir $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $\mathbf{L}_0 v = av' = f = \chi_{(\alpha, \beta)}$, senão $u = v'$ iria satisfazer $au = 1$ em (α, β) . Portanto, $f \notin \mathbf{L}_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. ■

3.20 Observação. Sem utilizar que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é semireflexivo e utilizando a Proposição (1.4), os mesmos argumentos mostram que se $a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e se existir um ponto em $\mathbb{T}^1$ onde a é *flat*, então a imagem de $\mathbf{L}_0$ não será fechada na topologia *fraca** de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ e da Observação (3.18) seguirá que a imagem de $\mathbf{L}$ não será fechada na topologia *fraca** de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.

Os teoremas (3.16), (3.17) e (3.19) finalizam a demonstração do Teorema (3.15) e junto com os resultados da seção anterior finalizam a demonstração do Teorema (3.1).

Segue das observações (3.18) e (3.20) que sem utilizar o fato de que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$ é semireflexivo, podemos demonstrar que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a imagem de $\mathbf{L}$ será um subespaço fechado na topologia *fraca** de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ se, e somente se, a possuir apenas zeros de ordem finita.

Para encerrar essa seção, finalizaremos a demonstração do Teorema (3.2). Suponha que P age em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ e que $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$. Se existir um ponto em $\mathbb{T}^1$ onde a função a é *flat*, então $P\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ não será um subespaço fechado de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, uma vez que $P\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ fechado em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ implicaria que $-{}^tP = L$ possuiria imagem fechada em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ (veja a Proposição (1.3)), o que pelo Teorema (3.15) não pode ocorrer. Portanto, quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a finitude da ordem dos zeros de a será uma condição necessária para que a imagem de P seja fechada em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Junto com os resultados da seção anterior, isso finaliza a demonstração do Teorema (3.4), isto é, do Teorema (3.2) quando consideramos o operador P agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Agora considere P agindo em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Analogamente ao que ocorre com os campos da forma L , quando $a^{-1}(0) = \emptyset$ o estudo da resolubilidade global de um operador do tipo P se reduz ao estudo da resolubilidade global de um campo vetorial com coeficientes constantes da forma $\tilde{L} = \partial_X + \mu\partial_T$, logo o Teorema (3.2) é uma consequência do Teorema (A.1) do Apêndice A. Mais ainda, quando $a^{-1}(0) = \mathbb{T}^1$ ou $a^{-1}(0) = \emptyset$, as considerações feitas no Apêndice A também permitem concluir que nenhum campo da forma P será sobrejetor.

Resta provar que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a condição de $a^{-1}(0)$ conter apenas zeros de ordem finita será necessária e suficiente para a resolubilidade global de P em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$.

3.21 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e $a^{-1}(0)$ contém apenas zeros de ordem finita, então $P\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) = \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$.*

Prova: Do Teorema (3.1) segue que o operador

$$L : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$$

tem imagem fechada em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ e como

$$P = -{}^tL : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2),$$

segue da Proposição (1.3) que $P\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado na topologia *fraca**. Pela Proposição (1.2) segue que ${}^\circ(\ker L) = P\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$.

Por fim, mostraremos que $\ker L = \{0\}$. De fato, para cada $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, utilizando série parcial de Fourier obtemos $u \in \ker L$ se, e somente se, $a\hat{u}'_k + ik\hat{u}_k = 0$, para todo $k \in \mathbb{Z}$.

Como na seção anterior, escolha $x_1 \in a^{-1}(0)$, denote o conjunto $a^{-1}(0) \cap [x_1, x_1 + 2\pi)$ por $\{x_1 < \dots < x_N\}$ e defina $x_{N+1} = x_1 + 2\pi$. Fixe $j \in \{1, \dots, N\}$ e $y_j \in (x_j, x_{j+1})$.

Utilizando fator integrante obtemos $\hat{u}_k(x) = c \exp\{-ik \int_{y_j}^x 1/a(y)dy\}$, $x \in (x_j, x_{j+1})$. Em particular, $|\hat{u}_k(x)| \equiv c$, para $x \in (x_j, x_{j+1})$ e pela continuidade do coeficiente parcial $\hat{u}_k$ segue que $c = 0$. Assim, $\hat{u}_k \equiv 0$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, ou seja, $u \equiv 0$. Portanto, $\ker L = \{0\}$ e $P\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2) = \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. ■

Consideremos agora a restrição P_0 de P ao subespaço $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \simeq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \otimes 1_t$. Um cálculo direto mostra que

$$P_0 : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$$

é dado por

$$P_0 = d/dx(a \cdot).$$

Para saber que a imagem de P não é um subespaço fechado basta saber que a imagem de P_0 não é um subespaço fechado, conforme enunciaremos abaixo.

3.22 Teorema. *Se $P\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ for um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$, então $P_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ será um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.*

A demonstração do teorema acima segue a mesma técnica que foi utilizada na demonstração do Teorema (3.17) e será omitida.

3.23 Teorema. *Se $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$ e a for flat em algum ponto, então a imagem de P_0 não será um subespaço fechado de $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.*

Prova: Basta mostrar que existe uma distribuição no conjunto $(\ker {}^tP_0)^\circ \setminus P_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. Considerando o operador L agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ e restringindo L ao subespaço de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ formado pelas funções que dependem apenas da variável x , obtemos

$$L_0 : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$$

e

$$-{}^tL_0 = P_0 : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1),$$

logo $-{}^{tt}L_0 = {}^tP_0$. Como $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^1)$ é semireflexivo, segue da Proposição (1.5) que basta exibir uma distribuição no conjunto ${}^\circ(\ker L_0) \setminus P_0\mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$.

Denote por $\mathcal{F} \subset \mathbb{T}^1$ o conjunto dos pontos onde a é flat e seja $G \doteq \mathbb{T}^1 \setminus \mathcal{F}$. Então $\mathcal{F}$ é fechado e, por hipótese, $\emptyset \neq \mathcal{F} \neq \mathbb{T}^1$; logo $\emptyset \neq G \subsetneq \mathbb{T}^1$ é um subconjunto aberto. Assim, as componentes conexas de G são intervalos abertos da forma (α, β) . Fixando uma componente conexa (α, β) de G , considere a distribuição $\delta(x - \alpha)$.

Afirmamos que $\delta'(x - \alpha) \in {}^\circ(\ker L_0) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$. De fato, se $g \in \ker L_0$, então $ag' = 0$ e como os zeros de a em G , se existirem, são isolados, segue da continuidade de g' que $g'(\alpha) = 0$. Portanto, $\langle \delta'(x - \alpha), g \rangle = -\langle \delta(x - \alpha), g' \rangle = -g'(\alpha) = 0$, para toda $g \in \ker L_0$.

Por fim, o fato de (α, β) ser uma componente conexa de G , logo um conexo maximal, implica que a função a é *flat* em $\{\alpha, \beta\}$. Assim, não pode existir $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^1)$ tal que $P_0u = (au)' = \delta'(x - \alpha)$, senão teríamos $au = \delta(x - \alpha) + c$, o que pela Proposição (2.46) não ocorre, uma vez que a é *flat* em α . ■

Segue dos teoremas (3.22) e (3.23) que quando $\emptyset \neq a^{-1}(0) \neq \mathbb{T}^1$, a finitude da ordem de anulamento dos zeros de a será necessária para a resolubilidade global em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ de um operador do tipo P, o que finaliza a demonstração do Teorema (3.2).

Campos vetoriais com coeficientes constantes no toro bidimensional

Dedicamos este apêndice ao estudo da resolubilidade global de campos vetoriais com coeficientes constantes em $\mathbb{T}_{(x,t)}^2$, a saber, $\tilde{L} = \partial_x + \alpha \partial_t$, onde $\alpha \in \mathbb{C}$. As referências para a resolubilidade global de campos vetoriais com coeficientes constantes em $\mathbb{T}^2$ são [10] e [8]. A resolubilidade global dos campos vetoriais do tipo $\tilde{L}$ está intimamente relacionada com a natureza do número complexo $\alpha \in \mathbb{C}$. Analisaremos também quais operadores da forma $\tilde{L}$ são sobrejetores e quais são fortemente resolúveis.

A.1 Teorema. *Consideremos $\tilde{L} = \partial_x + \alpha \partial_t$, onde $\alpha \in \mathbb{C}$, um campo vetorial com coeficientes constantes. Então as seguintes propriedades são equivalentes:*

- (I) $\tilde{L}\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$,
- (II) $\tilde{L}\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ é um subespaço fechado em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$,
- (III) Uma das seguintes situações ocorre:
 - (III.1) $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$;
 - (III.2) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e α não é um número de Liouville;
 - (III.3) $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Prova: Consideremos inicialmente $\tilde{\mathbf{L}}$ agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$.

(Caso III.1). Suponha que $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Se $\alpha = ib$, onde b é um número real não nulo, dada $f \in (\ker {}^t\tilde{\mathbf{L}})^\circ$ defina

$$u(x, t) = \sum_{(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{\hat{f}(j, k)}{i(j + \alpha k)} e^{(ijx + ikt)},$$

para todo $(x, t) \in \mathbb{T}^2$. Como $|(j + \alpha k)^{-1} \hat{f}(j, k)| \leq 2|\hat{f}(j, k)|(\min\{1, |b|\})^{-1}(|j| + |k|)^{-1} \leq 2|\hat{f}(j, k)|(\min\{1, |b|\})^{-1}$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ e do fato de que $\hat{f}(j, k)$ decresce rápido segue que a sequência $[i(j + \alpha k)]^{-1} \hat{f}(j, k)$ é rapidamente decrescente, logo a função $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ satisfaz $i(j + \alpha k)\hat{u}(j, k) = \hat{f}(j, k)$ para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$. Note que a distribuição $1_x \otimes 1_t$ pertence a $\ker {}^t\tilde{\mathbf{L}}$, pois ${}^t\tilde{\mathbf{L}} = -\tilde{\mathbf{L}}$. Assim, $(2\pi)^2 \hat{f}(0, 0) = \langle 1_x \otimes 1_t, f \rangle = 0$ e, portanto, $\tilde{\mathbf{L}}u = f$.

Seja $\alpha = b_1 + ib_2$, onde b_1 e b_2 são números reais não nulos. Então $|j + \alpha k| \geq |j + b_1 k|$ e $|j + \alpha k| \geq |b_2 k|$. Tomando $0 < \epsilon < 1$ temos $|j + b_1 k| \leq \epsilon|j|$ ou $|j + b_1 k| \geq \epsilon|j|$. Se $|j + b_1 k| \geq \epsilon|j|$, então $2|j + \alpha k| \geq \epsilon|j| + |b_2||k| \geq \min\{\epsilon, |b_2|\}(|j| + |k|)$. Senão, $|j + b_1 k| \leq \epsilon|j|$ e conseqüentemente $|b_1 k| \geq |j|(1 - \epsilon)$, logo $|j + \alpha k| \geq |b_2 k| = \frac{1}{2}(|b_2||k| + \frac{|b_2|}{|b_1|}|b_1||k|) \geq \frac{|b_2||k|}{2} + \frac{|b_2|}{2|b_1|}(1 - \epsilon)|j| \geq \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{|b_2|}{2|b_1|}(1 - \epsilon)\right\}(|j| + |k|)$. Em ambos os casos existe um número real $C > 0$ satisfazendo $|j + \alpha k| \geq C(|j| + |k|)$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$. Portanto, dada uma função $f \in (\ker {}^t\tilde{\mathbf{L}})^\circ$, defina

$$u(x, t) = \sum_{(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{\hat{f}(j, k)}{i(k + \alpha k)} e^{(ijx + ikt)},$$

para todo $(x, t) \in \mathbb{T}^2$. Como $|(j + \alpha k)^{-1} \hat{f}(j, k)| \leq C^{-1}|\hat{f}(j, k)|(|j| + |k|)^{-1} \leq C^{-1}|\hat{f}(j, k)|$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$, segue que a sequência $[i(j + \alpha k)]^{-1} \hat{f}(j, k)$ é rapidamente decrescente, logo $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ satisfaz $i(j + \alpha k)\hat{u}(j, k) = \hat{f}(j, k)$ para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ e como $\hat{f}(0, 0) = 0$ temos $\tilde{\mathbf{L}}u = f$.

(Caso III.2). Seja $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Da definição de número de Liouville segue que α não é um número de Liouville se, e somente se, existem constantes $c_1, c_2, c_3 > 0$ tais que $|j + \alpha k| \geq c_1(|j| + |k|)^{-c_2}$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$ com $|j| + |k| \geq c_3$. Esta condição aparece na referência [8].

Suponha que α não seja um número de Liouville, isto é, que existam constantes $c_1, c_2, c_3 > 0$ tais que $|j + \alpha k| \geq c_1(|j| + |k|)^{-c_2}$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$ com $|j| + |k| \geq c_3$.

Dada $f \in (\ker {}^t\tilde{L})^\circ$, defina $(c_{jk})_{(j,k) \in \mathbb{Z}^2}$ por $c_{jk} = \hat{f}(j, k)[i(j + \alpha k)]^{-1}$, para todo $(j, k) \neq (0, 0)$ e $c_{00} = 0$.

Afirmamos que a sequência $(c_{jk})_{(j,k) \in \mathbb{Z}^2}$ é rapidamente decrescente. De fato, dado $r > 0$, existe $c > 0$ tal que $|\hat{f}(j, k)| \leq c(|j| + |k|)^{-r-c_2}$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, logo $|c_{jk}| = |\hat{f}(j, k)||j + \alpha k|^{-1} \leq cc_1^{-1}(|j| + |k|)^{-r}$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Portanto, a sequência $(c_{jk})_{(j,k) \in \mathbb{Z}^2}$ é rapidamente decrescente, logo define uma função $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ tal que $\hat{u}(j, k) = c_{jk}$ para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$. Assim, $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ satisfaz $i(j + \alpha k)\hat{u}(j, k) = \hat{f}(j, k)$ para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ e como $f \in (\ker {}^t\tilde{L})^\circ$ implica que $\hat{f}(0, 0) = 0$, concluímos que $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ satisfaz $\tilde{L}u = f$.

Reciprocamente, suponha que α seja um número de Liouville. Mostraremos que existe $f \in (\ker {}^t\tilde{L})^\circ \setminus \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Cálculos diretos mostram que $\{\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2); \hat{\phi}(0) = 0\} = (\ker {}^t\tilde{L})^\circ$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $(j_n, k_n) \in \mathbb{Z}^2$ tal que $|j_n| + |k_n| \geq n$ e $|j_n + \alpha k_n| < (|j_n| + |k_n|)^{-n}$. Como a sequência $((|j_n| + |k_n|)^{-\frac{n}{2}})_{n \in \mathbb{N}}$ é rapidamente decrescente, fica bem definida uma função $f \in (\ker {}^t\tilde{L})^\circ$ dada por

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (|j_n| + |k_n|)^{-\frac{n}{2}} \exp(ij_n x + ik_n t),$$

para todo $(x, t) \in \mathbb{T}^2$.

Agora suponha que exista $u \in \mathbb{T}^2$ satisfazendo $\tilde{L}u = f$. Utilizando coeficientes de Fourier concluímos que $i(j + \alpha k)\hat{u}(j, k) = \hat{f}(j, k)$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$. Em particular, para cada $n \in \mathbb{N}$, temos $|\hat{u}(j_n, k_n)| = |\hat{f}(j_n, k_n)||i(j_n + \alpha k_n)|^{-1} > (|j_n| + |k_n|)^{\frac{n}{2}}$. Verifica-se que a sequência $((|j_n| + |k_n|)^{\frac{n}{2}})_{n \in \mathbb{N}}$ não é rapidamente decrescente. Portanto, temos uma contradição.

(Caso III.3). Suponha agora que $\alpha \in \mathbb{Q}$. Se $\alpha \neq 0$ podemos escrever $\alpha = p/q$, fração irredutível, com $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}$. Se $\alpha = 0$ escrevemos $\alpha = 0/1$. Defina o conjunto $\mathcal{A} = \{(j, k) \in \mathbb{Z}^2; j + \alpha k = 0\} = \{(j, k) \in \mathbb{Z}^2; j = p\ell, k = -q\ell, \ell \in \mathbb{Z}\}$ e seja $\mathcal{B} = \mathbb{Z}^2 \setminus \mathcal{A}$.

Utilizando série de Fourier verifica-se que $\{v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2); \hat{v}(j, k) = 0 \text{ se } (j, k) \in \mathcal{B}\} = \ker {}^t\tilde{L}$ e que $(\ker {}^t\tilde{L})^\circ = \{\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2); \hat{\phi}(j, k) = 0, \text{ se } (j, k) \in \mathcal{A}\}$. Sendo assim, dada $f \in (\ker {}^t\tilde{L})^\circ$, definimos a sequência $(c_{jk})_{(j,k) \in \mathbb{Z}^2}$ por $c_{jk} = \hat{f}(j, k)[i(j + \alpha k)]^{-1}$, se $(j, k) \in \mathcal{B}$ e $c_{jk} = 0$, se $(j, k) \in \mathcal{A}$. Por definição, se $(j, k) \in \mathcal{B}$ então $j + \alpha k \neq 0$, logo $qj + pk \neq 0$. Como $qj + pk \in \mathbb{Z}$, resulta que $|qj + pk| \geq 1$ e, portanto, $|j + \alpha k| \geq 1/q$. Daqui segue-se facilmente que a sequência $(c_{jk})_{(j,k) \in \mathbb{Z}^2}$ é rapidamente decrescente, logo define uma função $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ que satisfaz $i(j + \alpha k)\hat{u}(j, k) = i(j + \alpha k)c_{jk} = \hat{f}(j, k)$, para todo $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$, ou seja, $\tilde{L}u = f$.

As considerações anteriores finalizam a demonstração do Teorema (A.1) quando consideramos o campo $\tilde{L}$ agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$. Para a demonstração do caso em que $\tilde{L}$ age em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ utiliza-se tais técnicas mais a Proposição (1.5) (aqui usa que $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é semireflexivo). ■

Vale observar que se $\tilde{L}$ age em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$, então $\ker {}^t\tilde{L} \neq \{0\}$ implica que $\tilde{L}$ não é sobrejetor. Utilizando série de Fourier verifica-se que:

1. Se $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$, então $\ker {}^t\tilde{L} = \{v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2); \hat{v}(j, k) = 0, \text{ se } (j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}\}$.
2. Se $\alpha \in \mathbb{Q}$, então $\ker {}^t\tilde{L} = \{v \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2); \hat{v}(j, k) = 0, \text{ se } (j, k) \in \mathcal{B}\}$, onde $\mathcal{B}$ é definido na demonstração do Teorema (A.1) (caso III.3).

Portanto, nenhum campo da forma $\tilde{L}$ agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é sobrejetor.

Dos comentários após a Definição (1.2) do artigo [4] segue que um campo da forma $\tilde{L}$ agindo em $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ será fortemente resolúvel se, e somente se, a imagem de $\tilde{L}$ for um subespaço fechado e $\ker {}^t\tilde{L}$ for um subespaço de dimensão finita. Assim, do Teorema (A.1) e das propriedades acima resulta que $\tilde{L}$ é fortemente resolúvel se, e somente se, $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ou $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e α não é um número de Liouville.

Por fim, se $\tilde{L}$ age em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$, então $(\ker {}^t\tilde{L}) \neq \{0\}$ implica que $\tilde{L}$ não é sobrejetor. Agora, $(\ker {}^t\tilde{L}) \neq \{0\}$ se, e somente se, $(\ker {}^t\tilde{L})^\circ \neq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$. Como $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é semireflexivo, exigir que $(\ker {}^t\tilde{L})^\circ \neq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ é equivalente a exigir que ${}^\circ(\ker \tilde{P}) \neq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$, onde

$$\tilde{P} = -\tilde{L} : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2).$$

Como $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2)$ é localmente convexo, uma aplicação do Teorema de Hahn-Banach fornece que ${}^\circ(\ker \tilde{P}) \neq \mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ se, e somente se, $\ker \tilde{P} \neq \{0\}$.

Novamente, utilizando série de Fourier verifica-se que:

1. Se $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$, então $\ker \tilde{P} = \{\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2); \hat{\phi}(j, k) = 0, \text{ se } (j, k) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}\}$.
2. Se $\alpha \in \mathbb{Q}$, então $\ker \tilde{P} = \{\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^2); \hat{\phi}(j, k) = 0, \text{ se } (j, k) \in \mathcal{B}\}$, onde $\mathcal{B}$ é definido na demonstração do Teorema (A.1) (caso III.3).

Portanto, para qualquer $\alpha \in \mathbb{C}$ segue que $\tilde{L}$ agindo em $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^2)$ não é sobrejetor.

Referências Bibliográficas

- [1] Barros-Neto. - *An introduction to the theory of distributions* Marcel Dekker, INC. New York, 1973.
- [2] Bergamasco, A. P. e Petronilho, G. - *Closedness of the Range for Vector Fields on the Torus*. Journal of Differential Equations. **154** (1999), 132-139.
- [3] Bergamasco, A. P. e Dattori da Silva, P. L. - *Global solvability for a special class of Vector Fields on the Torus*. Contemporary Mathematics. **400** (2006), 11-20.
- [4] Bergamasco, A. P. e Cordado, P. D. e Petronilho, G - *Global Solvability for a Class of Complex Vector Fields on the Two-Torus*. Communications in Partial Differential Equations. **29** (2004), 785-819.
- [5] Elon, L. L. - *Espaços Métricos*, quarta edição. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2007.
- [6] Elon, L. L. - *Variedades Diferenciáveis*, Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2007.
- [7] Friedlander, F. G. e Joshi, M. - *Introduction to the theory of distributions*. Cambridge University Press, 1982.
- [8] Greenfield, S. e Wallach, N. - *Global hypoellipticity and Liouville numbers*. Proc. Amer. Math. Soc. **31** (1972), 112-114.
- [9] Grubb, G. - *Distributions and Operators*. Springer, 2009.
- [10] Herz, C. - *Functions which are divergences*. Amer. J. Math. **92** (1970), 641-656.

-
- [11] Hörmander, L. - *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*. Springer-Verlag, 1983.
 - [12] Hounie, J. - *Teoria Elementar das Distribuições*. 12º Colóquio Brasileiro de Matemática, Poços de Caldas, 1979.
 - [13] Nirenberg, L. e Treves, F. - *Solvability of a first order linear partial differential equation* Comm. Pure Appl. Math. **16** (1963), 331-351.
 - [14] Reed, M. e Simon, B. - *Methods of modern mathematical physics*. vol I: Functional Analysis. Academic Press, New York, 1972.
 - [15] Rudin, W. - *Functional Analysis*. McGraw-Hill, 1973.
 - [16] Schaefer, H. H. - *Topological Vector Spaces*. Springer-Verlag, Third Printing Corrected, 1971.
 - [17] Treves, F. - *Topological Vector Spaces, Distributions and Kernels*. Academic Press, New York, 1967.
 - [18] Zani, S. L. - *Hipoeliticidade global para operadores de segunda ordem*. Dissertação de Mestrado, ICMC-USP, São Carlos, 1988.

Índice Remissivo

anulador, 14

coeficientes de Fourier, 55

coeficientes parciais de Fourier, 57

delta de Dirac, 28, 29

distribuição

- composição com difeomorfismos, 30
- de ordem finita, 29
- definição de, 27
- ordem da, 28, 29
- periódica, 30
- suporte, 33

espaço

- de Fréchet, 16
- reflexivo, 15
- semireflexivo, 15
- vetorial topológico, 13

exaustão de um aberto, 21

fórmula de Taylor, 20

número de Liouville, 60

operador

- fortemente resolúvel, 59
- globalmente resolúvel, 59

produto direto entre distribuições, 56

produto entre distribuições e funções, 31

regra de Leibniz, 20

série de Fourier, 55

série parcial de Fourier, 57

sequência

- de crescimento lento, 54, 57
- rapidamente decrescente, 54, 56

transposto, 15

Índice de Notações

X' , 14	$\mathcal{C}^\infty(\Omega)'$, 27
X'_σ , 14	$\mathcal{P}'_T(\mathbb{R}^N)$, 27
X'_b , 14	$\mathcal{D}'(\Omega)$, 27
$^\circ M$, 14	$\mathcal{C}^\infty_c(K)$, 28
N° , 14	$\mathcal{D}'_T(\mathbb{R}^N)$, 30
$J(x)$, 14	$H, {}^tH$, 30
$\overline{Z}^{\omega*}$, 15	$\tilde{H}, {}^t\tilde{H}$, 30
tT , 15	$S(u)$, 33
$\mathcal{R}(T)$, 16	$\mathcal{E}'(\Omega)$, 33
$\mathcal{C}^\infty(\Omega)$, 19	$\mathfrak{p}$, 47
$\partial^\alpha \phi$, 19	$\mathbb{T}^N$, 47
$S(f)$, 19	$\mathcal{C}^\infty(\mathbb{T}^N)$, 47
$\mathcal{C}^\infty_c(\Omega)$, 19	Λ , 47
$\mathcal{P}_T(\mathbb{R}^N)$, 19	$L^p(\mathbb{T}^N)$, 47
$\alpha \leq \beta$, 20	$\mathcal{D}'(\mathbb{T}^N)$, 48
$ \alpha $, 20	$\otimes$, 56
x^α , 20	μ , 60
$\alpha!$, 20	$\mathcal{E}$, 61
$\binom{\beta}{\alpha}$, 20	$\mathcal{G}$, 61
$\mathcal{U}_T(\mathbb{R}^N)$, 27	$\mathcal{M}$, 62