Do cálculo à cohomologia: cohomologia de de
Rham

Thaís Zanutto Mendes

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Do cálculo à cohomologia: cohomologia de de Rham

Thaís Zanutto Mendes

***Orientador:* Prof. Dr. Daniel Levcovitz**

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC-USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências - Matemática . *VERSÃO REVISADA*

USP – São Carlos
Junho de 2012

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi
e Seção Técnica de Informática, ICMC/USP,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M538c Mendes, Thaís Zanutto
Do cálculo à cohomologia: cohomologia de de Rham /
Thaís Zanutto Mendes; orientador Daniel Levcovitz. --
São Carlos, 2012.
67 p.

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Ciências de Computação e Matemática Computacional) --
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação,
Universidade de São Paulo, 2012.

1. cohomologia. 2. cohomologia de de Rham. 3.
álgebra homológica. I. Levcovitz, Daniel, orient. II.
Título.

*“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.
Now is the time to understand more, so that we may fear
less.”*

Marie Curie

Agradecimentos

Ao Pai Todo Amor, por caminhar ao meu lado.

Ao meu orientador, que foi sempre um apoio por todo o caminho do mestrado.

Aos meus pais e irmãos, por todo carinho e apoio que me deram.

Ao Adriano, por acreditar sempre que eu conseguiria, mesmo quando eu mesma não acreditava.

Resumo

Neste trabalho, estudamos a cohomologia de de Rham e métodos para os seus cálculos. Finalizamos com aplicações da cohomologia de de Rham em teoremas da topologia.

Abstract

In this work we study the de Rham cohomology and methods for its calculations. We close it with applications of the Rham cohomology in theorems from topology.

Sumário

Introdução	1
0.1 Aplicações Multilineares Alternadas	1
0.2 O produto exterior	3
1 A cohomologia de de Rham	13
1.1 Formas diferenciais	13
1.2 A cohomologia de de Rham	18
1.3 O lema de Poincaré	25
2 Complexos de cadeia e suas cohomologias	29
2.1 Complexos de Cadeia	29
2.2 Cohomologia de complexos de cadeia	33
3 A sequência de Mayer-Vietoris	39
4 Homotopia	45
4.1 O funtor de cohomologia	45
5 Aplicações da Cohomologia de de Rham	55
5.1 Primeiros resultados	55

Introdução

0.1 Aplicações Multilineares Alternadas

Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Uma aplicação:

$$\omega : V^k := \underbrace{V \times \dots \times V}_{k \text{ vezes}} \longrightarrow \mathbb{R},$$

é chamada k -linear, ou simplesmente multilinear, se for linear em cada uma de suas entradas, ou seja, se $v_1, v_2, \dots, v_k, w_i \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então:

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i + w_i, \dots, v_k) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) + \omega(v_1, \dots, w_i, \dots, v_k).$$

Definição 0.1.1. Uma aplicação k -linear $\omega : V^k \longrightarrow \mathbb{R}$ é dita alternada se $\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = 0$, sempre que $\xi_i = \xi_j$ para algum par $i \neq j$. O espaço vetorial das aplicações k -lineares alternadas será denotado por $\text{Alt}^k(V)$.

Notemos que $\text{Alt}^k(V) = 0$ sempre que $k > \dim V$. De fato, se tomarmos $\xi_1, \dots, \xi_k \in V$, como $k > \dim V$, existe pelo menos um vetor ξ_i que é combinação linear dos outros vetores, ou seja, $\xi_i = \sum_{j=1, j \neq i}^k \lambda_j \xi_j$. Assim:

$$\begin{aligned} \omega(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_k) &= \omega(\xi_1, \dots, \sum_{j=1, j \neq i}^k \lambda_j \xi_j, \dots, \xi_k) \\ &= \sum_{j=1, j \neq i}^k \lambda_j \omega(\xi_1, \dots, \xi_j, \dots, \xi_k) = 0, \end{aligned}$$

pois ω é alternada. Isso também nos diz que se ω é uma aplicação k -linear alternada e $\xi_1, \dots, \xi_k \in V$ são linearmente dependentes então $\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = 0$. Logo, para saber se um conjunto de k vetores são linearmente independentes, basta encontrar uma aplicação k -linear alternada tal que $\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) \neq 0$.

O grupo simétrico de permutações do conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$ é denotado por $S(k)$. Lembramos ainda que qualquer permutação pode ser escrita como uma composição de transposições (usualmente dizemos produto de transposições). A transposição que leva i em j e fixa os demais elementos será denotada por (i, j) . O sinal da permutação:

$$\text{sign} : S(k) \longrightarrow \{\pm 1\}$$

é um homomorfismo; $\text{sign}(\sigma\tau) = \text{sign}(\sigma) \circ \text{sign}(\tau) = \text{sign}(\sigma) \cdot \text{sign}(\tau)$, que aplica toda transposição em -1 . Assim, o sinal de $\sigma \in S(k)$ é -1 se σ se decompõe em um produto de uma quantidade ímpar de transposições e é 1 caso contrário.

Lema 0.1.2. *Se $\omega \in \text{Alt}^k(V)$ e $\sigma \in S(k)$, então:*

$$\omega(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(k)}) = \text{sign}(\sigma) \cdot \omega(\xi_1, \dots, \xi_k).$$

Demonstração: Como toda permutação pode ser escrita como produto de transposições, é suficiente provar para $\sigma = (i, j)$. Para simplificar, escreveremos:

$$\omega_{i,j}(\xi, \xi') = \omega(\xi_1, \dots, \xi, \dots, \xi', \dots, \xi_k),$$

onde ξ e ξ' ocupam respectivamente as coordenadas i e j . O restante dos vetores são escolhidos arbitrariamente, mas fixados. Segue da definição que $\omega_{i,j} \in \text{Alt}^2(V)$. Então $\omega_{i,j}(\xi + \xi', \xi + \xi') = 0$. Assim:

$$\begin{aligned} 0 &= \omega_{i,j}(\xi + \xi', \xi + \xi') = \omega_{i,j}(\xi, \xi) + \omega_{i,j}(\xi, \xi') + \omega_{i,j}(\xi', \xi) + \omega_{i,j}(\xi', \xi') \\ 0 &= \omega_{i,j}(\xi, \xi') + \omega_{i,j}(\xi', \xi) \Leftrightarrow \omega_{i,j}(\xi, \xi') = -\omega_{i,j}(\xi', \xi), \end{aligned}$$

o que encerra a nossa demonstração. ■

O que provamos acima também mostra que se uma aplicação é k -linear e alternada, então ela é anti-simétrica. A inversa dessa afirmação também é verdadeira, ou seja, se ω é anti-simétrica, então ela é alternada. Ora, se $\omega_{i,j}$ é anti-simétrica, $\omega_{i,j}(\xi, \xi) = -\omega_{i,j}(\xi, \xi)$ e assim $2\omega_{i,j}(\xi, \xi) = 0$, e portanto $\omega_{i,j}(\xi, \xi) = 0$.

Exemplo 0.1.3. *Seja $V = \mathbb{R}^k$ e $\xi_i = (\xi_{i1}, \dots, \xi_{ik})$. A função $\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = \det(\xi_{ij})$ é alternada. De acordo com as propriedades de determinante, ω é anti-simétrica, e portanto, alternada.*

Exemplo 0.1.4. *A aplicação bilinear $\omega(\xi_1, \xi_2) = \xi_1^1 \xi_2^2 - \xi_2^1 \xi_1^2$, onde $\xi_1 = (\xi_1^1, \xi_1^2)$ e $\xi_2 = (\xi_2^1, \xi_2^2)$ é alternada.*

0.2 O produto exterior

A partir de agora definiremos o produto exterior, que é uma função de $\text{Alt}^p(V) \times \text{Alt}^q(V)$ em $\text{Alt}^{p+q}(V)$.

Definição 0.2.1. *Um (p, q) -embaralhamento σ é uma permutação de $I_{p+q} = \{1, \dots, p+q\}$ satisfazendo:*

$$\sigma(1) < \sigma(2) < \dots < \sigma(p) \quad e \quad \sigma(p+1) < \dots < \sigma(p+q).$$

Exemplo 0.2.2. *A permutação $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ é um $(2, 3)$ -embaralhamento, pois:*

$$\sigma(1) = 3 < \sigma(2) = 5 \quad e \quad \sigma(3) = 1 < \sigma(4) = 2 < \sigma(5) = 4.$$

Um (p, q) -embaralhamento permuta o conjunto I_{p+q} , tomando p primeiros elementos e os dispendo de forma crescente. Então, a imagem dos outros q elementos fica completamente determinada. Logo a quantidade de (p, q) -embaralhamentos diferentes é a quantidade de combinações dos $p + q$ elementos de I_{p+q} p a p . Assim, o conjunto de todos os (p, q) -embaralhamentos tem $\binom{p+q}{p}$ elementos. Denotaremos esse conjunto por $S(p, q)$.

Definição 0.2.3. *Sejam $\omega_1 \in \text{Alt}^p(V)$ e $\omega_2 \in \text{Alt}^q(V)$, chamamos a aplicação:*

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) = \sum_{\sigma \in S(p, q)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}),$$

onde $\xi_1, \dots, \xi_{p+q} \in V$, de produto exterior de ω_1 e ω_2 .

Exemplo 0.2.4. Quando $p = q = 1$, o produto exterior é dado por $(\omega_1 \wedge \omega_2)(\xi_1, \xi_2) = \omega_1(\xi_1) \cdot \omega_2(\xi_2) - \omega_1(\xi_2) \cdot \omega_2(\xi_1)$, onde $\omega_1, \omega_2 \in \text{Alt}^1(V)$ e $\xi_1, \xi_2 \in V$.

Exemplo 0.2.5. Tomemos as seguintes aplicações alternadas:

$$\begin{aligned} \omega_1 : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} & \omega_2 : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\xi_1, \xi_2) &\longmapsto \xi_1^1 \xi_2^2 - \xi_1^2 \xi_2^1 & (\xi_1^1, \xi_1^2) &\longmapsto \xi_1^1 \xi_1^2 \end{aligned}$$

onde $\xi_1 = (\xi_1^1, \xi_1^2)$ e $\xi_2 = (\xi_2^1, \xi_2^2)$. Sabemos que existem três $(2,1)$ -embaralhamentos, pois $\binom{3}{2} = 3$. São eles:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} ; \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad e \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

com $\text{sign}(\sigma_1) = 1$, $\text{sign}(\sigma_2) = -1$ e $\text{sign}(\sigma_3) = 1$. Assim:

$$\begin{aligned} (\omega_1 \wedge \omega_2)(\xi_1, \xi_2, \xi_3) &= \sum_{\sigma \in S(2,1)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \xi_{\sigma(2)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(3)}) = \\ &= \text{sign}(\sigma_1) \omega_1(\xi_1, \xi_2) \omega_2(\xi_3) + \text{sign}(\sigma_2) \omega_1(\xi_1, \xi_3) \omega_2(\xi_2) + \text{sign}(\sigma_3) \omega_1(\xi_2, \xi_3) \omega_2(\xi_1) = \\ &= (\xi_1^1 \xi_2^2 - \xi_1^2 \xi_2^1) \xi_3^1 \xi_3^2 - (\xi_1^1 \xi_3^2 - \xi_1^2 \xi_3^1) \xi_2^1 \xi_2^2 + (\xi_2^1 \xi_3^2 - \xi_2^2 \xi_3^1) \xi_1^1 \xi_1^2. \end{aligned}$$

O produto exterior $\omega_1 \wedge \omega_2$ é uma forma $(p+q)$ -linear, pois ω_1 e ω_2 são p -linear e q -linear, respectivamente. Além disso:

Lema 0.2.6. Se $\omega_1 \in \text{Alt}^p(V)$ e $\omega_2 \in \text{Alt}^q(V)$. Então $\omega_1 \wedge \omega_2 \in \text{Alt}^{p+q}(V)$.

Para essa demonstração é necessário antes demonstrar outro lema:

Lema 0.2.7. Uma aplicação k -linear ω é alternada se $\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = 0$ para toda k -upla com $\xi_i = \xi_{i+1}$, para algum $1 \leq i \leq k-1$.

Demonstração: Temos que $S(k)$ é gerado por transposições do tipo $(i, i+1)$ e, pelo mesmo argumento usado no lema 0.1.2, temos:

$$\omega(\xi_1, \dots, \xi_i, \xi_{i+1}, \dots, \xi_k) = -\omega(\xi_1, \dots, \xi_{i+1}, \xi_i, \dots, \xi_k).$$

Como o lema 0.1.2 é válido para toda $\sigma \in S(k)$, então, ω é alternada. ■

Agora munidos desse resultado, voltemos nossa atenção a demonstração desejada:

Demonstração do lema 0.2.6 Mostremos primeiramente que $\omega_1 \wedge \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) = 0$ quando $\xi_1 = \xi_2$. Façamos:

- (i) $S_{12} = \{\sigma \in S(p, q) / \sigma(1) = 1, \sigma(p+1) = 2\};$
- (ii) $S_{21} = \{\sigma \in S(p, q) / \sigma(1) = 2, \sigma(p+1) = 1\};$
- (iii) $S_o = S(p, q) - (S_{12} \cup S_{21}).$

Caso $\sigma \in S_o$ então $\omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) = 0$ ou $\omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) = 0$, já que $\xi_{\sigma(1)} = \xi_{\sigma(2)}$ ou $\xi_{\sigma(p+1)} = \xi_{\sigma(p+2)}$. Notemos ainda que S_{12} é aplicado em S_{21} de forma bijetiva compondo $\tau = (1, 2)$ com cada permutação de S_{12} . Assim, temos:

$$\begin{aligned}
 \omega_1 \wedge \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) &= \sum_{\sigma \in S(p, q)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\
 &= \sum_{\sigma \in S_{12}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\
 &\quad + \sum_{\sigma \in S_{21}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\
 &\quad + \sum_{\sigma \in S_o} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\
 &= \sum_{\sigma \in S_{12}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) + \\
 &\quad + \sum_{\sigma \in S_{12}} \text{sign}(\tau\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\tau\sigma(1)}, \dots, \xi_{\tau\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\tau\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\tau\sigma(p+q)}) \\
 &= \sum_{\sigma \in S_{12}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\
 &\quad - \sum_{\sigma \in S_{12}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\tau\sigma(1)}, \dots, \xi_{\tau\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\tau\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\tau\sigma(p+q)}).
 \end{aligned}$$

Desde que $\sigma(1) = 1$ e $\sigma(p+1) = 2$, temos $\tau\sigma(1) = 2$ e $\tau\sigma(p+1) = 1$ e vemos $\tau\sigma(i) = i$, sempre que $i \neq 1$ ou $i \neq p+1$. Como $\xi_1 = \xi_2$, os termos das duas somas se cancelam.

Para o caso geral $\xi_i = \xi_{i+1}$, o raciocínio é mesmo. Consideremos:

- (i) $S_{i \ i+1} = \{\sigma \in S(p, q) / \sigma(i) \neq r, r \geq p+1; \sigma(p+1) \neq s, s \leq p\};$
- (ii) $S_{i+1 \ i} = \{\sigma \in S(p, q) / \sigma(i) \neq r, r \leq p; \sigma(p+1) \neq s, s \geq p+1\};$
- (iii) $S_o = S(p, q) - (S_{i \ i+1} \cup S_{i+1 \ i}).$

Assim, para $\sigma \in S_o$, temos $\omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) = 0$ ou $\omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) = 0$. Então:

$$\begin{aligned} \omega_1 \wedge \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) &= \sum_{\sigma \in S_{i+1}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\ &\quad + \sum_{\sigma \in S_{i+1}} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}). \end{aligned}$$

Usando agora a transposição $\tau = (i, i+1)$, temos uma bijeção de S_{i+1} em S_{i+1} e, como antes, a soma se cancelará. Logo:

$$\omega_1 \wedge \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) = 0$$

sempre que $\xi_i = \xi_{i+1}$, para algum $1 \leq i \leq k-1$ na $(p+q)$ -upla. Então, pelo lema 0.2.6, $\omega_1 \wedge \omega_2 \in \text{Alt}^{p+q}(V)$. ■

Enunciaremos alguma propriedades do produto exterior. Consideremos $\omega_1, \omega'_1 \in \text{Alt}^p(V)$, $\omega_2, \omega'_2 \in \text{Alt}^q(V)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Então:

1. $(\omega_1 + \omega'_1) \wedge \omega_2 = \omega_1 \wedge \omega_2 + \omega'_1 \wedge \omega_2$;
2. $(\lambda \omega_1) \wedge \omega_2 = \lambda(\omega_1 \wedge \omega_2) = \omega_1 \wedge (\lambda \omega_2)$;
3. $\omega_1 \wedge (\omega_2 + \omega'_2) = \omega_1 \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge \omega'_2$.

Lema 0.2.8. Se $\omega_1 \in \text{Alt}^p(V)$ e $\omega_2 \in \text{Alt}^q(V)$, então $\omega_1 \wedge \omega_2 = (-1)^{pq} \omega_2 \wedge \omega_1$.

Demonstração: Seja $\theta \in S(p+q)$ tal que:

$$\begin{aligned} \theta(1) &= p+1, \theta(2) = p+2, \dots, \theta(q) = p+q \\ \theta(q+1) &= 1, \theta(q+2) = 2, \dots, \theta(p+q) = p. \end{aligned}$$

Temos que $\text{sign}(\theta) = (-1)^{pq}$. Não é difícil ver que a composição de θ com os elementos de $S(p, q)$ gera uma bijeção:

$$\begin{aligned} S(p, q) &\longleftrightarrow S(q, p) \\ \sigma &\longmapsto \sigma \circ \theta, \end{aligned}$$

ou seja, essa bijeção simplesmente inverte a ordem do embaralhamento.

Observemos que:

$$\begin{aligned}\omega_2(\xi_{\sigma\theta(1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(q)}) &= \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\ \omega_1(\xi_{\sigma\theta(q+1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p+q)}) &= \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}).\end{aligned}$$

Então:

$$\begin{aligned}\omega_2 \wedge \omega_1(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) &= \sum_{\sigma \in S(p,q)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(q)}) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(q+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\ &= \sum_{\sigma \in S(p,q)} \text{sign}(\sigma\theta) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma\theta(1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(q)}) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma\theta(q+1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p+q)}) \\ &= (-1)^{pq} \sum_{\sigma \in S(p,q)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\ &= (-1)^{pq} \omega_1 \wedge \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}).\end{aligned}$$

■

Lema 0.2.9. Se $\omega \in \text{Alt}^p(V)$, $\omega_2 \in \text{Alt}^q(V)$ e $\omega_3 \in \text{Alt}^r(V)$, então:

$$\omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) = (\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3.$$

Demonstração: Seja $S(p, q, r) \subset S(p+q+r)$ o conjunto das permutações que satisfazem:

$$\begin{aligned}\sigma(1) &< \dots < \sigma(p) \\ \sigma(p+1) &< \dots < \sigma(p+q) \\ \sigma(p+q+1) &< \dots < \sigma(p+q+r).\end{aligned}$$

Consideremos os seguintes subconjuntos de $S(p, q, r)$:

$$\begin{aligned}S(\bar{p}, q, r) &= \{\sigma \in S(p, q, r) / \sigma(i) = i, 1 \leq i \leq p\} \\ S(p, q, \bar{r}) &= \{\sigma \in S(p, q, r) / \sigma(i) = i, p+q+1 \leq i \leq p+q+r\}.\end{aligned}$$

Consideremos a seguinte bijeção:

$$\begin{aligned}S(p, q+r) \times S(\bar{p}, q, r) &\longleftrightarrow S(p, q, r) \\ (\sigma, \theta) &\longmapsto \sigma \circ \theta.\end{aligned}\tag{0.2.1}$$

Com todas essas informações:

$$\begin{aligned}
[\omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3)](\xi_1, \dots, \xi_{p+q+r}) &= \sum_{\sigma \in S(p, q+r)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) (\omega_2 \wedge \omega_3)(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q+r)}) \\
&= \sum_{\sigma \in S(p, q+r)} \text{sign}(\sigma) \sum_{\theta \in S(\bar{p}, q, r)} \text{sign}(\theta) [\omega_1(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \omega_2(\xi_{\sigma\theta(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p+q)}) \omega_3(\xi_{\sigma\theta(p+q+1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p+q+r)})] \\
&= \sum_{\substack{\sigma \in S(p, q+r) \\ \theta \in S(\bar{p}, q, r)}} \text{sign}(\sigma\theta) [\omega_1(\xi_{\sigma\theta(1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p)}) \omega_2(\xi_{\sigma\theta(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p+q)}) \omega_3(\xi_{\sigma\theta(p+q+1)}, \dots, \xi_{\sigma\theta(p+q+r)})] \\
&= \sum_{\mu \in S(p, q, r)} \text{sign}(\sigma\theta) [\omega_1(\xi_{\mu(1)}, \dots, \xi_{\mu(p)}) \omega_2(\xi_{\mu(p+1)}, \dots, \xi_{\mu(p+q)}) \omega_3(\xi_{\mu(p+q+1)}, \dots, \xi_{\mu(p+q+r)})] .
\end{aligned}$$

Onde usamos que $\sigma(i) = \sigma\theta(i)$, $1 \leq i \leq p$ e a bijeção 0.2.1 na última passagem. Isso porque a combinação dos dois somatórios, descrita na terceira linha, gera todas as combinações possíveis, logo, a troca é possível.

Consideremos agora a seguinte bijeção:

$$\begin{aligned}
S(p+q, r) \times S(p, q, \bar{r}) &\longleftrightarrow S(p, q, r) \\
(\eta, \mu) &\longmapsto \eta \circ \mu.
\end{aligned} \tag{0.2.2}$$

Analogamente, teremos:

$$\begin{aligned}
[(\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3](\xi_1, \dots, \xi_{p+q+r}) &= \sum_{\eta \in S(p+q, r)} \text{sign}(\eta) \cdot (\omega_1 \wedge \omega_2)(\xi_{\eta(1)}, \dots, \xi_{\eta(p+q)}) \omega_3(\xi_{\eta(p+q+1)}, \dots, \xi_{\eta(p+q+r)}) \\
&= \sum_{\eta \in S(p+q, r)} \text{sign}(\eta) \sum_{\mu \in S(p, q, \bar{r})} \text{sign}(\mu) [\omega_1(\xi_{\eta\mu(1)}, \dots, \xi_{\eta\mu(p)}) \omega_2(\xi_{\eta\mu(p+1)}, \dots, \xi_{\eta\mu(p+q)}) \omega_3(\xi_{\eta\mu(p+q+1)}, \dots, \xi_{\eta\mu(p+q+r)})] \\
&= \sum_{\substack{\eta \in S(p+q, r) \\ \mu \in S(p, q, \bar{r})}} \text{sign}(\eta\mu) [\omega_1(\xi_{\eta\mu(1)}, \dots, \xi_{\eta\mu(p)}) \omega_2(\xi_{\eta\mu(p+1)}, \dots, \xi_{\eta\mu(p+q)}) \omega_3(\xi_{\eta\mu(p+q+1)}, \dots, \xi_{\eta\mu(p+q+r)})] \\
&= \sum_{v \in S(p, q, r)} \text{sign}(\eta\mu) [\omega_1(\xi_{v(1)}, \dots, \xi_{v(p)}) \omega_2(\xi_{v(p+1)}, \dots, \xi_{v(p+q)}) \omega_3(\xi_{v(p+q+1)}, \dots, \xi_{v(p+q+r)})] .
\end{aligned}$$

Onde usamos que $\eta(i) = \eta\mu(i)$, $p+q+1 \leq i \leq p+q+r$ e a bijeção 0.2.2 para a última passagem, como feito antes.

Logo, $\omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) = (\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3$ como queríamos demonstrar. ■

Observação 0.2.10. *É comum encontrarmos na literatura a seguinte definição:*

$$\omega_1 \bar{\wedge} \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) = \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S(p+q)} \text{sign}(\sigma) \cdot \omega_2(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(q)}) \cdot \omega_1(\xi_{\sigma(q+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)})$$

Note que nessa definição $\{\sigma(1), \dots, \sigma(p)\}$ e $\{\sigma(p+1), \dots, \sigma(p+q)\}$ não estão ordenados. Ora, há exatamente $S(p) \times S(q)$ modos para que os conjuntos acima se tornem uma sequência arbitrária, e essa é a causa do fator de correção $\frac{1}{p!q!}$ aparecer na expressão. Então $\omega_1 \wedge \omega_2 = \omega_1 \bar{\wedge} \omega_2$.

Uma $\mathbb{R}$ -álgebra $\mathcal{A}$ consiste de um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e uma aplicação bilinear $\mu : A \times A \longrightarrow A$ que seja associativa, ou seja, $\mu(a, \mu(b, c)) = \mu(\mu(a, b), c)$, para quaisquer $a, b, c \in A$. A álgebra é chamada *com unidade* se existir um elemento $1 \in A$ tal que $\mu(1, a) = \mu(a, 1) = a$, para todo $a \in A$. Tal elemento é chamado de *unidade*.

Definição 0.2.11. (i) Uma $\mathbb{R}$ -álgebra graduada $\mathcal{A}_*$ é uma sequência de espaços vetoriais A_k , $k = 0, 1, \dots$, e aplicações bilineares $\mu : A_k \times A_l \longrightarrow A_{k+l}$ que são associativas;

(ii) A álgebra graduada $\mathcal{A}_*$ é dita conexa se ela tiver unidade $1 \in A_0$ e se $\epsilon : \mathbb{R} \longrightarrow A_0$ dada por $\epsilon(r) = r \cdot 1$ é um isomorfismo;

(iii) A álgebra graduada $\mathcal{A}_*$ é chamada comutativa (ou anti-comutativa), se $\mu(a, b) = (-1)^{kl} \mu(b, a)$, para $a \in A_k$ e $b \in A_l$.

Os elementos de A_k são ditos de grau k . Sabemos que $\text{Alt}^k(V)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ do modo usual:

$$\begin{aligned} (\omega_1 + \omega_2)(\xi_1, \dots, \xi_k) &= \omega_1(\xi_1, \dots, \xi_k) + \omega_2(\xi_1, \dots, \xi_k) \\ (\lambda\omega)(\xi_1, \dots, \xi_k) &= \lambda(\omega(\xi_1, \dots, \xi_k)). \end{aligned}$$

Também já foi mostrado que o produto exterior é uma aplicação bilinear de $\text{Alt}^p(V) \times \text{Alt}^q(V)$ em $\text{Alt}^{p+q}(V)$. Partindo de $\text{Alt}^0(V) = \mathbb{R}$, expandimos o produto exterior para $\text{Alt}^0(V) \times \text{Alt}^p(V)$ usando a estrutura de espaço vetorial. As propriedades das formas alternadas podem ser resumidas em:

Teorema 0.2.12. $\text{Alt}^*(V)$ é uma álgebra graduada, anti-comutativa e conexa.

■

Lema 0.2.13. Para 1-formas $\omega_1, \dots, \omega_p \in \text{Alt}^1(V)$ temos que:

$$\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_p(\xi_1, \dots, \xi_p) = \det \begin{pmatrix} \omega_1(\xi_1) & \omega_1(\xi_2) & \dots & \omega_1(\xi_p) \\ \omega_2(\xi_1) & \omega_2(\xi_2) & \dots & \omega_2(\xi_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_p(\xi_1) & \omega_p(\xi_2) & \dots & \omega_p(\xi_p) \end{pmatrix}.$$

Demonstração: Por indução sobre p . Para $p = 2$, sejam $\omega_1, \omega_2 \in \text{Alt}^1(V)$. Então:

$$(\omega_1 \wedge \omega_2)(\xi_1, \xi_2) = \sum_{\sigma \in S(1,1)} \text{sign}(\sigma) \omega_1(\xi_{\sigma(1)}) \omega_2(\xi_{\sigma(2)}) = \omega_1(\xi_1) \omega_2(\xi_2) - \omega_1(\xi_2) \omega_2(\xi_1)$$

e

$$\det \begin{pmatrix} \omega_1(\xi_1) & \omega_1(\xi_2) \\ \omega_2(\xi_1) & \omega_2(\xi_2) \end{pmatrix} = \omega_1(\xi_1) \omega_2(\xi_2) - \omega_1(\xi_2) \omega_2(\xi_1)$$

o que comprova a afirmação para $p = 2$.

Suponhamos que a afirmação seja verdadeira para $p - 1$. Pela definição de produto exterior, temos, para $\omega_1, \dots, \omega_p \in \text{Alt}^1(V)$:

$$\begin{aligned} \omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p)(\xi_1, \dots, \xi_p) &= \sum_{\sigma \in S(1, p-1)} \text{sign}(\sigma) \omega_1(\xi_{\sigma(1)}) (\omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p)(\xi_{\sigma(2)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \\ &= \sum_{j=1}^p (-1)^{j+1} \omega_1(\xi_j) (\omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p)(\xi_{\sigma(2)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \\ &= \sum_{j=1}^p (-1)^{j+1} \omega_1(\xi_j) (\omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_j}, \dots, \xi_p), \end{aligned}$$

onde $(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_j}, \dots, \xi_p)$ é uma $(p - 1)$ -upla que omite a variável ξ_j . Como a afirmação é válida para $p - 1$, temos:

$$\begin{aligned} \omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p)(\xi_1, \dots, \xi_p) &= \sum_{j=1}^p (-1)^{j+1} \omega_1(\xi_j) (\omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_j}, \dots, \xi_p) \\ &= \sum_{j=1}^p (-1)^{j+1} \omega_1(\xi_j) \det \begin{pmatrix} \omega_2(\xi_1) & \omega_2(\xi_2) & \dots & \omega_2(\xi_p) \\ \omega_3(\xi_1) & \omega_3(\xi_2) & \dots & \omega_3(\xi_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_p(\xi_1) & \omega_p(\xi_2) & \dots & \omega_p(\xi_p) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

O último termo da igualdade acima é justamente o determinante da matriz $(\omega_i(\xi_j))$, em expansão pela 1ª linha segundo a regra de Laplace para determinantes de matrizes quadradas. ■

Do lema acima, temos que se as 1-formas $\omega_1, \dots, \omega_p \in \text{Alt}^1(V)$ são linearmente independentes, então $\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_p \neq 0$. De fato, podemos escolher $\xi \in V$ com $\omega_i(\xi_j) = 0$ se $i \neq j$ e $\omega_i(\xi_j) = 1$, para $i = j$ e teremos $\det(\omega_i(\xi_j)) = 1$. Reciprocamente, se $\omega_1, \dots, \omega_p \in \text{Alt}^1(V)$ são linearmente dependentes, existirá pelo menos um ω_i que poderá ser expresso como combinação linear dos outros. Ou seja, $\omega_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^p r_j \omega_j$, então:

$$\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_i \wedge \dots \wedge \omega_p = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^p r_j (\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_j \wedge \dots \wedge \omega_p) = 0$$

pois, pelo lema anterior, podemos calcular esse produto exterior pelo determinante, que sempre se anulará em cada termo do somatório, já que teremos duas linhas iguais. Essas ressalvas provam o seguinte lema:

Lema 0.2.14. *Sejam $\omega_1, \dots, \omega_p \in \text{Alt}^1(V)$, então $\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_p \neq 0$ se e somente se, $\omega_1, \dots, \omega_p$ são linearmente independentes.* ■

Teorema 0.2.15. *Sejam $e_1, \dots, e_n$ uma base de V e $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ a base dual de $\text{Alt}^1(V)$. Então:*

$$\{\epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)}\}_{\sigma \in S(p, n-p)}$$

é uma base para $\text{Alt}^p(V)$. Em particular

$$\dim \text{Alt}^p(V) = \binom{\dim V}{p}.$$

Demonstração do teorema 0.2.15: Como $\epsilon_i(e_j) = 0$ quando $i \neq j$ e $\epsilon_i(e_i) = 1$, o lema 0.2.13 nos permite caracterizar o produto exterior do enunciado como:

$$\epsilon_{i_1} \wedge \dots \wedge \epsilon_{i_p}(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) = \begin{cases} 0 & \text{se } \{i_1, \dots, i_p\} \neq \{j_1, \dots, j_p\} \\ \text{sign}(\sigma) & \text{se } \{i_1, \dots, i_p\} = \{j_1, \dots, j_p\} \end{cases} \quad (0.2.3)$$

onde σ é a permutação $\sigma(i_k) = j_k$. Então, do lema 0.1.2 e de 0.2.3, temos que:

$$\omega = \sum_{S(p, n-p)} \omega(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(p)}) \epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)},$$

para qualquer p -forma alternada $\omega \in \text{Alt}^p(V)$. De fato, ao tomarmos $e_1, \dots, e_p$ elementos da base de V , temos:

$$\begin{aligned} \sum_{S(p, n-p)} \omega(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(p)}) \epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)}(e_1, \dots, e_p) &= \sum_{\substack{S(p, n-p) \\ 1 \leq \sigma(i) \leq p \\ 1 \leq i \leq p}} \omega(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(p)}) \text{sign}(\sigma) \\ &= \sum_{\substack{S(p, n-p) \\ 1 \leq \sigma(i) \leq p \\ 1 \leq i \leq p}} \text{sign}(\sigma) \omega(e_1, \dots, e_p) \text{sign}(\sigma) \\ &= \omega(e_1, \dots, e_p), \end{aligned}$$

pois a única permutação em $S(p, n-p)$ a atender as condições descritas no somatório da segunda linha é a identidade. Logo $\text{Alt}^p(V)$ é gerado pelas $\epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)}$, com $\sigma \in S(p, n-p)$.

Para a independência linear, consideremos a seguinte expressão:

$$\sum_{S(p, n-p)} \lambda_{\sigma} \epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)} = 0, \lambda_{\sigma} \in \mathbb{R}. \quad (0.2.4)$$

Como anteriormente, tomemos $e_1, \dots, e_p$ base de V . Então:

$$\sum_{S(p, n-p)} \lambda_{\sigma} \epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)}(e_1, \dots, e_p) = \sum_{\substack{S(p, n-p) \\ 1 \leq \sigma(i) \leq p \\ 1 \leq i \leq p}} \lambda_{\sigma} \text{sign}(\sigma) = \lambda_{\sigma}.$$

Assim, para que a expressão 0.2.4 seja satisfeita devemos ter $\lambda_{\sigma} = 0$. Logo, provamos a independência linear dos termos $\epsilon_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \epsilon_{\sigma(p)}$, com $\sigma \in S(p, n-p)$.

Logo, a dimensão de $\text{Alt}^p(V)$ é justamente a quantidade de $(p, n-p)$ -embaralhamentos existentes, ou seja, $\binom{n}{p}$ ou $\binom{\dim V}{p}$. O que conclui a nossa demonstração. ■

Deste teorema, temos $\text{Alt}^n(V) \cong \mathbb{R}$ se $n = \dim V$ e, como já vimos antes, $\text{Alt}^p(V) = 0$ se $p > n$. No caso $n = \dim V$ temos que $\dim \text{Alt}^n(V) = 1$ e a base é dada pela n -forma alternada $\epsilon_1 \wedge \dots \wedge \epsilon_n$. Em particular toda n -forma alternada do $\mathbb{R}^n$ é proporcional ao determinando 0.1.3 desse capítulo.

A cohomologia de de Rham

1.1 Formas diferenciais

O objetivo deste capítulo é apresentar a cohomologia de de Rham e provar o lema de Poincaré.

Definição 1.1.1. *Uma p -forma diferencial (ou simplesmente uma p -forma) é uma aplicação $\omega : U \longrightarrow \text{Alt}^p(\mathbb{R}^n)$, onde U é um aberto de $\mathbb{R}^n$ e ω é infinitamente diferenciável.*

O conjunto de todas as p -formas diferenciáveis no aberto U será denotado por $\Omega^p(U)$. Denotaremos a derivada usual de ω por $D\omega$, e seu valor em x por $D_x\omega$. Assim,

$$D_x\omega : \mathbb{R}^n \longrightarrow \text{Alt}^p(\mathbb{R}^n)$$

é tal que

$$(D_x\omega)(e_i) = \frac{d}{dt}\omega(x + te_i)_{t=0} = \frac{\partial\omega}{\partial x_i}(x).$$

No capítulo anterior demonstramos que as p -formas $\epsilon_I = \epsilon_{i_1} \wedge \cdots \wedge \epsilon_{i_p}$ com $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n$ formam uma base para $\text{Alt}^p(\mathbb{R}^n)$. Logo, qualquer p -forma $\omega \in \Omega^p(U)$ se escreve unicamente como:

$$\omega(x) = \sum_I \omega_I(x) \epsilon_I$$

onde $\omega_I(x)$ são funções reais diferenciáveis e $x \in U$. Lembramos ainda que $\text{Alt}^0(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$ e $\Omega^0(U)$ é o espaço das funções reais diferenciáveis em U , ou seja, $\Omega^0(U) = C^\infty(U, \mathbb{R})$.

Assim, a diferencial $D_x\omega$ é a aplicação linear dada por:

$$(D_x\omega)(e_j) = \sum_j \frac{\partial \omega_I}{\partial x_j}(x) \epsilon_I, j = 1, \dots, n. \quad (*)$$

E note que a função $x \longrightarrow D_x\omega$ é uma aplicação de U no espaço das aplicações lineares de $\mathbb{R}^n$ em $\text{Alt}^p(\mathbb{R}^n)$.

Definição 1.1.2. *A diferencial exterior é o operador linear*

$$d : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^{p+1}(U)$$

tal que

$$d_x\omega(\xi_1, \dots, \xi_{p+1}) = \sum_1^{p+1} (-1)^{l-1} D_x\omega(\xi_l)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_l}, \dots, \xi_{p+1}).$$

onde $(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_l}, \dots, \xi_{p+1}) = (\xi_1, \dots, \xi_{l-1}, \xi_{l+1}, \dots, \xi_{p+1})$.

Mostremos que $d_x\omega \in \text{Alt}^{p+1}(\mathbb{R}^n)$. Pelo lema 0.2.7 do capítulo anterior, basta mostrar que se $\xi_i = \xi_{i+1}$, então $d_x\omega(\xi_1, \dots, \xi_{p+1}) = 0$, para qualquer $1 \leq i \leq p-1$. Assim:

$$\begin{aligned} \sum_1^{p+1} (-1)^{l-1} D_x\omega(\xi_l)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_l}, \dots, \xi_{p+1}) &= \\ &= (-1)^{i-1} D_x\omega(\xi_i)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_i}, \dots, \xi_{p+1}) + (-1)^i D_x\omega(\xi_{i+1})(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_{i+1}}, \dots, \xi_{p+1}) = \\ &= (-1)^{i-1} D_x\omega(\xi_i)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_i}, \dots, \xi_{p+1}) + (-1)^i D_x\omega(\xi_i)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_i}, \dots, \xi_{p+1}) = 0 \end{aligned}$$

Exemplo 1.1.3. *Tomemos a i -ésima projeção $x_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$. Assim:*

$$D_x x_i(e_j) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial x_j}(x) \epsilon_j = \epsilon_i$$

$$\text{pois } \frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \begin{cases} 0 & \text{se, } i \neq j \\ 1 & \text{se, } i = j. \end{cases}$$

De uma forma mais geral, se $f \in \Omega^0(U)$, teremos:

$$d_x f(\zeta) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \zeta^1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \zeta^2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \zeta^n$$

com $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n)$, ou seja,

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \epsilon^i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

Lema 1.1.4. Se $\omega(x) = f(x)\epsilon_I$, então $d_x\omega = d_x f \wedge \epsilon_I$.

Demonstração: Pela equação (*), temos:

$$D_x\omega(\zeta) = D_x f(\zeta)\epsilon_I = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\zeta^1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\zeta^2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\zeta^n \right) \epsilon_I = d_x f(\zeta)\epsilon_I$$

e, usando a definição de diferencial exterior, temos:

$$\begin{aligned} d_x\omega(\xi_1, \dots, \xi_{p+1}) &= \sum_{l=1}^{p+1} (-1)^{l+1} D_x\omega(\xi_l)(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_l}, \dots, \xi_{p+1}) \\ &= \sum_{l=1}^{p+1} (-1)^{l+1} d_x f(\xi_l)\epsilon_I(\xi_1, \dots, \widehat{\xi_l}, \dots, \xi_{p+1}). \end{aligned}$$

Notemos que esta última expressão é similar a definição de produto exterior dada no capítulo anterior tomando $\omega_1 = d_x f$ e $\omega_2 = \epsilon_I$. Além disso, o somatório acima percorre todas $p+1$ embaralhamentos do tipo $(1, p)$ existentes, e o fator $(-1)^{p+1}$ é o sinal da permutação correspondente. ■

Notemos que

$$\epsilon^k \wedge \epsilon^I = \begin{cases} 0 & \text{se, } k \in I \\ (-1)^r \epsilon_J & \text{se, } k \notin I \end{cases}$$

onde $\epsilon_I \in \text{Alt}^p(\mathbb{R}^n)$ e r é o número determinado por $i_r < k < i_{r+1}$ e $J = (i_1, \dots, i_r, k, i_{r+1}, \dots, i_p)$.

Lema 1.1.5. Se $p \geq 0$, a composição $\Omega^p(U) \xrightarrow{d} \Omega^{p+1} \xrightarrow{d} \Omega^{p+2}$ é identicamente nula.

Demonstração: Lembrando que as aplicações ϵ_I formam uma base para $\text{Alt}^p(\mathbb{R}^n)$, tomemos $\omega = f\epsilon_I$. Então:

$$d\omega = df \wedge \epsilon_I = \frac{\partial f}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_I + \frac{\partial f}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_I + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \epsilon_n \wedge \epsilon_I = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \epsilon_i \wedge \epsilon_I.$$

Como $\epsilon_i \wedge \epsilon_i = 0$ e $\epsilon_i \wedge \epsilon_j = -\epsilon_j \wedge \epsilon_i$, teremos:

$$\begin{aligned}
d^2\omega &= d(df \wedge \epsilon_I) \\
&= d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \epsilon_i \wedge \epsilon_I\right) \\
&= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \epsilon_i \wedge \epsilon_j \wedge \epsilon_I \\
&= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \epsilon_i \wedge \epsilon_j \wedge \epsilon_I \\
&= \sum_{i < j}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) \epsilon_i \wedge \epsilon_j \wedge \epsilon_I = 0
\end{aligned}$$

■

O produto exterior em $\text{Alt}^*(\mathbb{R}^n)$ induz um produto exterior em $\Omega^*(U)$, definido por:

$$\begin{aligned}
\wedge : \Omega^p(U) \times \Omega^q(U) &\longrightarrow \Omega^{p+q}(U) \\
(\omega_1 \wedge \omega_2)(x) &\longmapsto \omega_1(x) \wedge \omega_2(x)
\end{aligned}$$

Ou seja, se ω_1 é uma p -forma diferencial e ω_2 é uma q -forma diferencial, teremos que $\omega_1 \wedge \omega_2$ será uma $p+q$ -forma diferencial e a operação $\wedge$ será bilinear. Mais ainda, se $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$, temos:

$$(f\omega_1) \wedge \omega_2 = f(\omega_1 \wedge \omega_2) = \omega_1 \wedge (f\omega_2)$$

isso segue do fato de que $f \in \Omega^0(U)$, sendo assim, $f \wedge \omega = f\omega$, pela definição de produto exterior.

Lema 1.1.6. Para $\omega_1 \in \Omega^p(U)$ e $\omega_2 \in \Omega^q(U)$, temos

$$d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2.$$

Demonstração: Sendo as formas ϵ_I base, é suficiente provar para o caso $\omega_1 = f\epsilon_I$ e $\omega_2 = g\epsilon_J$. Assim $\omega_1 \wedge \omega_2 = f\epsilon_I \wedge g\epsilon_J = fg\epsilon_I \wedge \epsilon_J$, pois $f, g \in \Omega^0(U)$. Logo:

$$\begin{aligned}
d(\omega_1 \wedge \omega_2) &= d(fg\epsilon_I \wedge \epsilon_J) \\
&= dfg \wedge \epsilon_I \wedge \epsilon_J + fg d\epsilon_I \wedge \epsilon_J \\
&= df \wedge \epsilon_I \wedge g\epsilon_J + fg d\epsilon_I \wedge \epsilon_J \\
&= df \wedge \epsilon_I \wedge g\epsilon_J + (-1)^p f\epsilon_I \wedge dg \wedge \epsilon_J \\
&= d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2.
\end{aligned}$$

onde usamos o lema 0.2.8 na última passagem com o fato de que $dg \in \Omega^1(U)$ e $\epsilon_I \in \Omega^p(U)$

■

Resumindo, temos uma álgebra anti-comutativa $\Omega^*(U)$, com uma diferencial $d : \Omega^*(U) \rightarrow \Omega^{*+1}(U)$ e $d \circ d = 0$. A cadeia:

$$\Omega^0(U) \xrightarrow{d} \Omega^1(U) \rightarrow \cdots \rightarrow \Omega^p(U) \xrightarrow{d} \Omega^{p+1}(U) \rightarrow \cdots$$

é chamada de complexo de de Rham de U .

Teorema 1.1.7. *Há precisamente um operador linear*

$$d : \Omega^p(U) \rightarrow \Omega^{p+1}(U) \quad , \quad p = 0, 1, \dots$$

tal que :

$$(i) \quad f \in \Omega^0(U), df = \frac{\partial f}{\partial x_1} \epsilon_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \epsilon_n;$$

$$(ii) \quad d \circ d = 0;$$

$$(iii) \quad d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2.$$

Demonstração: Ora, nos três lemas anteriores provamos que a diferencial d satisfaz as três condições impostas em (i), (ii) e (iii) no enunciado. Resta-nos provar a unicidade. Suponhamos que exista um outro operador d' que satisfaz as condições (i), (ii) e (iii) do enunciado. Por (i) teremos que $d' = d$ em $\Omega^0(U)$. Em particular, para a i -ésima projeção $x_i : U \rightarrow \mathbb{R}$, teremos $dx_i = d'x_i$. Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo 1.1.3, $d'x_i = \epsilon_i$, função constante. Pela propriedade (ii), temos $d' \circ d' = 0$, então $d'(d'x_i) = d'\epsilon_i = 0$, e por (iii), $d'\epsilon_i = 0$.

Tomemos $\omega = f\epsilon_I = f \wedge \epsilon_I$, com $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$, então:

$$d'\omega = d'(f \wedge \epsilon_I) = d'f \wedge \epsilon_I + f \wedge d'\epsilon_I = d'f \wedge \epsilon_I = df \wedge \epsilon_I = d\omega$$

Logo, $d = d'$, para todo $\omega \in \Omega^p(U)$. ■

Vejamos dois exemplos de cálculo da diferencial.

Exemplo 1.1.8. *Seja $U \subset \mathbb{R}^3$ um aberto e $d : \Omega^1(U) \rightarrow \Omega^2(U)$.*

$$\begin{aligned}
d(f_1\epsilon_1 + f_2\epsilon_2 + f_3\epsilon_3) &= df_1 \wedge \epsilon_1 + df_2 \wedge \epsilon_2 + df_3 \wedge \epsilon_3 + \\
&= \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \epsilon_3 \wedge \epsilon_1 \right) + \\
&+ \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_2 + \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \epsilon_3 \wedge \epsilon_2 \right) + \\
&+ \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_3 + \frac{\partial f_3}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_3 + \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \epsilon_3 \wedge \epsilon_3 \right) \\
&= \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_2} \right) \epsilon_3 \wedge \epsilon_2 + \\
&+ \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) \epsilon_3 \wedge \epsilon_1
\end{aligned}$$

onde usamos na primeira igualdade o teorema anterior no fato de que $d(f \wedge \epsilon_i) = df_i \wedge \epsilon_i + (-1)^1 f_i \wedge d\epsilon_i = df_i \wedge \epsilon_i$, e na última igualdade usamos que $\epsilon_i \wedge \epsilon_j = -\epsilon_j \wedge \epsilon_i$, pois ambas são 1-formas.

Exemplo 1.1.9. Seja $U \subset \mathbb{R}^3$ um aberto e $d : \Omega^1(U) \longrightarrow \Omega^2(U)$.

$$\begin{aligned}
d(g_3\epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + g_1\epsilon_2 \wedge \epsilon_3 + g_2\epsilon_3 \wedge \epsilon_1) &= dg_3 \wedge \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + dg_1 \wedge \epsilon_2 \wedge \epsilon_3 + dg_2 \wedge \epsilon_3 \wedge \epsilon_1 \\
&= \frac{\partial g_3}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + \frac{\partial g_3}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + \frac{\partial g_3}{\partial x_3} \epsilon_3 \wedge \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 + \\
&+ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 \wedge \epsilon_3 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_2 \wedge \epsilon_3 + \frac{\partial g_1}{\partial x_3} \epsilon_3 \wedge \epsilon_2 \wedge \epsilon_3 + \\
&+ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \epsilon_1 \wedge \epsilon_3 \wedge \epsilon_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \epsilon_2 \wedge \epsilon_3 \wedge \epsilon_1 + \frac{\partial g_2}{\partial x_3} \epsilon_1 \wedge \epsilon_3 \wedge \epsilon_1 \\
&= \left(\frac{\partial g_1}{\partial x_1} + \frac{\partial g_2}{\partial x_2} + \frac{\partial g_3}{\partial x_3} \right) \epsilon_1 \wedge \epsilon_2 \wedge \epsilon_3.
\end{aligned}$$

1.2 A cohomologia de de Rham

Definição 1.2.1. A p -ésima cohomologia de de Rham é o espaço vetorial quociente:

$$H^p(U) = \frac{\ker(d : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^{p+1}(U))}{\text{im}(d : \Omega^{p-1}(U) \longrightarrow \Omega^p(U))}.$$

Em particular $H^p(U) = 0$ para $p < 0$ e $H^0(U)$ é o núcleo de

$$d : C^\infty(U, \mathbb{R}) \longrightarrow \Omega^1(U)$$

é o espaço das funções $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ cujas derivadas se anulam em U , ou seja,

$$H^0(U) = \left\{ f : U \longrightarrow \mathbb{R} : \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = 0, \forall x \in U, 1 \leq i \leq n \right\}.$$

Em um conjunto aberto U podemos estabelecer uma relação de equivalência onde $q_1 \sim q_2$ se existir uma curva contínua $\alpha : [a, b] \longrightarrow U$ tal que $\alpha(a) = q_1$ e $\alpha(b) = q_2$. Essas classes de equivalência particionam U em abertos disjuntos, aos quais nomeamos componentes conexas de U . Uma componente conexa W de U será dita maximal se não for possível escrever W como união de dois abertos disjuntos e não vazios, na topologia induzida pelo $\mathbb{R}^n$. Lembrando que qualquer aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ terá sempre uma quantidade enumerável de componentes conexas, isto porque, para cada componente conexa, podemos escolher um ponto com coordenadas racionais para representá-la.

Lema 1.2.2. $H^0(U)$ é o espaço vetorial das aplicações $U \longrightarrow \mathbb{R}$ que são constantes em cada componente conexa de U .

Demonstração: Funções $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ que são localmente constantes fornecem uma partição de U em abertos disjuntos $f^{-1}(c)$, $c \in \mathbb{R}$, ou seja, cada $f^{-1}(c)$ será uma componente conexa de U , logo, f será localmente constante quando for constante em cada componente conexa. ■

A $\dim_{\mathbb{R}}(H^0(U))$ será a quantidade de componentes conexas de U . Já citamos que as componentes conexas de U são enumeráveis, logo $\dim_{\mathbb{R}}(H^0(U))$ será um número inteiro não negativo ou ∞ .

Quando $\omega \in \Omega^p(U)$ pertence ao núcleo de $d : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^{p+1}(U)$, ou seja, $d\omega = 0$, dizemos que ω é uma *p-forma fechada*. As aplicações que fazem parte de $d(\Omega^{p-1}) \subset \Omega^p$ são chamadas de *p-formas exatas*. Note que toda *p-forma exata* é uma *p-forma fechada*, mas o inverso não é verdade. Isto é justamente o que mede a *p-ésima cohomologia de de Rham*, o quanto as *p-formas fechadas* são *exatas*. No caso de $H^p(U) = 0$, teremos que todas as *p-formas fechadas* serão *exatas*. As *p-formas fechadas* determinam as classes de cohomologia, da seguinte forma:

$$[\omega] = \omega + d(\Omega^{p-1}) \subset \Omega^p, \omega \text{ fechada.}$$

Duas classes de cohomologia serão iguais quando diferirem por uma forma exata, ou seja, $[\omega] = [\omega']$ se $\omega - \omega'$ é exata. Em geral o espaço das p -formas fechadas e o espaço das p -formas exatas tem dimensão infinita, o que torna curioso o fato de que a dimensão de $H^p(U)$ ser, usualmente, finita.

Podemos definir um produto entre classes da seguinte forma:

$$\begin{aligned} H^p(U) \times H^q(U) &\longrightarrow H^{p+q}(U) \\ ([\omega_1], [\omega_2]) &\longmapsto [\omega_1 \wedge \omega_2] \end{aligned}$$

Vejamos que este produto está bem definido, pois:

$$\begin{aligned} (\omega_1 + d\eta_1) \wedge (\omega_2 + d\eta_2) &= \omega_1 \wedge \omega_2 + d\eta_1 \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge d\eta_2 + d\eta_1 \wedge d\eta_2 \\ &= \omega_1 \wedge \omega_2 + d(\eta_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge \eta_2 + \eta_1 \wedge d\eta_2) \end{aligned}$$

Para conseguir um funtor contravariante de U em $H^p(U)$, tomemos uma aplicação linear infinitamente diferenciável $\phi_1 : U_1 \longrightarrow U_2$ entre abertos $U_1 \subset \mathbb{R}^n$ e $U_2 \subset \mathbb{R}^m$. Gostaríamos de definir:

$$H^p(\phi) : H^p(U_2) \longrightarrow H^p(U_1)$$

tal que,

$$\begin{aligned} H^p(\phi_1 \circ \phi_2) &= H^p(\phi_1) \circ H^p(\phi_2) \\ H^p(\text{id}) &= \text{id}. \end{aligned}$$

Mas antes disso temos:

Definição 1.2.3. *Sejam dois abertos $U_1 \subset \mathbb{R}^n$ e $U_2 \subset \mathbb{R}^m$ e $\phi : U_1 \longrightarrow U_2$ uma aplicação diferenciável. Definimos o pullback de ϕ quando $p > 0$ como:*

$$\begin{aligned} \Omega^p(\phi) : \Omega^p(U_2) &\longrightarrow \Omega^p(U_1) \\ \Omega^p(\phi)(\omega)_x(\xi_1, \dots, \xi_n) &= \omega_{\phi(x)}(D_x\phi(\xi_1), \dots, D_x\phi(\xi_p)), \end{aligned}$$

e quando $p = 0$: $\Omega^p(\phi)(\omega)_x = (\omega)_{\phi(x)}$.

É comum encontrarmos na literatura a notação ϕ^* para $\Omega^p(\phi)$, que torna a notação mais simples. Neste trabalho adotaremos a notação de ϕ^* .

Tomemos $\phi : U_1 \longrightarrow U_2$ e $\psi : U_2 \longrightarrow U_3$, onde $U_1 \subset \mathbb{R}^n$, $U_2 \subset \mathbb{R}^m$ e $U_3 \subset \mathbb{R}^q$. Usando a regra da cadeia temos $D_x(\psi \circ \phi) = D_{\phi(x)}(\psi) \circ D_x(\phi)$, que na definição 1.2.3, nos dá:

$$(\psi \circ \phi)^* = \psi^* \circ \phi^* \text{ é claro que } \phi^*(\text{id}_U) = \text{id}_{\Omega^p(U)}$$

Provemos a afirmação acima. Temos:

$$U_1 \xrightarrow{\phi} U_2 \xrightarrow{\psi} U_3$$

$$\Omega^p(U_3) \xrightarrow{\psi^*} \Omega^p(U_2) \xrightarrow{\phi^*} \Omega^p(U_1)$$

Seja $x \in U_1$, faremos $\phi(x) = y$ e $\psi(y) = \psi(\phi(x)) = z$. Então, para $\omega \in \Omega^p(U_3)$, $\xi_1, \dots, \xi_p \in \mathbb{R}^n$ e $x \in U_1$, temos:

$$\begin{aligned} (\psi \circ \phi)_x^*(\omega)(\xi_1, \dots, \xi_p) &= \omega_{(\psi \circ \phi)(x)}(D_x(\psi \circ \phi)(\xi_1), \dots, D_x(\psi \circ \phi)(\xi_p)) \\ &= \omega_z(D_y\psi(D_x(\xi_1)), \dots, D_y\psi(D_x(\xi_p))) \end{aligned}$$

onde usamos a regra da cadeia na última igualdade. Por outro lado:

$$\begin{aligned} (\psi^* \circ \phi^*)_x(\omega)(\xi_1, \dots, \xi_p) &= \psi^* (\omega_{\phi(x)}(D_x\phi(\xi_1), \dots, D_x\phi(\xi_p))) \\ &= \psi^* (\omega_y(D_x\phi(\xi_1), \dots, D_x\phi(\xi_p))) \\ &= \omega_{\psi(y)}(D_y\psi(D_x(\xi_1)), \dots, D_y\psi(D_x(\xi_p))) \\ &= \omega_z(D_y\psi(D_x(\xi_1)), \dots, D_y\psi(D_x(\xi_p))) \end{aligned}$$

o que prova a veracidade da primeira igualdade. Para a segunda igualdade, temos:

$$\text{id}_U : U \longrightarrow U \quad ; \quad \text{id}_U(x) = x \quad ; \quad U \subset \mathbb{R}^n$$

$$\text{id}^* : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^p(U) \quad ; \quad \text{id}^*\omega = \omega.$$

Assim, para $x \in U$, $\omega \in \Omega^p(U)$ e $\xi_1, \dots, \xi_p \in \mathbb{R}^n$, temos:

$$\text{id}_x^*\omega(\xi_1, \dots, \xi_p) = \omega_{\text{id}(x)}(D_x\text{id}(\xi_1), \dots, D_x\text{id}(\xi_p)) = \omega_x(\xi_1, \dots, \xi_p)$$

pois $D_x\text{id}(\xi_i) = \xi_i$ pelo teorema 1.1.7. Logo, as duas identidades estão provadas.

Exemplo 1.2.4. Para 1-forma constante $\epsilon_i \in \Omega^1(U)$, temos:

$$\phi^*(\epsilon_i) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \phi_i}{\partial x_k} \epsilon_k = d\phi_i$$

com ϕ_i a i -ésima função coordenada. Seja $\zeta = (\zeta^1, \dots, \zeta^n) \in \mathbb{R}^n$, temos:

$$\begin{aligned}
\phi^*(\epsilon_i)(\zeta) &= \epsilon_i(D_x \phi(\zeta)) \\
&= \epsilon_i \left(\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n \frac{\partial \phi_k}{\partial x_l} \zeta^l \epsilon_k \right) \\
&= \sum_{l=1}^n \frac{\partial \phi_i}{\partial x_l} \epsilon_l(\zeta) = d\phi_i(\zeta).
\end{aligned}$$

Teorema 1.2.5. *Pela definição 1.2.3 de pull back, temos:*

$$(i) \quad \phi^*(\omega \wedge \tau) = \phi^*(\omega) \wedge \phi^*(\tau);$$

$$(ii) \quad \phi^*(f) = f \circ \phi \text{ se } f \in \Omega^0(U_2);$$

$$(iii) \quad d\phi^*(\omega) = \phi^*(d\omega).$$

Reciprocamente, se $\phi' : \Omega^*(U_2) \longrightarrow \Omega^*(U_1)$ é um operador que satisfaz as três condições impostas, então $\phi' = \phi^*$.

Demonstração: Para a primeira afirmação tomemos $x \in U_1$, $\xi_1, \dots, \xi_{p+q} \in \mathbb{R}^n$, $\omega \in \Omega^p(U_2)$, $\tau \in \Omega^q(U_2)$ e consideremos $p, q > 0$. Assim:

$$\begin{aligned}
\phi^*(\omega \wedge \tau)_x(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) &= (\omega \wedge \tau)_{\phi(x)}(D_x \phi(\xi_1), \dots, D_x \phi(\xi_{p+q})) \\
&= \sum_I \text{sign}(\sigma) \omega_{\phi(x)}(D_x \phi(\xi_{\sigma(1)}), \dots, D_x \phi(\xi_{\sigma(p)})) \cdot \tau_{\phi(x)}(D_x \phi(\xi_{\sigma(p+1)}), \dots, D_x \phi(\xi_{\sigma(p+q)})) \\
&= \sum_I \text{sign}(\sigma) \phi^* \omega_x(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) \cdot \phi^* \tau_x(\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}) \\
&= (\phi^*(\omega)_x \wedge \phi^*(\tau)_x)(\xi_1, \dots, \xi_{p+q})
\end{aligned}$$

No caso em que $p = 0$ ou $q = 0$ a prova é similar.

A prova de (ii) está contida na definição de ϕ^* em grau zero.

Resta-nos provar a afirmação (iii). Primeiramente mostremos para o caso $f \in \Omega^0(U_2)$. Temos:

$$df = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_k} \epsilon_k = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_k} \wedge \epsilon_k$$

onde usamos a definição de produto exterior, o item (i) do teorema 1.1.7 e $\epsilon_k \in \Omega^1(U_2)$

ter valor constante. Então:

$$\begin{aligned}
 \phi^*(df) &= \sum_{k=1}^m \phi^* \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right) \wedge \phi^*(\epsilon_k) \\
 &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_k} \circ \phi \wedge \sum_{l=1}^n \frac{\partial \phi_k}{\partial x_l} \epsilon_l \\
 &= \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \circ \phi \right) \left(\frac{\partial \phi_k}{\partial x_l} \right) \epsilon_l \\
 &= \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^m \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \circ \phi \right) \frac{\partial \phi_k}{\partial x_l} \right) \epsilon_l \\
 &= \sum_{l=1}^n \frac{\partial (f \circ \phi)}{\partial x_l} \epsilon_l = d(f \circ \phi) = d(\phi^*(f)),
 \end{aligned}$$

onde usamos (i) e (ii) já provados e a regra da cadeia na última igualdade.

Como em situações anteriores, é suficiente provar o caso geral para $\omega = f\epsilon_I = f \wedge \epsilon_I$, com $f \in \Omega^0(U_2)$. Pelo lema 1.1.6, temos $d\omega = df \wedge \epsilon_I$, pois $d\epsilon_I = 0$. Além disso,

$$\begin{aligned}
 d\phi^*(\epsilon_I) &= d(\phi^*(\epsilon_{i_1}) \wedge \cdots \wedge \phi^*(\epsilon_{i_p})) \\
 &= \sum (-1)^{k-1} \phi^*(\epsilon_{i_1}) \wedge \cdots \wedge d\phi^*(\epsilon_{i_k}) \wedge \cdots \wedge \phi^*(\epsilon_{i_p}) = 0
 \end{aligned}$$

isso porque no exemplo anterior ao teorema mostramos que $\phi^*\epsilon_i = d\phi_i$ e assim $d\phi^*\epsilon_i = d(d\phi_i) = 0$. ■

Para que a notação fique mais clara, escreveremos

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}$$

em vez de usar $\epsilon_I = \epsilon_{i_1} \wedge \cdots \wedge \epsilon_{i_p}$. Assim, uma p -forma arbitrária pode ser escrita como:

$$\omega(x) = \sum_I \omega_I(x) dx_I$$

onde I percorre todas as sequência $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n$. Do exemplo 1.2.4 temos $\phi(dy_i) = d\phi_i$, onde $y_i : U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ é a i -ésima função coordenada e $\phi_i = y_i \circ \phi$ a i -ésima coordenada de ϕ .

Exemplo 1.2.6. Tomemos $\gamma : (a, b) \rightarrow U$ uma curva suave em U , com $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$,

e $\omega = f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n \in \Omega^1(U)$. Assim:

$$\begin{aligned}
 \gamma^*(\omega) &= \gamma^*(f_1 \wedge dx_1) + \dots + \gamma^*(f_n \wedge dx_n) \\
 &= \gamma^*(f_1) \wedge \gamma^*(dx_1) + \dots + \gamma^*(f_n) \wedge \gamma^*(dx_n) \\
 &= (f_1 \circ \gamma) d\gamma_1 + \dots + (f_n \circ \gamma) d\gamma_n \\
 &= [(f_1 \circ \gamma)\gamma'_1 + \dots + (f_n \circ \gamma)\gamma'_n] dt = \langle f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt
 \end{aligned}$$

onde $\langle, \rangle$ é o produto interno usual.

Exemplo 1.2.7. Se ϕ é uma função diferenciável entre dois abertos de $\mathbb{R}^n$, temos:

$$\begin{aligned}
 \phi^*(dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n) &= \phi^*(dx_1) \wedge \dots \wedge \phi^*(dx_n) \\
 &= d\phi^*(x_1) \wedge \dots \wedge d\phi^*(x_n) \\
 &= d\phi_1 \wedge \dots \wedge d\phi_n \\
 &= \det(D_x \phi) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n
 \end{aligned}$$

onde a última igualdade é consequência do lema 0.2.13 do capítulo anterior.

Exemplo 1.2.8. Tomemos

$$\begin{aligned}
 \phi &: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n \\
 (x, t) &\longmapsto \phi(x, t) = \psi(t)x
 \end{aligned}$$

onde $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Então:

$$\begin{aligned}
 \phi^*(dx_i) &= d(\phi^*x_i) \\
 &= d(\phi \circ x_i) \\
 &= d(\psi(t) \cdot x_i) \\
 &= x_i \psi'(t) dt + \psi(t) dx_i
 \end{aligned}$$

Definição 1.2.9. Para uma aplicação diferenciável $\phi : U_1 \longrightarrow U_2$, podemos associar a aplicação linear:

$$\begin{aligned}
 H^p(\phi) &: H^p(U_2) \longrightarrow H^p(U_1) \\
 [\omega] &\longmapsto [\phi^*(\omega)]
 \end{aligned}$$

Veja que a aplicação independe da escolha do representante, pois:

$$\phi^*(\omega + d\eta) = \phi^*(\omega) + \phi^*(d\eta) = \phi^*(\omega) + d(\phi^*\eta) \in H^p(U_1)$$

Além disso, se $\omega_1 \in H^p(U_2)$ e $\omega_2 \in H^q(U_2)$, temos:

$$\begin{aligned} H^{p+q}(\phi)([\omega_1][\omega_2]) &= H^{p+q}(\phi)([\omega_1 \wedge \omega_2]) \\ &= [\phi^*(\omega_1 \wedge \omega_2)] \\ &= [\phi^*\omega_1 \wedge \phi^*\omega_2] \\ &= [\phi^*\omega_1][\phi^*\omega_2] \\ &= H^p(\phi)[\omega_1] \cdot H^q(\phi)[\omega_2] \end{aligned}$$

ou seja, $H^p(\phi) : H^p(U_2) \longrightarrow H^p(U_1)$ é um homomorfismo de álgebras graduadas.

1.3 O lema de Poincaré

Lema 1.3.1. *Se $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto estrelado, existe um operador linear*

$$S_p : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^{p-1}(U)$$

tal que $dS_p + S_{p+1}d = id$ quando $p > 0$ e $S_1d = id - e$, com $e(\omega) = \omega(0)$, para $\omega \in \Omega^0(U)$

Demonstração: Primeiramente lembremos que um conjunto estrelado é aquele que contém um ponto que pode ser conectado a outro ponto qualquer do conjunto por uma aplicação linear. No nosso caso podemos assumir U como estrelado na origem, sem perda de generalidade, caso contrário uma simples translação em ψ resolveria o problema.

Consideremos o conjunto $\Omega^p(U \times \mathbb{R})$. Para cada $\omega \in \Omega^p(U, \mathbb{R})$, podemos escrever:

$$\omega = \sum_I f_I(x, t) dx_I + \sum_J g_J(x, t) dt \wedge dx_J$$

onde $I = (i_1, \dots, i_p)$ e $J = (j_1, \dots, j_{p-1})$. Notemos que ao fazer isso separamos os termos que compõem ω , sendo os primeiros aqueles que independem de dt na combinação e o segundo somatório todos os termos de ω que contém dt na combinação.

Definimos:

$$\begin{aligned}\widehat{S}_p &: \Omega^p(U \times \mathbb{R}) \longrightarrow \Omega^{p-1}(U) \\ \omega &\longmapsto \sum_J \left(\int_1^0 g_J(x, t) dt \right) dx_J.\end{aligned}$$

Então:

$$\begin{aligned}d\widehat{S}_p(\omega) &= d \left(\sum_J \int_1^0 g_J(x, t) dt \right) dx_J \\ &= \sum_{J,i} \left(\int_0^1 \frac{\partial g_J(x, t)}{\partial x_i} dt \right) dx_i \wedge dx_J\end{aligned}$$

Temos também:

$$\begin{aligned}\widehat{S}_{p+1}d(\omega) &= \widehat{S}_{p+1} \left(\sum_I \frac{\partial f_I(x, t)}{\partial t} dt \wedge dx_I - \sum_{J,i} \frac{\partial g_J(x, t)}{\partial x_i} dt \wedge dx_i \wedge dx_J \right) \\ &= \sum_I \int_0^1 \left(\frac{\partial f_I(x, t)}{\partial t} dt \right) dx_I - \sum_{J,i} \left(\int_0^1 \frac{\partial g_J(x, t)}{\partial x_i} dt \right) dx_i \wedge dx_J\end{aligned}$$

E assim,

$$\begin{aligned}d\widehat{S}_p(\omega) + \widehat{S}_{p+1}d(\omega) &= \sum_I \int_0^1 \left(\frac{\partial f_I(x, t)}{\partial t} dt \right) dx_I \\ &= \sum_I f_I(x, 1) dx_I - \sum_I f_I(x, 0) dx_I\end{aligned}$$

Até este ponto da demonstração, ainda não usamos a hipótese de que U é um aberto estrelado. Usaremos no seguinte operador:

$$\phi : U \times \mathbb{R} \longrightarrow U \quad , \quad \phi(x, t) = \psi(t)x$$

onde ϕ é uma curva suave com:

$$\begin{cases} \psi(t) = 0 & \text{se } t \leq 0 \\ \psi(t) = 1 & \text{se } t \geq 1 \\ 0 \leq \psi(t) \leq 1 & \text{se } 0 < t < 1 \end{cases}$$

como U é estrelado, com as condições acima, $\phi(x) \in U$, qualquer que seja $x \in U$. Então, fica bem definida:

$$\begin{aligned}S_p &: \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^{p-1}(U) \\ \omega &\longmapsto \widehat{S}_p(\phi^*(\omega)).\end{aligned}$$

Tomando $\omega = \sum_I h_I(x) dx_I$ e usando a diferencial como na definição 1.2.9:

$$\phi^*(\omega) = \sum h_I(\psi(t)x)(d\psi(t)x_{i_1} + \psi(t)dx_{i_1}) \wedge \cdots \wedge (d\psi(t)x_{i_p} + \psi(t)dx_{i_p})$$

onde, usando a notação na qual definimos S_p , teremos

$$\sum_I f_I(x, t) dx_I = \sum_I h_I(\psi(t)x) \psi(t)^p dx_I,$$

o que implica

$$\begin{aligned} dS_p(\omega) + S_{p+1}d(\omega) &= \sum_I h_I(\psi(1)x) \psi(1)^p dx_I - \sum_I h_I(\psi(0)x) \psi(0)^p dx_I \\ &= \sum_I h_I(x) dx_I = \omega \end{aligned}$$

Para $p > 0$, pois $\psi(0) = 0$. No caso $p = 0$, $\omega = h(x)$ e assim:

$$dS_0(\omega) + S_1d(\omega) = h(x) - h(0) = \omega(x) - \omega(0).$$

E temos:

$$dS_p(\omega) + S_{p+1}d(\omega) = \begin{cases} \omega & \text{se } p > 0 \\ \omega(x) - \omega(0) & \text{se } p = 0 \end{cases}$$

o que concluí a nossa demonstração. ■

Teorema 1.3.2. (*Lema de Poincaré*) Se U é um aberto estrelado, então, $H^p(U) = 0$, para $p > 0$ e $H^0(U) = \mathbb{R}$.

Ora, tomemos o operador S_p do lema anterior. Para $\omega \in \Omega^p(U)$ uma p -forma fechada, com $p > 0$, temos

$$dS_p(\omega) + S_{p+1}d(\omega) = \omega \Rightarrow dS_p(\omega) = \omega$$

pois ω é fechada e assim $S_{p+1}d(\omega) = 0$. Logo, toda p -forma fechada é também exata. Assim $H^p(U) = 0$, para $p > 0$.

Para $p = 0$, temos que $\omega(x) = \omega(0)$, ou seja, uma constante. Logo $H^0(U) = \mathbb{R}$. ■

Complexos de cadeia e suas cohomologias

Neste capítulo apresentaremos algumas definições gerais de álgebra. Assim esclareceremos algumas construções do capítulo anterior e seremos capazes de construir alguns conceitos algébricos necessários para os próximos capítulos.

2.1 Complexos de Cadeia

Uma sequência de espaços vetoriais e aplicações lineares:

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \quad (1)$$

é chamada exata quando $\text{im } f = \ker g$ onde:

$$\ker g = \{b \in B | g(b) = 0\}, \text{ o núcleo de } g,$$

$$\text{im } f = \{f(a) | a \in A\}, \text{ a imagem de } f.$$

Note que $A \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$ será exato quanto f for sobrejetiva e que $0 \longrightarrow B \xrightarrow{g} C$

será exato quando g for injetiva. Uma sequência $A^* = \{A^i, d^i\}$, $i \in \mathbf{Z}$

$$\dots \longrightarrow A^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} A^i \xrightarrow{d^i} A^{i+1} \xrightarrow{d^{i+1}} A^{i+2} \longrightarrow \dots \quad (2)$$

de espaços vetoriais e aplicações lineares é chamada de complexo de cadeia quando $d^{i+1} \circ d^i = 0$, para qualquer $i \in \mathbf{Z}$, isto é $\text{im } d^i \subseteq \ker d^{i+1}$. Será exata quando $\ker d^{i+1} = \text{im } d^i$, para todo $i \in \mathbf{Z}$.

Uma sequência da forma:

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

é chamada de exata curta. Isso significa que f é injetiva, g é sobrejetiva e $\text{im } f = \ker g$.

Toda sequência exata longa como em (2), induzirá uma sequência exata curta, para cada $i \in \mathbf{Z}$,

$$0 \longrightarrow \text{im } d^{i-1} \longrightarrow A^i \longrightarrow \text{im } d^i \longrightarrow 0$$

que poderá ser usada para calcular A^i . Além disso os isomorfismos:

$$\frac{A^{i-1}}{\text{im } d^{i-2}} \cong \frac{A^{i-1}}{\ker d^{i-1}} \longrightarrow \text{im } d^{i-1}$$

são frequentemente aplicados em cálculos reais.

Lema 2.1.1. *Suponha que $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ é uma sequência exata curta de espaços vetoriais. Então B tem dimensão finita se A e C tiverem. Além disso $B \cong A \oplus C$.*

■

Definição 2.1.2. *Para um complexo de cadeia*

$$\dots \longrightarrow A^{p-1} \xrightarrow{d^{p-1}} A^p \xrightarrow{d^p} A^{p+1} \xrightarrow{d^{p+1}} A^{p+2} \longrightarrow \dots$$

definimos a p -ésima cohomologia por

$$H^p(A^*) = \frac{\ker d^p}{\text{im } d^{p-1}}.$$

Os elementos de $\ker d^p$ são chamados p-ciclos (ou fechados) e os elementos de $\operatorname{im} d^{p-1}$ de p-fronteiras (ou exatos). Os elementos de $H^p(A^*)$ são chamados de classes de cohomologia.

Uma aplicação de cadeia $f : A^* \longrightarrow B^*$ entre complexos de cadeias consiste de aplicações lineares $f^p : A^p \longrightarrow B^p$ que satisfazem $d_B^p \circ f^p = f^{p+1} \circ d_A^p$. Uma aplicação de cadeia pode ser ilustrada através do seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & A^{p-1} & \xrightarrow{d^{p-1}} & A^p & \xrightarrow{d^p} & A^{p+1} & \xrightarrow{d^{p+1}} & A^{p+2} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow f^{p-1} & & \downarrow f^p & & \downarrow f^{p+1} & & \downarrow f^{p+2} & & \\ \cdots & \longrightarrow & B^{p-1} & \xrightarrow{d^{p-1}} & B^p & \xrightarrow{d^p} & B^{p+1} & \xrightarrow{d^{p+1}} & B^{p+2} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Lema 2.1.3. *Uma aplicação de cadeia $f : A^* \longrightarrow B^*$ induz a seguinte aplicação linear:*

$$f^* = H^*(f) : H^p(A^*) \longrightarrow H^p(B^*), \forall p.$$

Demonstração: Tomemos um ciclo $a \in A^p$, ($d^p(a) = 0$) e sua classe de cohomologia:

$$[a] = a + \operatorname{im} d^{p-1}$$

Definimos

$$f^*([a]) = [f^p(a)]$$

Primeiramente $f^p(a)$ é um ciclo pois

$$d_B^p(f^p(a)) = f^{p+1}(d_A^p(a)) = f^{p+1}(0) = 0$$

Temos também que $[f^p(a)]$ independe da escolha do representante escolhido na classe $[a]$. Ora, se $[a_1] = [a_2]$, teremos que $a_1 - a_2 \in \operatorname{im} d_A^{p-1}$, ou seja, $a_1 - a_2 = d_A^{p-1}(x)$, para algum $x \in A$. Logo:

$$f^p(a_1) - f^p(a_2) = f^p(a_1 - a_2) = f^p d_A^{p-1}(x) = d_B^{p-1} f^{p-1}(x)$$

ou seja, $f^p(a_1) - f^p(a_2) \in \operatorname{im} d_B^{p-1}$ e, portanto, $f^p(a_1)$ e $f^p(a_2)$ definem a mesma classe de cohomologia. ■

Uma categoria $\mathcal{C}$ consiste de “objetos” e “morfismos” entre estes objetos, tal que a “composição” está definida, ou seja, se $f : C_1 \longrightarrow C_2$ e $g : C_2 \longrightarrow C_3$ são morfismos, então existe o morfismo $g \circ f : C_1 \longrightarrow C_3$. Além disso devemos assumir que $\operatorname{id}_C : C \longrightarrow C$ é um morfismo para cada $C \in \mathcal{C}$.

O conceito ficara mais claro com alguns exemplos:

Exemplo 2.1.4. *A categoria de abertos em espaços euclidianos, onde os morfismos serão aplicações diferenciáveis.*

Exemplo 2.1.5. *A categoria de espaços vetoriais, onde os morfismos são aplicações lineares.*

Exemplo 2.1.6. *A categoria dos grupos abelianos, onde os morfismos são homomorfismos.*

Exemplo 2.1.7. *A categoria dos complexos de cadeias, onde os morfismos são as aplicações de cadeia.*

Uma categoria com apenas um objeto é o mesmo que um semigrupo, ou seja, o semigrupo de morfismos do objeto.

Um funtor contravariante $F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{V}$ entre duas categorias é uma aplicação que associa a cada objeto $C \in \mathcal{C}$ a um objeto $F(C) \in \mathcal{V}$, e a cada morfismo $f : C_1 \longrightarrow C_2$ em $\mathcal{C}$ a um morfismo $F(f) : F(C_2) \longrightarrow F(C_1)$ em $\mathcal{V}$, tal que:

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g) \text{ e } F(\text{id}_C) = \text{id}_{F(C)}.$$

Um funtor covariante $F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{V}$ é uma aplicação $F(f) : F(C_1) \longrightarrow F(C_2)$ tal que:

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \text{ e } F(\text{id}_C) = \text{id}_{F(C)}.$$

Logo, os funtores são aplicações que preservam as estruturas das categorias. Os contravariantes mudam a direção das aplicações e os covariantes as preservam. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 2.1.8. *Seja A um espaço vetorial e $F(C) = \text{Hom}(C, A)$ as aplicações lineares de C para A . Se $\phi : C_1 \longrightarrow C_2$, então $\text{Hom}(\phi, A) : \text{Hom}(C_2, A) \longrightarrow \text{Hom}(C_1, A)$ é tal que $\psi \longmapsto \psi \circ \phi$ é um funtor contravariante da categoria de espaços vetoriais nela própria.*

Do mesmo modo, $F(C) = \text{Hom}(A, C)$ com $F(\phi) : \psi \longmapsto \phi \circ \psi$ é um funtor covariante entre a categoria dos espaços vetoriais.

Exemplo 2.1.9. *Tomemos a categoria $\mathcal{U}$ dos abertos em espaços euclidianos e aplicações diferenciáveis e Vect a categoria dos espaços vetoriais. O espaço vetorial $\Omega^p(U)$ das p -*

formas em $U \in \mathcal{U}$ define um funtor contravariante

$$\Omega^p : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{Vect}.$$

Exemplo 2.1.10. Tomemos $\mathcal{Vect}^*$ a categoria dos complexos de cadeia de espaços vetoriais. O complexo de de Rham define um funtor contravariante:

$$\Omega^* : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{Vect}^*.$$

Exemplo 2.1.11. Cada p -ésima cohomologia $H^p : \mathcal{Vect}^* \longrightarrow \mathcal{Vect}$ é um funtor covariante.

Exemplo 2.1.12. A composição dos dois funtores acima é exatamente a cohomologia de de Rham, que é contravariante.

Uma sequência exata curta de complexos de cadeia

$$0 \longrightarrow A^* \xrightarrow{f} B^* \xrightarrow{g} C^* \longrightarrow 0$$

consiste de aplicações de cadeia f e g tal que

$$0 \longrightarrow A^p \xrightarrow{f} B^p \xrightarrow{g} C^p \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata curta para todo p .

2.2 Cohomologia de complexos de cadeia

Lema 2.2.1. Para uma sequência exata curta de complexos de cadeias

$$0 \longrightarrow A^* \xrightarrow{f} B^* \xrightarrow{g} C^* \longrightarrow 0,$$

teremos que a sequência

$$H^p(A^*) \xrightarrow{f^*} H^p(B^*) \xrightarrow{g^*} H^p(C^*)$$

é exata.

Demonstração: Como $0 \longrightarrow A^p \xrightarrow{f^p} B^p \xrightarrow{g^p} C^p \longrightarrow 0$ é exata para todo p , temos que $g^p \circ f^p = 0$. Assim:

$$g^* \circ f^*([a]) = g^*([f^p(a)]) = [g^p(f^p(a))] = 0$$

para qualquer classe de cohomologia $[a] \in H^p(A)$, ou seja, $\text{im } f^* \subset \ker g^*$.

Reciprocamente, tomando $b \in H^p(B)$ tal que $g^*[b] = 0$, temos:

$$g^p(b) = d_C^{p-1}(c).$$

Como g^{p-1} é sobrejetiva, então existe $b_1 \in B^{p-1}$ com $g^{p-1}(b_1) = c$, logo:

$$\begin{aligned} g^p(b - d_B^{p-1}(b_1)) &= g^p(b) - g(d_B^{p-1}(b_1)) \\ &= g^p(b) - d_C^{p-1}(g^{p-1}(b_1)) \\ &= g^p(b) - d_C^{p-1}(c) = 0 \end{aligned}$$

ou seja, $b - d_B^{p-1}(b_1) \in \ker g^p$. Como $\ker g = \text{im } f$, existe $a \in H^p(A)$ tal que $f^p(a) = b - d_B^{p-1}(b_1)$. Para mostrar que a é um p -ciclo é suficiente mostrar que $f^{p+1}(d_A^p(a)) = 0$, pois f é injetora,

$$f^{p+1}(d_A^p(a)) = d_B^p(f^p(a)) = d_B^p(b - d_B^{p-1}(b_1)) = 0$$

pois b é um p -ciclo e $d^p \circ d^{p-1} = 0$. Encontramos assim uma classe de cohomologia $[a] \in H^p(A)$ tal que $f^*[a] = [b - d_B^{p-1}(b_1)] = [b]$, logo $\ker g^* \subset \text{im } f^*$, o que finaliza a nossa demonstração. ■

Definição 2.2.2. Para uma sequência exata curta de complexo de cadeia

$$0 \longrightarrow A^* \xrightarrow{f} B^* \xrightarrow{g} C^* \longrightarrow 0,$$

definimos ∂^* como a aplicação linear:

$$\begin{aligned} \partial^* : H^p(C^*) &\longrightarrow H^{p+1}(A^*) \\ [c] &\longmapsto \left[(f^{p+1})^{-1} (d_B^p((g^p)^{-1}(c))) \right] \end{aligned}$$

A definição acima diz que para cada $b \in (g^p)^{-1}(c)$, temos $d_B^p(b) \in \text{im } f^{p+1}$, e determina unicamente $a \in A^{p+1}$ tal que $f^{p+1}(a) = d_B^p(b)$ é um p -ciclo. Por fim, temos que $[a] \in H^{p+1}(A^*)$ independe da escolha de $b \in (g^p)^{-1}(c)$.

Para facilitar o entendimento das provas dessas afirmações, ilustramos o diagrama de uma sequência exata curta de complexos de cadeia, onde ∂^* aparece em destaque:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \cdots \rightarrow & A^{p-1} & \xrightarrow{f^{p-1}} & B^{p-1} & \xrightarrow{g^{p-1}} & C^{p-1} \cdots \rightarrow 0 \\
 & \downarrow d_A^{p-1} & & \downarrow d_B^{p-1} & & \downarrow d_C^{p-1} & \\
 0 & \cdots \rightarrow & A^p & \xrightarrow{f^p} & B^p & \xrightarrow{g^p} & C^p \cdots \rightarrow 0 \\
 & \downarrow d_A^p & & \downarrow \partial^* d_B^p & & \downarrow d_C^p & \\
 0 & \cdots \rightarrow & A^{p+1} & \xrightarrow{f^{p+1}} & B^{p+1} & \xrightarrow{g^{p+1}} & C^{p+1} \cdots \rightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

No que se segue provaremos algumas afirmações que sustentam a boa definição de ∂^* .

(i) Se $g^p(b) = c$ e $d_C^p(c) = 0$ então $d_B^p(b) \in \text{im } f^{p+1}$.

De fato, $g^{p+1}d_B^p(b) = d_C^p(g^p(b)) = d_C^p(c) = 0$. Como a sequência é exata temos $\ker g^{p+1} = \text{im } f^{p+1}$, logo $d_B^p(b) \in \text{im } f^{p+1}$.

(ii) Se $f^{p+1}(a) = d_B^p(b)$ então $d_A^{p+1}(a) = 0$.

Temos $f^{p+2}(d_A^{p+1}(a)) = d_B^{p+1}(f^{p+1}(a)) = d_B^{p+1}(d_B^p(b)) = 0$. Como f é injetiva, $d_A^{p+1}(a) = 0$.

(iii) Se $g^p(b_1) = g^p(b_2) = c$ e $f^{p+1}(a_i) = d_B^p(b_i)$, então $[a_1] = [a_2] \in H^{p+1}(A^*)$.

Como $g^p(b_1) = g^p(b_2)$, temos $g^p(b_1 - b_2) = 0$, logo $b_1 - b_2 \in \ker g = \text{im } f$, então $b_1 - b_2 = f^p(a)$, para algum $a \in A^p$. Assim $d_B^p(b_1) - d_B^p(b_2) = d_B^p(f^p(a)) = f^{p+1}(d_A^p(a))$ e por fim $(f^{p+1})^{-1}(d_B^p(b_1)) = (f^{p+1})^{-1}(d_B^p(b_2)) + d_A^p(a)$, daí $[a_1] = [a_2]$.

Lema 2.2.3. *A sequência*

$$H^p(B^*) \xrightarrow{g^*} H^p(C^*) \xrightarrow{\partial^*} H^{p+1}(A^*)$$

é exata.

Demonstração: Temos que

$$\begin{aligned}\partial^*(g^*([b])) &= \partial^*([g(b)]) \\ &= (f^{p+1})^{-1}(d_B^p(g^p)^{-1}(g(b))) \\ &= (f^{p+1})^{-1}(d_B^p(b)) = 0\end{aligned}$$

pois b é um p -ciclo. Logo $\text{im } g^* \subseteq \ker \partial^*$.

Por outro lado se $\partial^*[c] = 0$, usando a sobrejeção de g , escolhemos $b \in B^p$ tal que $g^p(b) = c$. Como $\partial^*[c] = [(f^{p+1})^{-1}(d_B^p(b))]$, existe $a \in A^p$ tal que:

$$d_B^p(b) = f^{p+1}(d_A^p(a)) = d_B^p(f^p(a))$$

assim $d_B^p(b - f^p(a)) = 0$, isto é $(b - f^p(a))$ é um p -ciclo. Como $g(b - f^p(a)) = c$, temos $g^*[b - f^p(a)] = [c]$, ou seja, $\ker \partial^* \subseteq \text{im } g^*$. ■

Lema 2.2.4. *A sequência*

$$H^p(C^*) \xrightarrow{\partial^*} H^{p+1}(A^*) \xrightarrow{f^*} H^{p+1}(B^*)$$

é exata.

Demonstração: Tomemos $b \in B^p$ tal que $g(b) = c$. Assim:

$$f^*\partial^*([c]) = [f^{p+1}((f^{p+1})^{-1}d_B^p(g^p)^{-1}(c))] = [d_B^p(b)] = 0$$

o que nos dá $\text{im } \partial^* \subseteq \ker f^*$

Reciprocamente, seja $f^*[a] = 0$. Então $f^{p+1}(a) = d_B^p(b)$, para algum $b \in B^p$. Assim $d_C^p(g^p(b)) = g^{p+1}(d_B^p(b)) = g^{p+1}(f^{p+1}(a)) = 0$, pois $\ker g^{p+1} = \text{im } f^{p+1}$ e encerramos com $\partial^*[g^p(b)] = [a]$, ou seja, $\ker f^* \subseteq \text{im } \partial^*$. ■

Teorema 2.2.5. *(da sequência exata longa de homologia) Para uma sequência exata curta de complexos de cadeia $0 \longrightarrow A^* \xrightarrow{f} B^* \xrightarrow{g} C^* \longrightarrow 0$, a sequência*

$$\dots \longrightarrow H^p(A^*) \xrightarrow{f^*} H^p(B^*) \xrightarrow{g^*} H^p(C^*) \xrightarrow{\partial^*} H^{p+1}(A^*) \xrightarrow{f^*} H^{p+1}(B^*) \longrightarrow \dots$$

é exata.

A prova deste teorema é a junção das provas dos três lemas anteriores.

Definição 2.2.6. *Duas aplicações de cadeia $f, g : A^* \longrightarrow B^*$ são ditas homotópicas se existir uma aplicação linear $s_p : A^p \longrightarrow B^{p-1}$, satisfazendo:*

$$d_B^{p-1} s_p + s_p d_A^{p-1} = f - g$$

para todo p .

O diagrama abaixo nos dá a visão de duas aplicações em cadeia que são homotópicas:

$$\begin{array}{ccccccccc} \dots & \longrightarrow & A^{p-1} & \longrightarrow & A^p & \longrightarrow & A^{p+1} & \longrightarrow & A^{p+2} & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow & \nearrow s_p & \downarrow & \nearrow s_{p+1} & \downarrow & \nearrow s_{p+2} & \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & B^{p-1} & \longrightarrow & B^p & \longrightarrow & B^{p+1} & \longrightarrow & B^{p+2} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Lema 2.2.7. *Duas aplicações de cadeia que são homotópicas $f, g : A^* \longrightarrow B^*$, induzem a mesma aplicação em homologia, ou seja:*

$$f_* = g_* : H^p(A) \longrightarrow H^p(B).$$

Demonstração: Tomemos $[a] \in H^p(A)$, então:

$$(f_* - g_*)[a] = [f^p(a) - g^p(a)] = [d_B^p s_p(a) + s_p d_A^p(a)] = [d_B^p s_p(a)] = 0$$

pois $d_A^p(a)$ é um p -ciclo e $d_B^p s_p(a)$ é uma p -fronteira. ■

Observação 2.2.8. *Para provar o lema de Poincaré no capítulo anterior, construímos aplicações lineares*

$$S^p : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^{p-1}(U)$$

com $d^{p-1} S^p + S^{p+1} d^p = id$, para $p > 0$, que é uma homotopia entre a id e 0 . Assim temos que:

$$id^* = 0^* : H^p(U) \longrightarrow H^p(U)$$

Contudo, $id^* = id$ e $0^* = 0$, então $id = 0$ em $H^p(U)$ e $H^p(U) = 0$ quando $p > 0$.

Lema 2.2.9. *Se A^* e B^* são complexos de cadeia, então:*

$$H^p(A^* \oplus B^*) = H^p(A^*) \oplus H^p(B^*).$$

Demonstração: Segue diretamente dos fatos:

$$\begin{aligned}\ker d_{A\oplus B}^p &= \ker d_A^p \oplus \ker d_B^p \\ \operatorname{im} d_{A\oplus B}^p &= \operatorname{im} d_A^p \oplus \operatorname{im} d_B^p\end{aligned}$$

o que prova o lema. ■

A sequência de Mayer-Vietoris

Neste capítulo introduziremos uma técnica para calcular a cohomologia de de Rham. Esta técnica é chamada de sequência de Mayer-Vietoris, onde conseguimos calcular $H^*(U_1 \cup U_2)$ em função de $H^*(U_1)$, $H^*(U_2)$ e $H^*(U_1 \cap U_2)$, onde U_1 e U_2 são abertos do $\mathbb{R}^n$. De um modo mais geral, somos capazes de calcular $H^*(U_1 \cup \dots \cup U_n)$ em função dos $H^*(U_\alpha)$, onde $\alpha = \{i_1, \dots, i_r\}$ são subconjuntos de $\{1, \dots, n\}$ e $U_\alpha = U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_r}$. Esta técnica, combinada com o lema de Poincaré, é capaz de produzir $H^*(U)$ para muitos abertos do $\mathbb{R}^n$. Por exemplo, se U pode ser coberto por um número finito de abertos convexos U_i , então todo U_α também será convexo e $H^*(U_\alpha)$ é conhecido, pelo lema de Poincaré.

Teorema 3.0.10. *Sejam U_1 e U_2 são abertos em $\mathbb{R}^n$ com $U = U_1 \cup U_2$ e consideremos as aplicações*

$$\begin{array}{ll} i_1 : U_1 \longrightarrow U & j_1 : U_1 \cap U_2 \longrightarrow U_1 \\ i_2 : U_2 \longrightarrow U & j_2 : U_1 \cap U_2 \longrightarrow U_2 \end{array}$$

as correspondentes inclusões. Então a sequência:

$$0 \longrightarrow \Omega^p(U) \xrightarrow{I^*} \Omega^p(U_1) \oplus \Omega^p(U_2) \xrightarrow{J^*} \Omega^p(U_1 \cap U_2) \longrightarrow 0$$

é exata, onde $I^p(\omega) = (i_1^(\omega), i_2^*(\omega))$ e $J^p(\omega_1, \omega_2) = j_1^*(\omega_1) - j_2^*(\omega_2)$.*

Demonstração: Relembremos alguns pontos já alcançados. Para uma aplicação suave

$\phi : U \longrightarrow W$ e uma p -forma $\omega = \sum_I f_I dx_I \in \Omega^p(W)$, temos:

$$\phi^*(\omega) = \sum_I (f_I \circ \phi) d\phi_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\phi_{i_p}.$$

Em particular, quando ϕ for uma inclusão, podemos escrever $\phi_i = x_i$, assim:

$$d\phi_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\phi_{i_p} = dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p},$$

e temos:

$$\phi^*(\omega) = \sum_I (f_I \circ \phi) dx_I = \sum_I (f_I|_U) dx_I =: \omega|_U.$$

Seja $\omega \in \Omega^p(U)$ tal que $I^p(\omega) = 0$. Logo $i_1^*(\omega) = i_2^*(\omega) = 0$, e temos

$$i_1^*(\omega) = \sum_I (f_I \circ i_1) dx_I = \sum_I (f_I|_{U_1}) dx_I = 0.$$

Isso ocorre se, e somente se, $f_I|_{U_1} = 0$. Usando o mesmo raciocínio para i_2^* , chegamos a conclusão que tivemos ter $f_I = 0$ para todo $x \in U$, pois $f_I|_{U_1} = 0 = f_I|_{U_2}$ e $U = U_1 \cup U_2$, logo $\omega = 0$ e I^p é injetora.

Mostremos agora que $\ker J^p = \text{im } I^p$. Seja $\omega \in \Omega^p(U)$, então:

$$\begin{aligned} J^p \circ I^p(\omega) &= j_2^* i_2^*(\omega) - j_1^* i_1^*(\omega) \\ &= j_2^*(\omega|_{U_2}) - j_1^*(\omega|_{U_1}) \\ &= \omega|_{U_1 \cap U_2} - \omega|_{U_1 \cap U_2} = 0, \end{aligned}$$

ou seja, $\text{im } I^p \subset \ker J^p$. Tomemos agora duas p -formas $\omega_1 \in \Omega^p(U_1)$ e $\omega_2 \in \Omega^p(U_2)$,

$$\omega_1 = \sum_I f_I dx_I \quad \text{e} \quad \omega_2 = \sum_J g_J dx_J$$

tais que $(\omega_1, \omega_2) \in \ker J^p$. Assim $J^p(\omega_1, \omega_2) = 0 \Rightarrow j_2^*(\omega_2) - j_1^*(\omega_1) = 0 \Rightarrow j_1^*(\omega_1) = j_2^*(\omega_2) \Rightarrow \omega_1|_{U_1 \cap U_2} = \omega_2|_{U_1 \cap U_2}$. Com isso, fica bem definida $h_I : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$, onde:

$$h_I(x) = \begin{cases} f_I(x) & \text{se } x \in U_1 \\ g_I(x) & \text{se } x \in U_2 \end{cases}$$

Notemos que h_I é uma função suave, pois f_I e g_I o são e coincidem na intersecção de seus domínios. Assim, se $\omega = \sum_I h_I dx_I$, temos $I^p = (\omega_1, \omega_2)$ e com isso $\ker J^p \subset \text{im } I^p$.

Resta-nos provar a sobrejetividade de J^p . Para isso usaremos uma partição da unidade, ou seja, funções suaves

$$p_1 : U \longrightarrow [0, 1] \quad \text{e} \quad p_2 : U \longrightarrow [0, 1]$$

tais que $\text{supp}_{U_2}(p_1) \subset U_1$ e $\text{supp}_{U_1}(p_2) \subset U_2$ e $p_1(x) + p_2(x) = 1$, para todo $x \in U$.

Seja $f : U_1 \cap U_2 \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que f é suave. Nosso objetivo é usar a partição da unidade para estender f a U_1 e U_2 de forma suave. Definimos:

$$f_2(x) = \begin{cases} -f(x)p_1(x) & \text{se } x \in U_1 \cap U_2 \\ 0 & \text{se } x \in U_2 - \text{supp}_U(p_1) \end{cases}$$

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x)p_2(x) & \text{se } x \in U_1 \cap U_2 \\ 0 & \text{se } x \in U_1 - \text{supp}_U(p_2) \end{cases}$$

que são suaves e estão bem definidas pois $\text{supp}_U(p_1) \subset U_1 \cap U_2$ e $\text{supp}_U(p_2) \subset U_1 \cap U_2$. Como $p_1(x) + p_2(x) = 1$, temos $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$, se $x \in U_1 \cap U_2$.

Tomemos agora $\omega \in \Omega^p(U_1 \cap U_2)$. Podemos escrever $\omega = \sum_I f_I dx_I$ e aplicar a extensão apresentada acima para cada uma das funções $f_I : U_1 \cap U_2 \longrightarrow \mathbb{R}$ e obteremos $f_{I,2} : U_2 \longrightarrow \mathbb{R}$ e $f_{I,1} : U_1 \longrightarrow \mathbb{R}$, ambas suaves e de tal forma que $f_I = f_{I,1} - f_{I,2}$ em $U_1 \cap U_2$. Com isso obtemos duas p -formas $\omega_1 = \sum_I f_{I,1} dx_I \in \Omega^p(U_1)$ e $\omega_2 = \sum_I f_{I,2} dx_I \in \Omega^p(U_2)$, tais que:

$$\begin{aligned} J^p(\omega_1, \omega_2) &= j_1^*(\omega_1) - j_2^*(\omega_2) \\ &= \omega_1|_{U_1 \cap U_2} - \omega_2|_{U_1 \cap U_2} \\ &= \sum_I f_{I,1}|_{U_1 \cap U_2} dx_I - \sum_I f_{I,2}|_{U_1 \cap U_2} dx_I \\ &= \sum_I (f_{I,1}|_{U_1 \cap U_2} - f_{I,2}|_{U_1 \cap U_2}) dx_I \\ &= \sum_I f_I dx_I = \omega \end{aligned}$$

ou seja, J^p é sobrejetora. ■

Teorema 3.0.11. (Mayer-Vietoris) Tomemos dois abertos U_1 e U_2 em $\mathbb{R}^n$ e consideremos $U = U_1 \cup U_2$. Então existe uma sequência exata de cohomologia.

$$\cdots \longrightarrow H^p(U) \xrightarrow{I^*} H^p(U_1) \oplus H^p(U_2) \xrightarrow{J^*} H^p(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\partial^*} H^{p+1}(U) \longrightarrow \cdots$$

onde $I^*([\omega]) = (i_1^*[\omega], i_2^*[\omega])$ e $J^*([\omega_1], [\omega_2]) = j_1^*[\omega_1] - j_2^*[\omega_2]$, são as mesmas inclusões do

teorema anterior.

Demonstração: Consideremos a cadeia:

$$0 \longrightarrow \Omega^*(U) \xrightarrow{I} \Omega^*(U_1) \oplus \Omega^*(U_2) \xrightarrow{J} \Omega^*(U_1 \cap U_2) \longrightarrow 0$$

Pelo teorema 3.0.10 temos que esta cadeia é uma sequência exata curta de complexos de cadeia. O teorema 2.2.5 nos dá que a sequência pode ser expandida a uma sequência longa em cohomologia:

$$\cdots \longrightarrow H^p(\Omega^*(U)) \xrightarrow{I^*} H^p(\Omega^*(U_1) \oplus \Omega^*(U_2)) \xrightarrow{J^*} H^p(\Omega^*(U_1 \cap U_2)) \xrightarrow{\partial^*} H^{p+1}(\Omega^*(U)) \longrightarrow \cdots$$

e o lema 2.2.9 nos dá a última igualdade necessária $H^p(\Omega^*(U_1) \oplus \Omega^*(U_2)) = H^p(\Omega^*(U_1)) \oplus H^p(\Omega^*(U_2))$. ■

Corolário 3.0.12. *Sejam U_1 e U_2 abertos do $\mathbb{R}^n$ disjuntos, então:*

$$I^* : H^p(U_1 \cup U_2) \longrightarrow H^p(U_1) \oplus H^p(U_2)$$

é um isomorfismo.

Demonstração: Como $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, temos $H^p(U_1 \cap U_2) = 0 = H^{p-1}(U_1 \cap U_2)$. Logo, pelo teorema 3.0.11 temos:

$$0 \longrightarrow H^p(U) \xrightarrow{I^*} H^p(U_1) \oplus H^p(U_2) \longrightarrow 0$$

assim, I^* é bijetora, logo um isomorfismo. ■

Exemplo 3.0.13. *Usaremos o teorema 3.0.11 para calcular a cohomologia de de Rham do plano perfurado $\mathbb{R}^2 - \{0\}$. Tomemos*

$$U_1 = \mathbb{R}^2 - \{(x, y) | x \geq 0; y = 0\}$$

$$U_2 = \mathbb{R}^2 - \{(x, y) | x \leq 0; y = 0\}.$$

Tanto U_1 quanto U_2 são abertos estrelados do $\mathbb{R}^2$, logo $H^p(U_1) = H^p(U_2) = 0$, para $p > 0$ e $H^0(U_1) = H^0(U_2) = \mathbb{R}$. A interseção $U_1 \cap U_2 = \mathbb{R}^2 - \mathbb{R} = \mathbb{R}_+^2 \cup \mathbb{R}_-^2$, é a união

disjunta de dois abertos, os semi-planos $y > 0$ e $y < 0$. Logo, pelo corolário anterior e pelo lema de Poincaré:

$$H^p(U_1 \cup U_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } p > 0 \\ \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} & \text{se } p = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Pela sequência de Mayer-Vietoris, temos:

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H^p(U_1) \oplus H^p(U_2) &\xrightarrow{J^*} H^p(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\partial^*} \\ H^{p+1}(\mathbb{R}^2 - \{0\}) &\xrightarrow{I^*} H^{p+1}(U_1) \oplus H^{p+1}(U_2) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

Onde, para $p > 0$, temos:

$$0 \longrightarrow H^p(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\partial^*} H^{p+1}(\mathbb{R}^2 - \{0\}) \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata. Assim, ∂^* é um isomorfismo e $H^p(\mathbb{R}^2 - \{0\}) = 0$ para $p > 0$.

Quando $p = 0$ temos a sequência exata:

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H^{-1}(U_1 \cap U_2) \longrightarrow H^0(\mathbb{R}^2 - \{0\}) &\xrightarrow{I^0} H^0(U_1) \oplus H^0(U_2) \xrightarrow{J^0} \\ H^0(U_1 \cap U_2) &\xrightarrow{\partial^*} H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\}) \xrightarrow{I^1} H^1(U_1) \oplus H^1(U_2) \longrightarrow \cdots \end{aligned} \quad (**)$$

Como $H^{-1}(U) = 0$ para qualquer aberto, em particular $H^{-1}(U_1 \cap U_2) = 0$ e assim, I^0 é injetiva. Como $H^1(U_1) = H^1(U_2) = 0$, ∂^* é sobrejetiva. A sequência ** é:

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(\mathbb{R}^2 - \{0\}) &\xrightarrow{I^0} \overbrace{H^0(U_1) \oplus H^0(U_2)}^{=\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}} \xrightarrow{J^0} \\ \underbrace{H^0(U_1 \cap U_2)}_{=\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}} &\xrightarrow{\partial^*} H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\}) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

Contudo, $U = \mathbb{R}^2 - 0$ é conexo. Então $H^0(\mathbb{R}^2 - 0) \cong \mathbb{R}$ e, pelo fato de I^0 ser injetiva, devemos ter $\text{im } I^0 \cong \mathbb{R}$ e, como a sequência é exata $\text{im } I^0 = \ker J^0$, logo, J^0 tem posto 1.

Portanto:

$$\partial^* : H^0(U_1 \cap U_2) / \text{im } J^0 \xrightarrow{\cong} H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$$

Como $H^0(U_1 \cap U_2) = \text{im } J^0 \cong \mathbb{R}$, mostramos que:

$$H^p(\mathbb{R}^2 - \{0\}) = \begin{cases} 0 & \text{se } p \geq 2 \\ \mathbb{R} & \text{se } p = 1 \text{ ou } p = 0. \end{cases}$$

Observação 3.0.14. A cohomologia de de Rham $H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$ tem um gerador conhecido. É a forma elemento de ângulo:

$$\omega = \frac{-y \, dx + x \, dy}{x^2 + y^2}.$$

Um estudo sobre este gerador pode ser encontrado no item [2] da bibliografia, página 191, teorema 2.

Teorema 3.0.15. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$. Caso existam abertos convexos $U_1, \dots, U_r$ tais que $U = U_1 \cup \dots \cup U_r$, então $H^p(U)$ é finitamente gerado.

Demonstração: Provaremos este fato por de indução sobre r .

O caso $r = 1$ está coberto pelo lema de Poincaré. Assumiremos verdadeiro para $r - 1$ e sejam $V = U_1 \cup \dots \cup U_{r-1}$ e $U = V \cup U_r$. O teorema anterior nos dá a sequência exata:

$$H^{p-1}(V \cap U_r) \xrightarrow{\partial^*} H^p(U) \xrightarrow{I^*} H^p(V) \oplus H^p(U_r)$$

o que nos leva a:

$$0 \longrightarrow \text{im } \partial^* \xrightarrow{\partial^*} H^p(U) \xrightarrow{I^*} \text{im } I^* \longrightarrow 0$$

que também é exata. O lema 2.1.1 diz que $H^p(U) = \text{im } \partial^* \oplus \text{im } I^*$. Como $V \cap U_r = (U_1 \cap U_r) \cup \dots \cup (U_{r-1} \cap U_r)$, temos que tanto V quanto $V \cap U_r$ são a união de $r - 1$ abertos convexos. Então, pela hipótese de indução, temos que $H^{p-1}(V \cap U_r)$, $H^p(V)$ e $H^p(U_r)$ são finitamente gerados e, portanto, $H^p(U)$ também. ■

Homotopia

Neste capítulo mostraremos que a cohomologia de de Rham é funtorial na categoria das aplicações diferenciáveis entre espaços euclidianos e calcularemos $H^*(\mathbb{R}^n - \{0\})$.

4.1 O funtor de cohomologia

Definição 4.1.1. *Duas aplicações contínuas $f_0 : X \longrightarrow Y$ e $f_1 : X \longrightarrow Y$ entre espaços topológicos são chamados de homotópicas se existir uma aplicação contínua:*

$$F : X \times [0, 1] \longrightarrow Y$$

tal que $F(x, 0) = f_0(x)$ e $F(x, 1) = f_1(x)$, para todo $x \in X$.

Denotaremos a homotopia entre duas aplicações por $f_0 \simeq f_1$, e F é chamada de homotopia de f_0 a f_1 . Podemos pensar em F como a família das aplicações contínuas $f_t : X \longrightarrow Y$ com $0 \leq t \leq 1$ dada por $f_t(x) = F(x, t)$, que deformam f_0 em f_1 .

Lema 4.1.2. *Homotopia é uma relação de equivalência.*

Demonstração: Ora, se F é uma homotopia de f_0 a f_1 , podemos definir a homotopia de f_1 a f_0 por $G(x, t) = F(x, 1 - t)$, para $0 \leq t \leq 1$, ou seja, se $f_0 \simeq f_1$ então, $f_1 \simeq f_0$.

Se $f_0 \simeq f_1$ por F e $f_1 \simeq f_2$ por G definimos:

$$H(x, t) = \begin{cases} F(x, 2t) & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \quad \forall x \in X \\ F(x, 2t - 1) & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \quad \forall x \in X \end{cases}$$

então $f_0 \simeq f_2$ por H .

Finalmente temos $f_0 \simeq f_0$ via $F(x, t) = f_0(x)$, $0 \leq t \leq 1$ e qualquer $x \in X$. ■

Lema 4.1.3. *Sejam X , Y e Z espaços topológicos e*

$$\begin{array}{ll} f_0 : X \longrightarrow Y & g_0 : Y \longrightarrow Z \\ f_1 : X \longrightarrow Y & g_1 : Y \longrightarrow Z \end{array}$$

aplicações contínuas. Se $f_0 \simeq f_1$ e $g_0 \simeq g_1$, então $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$.

Demonstração: Consideremos:

$$F(x, t), 0 \leq t \leq 1, \forall x \in X \quad \text{e} \quad G(y, t), 0 \leq t \leq 1, \forall y \in Y$$

onde F é a homotopia de f_0 para f_1 e G a de g_0 para g_1 e definimos:

$$H(x, t) = G(F(x, t), t), 0 \leq t \leq 1, \forall x \in X.$$

Notemos que H é contínua por ser a composição de funções contínuas. Além disso:

$$H(x, 0) = G(F(x, 0), 0) = G(f_0(x), 0) = g_0 \circ f_0(x)$$

e

$$H(x, 1) = G(F(x, 1), 1) = G(f_1(x), 1) = g_1 \circ f_1(x).$$

Logo, $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$ por H . ■

Definição 4.1.4. *Uma aplicação contínua $f : X \longrightarrow Y$ é chamada equivalência de homotopia se existir uma aplicação contínua $g : Y \longrightarrow X$ tal que $f \circ g \simeq id_X$ e $g \circ f \simeq id_Y$. Neste caso, g é chamada de homotopia inversa de f .*

Definição 4.1.5. *Dois espaço topológicos X e Y são ditos homotopicamente equivalentes (ou simplesmente homotópicos) quando existir uma equivalência de homotopia entre eles.*

Definição 4.1.6. *Um espaço topológico X é dito contrátil se for homotópico a um ponto, o que é o mesmo que dizer que id_X é homotópica a uma função constante.*

Definição 4.1.7. *As classes de equivalência definidas pela relação de equivalência de homotopia são chamadas de tipos homotópicos.*

Exemplo 4.1.8. *Seja $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ com a topologia induzida por $\mathbb{R}^m$. Se para duas aplicações contínuas $f_0 : X \rightarrow Y$ e $f_1 : X \rightarrow Y$, o segmento de reta que liga $f_0(x)$ a $f_1(x)$ estiver contido em Y para todo $x \in X$, podemos definir uma homotopia de f_0 para f_1 , da seguinte forma:*

$$\begin{aligned} F : X \times [0, 1] &\longrightarrow Y \\ (x, t) &\longmapsto (1 - t)f_0(x) + tf_1(x). \end{aligned}$$

Em particular este resultado também mostra que todo conjunto estrelado em $\mathbb{R}^n$ é contrátil.

Lema 4.1.9. *Se U, V , são abertos em espaços euclidianos, então:*

- (i) *Toda aplicação contínua $h : U \rightarrow V$ é homotópica a uma aplicação diferenciável;*
- (ii) *Para duas aplicações diferenciáveis $f_0 : U \rightarrow V$ e $f_1 : U \rightarrow V$ homotópicas, existe uma aplicação diferenciável $F : U \times \mathbb{R} \rightarrow V$ com $F(x, 0) = f_0(x)$ e $F(x, 1) = f_1(x)$, para todo $x \in U$ (F é chamada de homotopia suave de f_0 para f_1).*

Demonstração: Pelo lema A no anexo deste trabalho, podemos aproximar h por uma função f que seja suave, de forma que todo segmento que ligue $h(x)$ a $f(x)$ esteja contido em V . Assim, pela mesma F do exemplo anterior, $h \simeq f$.

Para (ii), consideremos G a homotopia de f_0 para f_1 e $\psi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ uma função suave tal que

$$\begin{cases} \psi(t) = 0 & \text{se } t \leq \frac{1}{3} \\ \psi(t) = 1 & \text{se } t \geq \frac{2}{3} \end{cases}.$$

Construímos:

$$\begin{aligned} H : U \times \mathbb{R} &\longrightarrow V \\ (x, t) &\longmapsto H(x, t) = G(x, \psi(t)) \end{aligned}$$

como $H(x, t) = f_0(x)$ para $t \leq \frac{1}{3}$ e $H(x, t) = f_1(x)$ para $t \geq \frac{2}{3}$, H é suave em $U \times (-\infty, \frac{1}{3}) \cup U \times (\frac{2}{3}, \infty)$. Assim, o lema A do anexo permite que aproximemos H por uma aplicação suave $F : U \times \mathbb{R} \rightarrow V$ tal que, F e V tenham a mesma restrição em $U \times [0, 1]$. Assim, para todo $x \in U$, temos $F(x, 0) = H(x, 0) = f_0(x)$ e $F(x, 1) = H(x, 1) = f_1(x)$. ■

Teorema 4.1.10. *Se $f, g : U \longrightarrow V$ são aplicações suaves e $f \simeq g$, então as aplicações induzidas*

$$f^*, g^* : \Omega^*(V) \longrightarrow \Omega^*(U)$$

são homotopias de cadeia, como na definição 2.2.6.

Demonstração: Nesta demonstração seguiremos um roteiro parecido com a prova do lema de Poincaré (1.3.2). Toda p -forma pode ser escrita como:

$$\omega = \sum_I f_I(x, t) dx_I + \sum_J g_J(x, t) dt \wedge dx_J$$

Se $\phi_0 : U \longrightarrow U \times \mathbb{R}$ é a inclusão $\phi_0(x) = (x, 0)$, então:

$$\phi_0^*(\omega) = \sum_I f_I(x, 0) d\phi_I = \sum_I f_I(x, 0) dx_I,$$

isso porque $\phi_0^*(dt \wedge dx_J) = 0$, pois ϕ é constante, como no exemplo 1.2.4. Analogamente, para $\phi_1 = (x, 1)$ temos:

$$\phi_1^*(\omega) = \sum_I f_I(x, 1) d\phi_I = \sum_I f_I(x, 1) dx_I.$$

Usaremos a mesma aplicação usada no lema de Poincaré.

$$\widehat{S}_p : \Omega^p(U \times \mathbb{R}) \longrightarrow \Omega^{p-1}(U)$$

que satisfaz:

$$(d\widehat{S}_p + \widehat{S}_{p+1}d)(\omega) = \phi_1^*(\omega) - \phi_0^*(\omega) = \sum_I f_I(x, 1) dx_I - \sum_I f_I(x, 0) dx_I. \quad (*)$$

Consideremos a composição $U \xrightarrow{\phi_0} U \times \mathbb{R} \xrightarrow{F} V$, onde F é a homotopia entre f e g . Então $F \circ \phi_0 = f$ e $F \circ \phi_1 = g$. Definimos:

$$\begin{aligned} S_p & : \Omega^p(V) \longrightarrow \Omega^{p-1}(U) \\ \omega & \longmapsto S_p(\omega) = \widehat{S}_p \circ F^*(\omega). \end{aligned}$$

Com isso temos $dS_p + S_{p+1}d = g^* - f^*$. De fato, usando a equação (*) aplicada a F^* ,

obtemos:

$$\begin{aligned} d\widehat{S}_p F^*(\omega) + \widehat{S}_{p+1} dF^*(\omega) &= \phi_1^* F^*(\omega) - \phi_0^* F^*(\omega) = (F \circ \phi_1)^*(\omega) - (F \circ \phi_0)^*(\omega) \\ &= g^*(\omega) - f^*(\omega), \end{aligned}$$

além disso, $\widehat{S}_{p+1} dF^*(\omega) = \widehat{S}_{p+1} F^* d(\omega) = S_{p+1} d(\omega)$, pois F é uma aplicação de cadeia. Logo S_p satisfaz as condições desejadas e f^* e g^* são homotopias de cadeia. ■

Sendo assim, o lema 2.2.7 nos diz que $f^* = g^* : H^p(V) \longrightarrow H^p(U)$. Para uma aplicação contínua $\phi : U \longrightarrow V$, podemos encontrar uma aplicação suave $f : U \longrightarrow V$ com $\phi \simeq f$, pelo lema 4.1.9 item (i). Os lemas 2.2.7 e o 4.1.2, junto com o teorema anterior nos mostram que $f^* : H^p(V) \longrightarrow H^p(U)$ independe da escolha da f . Então, podemos definir:

$$\phi^* = H^p(\phi) : H^p(V) \longrightarrow H^p(U)$$

pondo $\phi^* = f^*$, onde $f : U \longrightarrow V$ é uma aplicação suave homotópica a ϕ .

Teorema 4.1.11. *Para U, V e W espaços euclidianos e $p \in \mathbb{Z}$, temos:*

(i) *Se $\phi_0, \phi_1 : U \longrightarrow V$ são aplicações contínuas e homotópicas, então*

$$\phi_0^* = \phi_1^* : H^p(V) \longrightarrow H^p(U);$$

(ii) *Se $\phi : U \longrightarrow V$ e $\psi : V \longrightarrow W$ são contínuas, então*

$$(\psi \circ \phi)^* = \phi^* \circ \psi^* : H^p(W) \longrightarrow H^p(U);$$

(iii) *Se a aplicação contínua $\phi : U \longrightarrow V$ é uma equivalência de homotopia, então*

$$\phi^* : H^p(U) \longrightarrow H^p(V)$$

é um isomorfismo.

Demonstração: Podemos tomar $f : U \longrightarrow V$ suave de tal forma que $f \simeq \phi_0$ e $f \simeq \phi_1$. Logo, pelo lema 4.1.2, ϕ_0 e ϕ_1 fazem parte da mesma classe de equivalência, logo $\phi_0^* = \phi_1^*$.

Caso ϕ e ψ sejam suaves, sabemos que $\Omega^p(\psi \circ \phi) = \Omega^p(\phi) \circ \Omega^p(\psi)$. No caso geral, pelo lema 4.1.9 podemos tomar $f : U \longrightarrow V$ e $g : V \longrightarrow W$ suaves e tais que $f \simeq \phi$ e $g \simeq \psi$.

Assim, pelo lema 4.1.3, temos $\psi \circ \phi \simeq f \circ g$, e usando o lema 2.2.7, $(\psi \circ \phi)^* = (g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \phi^* \circ \psi^*$ e segue (ii).

Para (iii) basta considerar ψ a homotopia inversa de ϕ . Assim $\psi \circ \phi \simeq \text{id}_U$ e $\phi \circ \psi \simeq \text{id}_V$. Então $\psi^* : H^p(U) \longrightarrow H^p(V)$ é a inversa de $\phi^* : H^p(V) \longrightarrow H^p(U)$. ■

Este resultado nos mostra que $H^p(U)$ só depende do tipo de homotopia de U . Em particular, temos:

Corolário 4.1.12. *(Invariância topológica): Um homeomorfismo $h : U \longrightarrow V$ entre abertos euclidianos induz um isomorfismo*

$$h^* : H^p(V) \longrightarrow H^p(U)$$

para todo p .

Demonstração: Considerando no item (iii) do teorema anterior $h^{-1} : V \longrightarrow U$ a homotopia inversa de h , segue o resultado. ■

Corolário 4.1.13. *Se $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é um aberto contrátil, então $H^p(U) = 0$ quando $p > 0$ e $H^0(U) = \mathbb{R}$.*

Demonstração: Lembremos que um conjunto é contrátil se, e somente se, a identidade é homotópica a uma aplicação constante. Então, tomemos $F : U \times [0, 1] \longrightarrow V$ a homotopia entre $f_0 = \text{id}$ e f_1 uma aplicação constante com valor x_0 .

Para qualquer $x \in U$, $F(x, t)$ define uma curva contida em V , que conecta x a x_0 , logo U é conexo, e pelo lema 1.2.2 $H^0(U) = \mathbb{R}$.

Se $p > 0$, então $\Omega^p(f_1) : \Omega^p(U) \longrightarrow \Omega^p(U)$ é a aplicação nula e, pelo teorema 4.1.11 item (i), temos $\text{id}_{H^p(U)} = f_0^* = f_1^* = 0$, logo, $H^p(U) = 0$. ■

Proposição 4.1.14. *Para um subconjunto $A \subsetneq \mathbb{R}^n$ fechado, temos os isomorfismos:*

$$\begin{aligned} H^{p+1}(\mathbb{R}^{n+1} - A) &\cong H^p(\mathbb{R}^n - A), p \geq 1 \\ H^1(\mathbb{R}^{n+1} - A) &\cong H^0(\mathbb{R}^n - A)/\mathbb{R} \cdot 1 \\ H^0(\mathbb{R}^{n+1} - A) &\cong \mathbb{R} \end{aligned}$$

onde identificaremos $\mathbb{R}^n$ como o subespaço $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ de $\mathbb{R}^{n+1}$ e $\mathbb{R} \cdot 1$ denota o subespaço de dimensão 1 das funções constantes.

Demonstração: Definimos os abertos de $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} U_1 &= \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \cup (\mathbb{R}^n - A) \times (-1, \infty) \\ U_2 &= \mathbb{R}^n \times (-\infty, 0) \cup (\mathbb{R}^n - A) \times (-\infty, 1) \end{aligned}$$

Então $U_1 \cup U_2 = \mathbb{R}^{n+1} - A$ e $U_1 \cap U_2 = \mathbb{R}^n - A \times (-1, 1)$. Tomemos $\phi : U_1 \rightarrow U_2$ dada por adicionar 1 a $(n+1)$ -ésima coordenada. Para $x \in U_1$, temos que o segmento de reta entre x e $\phi(x)$ e de $\phi(x)$ para algum ponto fixado em $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ esta contido em U_1 . Como no exemplo 4.1.8, podemos tomar homotopias de id para ϕ e de ϕ para uma aplicação constante. Logo, U_1 é contrátil. Analogamente, U_2 também é contrátil. Logo $H^p(U_1)$ e $H^p(U_2)$ são descritos no corolário 4.1.13.

Seja pr a projeção de $U_1 \cap U_2$ em $\mathbb{R}^n - A$. Definimos $i : \mathbb{R}^n - A \rightarrow U_1 \cap U_2$ por $i(y) = (y, 0)$. Assim $i \circ \text{pr} \simeq \text{id}_{U_1 \cap U_2}$. Pelo teorema 4.1.11 item (iii), concluímos que:

$$\text{pr}^* : H^p(\mathbb{R}^n - A) \rightarrow H^p(U_1 \cap U_2)$$

é um isomorfismo para todo p . E o teorema 3.0.11 nos dá o isomorfismo

$$\partial^* : H^p(U_1 \cap U_2) \rightarrow H^{p+1}(\mathbb{R}^{n+1} - A)$$

para $p \geq 1$. Então a composição de pr^* com δ^* nos dá a primeira parte da prova da proposição.

Consideremos a sequência exata:

$$0 \rightarrow H^0(\mathbb{R}^{n+1} - A) \xrightarrow{I^*} H^0(U_1) \oplus H^0(U_2) \xrightarrow{J^*} H^0(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\partial^*} H^1(\mathbb{R}^{n+1} - A) \rightarrow 0$$

Um elemento de $H^0(U_1)$ ou $H^0(U_2)$ é uma função constante. Logo, um elemento de $H^0(U_1) \oplus H^0(U_2)$ é um par de funções constantes com valores a_1 e a_2 . Sua imagem por J^* , pelo teorema 3.0.11, é constante em $U_1 \cap U_2$ com valor $a_1 - a_2$, e assim $\ker \partial^* = \text{im } J^* = \mathbb{R} \cdot 1$, e obtemos o isomorfismo:

$$H^1(\mathbb{R}^{n+1} - A) \cong \frac{H^0(U_1 \cap U_2)}{\mathbb{R} \cdot 1} \cong \frac{H^0(\mathbb{R}^{n+1} - A)}{\mathbb{R} \cdot 1}$$

como $\dim(\text{im } I^*) = \dim(\ker \partial^*) = 1$, $H^0(\mathbb{R}^{n+1} - A) \cong \mathbb{R}$. ■

Corolário 4.1.15. *Nas mesmas condições da proposição anterior, temos o difeomorfismo*

$R : \mathbb{R}^{n+1} - A \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} - A$, definido por:

$$(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \longmapsto R(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n, -x_{n+1}).$$

A aplicação induzida

$$R^* : H^{p+1}(\mathbb{R}^{n+1} - A) \longrightarrow H^{p+1}(\mathbb{R}^{n+1} - A)$$

é a multiplicação por -1 .

Demonstração: Na notação do teorema anterior, teremos:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} - A & \xrightarrow{R} & \mathbb{R}^{n+1} - A \\ \uparrow i_1 & & \uparrow i_2 \\ U_1 & \xrightarrow{R_1} & U_2 \\ \uparrow j_1 & & \uparrow j_2 \\ U_1 \cap U_2 & \xrightarrow{R_0} & U_1 \cap U_2 \end{array}$$

e

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} - A & \xrightarrow{R} & \mathbb{R}^{n+1} - A \\ \uparrow i_2 & & \uparrow i_1 \\ U_2 & \xrightarrow{R_2} & U_1 \\ \uparrow j_2 & & \uparrow j_1 \\ U_1 \cap U_2 & \xrightarrow{R_0} & U_1 \cap U_2 \end{array}$$

onde R_0 , R_1 e R_2 são as restrições de R . Vimos que $\partial^* : H^p(U_1 \cap U_2) \longrightarrow H^p(\mathbb{R}^{n+1} - A)$ é sobrejetora. Então, é suficiente provar que $R^* \circ \partial^*([\omega]) = -\partial^*([\omega])$, para uma p -forma fechada ω em $U_1 \cap U_2$.

Usando o teorema 3.0.10, podemos tomar $\omega_1 \in \Omega^p(U_1)$ e $\omega_2 \in \Omega^p(U_2)$ com $\omega = j_1^*(\omega_1) - j_2^*(\omega_2)$. A definição 2.2.2 de ∂^* mostra que $\partial^*([\omega]) = [\tau]$, onde $\tau \in \Omega^{p+1}(\mathbb{R}^{n+1} - A)$ é determinado por $i_1^*([\tau]) = d\omega_1$ e $i_2^*([\tau]) = d\omega_2$. Além disso:

$$\begin{aligned} -R_0^*\omega &= R_0^* \circ j_2^*(\omega_2) - R_0^* \circ j_1^*(\omega_1) = j_1^*(R_1^* \circ \omega_2) - j_2^*(R_2^* \circ \omega_1) \\ i_1^*(R^*\tau) &= R_1^*(i_2^*\tau) = R_1^*(d\omega_2) = d(R_1^*\omega_2) \\ i_2^*(R^*\tau) &= R_2^*(i_1^*\tau) = R_2^*(d\omega_1) = d(R_2^*\omega_1) \end{aligned}$$

Essas equações e a definição de ∂^* nos dão que

$$\begin{aligned}\partial^*(-[R_0^*\omega]) &= [(I^*)^{-1}(d(J^*(-R^*\circ\omega)))] \\ &= [(I^*)^{-1}(d(j_1^*(R_1^*\omega_2) - j_2^*(R_2^*\omega_1)))] \\ &= [(I^*)^{-1}(d(R_1^*\omega_2) - d(R_2^*\omega_1))] = [R^*\tau].\end{aligned}\tag{*}$$

Para a projeção $\text{pr} : U_1 \cap U_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n - A$, temos que $\text{pr} \circ R_0 = \text{pr}$, e portanto:

$$H^p(\mathbb{R}^n - A) \xrightarrow{\text{pr}^*} H^p(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{R_0^*} H^p(U_1 \cap U_2)$$

é a própria pr^* . Como pr^* é isomorfismo, R_0^* tem que ser a identidade em $U_1 \cap U_2$. Assim, o lado esquerdo da equação (*) é $\partial^*[\omega]$, o que finaliza a demonstração. ■

Teorema 4.1.16. *Para $n \geq 2$, temos os isomorfismos:*

$$H^p(\mathbb{R}^n - \{0\}) = \begin{cases} \mathbb{R} & , \quad \text{se} \quad p = 0, n-1 \\ 0 & , \quad \text{caso contrário} \end{cases}$$

Demonstração: Por indução sobre n . O caso $n = 2$ já foi feito no exemplo 3.0.13. Suponhamos que $H^p(\mathbb{R}^{k-1} - \{0\})$ satisfaz as condições impostas, ora, como $\{0\}$ é um conjunto fechado, pelo lema $H^p(\mathbb{R}^{k-1} - \{0\}) \simeq H^{p+1}(\mathbb{R}^k - \{0\})$, o que encerra a demonstração. ■

Observação 4.1.17. *Um gerador conhecido para $H^p(\mathbb{R}^n - \{0\})$ é a forma elemento de ângulo sólido:*

$$\omega(x) = \frac{1}{|x|^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Apresentado no item [2] da bibliografia, página 425, exemplo 17.

Uma matriz A invertível $n \times n$, define um isomorfismo linear $\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, e um difeomorfismo $f_A : \mathbb{R}^n - \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^n - \{0\}$.

Lema 4.1.18. *Para cada $n \geq 2$, a aplicação induzida*

$$f_A^* : H^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\}) \longrightarrow H^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\})$$

é a multiplicação por $\frac{\det A}{|\det A|} \in \{-1, 1\}$

Demonstração: Seja B a matriz obtida a partir da matriz A , trocando a linha r pela soma das linhas r e c vezes a linha s , onde $r \neq s$ e $c \in \mathbb{R}$. Assim

$$B = (I + cE_{r,s})A$$

onde I é a matriz identidade e $E_{r,s}$ a matriz com as entradas iguais a 1 nas linha r e coluna s e 0 nas demais entradas. Assim, a homotopia que leva f_A a f_B é definida pela matriz:

$$(I + tcE_{r,s})A \quad 0 \leq t \leq 1$$

Do teorema 4.1.11 segue que $f_A^* = f_B^*$. Além disso $\det A = \det B$. Por operações elementares com a matriz A , ela pode ser transformada em $\text{diag}(1, \dots, 1, d)$, onde $d = \det A$. Assim, é suficiente provar para matrizes diagonais. As matrizes:

$$\text{diag}\left(1, \dots, 1, \frac{|d|^t d}{|d|}\right) \quad 0 \leq t \leq 1$$

produz uma homotopia, o que reduz nosso problema nos casos $A = (1, \dots, 1, \pm 1)$, então A será a identidade ou a aplicação R do corolário 4.1.15, o que encerra a demonstração. ■

Proposição 4.1.19. *Se $n \neq m$ então $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ não são homeomorfos.*

Demonstração: Podemos assumir que um possível homeomorfismo de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$ levaria 0 em 0, caso contrário bastaria uma translação para que isso acontecesse. Este homeomorfismo induziria um homeomorfismo entre $\mathbb{R}^n - \{0\}$ e $\mathbb{R}^m - \{0\}$. Então:

$$H^p(\mathbb{R}^n - \{0\}) \cong H^p(\mathbb{R}^m - \{0\})$$

para todo p , o que gera o absurdo. ■

Aplicações da Cohomologia de de Rham

Neste capítulo apresentaremos aplicações da cohomologia de de Rham.

5.1 Primeiros resultados

Neste capítulo usaremos as notações $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } ||x|| \leq 1\}$, a bola de raio um e $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } ||x|| = 1\}$ a esfera de raio 1.

Lema 5.1.1. *Não existe aplicação contínua $g : D^n \longrightarrow S^{n-1}$ tal que $g|_{S^{n-1}} = id_{S^{n-1}}$.*

Demonstração: Vamos assumir que tal aplicação exista para $n \geq 2$. Consideremos a aplicação:

$$\begin{aligned} r : \mathbb{R}^n - \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R}^n - \{0\} \\ x &\longmapsto \frac{x}{||x||}. \end{aligned}$$

Temos $id_{\mathbb{R}^n - \{0\}} \simeq r$, pois $\mathbb{R}^n - \{0\}$ sempre conterá segmento de reta entre x e $r(x)$, como no exemplo 4.1.8. Consideremos $H(x, t) = g(t \cdot r(x))$, $0 \leq t \leq 1$, que é uma homotopia entre r e uma aplicação constante. Logo $\mathbb{R}^n - \{0\}$ seria contrátil. Pelo corolário 4.1.13 $H^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\}) = 0$, o que contradiz o teorema 4.1.16. Se $n = 1$, D^1 é conexo e $S^0 = \{\pm 1\}$ não é conexo. ■

Teorema 5.1.2. *(Teorema do ponto fixo de Brouwer, 1912) Toda aplicação contínua $f : D^n \longrightarrow D^n$ tem um ponto fixo.*

Demonstração: Suponhamos que $f(x) \neq x$ para todo $x \in D^n$. Assim, podemos definir o ponto $g(x) \in S^{n-1}$ como o ponto de interseção de S^{n-1} com a semi-reta que liga $f(x)$ e x .

Temos que $g(x) = x + tu$, onde $u = \frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}$, e

$$t = -x \cdot u + \sqrt{1 - \|x\|^2 + (x \cdot u)}.$$

Onde $x \cdot u$ é o produto interno usual. A expressão de $g(x)$ foi obtida da solução da equação $(x + tu) \cdot (x + tu) = 1$. Temos duas soluções para esta equação, pois a semi-reta que liga $f(x)$ e x intercepta S^{n-1} em dois pontos. Estamos interessados na solução com $t \geq 0$. Logo, g é contínua com $g|_{S^{n-1}} = \text{id}_{S^{n-1}}$, o que é absurdo, pelo lema anterior. ■

O espaço tangente de S^n em um ponto $x \in S^n$ é $T_x S^n = \{x\}^\perp$. Um campo vetorial tangente em S^n é uma aplicação contínua $\nu : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $\nu(x) \in T_x S^n$ para todo $x \in S^n$.

Teorema 5.1.3. *A esfera S^n tem um campo vetorial tangente ν com $\nu(x) \neq 0$ para todo $x \in S^n$ se, e somente se, n é ímpar.*

Demonstração: O campo vetorial ν pode ser estendido a um campo vetorial em $\mathbb{R}^n - \{0\}$ por:

$$\omega(x) = \nu\left(\frac{x}{\|x\|}\right).$$

Temos que $\omega(x) \neq 0$ e $\omega(x) \cdot x = 0$. Tomemos a homotopia entre $f_0 = \text{id}_{\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}}$ e a aplicação antipodal $f_1(x) = -x$, dada por:

$$F(x, t) = (\cos \pi t)x + (\sin \pi t)\omega(x).$$

O item (i) do teorema 4.1.11 nos dá que f_1^* é a identidade em $H^n(\mathbb{R}^{n+1} - \{0\})$, que, pelo teorema 4.1.16 é 1-dimensional. Por outro lado o lema 4.1.18 nos diz que f_1^* é a multiplicação por $(-1)^{n+1}$, logo, n tem que ser ímpar.

Reciprocamente, para $n = 2m - 1$, podemos definir um campo vetorial ν por:

$$\nu(x_1, x_2, \dots, x_{2m}) = (x_2, -x_1, x_4, -x_3, \dots, x_{2m}, -x_{2m-1}).$$

■

Lema 5.1.4. (*Urysohn-Tietze*) Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é fechado e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação contínua, então existe uma aplicação contínua $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $g|_A = f$.

Demonstração: Denotaremos a distância euclidiana em $\mathbb{R}^n$ por $d(x, y)$ e definimos a distância entre um ponto e um conjunto A por $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$.

Para $p \in \mathbb{R}^n - A$, temos a vizinhança aberta $U_p \subseteq \mathbb{R}^n - A$ de p dada por:

$$U_p = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, p) < \frac{1}{2}d(p, A) \right\}$$

Essas vizinhanças dos $p \in \mathbb{R}^n - A$ fornecem uma cobertura aberta de $\mathbb{R}^n - A$. Usando o lema B do apêndice deste trabalho, podemos obter uma partição da unidade ϕ_p subordinada a cobertura aberta encontrada. Definimos a aplicação g da seguinte forma:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in A \\ \sum_{p \in \mathbb{R}^n - A} \phi_p(x)(a(p)) & \text{se } x \in \mathbb{R}^n - A \end{cases}$$

onde $a(p) \in A$ é escolhido de tal forma que $d(p, a(p)) < 2d(p, A)$. Como a soma é localmente finita em $\mathbb{R}^n - A$, g é suave em $\mathbb{R}^n - A$. Resta mostrar a continuidade de g para pontos x_0 na fronteira de A . Assim, se $x \in U_p$, então:

$$d(x_0, p) \leq d(x_0, x) + d(x, p) < d(x_0, x) + \frac{1}{2}d(p, A) \leq d(x_0, x) + \frac{1}{2}d(p, x_0).$$

Então, $d(x_0, p) < 2d(x_0, x)$ para $x \in U_p$. Como $d(p, a(p)) < 2d(p, A) \leq 2d(x_0, p)$, conseguimos, para $x \in U_p$ que $d(x_0, a(p)) \leq d(x_0, p) + d(p, a(p)) < 3d(x_0, p) < 6d(x_0, x)$.

E, para todo $x \in \mathbb{R}^n - A$, temos:

$$g(x) - g(x_0) = \sum_{p \in \mathbb{R}^n - A} \phi(x)_p (f(a(p)) - f(x_0)).$$

E assim:

$$\|g(x) - g(x_0)\| \leq \sum_p \phi(x)_p \|f(a(p)) - f(x_0)\|. \quad (*)$$

Agora, para um arbitrário $\epsilon > 0$, escolhemos $\delta > 0$ tal que $\|f(y) - f(x_0)\| < \epsilon$ para todo $y \in A$ com $d(x_0, y) < 6\delta$. Se $x \in \mathbb{R}^n - A$ e $d(x, x_0) < \delta$, então para qualquer $x \in U_p$, temos $d(x_0, a(p)) < 6\delta$ e $\|f(a(p)) - f(x_0)\| < \epsilon$. Segue de (*) que:

$$\|g(x) - g(x_0)\| \leq \sum_p \phi(x)_p \|f(a(p)) - f(x_0)\| < \sum_p \phi(x)_p \cdot \epsilon = \epsilon$$

e g é contínua também na fronteira de A .

Observação 5.1.5. *A prova apresentada acima também é válida, com pequenas modificações, quando $\mathbb{R}^n$ é substituído por um espaço métrico e $\mathbb{R}^m$ por um espaço vetorial topológico localmente convexo.*

Lema 5.1.6. *Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $B \subseteq \mathbb{R}^m$ dois conjuntos fechados e $\phi : A \rightarrow B$ é um homeomorfismo. Então existe um homeomorfismo $h : \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^{m+n}$ tal que:*

$$h(x, 0_m) = (0_n, \phi(x)),$$

para todo $x \in A$.

Demonstração: Pela lema 5.1.4 podemos estender ϕ para uma aplicação contínua $f_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e definir o homeomorfismo $h_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$:

$$h_1(x, y) = (x, y + f_1(x)).$$

Assim $h_1^{-1}(x, y) = (x, y - f_1(x))$. Analogamente, considerando $\phi^{-1} : B \rightarrow A$, a inversa de ϕ , podemos estender ϕ^{-1} a uma aplicação contínua $f_2 : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ e definir

$$h_2 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$

por:

$$h_2(x, y) = (x + f_2(y), y).$$

onde $h_2^{-1}(x, y) = (x - f_2(y), y)$. Definimos h como $h = h_2^{-1} \circ h_1$ e, para todo $x \in A$, temos:

$$\begin{aligned} h(x, 0_m) = h_2^{-1} \circ h_1(x, 0_m) &= h_2^{-1}(x, f_1(x)) = h_2^{-1}(x, \phi(x)) = (x - f_2(\phi(x)), \phi(x)) \\ &= (x - \phi^{-1}(\phi(x)), \phi(x)) = (0_n, \phi(x)). \end{aligned}$$

■

Vamos identificar $\mathbb{R}^n$ com um subespaço de $\mathbb{R}^{n+m}$ da seguinte forma:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n, \overbrace{0, \dots, 0}^{\text{m vezes}}).$$

Corolário 5.1.7. *Se $\phi : A \longrightarrow B$ é um homeomorfismo entre subconjuntos fechados do $\mathbb{R}^n$, então ϕ pode ser estendida a um homeomorfismo $\tilde{\phi} : \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}$.*

Demonstração: Consideremos h como no lema anterior. Seja $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, dada por $H(x, y) = (y, x)$ e $\tilde{\phi} = H \circ h$. ■

Observação 5.1.8. *A aplicação encontrada $\tilde{\phi}$ nós dá também um homeomorfismo entre $\mathbb{R}^{2n} - A$ e $\mathbb{R}^{2n} - B$ por restrição.*

Teorema 5.1.9. *Tomemos $A \subsetneq \mathbb{R}^n$ e $B \subsetneq \mathbb{R}^n$ fechados. Se A e B são homeomorfos, então*

$$H^p(\mathbb{R}^n - A) \cong H^p(\mathbb{R}^n - B).$$

Demonstração: Mostremos primeiramente, por indução sobre m , que:

$$\begin{aligned} H^{p+m}(\mathbb{R}^{m+n} - A) &\cong H^p(\mathbb{R}^n - A) & p > 0 \\ H^m(\mathbb{R}^{m+n} - A) &\cong H^0(\mathbb{R}^n - A)/\mathbb{R} \cdot 1 \end{aligned}$$

O caso $m = 1$ é a proposição 4.1.14. Suponhamos verdadeiro para algum $k \geq 2$. Então:

$$\begin{aligned} H^{p+k}(\mathbb{R}^{k+n} - A) &\cong H^p(\mathbb{R}^n - A) & p > 0 \\ H^k(\mathbb{R}^{k+n} - A) &\cong H^0(\mathbb{R}^n - A)/\mathbb{R} \cdot 1. \end{aligned} \tag{*}$$

Pela proposição 4.1.14 e pela hipótese de indução

$$H^{p+k+1}(\mathbb{R}^{n+k+1} - A) \cong H^{p+k}(\mathbb{R}^{n+k} - A) \cong H^p(\mathbb{R}^n - A) \cong H^{n+1}(\mathbb{R}^{k+1} - A)$$

e

$$H^{k+1}(\mathbb{R}^{n+k+1} - A) \cong H^1(\mathbb{R}^{n+1} - A) \cong H^0(\mathbb{R}^n - A)/\mathbb{R} \cdot 1.$$

Logo, (*) é válida para todo $m \geq 0$. Analogamente, para B temos:

$$\begin{aligned} H^{p+m}(\mathbb{R}^{m+n} - B) &\cong H^p(\mathbb{R}^n - B) & p > 0 \\ H^m(\mathbb{R}^{m+n} - B) &\cong H^0(\mathbb{R}^n - B)/\mathbb{R} \cdot 1. \end{aligned}$$

No corolário anterior mostramos que $\mathbb{R}^{2n} - A$ e $\mathbb{R}^{2n} - B$ são homeomorfos. O corolário de invariância topológica 4.1.12 mostra que isso induz um isomorfismo entre suas cohomologias de de Rham. Assim, para $p > 0$:

$$H^p(\mathbb{R}^n - A) \cong H^{p+n}(\mathbb{R}^{2n} - A) \cong H^{p+n}(\mathbb{R}^{2n} - B) \cong H^p(\mathbb{R}^n - B)$$

e, para $p = 0$:

$$H^0(\mathbb{R}^n - A)/\mathbb{R} \cdot 1 \cong H^n(\mathbb{R}^{2n} - A) \cong H^n(\mathbb{R}^{2n} - B) \cong H^0(\mathbb{R}^n - B)/\mathbb{R} \cdot 1$$

■

Observação 5.1.10. Para $A \subseteq \mathbb{R}^n$ fechado, o complementar $U = \mathbb{R}^n - A$ é um aberto e será uma união disjunta e enumerável de componentes conexas, todas abertas. Se forem infinitas, então $\dim(H^0(U)) = \infty$. Caso contrário, o número de componentes conexas é igual a $\dim(H^0(U))$.

Corolário 5.1.11. Se A e B são dois fechados homeomorfos em $\mathbb{R}^n$, então $\mathbb{R}^n - A$ e $\mathbb{R}^n - B$ tem o mesmo número de componentes conexas.

Demonstração: Se $A \neq \mathbb{R}^n$ e $B \neq \mathbb{R}^n$, então o resultado segue no teorema e da observação anteriores. Se $A = \mathbb{R}^n$ e $B \neq \mathbb{R}^n$, temos $\mathbb{R}^{n+1} - A$ com duas componentes conexas, enquanto $\mathbb{R}^{n+1} - B$ será conexo, o que não pode acontecer. ■

Teorema 5.1.12. (da separação de Jordan-Brouwer) Se $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$, com $n \geq 2$ é homeomorfo a S^{n-1} então:

- (i) $\mathbb{R}^n - \Sigma$ tem exatamente duas componentes conexas U_1 e U_2 , onde U_1 é limitada e U_2 é ilimitada;

(ii) Σ é a fronteira de U_1 e U_2 .

Demonstração: Como Σ é compacto, então é fechado em $\mathbb{R}^n$. Usando o corolário 5.1.11, temos o mesmo número de componentes conexas em $\mathbb{R}^n - \Sigma$ e em $\mathbb{R}^n - S^{n-1}$. Consideremos os conjuntos

$$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < 1\} \quad \text{e} \quad W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| > 1\}.$$

Ambos conexos com $\mathbb{R}^n - S^{n-1} = D^n \cup W$. Logo, $\mathbb{R}^n - S^{n-1}$ tem duas componentes conexas, e assim, $\mathbb{R}^n - \Sigma$ também tem.

Tomemos $r = \max_{x \in \Sigma} \|x\|$, $r < \infty$ pois Σ é compacto e a norma é contínua. Consideremos

$$rW = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| > r\}$$

Notemos que $rW \cap \Sigma = \emptyset$ e que rW é conexo. Assim, devemos ter rW inteiramente contido em uma das componente conexa de $\mathbb{R}^n - \Sigma$. Como rW é ilimitado, está contido em U_2 e U_2 é ilimitada. Assim, U_1 deverá estar contido em $\mathbb{R}^n - rW = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$, logo, U_1 está contida em um conjunto limitado e, portanto, será limitada.

Para provar (ii), tomemos $p \in \Sigma$ e consideremos V uma vizinhança aberta qualquer de p . Como Σ é fechado e V aberto, temos $A = \Sigma - (\Sigma \cap V)$ será fechado em Σ e será homeomorfo a um conjunto fechado $B \subsetneq S^{n-1}$. Claro que $\mathbb{R}^n - B$ será conexo e, pelo corolário 5.1.11 temos $\mathbb{R}^n - A$ conexo. Assim, sejam $p_1 \in U_1$, $p_2 \in U_2$ e $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n - A$ uma curva tal que $\gamma(a) = p_1$ e $\gamma(b) = p_2$. Por (i) temos que γ intercepta Σ pelo menos uma vez e $\gamma^{-1}[a, b] \subseteq [a, b]$ é um conjunto fechado. Consideremos $\gamma(c_1)$ e $\gamma(c_2)$ o primeiro e o último pontos de intersecção de γ com Σ . Como $\gamma(a) = p_1$ e $\gamma(b) = p_2$, temos que $c_1, c_2 \in (a, b)$. Além disso $\gamma(c_1) \in \Sigma \cap V$ e $\gamma(c_2) \in \Sigma \cap V$ e mais, $\gamma([a, c_1)) \subseteq U_1$ e $\gamma((c_2, b]) \subseteq U_2$. Então, podemos encontrar $t_1 \in [a, c_1)$ e $t_2 \in (c_2, b]$ tais que $\gamma(t_1) \in U_1 \cap V$ e $\gamma(t_2) \in U_2 \cap V$, e assim p será um ponto de fronteira. ■

Teorema 5.1.13. Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é homeomorfo a D^k com $k \leq n$, então $\mathbb{R}^n - A$ é conexo.

Demonstração: A é compacto e, portanto, fechado. Como temos $D^k \subseteq \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^n - D^k$ conexo, o corolário 5.1.11 nos dá o resultado. ■

Teorema 5.1.14. (Brouwer) Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um aberto e $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação contínua e injetiva. A imagem $f(U)$ é aberta em $\mathbb{R}^n$ e f aplica U homeomorficamente em $f(U)$.

Demonstração: É suficiente provar que $f(U)$ é aberto, pois isso fará com que $f(W)$ seja aberto para $W \subseteq U$, e isso provará a continuidade de $f^{-1} : f(U) \rightarrow U$, a inversa de f . Consideremos a bola fechada com centro em $x_0 \in U$:

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| \leq \delta\}$$

Contida em U e com fronteira S e interior $D^\circ = D - S$. É suficiente mostrar que $f(D^\circ)$ é aberto. Quando $n = 1$, temos $f(D^\circ)$ aberto, pois f é contínua e função de uma variável.

Assumimos $n \geq 2$. Tanto S quanto $\Sigma = f(S)$ são homeomorfos a S^{n-1} . Tomemos U_1 e U_2 as duas componentes conexas de $\mathbb{R}^n - \Sigma$, como no teorema 5.1.12. As duas são abertas, U_1 é limitada e U_2 é ilimitada. Pelo teorema 5.1.13 $\mathbb{R}^n - f(D)$ é conexo e como $(\mathbb{R}^n - f(D)) \cap \Sigma = \emptyset$, devemos ter $\mathbb{R}^n - f(D) \subseteq U_2$ ou $\mathbb{R}^n - f(D) \subseteq U_1$, mas $\mathbb{R}^n - D$ é ilimitado, então $\mathbb{R}^n - f(D) \subseteq U_2$. Assim $\Sigma \cup U_1 = \mathbb{R}^n - U_2 \subseteq f(D)$. Então $U_1 \subseteq f(D^\circ)$. Como D° é convexo, $f(D^\circ)$ também é conexo, além disso $f(D^\circ) \subseteq U_1 \cup U_2$, então $f(D^\circ) = U_1$, ou seja, $f(D^\circ)$ é aberto. ■

Corolário 5.1.15. (*Invariância de domínio*) Se $V \subseteq \mathbb{R}^n$ tem a topologia induzida do $\mathbb{R}^n$ e é homeomorfo a um aberto de $\mathbb{R}^n$, então V é um aberto de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração: Ora, sendo V homeomorfo a algum aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ por alguma aplicação f , então $V = f(U)$ e o resultado segue do teorema anterior. ■

Corolário 5.1.16. (*Invariância da dimensão*) Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ e $V \subseteq \mathbb{R}^m$ dois abertos não vazios. Se U é homeomorfo a V então $m = n$.

Demonstração: Assumimos que $m < n$. Do corolário anterior aplicado a V , considerado como um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ pela inclusão $\mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^n$, segue que V é aberto em $\mathbb{R}^n$, o que não é possível, pois V está contido em um subespaço próprio. ■

Exemplo 5.1.17. Um nó em $\mathbb{R}^3$ é um subconjunto $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ que é homeomorfo a S^1 . O nó complementar, é um aberto $U = \mathbb{R}^3 - \Sigma$. Mostremos que:

$$H^p(U) \cong \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } 0 \leq p \leq 2 \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

De acordo com o teorema 5.1.9 é suficiente mostrar isso com o nó trivial $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2 \subseteq$

$\mathbb{R}^3$. *Calculemos:*

$$H^p(\mathbb{R}^2 - S^1) = H^p(D^{\circ 2}) \oplus H^p(\mathbb{R}^2 - D^2) \quad (*)$$

Onde $D^{\circ 2}$ é o interior de D^2 . Temos que $D^{\circ 2}$ é estrelado e $\mathbb{R}^2 - D^2$ difeomorfo a $\mathbb{R}^2 - \{0\}$. Usando o teorema 1.3.2 e o exemplo 3.0.13 chegamos a conclusão de que $*$ tem dimensão 2 para $p = 0$, dimensão 1 para $p = 1$ e dimensão 0 para $p \geq 2$. Aplicando a proposição 4.1.14, temos que $H^{p+1}(\mathbb{R}^3 - S^1) \cong H^p(\mathbb{R}^2 - S^1)$.

Anexo

Lema A

Suponhamos que $A \subseteq U_0 \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$, onde U_0 e U são abertos do $\mathbb{R}^n$ e A fechado em U . Seja $h : U \rightarrow W$ uma aplicação contínua em um aberto $W \subseteq \mathbb{R}^m$, com restrição suave à U_0 . Para qualquer função contínua $\epsilon : U \rightarrow (0, \infty)$ existe uma função suave $f : U \rightarrow W$ que satisfaz:

- (i) $\|f(x) - h(x)\| \leq \epsilon(x)$, para todo $x \in U$;
- (ii) $f(x) = h(x)$, para todo $x \in A$.

Lema B (Partição da Unidade)

Se $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é um aberto e $V = (V_i)_{i \in I}$ uma cobertura de U onde V_i são abertos, então existem funções suaves $\phi_i : U \rightarrow [0, 1]$ com $i \in I$, satisfazendo:

- (i) $\text{supp}_U(\phi_i) \subseteq V_i$ para todo $i \in I$;
- (ii) Todo $x \in U$ tem uma vizinhança W onde apenas um número finito de ϕ_i não são nulas;
- (iii) Para todo $x \in U$ temos $\sum_{i \in I} \phi_i(x) = 1$.

Ou seja, $(\phi_i)_{i \in I}$ é uma partição da unidade formada por funções suaves e subordinada a cobertura V .

Referências Bibliográficas

- [1] Lima, E.L., *Álgebra Exterior* Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro, IMPA, 2005.
- [2] Lima, E.L., *Curso de Análise Volume 2* Rio de Janeiro, IMPA, 1981.
- [3] Lima, E.L., *Análise Real Volume 3* Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro, IMPA, 2008.
- [4] Lima, E.L., *Homologia Básica*, Rio de Janeiro, IMPA, 2009.
- [5] Madsen, I. H., *From calculus to cohomology: de Rham cohomology and characteristic classes*, Cambridge University Press, 1996.