Enlaçamentos Separáveis em S^4

Simone M. de Moraes

Orientador: *Prof. Dr. Oziride Manzoli Neto*

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, Universidade de São Paulo como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências - Área de Matemática.

USP - São Carlos
Agosto-1995

*... o valor do voo
não é medido pela decolagem
velocidade
muito menos pelo itinerário
o valor do voo
não é outra coisa
é o voo em si ...*

Ivan Petrovitch

*À minha pequena grande família,
presente na ausência.*

AGRADECIMENTOS

Agradecer é uma tarefa difícil, porém é bom lembrar das pessoas que compartilharam esses momentos e de alguma maneira contribuíram para que eu tivesse condições emocionais, intelectuais, psicológicas e até físicas para concretizar esse trabalho e assim chegasse aqui.

Chegou a hora, e agora agradeço:

À minha mãe (D. Edite), aos meus irmãos Sidnei e Sergio, à minha cunhada Neusa e aos pequenos Eric e Maira pelo amor, carinho e apoio constante antes, durante (e depois acredito) esse trabalho.

Ao Dide (prof. Dr. Oziride Manzoli Neto) pela orientação, pela amizade, uma pessoa que sem dúvida mais que um orientador foi um grande amigo durante esse período e conseguiu conviver com meu temperamento impulsivo e explosivo.

À prof^a. Dr^a. Silvia Dias Alcantara Machado da PUC-SP por ter me iniciado no mundo da matemática, ter acreditado em algum potencial meu e mais ainda por ter sido uma grande incentivadora.

Ao prof. Dr. Benedito Silva da PUC-SP pela dedicação e incentivo.

Ao prof. Dr. Carlos Biasi pela confiança creditada me convidando para participar do programa de mestrado do ICMSC-USP.

Aos professores do ICMSC que de algum modo tive contato me ajudando na continuidade do meu aprendizado matemático, em especial ao prof. Dr. Valdir Menegato pelas aulas brilhantes e ao prof. Dr. Janey Daccach pelo entusiasmo matemático que me ajudou decidir pela topologia.

Aos Professores Dr. Antonio Conde e Dr. João Carlos Vieira Sampaio pelas sugestões dadas a este trabalho.

Às secretárias da pós-graduação Beth e Laura pela solicitude nos momentos precisos.

À CAPES pelo auxílio financeiro, sem o qual este trabalho não se realizaria.

Aos amigos de "copo" e bate papo Claudia, Rô (Rosangela), Lana, Josmar, Peru e tantos outros com quem tomei muitas cervejinhas.

Aos amigos de Sampa, que entenderam a minha ausência e a minha saudade, em especial, o André, o Osmar, a Rê (minha irmãzinha) e o Tico que foram os amigos de ombro e de todas as horas, a Edninha, o Orlando e o Sorocaba que foram amigos de abraço.

À outra amiga de todas as horas, a super Adriana (Adriana B. Noronha), pela compreensão e o carinho que marcou nossa amizade.

À Luiza (Luiza T. Matumoto) pela amizade incondicional e pelo apoio nos momentos mais nebulosos.

À Lana (Lana Mara R. dos Santos) pela amizade, pela paciência e pelo grande incentivo.

Às amigas recentes Kátia, Célia, Clébia, Rô (Rosangela) e Maristela pelo convívio e amizade mesmo nos momentos em que conviver comigo foi tarefa difícil.

A duas pessoas especiais, Alencar e Alneu, que foram amigos importantes no primeiro ano do mestrado e com os quais aprendi muito quando dividimos o mesmo espaço.

Ao amigo de ouvido, sempre presente, Boneco (Ivaldo Bispo Araujo).

Ao grande amigo Sadao Massago, com certeza uma pessoa excepcional, que muito me ajudou e me ensinou neste período, um amigo pra sempre se ter.

À Vera (Vera Lúcia Garcia) que foi uma grande companheira de estudo no início do mestrado.

À Lilian que foi uma pessoa que me ouviu muito, com quem também estudei muito e além disso teve a paciência de assistir as prévias da minha qualificação.

Ao Rui e Mineiro (Valter Lucci) pelos toques interessantes e ajuda no entendimento de alguns assuntos matemáticos.

Ao pessoal dos coros (Boca em Cena e Voocal Eclético) com quem pude cantar um pouco, espantando os males e colocando um pouco de música na minha vida.

Ao Dr. Erickson (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP) pela grande ajuda em um momento muito difícil e pelos toques que me fizeram olhar um pouco mais dentro de mim.

Às companheiras da solidão, minhas plantinhas, que todos os dias sorriram pra mim e fizeram esses dias mais bonitos.

Enfim quero agradecer a todas as pessoas que de algum modo fizeram estes dois anos e meio anos de vida.

ABSTRACT

We present with details two examples of linking of spheres in S^4 with specific separability conditions.

The first example, given by van Kampen (1928), is a linking $A^* \cup B^*$ ($A^* \cong S^2 \cong B^*$) in S^4 with is homotopically split but not geometrically split.

The second example given by Andrews&Curtis (1959) is a linking $C^* \cup D^*$ ($C^* \cong S^2 \cong D^*$) in S^4 such that D^* is not homotopically linked with C^* , but C^* is homotopically linked with D^* and so this link is not homotopically split.

Using generalized spinning it was possible to generalize this last example to any dimension.

We also construct, using the above examples, linking of orientable surfaces of any genus in S^4 with the separability condition above mentioned.

RESUMO

Este trabalho apresenta de forma detalhada dois exemplos de enlaçamentos de esferas em S^4 , abordando a questão da separabilidade tanto do ponto de vista geométrico como homotópico.

O primeiro exemplo, dado por van Kampen (em *Zur Isotopie zweidimensionaler Flächen in R^4* - Hamburg Abh. 6 (216) - 1928), é um enlaçamento $A^* \cup B^*$ ($A^* \cong S^2 \cong B^*$) em S^4 separável homotopicamente, porém não é separável geometricamente.

O segundo exemplo, dado por Andrews & Curtis (em *Knotted 2-spheres in 4-space* - *Annals of Mathematics Studies* 70 (565-571) - 1959), é um enlaçamento $C^* \cup D^*$ ($C^* \cong S^2 \cong D^*$) em S^4 tal que D^* não é homotopicamente separável com C^* , mas C^* é homotopicamente enlaçada com D^* , e portanto este enlaçamento não é separável homotopicamente (e nem geometricamente).

Usando a generalização de rotação (spin) de um nó generalizamos a segunda afirmação do exemplo acima.

Além disso estendemos os conceitos de separabilidade para mergulhos de superfícies em S^4 e utilizando os exemplos citados acima, construímos enlaçamentos de superfícies orientáveis de quaisquer genus com as mesmas propriedades de separabilidade.

CONTEÚDO

Introdução	1
Capítulo 1 : Conceitos Preliminares	2
Definições e Relações de Equivalência	2
A Variedade de Seifert	5
O Teorema de van Kampen	6
O Grupo do Nó e a Apresentação de Wirtinger	6
A Soma Conexa de Mergulhos	9
A Rotação de um Nó	10
Join e Suspensão	15
Transversalidade.....	16
Série Central Inferior de um Grupo	17
Outros Resultados	18
Capítulo 2 : Enlaçamentos Separáveis e Um Exemplo	20
Capítulo 3 : Outro Exemplo: Um Enl. Não Sep. em S^4	29
Capítulo 4 : Separabilidade de Mergulhos de Superfícies em S^4	39
Bibliografia	54

INTRODUÇÃO

Dado um enlaçamento diferenciável de esferas podemos estudar a sua separabilidade geométrica e homotópica.

Neste texto definiremos as separabilidades de um enlaçamento, como acima citadas, estudaremos dois exemplos observando as relações entre os dois tipos de separabilidade, além disso faremos algumas generalizações para enlaçamentos de superfícies orientáveis em S^4 .

No capítulo 1 faremos uma exposição das ferramentas necessárias para a compreensão dos capítulos subsequentes, dentre estas ferramentas mostramos um resultado interessante que relaciona o rodado (spin) de um nó (ou enlaçamento) em R_+^3 e a generalização de rodado.

No capítulo 2 apresentamos as definições de enlaçamentos separáveis, além disso neste capítulo estudamos um exemplo de enlaçamento separável homotopicamente, mas não geometricamente, aqui utilizamos alguns recursos geométricos.

No capítulo 3 estudamos o exemplo de um enlaçamento de duas componentes onde a segunda componente não é enlaçada com a primeira, mas a primeira é enlaçada com a segunda, para demonstrarmos a última afirmação usamos a noção de Enlaçamento de Bordo e alguns resultados de transversalidade.

Finalmente no capítulo 4 apresentamos e demonstramos resultados similares aos dos exemplos dos capítulos 2 e 3 para superfícies orientáveis em S^4 , observamos ainda que estes resultados não foram encontrados na literatura consultada.

Ressaltamos aqui que as notações utilizadas neste texto são as usualmente conhecidas.

Capítulo 1

Conceitos Preliminares

Nesse capítulo definiremos alguns conjuntos e enunciaremos resultados relevantes, relacionados a tais conjuntos, para facilitar a compreensão deste trabalho. Em alguns casos demonstraremos os resultados.

DEFINIÇÕES E RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA

Definição 1.1:

Um enlaçamento (link) de variedades diferenciáveis na esfera S^{n+2} é um mergulho (diferenciável) $L: M_1^{k_1} \cup \dots \cup M_r^{k_r} \rightarrow S^{n+2}$ onde cada $M_i^{k_i}$ é uma variedade diferenciável sem bordo de dimensão k_i e a reunião acima é disjunta.

Observação 1.1:

Estaremos interessados no caso em que cada $M_i^{k_i}$ é orientável e além disso $k_i = n$ para todo i , pois os invariantes usados estão relacionados ao grupo fundamental do complementar do enlaçamento e só neste caso tal grupo não é trivial.

Se cada $M_i^n \cong S^n$ estamos na situação usualmente chamada de Enlaçamentos de Esferas em codimensão 2 e se $r = 1$ estamos trabalhando com Nós.

A teoria clássica de nós trata o caso $S^1 \rightarrow S^3$.

Às vezes denotaremos a imagem de L simplesmente por L para facilitar a escrita.

No caso de termos um nó, a notação mais usual será K no lugar de L .

Exemplos :

1)

2)

3)

4)

As figuras 1) e 2) são exemplos de nós e as figuras 3) e 4) são exemplos de enlaçamentos em $\mathbb{R}^3$ (ou S^3).

Observação 1.2:

Alguns autores consideram os nós e enlaçamentos como as imagens das aplicações consideradas, outros autores consideram estes subconjuntos com orientação e no caso de enlaçamentos podem ou não considerar a ordem dos fatores.

Não deixaremos explicitadas estas restrições no texto, supondo que elas fiquem claras ao leitor em cada contexto apresentado, caso contrário a notação ficaria muito carregada.

Definição 1.2:

Sejam K e K' dois nós de dimensão n em S^{n+2} , dizemos que K e K' são equivalentes se existe um difeomorfismo $h: S^{n+2} \rightarrow S^{n+2}$ tal que $h(K) = K'$.

No caso de enlaçamento de duas ou mais componentes, indexamos essas componentes e exigimos que o difeomorfismo h preserve a ordem fixada.

A classe de equivalência de um nó ou enlaçamento é chamada tipo do nó ou tipo do enlaçamento, respectivamente.

Definição 1.3:

Um par enodado é um par (D^{n+2}, X) tal que $X \cong D^n$ ($X \subset D^{n+2}$) com

$$\partial X \cong S^{n-1} \underset{\text{nó trivial}}{\subset} S^{n+1} = \partial D^{n+2} \quad (\partial X \subset \partial D^{n+2}).$$

No próximo teorema veremos que encontrar o mergulho $f: S^n \rightarrow S^{n+2}$ que define um nó K é equivalente a definir esse nó K através de um par enodado.

Teorema 1.1:

(i) Dado um mergulho $f: S^n \rightarrow S^{n+2}$ que define um nó K é possível construir um par enodado (D^{n+2}, X) .

(ii) Dado um par enodado (D^{n+2}, X) é possível construir $f: S^n \rightarrow S^{n+2}$ um mergulho que define um nó K .

Demonstração:

(i) Dada $f: S^n \rightarrow S^{n+2}$, tome um ponto $p \in f(S^n)$, como f é diferenciável existe uma vizinhança V de p em S^{n+2} com V difeomorfa a D^{n+2} através de uma carta local no disco standart $[-1, 1]^{n+2} = D^{n+2} \subset \mathbb{R}^{n+2}$, $f(S^n) \cap V$ é o disco $D^n \subset D^{n+2}$.

Considerando $S^{n+2} \cong D^{n+2} \cup D_f^{n+2}$ então o complementar de V é difeomorfo ao disco D_f^{n+2} e $f(S^n) \cap V^c \subset V^c$ tomando $X_f = f(S^n) \cap V^c$ que é difeomorfo a D^n , obtemos assim o par (D_f^{n+2}, X_f) , que é um par enodado correspondente à f .

(ii) Dado um par enodado (D^{n+2}, X) tomamos o par trivial (D_t^{n+2}, D_t^n) e colamos D^{n+2} a D_t^{n+2} através do bordo tal que ∂X é identificado a ∂D_t^n obtendo-se S^{n+2} e $X \underset{\text{id no } \partial}{\cup} D_t^n$ que é difeomorfo a $S^n \underset{g}{\subset} S^{n+2}$.

Portanto temos $g: S^n \rightarrow S^{n+2}$ descrevendo um nó correspondente ao par enodado (D^{n+2}, X) . ■

É possível provar que a correspondência do teorema acima é bijetiva, ou seja, dar um nó através de um mergulho é equivalente a dar um nó através de um par enodado.

A VARIEDADE DE SEIFERT

Definição 1.4:

Seja M^m subvariedade (diferenciável) de N^{m+1} , dizemos M^m tem colarinho duplo se existe mergulho $b: M^m \times [-1, 1] \rightarrow N^{m+1}$ tal que $b(x, 0) = x$ para todo $x \in M^m$.

A aplicação b é o colarinho duplo de M , mas em alguns casos sua imagem também poderá ser considerada o colarinho duplo de M .

Observações 1.3:

a) No caso em que M^m e N^{m+1} são, respectivamente, variedades orientáveis de dimensão m e $m+1$ (com bordo vazio) o colarinho duplo é uma vizinhança de M^m em N^{m+1} . Quando as variedades M^m e N^{m+1} não tem bordo vazio ou não são orientáveis as definições de colarinho são feitas convenientemente.

A imagem do colarinho $b(M^m \times (-1, 1))$ é um conjunto aberto, pela invariância do domínio (pois tem a mesma dimensão), aqui observemos que a variedade M tem bordo vazio.

b) No caso em que M^m e N^{m+1} são variedades orientáveis o colarinho duplo de M^m em N^{m+1} também é orientável.

Definição 1.5:

Seja L um enlaçamento (ou nó) de dimensão n em S^{n+2} . Uma variedade M compacta, conexa, com colarinho duplo, de dimensão $n+1$ em S^{n+2} com $\partial M = L$ é chamada variedade de Seifert do enlaçamento L .

Observação 1.4:

Qualquer enlaçamento L (de codimensão 2) admite variedade de Seifert [LEVINE].

Definição 1.6:

Seja $L \subset S^{n+2}$ um enlaçamento então existe vizinhança tubular de L [HIRSCH] que indicaremos por $V(L)$ e que é um subespaço difeomorfo à imagem de um mergulho $L \times D^2 \subset S^{n+2}$ onde L corresponde a $L \times \{(0, 0)\}$ em $V(L)$.

Observe que estamos trabalhando com enlaçamentos de variedades orientáveis, por isso o seu fibrado normal é trivial e daí concluímos que a vizinhança tubular é um produto cartesiano como o dito acima.

Observações 1.5:

a) Dados $L \subset S^{n+2}$ um enlaçamento e $V(L)$ uma vizinhança tubular de L existe uma retração $r: S^{n+2} - L \rightarrow S^{n+2} - V(L)$.

$$\text{Logo } \pi_1(S^{n+2} - L) \approx \pi_1(S^{n+2} - V(L)).$$

b) A vizinhança tubular de um enlaçamento L de dimensão 1 em S^3 é uma reunião disjunta de toros sólidos.

O TEOREMA DE VAN KAMPEN

Em muitas demonstrações deste texto utilizaremos o teorema de van Kampen, aqui apenas o enunciaremos na versão tal qual será aplicada. Sua demonstração e outras considerações mais gerais e podem ser encontradas em [MASSEY].

Teorema de van Kampen:

Seja $X = U \cup V$, onde U e V são abertos em X e $U \cap V$ é conexo por caminhos e consideremos as inclusões $i: U \cap V \rightarrow U$ e $j: U \cap V \rightarrow V$, tomando p um ponto base em $U \cap V$, então o grupo fundamental de X com ponto base em p é obtido do produto $\pi_1(U, p) * \pi_1(V, p)$ com as relações $i_*(z) = j_*(z)$ para todo $z \in \pi_1(U \cap V, p)$, onde i_* e j_* são as induzidas em π_1 das inclusões i e j .

O GRUPO DO NÓ E A APRESENTAÇÃO DE WIRTINGER

Definição 1.7:

Seja K um nó de dimensão n (ou enlaçamento) em R^{n+2} (ou S^{n+2}), o grupo fundamental do complemento $\pi_1(R^{n+2} - K)$ é chamado grupo do nó K (ou grupo do enlaçamento).

Observação 1.6:

No caso em que K é um nó em R^3 (ou S^3) a apresentação de Wirtinger nos fornece um algoritmo para calcular o grupo do nó K .

Utilizaremos este algoritmo em alguns exemplos deste trabalho, assim mostraremos em um exemplo como obter o grupo do nó através da apresentação de Wirtinger.

Consideremos então K o trefoil dado pela figura abaixo:

A "figura" de K é um número finito de arcos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ em um plano P (por exemplo o plano xy). Assumimos que cada α_i está conectado com α_{i+1} (índices tomados módulo n) por arcos β_i que saem do plano, exatamente como na figura abaixo. A união desses arcos é o nó K .

Assumiremos por conveniência que os α_i estejam orientados compativelmente com a ordem dos seus subscritos. Para representar um laço em $R^3 - K$ consideraremos pequenas setas, indicadas por x_i , que cortam α_i na direção direita-esquerda com respeito ao sentido de α_i .

Fixaremos um ponto base $*$, por exemplo $* = (0, 0, 1)$, os caminhos partindo de $*$ percorrendo x_i e voltando para $*$ determinam os laços em $R^3 - K$ que dão origem a geradores de $\pi_1(R^3 - K, *)$.

Obtemos em cada cruzamento as relações da apresentação de $\pi_1(R^3 - K)$, como podemos verificar nas figuras, abaixo, que descrevem estes cruzamentos.

Podemos obter dos cruzamentos acima as seguintes relações:

$$r_1: x_1 x_3 = x_3 x_2, \quad r_2: x_1 x_3 = x_2 x_1 \quad e \quad r_3: x_1 x_2 = x_2 x_3.$$

De tais relações concluímos que $\pi_1(R^3 - K) = \{x_1, x_3; x_1 x_3 x_1 = x_3 x_1 x_3\}$.

De um modo geral se K é um nó em R^3 de arcos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ com respectivos x_i , como os descritos acima, então o grupo de nó de K é gerado pelos x_i e tem apresentação $\pi_1(R^3 - K) = \{x_1, \dots, x_n; r_1, \dots, r_n\}$.

Observemos ainda que nosso objetivo foi dar apenas uma visão geral do algoritmo de Wirtinger, uma explicação mais detalhada do algoritmo pode ser encontrada em [ARMSTRONG].

Observação 1.7:

Em alguns momentos não faremos distinção entre $\pi_1(R^n - K)$ e $\pi_1(S^n - K)$ visto que temos o seguinte resultado:

Teorema 1.2:

Seja B um conjunto limitado de R^n , com $n \geq 3$, tal que $R^n - B$ é conexo por caminhos então a inclusão $i: R^n - B \rightarrow S^n - B$ induz o isomorfismo $\pi_1(R^n - B) \rightarrow \pi_1(S^n - B)$.

Demonstração:

Consideremos uma vizinhança U de ∞ em S^n que não alcança B e que seja homeomorfa a R^n . Então $U \cap (R^n - B) = U \cap R^n = U - \infty$ e $U - \infty$ tem equivalência homotópica com S^{n-1} . Assim U e $U \cap R^n$ são simplesmente conexos, pois $n \geq 3$, e aplicando o teorema de van Kampen no seguinte diagrama:

Segue que $\pi_1(R^n - B) \approx \pi_1(S^n - B)$. ■

A SOMA CONEXA DE MERGULHOS

Definição 1.8:

Sejam M_1 e M_2 variedades diferenciáveis de dimensão n , a soma conexa $M_1 \# M_2$ é obtida através da remoção de discos mergulhados D_i^n de dimensão n em M_i , para $i = 1, 2$, e identificando as variedades resultantes através de um difeomorfismo entre as componentes de seus bordos $h: \partial D_2 \rightarrow \partial D_1$, resultantes da remoção dos discos citados $M_i - \overset{\circ}{D}_i$.

$$\text{Logo } M_1 \# M_2 = \left(M_1 - \overset{\circ}{D}_1 \right) \bigcup_h \left(M_2 - \overset{\circ}{D}_2 \right).$$

Para assegurar que $M_1 \# M_2$ seja uma variedade, exigimos que os discos D_i^n de dimensão n sejam triviais no sentido que D_i é interior para M_i e ∂D_i tem colarinho duplo em M_i .

Observe que para difeomorfismos diferentes podemos obter somas conexas diferentes.

Observação 1.8:

Se M_1 e M_2 tem bordo não vazio, podemos construir a soma conexa via bordo $M_1 \#_{\partial} M_2$ pela identificação de discos "triviais" D_i^{n-1} em ∂M_i .

Observe ainda que esta soma é diferente da soma conexa definida anteriormente, pois nesse caso escolhemos discos nos bordos com a mesma dimensão do bordo e sem remove-los identificamo-los por um difeomorfismo.

A ROTAÇÃO DE UM NÓ

Em alguns exemplos apresentados nos próximos capítulos vamos trabalhar com enlaçamentos (ou nós) em $\mathbb{R}^4$ produzidos através de arcos em $\mathbb{R}_+^3$ com pontos inicial e final em $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^4$.

Para isso definiremos agora o rodado (spin) de arcos enodados em $\mathbb{R}_+^3$, através dos quais produziremos nós $S^2 \subset \mathbb{R}^4$.

Definição 1.9:

Sejam $\mathbb{R}_+^3 = \{(x_1, x_2, x_3, 0) \in \mathbb{R}^4; x_3 \geq 0\}$ e $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2, 0, 0); x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ subconjuntos de $\mathbb{R}^4$. Definimos a rotação de um ponto $x = (x_1, x_2, x_3, 0)$ de $\mathbb{R}_+^3$ em torno de $\mathbb{R}^2$ por $\{x_\theta; 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ onde consideramos $x_\theta = (x_1, x_2, x_3 \cos \theta, x_3 \sin \theta)$.

Assim a rotação de um conjunto X qualquer de $\mathbb{R}_+^3$ em torno de $\mathbb{R}^2$ é o conjunto $X^* = \{x_\theta; x \in X \text{ e } 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, o conjunto X^* é chamado rodado de X .

Seja A um arco em $\mathbb{R}_+^3$ com pontos inicial e final em $\mathbb{R}^2$, como na figura abaixo, o rodado de A é o nó A^* em $\mathbb{R}^4$, além disso A^* é uma esfera de dimensão 2.

Definição 1.10:

Seja L um enlaçamento de n componentes definimos o rodado de L através da união do rodado das componentes de L , ou seja, se $L = L_1 \cup \dots \cup L_n$ então $L^* = L_1^* \cup \dots \cup L_n^*$.

Observação 1.9:

Para fazer esta operação estamos supondo L convenientemente localizado em $\mathbb{R}_+^3$.

Teorema 1.3:

Seja X um conjunto aberto conexo por caminhos em $\mathbb{R}_+^3$, tal que $X \cap \mathbb{R}^2 \neq \emptyset$ então a inclusão $i: X \rightarrow X^*$ induz um isomorfismo no π_1 , ou seja, $i_*: \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(X^*)$ é um isomorfismo.

Demonstração:

Como X é aberto em $\mathbb{R}_+^3$ segue que X^* é aberto em $\mathbb{R}^4$.

Embora pudessemos tomar um ponto base em $\mathbb{R}^2$, para que ficasse mais fácil entender a questão da rotação consideremos p um ponto base em $X - \mathbb{R}^2$ e α um laço em X^* com base em p , podemos assumir, por transversalidade, que α não atinge $\mathbb{R}^2$.

Consideremos $\varphi: X^* \rightarrow X$ a projeção dada por $\varphi(x) = \bar{x}$ com

$\bar{x} = (x_1, x_2, \sqrt{x_3^2 + x_4^2}, 0)$, que projeta α no laço $\bar{\alpha}$ em X .

Mostraremos que α é homotópico a $\bar{\alpha}$.

Seja $\theta: I \rightarrow \mathbb{R}$ a aplicação contínua satisfazendo $\theta(0) = 0$ e $\bar{\alpha}(t)_{\theta(t)} = \alpha(t)$, ou seja, $\theta(t)$ é o ângulo de rotação do ponto $\bar{\alpha}(t)$ para $\alpha(t)$.

Observe que $\bar{\alpha}(t_0)_{\theta(t_0)} = \alpha(t_0) = \bar{\alpha}(t_0)_{\theta(t_0)+2k\pi}$ onde $0 \leq \theta(t_0) \leq 2\pi$ e $k \in \mathbb{Z}$.

Como a aplicação θ é contínua existe $\varepsilon > 0$ pequeno e $t \in [0, \varepsilon) \subset I$ quando $k = 0$.

Agora consideremos $R_\theta: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a aplicação dada por

$$R_\theta(x, y, z, w) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \text{ e a homotopia } F: I \times I \rightarrow \mathbb{R}^4 \text{ dada por}$$

$F(t, s) = R_{s\theta(t)}(\alpha(t))$ temos então

$$F(t, 0) = R_0(\alpha(t)) = I_{M^4(\mathbb{R})}(\alpha(t)) = \alpha(t) \text{ e}$$

$$F(t, 1) = R_{-\theta(t)}(\alpha(t)) = \bar{\alpha}(t).$$

Além disso

$$F(0, s) = R_0(\alpha(0)) = I_{M^4(\mathbb{R})}(\alpha(0)) = \alpha(0) = p \text{ e}$$

$$F(1, s) = R_{-s2k\pi}(\alpha(1)) = \beta(s).$$

Como $X \cap \mathbb{R}^2 \neq \emptyset$ então p pode ser conectado a $\mathbb{R}^2$ por um caminho γ em X , rodando γ temos um disco que contrai a curva β . Logo β é homotópico a um ponto em X^* .

Assim $\bar{\alpha}$ é homotópico a $\alpha\beta$ que é homotópico a α . Portanto $\bar{\alpha}$ é homotópico a α .

Logo dado $[\alpha] \in \pi_1(X^*)$ então $[\alpha] = [\bar{\alpha}]$, ou seja, $i_*([\bar{\alpha}]) = [\bar{\alpha}] = [\alpha]$.

Portanto i_* é sobrejetora.

Mostremos agora que i_* é injetora.

Seja γ um laço em X tal que γ é homotópico a um ponto em X^* , então existe uma homotopia $F_1: I \times I \rightarrow X$ tal que $F_1(0, s) = \gamma(s)$ e $F_1(1, s) = *$.

Consideremos $F_2: I \times I \rightarrow X$ definida por $F_2 = \varphi \circ F_1$, onde φ é a projeção descrita acima, temos então

$$F_2(0, s) = \varphi(F_1(0, s)) = \varphi(\gamma(s)) = \bar{\gamma}(s) = \gamma(s) \text{ e}$$

$$F_2(1, s) = \varphi(F_1(1, s)) = \varphi(*) = *.$$

Portanto γ é homotópico a um ponto em X .

Logo i_* é injetora, pois se $i_*([\alpha]) = 1$ então α é homotópico a um ponto em X^* e portanto α é homotópico a um ponto em X , ou seja, $[\alpha] = 1$.

Segue que i_* é um isomorfismo, isto é, $\pi_1(X)$ é isomorfo a $\pi_1(X^*)$. ■

Veremos a seguir que a definição de rodado pode ser generalizada.

Definição 1.11:

Seja A^n um disco de dimensão n (ou uma coleção disjunta de discos de dimensão n) propriamente mergulhado no disco B^m de dimensão m , tal que $\partial A \subset \partial B$ e $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$. Então temos uma inclusão natural de $A \times D^{p+1}$ em $B \times D^{p+1}$.

Tomando os bordos $A^* = \partial(A \times D^{p+1})$ e $B^* = \partial(B \times D^{p+1})$ definimos o p -rodado (p -spin) do par (B, A) por $(B^*, A^*) = \partial((B, A) \times D^{p+1})$.

Assim A^* é um nó (ou enlaçamento) de uma esfera de dimensão $(n+p)$ na esfera B^* de dimensão $(m+p)$.

Vimos na definição 1.9 que o rodado de um arco A em R_+^3 produz um nó A^* em R^4 , através da rotação de A em torno de R^2 . E na definição 1.11 vimos que o p -rodado do par (B, A) , onde A^n um disco de dimensão n propriamente mergulhado em um disco B^m de dimensão m , tal que $\partial A \subset \partial B$ e $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$, é o par $(B^*, A^*) = \partial((B, A) \times D^{p+1})$.

Agora veremos que a primeira definição de rodado é um caso particular da definição generalizada.

Teorema 1.4:

A definição de arco rodado em R_+^3 , como em def.1.9, é um caso particular da generalização de rodado dado pela definição 1.11.

Demonstração:

A definição 1.9 do rodado de um segmento enodado em R_+^3 , tal que $\partial R_+^3 = R^2$, é feita de modo a dar origem a uma esfera enodada S^2 de dimensão 2 em R^4 . A vantagem dessa definição é que ela nos dá uma "visão" de como a esfera enodada S^2 esta em R^4 , pois nos mostra em R^4 fatias R_θ^3 , com $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Com uma pequena modificação na descrição podemos iniciar o processo com um par enodado (B, A) onde $B \cong D^3$ e $A \cong D^1$ obtendo no final um par $(\overline{B}, \overline{A})$ onde $\overline{B} \cong S^4$ e $\overline{A} \cong S^2$, para isso consideremos um par enodado (B, A) com $B \cong D^3$ e $A \cong D^1$. Neste caso temos $\partial A \cong S^0 \subset D^2$ onde $\partial B \cong S_1^2 \cong D^2 \cup D_1^2$.

Não perdemos em generalidade se supormos que $B = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [\frac{1}{2}, 1]$ e que o disco D^2 acima considerado, contendo bordo de A , é dado como sendo

$D^2 = [-1, 1] \times [-1, 1] \times \{1/2\}$. Além disso chamaremos $\partial A = \{r, s\} \subset D^2$. Assim $B \subset \mathbb{R}_+^3 \subset \mathbb{R}^4$.

A rotação em $\mathbb{R}^4$ do cubo B nos dá B_R um espaço difeomorfo a $D^3 \times S^1$ com $D^2 \times S^1$ em seu bordo.

Se denotarmos $D_0^3 = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [0, 1/2]$, $I_r = r \times [0, 1/2]$ e $I_s = s \times [0, 1/2]$ então a rotação de D_0^3 é um D_0^4 e os segmentos I_r e I_s se transformam em discos D_r^2 e D_s^2 trivialmente mergulhados em D_0^4 e se colarmos D_0^4 a B_R através da rotação de D^2 (difeomorfo a $D^2 \times S^1$) obtemos um outro disco D^4 e em seu interior a rotação de A acrescida de D_r^2 e D_s^2 é uma esfera S^2 de dimensão 2, que denotaremos $\bar{A}$. Podemos colar no bordo desse disco D^4 outro disco D_1^4 obtendo uma S^4 que denotaremos $\bar{B}$.

Ao par $(\bar{B}, \bar{A})$ denotamos o rodado do par (B, A) .

Usando a definição generalizada de rodado para este caso tomamos um par enodado (B, A) com $B \cong D^3$ e $A \cong D^1$ e consideramos o par $(B^*, A^*) = (B, A) \times D^k$ onde D^k é o disco de dimensão k , $k \geq 2$, e daí

$$\partial(B^*, A^*) = \left(\partial B \times D^k \bigcup_{\partial B \times \partial D^k} B \times \partial D^k, \partial A \times D^k \bigcup_{\partial A \times \partial D^k} A \times \partial D^k \right) = (\bar{\bar{B}}, \bar{\bar{A}}) \text{ onde } \bar{\bar{B}} \cong S^4 \text{ e } \bar{\bar{A}} \cong S^2.$$

Seja $D_2^2 \subset \partial B$ tal que $\partial A = \{r, s\} \subset D_2^2$, notamos que $\partial B = D_2^2 \cup D_3^2$. Considerando-se a parte de $\bar{\bar{B}}$ dada por $R = D_3^2 \times D^2 \subset \partial B \times D^2$ observamos que $R \cong D^4$ e que $\bar{\bar{A}} \cap R = \emptyset$, esta parte corresponde a D_1^4 da primeira construção.

O fecho complementar de R pode ser descrito como $D_2^2 \times D^2 \bigcup_{D_2^2 \times \partial D^2} B \times \partial D^2$ e podemos identificar $D_2^2 \times D^2$ com D_0^4 e $B \times \partial D^2$ com B_R da primeira construção.

Observemos que $\{r\} \times D^2$ e $\{s\} \times D^2$ são partes de $\bar{\bar{A}}$ e estão mergulhadas trivialmente em $D_2^2 \times D^2$ desta construção assim como os correspondentes D_r^2 e D_s^2 estão em D_0^4 .

Da mesma forma o cilindro $A \times S^1$, da primeira construção que está contido em B_R , corresponde a $A \times \partial D^2$ contido em $B \times \partial D^2$ nesta construção.

Todas essas identificações nos mostra que realmente a definição 1.9 é um caso particular da definição 1.11. ■

JOIN E SUSPENSÃO

Observação 1.10:

No próximo teorema utilizaremos a noção de *join* de dois espaços topológicos, mais adiante também vamos utilizar a noção de suspensão de um espaço topológico, como suspensão tem uma relação com *join* vamos definir estes conceitos agora.

Definição 1.12:

Sejam X e Y espaços topológicos o *join* de X e Y é o espaço quociente $X * Y = (X \times Y \times I) / \sim$, onde $\sim$ é a seguinte relação de equivalência:

$$(x, y, t) \sim (x', y', t') \Leftrightarrow \begin{cases} t = t' = 0 & \text{e } x = x' \\ & \text{ou} \\ t = t' = 1 & \text{e } y = y' \end{cases} \text{ e igualdade no resto.}$$

Observação 1.11:

Um resultado importante da definição acima é que se X é um m -simplexo e Y é um n -simplexo então $X * Y$ é um $(m+n+1)$ -simplexo. Além disso temos que $S^m * S^n \cong S^{m+n+1}$ e $D^m * D^n \cong D^{m+n+1}$ [ARMSTRONG].

Definição 1.13:

Sejam X um espaço topológico e $J = [-1, 1]$ a suspensão de X é o espaço $SX = (X \times J) / R$, onde R é a seguinte relação de equivalência:

$$(x, t) R (x', t') \Leftrightarrow \begin{cases} t = t' = 1 \\ & \text{ou} \\ t = t' = -1 \end{cases} \text{ e igualdade no resto.}$$

Observação 1.12:

Dado um espaço topológico X e considerando $Y = S^0$ (ou seja dois pontos) então a suspensão de X é homeomorfa ao *join* de X e S^0 , ou seja, $SX \cong X * S^0$.

Logo $SS^n \cong S^n * S^0 \cong S^{n+1}$, além disso é possível ver que $SD^n \cong D^{n+1}$.

Teorema 1.5:

Seja S^n mergulhado trivialmente em S^{n+2} , ou seja, S^n é não enodado em S^{n+2} , então $\pi_1(S^{n+2} - S^n) \approx \mathbb{Z}$.

Demonstração:

Pela observação 1.11 temos que $S^{n+2} = S^n * S^1$, assim $S^{n+2} - S^n = (S^n * S^1) - S^n$ e como S^1 é um retrato de deformação de $(S^n * S^1) - S^n$ segue então que $\pi_1(S^{n+2} - S^n) \approx \pi_1(S^1) \approx \mathbb{Z}$. ■

TRANSVERSALIDADE

Na demonstração do teorema 3.2, do capítulo 3, utilizaremos um conceito importante de Topologia Diferencial, agora enunciaremos este conceito e um resultado relevante que também será utilizado na demonstração do teorema 3.2.

Definição 1.14:

Seja $f: M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável de variedades diferenciáveis e seja $L \subset N$ uma subvariedade. Dizemos que f é transversal a L se a condição de transversalidade $f'(T_p M) + T_{f(p)} L = T_{f(p)} N$ se $f(p) \in L$, é satisfeita para todo p em M , onde $T_p M$ é o espaço tangente da variedade M no ponto p , $T_{f(p)} L$ é o espaço tangente da subvariedade L no ponto $f(p)$, $T_{f(p)} N$ é o espaço tangente da variedade N no ponto $f(p)$ e $f': T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ é a aplicação tangente de f no ponto p .

f é transversal à L

f não é transversal à L

Observação 1.13:

A condição de transversalidade deve ser verificada somente nos pontos da pré-imagem de L .

Assim uma aplicação, cuja imagem não encontra a subvariedade L , é certamente transversal.

Teorema 1.6:

Sejam M, N variedades diferenciáveis de dimensões m e n , respectivamente, e seja $f: M \rightarrow N$ uma aplicação transversal a $L \subset N$ uma subvariedade de dimensão k . Então $f^{-1}(L)$ é uma subvariedade de M de dimensão $m+k-n$.

SÉRIE CENTRAL INFERIOR DE UM GRUPO**Definição 1.15:**

Seja G um grupo a série central inferior de G é definida indutivamente por $G_0 = G$ e $G_i = [G, G_{i-1}]$ para $i \geq 1$, o subgrupo consistindo de todos os produtos de comutadores $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$ onde $g \in G$ e $h \in G_{i-1}$.

Lema 1.7:

Seja G um grupo e consideremos $G_0, G_1, \dots, G_i, \dots$ sua série central inferior, então temos o seguinte:

- (i) $G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots$,
- (ii) G_i é um subgrupo normal de G (logo por (i) segue que G_i é um subgrupo normal de G_{i-1}),

$$(iii) \quad G_i / G_{i+1} \subset Z(G / G_{i+1}).$$

Demonstração:

(i) Seja $x \in G_i$, para $i \geq 1$, então $x = ghg^{-1}h^{-1}$ onde $g \in G$ e $h \in G_{i-1}$.

Se $i = 1$ então $G_{i-1} = G_0$, logo $x \in G_0$. Portanto $G_0 \supset G_1$.

Se $i > 1$ então $h = klk^{-1}l^{-1}$ onde $k \in G$ e $l \in G_{i-2}$, logo
 $x = gklk^{-1}l^{-1}g^{-1}l^{-1}k^{-1} = gklk^{-1}g^{-1}l^{-1}lg^{-1}l^{-1}k^{-1} \in G_{i-1}$.

Portanto segue (i).

(ii) Sejam $g \in G$ e $h \in G_i$ então $h = klk^{-1}l^{-1}$ onde $k \in G$ e $l \in G_{i-1}$, logo
 $ghg^{-1} = gklk^{-1}l^{-1}g^{-1} = gklk^{-1}g^{-1}l^{-1}lg^{-1}l^{-1}g^{-1} \in G_i$.

Portanto $G_i \triangleleft G$.

(iii) Sejam $hG_{i+1} \in G_i / G_{i+1}$ e $gG_{i+1} \in G / G_{i+1}$ então

$$hG_{i+1} \cdot gG_{i+1} = gG_{i+1} \cdot g^{-1}G_{i+1} \cdot hG_{i+1} \cdot gG_{i+1} \cdot h^{-1}G_{i+1} \cdot hG_{i+1} = gG_{i+1} \cdot (g^{-1}hgh^{-1})G_{i+1} \cdot hG_{i+1} = gG_{i+1} \cdot hG_{i+1}$$

Logo $hG_{i+1} \in Z(G / G_{i+1})$, e portanto $G_i / G_{i+1} \subset Z(G / G_{i+1})$. ■

Teorema 1.8:

Seja G um grupo, se G é livre então $G_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} G_i$ consiste apenas no elemento neutro.

Demonstração:

Consideremos g um elemento em G_i então o comprimento de g , definido como o número mínimo de letras em alguma representação, é finito. Além disso a medida que i aumenta, o comprimento mínimo dos elementos, distintos do elemento neutro, também aumentam em G_i , pois G é livre.

Supondo que existe $x \in G_\infty - \{e_G\}$ então x tem um comprimento $n > 0$. Assim $x \notin G_{2n}$, o que é uma contradição.

$$\text{Logo } G_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} G_i = \{e_G\}. \quad \blacksquare$$

OUTROS RESULTADOS

Observação 1.14:

Na demonstração do corolário 3.6, do capítulo 3, usaremos os seguintes fatos:

O subgrupo segundo comutador de S_3 , o grupo das permutações do conjunto $S = \{1, 2, 3\}$, consiste apenas do elemento neutro.

É um fato trivial da teoria de grupos que dado um homomorfismo de grupos $\varphi: G \rightarrow H$ então φ leva elemento do segundo comutador de G em elemento do segundo comutador de H .

Assim mostraremos apenas o primeiro resultado.

Teorema 1.9:

Seja S_3 , o grupo das permutações do conjunto $S = \{1, 2, 3\}$, o segundo comutador do grupo S_3 consiste apenas no elemento neutro.

Demonstração:

Em [ROTMAN] temos que $S_3/A_3 \approx Z_2$, como Z_2 é um grupo abeliano segue que o segundo comutador do grupo S_3 está contido em A_3 .

Como $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$ então o subgrupo comutador de S_3 ou coincide com A_3 , ou consiste apenas no elemento neutro, mas $(12)(23)(12)^{-1}(23)^{-1} = (123)$.

Logo o comutador do grupo S_3 coincide com A_3 .

Assim o segundo comutador do grupo S_3 é o comutador do grupo A_3 , que com alguns cálculos triviais concluímos que consiste apenas no elemento neutro.

Portanto o segundo comutador do grupo S_3 consiste apenas no elemento neutro. ■

Capítulo 2

Enlaçamentos Separáveis e Um Exemplo de Enlaçamento não Separável Geometricamente em S^4

Nosso objetivo nesse capítulo é definir enlaçamentos geometricamente e homotopicamente separáveis, relacionando as duas definições e obtendo resultados que possibilitem meios alternativos para constatar se um dado enlaçamento é ou não separável homotopicamente ou geometricamente. Além disso estudaremos um exemplo dado por van Kampen (1928), de enlaçamento de duas esferas em S^4 , $L \cong S_1^2 \cup S_2^2$ homotopicamente separáveis, mas que não é separável geometricamente.

Definição 2.1:

Seja $L = L_1 \cup L_2$ um enlaçamento de duas componentes em S^n , dizemos que L é um enlaçamento separável geometricamente em S^n se existem discos disjuntos D_1^n, D_2^n em S^n tais que $L_1 \subset D_1^n$ e $L_2 \subset D_2^n$.

Exemplos 2.1:

1)

2)

3)

Nos enlaçamentos dos exemplos acima temos que 1) e 3) são separáveis geometricamente e 2) não é separável geometricamente.

Teorema 2.1:

Seja $L = L_1 \cup L_2$ um enlaçamento em S^n , com $n \geq 3$, se L é separável geometricamente em S^n então $\pi_1(S^n - L)$ é o produto livre dos grupos de nó $\pi_1(S^n - L_1)$ e $\pi_1(S^n - L_2)$.

Demonstração:

Como L é separável geometricamente em S^n então existe um disco $D_1^n \subset S^n$ tal que $L_1 \subset D_1^n$ e $L_2 \cap D_1^n = \emptyset$.

Considerando $D_2^n \cong S^n - D_1^n$ temos que $L_2 \subset D_2^n$.

Logo $D_1^n \cap D_2^n \cong S^{n-1}$, e como $n \geq 3$, segue que $\pi_1(D_1^n \cap D_2^n) \approx \pi_1(S^{n-1}) = 0$.

Aplicando o teorema de van Kampen temos

$$\pi_1(S^n - L) \approx \pi_1(D_1^n - L_1) * \pi_1(D_2^n - L_2) = \pi_1(D_1^n - L_1) * \pi_1(D_2^n - L_2).$$

Agora consideremos as seguintes inclusões:

$i_1: D_1^n - L_1 \rightarrow S^n - L_1$ e $i_2: D_2^n - L_2 \rightarrow S^n - L_2$, como $n \geq 3$ nas induzidas em π_1 teremos isomorfismos, ou seja, $\pi_1(D_1^n - L_1) \approx \pi_1(S^n - L_1)$ e $\pi_1(D_2^n - L_2) \approx \pi_1(S^n - L_2)$.

$$\text{Logo } \pi_1(S^n - L) \approx \pi_1(S^n - L_1) * \pi_1(S^n - L_2). \quad \blacksquare$$

Definição 2.2:

Seja $L = L_1 \cup L_2$ um enlaçamento de duas componentes em S^n , dizemos que L é um enlaçamento homotopicamente separável em S^n se cada componente de L não é homotopicamente enlaçada com a outra, ou seja, de existem homotopias H_1^1 e H_2^2 tais que H_1^1 é a homotopia entre a aplicação que descreve o mergulho L_1 em $S^n - L_2$ e uma aplicação constante e H_2^2 é a homotopia entre a aplicação que descreve o mergulho L_2 em $S^n - L_1$ e uma aplicação constante.

Exemplos 2.2:

Veremos no teorema 2.2, abaixo, que 1) e 3) dos exemplos 2.1 são enlaçamentos homotopicamente separáveis.

Observação 2.1:

Dado um enlaçamento $L = L_1 \cup L_2$ em S^n , com $L_1 \cong S^{k_1}$ e $L_2 \cong S^{k_2}$, se $[L_1] = 0$ em $\pi_{k_1}(S^n - L_2)$ então L_1 não é homotopicamente enlaçada com L_2 e se $[L_2] = 0$ em $\pi_{k_2}(S^n - L_1)$ então L_2 não é homotopicamente enlaçada com L_1 .

De fato:

Se $[L_1] = 0$ em $\pi_{k_1}(S^n - L_2)$ então L_1 é homotópico à constante na homotopia de dimensão k_1 , ou seja, existe uma homotopia $F_1^{k_1}: L_1 \times I \rightarrow S^n - L_2$ entre a imagem de L_1 em $S^n - L_2$ e uma aplicação constante na dimensão k_1 , isto significa que $F_0^{k_1} = i_1$ onde $i_1: L_1 \rightarrow S^n - L_2$ é a inclusão de L_1 em $S^n - L_2$ e $F_1^{k_1} = \text{cte}$.

Logo L_1 não é homotopicamente enlaçada com L_2 .

Analogamente mostra-se que L_2 não é homotopicamente enlaçada com L_1 .

Mostraremos agora um resultado relacionando os dois tipos de separabilidade definidos acima.

Teorema 2.2:

Seja $L = L_1 \cup L_2$, com $L_1 \cong S^{k_1}$ e $L_2 \cong S^{k_2}$, um enlaçamento separável geometricamente em S^n então L é separável homotopicamente em S^n .

Demonstração:

Como $L = L_1 \cup L_2$ um enlaçamento separável geometricamente em S^n então existe um disco $D_1^n \subset S^n$ tal que $L_1 \subset D_1^n$ e $L_2 \cap D_1^n = \emptyset$.

Consideremos a aplicação $\phi_1: S^{k_1} \rightarrow (S^n - L_2)$ que descreve o nó L_1 em $S^n - L_2$, e seja $\phi_1': S^{k_1} \rightarrow D_1^n$ então $[L_1] \in \pi_{k_1}(D_1^n)$, logo $[L_1] = 0$.

Agora consideremos a inclusão $i: D_1^n \rightarrow S^n - L_2$ e tomemos sua induzida em π_{k_1} , temos que $i_*: \pi_{k_1}(D_1^n) \rightarrow (S^n - L_2)$ é o homomorfismo nulo.

Além disso $i_*([L_1]) = [[L_1]]$, pois $i \circ \varphi'_1 = \varphi_1$.

Logo $[[L_1]] = 0$ em $\pi_{k_1}(S^n - L_2)$.

Portanto L_1 não é homotopicamente enlaçada com L_2 .

Analogamente temos que L_2 não é homotopicamente enlaçada com L_1 .

Seja $A \cup B$, como na figura abaixo, um enlaçamento em $\mathbb{R}^3_+$.

figura 2.1

Fazendo o rodado dos arcos A e B em torno de $\mathbb{R}^2$ obtemos um enlaçamento $L = A^* \cup B^*$, tal que $A^* \cong S^2_1$ e $B^* \cong S^2_2$ e se considerarmos separadamente ambas são trivialmente mergulhadas em S^4 .

Teorema 2.3:

O enlaçamento $L = A^* \cup B^*$ é homotopicamente separável em S^4 .

Demonstração:

Devemos mostrar que A^* não é homotopicamente enlaçada com B^* e B^* não é homotopicamente enlaçada com A^* .

Inicialmente lembremos que $S^4 = \partial D^5$ e que podemos escrever $D^5 = D^3 \times D^2$.

Temos então que

$$S^4 = \partial(D^3 \times D^2) = \partial D^3 \times D^2 \bigcup_{\partial D^3 \times \partial D^2} D^3 \times \partial D^2 = S^2 \times D^2 \bigcup_{S^2 \times S^1} D^3 \times S^1.$$

Agora consideremos $S_1^2 \times D^2$ uma vizinhança tubular de S_1^2 identificando-a em S^4 como acima segue que $S^4 - (S_1^2 \times D^2) \cong D^3 \times S^1 \cong S^1$.

Como $S^4 - S_1^2 \cong S^4 - (S_1^2 \times D^2)$ temos portanto $\pi_2(S^4 - S_1^2) \approx \pi_2(S^1) = 0$.

Logo $[A^*] = 0$ em $\pi_2(S^4 - S_1^2) \approx \pi_2(S^4 - B^*)$.

Portanto B^* não é homotopicamente enlaçada com A^* .

Analogamente mostramos que A^* não é homotopicamente enlaçada com B^* . ■

Observação 2.2:

Agora mostraremos que L não é separável geometricamente em S^4 . Precisamos determinar o grupo $\pi_1(R_+^3 - (A \cup B))$, faremos isto usando a apresentação de Wirtinger.

Pela figura (2.1) podemos concluir que os geradores do grupo $\pi_1(R_+^3 - (A \cup B))$ são a, b, c, d, e, f, g e h , com os quais obtemos as seguintes relações:

$$\begin{array}{lll} (1) \quad be = ea & (2) \quad bg = gc & (3) \quad fc = cg \\ (4) \quad fa = ae & (5) \quad df = fe & (6) \quad hf = fg \end{array}$$

Das relações (5) e (6) temos $d = fef^{-1}$ e $h = fgf^{-1}$, que podemos obter através das relações anteriores. Além disso podemos escrever as relações (2), (3) e (4) como segue

$$(2) \quad b = gcg^{-1} \quad (3) \quad g = c^{-1}fc \quad (4) \quad e = a^{-1}fa.$$

Considerando $x = c^{-1}a$ temos que $a = cx$ e $a^{-1} = x^{-1}c^{-1}$, além disso x não coincide com o elemento neutro, pois $a \neq c$.

Substituindo esses resultados, (2), (3) e (4) em (1) temos:

$gcg^{-1}x^{-1}c^{-1}fcx = x^{-1}c^{-1}fcxcx$, isto implica em $gcg^{-1}x^{-1}gx = x^{-1}gxcx$ que podemos escrever ainda como $cg^{-1}x^{-1}gx = g^{-1}x^{-1}gxcx$, logo $c[g; x] = [g; x]cx$ e $x = c^{-1}[g; x]^{-1}c[g; x]$ e finalmente temos que $x = [c; [g; x]]$.

$$\text{Portanto } \pi_1(R_+^3 - (A \cup B)) = \{c, g, x; x = [c; [g; x]]\}.$$

Teorema 2.4:

$\pi_1(R_+^3 - (A \cup B))$ não é um grupo livre.

Demonstração:

Consideremos $G = \pi_1(R_+^3 - (A \cup B))$ e sua série central inferior como na definição 1.15, ou seja, $G = G_0$ e $G_i = [G, G_{i-1}]$ para $i \geq 1$, o subgrupo consistindo de todos os produtos comutadores $[g; h] = ghg^{-1}h^{-1}$, $g \in G$ e $h \in G_{i-1}$.

Assim temos que $x \in G = G_0$, e como $x = [c; [g; x]]$ segue que $x \in G_2$, pois $[g; x] \in G_1$. Usando esse mesmo raciocínio temos que $x \in G_4$, e assim segue que $x \in G_{2n}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Agora lembremos que, pelo lema 1.7(i), temos $G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots$, portanto

$$x \in G_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} G_i.$$

Como x não coincide com o elemento neutro, segue pelo teorema 1.8 que $\pi_1(R_+^3 - (A \cup B))$ não é um grupo livre. ■

Corolário 2.5:

O enlaçamento $L = A^* \cup B^*$ não é geometricamente separável em S^4 .

Demonstração:

Pelos teoremas 1.2 e 1.3 temos que:

$$\pi_1(R_+^3 - (A \cup B)) \approx \pi_1(R^4 - (A^* \cup B^*)) \approx \pi_1(S^4 - (A^* \cup B^*)).$$

Suponhamos que $L = A^* \cup B^*$ é geometricamente separável em S^4 , então pelo teorema 2.1 temos que $\pi_1(S^4 - (A^* \cup B^*)) \approx \pi_1(S^4 - A^*) * \pi_1(S^4 - B^*)$.

$$\text{Agora } S^4 = \partial(D^3 \times D^2) = \partial D^3 \times D^2 \bigcup_{\partial D^3 \times \partial D^2} D^3 \times \partial D^2 = S^2 \times D^2 \bigcup_{S^2 \times S^1} D^3 \times S^1, \text{ como}$$

A^* e B^* são duas esferas de dimensão 2 não enodadas em S^4 segue que $A^* \cong S_1^2 \times D^2$ e $B^* \cong S_2^2 \times D^2$, onde S_1^2 e S_2^2 são esferas de dimensão 2 trivialmente mergulhadas em S^4 .

Logo

$$S^4 - A^* \cong S^4 - (S_1^2 \times D^2) \cong D^3 \times S^1 \cong S^1 \text{ e}$$

$$S^4 - B^* \cong S^4 - (S_2^2 \times D^2) \cong D^3 \times S^1 \cong S^1$$

$$\text{Portanto } \pi_1(S^4 - A^*) \approx \pi_1(S^4 - B^*) \approx \pi_1(S^1) \approx \mathbb{Z}.$$

Assim $\pi_1(S^4 - (A^* \cup B^*)) \approx Z * Z$ é um grupo livre com dois geradores, o que é uma contradição, já que pelo teorema 2.4 $\pi_1(S^4 - (A^* \cup B^*))$ não é um grupo livre.

Portanto o enlaçamento $L = A^* \cup B^*$ não é geometricamente separável em S^4 . ■

Assim temos um exemplo de um enlaçamento em S^4 separável homotopicamente que não é separável geometricamente.

Observação 2.3:

É possível verificar geometricamente que $x \in G_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} G_i$, como veremos agora.

Através da figura 2.2 podemos observar que a curva α é conjugada da curva $x = c^{-1}a$.

figura 2.2

Podemos alongar a superfície acima de tal forma que resulte na seguinte superfície:

figura 2.3

Olhando para as curvas β e γ da figura 2.3 obtemos a seguinte relação $\alpha = \beta^{-1}\gamma^{-1}\beta\gamma$.

Agora olhando para a figura 2.2 e deformando β através de ①, ②, ③ e ④, como mostra a figura 2.4 abaixo, concluímos que a curva β também é conjugada da curva $x = c^{-1}a$.

figura 2.4

Como as curvas α e β são conjugadas da curva $x = c^{-1}a$ existem $\rho, \lambda \in G = \pi_1(\mathbb{R}_+^3 - (A \cup B))$ tais que $x = \rho\alpha\rho^{-1}$ e $\beta = \lambda x \lambda^{-1}$. Mas além disso $\alpha = \beta^{-1}\gamma^{-1}\beta\gamma$, ou seja, $\alpha \in G_1$, e como pelo lema 1.7(ii), G_1 é um subgrupo normal de G segue que $x \in G_1$, pois $x = \rho\alpha\rho^{-1}$. Conseqüentemente temos que $\beta \in G_2$.

Fazendo esse processo sucessivamente concluímos que $x \in G_i$, para todo $i \in \mathbb{N}$, ou

$$\text{seja, } x \in G_\infty = \bigcap_{i=0}^{\infty} G_i.$$

Observação 2.4:

Embora não seja difícil verificar que o enlaçamento estudado não é separável geometricamente, basta olhar para a seqüência de figuras da observação 2.3, nós seguimos outro caminho para concluir este resultado, pois nosso objetivo era mostrar que a recíproca do teorema 2.2 não é verdadeira.

Capítulo 3

Outro Exemplo: Um Enlaçamento não Separável em S^4

Neste capítulo vamos estudar um exemplo de enlaçamento em S^4 , dado por Andrew & Curtis (1959), eles constroem um enlaçamento de duas esferas, obtidas pelo rodado dos arcos C e D da figura abaixo. C^* , o rodado de C , é uma esfera mergulhada trivialmente em S^4 e D^* é o rodado do nó trefoil.

Mostraremos que o enlaçamento $K = C^* \cup D^*$ não é homotopicamente separável em S^4 , e como consequência do teorema 2.2 temos que K também não é geometricamente separável em S^4 .

Para isso mostraremos que D^* não é homotopicamente enlaçada com C^* , mas C^* é homotopicamente enlaçada com D^* .

Teorema 3.1:

D^* não é homotopicamente enlaçada com C^* .

Demonstração:

Temos que C^* é uma esfera de dimensão 2 trivialmente mergulhada em S^4 .

Logo $\pi_2(S^4 - C^*) \approx \pi_2(S^4 - S^2) = 0$ como vimos na demonstração do teorema

2.1.

Portanto $[D^*] = 0$ em $\pi_2(S^4 - C^*)$.

Segue que D^* não é homotopicamente enlaçada com C^* . ■

Teorema 3.2:

C^* é homotopicamente enlaçada com D^* .

Alguns resultados serão necessários para a demonstração deste teorema, mas antes enunciaremos dois corolários que são consequência imediata dele.

Corolário 3.3:

O enlaçamento $K = C^* \cup D^*$ não é geometricamente separável em S^4 .

Demonstração:

De fato:

Pelo teorema 3.2 temos que K não é homotopicamente separável em S^4 , logo segue, pelo teorema 2.2 do capítulo 2, que K não é geometricamente separável em S^4 . ■

Corolário 3.4:

$\pi_2(R^4 - D^*) \neq 0$.

Demonstração:

De fato:

Como C^* é homotopicamente enlaçada com D^* temos que C^* não é homotópica à uma constante em $R^4 - D^*$ e por isso não representa o elemento nulo de $\pi_2(R^4 - D^*)$. ■

Definição 3.1:

Seja $L = L_1 \cup L_2$ um enlaçamento em S^3 , dizemos que L é um Enlaçamento de Bordo (Boundary Link) se existem superfícies de Seifert M_1 e M_2 disjuntas tais que L_1 é bordo de M_1 e L_2 é bordo de M_2 .

Lema 3.5:

Seja $L = L_1 \cup L_2$ um enlaçamento em S^3 , se L é um Enlaçamento de Bordo, então, L_1 representa um elemento no segundo comutador do grupo de nó de L_2 e L_2 representa um elemento no segundo comutador do grupo de nó de L_1 .

Demonstração:

Consideremos M_1 a superfície de Seifert que borda L_1 e não alcança L_2 , podemos observar através da figura abaixo, que representa a superfície acima considerada, que a classe de homotopia de L_1 satisfaz:

$[L_1] = (x_{11}y_{11}x_{11}^{-1}y_{11}^{-1}) \dots (x_{1g}y_{1g}x_{1g}^{-1}y_{1g}^{-1})$ em $\pi_1(S^3 - L_2)$, onde g é o genus da superfície M_1 .

Considerando M_2 uma superfície de Seifert de L_2 , disjunta de M_1 , temos que $\ell_k(x_{1i}, L_2) = \ell_k(y_{1i}, L_2) = 0$ para todo $1 \leq i \leq g$, onde $\ell_k(x_{1i}, L_2)$ é o número de enlaçamentos de x_{1i} e L_2 e $\ell_k(y_{1i}, L_2)$ é o número de enlaçamentos de y_{1i} e L_2 .

Pela quarta definição de número de enlaçamentos em [ROLFSEN], como $\ell_k(x_{1i}, L_2) = \ell_k(y_{1i}, L_2) = 0$, temos que $[L_1]$ está no segundo comutador do grupo $\pi_1(S^3 - L_2)$.

Analogamente verifica-se que $[L_2]$ está no segundo comutador do grupo $\pi_1(S^3 - L_1)$. ■

Corolário 3.6:

Sejam $L_1 = C^* \cap R^3$ e $L_2 = D^* \cap R^3$ então $L = L_1 \cup L_2$ não é um Enlaçamento de Bordo.

Demonstração:

Suponhamos o contrário, ou seja, L é um Enlaçamento de Bordo. Então pelo lema 3.5 temos que $[L_1]$ está no segundo comutador do grupo $\pi_1(S^3 - L_2)$.

Observemos, através da figura abaixo, que $[L_1] = cb^{-1}$ e L_2 é o nó quadrado, que pela apresentação de Wirtinger o seu grupo de nó é $\pi_1(S^3 - L_2) = \{a, b, c; aba = bab, aca = cac\}$ ver [CROWELL & FOX].

Construindo um homomorfismo $\varphi: \pi_1(S^3 - L_2) \rightarrow S_3$, onde S_3 é o grupo de permutações de $S = \{1, 2, 3\}$, mandando a, b, c para os ciclos $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$, respectivamente. Temos então que $\varphi([L_1]) = \varphi(cb^{-1}) = (2\ 3)(1\ 3) = (1\ 2\ 3)$.

Como homomorfismo leva segundo comutador em segundo comutador, concluímos que $[L_1]$ não está no segundo comutador do grupo $\pi_1(S^3 - L_2)$, pois o segundo comutador do grupo S_3 possui apenas o elemento neutro.

Logo L não é um Enlaçamento de Bordo. ■

Observação 3.1:

O homomorfismo inclusão $H_1(R^3 - L_2) \rightarrow H_1(R^4 - D^*)$ é um isomorfismo. E mais, isto não é verdade se substituirmos H_1 por π_1 .

De fato:

Observe que $H_1(R^3 - L_2) \approx Z$ e $H_1(R^4 - D^*) \approx Z$, além disso os geradores de $H_1(R^3 - L_2)$ e $H_1(R^4 - D^*)$ são os seus meridianos e como a inclusão leva meridiano em meridiano segue então que $H_1(R^3 - L_2) \approx H_1(R^4 - D^*)$.

Agora $\pi_1(R^3 - L_2) \not\approx \pi_1(R^4 - D^*)$.

De fato:

Na demonstração do corolário 3.4 vimos que $\pi_1(R^3 - L_2) \approx \pi_1(S^3 - L_2) = \{a, b, c; aba = bab, aca = cac\}$.

Pelo exemplo utilizado na observação 1.5 e pelo teorema 1.2 do capítulo 1 temos ainda que $\pi_1(R^4 - D^*) = \{a, c; aca = cac\}$.

Logo $\pi_1(R^3 - L_2)$ não é isomorfo a $\pi_1(R^4 - D^*)$. ■

Demonstração do teorema 3.2:

Queremos mostrar que C^* é homotopicamente enlaçada com D^* .

Observemos inicialmente que a intersecção de $C^* \cup D^*$ com R^3 é $L_1 \cup L_2$, como no corolário 3.6.

Suponhamos que C^* seja homotopicamente não enlaçada com D^* , então C^* é homotopicamente trivial em $R^4 - D^*$ e temos uma aplicação $f: B^3 \rightarrow R^4 - D^*$ que aplica $\partial B^3 = S^2$ homeomorficamente em C^* .

Pelo teorema de transversalidade para aplicações [HIRSCH] podemos assumir que f é transversal à R^3 , temos ainda, pelo teorema 1.6 do capítulo 1, que $f^{-1}(R^3) = M$ é uma superfície de dimensão 2 com colarinho duplo (logo orientável), com bordo $\partial M \subset \partial B^3$ levado via f homeomorficamente em L_1 .

Como na demonstração do lema 3.5, ∂M é homotópico em M a um produto de comutadores de certos laços x_i, y_i em M . Essa homotopia é levada via f para uma homotopia em $R^3 - L_2$ entre L_1 e um produto similar de comutadores de $f(x_i)$ e $f(y_i)$. Agora os $f(x_i)$ e $f(y_i)$ são homotopicamente triviais em $R^4 - D^*$, pois f se estende à um disco no B^3 .

Pela observação 3.1 a inclusão $R^3 - L_2 \rightarrow R^4 - D^*$ é uma equivalência de homologia, portanto $f(x_i)$ e $f(y_i)$ são homologicamente triviais em $R^3 - L_2$, ou seja, representam comutadores em $\pi_1(R^3 - L_2)$.

Assim concluímos que a classe de homotopia $[L_1]$ está no segundo comutador do grupo de $\pi_1(R^3 - L_2)$.

O que é uma contradição, pois vimos no corolário 3.6 que $[L_1]$ não está no segundo comutador do grupo $\pi_1(R^3 - L_2)$.

Logo C^* é homotopicamente enlaçada com D^* . ■

Observação 3.2:

O teorema 3.2 pode ser generalizado, ou seja, se considerarmos o p -rodado de C e D , digamos C_p^* e D_p^* , então C_p^* é homotopicamente enlaçada com D_p^* .

Mostraremos tal generalização, no caso $p=2$, onde denotaremos $C_2^* = C^{**}$ e $D_2^* = D^{**}$.

Passo 1:

Seja $D^3 \subset D^5$ trivialmente mergulhado, isto é, tomamos $D^5 = D^2 \times D^3$ e $D^3 \equiv (0,0) \times D^3 \subset D^5$.

Então temos que $D^5 - D^3 = (D^2 \times D^3) - ((0,0) \times D^3) = (D^2 - (0,0)) \times D^3$ que se retrai em $S^1 \times D^3 \subset \partial D^5$, (na verdade existe uma retração de $(D^2 - (0,0)) \times D^3$ em $S^1 \equiv ((0,0) \times S^1)$, pois $\partial D^5 = \partial(D^2 \times D^3) = (S^1 \times D^3) \bigcup_{S^1 \times S^2} (D^2 \times S^2)$.

Além disso essa retração é a identidade em $\overset{o}{D}^2 \times S^2$ que faz parte do bordo. Em particular é a identidade em $S^2 \equiv ((0,0) \times S^2)$.

Passo 2:

Dado $\tilde{D}^1 \subset D^3$ (enodado) consideremos $D^4 \equiv D^3 \times [-1,1] \supset \tilde{D}^1 \times \{0\} \equiv \tilde{D}^1$.

Sabemos que $\tilde{D}^1 \subset D^4$ é isotópico ao mergulho trivial, isto é, $(D^4, \tilde{D}^1) \sim (D^4, D^1)$.

Portanto se considerarmos $D^3 \times D^1 \times [-1,1] \supset \tilde{D}^1 \times D^1$, assim considerar também $D^3 \times [-1,1] \times D^1 \supset \tilde{D}^1 \times D^1$, e conseqüentemente $D^3 \times [-1,1] \times D^1 \supset \tilde{D}^1 \times D^1 \times D^1$. Como

$D^3 \times [-1, 1] \supset \tilde{D}^1$ é trivial, pela observação acima, então $(D^3 \times [-1, 1] \times D^1, \tilde{D}^1 \times D^2) \sim (D^5, D^3)$ trivial.

Logo existe uma retração

$\pi: D^3 \times [-1, 1] \times D^1 - \tilde{D}^1 \times D^2 \rightarrow \partial(D^3 \times [-1, 1] \times D^1) - \tilde{S}^2$ e esta retração não atinge a $\tilde{S}^2$ que é o bordo de $\tilde{D}^1 \times D^2$.

Agora vamos mostrar que C^{**} é homotopicamente enlaçada com D^{**} .

Suponhamos que C^{**} não é homotopicamente enlaçada com D^{**} , então existe $\Psi: S^3 \times I \rightarrow S^5 - D^{**}$ tal que $\Psi_{\{0\}}$, a restrição de Ψ à $S^3 \times \{0\}$, tem por imagem homeomorfica a C^{**} (veja passo 3) e $\Psi_{\{1\}}$, a restrição de Ψ à $S^3 \times \{1\}$, é a aplicação constante.

Aqui estamos considerando:

$$S^5 = \partial(D^6) = \partial(D^3 \times D^2 \times [-1, 1]) = \partial(D^5 \times [-1, 1]) = S^4 \times [-1, 1] \cup D^5 \times \{-1, 1\},$$

$$D^{**} = \partial(\tilde{D}_2^4) = \partial(\tilde{D}_2^1 \times D^2 \times [-1, 1]) = \partial(\tilde{D}_2^3 \times [-1, 1]) = \tilde{S}_2^2 \times [-1, 1] \cup \tilde{D}_2^3 \times \{-1, 1\}.$$

Observemos que $\tilde{D}_2^3 \times \{-1\} \subset D^5 \times \{-1\}$ e $\tilde{D}_2^3 \times \{1\} \subset D^5 \times \{1\}$ e que pelos passos 1 e 2 existem retrações $\pi_{\{-1\}}$ e $\pi_{\{1\}}$ tais que

$$\pi_{\{-1\}}: D^5 \times \{-1\} - \tilde{D}_2^3 \times \{-1\} \rightarrow S^4 \times \{-1\} \subset S^4 \times [-1, 1],$$

$$\pi_{\{1\}}: D^5 \times \{1\} - \tilde{D}_2^3 \times \{1\} \rightarrow S^4 \times \{1\} \subset S^4 \times [-1, 1].$$

Além disso essas projeções não atingem $\tilde{S}_2^2 \times \{-1\}$ e $\tilde{S}_2^2 \times \{1\}$.

Logo temos

$$\pi_{\{-1\}}: D^5 \times \{-1\} - \tilde{D}_2^3 \times \{-1\} \rightarrow (S^4 - \tilde{S}_2^2) \times \{-1\} \subset (S^4 - \tilde{S}_2^2) \times [-1, 1] = ((S^4 \times [-1, 1]) - (\tilde{S}_2^2 \times [-1, 1]))$$

$$\pi_{\{1\}}: D^5 \times \{1\} - \tilde{D}_2^3 \times \{1\} \rightarrow (S^4 - \tilde{S}_2^2) \times \{1\} \subset (S^4 - \tilde{S}_2^2) \times [-1, 1] = ((S^4 \times [-1, 1]) - (\tilde{S}_2^2 \times [-1, 1])).$$

Agora precisamos apenas de mais dois passos para concluir essa demonstração.

Passo 3:

Temos que

$$C^{**} = \partial(\tilde{D}_1^1 \times D^2 \times [-1, 1]) = \partial(\tilde{D}_1^3 \times [-1, 1]) = \tilde{S}_1^2 \times [-1, 1] \cup \tilde{D}_1^3 \times \{-1, 1\} \text{ e } C^{**} \subset S^5 - D^{**}.$$

Passo 4:

A componente C^* deve ser identificada com $\tilde{S}_1^2 \times \{0\}$, assim como a componente

D^* deve ser identificada com $\tilde{S}_2^2 \times \{0\}$, isto é,
$$\begin{cases} C^* = \partial(\tilde{D}_1^1 \times D^2) = \partial(\tilde{D}_1^1 \times D^2 \times \{0\}) \\ D^* = \partial(\tilde{D}_2^1 \times D^2) = \partial(\tilde{D}_2^1 \times D^2 \times \{0\}) \end{cases}$$

Com esses passos temos que $\Psi_0^{-1}(C^*) \cong S^2 \subset S^3 = S^3 \times \{0\} \subset S^3 \times I$, onde está definida a Ψ , então se considerarmos $\Phi: S^2 \times I \rightarrow S^5 - D^{**}$, a restrição de Ψ à $S^2 \times I$, temos que $\Phi_{\{0\}}$, a restrição de Φ à $S^2 \times \{0\}$, tem por imagem C^* e $\Phi_{\{1\}}$, a restrição de Φ à $S^2 \times \{1\}$, é a aplicação constante.

Como $S^5 - D^{**} = (S^4 \times [-1, 1] \cup D^5 \times \{-1, 1\}) - (\tilde{S}_2^2 \times [-1, 1] \cup \tilde{D}_2^3 \times \{-1, 1\})$, podemos projetar $S^5 - D^{**}$ usando $\pi_{\{-1\}} \cup \pi_{\{1\}}$ em $((S^4 \times [-1, 1]) - (\tilde{S}_2^2 \times [-1, 1])) = (S^4 - \tilde{S}_2^2) \times [-1, 1] = (S^4 - D^*) \times [-1, 1]$.

Agora podemos projetar esse conjunto em $S^4 - D^*$ usando a projeção P_1 no primeiro fator, logo $P_1 \circ (\pi_{\{-1\}} \cup \pi_{\{1\}}) \circ \Phi = \Lambda: S^2 \times I \rightarrow S^4 - D^*$ e Λ é tal que $\Lambda_{\{0\}}$, a restrição de Λ à $S^2 \times \{0\}$, tem por imagem C^* e $\Lambda_{\{1\}}$, a restrição de Λ à $S^2 \times \{1\}$, é a aplicação constante. Isto é um absurdo, pois C^* é homotopicamente enlaçada com D^* .

Logo C^{**} é homotopicamente enlaçada com D^{**} . ■

Observação 3.3:

Sabendo que C_2^* é homotopicamente enlaçada com D_2^* , e raciocinando como acima concluiremos que C_3^* é homotopicamente enlaçada com D_3^* . Utilizando esse processo sucessivamente concluiremos que C_p^* é homotopicamente enlaçada com D_p^* , para todo $p \in \{1, 2, \dots\}$.

Portanto a generalização é válida.

Observação 3.4:

Podemos concluir que o enlaçamento $K = C^* \cup D^*$ não é geometricamente separável em S^4 por outro caminho.

Suponhamos que $K = C^* \cup D^*$ é geometricamente separável em S^4 , então pelo teorema 2.1 temos $\pi_1(S^4 - K) \approx \pi_1(S^4 - C^*) * \pi_1(S^4 - D^*)$.

Segue pelos teoremas 1.1 e 1.2 que $\pi_1(S^4 - K) \approx \pi_1(R_+^3 - C) * \pi_1(R_+^3 - D)$, ou seja, é o produto livre do grupo do trefoil e de Z , que não é livre.

Mas $\pi_1(S^4 - K) \approx \pi_1(R_+^3 - (C \cup D))$, pelos teoremas 1.1 e 1.2, e $\pi_1(R_+^3 - (C \cup D))$ é um grupo livre de dois geradores, como podemos ver nas seguintes deformações do complemento de $C \cup D$ em R_+^3 das figuras abaixo.

Capítulo 4

Separabilidade de Mergulhos de Superfícies em S^4

Antes de iniciarmos este capítulo convém observar que os resultados e demonstrações aqui obtidos não foram encontrados em na literatura consultada, assim as demonstrações aqui expostas são originais.

Neste capítulo utilizaremos os exemplos dos capítulos 2 e 3 para construir enlaçamentos de superfícies de quaisquer genus com propriedades análogas àquelas obtidas para esferas. Assim nosso objetivo será provar os seguintes teoremas:

Teorema 4.1:

Dados g_1 e g_2 números naturais quaisquer, existem enlaçamentos do tipo $M = M_1 \cup M_2$ em S^4 , onde M_1 e M_2 são superfícies orientáveis, de genus g_1 e g_2 respectivamente, tais que M é homotopicamente separável, mas não é geometricamente separável.

Teorema 4.2:

Dados g_1 e g_2 números naturais quaisquer, existem enlaçamentos do tipo $M = M_1 \cup M_2$ em S^4 , onde M_1 e M_2 são superfícies orientáveis, de genus g_1 e g_2 respectivamente, tais que M_2 não é homotopicamente enlaçada com M_1 , mas M_1 é homotopicamente enlaçada com M_2 .

As demonstrações desses teoremas serão obtidas facilmente depois que fizermos algumas considerações.

Inicialmente lembremos que no capítulo 1 definimos a soma conexa de duas variedades orientáveis, agora consideremos M uma superfície orientável em S^4 e $T^2 = S^1 \times S^1$ um toro mergulhado trivialmente em $D^4 \subset S^4$.

Mostraremos como será feita a soma conexa de M e T^2 , que denotaremos por $\hat{M} = M \# T^2$, esta operação pode ser considerada como colocar uma alça (handle) em M . Também mostraremos como obter $\tilde{M} \cong M$ através $\hat{M}$.

Construindo $\hat{M}$:

Consideremos $D^4 = D^2 \times D^2$, $T^2 = S^1 \times S^1$ mergulhado trivialmente em $D^4 \subset S^4$ e M uma superfície orientável em S^4 com $(0,0) \times D^2 \subset M$ de tal forma que $(0,0) \times (0,0)$ corresponde a $p \in M$.

Agora consideremos D_p^2 um disco em M com centro em p e $D_{p/2}^2$ o disco de centro p e raio metade dentro de D_p^2 .

A construção de $\hat{M}$ é feita removendo os discos D^2 de T^2 e $D_{p/2}^2$ de M e identificando ∂D^2 com $\partial D_{p/2}^2$.

Esquemáticamente temos:

Construindo $\tilde{M} \cong M$ a partir de $\hat{M}$:

Para transformarmos $\hat{M} = M \# T^2$ em M devemos remover " T^2 " de $\hat{M}$, ou seja, a operação a ser feita será a inversa da descrita acima.

Consideremos D^4 tal que $\hat{M} \cap D^4$ seja como no desenho abaixo, ou seja, $\hat{M} \cap \partial D^4 = S^1$ mergulhada trivialmente em $S^3 = \partial D^4$.

Estamos supondo a existência de uma curva C , homologicamente não trivial em $\hat{M}$, com $C = \partial D^2$ e $D^2 \subset D^4 - \hat{M}$ (veja desenho). Na verdade supomos que existe $D^2 \times [-1, 1]$ tal que $\partial D^2 \times [-1, 1]$ seja um colarinho de C em $\hat{M}$.

Removendo, em D^4 , $C \times [-1, 1]$ e colando $D^2 \times \{-1\}$ em $C \times \{-1\}$ e $D^2 \times \{1\}$ em $C \times \{1\}$, obtemos $\tilde{M} \cong M$.

Esquemáticamente temos:

As notações utilizadas neste capítulo serão as seguintes:

$$\hat{M}_i = M_i \# T^2, \quad X_i = S^4 - M_i \text{ e } \hat{X}_i = S^4 - \hat{M}_i \text{ para } i = 1, 2.$$

Mostraremos que dado um enlaçamento de superfícies orientáveis do tipo $M = M_1 \cup M_2$ em S^4 , se M_2 não é homotopicamente enlaçada com M_1 então o mesmo ocorre com os pares $(\hat{M}_2 \text{ e } M_1)$ e $(M_2 \text{ e } \hat{M}_1)$ e se M_1 é homotopicamente enlaçada com M_2 então o mesmo ocorre com os pares $(\hat{M}_1 \text{ e } M_2)$ e $(M_1 \text{ e } \hat{M}_2)$.

Teorema 4.3:

Seja $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 tal que M_1 é homotopicamente enlaçada com M_2 então:

- (i) $\hat{M}_1$ é homotopicamente enlaçada com M_2 ;
- (ii) M_1 é homotopicamente enlaçada com $\hat{M}_2$.

Demonstração:

(i) Suponhamos o contrário, então existe Φ'_1 uma homotopia entre a aplicação $\varphi'_1: \hat{M}_1 \rightarrow X_2$ mergulho que descreve $\hat{M}_1$ em X_2 e uma aplicação constante, ou seja, $\Phi'_1: \hat{M}_1 \times I \rightarrow X_2$ é tal que $\Phi'_1(x, 0) = \text{cte}$ e $\Phi'_1(x, 1) = \varphi'_1(x)$.

Considerando Φ_1 a restrição de Φ'_1 a $(M_1 - D_{p/2}^2) \times I$, onde $D_{p/2}^2$ é o disco removido de M_1 para construir $\hat{M}_1$, temos que $\Phi_1(x, 0) = \text{cte}$ e $\Phi_1(x, 1) = \varphi_1(x)$ onde φ_1 é a restrição de φ'_1 a $M_1 - D_{p/2}^2$.

É fácil ver que é possível estender Φ_1 a $\bar{\Phi}_1: M_1 \times I \rightarrow X_2$, homotopia entre o mergulho $\bar{\varphi}_1: M_1 \rightarrow X_2$ que descreve M_1 em X_2 e uma aplicação constante.

Logo temos uma contradição!

Portanto $\hat{M}_1$ é homotopicamente enlaçada com M_2 .

(ii) Suponhamos o contrário, então existe Ψ uma homotopia entre uma aplicação constante e o mergulho $\psi: M_1 \rightarrow \hat{X}_2$ que descreve M_1 em $\hat{X}_2$ (e em X_2), ou seja, existe $\Psi: M_1 \times I \rightarrow \hat{X}_2$ tal que $\Psi(x, 0) = \text{cte}$ e $\Psi(x, 1) = \psi(x)$.

Observemos agora que

$\hat{X}_2 = S^4 - \hat{M}_2 \cong S^4 - V(\hat{M}_2) \cong (S^4 - M_2) \bigcup_{D^2 \times S^1} (D^4 - T^2)$, que se retrai em $(S^4 - M_2) = X_2$, mantendo-se a identidade numa vizinhança da imagem de ψ .

Logo existe uma retração de $\hat{X}_2$ em X_2 , $r: \hat{X}_2 \rightarrow X_2$.

Temos então $M_1 \xrightarrow{\psi} \hat{X}_2 \xrightarrow{r} X_2$, considerando $\psi' = r \circ \psi$ temos que ψ' é o mergulho que descreve M_1 em X_2 e ψ' homotópico à aplicação constante, o que é uma contradição, visto que M_1 é homotopicamente enlaçada com M_2 .

Portanto M_1 é homotopicamente enlaçada com $\hat{M}_2$. ■

Corolário 4.4:

Seja $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 que não é separável homotopicamente, então o enlaçamento $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup M_2$ também não é separável homotopicamente.

De um modo geral se $M = M_1 \cup M_2$ não é homotopicamente separável então $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup \hat{M}_2$ não é separável homotopicamente.

Teorema 4.5:

Seja $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 tal que M_2 não é homotopicamente enlaçada com M_1 , então:

(i) M_2 não é homotopicamente enlaçada com $\hat{M}_1$;

(ii) $\hat{M}_2$ não é homotopicamente enlaçada com M_1 .

Demonstração:

(i) Como M_2 não é homotopicamente enlaçada com M_1 , então existe homotopia $\Phi_2: M_2 \times I \rightarrow X_1$ tal que $\Phi_2(x, 0) = \text{cte}$ e $\Phi_2(x, 1) = \varphi_2(x)$ onde φ_2 é o mergulho que descreve M_2 em X_1 .

Como $\hat{X}_1 = S^4 - \hat{M}_1 \cong S^4 - V(\hat{M}_1) \cong (S^4 - M_1) \bigcup_{D^2 \cup S^1} (D^4 - T^2)$ que se retrai em $S^4 - M_1 = X_1$, mantendo-se a identidade numa vizinhança da imagem do mergulho φ_2 , então existe uma retração $r: \hat{X}_1 \rightarrow X_1$ e uma inclusão $i: X_1 \rightarrow \hat{X}_1$ é tal que $r \circ i = \text{id}_{X_1}$.

Consideremos $\varphi'_2 = i \circ \varphi_2$ temos que $r \circ \varphi'_2 = r \circ i \circ \varphi_2 = \varphi_2$.

Logo existe $\Phi'_2: M_2 \times I \rightarrow \hat{X}_1$ tal que $\Phi'_2(x, 0) = \text{cte}$ e $\Phi'_2(x, 1) = \varphi'_2(x)$. Basta definir $\Phi'_2 = i \circ \Phi_2$.

Portanto M_2 não é homotopicamente enlaçada com $\hat{M}_1$.

(ii) Faremos essa demonstração construindo uma homotopia entre o mergulho que descreve de $\hat{M}_2$ em X_1 e a aplicação constante. Essa homotopia será definida por partes, como veremos a seguir:

Analogamente a construção de $\hat{M}$, no início do capítulo, consideremos D_p^2 um disco de M_2 e com centro p , onde $p \in M_2$ (é na vizinhança desse ponto que faremos a cirurgia para obtermos $\hat{M}_2$).

Seja $\Phi: M_2 \times I \rightarrow X_1$ a homotopia que no estágio inicial $\Phi_{\{0\}}$ é o mergulho que descreve M_2 em X_1 e no estágio final $\Phi_{\{1\}}$ é a aplicação constante. Seja $\alpha = \text{Im } \Phi_{\{1\}}$.

Consideremos a aplicação $\theta: M_2 \times I \rightarrow M_2 \times I$ tal que $\theta(x, t) = (\lambda(x), t)$ onde $\lambda: M_2 \rightarrow M_2$ é definida da seguinte forma:

λ restrita à $M_2 - D_p^2$ é a aplicação identidade e $\lambda: D_p^2 \rightarrow D_p^2$ é tal que se ${}_1D_p^2$ é o disco de raio metade dentro de D_p^2 então $\lambda({}_1D_p^2) = p$ e λ se estende radialmente para a coroa $D_p^2 - {}_1D_p^2$.

Esquematicamente temos:

Compondo-se θ e Φ , isto é, considerando $\Phi \circ \theta$ obtemos $\bar{\Phi}: M_2 \times I \rightarrow X_1$ tal que $\bar{\Phi}_{\{1\}}: M_2 \times \{1\} \rightarrow X_1$ é a constante α e a imagem de $\bar{\Phi}$ coincide com a imagem de Φ .

Seja $D_0^4 = D_0^2 \times D^2$ onde D^2 é vizinhança de $\Phi(p)$ de tal forma que D_0^2 é imagem de D_p^2 pelo mergulho $\Phi_{\{0\}}$.

Agora consideremos uma aplicação $\Omega: X_1 \times I \rightarrow X_1$ definida como segue:

em $X_1 \times \{0\}$ e em $(X_1 - D_0^4) \times \{t\}$ a aplicação Ω é a identidade, Ω em $X_1 \times \{1\}$ é tal que fora de D_0^4 é a aplicação identidade (compatível com o que temos acima) e dentro de D_0^4 é descrita abaixo:

Observe que a cirurgia que transforma M_2 em $\hat{M}_2$ é feita dentro de um subdisco de D_0^4 , ou seja, dentro de $D_{1/2}^4 = D_{0,1/2}^2 \times D_{1/2}^2$. Assim colocamos Ω constante igual a $\Phi(p)$ em $D_{1/2}^4$ e na "coroa" $D_0^4 - D_{1/2}^4$ "estica" radialmente os segmentos desta coroa até atingir o centro $\Phi(p)$.

Observemos que a imagem de $\hat{M}_2 \cap D_0^4$ no estágio final estará contida na imagem de M_2 .

Finalmente Ω restrita à $D_0^4 \times I$ é definida de forma óbvia, ou seja, Ω em $D_0^4 \times \{0\}$ é a aplicação identidade, em $D_0^4 \times \{1\}$ é aplicação definida acima e em $D_0^4 \times \{t\}$ é definida continuamente como mostra a figura abaixo.

Definamos então $\Psi: \hat{M}_2 \times I \rightarrow X_1$ tal que $\Psi_{\{0\}}$ é o mergulho que descreve $\hat{M}_2$ em X_1 e $\Psi_{\{1\}}$ é a aplicação constante igual a α .

Definiremos Ψ nos subconjuntos $\hat{M}_2 \times [0, \frac{1}{2}]$ e $\hat{M}_2 \times [\frac{1}{2}, 1]$.

Descrição de Ψ em $\hat{M}_2 \times [0, \frac{1}{2}]$:

$\Psi_{\{0\}}: \hat{M}_2 \times \{0\} \rightarrow X_1$ é a inclusão $\hat{\Phi}$ de $\hat{M}_2$ em X_1 , observando que $\hat{\Phi}$ coincide com Φ em $M_2 - D_p^2$ e $\hat{\Phi}$ em $\hat{T}_2 = \overline{\hat{M}_2 - M_2}$ foi descrita quando construimos $\hat{M}_2$ ($\hat{M}_2 = M_2 \# T^2$ com a soma feita dentro de $D_{\frac{1}{2}}^4$); $\Psi: (M_2 - D_p^2) \times \{t\} \rightarrow X_1$, para $t \in [0, \frac{1}{2}]$, coincide

com $\hat{\Phi}$ (e portanto com a Φ), $\Psi(x, t) = \Omega(\hat{\Phi}(x), 2t)$ em $\hat{T}^2 \times [0, \frac{1}{2}]$,

$\Psi(x, t) = \overline{\Phi}(x, 2t - 1)$ em $(M_2 - D_p^2) \times [\frac{1}{2}, 1]$ e $\Psi(x, t) = \overline{\Phi}(p, 2t - 1)$ em $\hat{T}^2 \times [\frac{1}{2}, 1]$.

E assim temos que $\Psi_{\{0\}}$ é o mergulho que descreve $\hat{M}_2$ em X_1 e $\Psi_{\{1\}}$ é a aplicação constante α .

Logo $\hat{M}_2$ não é homotopicamente enlaçada com M_1 . ■

Corolário 4.6:

Seja $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 separável homotopicamente, então o enlaçamento $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup M_2$ também é separável homotopicamente.

De um modo geral se $M = M_1 \cup M_2$ é separável homotopicamente então $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup \hat{M}_2$ é separável homotopicamente.

Com os resultados obtidos nos teoremas 4.3 e 4.5 agora poderemos demonstrar o teorema 4.2.

Demonstração do teorema 4.2:

Consideremos o enlaçamento $K = C^* \cup D^*$ de esferas em S^4 como no capítulo 3.

Pelo teorema 4.5 segue que D^* não é homotopicamente enlaçada com $\hat{C}^* = C^* \# T^2$ e $\hat{D}^* = D^* \# T^2$ não é homotopicamente enlaçada com C^* .

Logo se considerarmos o enlaçamento $\hat{K}_{g_1, g_2} = \hat{C}_{g_1}^* \cup \hat{D}_{g_2}^*$, onde $\hat{C}_{g_1}^* = C^* \# T_{g_1}^2$ e $\hat{D}_{g_1}^* = D^* \# T_{g_2}^2$, soma conexa de C^* e D^* à superfícies de genus g_1 e g_2 trivialmente mergulhadas em S^4 , respectivamente, temos que $\hat{D}_{g_2}^*$ não é homotopicamente enlaçada com $\hat{C}_{g_1}^*$.

Além disso temos também, através do teorema 4.3, que $\hat{C}^*$ é homotopicamente enlaçada D^* e C^* é homotopicamente enlaçada com $\hat{D}^*$.

Portanto considerando o enlaçamento $\hat{K}_{g_1, g_2} = \hat{C}_{g_1}^* \cup \hat{D}_{g_2}^*$ temos que $\hat{C}_{g_1}^*$ é homotopicamente enlaçada com $\hat{D}_{g_2}^*$. ■

Agora mostraremos mais alguns resultados que possibilitarão demonstrar o teorema 4.1. A princípio desejamos obter o seguinte resultado:

Se $M = M_1 \cup M_2$ é um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 que não é separável geometricamente então $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup \hat{M}_2$ também não é separável geometricamente.

Pelo teorema 2.1 podemos identificar a não separabilidade geométrica de um enlaçamento de variedades $M = M_1 \cup M_2$ através do grupo de nó de M e de suas componentes.

O próximo lema sera utilizado para fazermos esta identificação, antes porém precisamos observar o seguinte:

Observação 4.1:

Queremos mostrar que $\pi_1(S^4 - T^2) \approx \mathbb{Z}$, assim mostraremos que $S^4 - T^2$ tem o mesmo tipo de homotopia de $S^1 \vee S^2 \vee S^2$.

Consideremos inicialmente T^2 mergulhado em D^3 , e $V(T^2)$ uma vizinhança tubular aberta de T^2 em D^3 , podemos construir uma retração $r: D^3 - V(T^2) \rightarrow a \cup b \cup S^2$, onde a é um círculo, b é um segmento ligando os polos norte e sul de S^2 , que denotaremos A e B , além disso r restrita ao bordo de D^3 é a identidade de $S^2 (= \partial D^3)$, como no esquema abaixo:

Consideremos $D^3 \subset D^4$ sendo que D^4 será a suspensão de D^3 em $\mathbb{R}^4$ pelos pontos $C = (0,0,0,1)$ e $D = (0,0,0,-1)$, é fácil ver que a suspensão $S(V(T^2)) - \{C, D\}$ é vizinhança tubular de T^2 em D^4 , que denotaremos por $W(T^2)$.

Assim podemos construir uma retração $R: D^4 - W(T^2) \rightarrow S(a \cup b \cup S^2)$ repetindo a retração r acima, descrita em cada nível t da suspensão, para $-1 \leq t \leq 1$.

Com esta construção temos que R restrita a $S(S^2) = S^3$ é a identidade (o que ocorre para r).

Agora considerando $D^4 \subset S^4$ podemos estender a retração R à outra $\bar{R}: D^4 - W(T^2) \rightarrow S(a) \cup S(b) \cup (S(S^2) \cup D_f^4)$, onde D_f^4 é tal que $D^4 \cup D_f^4 \cong S^4$.

Verifiquemos agora que o espaço $S(a) \cup S(b) \cup (S(S^2) \cup_\partial D_f^4) = S(a) \cup S(b) \cup D_f^4$ tem o mesmo tipo de homotopia de $S^1 \vee S^2 \vee S^2$.

Observemos que $S(a) \cong S^2$ e $S(b) \cong D^2$, além disso $S(a) \cap D_f^4 = \{C, D\} \subset \partial D_f^4$ e $S(b) \cap D_f^4 = S^1 = S(\{A, B\}) \supset \{C, D\}$.

Consideremos um disco $D_i^2 \subset_{\text{propriamente}} D_f^4$ com $\partial D_i^2 = S(b) \cap D_f^4$.

Se retrairmos D^4 em D_i^2 (o que é possível sem interferir em $S(a)$ e $S(b)$) concluímos que o espaço $S(a) \cup S(b) \cup (S(S^2) \cup_\partial D_f^4)$ se retrai em $S(a) \cup (S(b) \cup D_i^2)$ que nada mais é que duas esferas com os pontos C e D em comum, e este espaço tem o mesmo tipo de homotopia de $S^1 \vee S^2 \vee S^2$.

Uma demonstração mais elaborada deste fato pode ser encontrada em [HOSOKAWA, MAEDA & SUZUKI].

Lema 4.7:

Sejam $\hat{M} = M_1 \cup M_2$ e $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup M_2$ enlaçamentos de superfícies orientáveis em S^4 então $\pi_1(S^4 - M) \approx \pi_1(S^4 - \hat{M})$.

Demonstração:

Consideremos os discos $D_{M_1}^4$ e $D_{T^2}^4$ tais que $M_1 \subset D_{M_1}^4$, $T^2 \subset D_{T^2}^4$ e $D_{M_1}^4 \cup D_{T^2}^4 \cong S^4 - \hat{M}_1$. Pelo esquema abaixo não é difícil concluir que $(D_{M_1}^4 - M_1) \cap (D_{T^2}^4 - T^2) \cong S^3 - S^1$.

Além disso $\pi_1(D_{M_1}^4 - M_1) \approx \pi_1(S^4 - M_1)$ e $\pi_1(D_{T^2}^4 - T^2) \approx \pi_1(S^4 - T^2)$.

Assim usando o teorema de van Kampen temos:

Agora sabemos que $S^3 = \partial D^4 = \partial(D^2 \times D^2) = S^1 \times D^2 \bigcup_{S^1 \times S^1} D^2 \times S^1$ e

$V(S^1) = S^1 \times D^2$, logo $S^3 - S^1 \cong S^3 - V(S^1) \cong D^2 \times S^1 \cong S^1$, assim

$\pi_1(S^3 - S^1) \approx Z = \langle a \rangle$, e pela observação 4.1 temos ainda que $\pi_1(S^4 - T^2) \approx Z = \langle b \rangle$.

Assim o diagrama acima fica do seguinte modo:

Logo $\pi_1(S^4 - \hat{M}_1) \approx |x_1, \dots, x_n, b; r_1, \dots, r_s, i_{1*}(a) = i_{2*}(a)|$, como $i_{1*}(a) = b$ e $i_{2*}(a)$ é um polinômio em $x_1, \dots, x_n$ segue que $\pi_1(S^4 - \hat{M}_1) \approx |x_1, \dots, x_n; r_1, \dots, r_s| = \pi_1(S^4 - M)$. ■

Observação 4.2:

Usando o mesmo argumento do lema 4.7 podemos mostrar que $\pi_1(S^4 - M_1) \approx \pi_1(S^4 - \hat{M}_1)$. Logo dado $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 não separável geometricamente, se constataremos a não separabilidade através do teorema 2.1 então $\hat{M}_1 = \hat{M}_1 \cup M_2$ também não será separável geometricamente.

De um modo geral se $\pi_1(S^4 - M) \not\approx \pi_1(S^4 - M_1) * \pi_1(S^4 - M_2)$ então o enlaçamento de superfícies orientáveis $\hat{M}_{g_1, g_2} = (M_1 \# T_{g_1}^2) \cup (M_2 \# T_{g_2}^2)$ não é separável geometricamente.

Se mostrarmos que quando $\hat{M}_1 = \hat{M}_1 \cup M_2$ é separável geometricamente então $M = M_1 \cup M_2$ também é separável geometricamente, poderemos estender este resultado substituindo $\hat{M}_1$ por $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup \hat{M}_2$ e conseqüentemente a extensão se dará para $\hat{M}_{g_1, g_2}$ como acima.

Logo poderemos provar o teorema 4.1, utilizando apenas o enlaçamento do exemplo do capítulo 2.

Teorema 4.8:

Sejam $M = M_1 \cup M_2$ e $\hat{M}_1 = \hat{M}_1 \cup M_2$ enlaçamentos de superfícies orientáveis em S^4 , se $\hat{M}_1$ é separável geometricamente então o mesmo ocorre com M .

Demonstração:

Como $\hat{M}_1$ é separável geometricamente em S^4 então existe um disco D_1^4 tal que $\hat{M}_1 \subset D_1^4$ e $M_2 \cap D_1^4 = \emptyset$.

A variedade $\hat{M}_1$ foi obtida colocando uma alça (handle) em M_1 , logo existe D_0^4 tal que $D_0^4 \cap M_1 = D^2$, onde D^2 é um disco cujo bordo é uma curva C não desconectante em $T^2 \subset \hat{M}_1$.

Como $\hat{M}_1 \cap D_0^4 = D^2$ esta contido no interior de D_1^4 , $\partial D^2 = C$ e $C \times [-1, 1] \subset \hat{M}_1$ segue que $D^2 \times [-1, 1] \subset D_1^4$. Além disso $\partial D_1^4 = S_1^3$ e $D^2 \times [-1, 1]$ são compactos então existe $r > 0$ tal que $D_r^4 = D^2 \times [-1, 1] \times [-r, r] \subset D_1^4$.

Mas a operação $M_1 \rightarrow \hat{M}_1$ foi feita dentro de D_r^4 , logo $\hat{M}_1 \subset D_1^4$ e $D_r^4 \subset D_1^4$.

Fazendo a operação que transforma $\hat{M}_1$ em $\tilde{\hat{M}}_1$ dentro de D_r^4 temos que $\tilde{\hat{M}}_1 \subset D_1^4$.

Como $\tilde{M}_1 \cong M_1$ com a isotopia identidade fora de D_r^4 e retração à um ponto dentro de D_r^4 , segue que $M_1 \subset D_1^4$; como M_2 não foi alterada então $M_2 \cap D_1^4 = \emptyset$.

Logo $M = M_1 \cup M_2$ é separável geometricamente em S^4 . ■

Corolário 4.9:

Seja $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis em S^4 que não é separável geometricamente, então o enlaçamento $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup M_2$ também não é separável geometricamente.

Mais geralmente se $M = M_1 \cup M_2$ não for separável geometricamente então $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup \hat{M}_2$ não será separável geometricamente.

Agora podemos demonstrar o teorema 4.1.

Demonstração do teorema 4.1:

Inicialmente consideremos o enlaçamento $L = A^* \cup B^*$ de superfícies orientáveis em S^4 como no capítulo 2.

Pelo corolário 4.6 temos que $\hat{L}_A = \hat{A}^* \cup B^*$, $\hat{L}_B = A^* \cup \hat{B}^*$ e $\hat{L} = \hat{A}^* \cup \hat{B}^*$, onde $\hat{A}^* = A^* \# T^2$ e $\hat{B}^* = B^* \# T^2$, são enlaçamentos de superfícies orientáveis homotopicamente separáveis em S^4 .

Portanto considerando o enlaçamento $\hat{L}_{g_1, g_2} = \hat{A}_{g_1}^* \cup \hat{B}_{g_2}^*$, onde $\hat{A}_{g_1}^* = A^* \# T_{g_1}^2$ e $\hat{B}_{g_2}^* = B^* \# T_{g_2}^2$, temos que $\hat{L}_{g_1, g_2}$ é separável homotopicamente em S^4 .

Além disso temos também, através do corolário 4.9, que $\hat{L}_A = \hat{A}^* \cup B^*$, $\hat{L}_B = A^* \cup \hat{B}^*$ e $\hat{L} = \hat{A}^* \cup \hat{B}^*$ são enlaçamentos de superfícies orientáveis que não são geometricamente separáveis em S^4 .

Logo o enlaçamento $\hat{L}_{g_1, g_2}$ também não é separável geometricamente em S^4 . ■

Observação 4.3:

Além dos resultados dos teoremas 4.1 e 4.2 podemos observar também que dado um enlaçamento $M = M_1 \cup M_2$ de superfícies orientáveis em S^4 , se M é geometricamente separável então o mesmo ocorre com $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup M_2$.

De fato:

Como M é geometricamente separável em S^4 então existe D^4 tal que $M_1 \subset D^4$ e $M_2 \subset (D^4)^c$, onde $(D^4)^c$ é o complementar de D^4 em S^4 e $\partial D^4 = \partial(D^4)^c = S^3$.

Consideremos $D_1^2 \subset M_1^2$ tal que $D_1^2 \cap (D^4)^c = \emptyset$, então fazendo a soma conexa $M_1 \# T_1^2$ em D_1^2 temos que $\hat{M}_1 = M_1 \# T_1^2 \subset D^4$ e $M_2 \subset (D^4)^c$, logo $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup M_2$ é geometricamente separável em S^4 .

Consequência:

Se $M = M_1 \cup M_2$ um enlaçamento de superfícies orientáveis é separável geometricamente em S^4 então o mesmo ocorre com $\hat{M} = \hat{M}_1 \cup \hat{M}_2$.

BIBLIOGRAFIA

[ANDREWS & CURTIS] *J. J. Andrews and M. L. Curtis* - Knotted 2-spheres in 4-space, *Annals of Mathematics Studies* 70, P.565-571, 1959.

[ARMSTRONG] *M. A. Armstrong* - Basic Topology, UTM, Springer Verlag, 1983.

[CROWELL & FOX] *Richard H. Crowell and Ralph H. Fox* - Introduction to Knot Theory, GTM 57, Springer-Verlag, 1963.

[HACON] *Derek Hacon* - Introdução à Teoria dos Nós em $\mathbb{R}^3$, 15º Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA (Instituto Brasileiro de Matemática), 1985.

[HIRSCH] *Morris W. Hirsch* - Differential Topology, GTM 33, Springer Verlag, 1976.

[HOSOKAWA, MAEDA & SUZUKI] *Fujitsugu Hosokawa, Toru Maeda and Shin'ichi Suzuki* - Numerical Invariants of Surface in 4-space, *Mathematic Seminar Notes*, vol.7, 1979.

[KAMPEN] *E. R. van Kampen* - Zur Isotopie zweidimensionaler Flächen in $\mathbb{R}^4$, *Hamburg Abh.* 6, (216), 1928.

[LEVINE] *J. Levine* - Unknotting spheres in codimension two, *Topology* 4, P 9-16, 1965.

[MARAR] *Washington L. Marar* - Espaços de Revestimentos e Aplicações à Teoria de Nós, Dissertação de Mestrado, ICMSC (Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos - USP), 1983.

[MASSEY] *William S. Massey* - Algebraic Topology; An Introduction, GTM 56, Springer Verlag, 1976.

[ROLFSEN] *Dale Rolfsen* - Knots and Links, *Mathematics Lecture Note Series* 7, Publish or Perish, 1976.

[ROTMAN] *Joseph J. Rotman* - The theory of Groups: An Introduction, Ally and Bacon Series in Advanced Mathematics, 1965.

[SPANIER] *Edwin H. Spanier* - Algebraic Topology - McGraw-Hill Book Company, 1966.