Sobre a multiplicidade de soluções positivas para
uma classe de problemas elípticos de quarta-
ordem via categoria de Lusternik-Schnirelman

Jéssyca Lange Ferreira Melo

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura:_____

Sobre a multiplicidade de soluções positivas para uma classe de problemas elípticos de quarta-ordem via categoria de Lusternik-Schnirelman

Jéssyca Lange Ferreira Melo

***Orientador:* Prof. Dr. Ederson Moreira dos Santos**

Tese apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC-USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciências - Matemática . *VERSÃO REVISADA*

**USP – São Carlos
Junho de 2014**

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi
e Seção Técnica de Informática, ICMC/USP,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M528s Melo, Jéssyca Lange Ferreira
 Sobre a multiplicidade de soluções positivas para
uma classe de problemas elípticos de quarta-ordem
via categoria de Lusternik-Schnirelman / Jéssyca
Lange Ferreira Melo; orientador Ederson Moreira dos
Santos. -- São Carlos, 2014.
 112 p.

 Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
Matemática) -- Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação, Universidade de São Paulo, 2014.

 1. Operador biharmônico. 2. Problema de quarta-
ordem. 3. Regiões crítica e não-crítica. 4. Categoria
de Lusternik-Schnirelman. I. Moreira dos Santos,
Ederson, orient. II. Título.

*“Por vezes
sentimos que
aquilo que
fazemos não é
senão uma gota
de água no mar.
Mas o mar seria
menor se lhe
faltasse uma
gota.” Madre
Teresa de Calcutá*

Agradecimentos

Aos meus pais, Adeildo e Conceição, pelo amor incondicional e pelo apoio dado durante toda essa trajetória.

Ao prof. Ederson, por toda atenção e paciência durante a orientação no doutorado, serei sempre grata por todo esforço e tempo dedicado para concretização deste trabalho.

Aos professores Marcelo Furtado, Marco Aurélio Souto, Francisco Odair de Paiva e Sérgio Henrique Soares, pela disponibilidade em me avaliar, fazendo parte da banca examinadora.

Aos professores e amigos da UFCG, onde comecei a minha vida acadêmica. Em especial, ao prof. Claudianor Alves pela orientação no mestrado, e pela indicação do artigo [4], bastante útil neste trabalho.

Aos professores e funcionários do ICMC-USP-São Carlos.

Aos amigos feitos em São Carlos.

Aos meus familiares: minha irmã Jussara, meus avós, tios, tias, primos, primas... por todo apoio e torcida que sempre tiveram por mim.

Ao Diego, pelo amor e paciência.

A FAPESP, pelo apoio financeiro.

A todos que contribuíram direta ou indiretamente para realização deste trabalho, muito obrigada!

Resumo

MELO, J. L. F. **Sobre a multiplicidade de soluções positivas para uma classe de problemas elípticos de quarta-ordem via categoria de Lusternik-Schnirelman.** 2014. 112 p. Tese (Doutorado) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

Neste trabalho estudamos a existência e a multiplicidade de soluções clássicas positivas para uma classe de problemas de quarta-ordem sob a condição de fronteira de Navier, relacionando o número de soluções com a topologia do domínio, mais precisamente, com sua categoria de Lusternik-Schnirelman. Introduzimos também uma noção de regiões crítica e não-crítica associadas a um de nossos problemas, a fim de garantir condições para existência de solução.

Palavras-chave: Operador biarmônico, Problema de quarta-ordem, Regiões crítica e não-crítica, Categoria de Lusternik-Schnirelman.

Abstract

MELO, J. L. F. **On the multiplicity of positive solutions for a class of fourth-order elliptic problems by Lusternik-Schnirelman category.** 2014. 112 p. Ph.D. thesis - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

In this work we study the existence and multiplicity of positive classical solutions for a class of fourth-order problems under Navier boundary condition, relating the number of solutions to the domain topology, more specifically, to its Lusternik-Schnirelman category. We also introduce the notion of critical and noncritical regions related to one of our problems, in order to ensure conditions to existence of solutions.

Keywords: Biharmonic operator, Fourth-order problem, Critical and noncritical regions, Lusternik-Schnirelman category.

Índice

Índice de Notações	1
Introdução	3
1 Multiplicidade de soluções para o problema (P_1)	13
1.1 Preliminares	14
1.2 Compacidade	15
1.3 Multiplicidade de soluções	19
1.4 Prova do Lema 1.4	27
1.5 Prova do Lema 1.9	31
2 Existência e multiplicidade de soluções para o problema (P_2)	33
2.1 Preliminares e prova do Teorema 2.1	34
2.2 Um importante resultado de compacidade	39
2.3 Lemas Técnicos	43
2.4 Prova do Teorema 2.2	47
2.5 Prova do Lema 2.6 completa	50
3 Existência de soluções para o problema (P_3)	55
3.1 Compacidade e prova do Teorema 3.3	60
3.2 Prova do Teorema 3.6	70
3.3 Prova do Lema 3.19	71
3.4 Regiões crítica e não-crítica da hipérbole crítica para um sistema Hamiltoniano	81
4 Multiplicidade de soluções para o problema (P'_3)	85
4.1 Positividade das soluções do problema (P'_3)	86
4.2 Compacidade	88

4.3	Multiplicidade de soluções	94
A	Sobre o teorema do passo da montanha	105
	Referências Bibliográficas	109

Índice de Notações

Ω é um domínio suave e limitado de $\mathbb{R}^N$;

$B_r(y)$ bola aberta de centro y e raio r ;

$|\Omega|$ é a medida de Lebesgue de um subconjunto $\Omega \subset \mathbb{R}^N$;

$\Omega - y := \{x - y; x \in \Omega\}$;

$\Delta^2 u = \Delta(\Delta u)$ biarmônico da função u ;

$\text{cat}_\Omega(\Omega)$ categoria de Lusternik-Schnirelman de Ω em Ω ;

$E(\Omega) = W^{2, \frac{p+1}{p}}(\Omega) \cap W_0^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega)$, quando $p = 1$, $E(\Omega) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$;

$\mu_1(\Omega)$ primeiro autovalor de $\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) = \mu |u|^{\frac{1}{p}-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega; \end{cases}$

$2_* = \frac{2N}{N-4}$ expoente crítico da imersão de $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^{2_*}(\Omega)$, para $N \geq 5$;

$|u|_r = |u|_{r, \Omega} = (\int_\Omega |u|^r dx)^{1/r}$ norma de $u \in L^r(\Omega)$;

$\|u\| = |\Delta u|_{\frac{p+1}{p}}$ norma de $u \in E(\Omega)$;

$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}$, hipérbole crítica para $N \geq 3$;

$\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N) = \{u \in L^{q+1}(\mathbb{R}^N), \Delta u \in L^{\frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)\}$, $\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}$; quando $p = 1$, $q+1 = 2_*$;

$S = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx; u \in \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{q+1} dx = 1 \right\}$ constante de Sobolev;

$\|\lambda\|$ norma da medida λ ;

u^* simetrizada de Schwarz da função u ;

$u^+(x) = \max\{u(x), 0\}$ parte positiva da função u ;

$u^-(x) = \max\{-u(x), 0\}$ parte negativa da função u ;

$\overline{A}$ fecho do conjunto A ;

Se $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{supp} u = \overline{\{x \in \Omega, u(x) \neq 0\}}$;

$\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N) = \{u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N); \text{supp} u \subset\subset \mathbb{R}^N\}$;

δ_x função de Dirac em torno do ponto x .

Introdução

O objetivo principal deste trabalho é estudar a existência e a multiplicidade de soluções positivas para uma classe de problemas elípticos de quarta-ordem sob a condição de Navier em um domínio limitado $\Omega \subset \mathbb{R}^N$.

No **Capítulo 1** estudamos a existência de múltiplas soluções clássicas para o problema de quarta-ordem envolvendo o operador biarmônico

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u + u^{2^*-1} & \text{em } \Omega, \\ u, -\Delta u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_1)$$

onde Ω é um domínio suave e limitado em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, $\mu_1(\Omega)$ é o primeiro autovalor do problema

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1)$$

$E(\Omega) := H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, e $2_* = 2N/(N-4)$ é o expoente crítico da imersão de $E(\Omega)$ em $L^{2_*}(\Omega)$. A motivação para o estudo desse problema é dada a seguir.

Brezis e Nirenberg [12] investigaram a questão sobre a existência de solução clássica para o problema de segunda ordem

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u + u^{2^*-1}, & u > 0 \text{ em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (\text{BN})$$

onde $2^* = 2N/(N-2)$, $N \geq 3$ e $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ é um domínio suave e limitado. Seja $\lambda_1(\Omega)$ o primeiro autovalor de $(-\Delta, H_0^1(\Omega))$. Foi provado em [12] que:

- (i) (BN) não possui solução para $\lambda \geq \lambda_1(\Omega)$. Se Ω é também estrelado, então a identidade de Pohožaev [38] garante que (BN) não possui solução para $\lambda \leq 0$.

- (ii) Para $N \geq 4$ o problema (BN) possui solução para todo $0 < \lambda < \lambda_1(\Omega)$.
- (iii) No caso $N = 3$, também chamado de dimensão crítica, o problema é mais complexo. De fato, no caso em que Ω é estrelado, (BN) não possui solução quando o parâmetro λ é positivo e suficientemente pequeno e, no caso particular em que Ω é uma bola aberta, (BN) possui solução se, e somente se, $\frac{\lambda_1(\Omega)}{4} < \lambda < \lambda_1(\Omega)$.

Em contraste ao caso em que Ω é estrelado, considere $N \geq 3$ e um anel $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Sabemos que a imersão $H_{0,\text{rad}}^1(\Omega) \hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$ é compacta; ver Ni [36, Radial Lemma]. Portanto, (BN) possui uma solução radial para todo $\lambda \in (-\infty, \lambda_1(\Omega))$.

A descrição dada anteriormente mostra que o formato do domínio Ω e a dimensão N interferem no conjunto de soluções de (BN). Rey [41, 43] observou que o número de soluções de (BN) é fortemente influenciado pela topologia de Ω . De fato, usando argumentos baseados na categoria de Lusternik-Schnirelman [30], foi provado por Rey [41] para $N \geq 5$, posteriormente por Lazzo [28] para $N \geq 4$, que (BN) possui, no mínimo, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções se o parâmetro $\lambda > 0$ é suficientemente pequeno. A extensão dos resultados de Lazzo [28] para o problema correspondente envolvendo o operador p -Laplaciano foi apresentado por Alves e Ding [3].

No Capítulo 1, inspirados pelos resultados descritos, estudamos a existência de múltiplas soluções clássicas para a equação de quarta-ordem com condição de Navier em (P_1) . Em [47], van der Vorst provou que se $N \geq 5$, $\mu \geq \mu_1(\Omega)$ ou, $\mu \leq 0$ e se o domínio Ω é estrelado, então (P_1) não possui solução. No mesmo artigo, supondo que Ω é um domínio regular geral em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 8$ e $\mu \in (0, \mu_1(\Omega))$, foi provado que (P_1) possui solução. Posteriormente, Gazzola et al. [21] provaram que $N = 5, 6, 7$ são as dimensões críticas para o problema (P_1) no sentido de que (P_1) não possui solução se $\mu > 0$ é suficientemente pequeno e Ω é uma bola aberta em $\mathbb{R}^N$.

Nossa principal contribuição no Capítulo 1 deste trabalho é apresentar um resultado de existência de múltiplas soluções clássicas para (P_1) para todas as dimensões não críticas, mais precisamente, para todo $N \geq 8$.

Teorema 1.1. *Se Ω é um domínio suave limitado em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, então existe $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$ tal que, para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$, o problema (P_1) possui, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas.*

Mencionamos que El-Mehdi & Selmi [16], inspirados pelos procedimentos empregados em [41, 42, 43] para lidar com (BN), provaram que para $N > 8$ o problema (P_1) possui, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções se o parâmetro $\mu > 0$ é suficientemente pequeno. Mais recentemente, Abdelhedi [1] usou técnicas similares aquelas em [16] para provar a existência de múltiplas soluções para um problema similar.

Destacamos que a condição $N > 8$ parece essencial nos argumentos em [1] e [16] bem como $N \geq 5$ foi exigido por Rey em [41]. Em particular, ficou como problema em aberto a influência da topologia do domínio na existência de múltiplas soluções para o problema (P_1) no caso $N = 8$; ver [16, Remark 1.4].

Para provar nosso resultado usamos uma abordagem diferente daquela em [1, 16], que aparenta ser mais direta e funciona para $N \geq 8$. Ressaltamos também que em vez de

projeções nós empregamos extensões apropriadas; por exemplo compare [16, p. 419] e (1.34) neste trabalho. Além disso, acreditamos que as técnicas de extensão e simetrização aplicadas aqui para funções em $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ serão úteis para tratar outros problemas de quarta-ordem. Em particular, as provas dos Lemas 1.11 e 1.13 e eq. (1.40) exemplificam como nosso procedimento de extensão substitui a extensão por zero convencional usada para tratar problemas de segunda-ordem, ou mesmo problemas de quarta-ordem com condição de Dirichlet na fronteira. Já ressaltamos que essas extensões serão bastante utilizadas ao longo dos próximos capítulos desta tese.

O resultado obtido neste primeiro capítulo encontra-se em forma de artigo, aceito para publicação, cf. [32].

No **Capítulo 2** estudamos a existência e a multiplicidade de soluções para uma versão do problema (P_1) , considerando agora também perturbações superlineares, mas precisamente o problema

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u^s + u^{2_*-1} & \text{em } \Omega, \\ u, -\Delta u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_2)$$

onde Ω é um domínio limitado suave em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, $\mu > 0$, $2 \leq s+1 < 2_*$.

O primeiro resultado que obtivemos neste segundo capítulo foi a existência de solução para (P_2) , e o resultado principal desse capítulo afirma que se Ω possui topologia rica, descrita por sua categoria de Lusternik-Schnirelman, então múltiplas soluções para o problema (P_2) existem desde que $\mu > 0$ seja suficientemente pequeno.

Teorema 2.1. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado suave em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, e $\mu > 0$. No caso $s = 1$ suponha $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, $\mu_1(\Omega)$ primeiro autovalor do problema (1). Supondo $2 \leq s+1 < 2_*$ se $N \geq 8$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$ para as dimensões críticas $N = 5, 6, 7$, então (P_2) possui uma solução clássica.*

Teorema 2.2. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado suave em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$. Suponha $2 \leq s+1 < 2_*$ se $N \geq 8$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$ para as dimensões críticas $N = 5, 6, 7$. Então existe $\bar{\mu} > 0$ tal que, para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$, o problema (P_2) possui, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas.*

Primeiramente observamos que, cf. [47], se $2 \leq s+1 < 2_*$ e $\mu \leq 0$ então (P_2) não possui solução em domínios estrelados $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$. Se $s = 1$, então a condição $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ é necessária para a existência de solução para domínios gerais. Observamos também que o Teorema 2.2, no caso particular em que $s = 1$ se reduz ao Teorema 1.1. Entretanto, a abordagem neste segundo capítulo é baseada em algumas análises da variedade de Nehari associada ao problema (P_2) , sendo assim diferente do procedimento adotado no primeiro capítulo deste trabalho.

Mencionamos que o Teorema 2.2 foi provado por Alves e Figueiredo [4] para o contexto do correspondente problema sob condição de Dirichlet

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu |u|^{s-1} u + |u|^{2^*-2} u & \text{em } \Omega, \\ u, \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (\text{AF})$$

Theorem 1.1 em [4]. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio suave e limitado com $N \geq 5$. Suponha $2 \leq s+1 < 2_*$ se $N \geq 8$ e, $2_* - 2 < s+1 < 2_*$ para as dimensões críticas $N = 5, 6, 7$. Então existe $\bar{\mu} > 0$ tal que para todo $0 < \mu < \bar{\mu}$ o problema (AF) possui, no mínimo, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas não-triviais.**

Existe uma diferença entre [4, Theorem 1.1] e Teorema 2.2 nesse trabalho, que envolve uma propriedade qualitativa das soluções. Enquanto nenhuma informação sobre o sinal das soluções de (AF) foi dada, pois, como é bem sabido, um princípio de comparação para o operador biharmônico sob a condição de Dirichlet não existe para domínios gerais, cf. [22, Chapter 5], aqui e no Capítulo 1 fazemos uso de um princípio de comparação válido para o operador biharmônico sob a condição de fronteira de Navier, ver Lema 2.4.

Para um resultado de existência de solução para perturbações sublineares, isto é, no caso $1 < s+1 < 2$, mencionamos [8, Theorem 7.1].

Como feito para o resultado obtido no Capítulo 1, os resultados obtidos neste segundo capítulo foram submetidos em forma de artigo, aceito para publicação, cf. [33].

O **Capítulo 3** é dedicado ao estudo da existência de solução para o problema de quarta-ordem não linear

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) = \mu |u|^{s-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_3)$$

satisfazendo

$$u, -\Delta u > 0 \text{ em } \Omega,$$

onde Ω é um domínio suave limitado de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\mu > 0$. Observe que (P_3) pode ser re-escrito como

$$\begin{cases} -\Delta u = |v|^{p-1} v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu |u|^{s-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (S_3)$$

Assumiremos que (p, q) pertence a hipérbole crítica

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}, \quad (2)$$

*Há um pequeno erro em [4, Theorem 1.1] e, de acordo com a notação nesse artigo, a condição $2_{**} - 2 \leq q < 2_{**}$ deve ser lida como $2_{**} - 2 < q < 2_{**}$. As potências $s+1$ e 2_* nesse trabalho correspondem, respectivamente, as potências q e 2^{**} em [4]. Veja a prova do Lema 2.6 desta tese para mais detalhes.

e $\frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1$. Denotamos agora $E(\Omega) := W^{2, \frac{p+1}{p}}(\Omega) \cap W_0^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega)$. Seja também $\mu_1(\Omega)$ o primeiro autovalor do problema

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) = \mu |u|^{\frac{1}{p}-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (3)$$

Observe que a condição $\frac{p+1}{p} < s+1$ diz que a perturbação $|u|^{s-1}u$ é do tipo “superlinear” para o operador $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)$ e no caso $\frac{p+1}{p} = s+1$ então $|u|^{s-1}u$ e $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)$ têm mesma homogeneidade.

Lembramos que a hipérbole crítica (3.1) é um determinante para a existência de solução positiva para o sistema (S_3) no caso em que $\mu = 0$. Neste caso o sistema (S_3) não tem solução positiva se (p, q) pertence ou está acima da hipérbole crítica, isto é,

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} \leq \frac{N-2}{N}.$$

Este tipo de resultado, baseado em uma identidade do tipo Pohožev foi observado por Clément et al. [15] e van der Vorst [48]; veja também Pucci e Serrin [39], Mitidieri [34] e Peletier e van der Vorst [37].

Para obtermos solução para o problema (P_3) , analisamos a existência de pontos críticos não-triviais do funcional

$$I_\mu(u) := \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} \int_\Omega |u|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_\Omega |u|^{q+1} dx, \quad u \in E(\Omega), \quad (4)$$

e ao constataremos que o mesmo possui a geometria do passo da montanha, Lema 3.9, procuramos condições nas quais o funcional I_μ satisfaz a condição (PS), Lema 3.18, e onde estaria localizado o nível do passo da montanha, Lema 3.19.

Visando tornar claro a definição que será dada a seguir, voltemos ao problema clássico de Brezis e Nirenberg (BN). Sabemos que as funções que realizam a constante de Sobolev

$$\inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u|^2 dx; u \in \mathcal{D}^{1,2}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{2^*} dx = 1 \right\}, \quad N \geq 3,$$

comportam-se no infinito como $r^{-(N-2)}$. Segundo os argumentos de Brezis e Nirenberg [12, Lemma 1.2], a definição de dimensão crítica e não-crítica associada ao problema (BN) surge naturalmente da L^2 -integrabilidade de $|x|^{-(N-2)}$ em $\mathbb{R}^N \setminus B_1(0)$, mais precisamente

$$\begin{aligned} 2(N-2) &\geq N && \text{corresponde as dimensões não-críticas para (BN), e} \\ 2(N-2) &< N && \text{corresponde as dimensões críticas para (BN),} \end{aligned}$$

isto é,

$$\begin{aligned} N &\geq 4 && \text{são as dimensões não-críticas para (BN), e} \\ N &= 3 && \text{é a dimensão crítica para (BN).} \end{aligned}$$

Argumentos semelhantes foram introduzidos em [19, §7 e §8] para classificar as dimensões críticas e não-críticas associadas ao problema

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{p-1} + u^{p^*-1}, & u > 0 \text{ em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (\text{P}')$$

onde $p^* = pN/(N-p)$. Sabendo que as funções que realizam

$$\inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u|^p dx; u \in \mathcal{D}^{1,p}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{p^*} dx = 1 \right\}, \quad N > p,$$

comportam-se no infinito como $r^{-\frac{N-p}{p-1}}$, a definição de dimensão crítica e não-crítica associada ao problema (P') surge da L^p -integrabilidade de $|x|^{-\frac{N-p}{p-1}}$ em $\mathbb{R}^N \setminus B_1(0)$, mais precisamente

$$\begin{aligned} N \geq p^2 & \text{ são as dimensões não-críticas para (P'), e} \\ p < N < p^2 & \text{ são as dimensões críticas para (P').} \end{aligned}$$

Ao analisar o comportamento assintótico dos instantons que realizam a constante de Sobolev

$$S = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx; u \in \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{q+1} dx = 1 \right\}, \quad (5)$$

ver [25, (1.14), (1.15) e (1.16)], ou (3.5), (3.6) e (3.7) neste trabalho, observamos que, para $p < \frac{N}{N-2}$, o instanton, no infinito, comporta-se como $r^{-[p(N-2)-2]}$. Logo, visando proceder como Brezis e Nirenberg [12, Lemma 1.2], para garantir a existência de solução para o problema (P_3) com perturbação de mesma ordem, isto é, $s = 1/p$, faz-se necessário considerar

$$[p(N-2)-2] \left(\frac{p+1}{p} \right) \geq N, \quad \text{ou equivalentemente,} \quad \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq p < \frac{N}{N-2}.$$

Note que $\frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} < \frac{N}{N-2}$ se, e somente se, $N \geq 6$. Observe também que

$$[p(N-2)-2] \left(\frac{p+1}{p} \right) \geq N \text{ é equivalente a } N \geq 2 \left(\frac{p+1}{p} \right)^2.$$

Isto indica a naturalidade desta restrição quando a comparamos com as dimensões não-críticas do biarmônico e fazemos um paralelo da restrição $N \geq p^2$ para o p -Laplaciano com as dimensões não-críticas do Laplaciano. Para $p \geq \frac{N}{N-2}$, o comportamento no infinito dos instantons associados a (5) é descrito por $r^{-(N-2)}$, veja (3.6) e (3.7), e somos induzidos a considerar

$$(N-2) \left(\frac{p+1}{p} \right) \geq N, \quad \text{ou equivalentemente,} \quad \frac{N}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}.$$

Mais uma vez, observe que a desigualdade $\frac{N}{N-2} \leq \frac{N-2}{2}$ é válida se, e somente se, $N \geq 6$.

Com isso, introduzimos a noção de região não-crítica e região crítica da hipérbole crítica, dada em (2), associadas ao problema (P_3) .

Definição 3.1. Dizemos que o ponto (p, q) da hipérbole crítica (2) está em uma região:

(a) Não-crítica se $N \geq 6$ e p satisfaz

$$\frac{2 + \sqrt{2N}}{N - 2} \leq p \leq \frac{N - 2}{2}. \quad (6)$$

(b) Crítica, se $N \geq 6$ e p não satisfaz (6); ou $N = 3, 4, 5$ e p qualquer.

Ao longo do terceiro capítulo, a hipótese (H), relativa a potência $s + 1$, indica a seguinte situação:

$$\left. \begin{array}{l}
 \text{(a) Na região não-crítica, i.e., } N \geq 6 \text{ e } \frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}, \text{ suponha} \\
 \quad \frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1. \\
 \text{(b) Nas regiões críticas,} \\
 \quad \text{(b1) } N \geq 6 \text{ e } \frac{2}{N-2} < p < \frac{2+\sqrt{2N}}{N-2}, \text{ suponha } q-p < s+1 < q+1; \\
 \quad \text{(b2) } N \geq 6 \text{ e } p > \frac{N-2}{2}, \text{ suponha } \frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1; \\
 \quad \text{(b3) } N = 3, 4, 5 \text{ e } \frac{2}{N-2} < p < \frac{N}{N-2}, \text{ suponha } q-p < s+1 < q+1; \\
 \quad \text{(b4) } N = 3, 4, 5 \text{ e } p \geq \frac{N}{N-2}, \text{ suponha } \frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1.
 \end{array} \right\} \quad (H)$$

Observe que no caso biarmônico, isto é, no caso $p = 1$, a hipótese (H) é reduzida à hipótese sobre $s+1$ do Teorema 2.1, de modo que a hipótese na região não-crítica é equivalente a hipótese nas dimensões não-críticas para o problema (P_2) , enquanto as hipóteses relativas as regiões críticas correspondem a hipótese nas dimensões críticas para o problema (P_2) .

Também vale ressaltar que hipóteses semelhantes a (H) foram introduzidas em [12, eq. (0.6)] para estudar o problema

$$-\Delta u = \lambda u^{s-1} + u^{2^*-1}, \quad u > 0 \quad \text{em } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{sobre } \partial\Omega.$$

e em [19, §7 e §8] e [20, Section 3] para estudar

$$-\Delta_p u = \lambda u^{s-1} + u^{p^*-1}, \quad u > 0 \quad \text{em } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{sobre } \partial\Omega.$$

Teorema 3.3. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, $\mu_1(\Omega)$ primeiro autovalor do problema (3). Então, sob a hipótese (H), o problema (P_3) admite uma solução clássica $u \in \mathcal{C}^4(\Omega) \cap \mathcal{C}^2(\overline{\Omega})$ satisfazendo $u, -\Delta u > 0$ em Ω .*

Na Seção 3.3, onde faremos a demonstração do Lema 3.19 ficará claro onde a condição sob a perturbação $s + 1$ de cada linha na hipótese (H) é necessária; mais especificamente, para cada dimensão $N \geq 3$ a condição sob a perturbação $s + 1$ nas regiões críticas e não-críticas da hipérbole crítica, quando esta última existir. Como consequência direta dos Lemas 3.18 e 3.19, e do teorema clássico do passo da montanha [6], obtivemos um resultado de existência de solução para o problema (P_3) .

É importante destacar que o Teorema 3.3 inclui todos os resultados em [24, Theorem 2] para o sistema (S_3) , uma vez que [24, Theorem 2] trata o caso particular $s = 1$ e que, neste caso, nossa hipótese (H) é equivalente as hipóteses em [24]. Também acreditamos ser mais natural trabalhar com (S_3) com $s = \frac{1}{p}$ em lugar de $s = 1$.

No Capítulo 3 também apresentamos alguns resultados que descrevem propriedades qualitativas das soluções de energia mínima do problema (P_3) ; cf. Teorema 3.6.

Ainda no Capítulo 3, indicamos o que devem ser as regiões crítica e não-crítica da hipérbole crítica associada ao sistema

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda |v|^{\frac{1}{q}-1} u + |v|^{p-1} v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu |u|^{\frac{1}{p}-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (S_1)$$

Por fim, no **Capítulo 4** estudamos a existência de múltiplas soluções para o problema (P_3) no caso em que a perturbação $|u|^{s-1}u$ tem a mesma homogeneidade do operador $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u)$, isto é, no caso $s = 1/p$. Mais precisamente, dedicamos este capítulo ao estudo de múltiplas soluções para o problema de quarta-ordem

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u) = \mu |u|^{\frac{1}{p}-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P'_3)$$

satisfazendo

$$u, -\Delta u > 0 \quad \text{em } \Omega,$$

onde Ω é um domínio suave limitado de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 6$, $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, onde $\mu_1(\Omega)$ é dado por (3) e (p, q) pertence a região não-crítica da hipérbole crítica dada pela Definição 3.1 (a). Novamente, relacionamos o número de soluções do problema (P'_3) com a topologia do domínio Ω , mais precisamente, com a sua categoria de Lusternik-Schnirelman, trabalhando mais uma vez como o parâmetro $\mu > 0$ suficientemente pequeno.

Teorema 4.1. *Sejam Ω um domínio limitado suave de $\mathbb{R}^N$ e (p, q) um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) . Então existe $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$, $\mu_1(\Omega)$ dado por (3), tal que, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, o problema (P'_3) possui, no mínimo, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas.*

Neste quarto capítulo aplicamos um procedimento semelhante àquele aplicado no Capítulo 1 para obter múltiplas soluções para o problema (P'_3) . De fato, o caso $p = 1$ no problema (P'_3) torna-se o problema (P_1) , e a hipótese $\frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} \leq p$ do Teorema 4.1 é reduzida a $N \geq 8$ (dimensões não-críticas para o biarmônico). Entretanto, ao trabalharmos agora no espaço de Banach $W^{2, \frac{p+1}{p}}(\Omega) \cap W_0^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega)$ em vez do espaço de Hilbert $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, algumas dificuldades extras surgem.

Uma diferença a ser citada é a hipótese (4.18) necessária para a demonstração do Lema de concentração e compacidade 4.4, que é dispensável no Lema de concentração e compacidade 1.4, este último usado nos Capítulos 1 e 2. Com essa hipótese adicional, foram necessários alguns resultados complementares, ver Lemas 4.5 e 4.12, para que o Lema 4.4 pudesse ser aplicado. Outro fato a ser destacado é que, enquanto foi possível, nos Capítulos 1 e 2, aplicarmos um princípio de comparação válido para o operador biarmônico sob a condição de fronteira de Navier, neste quarto capítulo fizemos uso de um argumento de energia, juntamente com o resultado de regularidade Teorema 3.8, para obtermos a positividade das múltiplas soluções; cf. Lema 4.2.

Finalizamos esta tese com o **Apêndice A**, no qual fazemos uma análise sobre os caminhos que caracterizam o nível do passo da montanha do funcional I_μ dado em (4), e assim concluir que o ponto crítico $u \in E(\Omega)$ do funcional I_μ obtido através dessa geometria pode ser tomado, a menos de substituir u por $-u$, de modo que $u, -\Delta u \geq 0$, apresentando assim uma maneira alternativa para concluir a positividade de u e $-\Delta u$ no Teorema 3.3. Ressaltamos que com este argumento não é necessário considerar $\mu > 0$ pequeno.

Multiplicidade de soluções para o problema (P_1)

Neste capítulo provamos a existência de múltiplas soluções clássicas para o problema de quarta-ordem envolvendo o operador biarmônico

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u + u^{2_*-1} & \text{em } \Omega, \\ u, -\Delta u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_1)$$

onde Ω é um domínio limitado em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, $2_* = 2N/(N-4)$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, onde $\mu_1(\Omega)$ é o primeiro autovalor de

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.1)$$

Teorema 1.1. *Se Ω é um domínio suave limitado em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, então existe $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$ tal que, para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$, o problema (P_1) possui, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas.*

1.1 Preliminares

Primeiramente, fixaremos algumas notações. Consideramos o espaço $E(\Omega) := H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ munido da norma $\|u\| := |\Delta u|_2$, que por sua vez é induzida pelo produto interno

$$\langle u, v \rangle = \int_{\Omega} \Delta u \Delta v dx, \quad u, v \in E(\Omega). \quad (1.2)$$

Nesta parte, temos as seguintes hipóteses: $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, é um domínio suave limitado e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$.

Considere a constante de Sobolev da imersão $E(\Omega) \hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$, dada por

$$S(\Omega) = \inf \left\{ \int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx; u \in E(\Omega), \int_{\Omega} |u|^{2^*} dx = 1 \right\}. \quad (1.3)$$

É sabido que $S(\Omega)$ não depende de Ω e $S(\Omega)$ nunca é atingido, exceto quando $\Omega = \mathbb{R}^N$ [46]. Mais ainda, $S(\Omega) = S$, onde

$$S = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^2 dx; u \in \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{2^*} dx = 1 \right\}, \quad (1.4)$$

que é atingido precisamente pelas funções $S^{\frac{4-N}{8}} \varphi_{\delta,a}$, com

$$\varphi_{\delta,a}(x) = \frac{[(N-4)(N-2)N(N+2)]^{\frac{N-4}{8}} \delta^{\frac{N-4}{2}}}{(\delta^2 + |x-a|^2)^{\frac{N-4}{2}}} = \frac{C_N \delta^{\frac{N-4}{2}}}{(\delta^2 + |x-a|^2)^{\frac{N-4}{2}}}, \quad (1.5)$$

para todo $a \in \mathbb{R}^N$ e $\delta > 0$ [21, Lemma 1]. Lembramos também que as funções dadas por (1.5) são precisamente as soluções positivas e regulares da equação

$$\Delta^2 u = u^{2^*-1} \quad \text{em } \mathbb{R}^N.$$

Defina, para $\mu \in (0, \mu_1(\Omega))$, a norma

$$\|u\|_{\mu} := (|\Delta u|_2^2 - \mu |u|_2^2)^{1/2}, \quad \forall u \in E(\Omega), \quad (1.6)$$

e observe a equivalência

$$\|u\|_{\mu} \leq \|u\| \leq c(\Omega) \|u\|_{\mu}, \quad \forall u \in E(\Omega), \quad (1.7)$$

onde $c(\Omega) = \left(1 - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)}\right)^{-1/2} > 0$.

Para estudar a existência de soluções para o problema (P_1) , consideramos o funcional

$$I(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx - \frac{\mu}{2} \int_{\Omega} (u^+)^2 dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Omega} (u^+)^{2_*} dx, \quad u \in E(\Omega). \quad (1.8)$$

Definição 1.2. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, um domínio suave e limitado e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Dizemos que $u \in E(\Omega)$ é uma solução fraca do problema (P_1) se u é um ponto crítico de I , isto é, $u \in E(\Omega)$ satisfaz*

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta v dx = \mu \int_{\Omega} (u^+) v dx + \int_{\Omega} (u^+)^{2_*-1} v dx, \quad \forall v \in E(\Omega). \quad (1.9)$$

Lema 1.3. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, um domínio suave e limitado e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então as soluções clássicas $C^4(\overline{\Omega})$ de (P_1) são precisamente os pontos críticos não triviais do funcional I definido em (1.8).*

Demonstração. Os resultados em [46, Appendix B], [2, Theorem 12.7] e [22, Theorems 2.19 e 2.20] garantem que os pontos críticos não triviais de I são precisamente as soluções clássicas de (P_1) . Argumentamos como em [14, p. 375] para provar que todo ponto crítico não trivial de I satisfaz $u, -\Delta u > 0$ em Ω : se u é ponto crítico não trivial de I , então u satisfaz (1.9), para todo $v \in E(\Omega)$. Como $-\Delta : E(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ é um isomorfismo isométrico [23, Chapter 9] temos

$$\int_{\Omega} \Delta u(-w) dx = \mu \int_{\Omega} (u^+) [(-\Delta)^{-1} w] dx + \int_{\Omega} (u^+)^{2^*-1} [(-\Delta)^{-1} w] dx, \quad \forall w \in L^2(\Omega),$$

e $(-\Delta)^{-1} w \geq 0$, para todo $w \in L^2(\Omega)$, $w \geq 0$. Dessa maneira,

$$\int_{\Omega} \Delta u(-w) dx \geq 0, \quad \forall w \geq 0,$$

e portanto $-\Delta u \geq 0$ e consequentemente $u \geq 0$. Sendo u não trivial, segue do princípio do máximo forte que $u, -\Delta u > 0$ em Ω . $\square$

Estudar o funcional I é equivalente a estudar o funcional

$$I_{\mu}(u) := \int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx - \mu \int_{\Omega} (u^+)^2 dx, \quad (1.10)$$

restrito a variedade

$$V := \{u \in E(\Omega); \psi(u) = 1\} \quad \text{onde} \quad \psi(u) := \int_{\Omega} (u^+)^{2^*} dx. \quad (1.11)$$

Também definimos

$$m(\mu, \Omega) := \inf\{I_{\mu}(u); u \in V\} \quad (1.12)$$

e, se $\Omega = B_{\rho}(0)$, denotamos $m(\mu, \rho) := m(\mu, B_{\rho}(0))$.

Provaremos que o funcional $I_{\mu}|_V$ possui, pelo menos, tantos pontos críticos quanto a categoria de Lusternik-Schnirelman de Ω , que a menos de multiplicação por constantes apropriadas serão soluções clássicas para o problema (P_1) .

1.2 Compacidade

O próximo lema descreve a falta de compacidade da imersão de $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ em $L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$. Um resultado similar para a imersão de $\mathcal{D}^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ em $L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$ é provado em [49, Lemma 1.40]; ver também [7, 9, 29].

Lema 1.4 (Concentração e compacidade). *Seja $(u_n) \subset \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ uma sequência tal que*

$$u_n \rightharpoonup u \text{ em } \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N), \quad (1.13)$$

$$|\Delta(u_n - u)|^2 \xrightarrow{*} \lambda \text{ no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N, \quad (1.14)$$

$$|u_n - u|^{2*} \xrightarrow{*} \nu \text{ no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N, \quad (1.15)$$

$$u_n \rightarrow u \text{ q.t.p. em } \mathbb{R}^N. \quad (1.16)$$

Defina

$$\lambda_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx, \quad \nu_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |u_n|^{2*} dx.$$

Temos então

$$\|\nu\|^{2/2*} \leq S^{-1} \|\lambda\|, \quad (1.17)$$

$$\nu_\infty^{2/2*} \leq S^{-1} \lambda_\infty, \quad (1.18)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\Delta u_n|_2^2 = |\Delta u|_2^2 + \|\lambda\| + \lambda_\infty, \quad (1.19)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |u_n|_{2*}^{2*} = |u|_{2*}^{2*} + \|\nu\| + \nu_\infty. \quad (1.20)$$

Mais ainda, se $u = 0$ e $\|\nu\|^{2/2*} = S^{-1} \|\lambda\|$, então λ e ν estão concentradas em um único ponto em comum.

Demonstração. Ver Seção 1.4. □

Lema 1.5. *Suponha $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Toda sequência (PS) para I é limitada.*

Demonstração. Segue de argumentos padrões, pois

$$\|u\|_\mu = \left(\int_\Omega |\Delta u|^2 dx - \mu \int_\Omega (u^+)^2 dx \right)^{1/2}, \quad u \in E(\Omega),$$

é uma norma em $E(\Omega)$ e $2_* > 2$. □

Lema 1.6. *Suponha $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Toda sequência $(u_n) \subset E(\Omega)$ tal que*

$$I(u_n) \rightarrow d < c^* := \frac{2}{N} S^{N/4} \quad \text{e} \quad I'(u_n) \rightarrow 0$$

admite uma subsequência convergente, onde I é dado em (1.8).

Demonstração. Do Lema 1.5 segue que, a menos de subsequência,

$$u_n \rightharpoonup u \text{ em } E(\Omega), \quad u_n \rightarrow u \text{ em } L^2(\Omega) \quad \text{e} \quad u_n \rightarrow u \text{ q.t.p. em } \Omega.$$

Para todo $\varphi \in E(\Omega)$ temos

$$\int_\Omega \Delta u_n \Delta \varphi dx - \mu \int_\Omega (u_n^+) \varphi dx = \int_\Omega (u_n^+)^{2*-1} \varphi dx + o_n(1). \quad (1.21)$$

Da imersão contínua $E(\Omega) \hookrightarrow L^{2*}(\Omega)$, (u_n^+) é limitada em $L^{2*}(\Omega)$ e consequentemente $((u_n^+)^{2*-1})$ é limitada em $L^{\frac{2*}{2*-1}}(\Omega)$; temos também $u_n^+ \rightarrow u^+$ q.t.p. em Ω . Portanto, como uma consequência do lema de Brezis-Lieb, ver por exemplo [27, Lemma 4.8], $(u_n^+)^{2*-1} \rightharpoonup (u^+)^{2*-1}$ em $L^{\frac{2*}{2*-1}}(\Omega)$, e obtemos

$$\int_{\Omega} (u_n^+)^{2*-1} \varphi dx \rightarrow \int_{\Omega} (u^+)^{2*-1} \varphi dx, \quad \forall \varphi \in L^{2*}(\Omega), \quad (1.22)$$

em particular, (1.22) é válido para todo $\varphi \in E(\Omega)$. De $u_n \rightarrow u$ em $L^2(\Omega)$ obtemos

$$\int_{\Omega} (u_n^+) \varphi dx \rightarrow \int_{\Omega} (u^+) \varphi dx, \quad \forall \varphi \in E(\Omega). \quad (1.23)$$

Agora, como $u_n \rightharpoonup u$ em $E(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \Delta u_n \Delta \varphi dx =: \langle u_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle u, \varphi \rangle := \int_{\Omega} \Delta u \Delta \varphi dx, \quad \forall \varphi \in E(\Omega). \quad (1.24)$$

Dessa maneira, fazendo $n \rightarrow \infty$ em (1.21) e usando (1.22)-(1.24) concluímos que

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta \varphi dx - \mu \int_{\Omega} (u^+) \varphi dx = \int_{\Omega} (u^+)^{2*-1} \varphi dx, \quad \forall \varphi \in E(\Omega), \quad (1.25)$$

ou seja, u é uma solução fraca do problema

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu(u^+) + (u^+)^{2*-1} & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

e, argumentando como no Lema 1.3, fazendo uso do princípio do máximo fraco, concluímos que $u, -\Delta u \geq 0$ em Ω .

Fazendo $\varphi = u$ em (1.25) obtemos

$$|\Delta u|_2^2 - \mu |u^+|_2^2 = |u^+|_{2*}^{2*} \quad (1.26)$$

e

$$I(u) = \frac{1}{2} [|\Delta u|_2^2 - \mu |u^+|_2^2] - \frac{1}{2*} |u^+|_{2*}^{2*} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2*} \right) |u^+|_{2*}^{2*} \geq 0. \quad (1.27)$$

Fazendo agora $v_n = u_n - u$, ver [49, p. 33], o lema de Brezis-Lieb [11] nos fornece

$$|u_n^+|_{2*}^{2*} = |u^+|_{2*}^{2*} + |v_n^+|_{2*}^{2*} + o_n(1). \quad (1.28)$$

De $u_n \rightarrow u$ em $L^2(\Omega)$, temos também

$$|u_n^+|_2^2 = |u^+|_2^2 + |v_n^+|_2^2 + o_n(1). \quad (1.29)$$

Usando (1.28) e (1.29) temos

$$I(u_n) = \frac{1}{2} |\Delta u_n|_2^2 - \frac{\mu}{2} |u_n^+|_2^2 - \frac{1}{2*} |u_n^+|_{2*}^{2*} = I(u) + \frac{1}{2} |\Delta v_n|_2^2 - \frac{\mu}{2} |v_n^+|_2^2 - \frac{1}{2*} |v_n^+|_{2*}^{2*} + o_n(1),$$

pois $v_n \rightharpoonup 0$ em $E(\Omega)$. Assumindo que $I(u_n) \rightarrow d < c^*$, obtemos

$$I(u) + \frac{1}{2}|\Delta v_n|_2^2 - \frac{\mu}{2}|v_n^+|_2^2 - \frac{1}{2_*}|v_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow d. \quad (1.30)$$

Usando novamente (1.28) e (1.29)

$$\begin{aligned} I'(u_n)u_n &= |\Delta u_n|_2^2 - \mu|u_n^+|_2^2 - |u_n^+|_{2_*}^{2_*} \\ &= |\Delta v_n|_2^2 + 2\langle v_n, u \rangle + |\Delta u|_2^2 - \mu|u^+|_2^2 - \mu|v_n^+|_2^2 - |u^+|_{2_*}^{2_*} - |v_n^+|_{2_*}^{2_*} + o_n(1) \end{aligned}$$

e como $I'(u_n)u_n \rightarrow 0$, concluímos, agora usando (1.26), que

$$|\Delta v_n|_2^2 - \mu|v_n^+|_2^2 - |v_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow |\Delta u|_2^2 - \mu|u^+|_2^2 - |u^+|_{2_*}^{2_*} = 0.$$

Dessa forma, podemos assumir que

$$|\Delta v_n|_2^2 - \mu|v_n^+|_2^2 \rightarrow b \quad \text{e} \quad |v_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow b.$$

Como $v_n \rightarrow 0$ em $L^2(\Omega)$, em particular, $v_n^+ \rightarrow 0$ em $L^2(\Omega)$. Então segue que $|\Delta v_n|_2^2 \rightarrow b$. Da definição de S , temos

$$|\Delta v_n|_2^2 \geq S|v_n|_2^2 \geq S|v_n^+|_{2_*}^{2_*}$$

o que implica $b \geq Sb^{\frac{2}{2_*}} = Sb^{\frac{N-4}{N}}$. Assim, ou $b = 0$ ou $b \geq S^{\frac{N}{4}}$. De (1.30),

$$I(u) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2_*}\right)b = I(u) + \frac{2}{N}b = d$$

e de (1.27), $d \geq \frac{2}{N}b$. Se $b \geq S^{\frac{N}{4}}$ então

$$c^* = \frac{2}{N}S^{\frac{N}{4}} \leq \frac{2}{N}b \leq d < c^*,$$

uma contradição. Portanto, $b = 0$, e a prova está completa, pois

$$\|u_n - u\|^2 = \|v_n\|^2 = |\Delta v_n|_2^2 \rightarrow 0, \quad \text{isto é,} \quad u_n \rightarrow u \quad \text{em} \quad E(\Omega). \quad \square$$

Lema 1.7. *Suponha $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Toda sequência $(u_n) \subset V$ tal que*

$$I_\mu(u_n) \rightarrow c < S, \quad \|I'_\mu(u_n)\|_* \rightarrow 0, \quad (1.31)$$

admite uma subsequência convergente, onde $\|\cdot\|_$ denota a norma da derivada de $I_\mu|_V$, e é dada por*

$$\|I'_\mu(u)\|_* = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|I'_\mu(u) - \lambda \psi'(u)\|, \quad \forall u \in V.$$

Demonstração. Se (u_n) satisfaz (1.31), então

$$0 \leq I_\mu(u_n) \rightarrow c,$$

$$\|I'_\mu(u_n)\|_* = \|I'_\mu(u_n) - \bar{\lambda}_n \psi'(u_n)\| \rightarrow 0, \quad \bar{\lambda}_n \in \mathbb{R}.$$

Então, existe $(\sigma_n) \subset [0, +\infty)$, $\sigma_n \rightarrow 0$ tal que

$$\left| \int_{\Omega} \Delta u_n \Delta w dx - \mu \int_{\Omega} (u_n^+) w dx - \lambda_n \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*-1} w dx \right| \leq \sigma_n \|w\|, \quad \forall w \in E(\Omega), \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

A sequência (u_n) é limitada em $E(\Omega)$. De fato,

$$\|u_n\|^2 = \|u_n\|^2 - \mu |u_n^+|_2^2 + \mu |u_n^+|_2^2 = c + o_n(1) + \mu |u_n^+|_2^2,$$

e da imersão contínua de $L^{2^*}(\Omega)$ em $L^2(\Omega)$, segue que (u_n) é limitada em $E(\Omega)$. Dessa maneira

$$\left| \int_{\Omega} [\Delta u_n]^2 - \mu (u_n^+)^2 dx - \lambda_n \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*} dx \right| \leq \sigma_n \|u_n\| \quad \Rightarrow \quad I_{\mu}(u_n) - \lambda_n \rightarrow 0,$$

isto é, $\lambda_n \rightarrow c \geq 0$.

Se $c = 0$, então

$$\begin{aligned} 0 \leq \left(1 - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)}\right) \|u_n\|^2 &= \|u_n\|^2 - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)} \|u_n\|^2 \leq \|u_n\|^2 - \mu |u_n^+|^2 \leq \|u_n\|^2 - \mu |u_n^+|^2 \\ &= I_{\mu}(u_n) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

e (u_n) converge forte para 0 em $E(\Omega)$.

Se $c > 0$, então $\lambda_n > 0$ para n suficientemente grande. Faça $v_n = \lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n$. Tomando I dado por (1.8) temos

$$\begin{aligned} I(v_n) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left[|\Delta(\lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n)|^2 - \mu (\lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n^+)^2 \right] dx - \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} (\lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n^+)^{2^*} dx \\ &= \frac{1}{2} \lambda_n^{\frac{2}{2^*-2}} I_{\mu}(u_n) - \frac{1}{2^*} \lambda_n^{\frac{2^*}{2^*-2}} \rightarrow \frac{1}{2} c^{\frac{2}{2^*-2}} c - \frac{1}{2^*} c^{\frac{2^*}{2^*-2}} = \frac{2}{N} c^{\frac{N}{4}} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} |I'(v_n)w| &= \left| \int_{\Omega} [\Delta(\lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n) \Delta w - \mu (\lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n^+) w] dx - \int_{\Omega} (\lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} u_n^+)^{2^*-1} w dx \right| \\ &= \lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} \left| \int_{\Omega} [\Delta u_n \Delta w - \mu (u_n^+) w - \lambda_n (u_n^+)^{2^*-1} w] dx \right| \leq \lambda_n^{\frac{1}{2^*-2}} \sigma_n \|w\|, \quad \forall w \in E(\Omega). \end{aligned}$$

Portanto

$$I(v_n) \rightarrow \frac{2}{N} c^{\frac{N}{4}} < \frac{2}{N} S^{\frac{N}{4}} = c^* \quad \text{e} \quad I'(v_n) \rightarrow 0.$$

Do Lema 1.6, (v_n) admite uma subsequência convergente, e então (u_n) também admite uma subsequência convergente. $\square$

1.3 Multiplicidade de soluções

Primeiramente, recordaremos um resultado clássico da teoria de categoria de Lusternik-Schnirelman [30].

Teorema 1.8. [49, Theorem 5.20] *Sejam X um espaço de Banach, $\varphi \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$, $\psi \in \mathcal{C}^2(X, \mathbb{R})$, $V = \{v \in X; \psi(v) = 1\}$, e suponha que para todo $v \in V$, $\psi'(v) \neq 0$. Se $\varphi|_V$ é limitado inferiormente e satisfaz a condição $(PS)_c$ para todo $c \in [\inf_V \varphi, d]$, então $\varphi|_V$ possui um mínimo e o conjunto $\varphi^d := \{v \in V; \varphi(v) \leq d\}$ possui, pelo menos, $\text{cat}_{\varphi^d}(\varphi^d)$ pontos críticos de $\varphi|_V$.*

No nosso contexto, $X = E(\Omega)$, $\psi(u) = \int_{\Omega} (u^+)^{2^*} dx$ e $\varphi = I_{\mu}$.

Lema 1.9. *Sejam $N \geq 8$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Existe $v \in E(\Omega) \setminus \{0\}$, com $v > 0$ em Ω tal que*

$$\frac{\|v\|_{\mu}^2}{|v|_{2_*}^2} = \frac{|\Delta v|_2^2 - \mu|v|_2^2}{|v|_{2_*}^2} < S. \quad (1.32)$$

Demonstração. Ver Seção 1.5. □

Lema 1.10. *Se $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ e $N \geq 8$, então*

$$m(\mu, \Omega) < S$$

e existe $u \in V$, tal que $u, -\Delta u > 0$ em Ω e $I_{\mu}(u) = m(\mu, \Omega)$, com $m(\mu, \Omega)$ como definido em (1.12).

Demonstração. Do Lema 1.9, existe $v \in E(\Omega) \setminus \{0\}$ não-negativa tal que

$$\frac{|\Delta v|_2^2 - \mu|v|_2^2}{|v|_{2_*}^2} < S.$$

Fazendo $w = v/|v|_{2_*}$, temos $w \in V$ e

$$I_{\mu}(w) = |\Delta w|_2^2 - \mu|w^+|_2^2 = |\Delta w|_2^2 - \mu|w|_2^2 = \frac{|\Delta v|_2^2 - \mu|v|_2^2}{|v|_{2_*}^2} < S,$$

e portanto

$$m(\mu, \Omega) = \inf_{u \in V} I_{\mu}(u) \leq I_{\mu}(w) < S.$$

Do Lema 1.7, $I_{\mu}|_V$ satisfaz a condição $(PS)_c$, com $c = m(\mu, \Omega)$. Pelo Teorema 1.8, $I_{\mu}|_V$ possui um mínimo, isto é, existe $u \in V$ tal que

$$I_{\mu}(u) = m(\mu, \Omega) = \min_{u \in V} I_{\mu}(u).$$

Agora mostraremos que $u, -\Delta u > 0$ em Ω . Como u é tal que

$$|u^+|_{2_*}^{2^*} = 1, \quad I_{\mu}(u) = |\Delta u|_2^2 - \mu|u^+|_2^2 = m(\mu, \Omega) > 0,$$

segue do teorema dos multiplicadores de Lagrange que u satisfaz

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta v dx = \mu \int_{\Omega} (u^+) v dx + m(\mu, \Omega) \int_{\Omega} (u^+)^{2^*-1} v dx, \quad \forall v \in E(\Omega).$$

Logo,

$$\int_{\Omega} \Delta u(-w) dx = \mu \int_{\Omega} (u^+) [(-\Delta)^{-1} w] dx + m(\mu, \Omega) \int_{\Omega} (u^+)^{2^*-1} [(-\Delta)^{-1} w] dx, \quad \forall w \in L^2(\Omega),$$

e $(-\Delta)^{-1} w \geq 0$, para todo $w \in L^2(\Omega)$, $w \geq 0$. Assim,

$$\int_{\Omega} \Delta u(-w) dx \geq 0, \quad \forall w \geq 0,$$

e então, do princípio do máximo fraco, $-\Delta u \geq 0$ e consequentemente $u \geq 0$. Como u é não trivial e, a menos de multiplicação por constante, é ponto crítico do funcional I dado em (1.8), segue agora do Lema 1.3 que $u, -\Delta u > 0$ em Ω . $\square$

Lema 1.11. *Se Ω_1 e Ω_2 são domínios regulares limitados de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 8$, tais que $\Omega_1 \subset\subset \Omega_2$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega_2)$, então $m(\mu, \Omega_1) > m(\mu, \Omega_2)$.*

Demonstração. Primeiro, recordamos que $\mu_1(\Omega_2) < \mu_1(\Omega_1)$. Seja $u \in E(\Omega_1)$ uma função tal que $u, -\Delta u > 0$ em Ω e

$$\int_{\Omega_1} (u^+)^{2^*} dx = 1, \quad \int_{\Omega_1} [|\Delta u|^2 - \mu(u^+)^2] dx = m(\mu, \Omega_1),$$

e tome w solução de

$$\begin{cases} -\Delta w = \widetilde{-\Delta u} & \text{em } \Omega_2, \\ w = 0 & \text{sobre } \partial\Omega_2, \end{cases}$$

onde $\sim$ denota a extensão por zero fora de Ω_1 . Note que $w > 0$ em Ω_2 e $w > u$ em Ω_1 . Fazendo $\bar{w} = \frac{w}{|w|_{2^*, \Omega_2}}$, temos $|\bar{w}^+|_{2^*, \Omega_2} = 1$ e

$$\begin{aligned} m(\mu, \Omega_2) &\leq \int_{\Omega_2} [|\Delta \bar{w}|^2 - \mu(\bar{w}^+)^2] dx = \frac{1}{|w|_{2^*, \Omega_2}^2} \int_{\Omega_2} [|\Delta w|^2 - \mu(w^+)^2] dx \\ &< \int_{\Omega_2} [|\Delta w|^2 - \mu(w^+)^2] dx < \int_{\Omega_1} [|\Delta u|^2 - \mu(u^+)^2] dx = m(\mu, \Omega_1). \end{aligned}$$

$\square$

Lema 1.12. *Se $\Omega = B_\rho(0) \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 8$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, então $m(\mu, \rho)$ é atingido por uma função u tal que $u, -\Delta u > 0$ em $B_\rho(0)$ e $u, -\Delta u$ são radialmente simétricas. Mais ainda, tal solução u é única.*

Demonstração. Seja u uma função tal que $u, -\Delta u > 0$ em $B_\rho(0)$ e que realiza $m(\mu, \rho)$. Denote por u^* e $(-\Delta u)^*$ as simetrizações de Schwarz de u e $-\Delta u$, respectivamente. Se v é a solução de

$$\begin{cases} -\Delta v = (-\Delta u)^* & \text{em } B_\rho(0), \\ v = 0 & \text{sobre } \partial B_\rho(0), \end{cases}$$

então $v = u^*$. Provaremos que $u = v$. De [5], ver também [10, Lemma 2.8], temos $v \geq u^*$ e

$$|v > u^*| = 0 \Leftrightarrow -\Delta u = (-\Delta u)^*.$$

Se $|v > u^*| > 0$, escreva $w = \frac{v}{|v|_{2_*}}$. Logo, $|w^+|_{2_*} = 1$ e

$$\begin{aligned} m(\mu, \rho) &\leq \int_{B_\rho(0)} [|\Delta w|^2 - \mu(w^+)^2] dx = \frac{1}{|v|_{2_*}^2} \int_{B_\rho(0)} [|\Delta v|^2 - \mu(v^+)^2] dx \\ &< \frac{1}{|v|_{2_*}^2} \int_{B_\rho(0)} [|(-\Delta u)^*|^2 - \mu(u^*)^2] dx < \frac{1}{|u^*|_{2_*}^2} \int_{B_\rho(0)} [|(-\Delta u)^*|^2 - \mu(u^*)^2] dx \\ &= \frac{1}{|u^+|_{2_*}^2} \int_{B_\rho(0)} [|-\Delta u|^2 - \mu(u^+)^2] dx = m(\mu, \rho), \end{aligned}$$

uma contradição. Dessa maneira, $-\Delta u = (-\Delta u)^*$ e como u e v são soluções do problema

$$\begin{cases} -\Delta w = (-\Delta u)^* & \text{em } B_\rho(0), \\ w = 0 & \text{sobre } \partial B_\rho(0), \end{cases}$$

segue que $u = v$.

Finalmente, mencionamos que a unicidade de u pode ser provada argumentando como em [17, Section 3] através do princípio da comparação para funções radiais [31]. $\square$

Defina agora a aplicação baricentro $\beta : V \rightarrow \mathbb{R}^N$ por

$$\beta(u) = \frac{\int_{\Omega} |\Delta u|^2 x dx}{\int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx}. \quad (1.33)$$

Lema 1.13. *Se $(u_n) \subset V$ é tal que $\|u_n\|^2 = |\Delta u_n|_2^2 \rightarrow S$, então $\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) \rightarrow 0$.*

Demonstração. Suponha, por contradição, que $\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) \not\rightarrow 0$. Logo, existe $r > 0$ tal que, a menos de subsequência,

$$\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) > r.$$

Escreva $v_n = u_n / |\Delta u_n|_2 \in E(\Omega)$ e w_n como o potencial Newtoniano de $|\widetilde{-\Delta v_n}|$, onde $\sim$ denota a extensão por zero fora de Ω . Então, de [23, Theorem 9.9], segue que $w_n \in \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ e

$$-\Delta w_n = |\widetilde{-\Delta v_n}| \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N. \quad (1.34)$$

Em particular, (w_n) é uma sequência limitada em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$. Logo, a menos de subsequência,

$$w_n \rightharpoonup w \quad \text{em } \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N),$$

$$|\Delta(w_n - w)|^2 \xrightarrow{*} \lambda \quad \text{no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N,$$

$$|w_n - w|^{2_*} \xrightarrow{*} \nu \quad \text{no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N,$$

$$w_n \rightarrow w \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N.$$

Do Lema 1.4, levando em conta que $\lambda_\infty = \nu_\infty = 0$ (pois Ω é limitado) e $w_n \geq |\widetilde{v_n}|$ em $\mathbb{R}^N$,

$$1 = |\Delta w|_2^2 + \|\lambda\|, \quad (1.35)$$

$$\frac{1}{S^{2_*/2}} \leq |w|_{2_*}^{2_*} + \|\nu\|, \quad (1.36)$$

e

$$\|\nu\|^{2/2_*} \leq \frac{1}{S}\|\lambda\|, \quad |w|_{2_*}^2 \leq \frac{1}{S}|\Delta w|_2^2. \quad (1.37)$$

Segue que o par $(|\Delta w|_2^2, \|\lambda\|) \in \{(1, 0), (0, 1)\}$. De fato, de (1.36) e (1.37)

$$\frac{1}{S^{2_*/2}} \leq |w|_{2_*}^{2_*} + \|\nu\| \leq \frac{1}{S^{2_*/2}}[|\Delta w|_2^{2_*} + \|\lambda\|^{2_*/2}],$$

isto é,

$$|\Delta w|_2^{2_*} + \|\lambda\|^{\frac{2_*}{2}} \geq 1. \quad (1.38)$$

De (1.35), (1.38) e como $2_*/2 > 1$, obtemos que o par $(|\Delta w|_2^2, \|\lambda\|) \in \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Suponha agora que $|\Delta w|_2^2 = 1$ e $\|\lambda\| = 0$. Logo, de (1.37), $\|\nu\| = 0$, o que implica, de (1.36),

$$\frac{1}{S} \leq |w|_{2_*}^2 \leq \frac{1}{S}|\Delta w|_2^2 = \frac{1}{S}$$

e então $|\Delta w|_2^2/|w|_{2_*}^2 = S$. Assim, a menos de multiplicação, w é uma solução não-trivial e não-negativa para a equação

$$\Delta^2 w = w^{2_*-1} \quad \text{em } \mathbb{R}^N,$$

e então, $w, -\Delta w > 0$ em $\mathbb{R}^N$. Entretanto, para todo $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ temos

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n - \Delta w|^2 \varphi dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} \varphi d\lambda = 0,$$

o que implica, em particular,

$$\int_{\Omega} |\Delta w_n - \Delta w|^2 \varphi dx + \int_{\mathbb{R}^N \setminus \Omega} |\Delta w|^2 \varphi dx \rightarrow 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N \setminus \Omega),$$

e então $-\Delta w = 0$ em $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$, o que gera uma contradição.

Dessa maneira, $|\Delta w|_2^2 = 0$ (e de (1.37), segue que $w = 0$) e $\|\lambda\| = 1$. De (1.36) e (1.37), obtemos $\|\nu\|^{2/2_*} = S^{-1}\|\lambda\|$. Dessa maneira, do Lema 1.4, segue que a medida λ está concentrada em um único ponto $y \in \mathbb{R}^N$.

Afirmamos agora que $y \in \overline{\Omega}$. De fato, suponha por contradição que $y \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$. Tome $\psi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi \equiv 1$ em $B_R(y)$, para algum $R > 0$, e $\text{supp}(\psi) \cap \overline{\Omega} = \emptyset$. Então,

$$1 = \lambda(\{y\}) = \int_{\mathbb{R}^N} \psi d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi |\Delta w_n|^2 dx = 0,$$

o que é claramente uma contradição. Portanto, $y \in \overline{\Omega}$ e tomando $\eta \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\eta \equiv 1$ em $\overline{\Omega}$, temos

$$\begin{aligned} \beta(u_n) &= \frac{\int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx}{\int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx} = \int_{\Omega} |\Delta v_n|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n|^2 x \eta(x) dx \\ &\rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} x \eta(x) d\lambda = y \eta(y) = y \in \overline{\Omega}, \end{aligned}$$

o que contradiz a nossa hipótese inicial $\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) \not\rightarrow 0$. □

Sem perda de generalidade, podemos assumir que $0 \in \Omega$. Seja $r > 0$ suficientemente pequeno tal que

$$\Omega_r^+ := \{x \in \mathbb{R}^N; \text{dist}(x, \overline{\Omega}) \leq r\} \quad \text{e} \quad \Omega_r^- := \{x \in \Omega; \text{dist}(x, \partial\Omega) \geq r\}$$

sejam homotopicamente equivalentes a Ω e tais que $B_r(0) \subset \Omega$. Definimos também o conjunto

$$I_\mu^{m(\mu, r)} := \{u \in V; I_\mu(u) \leq m(\mu, r)\},$$

que é não-vazio; ver Lema 1.11.

Lema 1.14. *Existe $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$ tal que, para $0 < \mu < \bar{\mu}$,*

$$u \in I_\mu^{m(\mu, r)} \Rightarrow \beta(u) \in \Omega_r^+.$$

Demonstração. Se $u \in V$, então segue da desigualdade de Hölder

$$|u^+|_2^2 \leq |u^+|_{2_*}^2 |\Omega|^{\frac{2_*-2}{2_*}} = |\Omega|^{4/N}. \quad (1.39)$$

Do Lema 1.13, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$u \in V, \quad \|u\|^2 \leq S + \varepsilon \Rightarrow \beta(u) \in \Omega_r^+.$$

Faça $\bar{\mu} := \varepsilon/|\Omega|^{4/N}$, para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno tal que $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$. Logo, se $0 < \mu < \bar{\mu}$ e $u \in I_\mu^{m(\mu, r)}$, obtemos, de (1.39) e Lema 1.10,

$$\begin{aligned} \|u\|^2 &= \|u\|^2 - \mu|u^+|_2^2 + \mu|u^+|_2^2 = I_\mu(u) + \mu|u^+|_2^2 \leq m(\mu, r) + \bar{\mu}|u^+|_2^2 \\ &< S + \frac{\varepsilon}{|\Omega|^{\frac{4}{N}}} |\Omega|^{\frac{4}{N}} = S + \varepsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\beta(u) \in \Omega_r^+$. □

Seja $\bar{\mu}$ como no Lema 1.14. Para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$ definimos $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow I_\mu^{m(\mu, r)}$ por

$$\begin{aligned} \gamma_\mu(y) : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \gamma_\mu(y)(x) = \frac{w_y(x)}{|w_y|_{2_*}}, \end{aligned} \quad (1.40)$$

onde w_y é solução para o problema

$$\begin{cases} -\Delta w_y = z_y & \text{em } \Omega, \\ w_y = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad \text{com} \quad z_y(x) = \begin{cases} -\Delta v_\mu(x-y), & \text{se } x \in B_r(y), \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus B_r(y), \end{cases}$$

onde, ver Lema 1.12, v_μ é radialmente simétrica com respeito a origem, $v_\mu, -\Delta v_\mu > 0$ in $B_r(0)$ e

$$\int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{2_*} dx = 1, \quad \int_{B_r(0)} [|\Delta v_\mu|^2 - \mu(v_\mu^+)^2] dx = m(\mu, r).$$

Observação 1.15. *Argumentando como na prova do Lema 1.3, obtemos $v_\mu \in C^4(\overline{B_r(0)})$.*

Lema 1.16. *Seja $0 < \mu < \bar{\mu}$, onde $\bar{\mu}$ é dado pelo Lema 1.14. Então $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow I_\mu^{m(\mu, r)}$ é bem definida, contínua e*

$$(\beta \circ \gamma_\mu)(y) = y, \quad \forall y \in \Omega_r^-. \quad (1.41)$$

Demonstração. Primeiramente, observe que [23, Theorem 9.15] garante que $\gamma_\mu(y) \in E(\Omega)$ e, pelo princípio do máximo forte, temos $w_y(x) > v_\mu(x - y)$, para todo $x \in B_r(y)$ e $y \in \Omega_r^-$. Então

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx &= \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^2 dx, \quad \int_{\Omega} |w_y|^2 dx > \int_{B_r(0)} |v_\mu|^2 dx \\ \text{e} \quad \int_{\Omega} |w_y|^{2^*} dx &> \int_{B_r(0)} |v_\mu|^{2^*} dx = 1. \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} I_\mu(\gamma_\mu(y)) &= I_\mu\left(\frac{w_y(x)}{|w_y|_{2^*}}\right) = \frac{1}{|w_y|_{2^*}^2} \left[\int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx - \mu \int_{\Omega} (w_y^+)^2 dx \right] \\ &< \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx - \mu \int_{\Omega} (w_y^+)^2 dx \leq \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^2 dx - \mu \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^2 dx = m(\mu, r), \end{aligned}$$

ou seja, $\gamma_\mu(y) \in I_\mu^{m(\mu, r)}$ para todo $y \in \Omega_r^-$ e daí $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow I_\mu^{m(\mu, r)}$ está bem definida.

A continuidade de γ_μ é uma consequência da regularidade de v_μ . Para provar que γ_μ é contínua, é suficiente mostrar que $\bar{\gamma}_\mu : \Omega_r^- \rightarrow E(\Omega)$, definida por $\bar{\gamma}_\mu(y)(x) = w_y(x)$, é contínua. Se $y_n \rightarrow y$ em Ω_r^- , então

$$\begin{aligned} \|\bar{\gamma}_\mu(y_n) - \bar{\gamma}_\mu(y)\|^2 &= \|\Delta(\bar{\gamma}_\mu(y_n) - \bar{\gamma}_\mu(y))\|_2^2 = \|\Delta w_{y_n} - \Delta w_y\|_2^2 = \|z_{y_n} - z_y\|_2^2 \\ &= \|z_{y_n}\|_2^2 - 2 \int_{\Omega} z_{y_n}(x) z_y(x) dx + \|z_y\|_2^2 \\ &= 2 \left[\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz - \int_{\Omega} z_{y_n}(x) z_y(x) dx \right] \rightarrow 0, \end{aligned}$$

pois $\Delta v_\mu : \overline{B_r(0)} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua.

Finalmente, para todo $y \in \Omega_r^-$

$$\begin{aligned} (\beta \circ \gamma_\mu)(y) &= \frac{\int_{\Omega} \left| \Delta \left(\frac{w_y}{|w_y|_{2^*}} \right) \right|^2 x dx}{\int_{\Omega} \left| \Delta \left(\frac{w_y}{|w_y|_{2^*}} \right) \right|^2 dx} = \frac{\int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 x dx}{\int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx} = \frac{\int_{B_r(y)} |\Delta v_\mu(x - y)|^2 x dx}{\int_{B_r(y)} |\Delta v_\mu(x - y)|^2 dx} \\ &= \frac{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 (z + y) dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz} = \frac{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 z dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz} + \frac{y \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz} \\ &= y, \end{aligned}$$

pois Δv_μ é radialmente simétrica. □

Lema 1.17. *Se $N \geq 8$ e $0 < \mu < \bar{\mu}$, onde $\bar{\mu}$ é dado pelo Lema 1.14, então $\text{cat}_{I_\mu^{m(\mu,r)}}(I_\mu^{m(\mu,r)}) \geq \text{cat}_\Omega(\Omega)$.*

Demonstração. Se $\text{cat}_{I_\mu^{m(\mu,r)}}(I_\mu^{m(\mu,r)}) = \infty$, então nada a fazer. Se $\text{cat}_{I_\mu^{m(\mu,r)}}(I_\mu^{m(\mu,r)}) = n$, então

$$I_\mu^{m(\mu,r)} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n,$$

onde A_j é fechado e contrátil em $I_\mu^{m(\mu,r)}$, para todo $j = 1, \dots, n$. Para cada $j = 1, \dots, n$, sejam $h_j : [0, 1] \times A_j \rightarrow I_\mu^{m(\mu,r)}$ aplicação contínua tal e $w_j \in I_\mu^{m(\mu,r)}$ tais que

$$h_j(0, u) = u, \quad h_j(1, u) = w_j, \quad \forall u \in A_j. \quad (1.42)$$

Considere $B_j = \gamma_\mu^{-1}(A_j)$, onde γ_μ é dada por (1.40). Os conjuntos B_j são fechados e $\Omega_r^- = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$. Defina, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, a deformação

$$\begin{aligned} g_j : [0, 1] \times B_j &\longrightarrow \Omega_r^+ \\ (t, y) &\longmapsto g_j(t, y) = \beta(h_j(t, \gamma_\mu(y))). \end{aligned}$$

Pelo Lema 1.14, a deformação g_j está bem definida, e de (1.41) e (1.42)

$$g_j(0, y) = \beta(h_j(0, \gamma_\mu(y))) = \beta(\gamma_\mu(y)) = y, \quad \forall y \in B_j,$$

$$g_j(1, y) = \beta(h_j(1, \gamma_\mu(y))) = \beta(w_j), \quad \forall y \in B_j.$$

Portanto, os conjuntos B_j são contráteis em Ω_r^+ , donde

$$\text{cat}_\Omega(\Omega) = \text{cat}_{\Omega_r^+}(\Omega_r^-) \leq n = \text{cat}_{I_\mu^{m(\mu,r)}}(I_\mu^{m(\mu,r)}). \quad \square$$

Conclusão da prova do Teorema 1.1

Dos Lemas 1.7 e 1.10, para $c \leq m(\mu, \Omega) < m(\mu, r) < S$, $I_\mu|_V$ satisfaz a condição $(PS)_c$. Pelo Teorema 1.8, com $d = m(\mu, r)$, segue que $I_\mu^{m(\mu,r)}$ possui, no mínimo, $\text{cat}_{I_\mu^{m(\mu,r)}}(I_\mu^{m(\mu,r)})$ pontos críticos de $I_\mu|_V$. Então, pelo Lema 1.17, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, segue que $I_\mu|_V$ possui, pelo menos, $n = \text{cat}_\Omega(\Omega)$ diferentes pontos críticos, digamos $v_1, \dots, v_n \in V$.

Para cada $j = 1, \dots, n$, existe $\lambda_j \in \mathbb{R}$ tal que v_j satisfaz

$$\begin{cases} \Delta^2 v_j = \mu(v_j^+)^{2^*-1} & \text{em } \Omega, \\ v_j, \Delta v_j = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Como $v_j \in V$ temos $v_j \neq 0$, e

$$\lambda_j = \lambda_j \int_\Omega (v_j^+)^{2^*} dx = I_\mu(v_j) = \int_\Omega [|\Delta v_j|^2 - \mu(v_j^+)^2] dx > 0.$$

Portanto, para cada $j = 1, \dots, n$, segue que $u_j := \lambda_j^{1/(2^*-2)} v_j$ é uma solução não-trivial de

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u^+ + (u^+)^{2^*-1} & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.43)$$

ou seja, u_j é um ponto crítico de I . Como $v_j \neq v_i$ se $j \neq i$, segue que $u_j \neq u_i$ se $j \neq i$. Por fim, aplicamos o Lema 1.3 para finalizar essa demonstração. $\square$

1.4 Prova do Lema 1.4

Demonstração.

Caso particular: $u = 0$. Provaremos (1.17) e (1.18), e que λ e ν são concentradas em um único ponto em comum.

Para cada $h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, obtemos de (1.4) que

$$\left(\int_{\mathbb{R}^N} |hu_n|^{2^*} dx \right)^{2/2^*} \leq S^{-1} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta(hu_n)|^2 dx. \quad (1.44)$$

Usando (1.14) e (1.15) temos

$$\left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^{2^*} |u_n|^{2^*} dx \right)^{2/2^*} \rightarrow \left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^{2^*} d\nu \right)^{2/2^*} \quad (1.45)$$

e

$$\int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 |\Delta u_n|^2 dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 d\lambda. \quad (1.46)$$

Note que

$$\Delta(hu_n) - h\Delta u_n = u_n\Delta h + 2\nabla h \cdot \nabla u_n. \quad (1.47)$$

Temos

$$|u_n\Delta h|_2^2 = \int_{B_R(0)} |\Delta h|^2 |u_n|^2 dx \leq C \int_{B_R(0)} |u_n|^2 dx,$$

onde $R > 0$ é tal que $\text{supp}(h) \subset \overline{B}_R(0)$ e $C = \max_{\overline{B}_R(0)} |\Delta h|^2$. Então

$$|u_n\Delta h|_2^2 \rightarrow 0, \quad (1.48)$$

pois $u_n \rightarrow 0$ em $L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)$. Temos também

$$|\nabla h \cdot \nabla u_n|_2^2 \leq \int_{B_R(0)} |\nabla h|^2 |\nabla u_n|^2 dx \leq \overline{C} \int_{B_R(0)} |\nabla u_n|^2 dx,$$

onde $\overline{C} = \max_{\overline{B}_R(0)} |\nabla h|^2$, e consequentemente

$$|\nabla h \cdot \nabla u_n|_2^2 \rightarrow 0, \quad (1.49)$$

pois $\nabla u_n \rightarrow 0$ em $[L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)]^N$. De (1.47)-(1.49) segue que

$$\begin{aligned} ||\Delta(hu_n)|_2 - |h\Delta u_n|_2| &\leq |\Delta(hu_n) - h\Delta u_n|_2 = |u_n\Delta h + 2\nabla h \cdot \nabla u_n|_2 \\ &\leq |u_n\Delta h|_2 + 2|\nabla h \cdot \nabla u_n|_2 \rightarrow 0, \end{aligned}$$

isto é,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta(hu_n)|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |h\Delta u_n|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 d\lambda.$$

Portanto, de (1.44)-(1.45) obtemos

$$\left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^{2^*} d\nu \right)^{2/2^*} \leq S^{-1} \int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 d\lambda. \quad (1.50)$$

Tomando agora uma sequência $(h_n) \subset \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$h_n \equiv 1 \text{ em } B_n(0), \quad \text{supp}(h_n) \subset B_{n+1}(0), \quad 0 \leq h_n \leq 1,$$

segue do teorema da convergência dominada que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |h_n|^{2^*} d\nu = \int_{\mathbb{R}^N} 1 d\nu = \|\nu\| \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |h_n|^2 d\lambda = \int_{\mathbb{R}^N} 1 d\lambda = \|\lambda\|.$$

Assim, obtemos (1.17) usando (h_n) em (1.50) e fazendo $n \rightarrow \infty$.

Agora procederemos para provar (1.18). Fixe $R > 0$ e seja $\psi_R \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi_R(x) = 1$ para $|x| \geq R+1$, $\psi_R(x) = 0$ para $|x| \leq R$ e $0 \leq \psi_R \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$. Da desigualdade de Sobolev,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\psi_R u_n|^{2^*} dx \right)^{2/2^*} \leq S^{-1} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta(\psi_R u_n)|^2 dx. \quad (1.51)$$

Temos

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^N} |u_n \Delta \psi_R|^2 dx \leq \int_{|x| \leq R+1} |\Delta \psi_R|^2 |u_n|^2 dx \leq C_R \int_{|x| \leq R+1} |u_n|^2 dx,$$

onde $C_R = \max_{\overline{B}_{R+1}(0)} |\Delta \psi_R|^2$, e

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla \psi_R \cdot \nabla u_n|^2 dx \leq \int_{|x| \leq R+1} |\nabla \psi_R|^2 |\nabla u_n|^2 dx \leq D_R \int_{|x| \leq R+1} |\nabla u_n|^2 dx,$$

onde $D_R = \max_{\overline{B}_{R+1}(0)} |\nabla \psi_R|^2$. Dessa maneira

$$||\Delta(\psi_R u_n)|_2 - |\psi_R \Delta u_n|_2| \leq |u_n \psi_R|_2 + |2 \nabla \psi_R \cdot \nabla u_n|_2 \rightarrow 0,$$

pois $u_n, \nabla u_n \rightarrow 0$ em $L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)$, $[L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)]^N$, respectivamente. De (1.51) concluimos que

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^N} \psi_R^{2^*} |u_n|^{2^*} dx \right)^{2/2^*} \leq S^{-1} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi_R^2 |\Delta u_n|^2 dx. \quad (1.52)$$

Por outro lado, temos

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u_n|^2 \psi_R^2 dx = \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 \psi_R^2 dx \leq \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx$$

e

$$\int_{|x| \geq R+1} |u_n|^{2^*} dx = \int_{|x| \geq R+1} |u_n|^{2^*} \psi_R^{2^*} dx \leq \int_{\mathbb{R}^N} |u_n|^{2^*} \psi_R^{2^*} dx$$

e de (1.52) segue que

$$\nu_\infty^{2/2^*} = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{|x| \geq R+1} |u_n|^{2^*} dx \right)^{2/2^*} \leq S^{-1} \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx \right) = S^{-1} \lambda_\infty,$$

o que prova (1.18).

Suponha agora que $\|\nu\|^{2/2_*} = S^{-1}\|\mu\|$. Mostraremos que λ e ν são concentradas em um único ponto em comum. Dada $h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ temos, de (1.50),

$$\left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^{2_*} d\nu \right)^{1/2_*} \leq S^{-\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 d\lambda \right)^{1/2}, \quad (1.53)$$

e da desigualdade de Hölder obtemos

$$\int_{\mathbb{R}^N} |h|^{2_*} d\nu \leq S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 d\lambda, \quad \forall h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N), \quad (1.54)$$

o que implica

$$\nu(\Omega) \leq S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\Omega), \quad \forall \Omega \subset \mathbb{R}^N \text{ mensurável.}$$

Provaremos agora que $\nu(\Omega) = S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\Omega)$, para todo $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ mensurável. Suponha que existe $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^N$ tal que $\nu(\Omega_0) < S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\Omega_0)$. Por hipótese, $\|\nu\|^{2/2_*} = S^{-1}\|\lambda\|$, o que implica

$$\nu(\mathbb{R}^N) = S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\mathbb{R}^N). \quad (1.55)$$

Note então que

$$\begin{aligned} \nu(\mathbb{R}^N) &= \nu(\Omega_0) + \nu(\mathbb{R}^N \setminus \Omega_0) < S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\Omega_0) + S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\mathbb{R}^N \setminus \Omega_0) \\ &= S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} [\lambda(\Omega_0) + \lambda(\mathbb{R}^N \setminus \Omega_0)] = S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\mathbb{R}^N), \end{aligned}$$

contradizendo (1.55). Segue de (1.53), $\nu(\Omega) = S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda(\Omega)$ e $\|\nu\|^{2/2_*} = S^{-1}\|\lambda\|$ que

$$\left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^{2_*} d\nu \right)^{1/2_*} \|\nu\|^{2/N} \leq \left(\int_{\mathbb{R}^N} |h|^2 d\nu \right)^{1/2}, \quad \forall h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N).$$

Logo, para cada conjunto aberto $\Omega \subset \mathbb{R}^N$,

$$\nu(\Omega)^{1/2_*} \nu(\mathbb{R}^N)^{2/N} \leq \nu(\Omega)^{1/2}.$$

Como $\frac{1}{2} - \frac{1}{2_*} = \frac{2}{N}$, temos

$$\nu(\Omega) = 0 \quad \text{ou} \quad \nu(\Omega) \geq \nu(\mathbb{R}^N), \quad \text{para todo conjunto aberto } \Omega \subset \mathbb{R}^N.$$

Portanto, ν é concentrada em único ponto, que é o mesmo ponto em que λ está concentrada, pois $\nu = S^{-2_*/2} \|\lambda\|^{4/(N-4)} \lambda$.

Caso geral: u não é necessariamente nula e provaremos (1.17)-(1.20).

Escreva $v_n := u_n - u$. Logo, $v_n \rightharpoonup 0$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, $|\Delta v_n|^2 \xrightarrow{*} \lambda$ e $|v_n|^{2_*} \xrightarrow{*} \nu$ no sentido das medidas em $\mathbb{R}^N$, e $v_n \rightarrow 0$ q.t.p. em $\mathbb{R}^N$, e dessa maneira, do caso estudado anteriormente, (1.17) é válido.

Temos

$$\begin{aligned} \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx &= \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n + \Delta u|^2 dx \\ &= \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n|^2 dx + 2 \int_{|x| \geq R} \Delta v_n \Delta u dx + \int_{|x| \geq R} |\Delta u|^2 dx, \end{aligned}$$

o que implica

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n|^2 dx + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} \Delta v_n \Delta u dx + \int_{|x| \geq R} |\Delta u|^2 dx$$

e, como $v_n \rightharpoonup 0$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, concluímos que

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n|^2 dx + \int_{|x| \geq R} |\Delta u|^2 dx. \quad (1.56)$$

Logo, (1.56) implica que

$$\lambda_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^2 dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n|^2 dx.$$

Pelo lema de Brezis-Lieb [11],

$$\int_{|x| \geq R} |u|^{2^*} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{|x| \geq R} |u_n|^{2^*} dx - \int_{|x| \geq R} |v_n|^{2^*} dx \right),$$

e então

$$\nu_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |u_n|^{2^*} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |v_n|^{2^*} dx.$$

Do caso particular estudado anteriormente, segue (1.18).

Agora procederemos para provar (1.19). Primeiramente, afirmamos que

$$|\Delta u_n|^2 \xrightarrow{*} \lambda + |\Delta u|^2. \quad (1.57)$$

De fato, da identidade $|\Delta u_n|^2 = |\Delta v_n + \Delta u|^2 = |\Delta v_n|^2 + 2\Delta v_n \Delta u + |\Delta u|^2$, temos

$$\int_{\mathbb{R}^N} \varphi |\Delta u_n|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^N} \varphi |\Delta v_n|^2 dx + 2 \int_{\mathbb{R}^N} \Delta v_n \Delta u \varphi dx + \int_{\mathbb{R}^N} \varphi |\Delta u|^2 dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^N).$$

Como $v_n \rightharpoonup 0$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ e $|\Delta v_n|^2 \xrightarrow{*} \lambda$, obtemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \varphi |\Delta u_n|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^N} \varphi d\lambda + \int_{\mathbb{R}^N} \varphi |\Delta u|^2 dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^N),$$

que é precisamente (1.57).

Fixe $R > 0$ e seja $\psi_R \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi_R(x) = 1$ para $|x| \geq R + 1$, $\psi_R(x) = 0$ para $|x| \leq R$ e $0 \leq \psi_R \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$. De (1.57) temos

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u_n|^2 dx = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi_R |\Delta u_n|^2 dx + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) d\lambda + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) |\Delta u|^2 dx.$$

Tomando agora $R \rightarrow \infty$, segue do teorema da convergência dominada que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u_n|^2 dx = \lambda_\infty + \int_{\mathbb{R}^N} 1 d\lambda + \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^2 dx$$

e dessa maneira

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\Delta u_n|_2^2 = |\Delta u|_2^2 + \|\lambda\| + \lambda_\infty.$$

Para provar (1.20), primeiramente observe que

$$|u_n|^{2*} \xrightarrow{*} \nu + |u|^{2*}. \quad (1.58)$$

De fato, para todo $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^N)$ temos, do lema de Brezis-Lieb [11] aplicado a f^+ e f^- ,

$$\int_{\mathbb{R}^N} f |u|^{2*} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^N} f |u_n|^{2*} dx - \int_{\mathbb{R}^N} f |v_n|^{2*} dx \right),$$

de onde (1.58) segue, pois $|v_n|^{2*} \xrightarrow{*} \nu$.

Fixe $R > 0$ e seja $\psi_R \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi_R(x) = 1$ para $|x| \geq R + 1$, $\psi_R(x) = 0$ para $|x| \leq R$ e $0 \leq \psi_R \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$. Então,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |u_n|^{2*} dx = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi_R |u_n|^{2*} dx + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) d\nu + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) |u|^{2*} dx.$$

Tomando $R \rightarrow \infty$, segue do teorema da convergência dominada que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |u_n|^{2*} dx = \nu_\infty + \int_{\mathbb{R}^N} 1 d\nu + \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{2*} dx$$

e assim

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |u_n|_{2*}^{2*} = |u|_{2*}^{2*} + \|\nu\| + \nu_\infty.$$

□

1.5 Prova do Lema 1.9

Demonstração. Sem perda de generalidade, suponha $0 \in \Omega$. Seja $\xi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ uma função tal que $0 \leq \xi(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B(0, \rho/2)$, $\xi \equiv 0$ em $B(0, \rho)^c$, e $B(0, \rho) \subset \subset \Omega$, $\rho > 0$. Escreva

$$U_\delta(x) := \xi(x) \psi_\delta(x), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad 0 < \delta < \rho,$$

onde $\psi_\delta = S^{\frac{4-N}{8}} \varphi_\delta$ e $\varphi_\delta(x) = \varphi_{\delta,0}(x)$ é dado por (1.5). Então

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta \psi_\delta|^2 dx = S \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}^N} |\psi_\delta|^{2*} dx = 1,$$

e, ver [35, eq. (6.4) and eq. (6.3)] respectivamente, temos

$$|\Delta U_\delta|_{2,\Omega}^2 = S + O(\delta^{N-4}), \quad (1.59)$$

$$|U_\delta|_{2^*,\Omega}^2 = 1 + O(\delta^N). \quad (1.60)$$

Para obter (1.32), estimaremos $|U_\delta|_{2,\Omega}^2$. Temos

$$|U_\delta|_{2,\Omega}^2 = \int_{\Omega} |\xi(x)\psi_\delta(x)|^2 dx = \int_{B(0,\rho)} |\psi_\delta(x)|^2 dx + \int_{B(0,\rho)} [|\xi(x)|^2 - 1] |\psi_\delta(x)|^2 dx.$$

Note que

$$\begin{aligned} \int_{B(0,\rho)} [|\xi(x)|^2 - 1] |\psi_\delta(x)|^2 dx &= \int_{B(0,\rho)} [|\xi(x)|^2 - 1] |\psi_\delta(x)|^2 dx \leq \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^2 dx \\ &= \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{C\delta^{N-4}}{(\delta^2 + |x|^2)^{N-4}} dx \leq \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{C\delta^{N-4}}{|x|^{2(N-4)}} dx = O(\delta^{N-4}). \end{aligned}$$

Logo, obtemos

$$\int_{\Omega} |U_\delta(x)|^2 dx = \int_{B(0,\rho)} |\psi_\delta(x)|^2 dx + O(\delta^{N-4}). \quad (1.61)$$

Agora,

$$\int_{B(0,\rho)} |\psi_\delta(x)|^2 dx = \int_{B(0,\delta)} |\psi_\delta(x)|^2 dx + \int_{\delta < |x| < \rho} |\psi_\delta(x)|^2 dx. \quad (1.62)$$

Note que

$$\int_{B(0,\delta)} |\psi_\delta(x)|^2 dx = \int_{B(0,\delta)} \frac{C\delta^{N-4}}{(\delta^2 + |x|^2)^{N-4}} dx \geq \int_{B(0,\delta)} \frac{C\delta^{N-4}}{(2\delta^2)^{N-4}} dx = C\delta^4, \quad (1.63)$$

e

$$\begin{aligned} \int_{\delta < |x| < \rho} |\psi_\delta(x)|^2 dx &= \int_{\delta < |x| < \rho} \frac{C\delta^{N-4}}{(\delta^2 + |x|^2)^{N-4}} dx \geq \int_{\delta < |x| < \rho} \frac{C\delta^{N-4}}{(2|x|^2)^{N-4}} dx \\ &= C\delta^{N-4} \int_{\delta < |x| < \rho} \frac{1}{|x|^{2(N-4)}} dx = C\delta^{N-4} \int_{\delta}^{\rho} \int_{S_r} \frac{1}{r^{2(N-4)}} dS dr, \end{aligned}$$

o que implica

$$\int_{\delta < |x| < \rho} |\psi_\delta(x)|^2 dx \geq C\delta^{N-4} \begin{cases} \log r \Big|_{\delta}^{\rho}, & \text{se } N = 8, \\ -\frac{1}{N-8} \frac{1}{r^{N-8}} \Big|_{\delta}^{\rho}, & \text{se } N > 8. \end{cases} \quad (1.64)$$

Finalmente, combinando (1.61), (1.62), (1.63) e (1.64), concluímos que

$$|U_\delta|_{2,\Omega}^2 \geq \begin{cases} C\delta^4 |\log \delta| + O(\delta^4), & \text{se } N = 8, \\ C\delta^4 + O(\delta^{N-4}), & \text{se } N > 8. \end{cases} \quad (1.65)$$

Assim, de (1.59), (1.60) e (1.65), existe uma constante $C = C(N) > 0$ tal que

$$\frac{|\Delta U_\delta|_2^2 - \mu |U_\delta|_2^2}{|U_\delta|_{2^*}^2} \leq \begin{cases} S - \mu C\delta^4 |\log \delta| + O(\delta^4), & N = 8 \\ S - \mu C\delta^4 + O(\delta^{N-4}), & N > 8 \end{cases} < S,$$

para $N \geq 8$ e $\delta > 0$ suficientemente pequeno. $\square$

Existência e multiplicidade de soluções para o problema (P_2)

Neste capítulo estudamos a existência de múltiplas soluções clássicas para o problema de quarta-ordem

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \mu u^s + u^{2_*-1} & \text{em } \Omega, \\ u, -\Delta u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_2)$$

onde Ω é um domínio limitado suave em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, $\mu > 0$, $2 \leq s+1 < 2_*$, e $2_* = 2N/(N-4)$ é o expoente crítico da imersão de $E(\Omega) := H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ em $L^{2_*}(\Omega)$. Neste capítulo, $\mu_1(\Omega)$ denota o primeiro autovalor do problema (1.1).

Teorema 2.1. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado suave em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, e $\mu > 0$. No caso $s = 1$ suponha $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$, então (P_2) possui uma solução clássica.*

Teorema 2.2. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado suave em $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$. Suponha $2 \leq s+1 < 2_*$ se $N \geq 8$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$ para as dimensões críticas $N = 5, 6, 7$. Então existe $\bar{\mu} > 0$ tal que, para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$, o problema (P_2) possui, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas.*

2.1 Preliminares e prova do Teorema 2.1

Primeiramente, enfatizamos que grande parte dos nossos resultados preliminares são válidos para domínios suaves limitados $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ com $N \geq 5$. Esta é nossa hipótese geral. Destacaremos nesse capítulo onde as condições $N \geq 5$ ou $N \geq 8$ são suficientes.

Considere o espaço $E(\Omega) := H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, dotado com a norma $\|u\| := |\Delta u|_2$, induzida pelo produto interno

$$\langle u, v \rangle = \int_{\Omega} \Delta u \Delta v dx, \quad u, v \in E(\Omega).$$

Considere a constante de Sobolev da imersão $E(\Omega) \hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$, dada por (1.4),

$$S = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^2 dx; u \in \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{2^*} dx = 1 \right\},$$

que é atingido precisamente pelas funções $S^{\frac{4-N}{8}} \varphi_{\delta,a}$, com

$$\varphi_{\delta,a}(x) = \frac{[(N-4)(N-2)N(N+2)]^{\frac{N-4}{8}} \delta^{\frac{N-4}{2}}}{(\delta^2 + |x-a|^2)^{\frac{N-4}{2}}} = \frac{C_N \delta^{\frac{N-4}{2}}}{(\delta^2 + |x-a|^2)^{\frac{N-4}{2}}}, \quad (2.1)$$

para $a \in \mathbb{R}^N$ e $\delta > 0$ [21, Lemma 1].

Para estudar a existência de soluções para o problema (P_2) , consideramos o funcional

$$I_{\mu}(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega} (u^+)^{s+1} dx - \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} (u^+)^{2^*} dx, \quad u \in E(\Omega), \quad (2.2)$$

e a variedade de Nehari associada ao funcional I_{μ} , dada por

$$\mathcal{N}_{\mu} := \{u \in E(\Omega) \setminus \{0\}; I'_{\mu}(u)u = 0\}. \quad (2.3)$$

Definição 2.3. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$ um domínio suave limitado, $2 \leq s+1 < 2^*$ e $\mu > 0$. Dizemos que $u \in E(\Omega)$ é uma solução fraca de (P_2) se u é um ponto crítico de I_{μ} , isto é, u satisfaz*

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta v dx = \mu \int_{\Omega} (u^+)^s v dx + \int_{\Omega} (u^+)^{2^*-1} v dx, \quad \forall v \in E(\Omega).$$

Lema 2.4. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, um domínio suave e limitado, $2 \leq s+1 < 2^*$ e $\mu > 0$. Então as soluções clássicas $\mathcal{C}^4(\overline{\Omega})$ de (P_2) são precisamente os pontos críticos do funcional I_{μ} definido em (2.2).*

Demonstração. A equivalência entre os pontos críticos não triviais de I_{μ} e as soluções clássicas de (P_2) seguem de [46, Appendix B], [2, Theorem 12.7] e [22, Theorems 2.19 e 2.20]. O princípio do máximo forte para operadores elípticos de segunda ordem é aplicado, como em [14, p. 375], para reescrever (P_2) como

$$\begin{cases} -\Delta u = v, & -\Delta v = \mu(u^+)^s + (u^+)^{2^*-1} \quad \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 \quad \text{sobre } \partial\Omega, & u \neq 0 \quad \text{em } \Omega, \end{cases}$$

e então provar que todo ponto crítico não trivial de I_{μ} satisfaz $u, -\Delta u > 0$ em Ω . $\square$

Lema 2.5. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, um domínio suave e limitado. No caso $2 < s + 1 < 2_*$ consideramos $\mu > 0$ e, no caso $s = 1$, consideramos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então o funcional I_μ satisfaz a geometria do passo da montanha em torno do seu mínimo local em zero, com o associado nível do passo da montanha*

$$c_\mu = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0,1]} I_\mu(\gamma(t)),$$

onde

$$\Gamma = \{\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega)); \gamma(0) = 0, I_\mu(\gamma(1)) < 0\}.$$

Mais ainda,

$$c_\mu = \tilde{c}_\mu = \hat{c}_\mu, \quad (2.4)$$

onde

$$\tilde{c}_\mu = \inf_{u \in E(\Omega) \setminus \{0\}} \max_{t \geq 0} I_\mu(tu) \quad \text{e} \quad \hat{c}_\mu = \inf_{u \in \mathcal{N}_\mu} I_\mu(u), \quad (2.5)$$

onde $\mathcal{N}_\mu$ é dada por (2.3).

Demonstração. A prova de que I_μ satisfaz a geometria do passo da montanha é feita usando argumentos padrões e será aqui omitida. Argumentando como [40, Proposition 3.11] prova-se a igualdade (2.4). $\square$

Lema 2.6. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, um domínio suave e limitado. No caso $2 < s + 1 < 2_*$ consideramos $\mu > 0$ e, no caso $s = 1$, consideramos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então I_μ satisfaz a condição $(PS)_c$ para todo $c < \frac{2}{N}S^{N/4}$. Mais ainda, se $N \geq 8$ e $2 \leq s + 1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s + 1 < 2_*$, então $c_\mu \in (0, \frac{2}{N}S^{N/4})$.*

Demonstração. A demonstração da primeira parte do lema segue de maneira análoga a do Lema 1.6. Para a segunda parte, ver Seção 2.5. $\square$

Destacamos que o próximo resultado é uma consequência direta do Lema 2.6 e do teorema clássico do passo da montanha [6]. Para um resultado para perturbações sublineares, isto é, para o caso $1 < s + 1 < 2$, mencionamos [8, Theorem 7.1].

Proposição 2.7. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, um domínio limitado suave e $\mu > 0$. No caso $s = 1$, assumimos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se $N \geq 8$ e $2 \leq s + 1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s + 1 < 2_*$, então o nível do passo da montanha c_μ é um valor crítico de I_μ , isto é, existe $u_\mu \in E(\Omega)$ tal que*

$$I_\mu(u_\mu) = c_\mu, \quad I'_\mu(u_\mu) = 0.$$

A seguir apresentamos um resultado sobre a monotonicidade de $c_\mu(\Omega)$ com respeito a Ω .

Lema 2.8. *Sejam $N \geq 5$, $\mu > 0$ para $2 < s + 1 < 2_*$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ para $s = 1$. Se Ω_1 e Ω_2 são domínios regulares limitados em $\mathbb{R}^N$ tais que $\Omega_1 \subset \Omega_2$ e $\mu > 0$, então $c_{\mu, \Omega_1} \geq c_{\mu, \Omega_2}$. Mais ainda, se $\Omega_1 \subset \subset \Omega_2$ e se assumimos as hipóteses extras*

$$N \geq 8 \quad \text{e} \quad 2 \leq s + 1 < 2_*; \quad \text{ou} \quad N = 5, 6, 7 \quad \text{e} \quad 2_* - 2 < s + 1 < 2_*,$$

então temos a desigualdade estrita $c_{\mu,\Omega_1} > c_{\mu,\Omega_2}$. Aqui, $c_\mu(\Omega)$ é como definido em (2.4) e adicionamos o subíndice Ω para enfatizar sua dependência no domínio considerado.

Demonstração. Primeiramente, observe que o conjunto

$$\Gamma_\Omega = \{\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega)); \gamma(0) = 0, I_\mu(\gamma(1)) < 0\}$$

usado para definir $c_{\mu,\Omega}$ pode ser substituído pelo seu subconjunto

$$\bar{\Gamma}_\Omega = \{\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega)); \gamma(0) = 0, I_\mu(\gamma(1)) < 0, -\Delta(\gamma(t))(x) \geq 0 \ \forall t \in [0, 1], \text{ q.t.p. } x \in \Omega\},$$

e note que, pelo princípio do máximo, se $\gamma \in \bar{\Gamma}_\Omega$ então $\gamma(t)(x), -\Delta(\gamma(t))(x) \geq 0$ para todo $t \in [0, 1]$ e q.t.p. $x \in \Omega$. De fato, dado $\gamma \in \Gamma_\Omega$, seja para cada $t \in [0, 1]$ o elemento $\bar{\gamma}(t) \in E(\Omega)$ definido pelas soluções de

$$\begin{cases} -\Delta(\bar{\gamma}(t)) = |\Delta(\gamma(t))| & \text{em } \Omega, \\ \bar{\gamma}(t) = \Delta(\bar{\gamma}(t)) = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Então $\bar{\gamma} \in \bar{\Gamma}_\Omega$ e $I_\mu(\bar{\gamma}(t)) \leq I_\mu(\gamma(t))$ pois, pelo princípio do máximo, $\bar{\gamma}(t)(x) \geq |\gamma(t)(x)|$ para todo $t \in [0, 1]$, q.t.p. $x \in \Omega$.

Dada uma função u definida em Ω_1 , denotamos por $\tilde{u}$ a função definida em Ω_2 por

$$\tilde{u}(x) = u(x) \quad \text{se } x \in \Omega_1 \quad \text{e} \quad \tilde{u}(x) = 0 \quad \text{se } x \in \Omega_2 \setminus \Omega_1.$$

Agora, dada $\gamma \in \bar{\Gamma}_{\Omega_1}$ definimos $\hat{\gamma} \in \bar{\Gamma}_{\Omega_2}$ escrevendo, para cada $t \in [0, 1]$, a solução de

$$\begin{cases} -\Delta(\hat{\gamma}(t)) = -\widetilde{\Delta\gamma(t)} & \text{em } \Omega_2, \\ \hat{\gamma}(t) = 0 & \text{sobre } \partial\Omega_2. \end{cases}$$

Então, pelo princípio do máximo, segue que $\hat{\gamma}(t)(x) \geq \widetilde{\gamma(t)}(x)$ para todo $t \in [0, 1]$ e q.t.p. $x \in \Omega_2$. Portanto

$$\begin{aligned} c_{\mu,\Omega_1} &= \inf_{\gamma \in \bar{\Gamma}_{\Omega_1}} \max_{t \in [0,1]} \frac{1}{2} \int_{\Omega_1} |\Delta\gamma(t)|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega_1} (\gamma(t))^{s+1} dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Omega_1} (\gamma(t))^{2_*} dx \\ &\geq \inf_{\gamma \in \bar{\Gamma}_{\Omega_1}} \max_{t \in [0,1]} \frac{1}{2} \int_{\Omega_2} |\Delta\hat{\gamma}(t)|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega_2} (\hat{\gamma}(t))^{s+1} dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Omega_2} (\hat{\gamma}(t))^{2_*} dx \\ &\geq \inf_{\hat{\gamma} \in \bar{\Gamma}_{\Omega_2}} \max_{t \in [0,1]} \frac{1}{2} \int_{\Omega_2} |\Delta\hat{\gamma}(t)|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega_2} (\hat{\gamma}(t))^{s+1} dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Omega_2} (\hat{\gamma}(t))^{2_*} dx = c_{\mu,\Omega_2}. \end{aligned}$$

A afirmação acerca da desigualdade estrita $c_{\mu,\Omega_1} > c_{\mu,\Omega_2}$ segue da Proposição 2.7, Lema 2.4, a caracterização (2.5) para o nível do passo da montanha e, argumentamos como anteriormente, agora usando o princípio do máximo forte. $\square$

Denotamos por c_0 e $\mathcal{N}_0$ o nível do passo da montanha e a variedade de Nehari associados ao funcional

$$I_0(u) := \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Omega} (u^+)^{2_*} dx, \quad u \in E(\Omega).$$

Sem perda de generalidade, suponha $0 \in \Omega$. Seja $\xi \in \mathcal{C}_c^\infty$ uma função tal que $0 \leq \xi(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B(0, \rho/2)$, $\xi \equiv 0$ em $B(0, \rho)^c$ e $B(0, \rho) \subset \subset \Omega$, $\rho > 0$. Escreva

$$U_\delta(x) = \xi(x)\psi_\delta(x), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad 0 < \delta < \rho,$$

onde $\psi_\delta = S^{\frac{4-N}{8}}\varphi_\delta$ e $\varphi_\delta(x) = \varphi_{\delta,0}(x)$ é dada por (2.1). Temos então,

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta \psi_\delta|^2 dx = S \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}^N} |\psi_\delta|^{2^*} dx = 1,$$

e, ver [35] eq. (6.4) e eq. (6.3) respectivamente,

$$|\Delta U_\delta|_{2,\Omega}^2 = S + O(\delta^{N-4}),$$

$$|U_\delta|_{2^*,\Omega}^2 = 1 + O(\delta^N).$$

Definindo

$$V_\delta(x) = \frac{U_\delta(x)}{|U_\delta|_{2^*}}, \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad (2.6)$$

segue que

$$|\Delta V_\delta|_2^2 = S + O(\delta^{N-4}). \quad (2.7)$$

Lema 2.9. *Sejam $N \geq 5$, $\mu > 0$ para $2 < s+1 < 2_*$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ para $s = 1$. Então $c_0 = \frac{2}{N}S^{\frac{N}{4}}$.*

Demonstração. Seja V_δ a função definida em (2.6). Como $|V_\delta|_{2^*} = 1$ temos $S \leq |\Delta V_\delta|_2^2$ e de (2.7) temos

$$|\Delta V_\delta|_2^2 \rightarrow S, \quad \delta \rightarrow 0.$$

Escrevendo

$$g(t) = I_0(tV_\delta) = \frac{t^2}{2}|\Delta V_\delta|_2^2 - \frac{t^{2^*}}{2_*}|V_\delta|_{2^*}^{2^*} = \frac{t^2}{2}|\Delta V_\delta|_2^2 - \frac{t^{2^*}}{2_*},$$

note que g atinge seu máximo em $t_\delta = |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2}{2^*-2}}$. Daí,

$$c_0 = \inf_{u \in E(\Omega) \setminus \{0\}} \max_{t \geq 0} I_0(tu) \leq \max_{t \geq 0} I_0(tV_\delta) = I_0(t_\delta V_\delta) = \frac{t_\delta^2}{2}|\Delta V_\delta|_2^2 - \frac{t_\delta^{2^*}}{2_*} = \frac{2}{N}|\Delta V_\delta|_2^{\frac{2 \cdot 2_*}{2^*-2}},$$

ou seja,

$$c_0 \leq \frac{2}{N}(|\Delta V_\delta|_2^2)^{\frac{2_*}{2^*-2}} \rightarrow \frac{2}{N}S^{\frac{2_*}{2^*-2}} = \frac{2}{N}S^{\frac{N}{4}}$$

e portanto

$$c_0 \leq \frac{2}{N}S^{\frac{N}{4}}. \quad (2.8)$$

Por outro lado, seja $(u_n) \subset E(\Omega)$ tal que

$$I_0(u_n) \rightarrow c_0, \quad I'_0(u_n) \rightarrow 0.$$

A sequência (u_n) é limitada, donde, a menos de subsequência, $\|u_n\|^2 \rightarrow l > 0$. Temos também

$$I'_0(u_n)u_n = \|u_n\|^2 - |u_n^+|_{2^*}^{2^*} \rightarrow 0$$

e assim $|u_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow l$. Fazendo $v_n = u_n/|u_n|_{2_*}$, temos $|v_n|_{2_*} = 1$ e

$$S \leq |\Delta v_n|_2^2 = \frac{|\Delta u_n|_2^2}{|u_n|_{2_*}^2} \leq \frac{|\Delta u_n|_2^2}{|u_n^+|_{2_*}^2} = \frac{|\Delta u_n|_2^2}{(|u_n^+|_{2_*}^{2_*})^{2/2_*}} \rightarrow \frac{l}{l^{2/2_*}} = l^{4/N},$$

o que implica $S \leq l^{4/N}$. Note que, de

$$I_0(u_n) = \frac{1}{2} \|u_n\|^2 - \frac{1}{2_*} |u_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow c_0,$$

concluimos que $l = (N/2)c_0$; então, $S \leq [(N/2)c_0]^{4/N}$, ou seja

$$c_0 \geq \frac{2}{N} S^{\frac{N}{4}}. \quad (2.9)$$

De (2.8) e (2.9) segue o resultado. $\square$

Observação 2.10. Se Θ é um domínio limitado e regular de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, o nível do passo da montanha referente ao funcional

$$I_0(u) = \frac{1}{2} \int_{\Theta} |\Delta u|^2 dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Theta} (u^+)^{2_*} dx$$

será $(2/N)S^{N/4}$, ou seja, o nível do passo da montanha de I_0 independe do domínio Θ .

Lema 2.11. Suponha $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$. Se $\mu_n \rightarrow 0^+$ então $c_{\mu_n} \rightarrow c_0$.

Demonstração. Sabemos que $c_{\mu_n} \leq c_0$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Da Proposição 2.7, seja $(u_n) \subset E(\Omega)$ tal que

$$I_{\mu_n}(u_n) = c_{\mu_n}, \quad I'_{\mu_n}(u_n) = 0,$$

e seja $(t_n) \subset (0, \infty)$ tal que $t_n u_n \in \mathcal{N}_0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ temos

$$c_0 = \inf_{u \in E(\Omega) \setminus \{0\}} \max_{t \geq 0} I_0(tu) \leq \max_{t \geq 0} I_0(tu_n) = I_0(t_n u_n) = I_{\mu_n}(t_n u_n) + \frac{\mu_n t_n^{s+1}}{s+1} |u_n^+|_{s+1}^{s+1};$$

como $u_n \in \mathcal{N}_{\mu_n}$, então

$$I_{\mu_n}(t_n u_n) \leq \max_{t \geq 0} I_{\mu_n}(tu_n) = I_{\mu_n}(u_n) = c_{\mu_n}$$

e daí

$$c_0 \leq c_{\mu_n} + \frac{\mu_n t_n^{s+1}}{s+1} |u_n^+|_{s+1}^{s+1}. \quad (2.10)$$

Temos

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{s+1} \right) \|u_n\|^2 \leq I_{\mu}(u_n) - \frac{1}{s+1} I'_{\mu}(u_n) u_n = c_{\mu} \leq c_0,$$

e (u_n) é limitada. Mostremos que a sequência (t_n) também é limitada. Suponha, por contradição, que $t_n \rightarrow \infty$. Como $c_{\mu_n} \leq c_0$, mostra-se que (u_n) é limitada em $E(\Omega)$. De $t_n u_n \in \mathcal{N}_0$ segue que $\max_{t \geq 0} I_0(tu_n) = I_0(t_n u_n)$, ou seja, $\frac{d}{dt} I_0(tu_n)|_{t=t_n} = 0$, o que implica

$$\|u_n\|^2 = t_n^{2_*-2} |u_n^+|_{2_*}^{2_*},$$

donde $|u_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow 0$. Por interpolação, segue que $|u_n^+|_{s+1}^{s+1} \rightarrow 0$. Como $I'_{\mu_n}(u_n)u_n = 0$ temos

$$\|u_n\|^2 = \mu_n |u_n^+|_{s+1}^{s+1} + |u_n^+|_{2_*}^{2_*},$$

e daí $\|u_n\|^2 \rightarrow 0$, e de

$$c_{\mu_n} = I_{\mu_n}(u_n) = \frac{1}{2}\|u_n\|^2 - \frac{\mu_n}{s+1}|u_n^+|_{s+1}^{s+1} - \frac{1}{2_*}|u_n^+|_{2_*}^{2_*}$$

segue que $c_{\mu_n} \rightarrow 0$, um absurdo, pois

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_{\mu_n} \geq c_{\mu_1} > 0.$$

Portanto, (t_n) é limitada, e de (2.10) segue que

$$c_0 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(c_{\mu_n} + \frac{\mu_n t_n^{s+1}}{s+1} |u_n^+|_{s+1}^{s+1} \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} c_{\mu_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} c_{\mu_n} \leq c_0,$$

e portanto $\lim_{n \rightarrow \infty} c_{\mu_n} = c_0$. □

Prova do Teorema 2.1. Segue do Lema 2.4 e da Proposição 2.7. □

2.2 Um importante resultado de compacidade

Nesta seção enunciaremos e provaremos um resultado de compacidade de extrema importância para demonstração do Teorema 2.2. Para a sua demonstração, faremos uso do Lema 1.4. Através do próximo lema poderemos relacionar a categoria do conjunto Ω com a categoria de um conjunto de nível apropriado do funcional I_μ , a fim de aplicarmos o Teorema 1.8.

Lema 2.12. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio suave limitado com $N \geq 5$. Seja $(u_n) \subset E(\Omega)$ uma sequência tal que*

$$|u_n|_{2_*} \geq 1, \|u_n\|^2 = |\Delta u_n|_2^2 = S + o_n(1).$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja w_n o potencial Newtoniano de $|\widetilde{-\Delta u_n}|$, onde $\sim$ denota a extensão por zero fora de Ω . Então, existem uma sequência $(y_n, \alpha_n) \subset \mathbb{R}^N \times (0, +\infty)$ e $v \in \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ tais que

$$v_n(x) := \alpha_n^{\frac{N-4}{2}} w_n(\alpha_n x + y_n)$$

satisfaz, a menos de subsequência, $v_n \rightarrow v$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, $y_n \rightarrow y \in \overline{\Omega}$ e $\alpha_n \rightarrow 0$.

Demonstração. Lembramos que, se w_n é o potencial Newtoniano de $|\widetilde{-\Delta u_n}|$, então de [23, Theorem 9.9] segue que $w_n \in \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ e

$$-\Delta w_n = |\widetilde{-\Delta u_n}| \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N. \quad (2.11)$$

Considere as funções de concentração de Lévy dadas por

$$Q_n(\alpha) = \sup_{y \in \mathbb{R}^N} \int_{B_\alpha(y)} |w_n|^{2_*} dx, \quad \alpha > 0.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} Q_n(\alpha) = 0$, pois $|w_n|^{2^*} \in L^1(\mathbb{R}^N)$. Mais ainda, $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} Q_n(\alpha) \geq 1$, pois $w_n \geq |\widetilde{u}_n|$ em $\mathbb{R}^N$. Então, como $Q_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, existe $\alpha_n > 0$ tal que $Q_n(\alpha_n) = 1/2$ e existe $y_n \in \mathbb{R}^N$ tal que

$$\frac{1}{2} = Q_n(\alpha_n) = \sup_{y \in \mathbb{R}^N} \int_{B_{\alpha_n}(y)} |w_n|^{2^*} dx = \int_{B_{\alpha_n}(y_n)} |w_n|^{2^*} dx,$$

já que

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{B_{\alpha_n}(y)} |w_n|^{2^*} dx = 0.$$

Definindo então $v_n(x) := \alpha_n^{\frac{N-4}{2}} w_n(\alpha_n x + y_n)$ temos

$$|v_n|_{2_*} = |w_n|_{2_*} \geq |\widetilde{u}_n|_{2_*} = |u_n|_{2_*} \geq 1,$$

$$|\Delta v_n|_2^2 = |\Delta w_n|_2^2 = |\Delta u_n|_2^2 = S + o_n(1),$$

e

$$\int_{B_{\alpha_n}(y_n)} |w_n|^{2^*} dx = \int_{B_1(0)} |v_n|^{2^*} dx = \frac{1}{2} = \sup_{y \in \mathbb{R}^N} \int_{B_1(y)} |v_n|^{2^*} dx. \quad (2.12)$$

Como (v_n) é limitada em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, a menos de subsequência segue que

$$v_n \rightharpoonup v \text{ em } \mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N),$$

$$|\Delta(v_n - v)|^2 \xrightarrow{*} \lambda \text{ no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N,$$

$$|v_n - v|^{2^*} \xrightarrow{*} \nu \text{ no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N,$$

$$v_n \rightarrow v \text{ q.t.p. em } \mathbb{R}^N.$$

Do Lema 1.4 temos

$$S = |\Delta v|_2^2 + \|\lambda\| + \lambda_\infty, \quad (2.13)$$

$$1 \leq |v|_{2_*}^{2^*} + \|\nu\| + \nu_\infty, \quad (2.14)$$

e

$$\|\nu\|^{2/2_*} \leq \frac{1}{S} \|\lambda\|, \nu_\infty^{2/2_*} \leq \frac{1}{S} \lambda_\infty, |v|_{2_*}^2 \leq \frac{1}{S} |\Delta v|_2^2. \quad (2.15)$$

Segue então que $|v|_{2_*}^{2^*}, \|\nu\|, \nu_\infty \in \{0, 1\}$. De fato, de (2.13) e (2.15),

$$S = |\Delta v|_2^2 + \|\lambda\| + \lambda_\infty \geq S[(|v|_{2_*}^{2^*})^{2/2_*} + \|\nu\|^{2/2_*} + \nu_\infty^{2/2_*}],$$

isto é,

$$(|v|_{2_*}^{2^*})^{2/2_*} + \|\nu\|^{2/2_*} + \nu_\infty^{2/2_*} \leq 1. \quad (2.16)$$

Como $2/2_* < 1$, segue de (2.14) e (2.16) que

$$|v|_{2_*}^{2^*}, \|\nu\|, \nu_\infty \in \{0, 1\} \text{ e que } 1 = |v|_{2_*}^{2^*} + \|\nu\| + \nu_\infty. \quad (2.17)$$

Passo 1: Provemos que $\nu_\infty = 0$.

Pelo lema de Brezis-Lieb [11],

$$\int_{B_1(0)} |v|^{2^*} dx + \int_{B_1(0)} |v_n - v|^{2^*} dx = \int_{B_1(0)} |v_n|^{2^*} dx + o_n(1).$$

Tome $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\varphi(x) = 1$ para $x \in B_1(0)$ e $0 \leq \varphi \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$, daí

$$\int_{B_1(0)} |v|^{2^*} \varphi dx + \int_{B_1(0)} |v_n - v|^{2^*} \varphi dx = \int_{B_1(0)} |v_n|^{2^*} \varphi dx + o_n(1)$$

e então, de (2.12),

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} |v|^{2^*} \varphi dx + \int_{\mathbb{R}^N} |v_n - v|^{2^*} \varphi dx &\geq \int_{B_1(0)} |v|^{2^*} \varphi dx + \int_{B_1(0)} |v_n - v|^{2^*} \varphi dx \\ &= \int_{B_1(0)} |v_n|^{2^*} \varphi dx + o_n(1) = \frac{1}{2} + o_n(1). \end{aligned}$$

Fazendo $n \rightarrow \infty$ na última desigualdade obtemos

$$\int_{\mathbb{R}^N} |v|^{2^*} \varphi dx + \langle \nu, \varphi \rangle \geq \frac{1}{2}.$$

Dessa maneira,

$$\int_{\mathbb{R}^N} |v|^{2^*} \varphi dx + \|\nu\| \geq \int_{\mathbb{R}^N} |v|^{2^*} \varphi dx + \langle \nu, \varphi \rangle \geq \frac{1}{2},$$

o que implica $|v|_{2^*}^{2^*} + \|\nu\| \geq 1/2$. Assim, de (2.17), segue que $\nu_\infty = 0$.

Passo 2: Provemos que $\|\nu\| = 0$ e $|v|_{2^*}^{2^*} = 1$.

Por contradição, de (2.17), suponha que $v = 0$ e $\|\nu\| = 1$. Neste caso, de (2.13),

$$S = \|\lambda\| + \lambda_\infty \geq \|\lambda\| \Rightarrow S^{-1}\|\lambda\| \leq 1 = \|\nu\|^{2/2^*},$$

e de (2.15) temos $\|\nu\|^{2/2^*} = S^{-1}\|\lambda\|$. Então, do Lema 1.4, as medidas λ e ν estão concentradas em um único ponto $z \in \mathbb{R}^N$. Considere $\varphi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tais que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & |x - z| \leq 1/2, \\ 0, & |x - z| \geq 1, \\ 0 \leq \varphi(x) \leq 1, & \forall x \in \mathbb{R}^N, \end{cases} \quad \text{e} \quad \psi(x) = \begin{cases} 1, & |x - z| \leq 1, \\ 0, & |x - z| \geq 2, \\ 0 \leq \psi(x) \leq 1, & \forall x \in \mathbb{R}^N. \end{cases}$$

Obtemos então

$$\int_{B_1(z)} |v_n|^{2^*} dx \geq \int_{B_1(z)} |v_n|^{2^*} \varphi dx = \int_{\mathbb{R}^N} |v_n|^{2^*} \varphi dx \rightarrow \langle \nu, \varphi \rangle = \|\nu\| \varphi(z) = \|\nu\|$$

e

$$\int_{B_1(z)} |v_n|^{2^*} dx = \int_{B_1(z)} |v_n|^{2^*} \psi dx \leq \int_{\mathbb{R}^N} |v_n|^{2^*} \psi dx \rightarrow \langle \nu, \psi \rangle = \|\nu\| \psi(z) = \|\nu\|.$$

Daí,

$$\int_{B_1(z)} |v_n|^{2^*} dx \rightarrow \|\nu\| = 1,$$

e assim, de (2.12),

$$\frac{1}{2} = \sup_{y \in \mathbb{R}^N} \int_{B_1(y)} |v_n|^{2^*} dx \geq \int_{B_1(z)} |v_n|^{2^*} dx \rightarrow \|\nu\| = 1,$$

um absurdo.

Passo 3: Provemos que $v_n \rightarrow v$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$.

Como $|v|_{2^*} = 1$, pela definição de S , temos $S \leq |\Delta v|_2^2$ e, de (2.13),

$$S = |\Delta v|_2^2 + \|\lambda\| + \lambda_\infty \geq |\Delta v|_2^2.$$

Portanto

$$|v|_{2^*} = 1 \text{ e } |\Delta v|_2^2 = S. \quad (2.18)$$

Mostramos então que $\lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta v_n|_2^2 = S = |\Delta v|_2^2$. Como $v_n \rightharpoonup v$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, que é uniformemente convexo, segue que $v_n \rightarrow v$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$.

Passo 4: Provemos que $\alpha_n \rightarrow 0$ e $y_n \rightarrow y \in \overline{\Omega}$.

De (2.18), e a menos de multiplicação por constantes apropriadas, segue que v é uma solução não-trivial da equação

$$\Delta^2 v = v^{2^*-1} \text{ em } \mathbb{R}^N. \quad (2.19)$$

Mostremos agora que $\alpha_n \rightarrow 0$ e $y_n \rightarrow y \in \overline{\Omega}$. Primeiro provemos que (α_n) é limitada. Suponha, por contradição, que, a menos de subsequência, $\alpha_n \rightarrow \infty$. Como $u_n, \Delta u_n \in L^2(\Omega)$ e $|\Omega| < \infty$, segue que $u_n, \Delta u_n \in L^1(\Omega)$ e de (2.11) segue então que $\Delta w_n \in L^1(\mathbb{R}^N)$. Logo,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta v_n| dx = \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta(\alpha_n^{\frac{N-4}{2}} w_n(\alpha_n x + y_n))| dx = \alpha_n^{\frac{N-4}{2}} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta(w_n(\alpha_n x + y_n))| dx \\ &= \alpha_n^{\frac{N-4}{2}} \alpha_n^2 \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n(\alpha_n x + y_n)| dx = \alpha_n^{\frac{N-4}{2}} \alpha_n^2 \alpha_n^{-N} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n(z)| dz = \frac{1}{\alpha_n^{\frac{N}{2}}} |\Delta w_n|_1 \\ &\leq \frac{K}{\alpha_n^{\frac{N}{2}}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Por outro lado, $v_n \rightarrow v$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ e do lema de Fatou,

$$0 = \liminf \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta v_n| dx \geq \int_{\mathbb{R}^N} \liminf |\Delta v_n| = \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta v| dx \geq 0,$$

donde $\Delta v = 0$ em $\mathbb{R}^N$, um absurdo.

Logo, a menos de subsequência, $\alpha_n \rightarrow \alpha_0 \geq 0$. Uma vez que (α_n) é uma sequência limitada, concluímos que (y_n) também é limitada. Com efeito, suponha por contradição, que $|y_n| \rightarrow \infty$. Sendo Ω limitado, para n suficientemente grande, temos

$$\alpha_n x + y_n \notin \overline{\Omega}, \quad \forall x \in \Omega,$$

e então $\Delta w_n(\alpha_n x + y_n) = 0$, $\forall x \in \Omega$ e n suficientemente grande. Mas então $\Delta v_n(x) = \alpha_n^{N/2} \Delta w_n(\alpha_n x + y_n) = 0$, para todo $x \in \Omega$, e como $\Delta v_n \rightarrow \Delta v$ q.t.p. em $\mathbb{R}^N$, segue que

$\Delta v(x) = 0$, para todo $x \in \Omega$, uma contradição, pois v é uma solução não-trivial da equação (2.19), o que implica que $v, -\Delta v$ são simultaneamente positivas ou negativas em $\mathbb{R}^N$.

Portanto, a menos de subsequência, $y_n \rightarrow y \in \mathbb{R}^N$ e $\alpha_n \rightarrow \alpha_0 \geq 0$. Suponha agora que $\alpha_n \rightarrow \alpha_0 > 0$. Então, se $\Omega - y_n := \{x - y_n; x \in \Omega\}$,

$$\Omega_n := \frac{\Omega - y_n}{\alpha_n} \rightarrow \frac{\Omega - y}{\alpha_0} = \tilde{\Omega} \subsetneq \mathbb{R}^N.$$

Note que se $x \notin \Omega_n$ então $\Delta v_n(x) = 0$. Seja então $R > 0$ tal que $\Omega_n, \tilde{\Omega} \subset B_R(0)$, para todo n . Para $x \in B_R(0)^c$ temos $\Delta v_n(x) = 0$ para todo n , donde $\Delta v(x) = 0$, para $x \in B_R(0)^c$, uma contradição. Portanto $\alpha_n \rightarrow 0$.

Finalmente, supondo que $y \notin \bar{\Omega}$, obteríamos, para n suficientemente grande $\alpha_n x + y_n \notin \bar{\Omega}$, para todo $x \in \Omega$, e vimos que isso gera uma contradição. Portanto $y \in \bar{\Omega}$ e a prova está concluída. $\square$

2.3 Lemas Técnicos

Seja $r > 0$ suficientemente pequeno tal que

$$\Omega_r^+ := \{x \in \mathbb{R}^N; \text{dist}(x, \Omega) \leq r\}, \quad \Omega_r^- := \{x \in \Omega; \text{dist}(x, \partial\Omega) \geq r\}$$

são homotopicamente equivalentes a Ω e tal que $B_r = B_r(0) \subset \Omega$. Considere agora a aplicação $I_{\mu,r} : E(B_r) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$I_{\mu,r}(u) := \frac{1}{2} \int_{B_r} |\Delta u|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{B_r} (u^+)^{s+1} dx - \frac{1}{2_*} \int_{B_r} (u^+)^{2_*} dx,$$

onde $E(B_r) := H^2(B_r) \cap H_0^1(B_r)$, e escreva

$$\mathcal{N}_{\mu,r} := \{u \in E(B_r) \setminus \{0\}; I'_{\mu,r}(u)u = 0\}$$

e

$$m(\mu) := \inf_{u \in \mathcal{N}_{\mu,r}} I_{\mu,r}(u) = \inf_{u \in E(B_r) \setminus \{0\}} \max_{t \geq 0} I_{\mu,r}(tu).$$

Lema 2.13. *Sejam $N \geq 5$ e $\mu > 0$. No caso $s = 1$, assumimos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$, então $m(\mu)$ é atingida por uma função $u \in E(B_r)$. Mais ainda, quaisquer dessas funções satisfazem $u, -\Delta u > 0$ em B_r e $u, -\Delta u$ são radialmente simétricas.*

Demonstração. De acordo com o Lema 2.4 e a Proposição 2.7, seja $u \in E(B_r) \setminus \{0\}$ tal que $u, -\Delta u > 0$ e

$$m(\mu) = I_{\mu,r}(u) = \max_{t \geq 0} I_{\mu,r}(tu).$$

Denote por u^* e $(-\Delta u)^*$ as simetrizações de Schwarz de u e $-\Delta u$, respectivamente. Se v é a solução de

$$\begin{cases} -\Delta v = (-\Delta u)^* & \text{em } B_r, \\ v = 0 & \text{sobre } \partial B_r, \end{cases}$$

então $v = v^*$. É suficiente provar que $u = v$. De [5], ver também [10, Lemma 2.8], temos $v \geq u^*$ e

$$|v > u^*| = 0 \Leftrightarrow -\Delta u = (-\Delta u)^*.$$

Se $|v > u^*| > 0$, temos

$$\begin{aligned} m(\mu) &\leq \max_{t \geq 0} I_{\mu,r}(tv) = \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{t^2}{2} \int_{B_r} |\Delta v|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r} v^{s+1} dx - \frac{t^{2*}}{2_*} \int_{B_r} v^{2*} dx \right\} \\ &< \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{t^2}{2} \int_{B_r} |(-\Delta u)^*|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r} (u^*)^{s+1} dx - \frac{t^{2*}}{2_*} \int_{B_r} (u^*)^{2*} dx \right\} \\ &= \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{t^2}{2} \int_{B_r} |-\Delta u|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r} u^{s+1} dx - \frac{t^{2*}}{2_*} \int_{B_r} u^{2*} dx \right\} \\ &= \max_{t \geq 0} I_{\mu,r}(tu) = m(\mu) \end{aligned}$$

um absurdo. Dessa maneira, $-\Delta u = (-\Delta u)^*$ e como u e v são soluções para o problema

$$\begin{cases} -\Delta w = (-\Delta u)^* & \text{em } B_r, \\ w = 0 & \text{sobre } \partial B_r, \end{cases}$$

segue que $u = v$. □

Defina agora a aplicação baricentro $\beta : \mathcal{N}_\mu \rightarrow \mathbb{R}^N$ por

$$\beta(u) = \frac{\int_{\Omega} |\Delta u|^2 x dx}{\int_{\Omega} |\Delta u|^2 dx}. \quad (2.20)$$

Também definimos o conjunto

$$I_\mu^{m(\mu)} := \{u \in E(\Omega); I_\mu(u) \leq m(\mu)\}.$$

Observação 2.14. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio suave limitado. Sejam $N \geq 5$ e $\mu > 0$ e no caso $s = 1$ assumimos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$, então do Lema 2.8 temos*

$$I_\mu^{m(\mu)} \cap \mathcal{N}_\mu \neq \emptyset.$$

Lema 2.15. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio suave limitado. Sejam $N \geq 5$ e $\mu > 0$ e no caso $s = 1$ assumimos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$ então existe $\bar{\mu} > 0$ tal que, se $\mu \in (0, \bar{\mu})$ e $u \in \mathcal{N}_\mu$ com $I_\mu(u) \leq m(\mu)$, então $\beta(u) \in \Omega_r^+$.*

Demonstração. Suponha, por contradição, que existem $\mu_n \rightarrow 0$, $u_n \in \mathcal{N}_{\mu_n}$, $I_{\mu_n}(u_n) \leq m(\mu_n)$ tais que $\beta(u_n) \notin \Omega_r^+$. Temos

$$c_{\mu_n} \leq I_{\mu_n}(u_n) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx - \frac{\mu_n}{s+1} \int_{\Omega} (u_n^+)^{s+1} dx - \frac{1}{2_*} \int_{\Omega} (u_n^+)^{2*} dx \leq m(\mu_n)$$

e

$$0 = I'_{\mu_n}(u_n)u_n = \int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx - \mu_n \int_{\Omega} (u_n^+)^{s+1} dx - \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*} dx. \quad (2.21)$$

Então (u_n) é limitada em $E(\Omega)$. Logo

$$c_{\mu_n} + o_n(1) \leq \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx - \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*} dx \leq m(\mu_n) + o_n(1) \quad (2.22)$$

e

$$\int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx - \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*} dx = o_n(1). \quad (2.23)$$

Dos Lemas 2.9 e 2.11 e de (2.22) segue que

$$\frac{2}{N} S^{N/4} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx - \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*} dx \right) \leq \frac{2}{N} S^{N/4}$$

e, de (2.23), a menos de subsequência,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (u_n^+)^{2^*} dx = l,$$

e concluímos que $l = S^{N/4}$. Note que, como $u_n \in \mathcal{N}_{\mu_n}$, segue de (2.21) que $u_n^+ \neq 0$. Se $z_n = u_n / |u_n^+|_{2^*} \in E(\Omega)$, então

$$|z_n|_{2^*} = \frac{|u_n|_{2^*}}{|u_n^+|_{2^*}} \geq \frac{|u_n|_{2^*}}{|u_n|_{2^*}} = 1,$$

$$|\Delta z_n|_2^2 = \frac{|\Delta u_n|_2^2}{|u_n^+|_{2^*}^2} = \frac{|\Delta u_n|_2^2}{(|u_n^+|_{2^*}^2)^{2/2^*}} \rightarrow \frac{S^{N/4}}{(S^{N/4})^{\frac{N-4}{N}}} = S.$$

Logo, se w_n é o potencial Newtoniano de $|\widetilde{-\Delta z_n}|$, segue do Lema 2.12 que existe $(y_n, \alpha_n) \subset \mathbb{R}^N \times (0, \infty)$ tal que a sequência $v_n(x) = \alpha_n^{\frac{N-4}{2}} w_n(\alpha_n x + y_n)$ admite uma subsequência que converge forte para v em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, $y_n \rightarrow y \in \overline{\Omega}$ e $\alpha_n \rightarrow 0$. Fixando $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\varphi(x) = x$, para todo $x \in \overline{\Omega}$ obtemos

$$\begin{aligned} \beta(u_n) &= \frac{\int_{\Omega} |\Delta u_n(z)|^2 z dz}{\int_{\Omega} |\Delta u_n(z)|^2 dz} = \frac{\int_{\Omega} |\Delta u_n(z)|^2 \varphi(z) dz}{\int_{\Omega} |\Delta u_n(z)|^2 dz} = \frac{|u_n^+|_{2^*}^2}{|\Delta u_n|_2^2} \int_{\Omega} |\Delta z_n(z)|^2 \varphi(z) dz \\ &= \frac{|u_n^+|_{2^*}^2}{|\Delta u_n|_2^2} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n(z)|^2 \varphi(z) dz = \frac{|u_n^+|_{2^*}^2}{|\Delta u_n|_2^2} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta (\alpha_n^{\frac{N-4}{2}} w_n(\alpha_n x + y_n))|^2 \varphi(\alpha_n x + y_n) dx \\ &= \frac{|u_n^+|_{2^*}^2}{|\Delta u_n|_2^2} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta v_n(x)|^2 \varphi(\alpha_n x + y_n) dx. \end{aligned}$$

Como $v_n \rightarrow v$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$, pelo teorema da convergência dominada e (2.18) segue que, a menos de subsequência,

$$\beta(u_n) \rightarrow \frac{(S^{N/4})^{2/2^*}}{S^{N/4}} S y = y \in \overline{\Omega},$$

o que contradiz a nossa hipótese inicial $\beta(u_n) \notin \Omega_r^+$. $\square$

De agora em diante assumimos todas as hipóteses do Lema 2.15 e seja $\bar{\mu}$ como neste lema. Para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$ definimos $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow I_\mu^{m(\mu)}$ por

$$\begin{aligned} \gamma_\mu(y) : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \gamma_\mu(y)(x) = w_y(x), \end{aligned} \quad (2.24)$$

onde w_y é solução do problema

$$\begin{cases} -\Delta w_y = z_y & \text{em } \Omega, \\ w_y = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad \text{com } z_y(x) = \begin{cases} -\Delta v_\mu(x-y), & \text{se } x \in B_r(y), \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus B_r(y), \end{cases}$$

onde, ver Lema 2.13, v_μ é radialmente simétrica com respeito a origem, $v_\mu, -\Delta v_\mu > 0$ em B_r e

$$I_{\mu,r}(v_\mu) = m(\mu), \quad I'_{\mu,r}(v_\mu) = 0.$$

Observação 2.16. *Argumentando como na prova do Lema 2.4, obtemos $v_\mu \in C^4(\overline{B_r(0)})$.*

Argumentando como no Lema 1.16, temos γ_μ bem definida e contínua. Pelo princípio do máximo forte temos $w_y(x) > v_\mu(x-y) > 0$, para todo $x \in B_r(y)$ e $y \in \Omega_r^-$. Então

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx &= \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^2 dx, \quad \int_{\Omega} (w_y^+)^{s+1} dx > \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{s+1} dx \\ \text{e } \int_{\Omega} (w_y^+)^{2^*} dx &> \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{2^*} dx. \end{aligned}$$

Então, para todo $y \in \Omega_r^-$,

$$\begin{aligned} I'_\mu(\gamma_\mu(y))\gamma_\mu(y) &= \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx - \mu \int_{\Omega} (w_y^+)^{s+1} dx - \int_{\Omega} (w_y^+)^{2^*} dx \\ &< \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^2 dx - \mu \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{s+1} dx - \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{2^*} dx = I'_{\mu,r}(v_\mu)v_\mu = 0, \end{aligned}$$

ou seja, $\gamma_\mu(y) \notin \mathcal{N}_\mu$. Entretanto, para cada $y \in \Omega_r^-$ existe um único $t_y > 0$ tal que

$$t_y \gamma_\mu(y) \in \mathcal{N}_\mu. \quad (2.25)$$

Observe também que, para todo $t > 0$,

$$\begin{aligned} I_\mu(t\gamma_\mu(y)) &= \frac{t^2}{2} \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{\Omega} (w_y^+)^{s+1} dx - \frac{t^{2^*}}{2^*} \int_{\Omega} (w_y^+)^{2^*} dx \\ &< \frac{t^2}{2} \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^2 dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{s+1} dx - \frac{t^{2^*}}{2^*} \int_{B_r(0)} (v_\mu^+)^{2^*} dx \\ &= I_{\mu,r}(tv_\mu) \leq I_{\mu,r}(v_\mu) = m(\mu), \end{aligned} \quad (2.26)$$

pois $v_\mu \in \mathcal{N}_{\mu,r}$ implica que $I_{\mu,r}(v_\mu) = \max_{t \geq 0} I_{\mu,r}(tv_\mu)$. Defina então

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}_\mu(y) : \Omega_r^- &\longrightarrow I_\mu^{m(\mu)} \cap \mathcal{N}_\mu \\ y &\longmapsto \bar{\gamma}_\mu(y) = t_y \gamma_\mu(y), \end{aligned} \quad (2.27)$$

Lema 2.17. *Suponha todas as hipóteses do Lema 2.15 e seja $\bar{\mu}$ como neste lema. Então, para cada $0 < \mu < \bar{\mu}$, a função $\bar{\gamma}_\mu$ é bem definida, contínua e satisfaz*

$$(\beta \circ \bar{\gamma}_\mu)(y) = y, \quad \forall y \in \Omega_r^-. \quad (2.28)$$

Demonstração. De (2.25) e (2.26), segue que $\bar{\gamma}_\mu$ está bem definida. A continuidade de $\bar{\gamma}_\mu$ segue da continuidade de γ_μ e da aplicação

$$E(\Omega) \setminus \{0\} \rightarrow (0, \infty) : u \mapsto t(u)$$

onde $t(u) > 0$ é tal que $t(u)u \in \mathcal{N}_\mu$. Por fim, para todo $y \in \Omega_r^-$

$$\begin{aligned} (\beta \circ \bar{\gamma}_\mu)(y) &= \frac{\int_{\Omega} |\Delta(t_y \gamma_\mu(y))|^2 dx}{\int_{\Omega} |\Delta(t_y \gamma_\mu(y))|^2 dx} = \frac{t_y^2 \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx}{t_y^2 \int_{\Omega} |\Delta w_y|^2 dx} = \frac{\int_{B_r(y)} |\Delta v_\mu(x-y)|^2 dx}{\int_{B_r(y)} |\Delta v_\mu(x-y)|^2 dx} \\ &= \frac{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 (z+y) dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz} = \frac{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 z dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz} + \frac{y \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^2 dz} \\ &= y, \end{aligned}$$

pois Δv_μ é radialmente simétrica. □

2.4 Prova do Teorema 2.2

Os lemas desta seção auxiliarão na demonstração do Teorema 2.2.

Lema 2.18. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 5$, um domínio suave e limitado. No caso $2 < s+1 < 2_*$ consideramos $\mu > 0$ e, no caso $s = 1$, supomos $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se u_μ é um ponto crítico de I_μ restrito a $\mathcal{N}_\mu$, então u é um ponto crítico de I_μ em $E(\Omega)$.*

Demonstração. Fazendo

$$J_\mu(u) = I'_\mu(u)u = \|u\|^2 - \mu|u^+|_{s+1}^{s+1} - |u^+|_{2_*}^{2_*}, \quad (2.29)$$

do Teorema dos Multiplicadores de Lagrange existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$I'_\mu(u_\mu) = \theta J'_\mu(u_\mu). \quad (2.30)$$

Observe que

$$J'_\mu(u_\mu)u_\mu = 2\|u_\mu\|^2 - \mu(s+1)|u_\mu^+|_{s+1}^{s+1} - 2_*|u_\mu^+|_{2_*}^{2_*}$$

e como

$$0 = I'_\mu(u_\mu)u_\mu = J_\mu(u_\mu) = \|u_\mu\|^2 - \mu|u_\mu^+|_{s+1}^{s+1} - |u_\mu^+|_{2_*}^{2_*}$$

temos

$$\begin{aligned} J'_\mu(u_\mu)u_\mu &= 2(\mu|u_\mu^+|_{s+1}^{s+1} + |u_\mu^+|_{2_*}^{2_*}) - \mu(s+1)|u_\mu^+|_{s+1}^{s+1} - 2_*|u_\mu^+|_{2_*}^{2_*} \\ &= \mu(2 - (s+1))|u_\mu^+|_{s+1}^{s+1} + (2 - 2_*)|u_\mu^+|_{2_*}^{2_*} < 0 \end{aligned}$$

donde, de

$$0 = I'_\mu(u_\mu)u_\mu = \theta J'_\mu(u_\mu)(u_\mu)$$

segue que $\theta = 0$, ou seja, de (2.30), $I'_\mu(u_\mu) = 0$ e u_μ é ponto crítico de I_μ em $E(\Omega)$. $\square$

Lema 2.19. *Nas hipóteses do Lema 2.18, o funcional I_μ restrito a variedade $\mathcal{N}_\mu$ satisfaz a condição $(PS)_c$ para $c < (2/N)S^{N/4}$.*

Demonstração. Seja (u_n) uma sequência $(PS)_c$ para I_μ restrita a $\mathcal{N}_\mu$, com $c < (2/N)S^{N/4}$. Então $I_\mu(u_n) \rightarrow c$ e do Teorema dos Multiplicadores de Lagrange existe $(\theta_n) \subset \mathbb{R}$ tal que

$$I'_\mu(u_n) = \theta_n J'_\mu(u_n) + o_n(1),$$

onde J_μ é dada em (2.29). Na demonstração do Lema 2.18 vimos que $J'_\mu(u)u < 0$ para todo $u \in \mathcal{N}_\mu$. Como (u_n) é limitada podemos supor $J'_\mu(u_n)u_n \rightarrow l \leq 0$. Se $J'_\mu(u_n)u_n \rightarrow 0$, então de

$$\|u_n\|^2 = \mu|u_n^+|_{s+1}^{s+1} + |u_n^+|_{2_*}^{2_*}$$

segue que

$$J'_\mu(u_n)u_n = 2\|u_n\|^2 - \mu(s+1)|u_n^+|_{s+1}^{s+1} - 2_*|u_n^+|_{2_*}^{2_*} = \mu(2 - (s+1))|u_n^+|_{s+1}^{s+1} + (2 - 2_*)|u_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow 0,$$

o que implica $|u_n^+|_{s+1}^{s+1}, |u_n^+|_{2_*}^{2_*} \rightarrow 0$ e consequentemente $\|u_n\|^2 \rightarrow 0$. Por outro lado, das imersões contínuas,

$$\|u_n\|^2 = \mu|u_n^+|_{s+1}^{s+1} + |u_n^+|_{2_*}^{2_*} \leq \mu C\|u_n\|^{s+1} + C\|u_n\|^{2_*}$$

e assim

$$1 \leq C(\mu\|u_n\|^{(s+1)-2} + \|u_n\|^{2_*-2}) \rightarrow 0,$$

um absurdo. Logo, $l < 0$ e assim de

$$0 = I'_\mu(u_n)u_n = \theta_n J'_\mu(u_n)u_n + o_n(1)$$

segue que $\theta_n \rightarrow 0$ e consequentemente

$$I_\mu(u_n) \rightarrow c < \frac{2}{N}S^{N/4}, \quad I'_\mu(u_n) \rightarrow 0,$$

e a conclusão segue da primeira parte do Lema 2.6. $\square$

O próximo lema estabelece a relação entre $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ e a categoria de um conjunto de nível apropriado, a fim de aplicarmos o resultado clássico da teoria de Lusternik-Schnirelman.

Lema 2.20. *Suponha todas as hipóteses do Lema 2.15 e seja $\bar{\mu}$ como naquele lema. Então, para cada $\mu \in (0, \bar{\mu})$, temos*

$$\text{cat}_{I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}}(I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}) \geq \text{cat}_\Omega(\Omega),$$

onde

$$I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)} := \{u \in \mathcal{N}_\mu; I_\mu(u) \leq m(\mu)\}.$$

Demonstração. Primeiramente, do Lema 2.14, segue que $I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)} \neq \emptyset$.

Se $\text{cat}_{I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}}(I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}) = \infty$, nada a demonstrar. Se $\text{cat}_{I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}}(I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}) = n$, então

$$I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n,$$

onde A_j é fechado e contrátil em $I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}$, para todo $j = 1, \dots, n$, ou seja, existem $h_j : [0, 1] \times A_j \rightarrow I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}$ contínuas tais que

$$h_j(0, u) = u, h_j(1, u) = w_j, \forall u \in A_j, \quad (2.31)$$

onde $w_j \in I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}$ é fixo, para cada $j = 1, \dots, n$. Considere $B_j = \bar{\gamma}_\mu^{-1}(A_j)$, onde $\bar{\gamma}_\mu$ é dada por (2.27). Os conjuntos B_j são fechados e $\Omega_r^- = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$. Defina, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, a deformação

$$\begin{aligned} g_j : [0, 1] \times B_j &\longrightarrow \Omega_r^+ \\ (t, y) &\longmapsto g_j(t, y) = \beta(h_j(t, \bar{\gamma}_\mu(y))), \end{aligned}$$

onde β é dada por (2.20). Do Lema 2.15, a deformação g_j está bem definida e de (2.28) e (2.31)

$$g_j(0, y) = \beta(h_j(0, \bar{\gamma}_\mu(y))) = \beta(\bar{\gamma}_\mu(y)) = y, \quad \forall y \in B_j,$$

$$g_j(1, y) = \beta(h_j(1, \bar{\gamma}_\mu(y))) = \beta(w_j), \quad \forall y \in B_j.$$

Portanto, os conjuntos B_j são contráteis em Ω_r^+ , e então

$$\text{cat}_\Omega(\Omega) = \text{cat}_{\Omega_r^+}(\Omega_r^-) \leq n = \text{cat}_{I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}}(I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}).$$

□

Conclusão da prova do Teorema 2.2

Denote por $I_{\mathcal{N}_\mu}$ a restrição de I_μ a $\mathcal{N}_\mu$. Do Lema 2.6 sabemos que

$$c_\mu, m(\mu) < \frac{2}{N} S^{N/4},$$

se $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$, ou $N = 5, 6, 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$. Além disso, do Lema 2.19, $I_{\mathcal{N}_\mu}$ satisfaz a condição $(PS)_c$, para todo $c \in (0, (2/N)S^{N/4})$. Da teoria padrão de categoria de Lusternik-Schnirelman, Teorema 1.8, concluímos que $I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}$ contém, pelo menos, $\text{cat}_{I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}}(I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)})$ pontos críticos de $I_{\mathcal{N}_\mu}$, ou seja, do Lema 2.20, $I_{\mathcal{N}_\mu}^{m(\mu)}$ contém, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ pontos críticos de $I_{\mathcal{N}_\mu}$. Agora, do Lema 2.18, concluímos enfim que I_μ contém, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ pontos críticos e resultado segue portanto do Lema 2.4. □

2.5 Prova do Lema 2.6 completa

Demonstração. Mostremos que, considerando $\mu > 0$ se $2 < s + 1 < 2_*$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ se $s = 1$, se $N \geq 8$ e $2 \leq s + 1 < 2_*$ ou $5 \leq N \leq 7$ e $2_* - 2 \leq s + 1 < 2_*$, então o nível do passo da montanha c_μ pertence ao intervalo $(0, (2/N)S^{N/4})$. Sem perda de generalidade, suponha $0 \in \Omega$. Seja $\xi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ uma função tal que $0 \leq \xi(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B(0, \rho/2)$, $\xi \equiv 0$ em $B(0, \rho)^c$ e $B(0, \rho) \subset \subset \Omega$, $\rho > 0$. Escreva

$$U_\delta(x) := \xi(x)\psi_\delta(x), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad 0 < \delta < \rho/2,$$

onde $\psi_\delta = S^{\frac{4-N}{8}}\varphi_\delta$ e $\varphi_\delta(x) = \varphi_{\delta,0}(x)$ é dado por (2.1). Então

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta \psi_\delta|^2 dx = S \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}^N} |\psi_\delta|^{2_*} dx = 1,$$

e, ver [35] eq. (6.4) and eq. (6.3) respectivamente, temos

$$|\Delta U_\delta|_{2,\Omega}^2 = S + O(\delta^{N-4}), \quad (2.32)$$

$$|U_\delta|_{2_*,\Omega}^{2_*} = 1 + O(\delta^N). \quad (2.33)$$

Fazendo

$$V_\delta(x) = \frac{U_\delta(x)}{|U_\delta|_{2_*}}, \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad (2.34)$$

segue que

$$|\Delta V_\delta|_2^2 = S + O(\delta^{N-4}). \quad (2.35)$$

O nosso objetivo é mostrar que para δ suficientemente pequeno temos

$$\max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) < \frac{2}{N}S^{N/4}. \quad (2.36)$$

Para isto, estimaremos $|V_\delta|_{s+1}^{s+1}$. Observe que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx &= \int_{\Omega} |\xi(x)\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\ &= \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx, \end{aligned}$$

e por sua vez, do teorema da convergência dominada,

$$\begin{aligned} \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{|\xi(x)|^{s+1}}{(\delta^2 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \left(\int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{|\xi(x)|^{s+1}}{|x|^{(N-4)(s+1)}} dx + o(1) \right) = C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}) \end{aligned}$$

e portanto

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}). \quad (2.37)$$

A seguir, consideramos 3 casos distintos:

Caso 1: $s + 1 < \frac{N}{N-4}$.

Segue, do teorema da convergência dominada, que

$$\begin{aligned} \int_{B(0, \rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{B(0, \rho/2)} \frac{1}{(\delta^2 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \left[\int_{B(0, \rho/2)} \frac{1}{|x|^{(N-4)(s+1)}} + o(1) \right] dx = C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}), \end{aligned}$$

e de (2.37) segue então que

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}). \quad (2.38)$$

Caso 2: $s + 1 > \frac{N}{N-4}$.

Temos

$$\int_{B(0, \rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx = \int_{B(0, \delta)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + \int_{\delta < |x| < \rho/2} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx; \quad (2.39)$$

por sua vez,

$$\begin{aligned} \int_{B(0, \delta)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{B(0, \delta)} \frac{1}{(\delta^2 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{B(0, \delta)} \frac{1}{\delta^{(N-4)(s+1)} (1 + |\frac{x}{\delta}|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &= C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{B(0, 1)} \frac{1}{(1 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx = C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}}. \end{aligned} \quad (2.40)$$

Temos também

$$\begin{aligned} \int_{\delta < |x| < \rho/2} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{\delta < |x| < \rho/2} \frac{1}{(\delta^2 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &= C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{1 < |x| < \rho/(2\delta)} \frac{1}{(1 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &= C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{|x| > 1} \frac{1}{(1 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx \\ &\quad - C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} \int_{|x| > \rho/(2\delta)} \frac{1}{(1 + |x|^2)^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}} dx = C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}}) \end{aligned}$$

Logo, de (2.37),

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}}), \quad (2.41)$$

pois $s + 1 > N/(N - 4)$.

Caso 3: $s + 1 = \frac{N}{N-4}$.

É válido (2.39) e (2.40). Temos

$$\begin{aligned}
 \int_{\delta < |x| < \rho/2} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= C\delta^{N/2} \int_{1 < |x| < \rho/(2\delta)} \frac{1}{(1 + |x|^2)^{N/2}} dx \\
 &= C\delta^{N/2} \int_1^{\rho/(2\delta)} \int_{S_r} \frac{1}{(1 + r^2)^{N/2}} dS dr \\
 &= C\delta^{N/2} \int_1^{\rho/(2\delta)} \frac{1}{r} dr + C\delta^{N/2} \int_1^{\rho/(2\delta)} \left[\frac{r^{N-1}}{(1 + r^2)^{N/2}} - \frac{1}{r} \right] dr \\
 &= C\delta^{N/2} |\log \delta| + O(\delta^{N/2}),
 \end{aligned}$$

e assim, de (2.37),

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{N/2} |\log \delta| + O(\delta^{N/2}). \quad (2.42)$$

Portanto, usando (2.38), (2.41) e (2.42), e a estimativa (2.33), concluímos que

$$|V_\delta|_{s+1}^{s+1} = \begin{cases} C\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{\frac{(N-4)(s+1)}{2}}), & \text{se } s + 1 < \frac{N}{N-4}, \\ C\delta^{N/2} |\log \delta| + O(\delta^{N/2}), & \text{se } s + 1 = \frac{N}{N-4}, \\ C\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}} + o(\delta^{N - \frac{(N-4)(s+1)}{2}}), & \text{se } s + 1 > \frac{N}{N-4}. \end{cases} \quad (2.43)$$

Note que

$$I_\mu(tV_\delta) = \frac{t^2}{2} |\Delta V_\delta|_2^2 - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} - \frac{t^{2_*}}{2_*}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} I_\mu(tV_\delta) = -\infty,$$

e então $\max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta)$ é atingido em algum $t_\delta > 0$. Dessa maneira,

$$\left. \frac{d}{dt} I_\mu(tV_\delta) \right|_{t=t_\delta} = 0 \Rightarrow |\Delta V_\delta|_2^2 - \mu t_\delta^{s-1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} - t_\delta^{2_*-2} = 0,$$

ou seja,

$$|\Delta V_\delta|_2^2 = \mu t_\delta^{s-1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} + t_\delta^{2_*-2} \geq t_\delta^{2_*-2}$$

donde

$$t_\delta \leq |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2}{2_*-2}}. \quad (2.44)$$

A última desigualdade implica que

$$|\Delta V_\delta|_2^2 = t_\delta^{2_*-2} + \mu t_\delta^{s-1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \leq t_\delta^{2_*-2} + \mu |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2(s-1)}{2_*-2}} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}$$

donde

$$t_\delta^{2_*-2} \geq |\Delta V_\delta|_2^2 - \mu |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2(s-1)}{2_*-2}} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} = |\Delta V_\delta|_2^2 \left[1 - \mu |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2(s-1)}{2_*-2}-2} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \right];$$

usando agora as estimativas em (2.35) e em (2.43), e a desigualdade (3.62), concluímos que

$$t_\delta \rightarrow S^{\frac{1}{2_*-2}}, \quad \delta \rightarrow 0. \quad (2.45)$$

Considere agora função

$$g(t) = \frac{t^2}{2} |\Delta V_\delta|_2^2 - \frac{t^{2_*}}{2_*}, \quad t \geq 0,$$

e observe que g atinge máximo em $t_0 = |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2}{2_*-2}}$ e que g é crescente no intervalo $[0, |\Delta V_\delta|_2^{\frac{2}{2_*-2}}]$. Dessa maneira, de (2.35) e (3.62),

$$\begin{aligned} \max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) &= I_\mu(t_\delta V_\delta) = g(t_\delta) - \mu \frac{t_\delta^{s+1}}{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &\leq \frac{(|\Delta V_\delta|_2^{\frac{2}{2_*-2}})^2}{2} |\Delta V_\delta|_2^2 - \frac{(|\Delta V_\delta|_2^{\frac{2}{2_*-2}})^{2_*}}{2_*} - \mu \frac{t_\delta^{s+1}}{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &= \frac{2}{N} (|\Delta V_\delta|_2^2)^{N/4} - \mu \frac{t_\delta^{s+1}}{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} = \frac{2}{N} S^{N/4} + O(\delta^{N-4}) - \mu \frac{t_\delta^{s+1}}{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}. \end{aligned}$$

Então, para δ suficientemente pequeno, segue de (2.45) que

$$\begin{aligned} \max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) &\leq \frac{2}{N} S^{N/4} + O(\delta^{N-4}) - \frac{\mu}{s+1} \left(\frac{S^{\frac{1}{2_*-2}}}{2} \right)^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &= \frac{2}{N} S^{N/4} + O(\delta^{N-4}) - \widehat{C} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}. \end{aligned}$$

Usamos agora as estimativas (2.43) para concluir que (2.36) é válido, se $N \geq 8$ e $2 \leq s+1 < 2_*$ ou $5 \leq N \leq 7$ e $2_* - 2 < s+1 < 2_*$. Em particular, observe que $2_* - 2 < s+1$, no caso $N = 5, 6, 7$ é necessário a fim de obter $c_\mu < (2/N) S^{N/4}$ quando aplicamos a terceira linha de (2.43). $\square$

Existência de soluções para o problema (P_3)

Neste capítulo estudamos a existência de solução para o problema de quarta-ordem não linear

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u) = \mu|u|^{s-1}u + |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_3)$$

satisfazendo

$$u, -\Delta u > 0 \quad \text{em } \Omega,$$

onde Ω é um domínio suave limitado de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\mu > 0$.

Vale observar que (P_3) pode ser reescrito como

$$\begin{cases} -\Delta u = |v|^{p-1}v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu|u|^{s-1}u + |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (S_3)$$

e a condição $u, -\Delta u > 0$ em Ω é equivalente a $u, v > 0$ em Ω .

Neste capítulo assumiremos que (p, q) pertence a hipérbole crítica

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}, \quad (3.1)$$

e

$$\frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1.$$

Observe que a condição $\frac{p+1}{p} < s+1$ diz que a perturbação $|u|^{s-1}u$ é do tipo “superlinear” para o operador $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u)$ e no caso $\frac{p+1}{p} = s+1$ então $|u|^{s-1}u$ e $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u)$ têm mesma homogeneidade.

Lembramos que a hipérbole crítica (3.1) é um determinante para a existência de solução positiva para o sistema (S_3) no caso em que $\mu = 0$. Neste caso o sistema (S_3) não tem solução positiva se (p, q) pertence ou está acima da hipérbole crítica, isto é,

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} \leq \frac{N-2}{N}.$$

Este tipo de resultado, baseado em um identidade do tipo Pohožev foi observado por Clément et al. [15] e van der Vorst [48]; veja também Pucci e Serrin [39], Mitidieri [34] e Peletier e van der Vorst [37].

Visando tornar claro a definição a seguir lembremos o problema clássico de Brezis e Nirenberg [12]

$$-\Delta u = \lambda u + u^{2^*-1}, \quad u > 0 \quad \text{em} \quad \Omega, \quad u = 0 \quad \text{sobre} \quad \partial\Omega. \quad (\text{BN})$$

Sabemos que as funções que realizam a constante de Sobolev

$$\inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u|^2 dx; u \in \mathcal{D}^{1,2}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{2^*} dx = 1 \right\}, \quad N \geq 3,$$

comportam-se no infinito como $r^{-(N-2)}$. Segundo os argumentos de Brezis e Nirenberg [12, Lemma 1.2], a definição de dimensão crítica e não-crítica associada ao problema (BN) surge naturalmente da L^2 -integrabilidade de $|x|^{-(N-2)}$ em $\mathbb{R}^N \setminus B_1(0)$, mais precisamente

$$\begin{aligned} 2(N-2) &\geq N && \text{corresponde as dimensões não-críticas para (BN), e} \\ 2(N-2) &< N && \text{corresponde as dimensões críticas para (BN)} \end{aligned}$$

isto é,

$$\begin{aligned} N &\geq 4 && \text{são as dimensões não-críticas para (BN), e} \\ N &= 3 && \text{é a dimensão crítica para (BN).} \end{aligned}$$

Argumentos semelhantes foram introduzidos em [19, §7 e §8] para classificar as dimensões críticas e não-críticas associadas ao problema

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{p-1} + u^{p^*-1}, & u > 0 \quad \text{em} \quad \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre} \quad \partial\Omega. \end{cases} \quad (\text{P}')$$

Sabendo que as funções que realizam

$$\inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u|^p dx; u \in \mathcal{D}^{1,p}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{p^*} dx = 1 \right\}, \quad N > p,$$

comportam-se no infinito como $r^{-\frac{N-p}{p-1}}$, a definição de dimensão crítica e não-crítica associada ao problema (P') surge da L^p -integrabilidade de $|x|^{-\frac{N-p}{p-1}}$ em $\mathbb{R}^N \setminus B_1(0)$, mais precisamente

$$\begin{aligned} N \geq p^2 & \text{ são as dimensões não-críticas para (P') e,} \\ p < N < p^2 & \text{ são as dimensões críticas para (P').} \end{aligned}$$

Voltemos para o problema (P_3) . Considere o espaço $E(\Omega) := W^{2, \frac{p+1}{p}}(\Omega) \cap W_0^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega)$, dotado da norma $\|u\| := |\Delta u|_{\frac{p+1}{p}}$. Considere a constante de Sobolev para a imersão $E(\Omega) \hookrightarrow L^{q+1}(\Omega)$, dada por

$$S(\Omega) = \inf \left\{ \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx; u \in E(\Omega), \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx = 1 \right\}. \quad (3.2)$$

É sabido que $S(\Omega)$ não depende de Ω e $S(\Omega)$ nunca é atingido, exceto quando $\Omega = \mathbb{R}^N$. Mais ainda, $S(\Omega) = S$, onde

$$S = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx; u \in \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N), \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{q+1} dx = 1 \right\}. \quad (3.3)$$

Lions [29] provou que S é atingida e que toda solução de S tem sinal definido e é radialmente simétrica em relação a algum ponto e que, as soluções positivas, são radialmente decrescentes em relação ao ponto de simetria.

Seja $\varphi \in \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$ radialmente simétrica em relação à origem, $\varphi > 0$ em $\mathbb{R}^N$, onde S é atingida. Lions [29, Corollary I.1] provou que todas as funções positivas que realizam S são dadas por

$$\varphi_{\delta,a}(x) = \delta^{-\frac{N}{q+1}} \varphi\left(\frac{x-a}{\delta}\right), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad (3.4)$$

onde $a \in \mathbb{R}^N$ e $\delta > 0$. Podemos então escolher φ com $\varphi(0) = 1$. Recordamos também que as funções dadas por $S^\alpha \varphi_{\delta,a}$, com $\varphi_{\delta,a}$ como em (3.4) e $\alpha = \frac{p(p(N-2)-2)}{2(p+1)^2}$, são precisamente as soluções positivas regulares de

$$\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) = u^q \text{ em } \mathbb{R}^N.$$

Segundo [25, (1.14), (1.15) e (1.16)], a função φ possui o seguinte comportamento assintótico:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r^{p(N-2)-2} \varphi(r) = b, \text{ se } p < \frac{N}{N-2}, \quad (3.5)$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^{N-2}}{\log r} \varphi(r) = b, \text{ se } p = \frac{N}{N-2}, \quad (3.6)$$

e

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r^{N-2} \varphi(r) = b, \text{ se } p > \frac{N}{N-2}, \quad (3.7)$$

onde $b > 0$ é uma constante.

Observe que, para $p < \frac{N}{N-2}$, a função φ , no infinito, comporta-se como $r^{-[p(N-2)-2]}$. Logo, visando proceder como Brezis e Nirenberg [12, Lemma 1.2], para garantir a existência

de solução para o problema (P_3) com perturbação de mesma ordem, isto é, $s = 1/p$, faz-se necessário considerar

$$[p(N-2) - 2] \left(\frac{p+1}{p} \right) \geq N, \quad \text{ou equivalentemente,} \quad \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq p < \frac{N}{N-2}.$$

Note que $\frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} < \frac{N}{N-2}$ se, e somente se, $N \geq 6$.

Observe também que

$$[p(N-2) - 2] \left(\frac{p+1}{p} \right) \geq N \quad \text{é equivalente a} \quad N \geq 2 \left(\frac{p+1}{p} \right)^2.$$

Isto indica a naturalidade desta restrição quando a comparamos com as dimensões não-críticas do biarmônico, cf. van der Vorst [47], e fazemos um paralelo da restrição $N \geq p^2$ para o p -Laplaciano com as dimensões não críticas do Laplaciano.

Para $p \geq \frac{N}{N-2}$, o comportamento de φ no infinito está relacionado com $r^{-(N-2)}$, veja (3.6) e (3.7), e somos induzidos a considerar

$$(N-2) \left(\frac{p+1}{p} \right) \geq N, \quad \text{ou equivalentemente} \quad \frac{N}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}.$$

Mais uma vez, observe que a desigualdade $\frac{N}{N-2} \leq \frac{N-2}{2}$ é válida se, e somente se, $N \geq 6$.

Com isto, introduzimos a noção de região não-crítica e região crítica da hipérbole crítica associadas ao problema (P_3) .

Definição 3.1. *Considere o problema (P_3) . Dizemos que o ponto (p, q) da hipérbole crítica (3.1) está em uma região:*

(a) *Não-crítica se $N \geq 6$ e p satisfaz*

$$\frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}. \quad (3.8)$$

(b) *Crítica, se $N \geq 6$ e p não satisfaz (3.8); ou $N = 3, 4, 5$ e p qualquer.*

Note que a região não-crítica associada à equação (P_3) não é necessariamente simétrica em relação ao eixo $p = q$ pois (P_3) , isto é (S_3) , não é uma perturbação simétrica do sistema

$$\begin{cases} -\Delta u = |v|^{p-1}v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Neste capítulo, $\mu_1(\Omega)$ denota o primeiro autovalor do problema

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u) = \mu u^{\frac{1}{p}} & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (3.9)$$

Ao longo deste capítulo a hipótese (H), relativa a potência $s+1$, indica a seguinte situação:

$$\left. \begin{aligned} \text{(a)} & \text{ Na região não-crítica, i.e., } N \geq 6 \text{ e } \frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}, \text{ suponha} \\ & \quad \frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1. \\ \text{(b)} & \text{ Nas regiões críticas,} \\ & \quad \text{(b1) } N \geq 6 \text{ e } \frac{2}{N-2} < p < \frac{2+\sqrt{2N}}{N-2}, \text{ suponha } q-p < s+1 < q+1; \\ & \quad \text{(b2) } N \geq 6 \text{ e } p > \frac{N-2}{2}, \text{ suponha } \frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1; \\ & \quad \text{(b3) } N = 3, 4, 5 \text{ e } \frac{2}{N-2} < p < \frac{N}{N-2}, \text{ suponha } q-p < s+1 < q+1; \\ & \quad \text{(b4) } N = 3, 4, 5 \text{ e } p \geq \frac{N}{N-2}, \text{ suponha } \frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1. \end{aligned} \right\} \quad (\text{H})$$

Vale observar que nos casos (b1) e (b3) tem-se

$$\frac{p+1}{p} < q-p,$$

e nos casos (b2) e (b4) tem-se

$$\frac{p+1}{p} < \frac{(p-1)(q+1)}{q},$$

cf. (3.64) e (3.67) para mais detalhes.

Vale dizer que no caso biarmônico, isto é, no caso $p = 1$, a hipótese (H) é reduzida à hipótese sobre $s+1$ do Teorema 2.1, de modo que a hipótese na região não-crítica é equivalente a hipótese nas dimensões não-críticas para o problema (P_2) , enquanto as hipóteses relativas as regiões críticas correspondem a hipótese nas dimensões críticas para o problema (P_2) .

Definição 3.2. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Dizemos que u é uma solução clássica de (P_3) se $u \in \mathcal{C}^2(\overline{\Omega})$, $|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \in \mathcal{C}^2(\Omega)$ e u satisfaz (P_3) pontualmente.*

Teorema 3.3. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então, sob a hipótese (H), o problema (P_3) admite uma solução clássica satisfazendo $u, -\Delta u > 0$ em Ω .*

Na Seção 3.3, onde faremos a demonstração do Lema 3.19, ficará claro onde a condição sob a perturbação $s+1$ em cada item na hipótese (H) é necessária; mais especificamente, para cada dimensão $N \geq 3$ a condição sob a perturbação $s+1$ nas regiões críticas e não-críticas da hipérbole crítica, quando esta última existir.

Observação 3.4. *Salientamos que o Teorema 3.3 inclui todos os resultados em [24, Theorem 2] para o sistema (S_3) , uma vez que [24, Theorem 2] trata o caso particular $s = 1$ e que, neste caso, nossa hipótese (H) é equivalente as hipóteses em [24]. Também acreditamos ser mais natural trabalhar com (S_3) com $s = \frac{1}{p}$ em lugar de $s = 1$.*

Definição 3.5. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Dizemos que $u \in E(\Omega)$ é solução de energia mínima para o problema (P_3) se u é solução não-trivial de (P_3) e tem menor energia*

$$I_\mu(u) := \frac{p}{p+1} \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx$$

entre as soluções não-triviais de (P_3) .

Teorema 3.6 (Solução de energia mínima). *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado, $\mu > 0$ e no caso $s = 1/p$, suponha também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Suponha (H) satisfeita. Então:*

- (i) *O problema (P_3) tem uma solução u de energia mínima.*
- (ii) *As soluções de energia mínima de (P_3) são soluções do tipo Passo da Montanha para o funcional I_μ .*
- (iii) *Se u é solução de energia mínima de (P_3) então, a menos de substituir u por $-u$, tem-se $u, -\Delta u > 0$ em Ω .*

(iv) Se Ω é uma bola centrada na origem de $\mathbb{R}^N$, então toda solução de energia mínima de (P_3) é tal que u e $-\Delta u$ são radiais.

3.1 Compacidade e prova do Teorema 3.3

Defina, para $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, $\mu_1(\Omega)$ dado por (3.9),

$$\|u\|_\mu := \left(|\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|^{\frac{p+1}{p}} \right)^{\frac{p}{p+1}}, \quad \forall u \in E(\Omega). \quad (3.10)$$

Assim $\|\cdot\|_\mu$ satisfaz

$$\|u\|_\mu \leq \|u\| \leq c(\Omega, \mu) \|u\|_\mu \quad \text{e} \quad \|tu\|_\mu = |t| \|u\|_\mu \quad \forall u \in E(\Omega), \forall t \in \mathbb{R}, \quad (3.11)$$

onde $c(\Omega, \mu) = \left(1 - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)}\right)^{-\frac{p}{p+1}} > 0$.

Para estudar a existência de solução para o problema (P_3) , consideramos o funcional

$$I_\mu(u) := \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} \int_\Omega |u|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_\Omega |u|^{q+1} dx, \quad u \in E(\Omega), \quad (3.12)$$

e a variedade de Nehari associada ao funcional I_μ , dada por

$$\mathcal{N}_\mu := \{u \in E(\Omega) \setminus \{0\}; I'_\mu(u)u = 0\}. \quad (3.13)$$

Definição 3.7. Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Dizemos que $u \in E(\Omega)$ é uma solução fraca de (P_3) se u é um ponto crítico de I_μ , isto é, u satisfaz

$$\int_\Omega |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \Delta v dx = \mu \int_\Omega |u|^{s-1} u v dx + \int_\Omega |u|^{q-1} u v dx, \quad \forall v \in E(\Omega).$$

Lema 3.8. Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então as soluções clássicas de (P_3) são precisamente os pontos críticos do funcional I_μ . Além disso, no caso em que $u, -\Delta u > 0$ em Ω temos $u \in C^4(\Omega) \cap C^2(\overline{\Omega})$.

Demonstração. O problema

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) = \mu |u|^{s-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P_3)$$

é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} -\Delta u = |v|^{p-1} v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu |u|^{s-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (S_3)$$

Então usamos os argumentos em [26, Section 3] para mostrar que o par (u, v) solução do sistema (S_3) está em $L^r(\Omega) \times L^r(\Omega)$ para todo $1 \leq r < \infty$. Logo, aplicando os resultados clássicos de regularidade para operador elípticos de segunda ordem ao sistema (S_3) obtemos $(u, v) \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) \times C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ para algum α que depende de p e q . Observe que no caso em que $-\Delta u = |v|^{p-1}v > 0$ em Ω então $|v|^{p-1}v$ é $C^2(\Omega)$ e portanto, podemos aplicar os resultados clássicos da teoria de regularidade para operadores elípticos de segunda ordem para obter que $u \in C^4(\Omega)$. $\square$

Lema 3.9. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado, $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então o funcional I_μ satisfaz a geometria do passo da montanha em torno do seu mínimo local em zero, com o associado nível do passo da montanha*

$$c_\mu = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0,1]} I_\mu(\gamma(t)), \quad (3.14)$$

onde

$$\Gamma = \{\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega)); \gamma(0) = 0, I_\mu(\gamma(1)) < 0\}. \quad (3.15)$$

Mais ainda,

$$c_\mu = \tilde{c}_\mu = \hat{c}_\mu, \quad (3.16)$$

onde

$$\tilde{c}_\mu = \inf_{u \in E(\Omega) \setminus \{0\}} \max_{t \geq 0} I_\mu(tu) \quad e \quad \hat{c}_\mu = \inf_{u \in \mathcal{N}_\mu} I_\mu(u), \quad (3.17)$$

onde $\mathcal{N}_\mu$ é dada por (3.13).

Demonstração. A prova de que I_μ satisfaz a geometria do passo da montanha é feita usando argumentos padrões e será aqui omitida. Argumentando como [40, Proposition 3.11] prova-se a igualdade (3.16). $\square$

Para contornar a falta de compacidade da imersão de $E(\Omega)$ em $L^{q+1}(\Omega)$, o seguinte resultado devido a Lions [29] será extremamente útil para demonstração de alguns resultados desse trabalho.

Lema 3.10. *Dada uma sequência limitada $(u_n) \subset E(\Omega)$, temos, a menos de subsequência:*

- (1) $u_n \rightharpoonup u$ em $E(\Omega)$;
- (2) $u_n \rightarrow u$ q.t.p. em Ω e em $L^\theta(\Omega)$, para todo $1 \leq \theta < q+1$;
- (3) $|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda$ no sentido das medidas em $\overline{\Omega}$;
- (4) $|u_n|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu$ no sentido das medidas em $\overline{\Omega}$;
- (5) existem um conjunto de índices J no máximo enumerável, uma família de pontos $\{x_j; j \in J\} \subset \overline{\Omega}$ e duas sequências $\{\lambda_j; j \in J\}, \{\nu_j; j \in J\} \subset (0, +\infty)$ tais que

$$\lambda \geq |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} + \sum_{j \in J} \lambda_j \delta_{x_j}, \quad \nu = |u|^{q+1} + \sum_{j \in J} \nu_j \delta_{x_j},$$

$$S\nu_j^{\frac{p+1}{p}\frac{1}{q+1}} \leq \lambda_j, \text{ para todo } j \in J, \text{ em particular } \sum_{j \in J} \nu_j^{\frac{p+1}{p}\frac{1}{q+1}} < +\infty;$$

(6) $\nabla u_n \rightharpoonup \nabla u$ em $(W^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega))^N$;

(7) $\nabla u_n \rightarrow \nabla u$ q.t.p. em Ω e em $(L^\sigma(\Omega))^N$, para todo $1 \leq \sigma < \sigma^*$, com $\sigma^* > \frac{p+1}{p}$ dependendo da imersão crítica de Sobolev de $W^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega)$.

Demonstração. Ver [29, Lemma I.1]. □

Lema 3.11. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então toda sequência (PS) para I_μ é limitada.*

Demonstração. Suponha que

$$I_\mu(u_n) \rightarrow d, \quad I'_\mu(u_n) \rightarrow 0.$$

Caso 1: $s = \frac{1}{p}$ e $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$.

Existem $C > 0$ e $(\sigma_n) \subset [0, +\infty)$, $\sigma_n \rightarrow 0$, tais que, para todo $n \in \mathbb{N}$ e todo $w \in E(\Omega)$

$$|I_\mu(u_n)| = \left| \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \frac{p}{p+1} \int_\Omega |u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{1}{q+1} \int_\Omega |u_n|^{q+1} dx \right| \leq C$$

e

$$|I'_\mu(u_n)w| = \left| \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta w dx - \mu \int_\Omega |u_n|^{\frac{1}{p}-1} u_n w dx - \int_\Omega |u_n|^{q-1} u_n w dx \right| \leq \sigma_n \|w\|.$$

De (3.10) e (3.11) segue que

$$\begin{aligned} (q+1)I_\mu(u_n) - I'_\mu(u_n)u_n &= \left[\frac{p}{p+1}(q+1) - 1 \right] \int_\Omega [|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u_n|^{\frac{p+1}{p}}] dx \\ &= \frac{pq-1}{p+1} \|u_n\|_\mu^{\frac{p+1}{p}} \geq \frac{1}{c(\Omega)} \frac{pq-1}{p+1} \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}}, \end{aligned}$$

e portanto

$$\frac{1}{c(\Omega)} \frac{pq-1}{p+1} \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} \leq (q+1)I_\mu(u_n) - I'_\mu(u_n)u_n \leq (q+1)C + \sigma_n \|u_n\|$$

o que prova que (u_n) é limitada em $E(\Omega)$.

Caso 2: $\frac{p}{p+1} < s+1 < q+1$ e $\mu > 0$.

Existem $C > 0$ e $(\sigma_n) \subset [0, +\infty)$, $\sigma_n \rightarrow 0$, tais que, para todo $n \in \mathbb{N}$ e todo $w \in E(\Omega)$

$$|I_\mu(u_n)| = \left| \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} \int_\Omega |u_n|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_\Omega |u_n|^{q+1} dx \right| \leq C$$

e

$$|I'_\mu(u_n)w| = \left| \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta w dx - \mu \int_\Omega |u_n|^{s-1} u_n w dx - \int_\Omega |u_n|^{q-1} u_n w dx \right| \leq \sigma_n \|w\|.$$

Segue que

$$\begin{aligned} I_\mu(u_n) - \frac{1}{s+1} I'_\mu(u_n) u_n &= \left(\frac{p}{p+1} - \frac{1}{s+1} \right) \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} + \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{q+1} \right) |u_n|_{q+1}^{q+1} \\ &\geq \left(\frac{p}{p+1} - \frac{1}{s+1} \right) \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}}, \end{aligned}$$

e portanto

$$\left(\frac{p}{p+1} - \frac{1}{s+1} \right) \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} \leq I_\mu(u_n) - \frac{1}{s+1} I'_\mu(u_n) u_n \leq C + \frac{1}{s+1} \sigma_n \|u_n\|$$

o que prova que (u_n) é limitada em $E(\Omega)$. $\square$

Lema 3.12. (i) Se $u \in E(\Omega)$ e $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, então $u\varphi \in E(\Omega)$.

(ii) Seja (u_n) uma sequência em $E(\Omega)$. Então $u_n \rightharpoonup u$ em $E(\Omega)$ se, e somente se, $\Delta u_n \rightharpoonup \Delta u$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$.

Demonstração. Ver [35], Lemas 3.4 e 2.4, respectivamente. $\square$

A fim de aplicarmos o teorema clássico do passo da montanha [6], é preciso mostrar para quais níveis o funcional I_μ satisfaz a condição $(PS)_c$. É esse o objetivo dos Lemas 3.13 a 3.18 a seguir, cujas demonstrações foram baseadas nos argumentos em [35], que por sua vez foram inspirados nos argumentos em [44].

Lema 3.13. Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se (u_n) é uma sequência (PS) para I_μ , então (u_n) satisfaz (1)-(7) do Lema 3.10, com o adicional de que J é, no máximo, finito.

Demonstração. Do Lema 3.11, segue (u_n) é limitada, donde vale (1)-(7) do Lema 3.10. Supondo $J \neq \emptyset$ seja $x_k \in \overline{\Omega}$ um ponto no suporte singular de λ e ν . Seja $\xi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \xi \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e $\text{supp}(\xi) \subset B_2(0)$; para cada $\theta > 0$ defina $\xi_\theta(x) = \xi\left(\frac{x-x_k}{\theta}\right)$. Existem então constantes $C_1, C_2 > 0$ independentes de θ tais que $|\nabla \xi_\theta(x)| \leq C_1/\theta$ e $|\Delta \xi_\theta(x)| \leq C_2/\theta^2$, para todo $x \in \mathbb{R}^N$, e do Lema 3.12-(i) segue que $\xi_\theta u_n \in E(\Omega)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e para todo $\theta > 0$.

Fixe $\theta > 0$. A sequência $(\xi_\theta u_n)$ é limitada em $E(\Omega)$, donde $I'_\mu(u_n)(\xi_\theta u_n) = o_n(1)$, ou seja,

$$\begin{aligned} o_n(1) &= \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} \xi_\theta dx + \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n u_n \Delta \xi_\theta dx + 2 \int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \nabla u_n \cdot \nabla \xi_\theta dx \\ &\quad - \mu \int_\Omega |u_n|^{s+1} \xi_\theta dx - \int_\Omega |u_n|^{q+1} \xi_\theta dx. \end{aligned} \tag{3.18}$$

Do item (2) do Lema 3.10, segue que $u_n \rightarrow u$ em $L^{s+1}(\Omega)$ e, consequentemente, $\xi_\theta u_n \rightarrow \xi_\theta u$ em $L^{s+1}(\Omega)$; por outro lado, $\xi_\theta(x) \rightarrow \delta_{x_k}(x)$ para todo $x \in \Omega$, quando $\theta \rightarrow 0$. Logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega |u_n|^{s+1} \xi_\theta dx = \int_\Omega |u|^{s+1} \xi_\theta dx \tag{3.19}$$

e do teorema da convergência dominada segue que

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \int_{\Omega} |u|^{s+1} \xi_{\theta} dx = 0. \quad (3.20)$$

Da desigualdade de Hölder, existe uma constante $C > 0$ independente de θ e n tal que

$$\left| \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n u_n \Delta \xi_{\theta} dx \right| \leq C \left(\int_{\Omega} |u_n|^{q+1} \left| \Delta \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{q+1}{2}} \right|^{\frac{1}{q+1}} dx \right)^{\frac{q+1}{2}}. \quad (3.21)$$

Da definição de convergência fraco-* temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_n|^{q+1} \left| \Delta \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{q+1}{2}} \right|^{\frac{1}{q+1}} dx = \int_{\Omega} \left| \Delta \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{q+1}{2}} \right|^{\frac{1}{q+1}} d\nu, \quad (3.22)$$

e como $|\Delta \xi(\frac{x-x_k}{\theta})|^{\frac{q+1}{2}} \rightarrow 0$ quando $\theta \rightarrow 0$ para todo $x \in \Omega$, segue novamente do teorema da convergência dominada que

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \int_{\Omega} \left| \Delta \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{q+1}{2}} \right|^{\frac{1}{q+1}} d\nu = 0. \quad (3.23)$$

Agora, note que

$$\left| \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \nabla u_n \cdot \nabla \xi_{\theta} dx \right| \leq C \left(\int_{\Omega} \frac{1}{\theta^{\frac{p+1}{p}}} \left| \nabla \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{p+1}{p}} \right|^{\frac{p}{p+1}} |\nabla u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx \right)^{\frac{p}{p+1}}, \quad (3.24)$$

e que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \frac{1}{\theta^{\frac{p+1}{p}}} \left| \nabla \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{p+1}{p}} \right|^{\frac{p}{p+1}} |\nabla u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx = \int_{\Omega} \frac{1}{\theta^{\frac{p+1}{p}}} \left| \nabla \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{p+1}{p}} \right|^{\frac{p}{p+1}} |\nabla u|^{\frac{p+1}{p}} dx, \quad (3.25)$$

e como $N > \frac{p+1}{p}$, de [18, Theorem 8.15] segue que

$$\int_{\Omega} \frac{1}{\theta^{\frac{p+1}{p}}} \left| \nabla \xi \left(\frac{x-x_k}{\theta} \right)^{\frac{p+1}{p}} \right|^{\frac{p}{p+1}} |\nabla u|^{\frac{p+1}{p}} dx = O(\theta^{N-\frac{p+1}{p}}). \quad (3.26)$$

Logo, fazendo $n \rightarrow \infty$ em (3.18), e depois $\theta \rightarrow 0$, segue de (3.19)-(3.26) que

$$0 = \lambda_k - \nu_k, \quad \forall k \in J. \quad (3.27)$$

Como $\lambda_k \geq S \nu_k^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}}$, obtemos $\nu_k \geq S \nu_k^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}}$ para todo $k \in J$, ou seja, para todo $k \in J$ temos $\nu_k = 0$ ou $\nu_k \geq S^{\frac{pN}{2(p+1)}}$. Por fim, como $\sum_{j \in J} \nu_j^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} < \infty$ segue então que J deve ser, no máximo, finito. $\square$

Lema 3.14. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Suponha (u_n) uma sequência (PS) para I_{μ} . Se $K \subset\subset \Omega \setminus \{x_j; j \in J\}$ é compacto, então $u_n \rightarrow u$ em $L^{q+1}(K)$.*

Demonstração. Do Lema 3.13, as hipóteses do Lema 3.10 são verificadas com J , no máximo, finito. Seja $\delta = \text{dist}(K, \{x_j; j \in J\})$. Para cada $\theta \in (0, \delta)$, considere $A_\theta = \{x \in \Omega; \text{dist}(x, K) < \theta\}$ e $\xi_\theta \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, $0 \leq \xi_\theta \leq 1$, $\xi_\theta \equiv 1$ em $A_{\theta/2}$ e $\xi_\theta \equiv 0$ em $\Omega \setminus A_\theta$. Então

$$\int_K |u_n|^{q+1} dx = \int_K |u_n|^{q+1} \xi_\theta dx \leq \int_{A_\theta} |u_n|^{q+1} \xi_\theta dx = \int_\Omega |u_n|^{q+1} \xi_\theta dx$$

e daí

$$\limsup_n \int_K |u_n|^{q+1} dx \leq \int_\Omega \xi_\theta d\nu = \int_\Omega \xi_\theta |u|^{q+1} dx = \int_{A_\theta} \xi_\theta |u|^{q+1} dx \leq \int_{A_\theta} |u|^{q+1} dx. \quad (3.28)$$

Fazendo $\theta \rightarrow 0$ em (3.28), segue do teorema da convergência dominada que

$$\limsup_n \int_K |u_n|^{q+1} dx \leq \int_K |u|^{q+1} dx.$$

Por outro lado, como $u_n \rightharpoonup u$ em $L^{q+1}(K)$, obtemos

$$\int_K |u|^{q+1} dx \leq \limsup_n \int_K |u_n|^{q+1} dx.$$

donde $|u_n|_{q+1, K} \rightarrow |u|_{q+1, K}$. Sendo $L^{q+1}(K)$ uniformemente convexo, segue por fim que $u_n \rightarrow u$ em $L^{q+1}(K)$. $\square$

Lema 3.15. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Suponha (u_n) uma sequência (PS) para I_μ . Se $K \subset\subset \Omega \setminus \{x_j; j \in J\}$ é compacto, então $\Delta u_n \rightarrow \Delta u$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(K)$.*

Demonstração. Para cada $r > 1$ existe uma constante $C_r > 0$ tal que

$$(|t|^{r-2}t - |s|^{r-2}s)(t - s) \geq \begin{cases} C_r |t - s|^r, & \text{se } r \geq 2, \\ C_r \frac{|t - s|^2}{(|t| + |s|)^{2-r}}, & \text{se } 1 < r < 2, \end{cases} \quad (3.29)$$

(ver [45, (2.2)]). Considere ξ_θ como no lema anterior. De (3.29) temos

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_K (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)(\Delta u_n - \Delta u) dx \\ &= \int_K (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)(\Delta u_n - \Delta u) \xi_\theta dx \\ &\leq \int_\Omega (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)(\Delta u_n - \Delta u) \xi_\theta dx \\ &= \int_\Omega [|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} \xi_\theta - |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \xi_\theta - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta(u_n - u)) \xi_\theta] dx \end{aligned} \quad (3.30)$$

Fixe $\theta > 0$. Como $I'_\mu(u_n) \rightarrow 0$ e (ξ_θ) é limitada em $E(\Omega)$, então $I'_\mu(u_n)(\xi_\theta u_n) = o_n(1)$ e $I'_\mu(u_n)(\xi_\theta u) = o_n(1)$, ou seja,

$$\int_\Omega |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (u \Delta \xi_\theta + 2 \nabla u \nabla \xi_\theta + \xi_\theta \Delta u) dx - \int_\Omega |u_n|^{s-1} u_n \xi_\theta u dx - \int_\Omega |u_n|^{q-1} u_n \xi_\theta u dx = o_n(1) \quad (3.31)$$

e

$$\int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (u_n \Delta \xi_{\theta} + 2 \nabla u_n \nabla \xi_{\theta} + \xi_{\theta} \Delta u_n) dx - \int_{\Omega} |u_n|^{s+1} \xi_{\theta} dx - \int_{\Omega} |u_n|^{q+1} \xi_{\theta} dx = o_n(1). \quad (3.32)$$

De (3.31) e (3.32) segue que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} [|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (u_n - u) \Delta \xi_{\theta} + 2 |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\nabla u_n - \nabla u) \nabla \xi_{\theta} + |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\Delta u_n - \Delta u) \xi_{\theta}] dx \\ - \int_{\Omega} |u_n|^{s-1} u_n (\xi_{\theta} u_n - \xi_{\theta} u) dx - \int_{\Omega} |u_n|^{q-1} u_n (\xi_{\theta} u_n - \xi_{\theta} u) dx = o_n(1), \end{aligned}$$

e como $\xi_{\theta} u_n \rightharpoonup \xi_{\theta} u$ em $L^{s+1}(\Omega)$ e em $L^{q+1}(\Omega)$ temos

$$\begin{aligned} o_n(1) = \int_{\Omega} \left[|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (u_n - u) \Delta \xi_{\theta} + 2 |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\nabla u_n - \nabla u) \nabla \xi_{\theta} \right. \\ \left. + |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\Delta u_n - \Delta u) \xi_{\theta} \right] dx \end{aligned}$$

o que implica

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\Delta u_n - \Delta u) \Delta \xi_{\theta} dx \\ = \int_{\Omega} [|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (u - u_n) \Delta \xi_{\theta} + 2 |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\nabla u - \nabla u_n) \nabla \xi_{\theta}] dx + o_n(1) \end{aligned}$$

e então

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\Delta u_n - \Delta u) \Delta \xi_{\theta} - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta u_n - \Delta u) \Delta \xi_{\theta} dx = \\ \int_{\Omega} [|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (u - u_n) \Delta \xi_{\theta} + 2 |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n (\nabla u - \nabla u_n) \nabla \xi_{\theta}] dx \\ - \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta u_n - \Delta u) \Delta \xi_{\theta} dx + o_n(1) \end{aligned}$$

Logo, de (3.30), do Lema 3.12-(ii), do Lema 3.14 e do fato de que $\xi_{\theta} u_n \rightharpoonup \xi_{\theta} u$ em $E(\Omega)$ temos

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_K (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) (\Delta u_n - \Delta u) dx \\ &\leq \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta \xi_{\theta} (u - u_n) dx + 2 \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \nabla \xi_{\theta} (\nabla u - \nabla u_n) dx \\ &\quad - \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta u_n - \Delta u) \xi_{\theta} dx + o_n(1) \\ &\leq C \left(\int_{A_{\theta}} |u - u_n|^{q+1} dx \right)^{\frac{1}{q+1}} + C \left(\int_{A_{\theta}} |\nabla u - \nabla u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx \right)^{\frac{p}{p+1}} \\ &\quad - \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta u_n - \Delta u) \xi_{\theta} dx + o_n(1) \\ &= - \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta u_n - \Delta u) \xi_{\theta} dx + o_n(1) = o_n(1). \end{aligned}$$

Portanto

$$\int_K (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) (\Delta u_n - \Delta u) dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (3.33)$$

No caso em que $(p+1)/p \geq 2$, obtemos de (3.29) e (3.33) que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_K |\Delta u_n - \Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx = 0,$$

e no caso em que $1 < (p+1)/p < 2$, segue da desigualdade de Hölder que

$$\begin{aligned} \int_K |\Delta u_n - \Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx &= \int_K \frac{|\Delta u_n - \Delta u|^{\frac{p+1}{p}}}{(|\Delta u_n| + |\Delta u|)^{\frac{\frac{p+1}{p}-1}{2} \frac{p-1}{p}}} (|\Delta u_n| + |\Delta u|)^{\frac{\frac{p+1}{p}-1}{2} \frac{p-1}{p}} dx \\ &\leq \left(\int_K \frac{|\Delta u_n - \Delta u|^2}{(|\Delta u_n| + |\Delta u|)^{1-\frac{1}{p}}} dx \right)^{\frac{p+1}{2p}} \left(\int_K (|\Delta u_n| + |\Delta u|)^{\frac{p+1}{p}} dx \right)^{\frac{p-1}{2p}} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

quando $n \rightarrow \infty$. Em ambos os casos concluímos que $\Delta u_n \rightarrow \Delta u$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(K)$. $\square$

Uma vez que

$$\Omega \setminus \{x_j; j \in J\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$$

onde cada conjunto K_n é compacto, aplicamos um argumento diagonal para obter o seguinte resultado.

Corolário 3.16. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se (u_n) uma sequência (PS) para I_μ , então, a menos de subsequência, (u_n) satisfaz (1)-(7) do Lema 3.10 com J no máximo finito e*

$$(8) \quad u_n \rightarrow u \text{ em } L^{q+1}(K), \quad \forall K \subset\subset \Omega \setminus \{x_j; j \in J\};$$

$$(9) \quad \Delta u_n \rightarrow \Delta u \text{ em } L^{\frac{p+1}{p}}(K), \quad \forall K \subset\subset \Omega \setminus \{x_j; j \in J\};$$

$$(10) \quad \Delta u_n \rightarrow \Delta u \text{ q. t. p em } \Omega.$$

Lema 3.17. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Se (u_n) é uma sequência (PS) para I_μ , então, a menos de subsequência, $u_n \rightharpoonup u$ em $E(\Omega)$ e u é solução fraca de (P_3) , com $I_\mu(u) \geq 0$.*

Demonstração. A sequência (u_n) satisfaz todas as propriedades do Corolário 3.16. Usando a imersão contínua de $E(\Omega)$ em $L^{q+1}(\Omega)$, concluímos, usando o lema de Brezis-Lieb [11], que $|u_n|^{q-1}u_n \rightharpoonup |u|^{q-1}u$ em $L^{\frac{q+1}{q}}(\Omega)$; em particular,

$$\int_\Omega |u_n|^{q-1}u_n \varphi dx \rightarrow \int_\Omega |u|^{q-1}u \varphi dx, \quad \forall \varphi \in E(\Omega). \quad (3.34)$$

Analogamente, mostra-se que

$$\int_\Omega |u_n|^{s-1}u_n \varphi dx \rightarrow \int_\Omega |u|^{s-1}u \varphi dx, \quad \forall \varphi \in E(\Omega). \quad (3.35)$$

Como Δu_n é limitada em $L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$, e $\Delta u_n \rightarrow \Delta u$ q.t.p. em Ω , usamos novamente o lema de Brezis-Lieb para concluir que $|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \rightarrow |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u$ em $L^{p+1}(\Omega)$, isto é,

$$\int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n z dx \rightarrow \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u z dx, \quad \forall z \in L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega),$$

e usamos agora o isomorfismo isométrico $-\Delta : E(\Omega) \rightarrow L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$ (ver [23, Chapter 9]) para concluir finalmente que

$$\int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta \varphi dx \rightarrow \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \Delta \varphi dx, \quad \forall \varphi \in E(\Omega). \quad (3.36)$$

Se (u_n) é uma sequência (PS) para I_{μ} , temos

$$I'_{\mu}(u_n)\varphi = \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta \varphi dx - \mu \int_{\Omega} |u_n|^{s-1} u_n \varphi dx - \int_{\Omega} |u_n|^{q-1} u_n \varphi dx = o_n(1), \quad \forall \varphi \in E(\Omega),$$

e fazendo $n \rightarrow \infty$ e usando (3.34)-(3.36), obtemos

$$\int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \Delta \varphi dx - \mu \int_{\Omega} |u|^{s-1} u \varphi dx - \int_{\Omega} |u|^{q-1} u \varphi dx = 0, \quad \varphi \in E(\Omega), \quad (3.37)$$

ou seja, u é solução fraca do problema (P_3) . Fazendo $\varphi = u$ em (3.37), temos

$$\int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx = \mu \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx + \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx,$$

donde

$$\begin{aligned} I_{\mu}(u) &= \frac{p}{p+1} \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx \\ &= \frac{p}{p+1} \left[\mu \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx + \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx \right] - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx \\ &= \mu \left(\frac{p}{p+1} - \frac{1}{s+1} \right) \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx + \left(\frac{p}{p+1} - \frac{1}{q+1} \right) \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx \\ &\geq \left(\frac{p}{p+1} - \frac{1}{q+1} \right) \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx = \frac{2}{N} |u|_{q+1}^{q+1} \geq 0. \end{aligned}$$

□

Lema 3.18. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então I_{μ} satisfaz a condição $(PS)_c$ para todo $c < \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}}$.*

Demonstração. Seja (u_n) uma sequência $(PS)_d$ para I_{μ} , com $d < \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}}$, isto é

$$I_{\mu}(u_n) \rightarrow d, \quad I'_{\mu}(u_n) \rightarrow 0.$$

Podemos supor (1)-(7) do Lema 3.10 e (8)-(10) do Corolário 3.16, com J no máximo finito, e $\lambda_k = \nu_k$, para todo $k \in J$, $\nu_k = 0$ ou $\nu_k \geq S^{\frac{pN}{2(p+1)}}$ (ver demonstração do Lema 3.13). Suponha

que existe $k \in J$ tal que $\nu_k \neq 0$. Então

$$\begin{aligned} d &= \lim_{n \rightarrow \infty} I_\mu(u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p}{p+1} \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega} |u_n|^{s+1} dx - \frac{1}{q+1} \int_{\Omega} |u_n|^{q+1} dx \right) \\ &\geq \frac{p}{p+1} \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx + \frac{p}{p+1} \sum_{j \in J} \nu_j - \frac{1}{q+1} \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx - \frac{1}{q+1} \sum_{j \in J} \nu_j - \frac{\mu}{s+1} \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx \\ &= I(u) + \left[\frac{p}{p+1} - \frac{1}{q+1} \right] \sum_{j \in J} \nu_j \geq I(u) + \frac{2}{N} \nu_k \geq I(u) + \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}}; \end{aligned}$$

como u é solução fraca do problema (P_3) , temos $I(u) \geq 0$, donde

$$d \geq I(u) + \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} \geq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}},$$

uma contradição. Portanto, $\nu_k = 0$, para todo $k \in J$, e como $L^{q+1}(\Omega)$ é uniformemente convexo, segue que $u_n \rightarrow u$ em $L^{q+1}(\Omega)$. Escreva agora $v_n := u_n - u$. Então $v_n \rightharpoonup 0$ em $E(\Omega)$, $\Delta v_n \rightarrow 0$ q.t.p. em Ω e $v_n \rightarrow 0$ em $L^{q+1}(\Omega)$. Mostremos agora $v_n \rightarrow 0$ em $E(\Omega)$, ou equivalentemente, que $\Delta v_n \rightarrow 0$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$. Do lema de Brezis-Lieb [11]

$$|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u + \Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} + |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} + o_n(1);$$

sendo u é solução fraca de (P_3) , temos

$$\begin{aligned} o_n(1) &= I'(u_n)u_n = |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u_n|_{s+1}^{s+1} - |u_n|_{q+1}^{q+1} \\ &= |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} + |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|_{s+1}^{s+1} - |u|_{q+1}^{q+1} + o_n(1) = |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} + o_n(1), \end{aligned}$$

ou seja, $v_n \rightarrow 0$ em $E(\Omega)$, e portanto, $u_n \rightarrow u$ em $E(\Omega)$, se $d < \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}}$. $\square$

Lema 3.19. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então, sob a hipótese (H), o nível do passo da montanha do funcional I_μ , dado por (3.14) é tal que*

$$c_\mu \in \left(0, \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} \right).$$

Demonstração. Ver Seção 3.3. $\square$

Destacamos que o próximo resultado é uma consequência direta dos Lemas 3.18 e 3.19, e do teorema clássico do passo da montanha [6].

Proposição 3.20. *Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, um domínio suave limitado e $\mu > 0$. No caso $s = 1/p$, supomos também $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$. Então, sob a hipótese (H), o nível do passo da montanha c_μ é um valor crítico de I_μ , isto é, existe $u_\mu \in E(\Omega)$ tal que*

$$I_\mu(u_\mu) = c_\mu, \quad I'_\mu(u_\mu) = 0.$$

Prova do Teorema 3.3

A existência de solução clássica não trivial para o problema (P_3) segue do Lema 3.8 e Proposição 3.20, como consequência do teorema do passo da montanha. Na Seção 3.2 veremos que toda solução u do tipo passo da montanha do problema (P_3) , a menos de substituir u por $-u$, satisfaz $u, -\Delta u > 0$ em Ω ; veja prova do Teorema 3.6 (iii). No Apêndice A deste trabalho, mostramos uma prova alternativa para este fato. $\square$

3.2 Prova do Teorema 3.6

Nesta parte nossos argumentos serão baseados nas caracterizações do nível do passo da montanha c_μ dadas pelo Lema 3.9.

Prova do Teorema 3.6 (i) e (ii). Provamos no Teorema 3.3 a existência de uma solução do tipo passo da montanha para o problema (P_3) associada ao nível crítico c_μ . Das igualdades dadas por (3.16) segue que toda solução passo da montanha de (P_3) é de energia mínima e vice-versa. $\square$

Prova do Teorema 3.6 (iii). Seja u uma solução de energia mínima de (P_3) . Segundo o Lema 3.8 sabemos que $u \in C^2(\bar{\Omega})$. Assim, usando o princípio do máximo forte para operadores elípticos de segunda ordem, basta provar que Δu não troca de sinal em Ω .

Por contradição suponha que Δu muda de sinal em Ω . Seja w a solução de

$$\begin{cases} -\Delta w = |\Delta u| & \text{em } \Omega, \\ w = 0 & \text{em } \partial\Omega. \end{cases}$$

Então, do princípio do máximo forte, tem-se $w > |u|$ em Ω . Como $w \in E(\Omega)$, temos

$$\begin{aligned} c_\mu &\leq \max_{t \geq 0} I_\mu(tw) \\ &= \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} \int_{\Omega} |\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{\Omega} |w|^{s+1} dx - \frac{t^{q+1}}{q+1} \int_{\Omega} |w|^{q+1} dx \right\} \\ &< \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{\Omega} |u|^{s+1} dx - \frac{t^{q+1}}{q+1} \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx \right\} \\ &= \max_{t \geq 0} I_\mu(tu) = c_\mu, \end{aligned}$$

um absurdo. $\square$

Prova do Teorema 3.6 (iv). Suponha $\Omega = B_r = B_r(0)$. Seja u uma solução de energia mínima de (P_3) . Segundo o item (iii) deste teorema, podemos admitir que $u, -\Delta u > 0$ em B_r .

Denote por u^* e $(-\Delta u)^*$ as simetrizações de Schwarz de u e $-\Delta u$, respectivamente. Se w é a solução de

$$\begin{cases} -\Delta w = (-\Delta u)^* & \text{em } B_r, \\ w = 0 & \text{sobre } \partial B_r, \end{cases}$$

então $w = w^*$ e $w \in E(B_r)$. Para a prova deste item basta mostrar que $u = w$.

De [5], ver também [10, Lemma 2.8], temos $w \geq u^*$ e

$$|w > u^*| = 0 \Leftrightarrow -\Delta u = (-\Delta u)^*.$$

Se $|w > u^*| > 0$, então

$$\begin{aligned} c_\mu &\leq \max_{t \geq 0} I_\mu(tv) \\ &= \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} \int_{B_r} |\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r} |w|^{s+1} dx - \frac{t^{q+1}}{q+1} \int_{B_r} |w|^{q+1} dx \right\} \\ &< \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} \int_{B_r} |(-\Delta u)^*|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r} |u^*|^{s+1} dx - \frac{t^{q+1}}{q+1} \int_{B_r} |u^*|^{q+1} dx \right\} \\ &= \max_{t \geq 0} \left\{ \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} \int_{B_r} |-\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} \int_{B_r} |u|^{s+1} dx - \frac{t^{q+1}}{q+1} \int_{B_r} |u|^{q+1} dx \right\} \\ &= \max_{t \geq 0} I_\mu(tu) = c_\mu \end{aligned}$$

um absurdo. Dessa maneira, $-\Delta u = (-\Delta u)^*$ e como u e w são soluções para o problema

$$\begin{cases} -\Delta z = (-\Delta u)^* & \text{em } B_r, \\ z = 0 & \text{sobre } \partial B_r, \end{cases}$$

segue que $u = w$. □

3.3 Prova do Lema 3.19

Mostremos que, sob a hipótese (H), o nível do passo da montanha c_μ , dado por (3.14), pertence ao intervalo $(0, (2/N)S^{\frac{pN}{2(p+1)}})$. Sem perda de generalidade, suponha $0 \in \Omega$. Seja $\xi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ uma função tal que $0 \leq \xi(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B(0, \rho/2)$, $\xi \equiv 0$ em $B(0, \rho)^c$ e $B(0, \rho) \subset \subset \Omega$, $\rho > 0$. Escreva

$$U_\delta(x) := \xi(x)\psi_\delta(x), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad 0 < \delta < \rho/2,$$

onde $\psi_\delta = S^{\frac{p[p(2-n)+2]}{2(p+1)^2}} \varphi_\delta$ e $\varphi_\delta(x) = \varphi_{\delta,0}(x)$ é dado por (3.4). Então

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta \psi_\delta|^{\frac{p+1}{p}} dx = S \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}^N} |\psi_\delta|^{q+1} dx = 1,$$

e, ver [35] eq. (6.4) and eq. (6.3) respectivamente, temos

$$|\Delta U_\delta|_{\frac{p+1}{p}, \Omega} = \begin{cases} S + O(\delta^{p(N-2)-2}), & \text{se } p < \frac{N}{N-2}, \\ S + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } p = \frac{N}{N-2}, \\ S + O(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } p > \frac{N}{N-2}, \end{cases} \quad (3.38)$$

e

$$|U_\delta|_{q+1, \Omega}^{q+1} = \begin{cases} 1 + O(\delta^{pN}), & \text{se } p < \frac{N}{N-2}, \\ 1 + |\log \delta|^{q+1} O(\delta^{q(N-2)-2}), & \text{se } p = \frac{N}{N-2}, \\ 1 + O(\delta^{q(N-2)-2}), & \text{se } p > \frac{N}{N-2}. \end{cases} \quad (3.39)$$

Fazendo

$$V_\delta(x) = \frac{U_\delta(x)}{|U_\delta|_{q+1}}, \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad (3.40)$$

segue que

$$|\Delta V_\delta|_{\frac{p+1}{p}, \Omega} = \begin{cases} S + O(\delta^{p(N-2)-2}), & \text{se } p < \frac{N}{N-2}, \\ S + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } p = \frac{N}{N-2}, \\ S + O(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } p > \frac{N}{N-2}, \end{cases} \quad (3.41)$$

Vamos agora estimar $|V_\delta|_{s+1}^{s+1}$.

Lema 3.21. *Suponha $\frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1$. Então*

(i) *Se $p < \frac{N}{N-2}$ então*

$$|V_\delta|_{s+1}^{s+1} = \begin{cases} C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} + o(\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]}), & \text{se } s+1 < \frac{N}{p(N-2)-2}, \\ C\delta^{\frac{Np}{p+1}} |\log \delta| + O(\delta^{\frac{Np}{p+1}}), & \text{se } s+1 = \frac{N}{p(N-2)-2}, \\ C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}), & \text{se } s+1 > \frac{N}{p(N-2)-2}. \end{cases} \quad (3.42)$$

(ii) *Se $p > \frac{N}{N-2}$ então*

$$|V_\delta|_{s+1}^{s+1} = \begin{cases} C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} + o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}), & \text{se } s+1 < \frac{N}{N-2}, \\ C\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}} |\log \delta| + O(\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}}), & \text{se } s+1 = \frac{N}{N-2}, \\ C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}), & \text{se } s+1 > \frac{N}{N-2}. \end{cases} \quad (3.43)$$

(iii) *Se $p = \frac{N}{N-2}$*

$$|V_\delta|_{s+1}^{s+1} = \begin{cases} C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} + |\log \delta|^{s+1} o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}), & \text{se } s+1 < \frac{N}{N-2}, \\ C\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}} |\log \delta| + |\log \delta|^{s+1} O(\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}}), & \text{se } s+1 = \frac{N}{N-2}, \\ C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}), & \text{se } s+1 > \frac{N}{N-2}. \end{cases} \quad (3.44)$$

Demonstração.

Caso 1: $p < \frac{N}{N-2}$.

De (3.5), existem constantes $C, D > 0$ tais que

$$\frac{D\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]}}{(\delta^{p(N-2)-2} + |x|^{p(N-2)-2})^{s+1}} \leq \frac{1}{\delta^{\frac{N(s+1)}{q+1}}} \varphi^{s+1}\left(\frac{x}{\delta}\right) \leq \frac{C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]}}{(\delta^{p(N-2)-2} + |x|^{p(N-2)-2})^{s+1}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Observe que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx &= \int_{\Omega} |\xi(x)\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\ &= \int_{B(0, \rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + \int_{B(0, \rho) \setminus B(0, \rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx, \end{aligned}$$

e por sua vez

$$\begin{aligned}
D\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} & \int_{B(0,\rho)\setminus B(0,\rho/2)} \frac{|\xi(x)|^{s+1}}{(\delta p^{(N-2)-2} + |x|^{p(N-2)-2})^{s+1}} dx \\
& \leq \int_{B(0,\rho)\setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\
& \leq C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} \int_{B(0,\rho)\setminus B(0,\rho/2)} \frac{|\xi(x)|^{s+1}}{(\delta p^{(N-2)-2} + |x|^{p(N-2)-2})^{s+1}} dx
\end{aligned}$$

donde, do teorema da convergência dominada,

$$\int_{B(0,\rho)\setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx = C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} + o(\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]})$$

e portanto

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} + o(\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]}). \quad (3.45)$$

A seguir, consideramos 3 casos distintos.

Caso 1.1: $s+1 < \frac{N}{p(N-2)-2}$.

Segue que

$$\begin{aligned}
D\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} & \int_{B(0,\rho/2)} \frac{1}{(\delta p^{(N-2)-2} + |x|^{p(N-2)-2})^{s+1}} dx \leq \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\
& \leq C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} \int_{B(0,\rho/2)} \frac{1}{(\delta p^{(N-2)-2} + |x|^{p(N-2)-2})^{s+1}} dx
\end{aligned}$$

donde, do teorema da convergência dominada,

$$\int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx = C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} + o(\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]})$$

e de (3.45) segue então que

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]} + o(\delta^{(s+1)\frac{p}{p+1}[p(N-2)-2]}). \quad (3.46)$$

Caso 1.2: $s+1 > \frac{N}{p(N-2)-2}$.

Temos

$$\int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx = \int_{B(0,\delta)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + \int_{\delta < |x| < \rho/2} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx; \quad (3.47)$$

por sua vez,

$$\begin{aligned}
\int_{B(0,\delta)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx & = \frac{C}{\delta^{\frac{N(s+1)}{q+1}}} \int_{B(0,\delta)} \varphi^{s+1}\left(\frac{x}{\delta}\right) dx \\
& = C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_{B(0,1)} \varphi^{s+1}(x) dx = C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}.
\end{aligned} \quad (3.48)$$

Temos também

$$\begin{aligned}
\int_{\delta < |x| < \rho/2} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= \frac{C}{\delta^{\frac{N(s+1)}{q+1}}} \int_{\delta < |x| < \rho/2} \varphi^{s+1}\left(\frac{x}{\delta}\right) dx \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_{1 < |x| < \rho/(2\delta)} \varphi^{s+1}(x) dx \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_{|x| > 1} \varphi^{s+1}(x) dx - C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_{|x| > \rho/(2\delta)} \varphi^{s+1}(x) dx \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}).
\end{aligned} \tag{3.49}$$

Logo, de (3.45),

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}), \tag{3.50}$$

pois $s+1 > \frac{N}{p(N-2)-2}$.

Caso 1.3: $s+1 = \frac{N}{p(N-2)-2}$.

É válido (3.47) e (3.48). Temos

$$\begin{aligned}
\int_{\delta < |x| < \rho/2} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx &= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_{1 < |x| < \rho/(2\delta)} \varphi^{s+1}(x) dx \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_1^{\rho/(2\delta)} \int_{S_r} \varphi^{s+1}(x) dS dr \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_1^{\rho/(2\delta)} \varphi^{s+1}(x) r^{N-1} dr \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_1^{\rho/(2\delta)} \frac{1}{r} dr + C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} \int_1^{\rho/(2\delta)} \left[\varphi^{s+1}(r) r^{N-1} - \frac{1}{r} \right] dr \\
&= C\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}} |\log \delta| + o(\delta^{N-\frac{N(s+1)}{q+1}}),
\end{aligned} \tag{3.51}$$

e assim, de (3.45),

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{Np}{p+1}} |\log \delta| + O(\delta^{\frac{Np}{p+1}}). \tag{3.52}$$

Caso 2: $p > \frac{N}{N-2}$.

De (3.7), existem constantes $C, D > 0$ tais que

$$\frac{D\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} \leq \frac{1}{\delta^{\frac{N(s+1)}{q+1}}} \varphi^{s+1}\left(\frac{x}{\delta}\right) \leq \frac{C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Observe que

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx &= \int_{\Omega} |\xi(x)\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\
&= \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx,
\end{aligned}$$

e por sua vez

$$\begin{aligned}
D\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{|\xi(x)|^{s+1}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx &\leq \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\
&\leq C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{|\xi(x)|^{s+1}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx
\end{aligned}$$

donde, do teorema da convergência dominada,

$$\int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} + o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}})$$

e portanto

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx + C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} + o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}). \quad (3.53)$$

Novamente, consideramos 3 casos distintos.

Caso 2.1: $s+1 < \frac{N}{N-2}$.

Segue que

$$\begin{aligned} D\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} \int_{B(0,\rho/2)} \frac{1}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx &\leq \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx \\ &\leq C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} \int_{B(0,\rho/2)} \frac{1}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx \end{aligned}$$

donde, do teorema da convergência dominada,

$$\int_{B(0,\rho/2)} |\psi_\delta(x)|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} + o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}})$$

e de (3.53) segue então que

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} + o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}). \quad (3.54)$$

Caso 2.2: $s+1 > \frac{N}{N-2}$.

É válido (3.47), (3.48) e (3.49). Logo, de (3.53),

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{N - \frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N - \frac{N(s+1)}{q+1}}), \quad (3.55)$$

pois $s+1 > \frac{N}{N-2}$.

Caso 2.3: $s+1 = \frac{N}{N-2}$.

É válido (3.47), (3.48) e (3.51). Logo, de (3.53)

$$\int_{\Omega} |U_\delta|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}} |\log \delta| + O(\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}}). \quad (3.56)$$

Caso 3: $p = \frac{N}{N-2}$.

De (3.6), existem constantes $C, D > 0$ tal que

$$\begin{aligned} \frac{D(|\log |x||^{s+1} + 1)|\log \delta|^{s+1} \delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} &\leq \frac{1}{\delta^{\frac{N(s+1)}{q+1}}} \varphi^{s+1} \left(\frac{x}{\delta} \right) \\ &\leq \frac{C(|\log |x||^{s+1} + 1)|\log \delta|^{s+1} \delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^N, \end{aligned}$$

se $|\log \delta| \geq 1$.

Observe que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |U_{\delta}|^{s+1} dx &= \int_{\Omega} |\xi(x)\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx \\ &= \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx + \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx, \end{aligned}$$

e por sua vez

$$\begin{aligned} D\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{(|\log |x||^{s+1} + 1) |\xi(x)|^{s+1}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx \\ \leq \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx \\ \leq C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} \int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} \frac{(|\log |x||^{s+1} + 1) |\xi(x)|^{s+1}}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx \end{aligned}$$

donde, do teorema da convergência dominada,

$$\int_{B(0,\rho) \setminus B(0,\rho/2)} |\xi(x)|^{s+1} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} + |\log \delta|^{s+1} o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}})$$

e portanto

$$\int_{\Omega} |U_{\delta}|^{s+1} dx = \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx + C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} + |\log \delta|^{s+1} o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}). \quad (3.57)$$

Mais uma vez, consideramos 3 casos distintos.

Caso 3.1: $s+1 < \frac{N}{N-2}$.

Segue que

$$\begin{aligned} D\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} \int_{B(0,\rho/2)} \frac{|\log |x||^{s+1} + 1}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx &\leq \int_{B(0,\rho/2)} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx \\ &\leq C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} \int_{B(0,\rho/2)} \frac{|\log |x||^{s+1} + 1}{(\delta^{N-2} + |x|^{N-2})^{s+1}} dx \end{aligned}$$

donde, do teorema da convergência dominada,

$$\int_{B(0,\rho/2)} |\psi_{\delta}(x)|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} + |\log \delta|^{s+1} o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}})$$

e de (3.57) segue então que

$$\int_{\Omega} |U_{\delta}|^{s+1} dx = C\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}} |\log \delta|^{s+1} + |\log \delta|^{s+1} o(\delta^{\frac{N(s+1)}{p+1}}). \quad (3.58)$$

Caso 3.2: $s+1 > \frac{N}{N-2}$.

É válido (3.47), (3.48) e (3.49). Logo, de (3.57),

$$\int_{\Omega} |U_{\delta}|^{s+1} dx = C\delta^{N - \frac{N(s+1)}{q+1}} + o(\delta^{N - \frac{N(s+1)}{q+1}}), \quad (3.59)$$

pois $s+1 > \frac{N}{N-2}$.

Caso 3.3: $s + 1 = \frac{N}{N-2}$.

É válido (3.47), (3.48) e (3.51). Logo, de (3.57)

$$\int_{\Omega} |U_{\delta}|^{s+1} dx = C \delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}} |\log \delta| + |\log \delta|^{s+1} O(\delta^{\frac{N^2}{(p+1)(N-2)}}). \quad (3.60)$$

□

Conclusão da prova do Lema 3.19

O nosso objetivo é mostrar que para δ suficientemente pequeno temos

$$\max_{t \geq 0} I_{\mu}(tV_{\delta}) < \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}}. \quad (3.61)$$

Note que

$$I_{\mu}(tV_{\delta}) = \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \frac{\mu}{s+1} t^{s+1} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1} - \frac{t^{q+1}}{q+1}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} I_{\mu}(tV_{\delta}) = -\infty,$$

e então $\max_{t \geq 0} I_{\mu}(tV_{\delta})$ é atingido em algum $t_{\delta} > 0$. Dessa maneira,

$$\left. \frac{d}{dt} I_{\mu}(tV_{\delta}) \right|_{t=t_{\delta}} = 0 \Rightarrow |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \mu t^{s-\frac{1}{p}} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1} - t_{\delta}^{q-\frac{1}{p}} = 0,$$

ou seja,

$$|\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = \mu t^{s-\frac{1}{p}} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1} + t_{\delta}^{q-\frac{1}{p}} \geq t_{\delta}^{q-\frac{1}{p}}$$

donde

$$t_{\delta} \leq |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{pq-1}}. \quad (3.62)$$

A última desigualdade implica que

$$|\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = t_{\delta}^{q-\frac{1}{p}} + \mu t_{\delta}^{s-\frac{1}{p}} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1} \leq t_{\delta}^{q-\frac{1}{p}} + \mu |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{pq-1}} \frac{ps-1}{p} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1}$$

e então

$$t_{\delta}^{q-\frac{1}{p}} \geq |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \mu |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{pq-1}} \frac{ps-1}{p} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1} = |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \left[1 - \mu |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{pq-1}} \frac{ps-1}{p} |V_{\delta}|_{s+1}^{s+1} \right].$$

Usando agora as estimativas em (3.41), as estimativas em (3.42), (3.43) e (3.44), e a desigualdade (3.62), concluímos que

$$t_{\delta} \rightarrow S^{\frac{p}{pq-1}}, \quad \delta \rightarrow 0. \quad (3.63)$$

Considere agora função

$$g(t) = \frac{p}{p+1} t^{\frac{p+1}{p}} |\Delta V_{\delta}|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \frac{t^{q+1}}{q+1}, \quad t \geq 0,$$

e observe que g atinge máximo em $t_0 = |\Delta V_\delta|^{\frac{p+1}{pq-1}}$ e que g é crescente no intervalo $[0, |\Delta V_\delta|^{\frac{p+1}{pq-1}}]$. Dessa maneira, de (3.62),

$$\begin{aligned} \max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) &= I_\mu(t_\delta V_\delta) = g(t_\delta) - \frac{\mu}{s+1} t_\delta^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &\leq \frac{p}{p+1} (|\Delta V_\delta|^{\frac{p+1}{pq-1}})^{\frac{p+1}{p}} |\Delta V_\delta|^{\frac{p+1}{p}} - \frac{(|\Delta V_\delta|^{\frac{p+1}{pq-1}})^{q+1}}{q+1} - \frac{\mu}{s+1} t_\delta^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &= \frac{2}{N} (|\Delta V_\delta|^{\frac{p+1}{p}})^{\frac{pN}{2(p+1)}} - \frac{\mu}{s+1} t_\delta^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}. \end{aligned}$$

Caso 1: $p < \frac{N}{N-2}$.

Segue de (3.41) que

$$\max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) \leq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + O(\delta^{p(N-2)-2}) - \frac{\mu}{s+1} t_\delta^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1},$$

e então, para δ suficientemente pequeno, segue de (3.63) que

$$\begin{aligned} \max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) &\leq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + O(\delta^{p(N-2)-2}) - \frac{\mu}{s+1} \left(\frac{S^{\frac{p}{pq-1}}}{2} \right)^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &= \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + O(\delta^{p(N-2)-2}) - \widehat{C} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}. \end{aligned}$$

Note que a 1ª linha em (3.42) não é útil para os nossos propósitos pois, da hipótese geral,

$$s+1 \geq \frac{p+1}{p} \Rightarrow (s+1) \frac{p}{p+1} \geq 1 \Rightarrow (s+1) \frac{p}{p+1} [p(N-2)-2] \geq [p(N-2)-2].$$

Agora, a 3ª linha (3.42) será útil se

$$N - \frac{N(s+1)}{q+1} < p(N-2) - 2,$$

e como $q+1 = \frac{N(p+1)}{p(N-2)-2}$, a última desigualdade é equivalente a

$$N - \frac{N(s+1)}{q+1} < \frac{N(p+1)}{q+1}, \quad \text{isto é, } q-p < s+1.$$

Lembrando que $\frac{p+1}{p} \leq s+1$ é hipótese geral, temos

$$q-p > \frac{p+1}{p} \Leftrightarrow p < \frac{2+\sqrt{2N}}{N-2}. \quad (3.64)$$

De fato, observe que se p e q satisfazem (3.1) então

$$q+1 = \frac{N(p+1)}{p(N-2)-2}. \quad (3.65)$$

Logo,

$$q - p > \frac{p+1}{p} \Leftrightarrow q > \frac{1}{p} + 1 + p \Leftrightarrow q + 1 > (p+1) \left(\frac{p+1}{p} \right);$$

de (3.65),

$$\frac{N(p+1)}{p(N-2)-2} > (p+1) \left(\frac{p+1}{p} \right) \Leftrightarrow \frac{N}{p(N-2)-2} > \frac{p+1}{p} \Leftrightarrow (N-2)p^2 - 4p - 2 < 0,$$

ou seja,

$$q - p > \frac{p+1}{p} \Leftrightarrow p < \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2}.$$

Ressaltamos também que

$$\min \left\{ \frac{N}{N-2}, \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \right\} = \begin{cases} \frac{N}{N-2}, & \text{se } N = 3, 4, 5, \\ \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2}, & \text{se } N \geq 6. \end{cases} \quad (3.66)$$

Portanto,

(i) se $N \geq 6$

(i.1) e $\frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq p < \frac{N}{N-2}$, e considerando também a 2ª linha de (3.42), temos (3.61) válido para todo $\frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1$;

(i.2) e $\frac{2}{N-2} < p < \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2}$, segue de (3.64) e (3.66) que (3.61) é válido se $q - p < s+1 < q+1$;

(ii) se $N = 3, 4, 5$ e $\frac{2}{N-2} < p < \frac{N}{N-2}$, segue de (3.64) e (3.66) que (3.61) é válido se $q - p < s+1 < q+1$.

Caso 2: $p > \frac{N}{N-2}$.

Segue de (3.41) que

$$\max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) \leq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + O(\delta^{\frac{N}{p}}) - \frac{\mu}{s+1} t_\delta^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1},$$

e então, para δ suficientemente pequeno, segue de (3.63) que

$$\begin{aligned} \max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) &\leq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + O(\delta^{\frac{N}{p}}) - \frac{\mu}{s+1} \left(\frac{S^{\frac{p}{pq-1}}}{2} \right)^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &= \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + O(\delta^{\frac{N}{p}}) - \widehat{C} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}. \end{aligned}$$

Note que a 1ª linha em (3.43) não é útil para os nossos propósitos pois, da hipótese geral,

$$s+1 \geq \frac{p+1}{p} \Rightarrow \frac{s+1}{p+1} \geq \frac{1}{p} \Rightarrow \frac{N(s+1)}{p+1} \geq \frac{N}{p}.$$

Agora, a 3ª linha (3.43) será útil se

$$N - \frac{N(s+1)}{q+1} < \frac{N}{p},$$

e a última desigualdade é equivalente a

$$\frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1.$$

Lembrando que $\frac{p+1}{p} \leq s+1$ é hipótese geral, temos

$$\frac{(p-1)(q+1)}{p} > \frac{p+1}{p} \Leftrightarrow p > \frac{N-2}{2}. \quad (3.67)$$

De fato, de (3.65),

$$(p-1) \frac{N(p+1)}{p(N-2)-2} > p+1 \Leftrightarrow p-1 > \frac{p(N-2)-2}{N},$$

ou seja,

$$\frac{(p-1)(q+1)}{p} > \frac{p+1}{p} \Leftrightarrow p > \frac{N-2}{2}.$$

Ressaltamos também que

$$\max \left\{ \frac{N}{N-2}, \frac{N-2}{2} \right\} = \begin{cases} \frac{N}{N-2}, & \text{se } N = 3, 4, 5, \\ \frac{N-2}{2}, & \text{se } N \geq 6. \end{cases} \quad (3.68)$$

Portanto,

(i) se $N \geq 6$

(i.1) e $\frac{N}{N-2} < p \leq \frac{N-2}{2}$, e considerando também a 2ª linha de (3.43), temos (3.61) válido para todo $\frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1$;

(i.2) e $p > \frac{N-2}{2}$, segue de (3.67) e (3.68) que (3.61) é válido se $\frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1$;

(ii) se $N = 3, 4, 5$ e $p > \frac{N}{N-2}$, segue de (3.67) e (3.68) que (3.61) é válido se $\frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1$.

Caso 3: $p = \frac{N}{N-2}$.

Segue de (3.41) que

$$\max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) \leq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{\frac{N}{p}}) - \frac{\mu}{s+1} t_\delta^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1},$$

e então, para δ suficientemente pequeno, segue de (3.63) que

$$\begin{aligned} \max_{t \geq 0} I_\mu(tV_\delta) &\leq \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{\frac{N}{p}}) - \frac{\mu}{s+1} \left(\frac{S^{\frac{p}{pq-1}}}{2} \right)^{s+1} |V_\delta|_{s+1}^{s+1} \\ &= \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{\frac{N}{p}}) - \widehat{C} |V_\delta|_{s+1}^{s+1}. \end{aligned}$$

A análise nesse caso é análoga a do Caso 2, usando agora as estimativas em (3.44).

Portanto,

(i) se $N \geq 6$

(i.1) e $\frac{N}{N-2} = p \leq \frac{N-2}{2}$, e considerando também a 2ª linha de (3.44), temos (3.61) válido para todo $\frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1$;

(i.2) e $p > \frac{N-2}{2}$, segue de (3.67) e (3.68) que (3.61) é válido se $\frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1$;

(ii) se $N = 3, 4, 5$ e $p \geq \frac{N}{N-2}$, segue de (3.67) e (3.68) que (3.61) é válido se $\frac{(p-1)(q+1)}{p} < s+1 < q+1$.

Por fim, combinando os itens (i.1) nos 3 casos obtemos (a) da hipótese (H). Os itens (i.2) e (ii) no Caso 1 equivalem a (b1) e (b3) de (H), enquanto os itens (i.2) e (ii) nos Casos 2 e 3 equivalem a (b2) e (b4) de (H). $\square$

3.4 Regiões crítica e não-crítica da hipérbole crítica para um sistema Hamiltoniano

Neste capítulo introduzimos na Definição 3.1 a noção de região não-crítica e região crítica da hipérbole crítica associadas ao operador $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u)$. No caso particular

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u) = \mu|u|^{\frac{1}{p}-1}u + |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P'_3)$$

$|u|^{\frac{1}{p}-1}u$ tem a mesma homogeneidade do operador $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u)$. Tenhamos em mente os resultados clássicos de Brezis e Nirenberg [12] para o $-\Delta$, Garcia Azorero e Peral Alonso [19] para o $-\Delta_p$ e van der Vorst [47] para Δ^2 , conforme já apresentados na introdução deste capítulo.

Observamos que a região não-crítica associada ao problema (P'_3) não é necessariamente simétrica em relação ao eixo $p = q$, pois o sistema associado ao problema (P'_3) , dado por

$$\begin{cases} -\Delta u = |v|^{p-1}v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu|u|^{\frac{1}{p}-1}u + |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (S'_3)$$

não é uma perturbação simétrica do sistema

$$\begin{cases} -\Delta u = |v|^{p-1}v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (S)$$

Se (p, q) pertence a região não-crítica associada ao problema (P'_3) , isto é,

$$N \geq 6 \quad \text{e} \quad \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}, \quad (3.69)$$

segue de $q + 1 = \frac{N(p+1)}{p(N-2)-2}$ que

$$\frac{4}{N-4} \leq q \leq \frac{N^2 + 2\sqrt{2N}}{\sqrt{2N}(N-2)}. \quad (3.70)$$

De forma semelhante, obtemos que a região não-crítica associada ao sistema

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda |u|^{\frac{1}{q}-1} u + |v|^{p-1} v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (S_3'')$$

é

$$N \geq 6 \quad \text{e} \quad \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq q \leq \frac{N-2}{2}. \quad (3.71)$$

Considere o sistema

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda |v|^{\frac{1}{q}-1} u + |v|^{p-1} v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu |u|^{\frac{1}{p}-1} u + |u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (S_1)$$

o qual é uma perturbação simétrica do sistema (S). Então é de se esperar que a região não-crítica associada ao sistema (S_1) seja dada pela interseção das regiões não-críticas associadas a (S_3') e (S_3'') , isto é, que a região não-crítica associada a (S_1) seja dada por

$$\begin{cases} \frac{4}{N-4} \leq p, q \leq \frac{N-2}{2}, & \text{se } N = 6, 7, 8, \\ \frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} \leq p, q \leq \frac{N^2+2\sqrt{2N}}{\sqrt{2N}(N-2)}, & \text{se } N \geq 9, \end{cases} \quad (3.72)$$

e que a região complementar seja crítica.

Resultados sobre o sistema do tipo

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda|v|^{r-1}u + |v|^{p-1}v & \text{em } \Omega, \\ -\Delta v = \mu|u|^{s-1}u + |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (S_2)$$

sob as hipóteses

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}, \quad \frac{q+1}{q} \leq r+1 < p+1, \quad \frac{p+1}{p} \leq s+1 < q+1$$

estão sendo estudados pela autora.

Multiplicidade de soluções para o problema (P'_3)

No Capítulo 3 estudamos a existência de soluções para o problema (P_3) . Dedicamos este capítulo ao estudo de múltiplas soluções para o problema (P_3) no caso em que a perturbação $|u|^{s-1}u$ tem a mesma homogeneidade do operador $\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u)$, isto é, no caso $s = 1/p$. Mais precisamente, dedicamos este capítulo ao estudo de múltiplas soluções para o problema de quarta-ordem

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u) = \mu|u|^{\frac{1}{p}-1}u + |u|^{q-1}u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P'_3)$$

satisfazendo

$$u, -\Delta u > 0 \quad \text{em } \Omega,$$

onde Ω é um domínio suave limitado de $\mathbb{R}^N$, $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$, onde $\mu_1(\Omega)$ denota o primeiro autovalor do problema (3.9), e

$$(p, q) \text{ é um ponto da hipérbole crítica } \frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}$$

na região não-crítica associada ao problema (P'_3) conforme apresentado pela Definição 3.1, isto é,

$$N \geq 6 \quad \text{e} \quad \frac{2 + \sqrt{2N}}{N-2} \leq p \leq \frac{N-2}{2}.$$

Teorema 4.1. *Sejam Ω um domínio limitado suave de $\mathbb{R}^N$ e (p, q) um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) . Então existe $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$ tal que, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, o problema (P'_3) possui, no mínimo, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ soluções clássicas que satisfazem $u, -\Delta u > 0$ em Ω .*

Observe que no caso $p = 1$ no problema (P'_3) torna-se o problema (P_1) , e a hipótese $\frac{2+\sqrt{2N}}{N-2} \leq p$ do Teorema 4.1 é reduzida a $N \geq 8$ (dimensões não-críticas para o biarmônico). Isto diz que o Teorema 4.1 estende o Teorema 1.1.

Como já definido no Capítulo 3, considere para $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$

$$\|u\|_\mu := \left(|\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|^{\frac{p+1}{p}} \right)^{\frac{p}{p+1}}, \quad \forall u \in E(\Omega) = W^{2, \frac{p+1}{p}}(\Omega) \cap W_0^{1, \frac{p+1}{p}}(\Omega). \quad (4.1)$$

Lembremos também da seguinte equivalência

$$\|u\|_\mu \leq \|u\| \leq c(\Omega) \|u\|_\mu, \quad \forall u \in E(\Omega), \quad (4.2)$$

onde $c(\Omega) = \left(1 - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)}\right)^{-\frac{p}{p+1}} > 0$. Trabalharemos com o funcional

$$J_\mu(u) := \int_\Omega |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \int_\Omega |u|^{\frac{p+1}{p}} dx \quad (4.3)$$

na variedade

$$V_q := \{u \in E(\Omega); \psi(u) = 1\} \quad \text{onde} \quad \psi(u) := \int_\Omega |u|^{q+1} dx. \quad (4.4)$$

Definimos

$$m(\mu, \Omega) := \inf\{J_\mu(u); u \in V_q\}, \quad (4.5)$$

e se $\Omega = B_\rho(0)$, denotamos $m(\mu, \rho) := m(\mu, B_\rho(0))$.

Provaremos que o funcional $J_\mu|_{V_q}$ possui, pelo menos, tantos pontos críticos quanto a categoria de Lusternik-Schnirelman de Ω , que a menos de multiplicação por constantes apropriadas são soluções clássicas para o problema (P'_3) .

4.1 Positividade das soluções do problema (P'_3)

Como veremos nas seções que seguem, as soluções obtidas no Teorema 4.1 serão, a menos de multiplicação por constantes apropriadas, pontos críticos de $J_\mu|_{V_q}$ com nível crítico menor que S , onde S é a constante de Sobolev associada a imersão $\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^{q+1}(\mathbb{R}^N)$. O lema a seguir mostra que tais soluções são positivas.

Lema 4.2. *Seja (p, q) um ponto sobre a hipérbole crítica. Então existe $0 < \tilde{\mu} < \mu_1(\Omega)$ tal que se $u \in V_q$ é um ponto crítico de $J_\mu|_{V_q}$ com $J_\mu(u) < S$ então, a menos de substituir u por $-u$, tem-se $u, -\Delta u > 0$ em Ω .*

Demonstração. Seja $u \in V_q$ é um ponto crítico de $J_\mu|_{V_q}$ com

$$J_\mu(u) < S. \quad (4.6)$$

Logo existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \Delta v dx = \mu \int_{\Omega} |u|^{\frac{1}{p}-1} |u| v dx + \lambda \int_{\Omega} |u|^{q-1} u v dx, \quad \forall v \in E(\Omega). \quad (4.7)$$

Como $u \in V_q$ temos $u \neq 0$ e

$$\lambda = \lambda \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx = \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \int_{\Omega} |u|^{\frac{p+1}{p}} dx = J_\mu(u) < S, \quad (4.8)$$

e também

$$\lambda = \lambda \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx = J_\mu(u) = \int_{\Omega} [|\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|^{\frac{p+1}{p}}] dx > 0. \quad (4.9)$$

Portanto, usando (4.7), segue que $w := \lambda^{\frac{p}{pq-1}} u$ é solução de (P'_3) . Pelo Lema 3.8, sabemos que w e portanto $u \in C^2(\overline{\Omega})$.

Suponha, por contradição, que $-\Delta u$ troca de sinal em Ω . Sejam u_1 e u_2 tais que

$$\begin{cases} -\Delta u_1 = (-\Delta u)^+ & \text{em } \Omega, \\ u_1 = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} -\Delta u_2 = -(-\Delta u)^- & \text{em } \Omega, \\ u_2 = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

onde $(-\Delta u)^+ = \max\{-\Delta u, 0\}$ e $(-\Delta u)^- = \max\{-(\Delta u), 0\}$. Segue então que $u_1, u_2 \in E(\Omega)$, $u = u_1 + u_2$, $u_1 \geq 0$, $u_2 \leq 0$ em Ω . Temos também

$$\int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx = \int_{\Omega} |\Delta u_1|^{\frac{p+1}{p}} dx + \int_{\Omega} |\Delta u_2|^{\frac{p+1}{p}} dx, \quad (4.10)$$

e, para $i = 1, 2$, são válidas as desigualdades

$$|u(x)|^{\frac{1}{p}-1} u(x) u_i(x) \leq |u_i(x)|^{\frac{p+1}{p}}, \quad |u(x)|^{q-1} u(x) u_i(x) \leq |u_i(x)|^{q+1} \quad \text{q.t.p. } x \in \mathbb{R}^N. \quad (4.11)$$

Veja [21, p. 126] onde um argumento semelhante foi utilizado.

Logo, de (3.2), (4.7), (4.8) e (4.11), e da imersão $L^{q+1}(\Omega) \hookrightarrow L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$ temos

$$\begin{aligned} S |u_i|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} &\leq |\Delta u_i|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = \int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \Delta u_i dx = \mu \int_{\Omega} |u|^{\frac{1}{p}-1} u u_i dx + \lambda \int_{\Omega} |u|^{q-1} u u_i dx \\ &\leq \mu \int_{\Omega} |u_i|^{\frac{p+1}{p}} dx + \lambda \int_{\Omega} |u_i|^{q+1} dx < \mu C |u_i|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} + S |u_i|_{q+1}^{q+1}, \end{aligned}$$

donde

$$|u_i|_{q+1}^{\frac{pq-1}{p}} > \frac{S - \mu C}{S}, \quad i = 1, 2. \quad (4.12)$$

Assim, usando novamente (3.2), (4.10) e (4.12) temos

$$\begin{aligned} J_\mu(u) &= |\Delta u|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u_1|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} + |\Delta u_2|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \geq S |u_1|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} + S |u_2|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \\ &> 2S \left(\frac{S - \mu C}{S} \right)^{\frac{p+1}{pq-1}} - \mu |u|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \rightarrow 2S, \end{aligned}$$

quando $\mu \rightarrow 0$, ou seja, para μ suficientemente pequeno $J_\mu(u) \geq S$, o que contradiz (4.6). Portanto, $-\Delta u$ possui sinal definido em Ω , digamos, $-\Delta u \geq 0$ e consequentemente, pelo princípio do máximo forte, $-\Delta u > 0$ em Ω . Segue então do princípio do máximo forte para o operador Laplaciano aplicado ao sistema associado a (P'_3) e do Lema 3.8 que $u > 0$ em Ω . $\square$

4.2 Compacidade

O Lema 4.4 descreve a falta de compacidade da imersão de $\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$ em $L^{q+1}(\mathbb{R}^N)$. O caso em que $p = 1$ foi provado no Lema 1.4, sem a necessidade da hipótese (4.18). Destacamos que as sequências minimizantes para as quais aplicaremos o Lema 4.4, mostraremos que essas satisfazem (4.18). Em relação a hipótese extra (4.18) lembramos também do seguinte resultado de Browder e de Figueiredo [13, Proposition 2.1].

Observação 4.3. *Sejam $r, s > 1$ tais que $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$. O operador de Nemytskii $\mathfrak{N} : L^r(\Omega) \rightarrow L^s(\Omega)$ definido por $\mathfrak{N}(w) = |w|^{r-2}w$ não é fracamente sequencialmente contínuo se $r \neq 2$. Isto diz que dada uma sequência $(u_n) \subset \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$ com $u_n \rightharpoonup u$ em $\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$ não tem-se necessariamente*

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta \varphi dx \longrightarrow \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u \Delta \varphi dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N). \quad (4.13)$$

No caso $p = 1$, a convergência $u_n \rightharpoonup u$ em $\mathcal{D}^{2,2}(\mathbb{R}^N)$ é precisamente (4.13), e foi esse fato utilizado na demonstração do Lema 1.4. Para a validade da convergência integral (4.13) para p qualquer faz-se necessário assumir $\Delta u_n \rightarrow \Delta u$ q.t.p. em $\mathbb{R}^N$. Mas, nesse caso, podemos também aplicar o lema de Brezis-Lieb [11] para prosseguir com a demonstração.

Lema 4.4 (Concentração e compacidade). *Seja (p, q) um ponto da hipérbole crítica. Seja $(u_n) \subset \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$ uma sequência tal que*

$$u_n \rightharpoonup u \text{ em } \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N), \quad (4.14)$$

$$|\Delta(u_n - u)|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda \text{ no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N, \quad (4.15)$$

$$|u_n - u|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu \text{ no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N, \quad (4.16)$$

$$u_n \rightarrow u \text{ q.t.p. em } \mathbb{R}^N, \quad (4.17)$$

$$\Delta u_n \rightarrow \Delta u \text{ q.t.p. em } \mathbb{R}^N. \quad (4.18)$$

Defina

$$\lambda_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| > R} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx, \quad \nu_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| > R} |u_n|^{q+1} dx.$$

Temos então

$$\|\nu\|^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} \leq S^{-1} \|\lambda\|, \quad (4.19)$$

$$\nu_\infty^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} \leq S^{-1} \lambda_\infty, \quad (4.20)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} + \|\lambda\| + \lambda_\infty, \quad (4.21)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |u_n|_{q+1}^{q+1} = |u|_{q+1}^{q+1} + \|\nu\| + \nu_\infty. \quad (4.22)$$

Mais ainda, se $u = 0$ e $\|\nu\|^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} = S^{-1} \|\lambda\|$, então λ e ν são concentradas em um único ponto em comum.

Demonstração.

Caso particular: $u = 0$. Provaremos (4.19) e (4.20), e que λ e ν são concentradas em um único ponto em comum.

A prova segue de maneira idêntica à demonstração do Lema 1.4.

Caso geral: u não é necessariamente nula e provaremos (4.19)-(4.22).

Escreva $v_n := u_n - u$. Então $v_n \rightharpoonup 0$ em $\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$, $|\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda$ e $|v_n|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu$ no sentido das medidas em $\mathbb{R}^N$, e $v_n \rightarrow 0$ q.t.p. em $\mathbb{R}^N$, donde, do caso particular, segue (4.19).

Usando a hipótese (4.18), segue do lema de Brezis-Lieb [11] que

$$\int_{|x| \geq R} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} dx \right),$$

donde

$$\lambda_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} dx.$$

Usando agora a hipótese (4.17) e novamente o lema de Brezis-Lieb, obtemos

$$\int_{|x| \geq R} |u|^{q+1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{|x| \geq R} |u_n|^{q+1} dx - \int_{|x| \geq R} |v_n|^{q+1} dx \right),$$

donde

$$\nu_\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |u_n|^{q+1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq R} |v_n|^{q+1} dx.$$

Do estudo feito no caso particular, segue (4.20).

Agora procederemos para provar (4.21). Temos

$$|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda + |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}}. \quad (4.23)$$

Com efeito, para toda $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^N)$ temos, do lema de Brezis-Lieb aplicado a f^+ e f^- ,

$$\int_{\mathbb{R}^N} f |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^N} f |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \int_{\mathbb{R}^N} f |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} dx \right).$$

donde (4.23) segue pois $|\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda$.

Fixe $R > 0$ e considere $\psi_R \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi_R(x) = 1$ se $|x| \geq R + 1$, $\psi_R(x) = 0$ se $|x| \leq R$ e $0 \leq \psi_R \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$. De (4.23) temos

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi_R |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) d\lambda + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx.$$

Fazendo agora $R \rightarrow \infty$, segue do teorema da convergência dominada que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx = \lambda_\infty + \int_{\mathbb{R}^N} 1 d\lambda + \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx$$

e portanto

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\Delta u_n|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} + \|\lambda\| + \lambda_\infty,$$

que é precisamente (4.21).

Para provar (4.22), primeiramente observe que

$$|u_n|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu + |u|^{q+1}. \quad (4.24)$$

Basta notar que para toda $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^N)$ temos, de Brezis-Lieb,

$$\int_{\mathbb{R}^N} f |u|^{q+1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^N} f |u_n|^{q+1} dx - \int_{\mathbb{R}^N} f |v_n|^{q+1} dx \right).$$

e argumentar como anteriormente, usando o fato de que $|v_n|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu$.

Fixe $R > 0$ e considerando, $\psi_R \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi_R(x) = 1$ se $|x| \geq R+1$, $\psi_R(x) = 0$ se $|x| \leq R$ e $0 \leq \psi_R \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$. De (4.24) temos

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |u_n|^{q+1} dx = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi_R |u_n|^{q+1} dx + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) d\nu + \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \psi_R) |u|^{q+1} dx,$$

e portanto

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |u_n|_{q+1}^{q+1} = |u|_{q+1}^{q+1} + \|\nu\| + \nu_\infty,$$

que é exatamente (4.22), encerrando a demonstração do lema. $\square$

Lema 4.5. *Seja (p, q) um ponto da hipérbole crítica. Se $(u_n) \subset V_q$ é tal que $\|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u_n|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \rightarrow S$, então, a menos de subsequência, $u_n \rightharpoonup u$ em $E(\Omega)$ e $\Delta u_n \rightarrow \Delta u$ q.t.p. em Ω .*

Demonstração. Se $(u_n) \subset V_q$ é tal que $\|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta u_n|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \rightarrow S$, então do princípio variacional de Ekeland [49, Theorem 8.5] segue que existe $(v_n) \subset V_q$ tal que

- (a) $F(v_n) := |\Delta v_n|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \rightarrow S$;
- (b) $\|u_n - v_n\| = |\Delta u_n - \Delta v_n|_{\frac{p+1}{p}} \rightarrow 0$;
- (c) $\|F'(v_n)\|_* = \min_{\alpha \in \mathbb{R}} \|F'(v_n) - \alpha \psi'(v_n)\| \rightarrow 0$, onde ψ é dada em (4.4),

ou seja, (v_n) é uma sequência $(PS)_S$ para o funcional $F|_{V_q}$.

Como (u_n) e (v_n) são limitadas em $E(\Omega)$, existem $u, v \in E(\Omega)$ tais que, a menos de subsequência, $u_n \rightharpoonup u$ e $v_n \rightharpoonup v$ em $E(\Omega)$. Segue então de (b) que $u = v$. Para provar o nosso lema, é suficiente mostrar que $\Delta v_n \rightarrow \Delta v$ q.t.p. em Ω , pois assim

$$\Delta u_n - \Delta v_n \rightarrow 0 \text{ em } L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega) \Rightarrow \Delta u_n - \Delta v_n \rightarrow 0 \text{ q.t.p. em } \Omega \Rightarrow \Delta u_n \rightarrow \Delta v = \Delta u \text{ q.t.p. em } \Omega.$$

Do item (c), para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $\alpha_n \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{aligned} |F'(v_n)w - \alpha_n \psi'(v_n)w| &= \left| \frac{p+1}{p} \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n \Delta w dx - \alpha_n (q+1) \int_{\Omega} |v_n|^{q-1} v_n w dx \right| \\ &\leq o_n(1) \|w\|, \forall w \in E(\Omega). \end{aligned}$$

Como a sequência (v_n) é limitada temos

$$\begin{aligned} F'(v_n)v_n - \alpha_n \psi'(v_n)v_n &= \frac{p+1}{p} \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} dx - \alpha_n (q+1) \int_{\Omega} |v_n|^{q+1} dx \\ &= \frac{p+1}{p} [S + o_n(1)] - \alpha_n (q+1) = o_n(1), \end{aligned}$$

ou seja,

$$\alpha_n = \frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1} S + o_n(1)$$

e assim concluímos que

$$\left| \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n \Delta w dx - [S + o_n(1)] \int_{\Omega} |v_n|^{q-1} v_n w dx \right| \leq o_n(1) \|w\|, \forall w \in E(\Omega). \quad (4.25)$$

Do Lema 3.10, podemos supor que:

$v_n \rightharpoonup v$ em $E(\Omega)$,

$v_n \rightarrow v$ q.t.p. em Ω e em $L^\theta(\Omega)$ para todo $1 \leq \theta < q+1$,

$|\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda$ no sentido das medidas de $\overline{\Omega}$,

$|v_n|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu$ no sentido das medidas de $\overline{\Omega}$,

e existem um conjunto de índices J no máximo enumerável, $\{x_j; j \in J\} \subset \overline{\Omega}$, $\{\nu_j; j \in J\}$, $\{\lambda_j; j \in J\} \subset (0, \infty)$ tais que

$$\begin{aligned} \nu &= |v|^{q+1} + \sum_{j \in J} \nu_j \delta_{x_j}, \quad \lambda \geq |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} + \sum_{j \in J} \lambda_j \delta_{x_j}, \\ S \nu_j^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} &\leq \mu_j, \forall j \in J, \quad \text{e} \quad \sum_{j \in J} \nu_j^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} < \infty. \end{aligned}$$

Para dar continuidade a nossa demonstração, provaremos três afirmações.

Afirmação 1: Se (v_n) satisfaz (4.25) então J é, no máximo, finito.

Seja $x_k \in \overline{\Omega}$ um ponto no suporte singular de λ e ν . Seja $\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $0 \leq \xi \leq 1$ em $\mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B_1(0)$, $\text{supp} \xi \subset B_2(0)$; para $\theta > 0$ defina $\xi_\theta(x) = \xi\left(\frac{x-x_k}{\theta}\right)$. Do Lema 3.12 (i), $\xi_\theta u_n \in E(\Omega)$ e é limitada. Fixado $\theta > 0$, temos, de (4.25),

$$\begin{aligned} o_n(1) &= \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n \Delta (\xi_\theta v_n) dx - [S + o_n(1)] \int_{\Omega} |v_n|^{q-1} v_n (\xi_\theta v_n) dx \\ &= \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (\xi_\theta \Delta v_n + 2 \nabla \xi_\theta \cdot \nabla v_n + v_n \Delta \xi_\theta) dx - [S + o_n(1)] \int_{\Omega} |v_n|^{q+1} \xi_\theta dx \\ &= \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} \xi_\theta dx - [S + o_n(1)] \int_{\Omega} |v_n|^{q+1} \xi_\theta dx \\ &+ \int_{\Omega} [|\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n v_n \Delta \xi_\theta + 2 |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n \nabla \xi_\theta \cdot \nabla v_n] dx. \end{aligned} \quad (4.26)$$

Logo, argumentando como no Lema 3.13, ao tomarmos o limite quando $n \rightarrow \infty$ em (4.26) e depois fazendo $\theta \rightarrow 0$, obtemos

$$0 = \lambda_k - S\nu_k, \forall k \in J.$$

Como $S\nu_k^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} \leq \lambda_k$, obtemos $\nu_k \geq \nu_k^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}}$ para todo $k \in J$, donde $\nu_k = 0$ ou $\nu_k^{1-\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} \geq 1$, e consequentemente $\nu_k \geq 1$. Por fim, como $\sum_{j \in J} \nu_j^{\frac{p+1}{p} \frac{1}{q+1}} < \infty$ segue que J deve ser, no máximo, finito.

Afirmção 2: Se $K \subset\subset \Omega \setminus \{x_j; j \in J\}$ é compacto, então $v_n \rightarrow v$ em $L^{q+1}(K)$.

O argumento é idêntico ao do Lema 3.14.

Afirmção 3: Se $K \subset\subset \Omega \setminus \{x_j; j \in J\}$ é compacto, então $\Delta v_n \rightarrow \Delta v$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(K)$.

Seja ξ_θ como na demonstração do Lema 3.14. Então, de (3.29)

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_K (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)(\Delta u_n - \Delta u) dx \\ &\leq \int_\Omega (|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u)(\Delta u_n - \Delta u) \xi_\theta dx \\ &= \int_\Omega [|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} \xi_\theta - |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \xi_\theta - |\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u (\Delta(u_n - u)) \xi_\theta] dx. \end{aligned}$$

Fixe $\theta > 0$. Como $(\xi_\theta v_n)$ é limitada em $E(\Omega)$, segue de (4.25) que

$$o_n(1) = \int_\Omega |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (v_n \Delta \xi_\theta + 2 \nabla v_n \cdot \nabla \xi_\theta + \xi_\theta \Delta v_n) dx - [S + o_n(1)] \int_\Omega |v_n|^{q+1} \xi_\theta dx$$

e

$$o_n(1) = \int_\Omega |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (v \Delta \xi_\theta + 2 \nabla v \cdot \nabla \xi_\theta + \xi_\theta \Delta v) dx - [S + o_n(1)] \int_\Omega |v_n|^{q-1} v_n \xi_\theta v dx.$$

Então

$$\begin{aligned} o_n(1) &= \int_\Omega |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (v_n - v) \Delta \xi_\theta + 2 |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (\nabla v_n - \nabla v) \cdot \nabla \xi_\theta \\ &\quad + |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (\Delta v_n - \Delta v) \xi_\theta - [S + o_n(1)] \int_\Omega |v_n|^{q-1} v_n (\xi_\theta v_n - \xi_\theta v) dx, \end{aligned}$$

e como $\xi_\theta v_n \rightharpoonup \xi_\theta v$ em $L^{q+1}(\Omega)$ temos

$$\begin{aligned} o_n(1) &= \int_\Omega |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (v_n - v) \Delta \xi_\theta + 2 |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (\nabla v_n - \nabla v) \cdot \nabla \xi_\theta \\ &\quad + |\Delta v_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta v_n (\Delta v_n - \Delta v) \xi_\theta dx \end{aligned}$$

e argumentando como no Lema 3.15, usando a Afirmção 2, concluímos então que $\Delta v_n \rightarrow \Delta v$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(K)$. Consequentemente, a menos de subsequência, $\Delta v_n \rightarrow \Delta v$ q.t.p. em Ω . $\square$

Lema 4.6. *Seja (p, q) um ponto da hipérbole crítica. Toda sequência $(u_n) \subset V_q$ tal que*

$$J_\mu(u_n) \rightarrow c < S, \quad \|J'_\mu(u_n)\|_* \rightarrow 0 \quad (4.27)$$

admite subsequência convergente, onde $\|\cdot\|_$ denota a norma da derivada da restrição do funcional J_μ à variedade V_q , e é dada por*

$$\|J'_\mu(u)\|_* = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|J'_\mu(u) - \lambda \psi'(u)\|, \quad \forall u \in V_q$$

e S é a constante de Sobolev para a imersão $\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^{q+1}(\mathbb{R}^N)$.

Demonstração. Se (u_n) satisfaz (4.27), então

$$0 \leq J_\mu(u_n) \rightarrow c,$$

e existe sequência $(\bar{\lambda}_n) \subset \mathbb{R}$ tal que

$$\|J'_\mu(u_n)\|_* = \|J'_\mu(u_n) - \bar{\lambda}_n \psi'(u_n)\| \rightarrow 0.$$

Logo existe $(\sigma_n) \subset \mathbb{R}$, com $\sigma_n \rightarrow 0$, tal que

$$\left| \int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta w dx - \mu \int_{\Omega} |u_n|^{\frac{1}{p}-1} u_n w dx - \lambda_n \int_{\Omega} |u_n|^{q-1} u_n w dx \right| \leq \sigma_n \|w\|, \quad \forall w \in E(\Omega).$$

A sequência (u_n) é limitada em $E(\Omega)$. De fato,

$$\|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} = \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u_n|^{\frac{p+1}{p}}_{\frac{p+1}{p}} + \mu |u_n|^{\frac{p+1}{p}}_{\frac{p+1}{p}} = c + o_n(1) + \mu |u_n|^{\frac{p+1}{p}}_{\frac{p+1}{p}}.$$

Como $(u_n) \subset V_q$, segue da imersão de $L^{q+1}(\Omega)$ em $L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$ que (u_n) é limitada em $L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$ e portanto a limitação de (u_n) em $E(\Omega)$.

Assim

$$\left| \int_{\Omega} [|\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u_n|^{\frac{p+1}{p}}] dx - \lambda_n \int_{\Omega} |u_n|^{q+1} dx \right| \leq \sigma_n \|u_n\| \Rightarrow J_\mu(u_n) - \lambda_n \rightarrow 0,$$

ou seja, $\lambda_n \rightarrow c \geq 0$.

Se $c = 0$, então

$$0 \leq \left(1 - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)}\right) \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} = \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} - \frac{\mu}{\mu_1(\Omega)} \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} \leq \|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u_n|^{\frac{p+1}{p}}_{\frac{p+1}{p}} = J_\mu(u_n) \rightarrow 0,$$

donde (u_n) converge fortemente para 0 em $E(\Omega)$.

Se $c > 0$ então $\lambda_n > 0$ para n suficientemente grande. Faça então $v_n = \lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n$. Temos

$$\begin{aligned} I_\mu(v_n) &= \frac{p}{p+1} \int_{\Omega} [|\Delta(\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n)|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n|^{\frac{p+1}{p}}] dx - \frac{1}{q+1} \int_{\Omega} |\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n|^{q+1} dx \\ &= \frac{p}{p+1} \lambda_n^{\frac{p+1}{pq-1}} J_\mu(u_n) - \frac{1}{q+1} \lambda_n^{\frac{p(q+1)}{pq-1}} \rightarrow \frac{p}{p+1} c^{\frac{p+1}{pq-1}} c - \frac{1}{q+1} c^{\frac{p(q+1)}{pq-1}} = \frac{2}{N} c^{\frac{pN}{2(p+1)}} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
|I'_\mu(v_n)w| &= \left| \int_{\Omega} [|\Delta(\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n)|^{\frac{1}{p}-1} \Delta(\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n) \Delta w - \mu |\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n|^{\frac{1}{p}-1} (\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n) w] dx \right. \\
&\quad \left. - \int_{\Omega} |\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n|^{q-1} (\lambda_n^{\frac{p}{pq-1}} u_n) w dx \right| \\
&= \lambda_n^{\frac{1}{pq-1}} \left| \int_{\Omega} [|\Delta u_n|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_n \Delta w - \mu |u_n|^{\frac{1}{p}-1} u_n w - \lambda_n |u_n|^{q-1} u_n w] dx \right| \\
&\leq \sigma_n \|w\| \rightarrow 0, \quad \forall w \in E(\Omega),
\end{aligned}$$

com I_μ dado por (3.12). Logo

$$I_\mu(v_n) \rightarrow \frac{2}{N} c^{\frac{pN}{2(p+1)}} < \frac{2}{N} S^{\frac{pN}{2(p+1)}} \quad \text{e} \quad I'_\mu(v_n) \rightarrow 0.$$

Do Lema 3.18 segue então que (v_n) admite uma subsequência convergente, donde (u_n) também admite subsequência convergente, ficando provada a condição $(PS)_c$ para o funcional J_μ , se $c < S$. $\square$

4.3 Multiplicidade de soluções

Nesta seção, faremos novamente uso do Teorema 1.8. Em nosso contexto, $X = E(\Omega)$, $\psi(u) = \int_{\Omega} |u|^{q+1} dx$ and $\varphi = J_\mu$.

Lema 4.7. *Sejam $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ e (p, q) um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) . Então existe $v \in E(\Omega) \setminus \{0\}$, com $v > 0$ em Ω , tal que*

$$\frac{\|v\|_{\mu^{\frac{p}{p+1}}}^{\frac{p+1}{p}}}{|v|_{q+1}^{\frac{p}{p+1}}} = \frac{|\Delta v|_{\frac{p}{p+1}}^{\frac{p+1}{p}} - \mu |v|_{\frac{p}{p+1}}^{\frac{p+1}{p}}}{|v|_{q+1}^{\frac{p}{p+1}}} < S. \quad (4.28)$$

Demonstração. Sem perda de generalidade, suponha $0 \in \Omega$. Seja $\xi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ uma função tal que $0 \leq \xi(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}^N$, $\xi \equiv 1$ em $B(0, \rho/2)$, $\xi \equiv 0$ em $B(0, \rho)^c$ e $B(0, \rho) \subset \subset \Omega$, $\rho > 0$. Escreva

$$U_\delta(x) := \xi(x) \psi_\delta(x), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad 0 < \delta < \rho/2,$$

onde $\psi_\delta = S^{\frac{p[p(2-n)+2]}{2(p+1)^2}} \varphi_\delta$ e $\varphi_\delta(x) = \varphi_{\delta,0}(x)$ é dado por (3.4). Então

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta \psi_\delta|^{\frac{p+1}{p}} dx = S \quad \text{e} \quad \int_{\mathbb{R}^N} |\psi_\delta|^{q+1} dx = 1,$$

e, ver [35] eq. (6.4) and eq. (6.3) respectivamente, temos

$$|\Delta U_\delta|_{\frac{p}{p+1}, \Omega}^{\frac{p+1}{p}} = \begin{cases} S + O(\delta^{p(N-2)-2}), & \text{se } p < \frac{N}{N-2}, \\ S + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } p = \frac{N}{N-2}, \\ S + O(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } p > \frac{N}{N-2}, \end{cases} \quad (4.29)$$

e

$$|U_\delta|_{q+1,\Omega}^{q+1} = \begin{cases} 1 + O(\delta^{pN}), & \text{se } p < \frac{N}{N-2}, \\ 1 + |\log \delta|^{q+1} O(\delta^{q(N-2)-2}), & \text{se } p = \frac{N}{N-2}, \\ 1 + O(\delta^{q(N-2)-2}), & \text{se } p > \frac{N}{N-2}. \end{cases} \quad (4.30)$$

Fazendo $s = 1/p$ no Lema 3.21 obtemos das estimativas (3.42), (3.43) e (3.44) que

$$|U_\delta|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = \begin{cases} C\delta^{p(N-2)-2} + o(\delta^{p(N-2)-2}), & \text{se } N < 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2, \\ C\delta^{2\frac{p+1}{p}} |\log \delta| + O(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N = 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2, \\ C\delta^{2\frac{p+1}{p}} + o(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N > 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2, \end{cases} \quad (4.31)$$

se $p < \frac{N}{N-2}$; que

$$|U_\delta|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = \begin{cases} C\delta^{\frac{N}{p}} + o(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } N < 2(p+1), \\ C\delta^{2\frac{p+1}{p}} |\log \delta| + O(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N = 2(p+1), \\ C\delta^{2\frac{p+1}{p}} + o(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N > 2(p+1), \end{cases} \quad (4.32)$$

se $p > \frac{N}{N-2}$; e que

$$|U_\delta|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = \begin{cases} C|\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} \delta^{\frac{N}{p}} + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} o(\delta^{\frac{N}{p}}), & \text{se } N < 2(p+1), \\ C\delta^{2\frac{p+1}{p}} |\log \delta| + |\log \delta|^{\frac{p+1}{p}} O(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N = 2(p+1), \\ C\delta^{2\frac{p+1}{p}} + o(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N > 2(p+1), \end{cases} \quad (4.33)$$

se $p = \frac{N}{N-2}$.

No caso em que $p < \frac{N}{N-2}$, segue de (4.29), (4.30) e (4.31) que existe uma constante $C = C(N) > 0$ tal que

$$\frac{| \Delta U_\delta |_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} - \mu |U_\delta|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}}}{|U_\delta|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}}} = \begin{cases} S - \mu C \delta^{p(N-2)-2} + O(\delta^{p(N-2)-2}), & \text{se } N < 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2, \\ S - \mu C \delta^{2\frac{p+1}{p}} |\log \delta| + O(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N = 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2, \\ S - \mu C \delta^{2\frac{p+1}{p}} + O(\delta^{2\frac{p+1}{p}}), & \text{se } N > 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2 \end{cases} < S,$$

para $N \geq 2\left(\frac{p+1}{p}\right)^2$ e $\delta > 0$ suficientemente pequeno. Uma conclusão análoga é obtida para o caso em que $p > N/(N-2)$ e $N \geq 2(p+1)$, usando-se (4.29), (4.30) e (4.32), e para o caso em que $p = N/(N-2)$ e $N \geq 2(p+1)$, usando-se (4.29), (4.30) e (4.33). $\square$

Lema 4.8. *Se $0 < \mu < \mu_1(\Omega)$ e (p, q) um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) , então*

$$m(\mu, \Omega) < S$$

e existe $u \in V_q$ tal que $J_\mu(u) = m(\mu, \Omega)$, com $m(\mu, \Omega)$ dado por (4.5). Além disso, qualquer $u \in V_q$ satisfazendo $J_\mu(u) = m(\mu, \Omega)$ é, a menos de substituir u por $-u$, tal que $u, -\Delta u > 0$ em Ω .

Demonstração. Do Lema 4.7, existe $v \in E(\Omega) \setminus \{0\}$ não negativa tal que

$$\frac{|\Delta v|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|v|^{\frac{p+1}{p}}}{|v|^{\frac{p+1}{p}}_{q+1}} < S.$$

Definindo $w = v/|v|_{q+1}$, temos $w \in V_q$ e

$$J_\mu(w) = |\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|w|^{\frac{p+1}{p}} = \frac{|\Delta v|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|v|^{\frac{p+1}{p}}}{|v|^{\frac{p+1}{p}}_{q+1}} < S,$$

donde

$$m(\mu, \Omega) = \inf_{u \in V_q} J_\mu(u) \leq J_\mu(w) < S.$$

Pelo Lema 4.6, $J_\mu|_{V_q}$ satisfaz a condição $(PS)_c$, com $c = m(\mu, \Omega)$. Do Teorema 1.8, J_μ assume um mínimo, isto é, existe $u \in V_q$ tal que

$$J_\mu(u) = m(\mu, \Omega) = \min_{u \in V_q} J_\mu(u).$$

Mostremos agora que, a menos de substituir u por $-u$, temos $u, -\Delta u > 0$ em Ω . Como $u \in E(\Omega)$ é tal que

$$|u|_{q+1} = 1, \quad |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|u|^{\frac{p+1}{p}} = m(\mu, \Omega) > 0,$$

segue do teorema dos multiplicadores de Lagrange que u é solução da equação

$$\begin{cases} \Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u) = \mu|u|^{\frac{1}{p}-1} u + m(\mu, \Omega)|u|^{q-1} u & \text{em } \Omega, \\ u, \Delta u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Considere então w a solução do problema

$$\begin{cases} -\Delta w = |-\Delta u| & \text{em } \Omega, \\ w = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Como $-\Delta u \in L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega)$, segue que $w \in E(\Omega)$ [23, Theorem 9.15] e do princípio do máximo segue que $w \geq |u|$ em Ω . Logo, $-\Delta u$ tem sinal definido em Ω ou $w > |u|$ em Ω . Suponha então $w > |u|$ em Ω e tome $\bar{w} = w/|w|_{q+1}$; então $|\bar{w}|_{q+1} = 1$ e

$$\begin{aligned} m(\mu, \Omega) &\leq \int_{\Omega} [|\Delta \bar{w}|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|\bar{w}|^{\frac{p+1}{p}}] dx = \frac{1}{|w|^{\frac{p+1}{p}}_{q+1}} \int_{\Omega} [|\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|w|^{\frac{p+1}{p}}] dx \\ &< \int_{\Omega} [|\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|w|^{\frac{p+1}{p}}] dx < \int_{\Omega} [|\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu|u|^{\frac{p+1}{p}}] dx = m(\mu, \Omega), \end{aligned}$$

uma contradição. Portanto, $-\Delta u$ tem sinal definido em Ω , digamos, $-\Delta u \geq 0$ em Ω , e consequentemente $u \geq 0$ em Ω . É fácil verificar então que $v = m(\mu, \Omega)^{\frac{p}{pq-1}} u$ é ponto crítico não negativo do funcional I_μ dado em (3.12), e do Lema 3.8 e do princípio do máximo forte temos $v, -\Delta v > 0$ em Ω , e o resultado segue. $\square$

Lema 4.9. *Se Ω_1 e Ω_2 são domínios regulares limitados em $\mathbb{R}^N$ tais que $\Omega_1 \subset\subset \Omega_2$, $0 < \mu < \mu_1(\Omega_2)$ e (p, q) é um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) , então $m(\mu, \Omega_1) > m(\mu, \Omega_2)$.*

Demonstração. Primeiramente observe que $\mu_1(\Omega_2) < \mu_1(\Omega_1)$. A prova deste fato pode ser feita usando argumentos de extensão exatamente como o que segue nesta demonstração.

Do Lema 4.8, seja $u \in E(\Omega_1)$ tal que $u, -\Delta u > 0$ em Ω_1 e

$$\int_{\Omega_1} |u|^{q+1} dx = 1, \quad \int_{\Omega_1} [|\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|^{\frac{p+1}{p}}] dx = m(\mu, \Omega_1),$$

e seja w solução do problema

$$\begin{cases} -\Delta w = \widetilde{-\Delta u} & \text{em } \Omega_2, \\ w = 0 & \text{sobre } \partial\Omega_2, \end{cases}$$

onde $\sim$ denota a extensão por zero fora de Ω_1 . Note que $w > 0$ em Ω_2 e $w > u$ em Ω_1 . Escrevendo $\bar{w} = w/|w|_{q+1, \Omega_2}$ temos $|\bar{w}|_{q+1, \Omega_2} = 1$ e

$$\begin{aligned} m(\mu, \Omega_2) &\leq \int_{\Omega_2} [|\Delta \bar{w}|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |\bar{w}|^{\frac{p+1}{p}}] dx = \frac{1}{|w|_{q+1, \Omega_2}^{\frac{p+1}{p}}} \int_{\Omega_2} [|\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |w|^{\frac{p+1}{p}}] dx \\ &< \int_{\Omega_2} [|\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |w|^{\frac{p+1}{p}}] dx < \int_{\Omega_1} [|\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|^{\frac{p+1}{p}}] dx = m(\mu, \Omega_1), \end{aligned}$$

e o resultado segue. $\square$

Lema 4.10. *Se $\Omega = B_\rho(0) \subset \mathbb{R}^N$, $0 < \mu < \mu_1(B_\rho(0))$ e (p, q) é um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) , então $m(\mu, \rho)$ é atingido por uma função u . Além disso, qualquer função u nestas condições é tal que u e $-\Delta u$ são radialmente simétricas e, a menos de substituir u por $-u$, tem-se $u, -\Delta u > 0$ em $B_\rho(0)$.*

Demonstração. Ver Teorema 3.6 (iv). $\square$

De acordo com [23, Theorem 9.9], se $f \in L^r(\mathbb{R}^N)$, $1 < r < \infty$, e w é o potencial Newtoniano de f então $w \in \mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N)$ e $-\Delta w = f$ q.t.p. em $\mathbb{R}^N$. A partir disso podemos construir uma isometria entre os espaços $L^r(\mathbb{R}^N)$ e $\mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N)$.

Lema 4.11. *Se $1 < r < \infty$, então $-\Delta : \mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N) \rightarrow L^r(\mathbb{R}^N)$ é um isomorfismo isométrico.*

Demonstração. Observe que $-\Delta$ está bem definida e é linear. É uma isometria, pois

$$\|-\Delta u\|_r = \|u\|_{\mathcal{D}^{2,r}};$$

e é injetora, pois

$$-\Delta u = 0 \Leftrightarrow \|u\|_{\mathcal{D}^{2,r}} = 0 \Leftrightarrow u = 0.$$

Para mostrar que $-\Delta$ é sobrejetiva, basta mostrar que $-\Delta(\mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N))$ é denso em $L^r(\mathbb{R}^N)$. Para isso, é suficiente mostrar que

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^N) \subset -\Delta(\mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N))$$

ou seja, que dada $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ existe $u \in \mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$-\Delta u = f \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N.$$

Mas isto é garantido por [23, Theorem 9.9]. $\square$

Lema 4.12. *Sejam $1 < r < \infty$ e (u_n) uma sequência em $\mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N)$. Então $u_n \rightharpoonup u$ em $\mathcal{D}^{2,r}(\mathbb{R}^N)$ se, e somente se, $\Delta u_n \rightharpoonup \Delta u$ em $L^r(\mathbb{R}^N)$.*

Demonstração. A demonstração segue o mesmo raciocínio do Lema 3.12 (ii), usando-se agora o resultado do Lema 4.11. $\square$

Defina agora a aplicação baricentro $\beta : V_q \rightarrow \mathbb{R}^N$ por

$$\beta(u) = \frac{\int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} x dx}{\int_{\Omega} |\Delta u|^{\frac{p+1}{p}} dx}. \quad (4.34)$$

Lema 4.13. *Seja (p, q) um ponto da hipérbole crítica. Se $(u_n) \subset V_q$ é tal que $\|u_n\|^{\frac{p+1}{p}} \rightarrow S$, então $\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) \rightarrow 0$.*

Demonstração. Suponha, por contradição, que $\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) \not\rightarrow 0$; existe então $r > 0$ tal que, a menos de subsequência,

$$\text{dist}(\beta(u_n), \Omega) > r.$$

Sejam $v_n = u_n / |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} \in E(\Omega)$ e w_n o potencial newtoniano de $|\widetilde{-\Delta v_n}|$, onde $\sim$ denota a extensão por zero fora de Ω . Então, de [23, Theorema 9.9] sabemos que $w_n \in \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$ e

$$-\Delta w_n = |\widetilde{-\Delta v_n}| \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N.$$

Em particular, (w_n) é limitada em $\mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N)$, donde, a menos de subsequência,

$$w_n \rightharpoonup w \quad \text{em } \mathcal{D}^{2, \frac{p+1}{p}}(\mathbb{R}^N),$$

$$|\Delta(w_n - w)|^{\frac{p+1}{p}} \xrightarrow{*} \lambda \quad \text{no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N,$$

$$|w_n - w|^{q+1} \xrightarrow{*} \nu \quad \text{no sentido das medidas em } \mathbb{R}^N,$$

$$w_n \rightarrow w \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N;$$

combinando agora os resultados dos Lemas 4.5 e 4.12 concluímos também que

$$\Delta w_n \rightarrow \Delta w \quad \text{q.t.p. em } \mathbb{R}^N.$$

Então como $w_n \geq |\widetilde{v_n}|$ em $\mathbb{R}^N$, temos do Lema 4.4 que (por Ω ser limitado $\lambda_\infty = \nu_\infty = 0$)

$$1 = |\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} + \|\lambda\|, \quad (4.35)$$

$$\frac{1}{S^{(q+1)\frac{p}{p+1}}} \leq |w|_{q+1}^{q+1} + \|\nu\|, \quad (4.36)$$

e

$$\|\nu\|^{\frac{p+1}{p}\frac{1}{q+1}} \leq \frac{1}{S}\|\lambda\|, \quad |w|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} \leq \frac{1}{S}|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}}. \quad (4.37)$$

Com isso segue que o par $(|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}}, \|\lambda\|) \in \{(1, 0), (0, 1)\}$. Com efeito, de (4.37) temos

$$\|\nu\| \leq \frac{1}{S^{(q+1)\frac{p}{p+1}}}\|\lambda\|^{(q+1)\frac{p}{p+1}}, \quad |w|_{q+1}^{q+1} = (|w|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}})^{(q+1)\frac{p}{p+1}} \leq \frac{1}{S^{(q+1)\frac{p}{p+1}}}|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{q+1},$$

e então de (4.36)

$$\frac{1}{S^{(q+1)\frac{p}{p+1}}} \leq |w|_{q+1}^{q+1} + \|\nu\| \leq \frac{1}{S^{(q+1)\frac{p}{p+1}}} [|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{q+1} + \|\lambda\|^{(q+1)\frac{p}{p+1}}]$$

ou seja,

$$|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{q+1} + \|\lambda\|^{(q+1)\frac{p}{p+1}} \geq 1. \quad (4.38)$$

De (4.35) e (4.38) e como $(q+1)\frac{p}{p+1} > 1$, segue que $(|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}}, \|\lambda\|) \in \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Suponha agora que $|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = 1$ e $\|\lambda\| = 0$. Então, de (4.37), segue que $\|\nu\| = 0$, o que implica, de (4.36),

$$\frac{1}{S} \leq |w|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} \leq \frac{1}{S}|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = \frac{1}{S}$$

e então $|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}}/|w|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}} = S$. Logo, a menos de multiplicação por escalar, w é uma solução não trivial e positiva da equação

$$\Delta(|\Delta u|^{\frac{1}{p}-1}\Delta u) = u^q \quad \text{em } \mathbb{R}^N,$$

e então, $w, -\Delta w > 0$ em $\mathbb{R}^N$. Mas, para toda $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ temos

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n - \Delta w|^{\frac{p+1}{p}} \varphi dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} \varphi d\lambda = 0$$

o que implica, em particular,

$$\int_{\Omega} |\Delta w_n - \Delta w|^{\frac{p+1}{p}} \varphi dx + \int_{\mathbb{R}^N \setminus \Omega} |\Delta w|^{\frac{p+1}{p}} \varphi dx \rightarrow 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N \setminus \Omega),$$

e então $-\Delta w = 0$ em $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$, o que é uma contradição.

Dessa maneira, $|\Delta w|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = 0$ (e de (4.37) segue que $w = 0$) e $\|\lambda\| = 1$. De (4.36) e (4.37) segue que $\|\nu\|^{\frac{p+1}{p}\frac{1}{q+1}} = S^{-1}\|\lambda\|$. Portanto, do Lema 4.4, segue que λ está concentrada em um único ponto $y \in \mathbb{R}^N$. Afirmamos agora que $y \in \overline{\Omega}$.

De fato, supondo que $y \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$, tome $\psi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\psi \equiv 1$ em $B_R(y)$, para algum $R > 0$ e $\text{supp}(\psi) \cap \overline{\Omega} = \emptyset$. Então,

$$1 = \lambda(\{y\}) = \int_{\mathbb{R}^N} \psi d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \psi |\Delta w_n|^{\frac{p+1}{p}} dx = 0,$$

o que é claramente uma contradição. Portanto, $y \in \overline{\Omega}$ e tomando $\eta \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\eta \equiv 1$ em $\overline{\Omega}$, temos

$$\begin{aligned}\beta(u_n) &= \frac{\int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx}{\int_{\Omega} |\Delta u_n|^{\frac{p+1}{p}} dx} = \int_{\Omega} |\Delta v_n|^{\frac{p+1}{p}} dx = \int_{\mathbb{R}^N} |\Delta w_n|^{\frac{p+1}{p}} x \eta(x) dx \\ &\rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} x \eta(x) d\lambda = y \eta(y) = y \in \overline{\Omega},\end{aligned}$$

o que contradiz nossa hipótese inicial. $\square$

Sem perda de generalidade, suponha $0 \in \Omega$. Seja $r > 0$ suficientemente pequeno tal que

$$\Omega_r^+ := \{x \in \mathbb{R}^N; \text{dist}(x, \overline{\Omega}) \leq r\} \quad \text{e} \quad \Omega_r^- := \{x \in \Omega; \text{dist}(x, \partial\Omega) \geq r\}$$

são homotopicamente equivalentes a Ω e tal que $B_r(0) \subset \Omega$. Defina também o conjunto

$$J_\mu^{m(\mu, r)} =: \{u \in V_q; J_\mu(u) \leq m(\mu, r)\},$$

que é não vazio; ver Lema 4.9.

Lema 4.14. *Seja (p, q) um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) . Então existe $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$ tal que, para $0 < \mu < \bar{\mu}$,*

$$u \in J_\mu^{m(\mu, r)} \Rightarrow \beta(u) \in \Omega_r^+.$$

Demonstração. Se $u \in V_q$, da desigualdade de Hölder segue que

$$|u|^{\frac{p+1}{\frac{p}{p+1}}} \leq |u|^{\frac{p+1}{q+1}} |\Omega|^{\frac{pq-1}{p(q+1)}} = |\Omega|^{\frac{2(p+1)}{pN}}. \quad (4.39)$$

Do Lema 4.13, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$u \in V_q, \quad \|u\|^{\frac{p+1}{\frac{p}{p+1}}} \leq S + \varepsilon \Rightarrow \beta(u) \in \Omega_r^+.$$

Tome então $\bar{\mu} := \varepsilon / |\Omega|^{\frac{2(p+1)}{pN}}$, para $\varepsilon > 0$ tal que $0 < \bar{\mu} < \mu_1(\Omega)$. Logo, se $0 < \mu < \bar{\mu}$ e $u \in J_\mu^{m(\mu, r)}$, obtemos, de (4.39) e do Lema 4.8,

$$\begin{aligned}\|u\|^{\frac{p+1}{p}} &= \|u\|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u|^{\frac{p+1}{\frac{p}{p+1}}} + \mu |u|^{\frac{p+1}{\frac{p}{p+1}}} = J_\mu(u) + \mu |u|^{\frac{p+1}{\frac{p}{p+1}}} \\ &\leq m(\mu, r) + \bar{\mu} |u|^{\frac{p+1}{\frac{p}{p+1}}} < S + \frac{\varepsilon}{|\Omega|^{\frac{2(p+1)}{pN}}} |\Omega|^{\frac{2(p+1)}{pN}} = S + \varepsilon\end{aligned}$$

de modo que $\beta(u) \in \Omega_r^+$. $\square$

Considere as hipóteses e $\bar{\mu}$ como no Lema 4.14. Para $0 < \mu < \bar{\mu}$ defina $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow J_\mu^{m(\mu, r)}$ por

$$\begin{aligned}\gamma_\mu(y) : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \gamma_\mu(y)(x) = \frac{w_y(x)}{|w_y|_{q+1}},\end{aligned} \quad (4.40)$$

onde w_y é solução do problema

$$\begin{cases} -\Delta w_y = z_y & \text{em } \Omega, \\ w_y = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad \text{com } z_y(x) = \begin{cases} -\Delta v_\mu(x-y), & \text{se } x \in B_r(y), \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus B_r(y), \end{cases}$$

onde, ver Lema 4.10, v_μ é radialmente simétrica, $v_\mu, -\Delta v_\mu > 0$ em $B_r(0)$ e

$$\int_{B_r(0)} |v_\mu|^{q+1} dx = 1, \quad \int_{B_r(0)} [|\Delta v_\mu|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |v_\mu|^{\frac{p+1}{p}}] dx = m(\mu, r).$$

Lema 4.15. *Seja (p, q) um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) . Seja $0 < \mu < \bar{\mu}$, onde $\bar{\mu}$ é dado pelo Lema 4.14. Então $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow J_\mu^{m(\mu, r)}$ está bem definida, é contínua e*

$$(\beta \circ \gamma_\mu)(y) = y, \quad \forall y \in \Omega_r^-. \quad (4.41)$$

Demonstração. Primeiramente, observe que [23, Theorem 9.15] garante que $\gamma_\mu(y) \in E(\Omega)$ e, pelo princípio do máximo forte, temos $w_y(x) > v_\mu(x-y)$, para todo $x \in B_r(y)$ e $y \in \Omega_r^-$. Então

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\Delta w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx &= \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^{\frac{p+1}{p}} dx, \quad \int_{\Omega} |w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx > \int_{B_r(0)} |v_\mu|^{\frac{p+1}{p}} dx \\ \text{e } \int_{\Omega} |w_y|^{q+1} dx &> \int_{B_r(0)} |v_\mu|^{q+1} dx = 1. \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} J_\mu(\gamma_\mu(y)) &= J_\mu\left(\frac{w_y(x)}{|w_y|_{q+1}}\right) = \frac{1}{|w_y|_{q+1}^{\frac{p+1}{p}}} \left[\int_{\Omega} |\Delta w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \int_{\Omega} |w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx \right] \\ &< \int_{\Omega} |\Delta w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \int_{\Omega} |w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx \leq \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \int_{B_r(0)} |v_\mu|^{\frac{p+1}{p}} dx \\ &= m(\mu, r), \end{aligned}$$

ou seja, $\gamma_\mu(y) \in J_\mu^{m(\mu, r)}$ para todo $y \in \Omega_r^-$ e daí $\gamma_\mu : \Omega_r^- \rightarrow J_\mu^{m(\mu, r)}$ está bem definida.

A continuidade de γ_μ é uma consequência da regularidade de v_μ . Para provar que γ_μ é contínua, é suficiente mostrar que $\bar{\gamma}_\mu : \Omega_r^- \rightarrow E(\Omega)$, definida por $\bar{\gamma}_\mu(y)(x) = w_y(x)$, é contínua. Se $y_n \rightarrow y$ em Ω_r^- , então

$$\begin{aligned} \|\bar{\gamma}_\mu(y_n) - \bar{\gamma}_\mu(y)\|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} &= |\Delta(\bar{\gamma}_\mu(y_n) - \bar{\gamma}_\mu(y))|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = |\Delta w_{y_n} - \Delta w_y|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} = |z_{y_n} - z_y|_{\frac{p+1}{p}}^{\frac{p+1}{p}} \\ &= \int_{B_r(y_n) \cap B_r(y)} |\Delta v_\mu(x - y_n) - \Delta v_\mu(x - y)|^{\frac{p+1}{p}} dx + \int_{B_r(y_n) \setminus B_r(y)} |\Delta v_\mu(x - y_n)|^{\frac{p+1}{p}} dx \\ &+ \int_{B_r(y) \setminus B_r(y_n)} |\Delta v_\mu(x - y)|^{\frac{p+1}{p}} dx \rightarrow 0, \end{aligned}$$

pois $\Delta v_\mu : \overline{B_r(0)} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua.

Finalmente, para todo $y \in \Omega_r^-$

$$\begin{aligned} (\beta \circ \gamma_\mu)(y) &= \frac{\int_{\Omega} \left| \Delta \left(\frac{w_y}{|w_y|_{q+1}} \right) \right|^{\frac{p+1}{p}} x dx}{\int_{\Omega} \left| \Delta \left(\frac{w_y}{|w_y|_{q+1}} \right) \right|^{\frac{p+1}{p}} dx} = \frac{\int_{\Omega} |\Delta w_y|^{\frac{p+1}{p}} x dx}{\int_{\Omega} |\Delta w_y|^{\frac{p+1}{p}} dx} = \frac{\int_{B_r(y)} |\Delta v_\mu(x-y)|^{\frac{p+1}{p}} x dx}{\int_{B_r(y)} |\Delta v_\mu(x-y)|^{\frac{p+1}{p}} dx} \\ &= \frac{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^{\frac{p+1}{p}} (z+y) dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^{\frac{p+1}{p}} dz} = \frac{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^{\frac{p+1}{p}} z dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^{\frac{p+1}{p}} dz} + \frac{y \int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^{\frac{p+1}{p}} dz}{\int_{B_r(0)} |\Delta v_\mu(z)|^{\frac{p+1}{p}} dz} = y, \end{aligned}$$

pois Δv_μ é radialmente simétrica. $\square$

Lema 4.16. *Se (p, q) é um ponto da hipérbole crítica na região não-crítica associada ao problema (P'_3) e $0 < \mu < \bar{\mu}$, onde $\bar{\mu}$ é dado no Lema 4.14, então $\text{cat}_{J_\mu^{m(\mu, r)}}(J_\mu^{m(\mu, r)}) \geq \text{cat}_\Omega(\Omega)$.*

Demonstração. Se $\text{cat}_{J_\mu^{m(\mu, r)}}(J_\mu^{m(\mu, r)}) = \infty$, nada a fazer. Se $\text{cat}_{J_\mu^{m(\mu, r)}}(J_\mu^{m(\mu, r)}) = n$, então

$$J_\mu^{m(\mu, r)} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n,$$

onde A_j é fechado e contrátil em $J_\mu^{m(\mu, r)}$, para todo $j = 1, \dots, n$, ou seja, existem aplicações $h_j : [0, 1] \times A_j \rightarrow J_\mu^{m(\mu, r)}$ contínuas tais que

$$h_j(0, u) = u, \quad h_j(1, u) = w_j, \quad \forall u \in A_j. \quad (4.42)$$

Considere então $B_j = \gamma^{-1}(A_j)$, onde γ é dada em (4.40). Os conjuntos B_j são fechados e $\Omega_r^- = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$. Defina, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, as funções

$$\begin{aligned} g_j : [0, 1] \times B_j &\longrightarrow \Omega_r^+ \\ (t, y) &\longmapsto g_j(t, y) = \beta(h_j(t, \gamma(y))). \end{aligned}$$

Do Lema 4.14, as funções g_j estão bem definidas, e de (4.41) e de (4.42) segue que

$$g_j(0, y) = \beta(h_j(0, \gamma(y))) = \beta(\gamma(y)) = y, \quad \forall y \in B_j,$$

$$g_j(1, y) = \beta(h_j(1, \gamma(y))) = \beta(w_j), \quad \forall y \in B_j,$$

Portanto, os conjuntos B_j são contráteis em Ω_r^+ , donde

$$\text{cat}_\Omega(\Omega) = \text{cat}_{\Omega_r^+}(\Omega_r^-) \leq n = \text{cat}_{J_\mu^{m(\mu, r)}}(J_\mu^{m(\mu, r)}).$$

$\square$

Conclusão da prova do Teorema 4.1

Dos Lemas 4.6 e 4.8, para $c \leq m(\mu, \Omega) \leq m(\mu, r) < S$, $J_\mu|_{V_q}$ satisfaz a condição $(PS)_c$. Do Teorema 1.8, com $d = m(\mu, r)$, segue que $J_\mu^{m(\mu, r)}$ contém, pelo menos, $\text{cat}_{J_\mu^{m(\mu, r)}}(J_\mu^{m(\mu, r)})$ pontos críticos de $J_\mu|_{V_q}$, ou seja, do Lema 4.16, para $0 < \mu < \bar{\mu}$, temos a existência de, pelo menos, $\text{cat}_\Omega(\Omega)$ pontos críticos de $J_\mu|_{V_q}$.

Seja $n = \text{cat}_\Omega(\Omega)$. Sejam $u_1, u_2, \dots, u_n \in V_q$ pontos críticos do funcional $J_\mu|_{V_q}$ tais que

$$J_\mu(u_j) \leq m(\mu, r) < S, \quad i = 1, \dots, n \quad (4.43)$$

descritos no parágrafo anterior. Pelo Lema 4.2 sabemos que, a menos de substituir u_j por $-u_j$, temos $u_j, -\Delta u_j > 0$ em Ω .

Por outro lado, para cada $j = 1, \dots, n$, existem $\lambda_j \in \mathbb{R}$ tais que u_j satisfazem

$$\int_\Omega |\Delta u_j|^{\frac{1}{p}-1} \Delta u_j \Delta v dx = \mu \int_\Omega |u_j|^{\frac{1}{p}-1} |u_j| v dx + \lambda_j \int_\Omega |u_j|^{q-1} u_j v dx, \quad \forall v \in E(\Omega).$$

Como $u_j \in V_q$ temos $u_j \neq 0$ e

$$\lambda_j = \lambda_j \int_\Omega |u_j|^{q+1} dx = J_\mu(u_j) = \int_\Omega [|\Delta u_j|^{\frac{p+1}{p}} - \mu |u_j|^{\frac{p+1}{p}}] dx > 0. \quad (4.44)$$

Portanto, para cada $j = 1, \dots, n$, $w_j := \lambda_j^{\frac{p}{pq-1}} u_j$ é ponto crítico não-negativo do funcional I_μ dado em (3.12), e como $u_j \neq u_i$ se $j \neq i$, segue que $w_j \neq w_i$ se $j \neq i$, o que conclui a demonstração do teorema. $\square$

Sobre o teorema do passo da montanha

No Capítulo 3, mostramos a existência de solução para o problema (P_3) através da geometria do passo da montanha do funcional I_μ , dado por (3.12); ver Proposição 3.20. O objetivo deste apêndice é apresentar uma prova alternativa, sem exigir que $\mu > 0$ seja pequeno, de que ponto crítico $u \in E(\Omega)$ do funcional I_μ obtido através dessa geometria pode ser tomado de modo que $u, -\Delta u \geq 0$ em Ω .

Teorema A.1 (Teorema do passo da montanha, Ambrosetti-Rabinowitz, 1973). *Sejam X um espaço de Banach, $I \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R}^N)$, $e \in X$ e $r > 0$ tais que $\|e\| > r$ e*

$$b := \inf_{\|u\|=r} I(u) > I(0) \geq I(e).$$

Se I satisfaz a condição $(PS)_c$ com

$$c := \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0,1]} I(\gamma(t)),$$

$$\Gamma := \{\gamma \in \mathcal{C}([0,1], X); \gamma(0) = 0, I(\gamma(1)) < 0\},$$

então c é um valor crítico de I .

Defina agora

$$c_\mu^+ := \inf_{\gamma \in \Gamma^+} \max_{t \in [0,1]} I_\mu(\gamma(t)),$$

$\Gamma^+ := \{\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega)); \gamma(0) = 0, I_\mu(\gamma(1)) < 0, -\Delta\gamma(t)(x) \geq 0, \forall t \in [0, 1], \text{ q.t.p. } x \in \Omega\};$

então

$$\Gamma^+ \subset \Gamma \Rightarrow c_\mu \leq c_\mu^+,$$

onde Γ é dado por (3.15) e c_μ por (3.14).

Agora, dado $\gamma \in \Gamma$, para cada $t \in [0, 1]$ defina $\gamma^+(t)$ por

$$\begin{cases} -\Delta\gamma^+(t) = |-\Delta\gamma(t)| & \text{em } \Omega, \\ \gamma^+(t) = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Segue então que:

(i) $\gamma^+(t) \in E(\Omega)$ e $-\Delta\gamma^+(t) \geq 0$ em Ω , para todo $t \in [0, 1]$.

(ii) $\gamma^+ \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega))$:

$$\begin{aligned} \|\gamma^+(t) - \gamma^+(t')\| &= |\Delta(\gamma^+(t)) - \Delta(\gamma^+(t'))|_{\frac{p+1}{p}} = ||\Delta(\gamma(t))| - |\Delta(\gamma(t'))||_{\frac{p+1}{p}} \\ &\leq ||\Delta(\gamma(t)) - \Delta(\gamma(t'))||_{\frac{p+1}{p}} = |\Delta(\gamma(t)) - \Delta(\gamma(t'))|_{\frac{p+1}{p}} \\ &= \|\gamma(t) - \gamma(t')\|, \end{aligned}$$

e a continuidade segue, pois $\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], E(\Omega))$.

(iii) Temos

$$\begin{cases} -\Delta\gamma^+(0) = |-\Delta\gamma(0)| = 0 & \text{em } \Omega, \\ \gamma^+(0) = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

e da unicidade de solução segue que $\gamma^+(0) = 0$; do princípio do máximo, $\gamma^+(t) \geq |\gamma(t)| \geq 0$ em Ω , para todo $t \in [0, 1]$, donde

$$\begin{aligned} I_\mu(\gamma^+(t)) &= \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\Delta(\gamma^+(t))|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\gamma^+(t)|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{1}{q+1} \int_\Omega |\gamma^+(t)|^{q+1} dx \\ &\leq \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\Delta(\gamma(t))|^{\frac{p+1}{p}} dx - \mu \frac{p}{p+1} \int_\Omega |\gamma(t)|^{\frac{p+1}{p}} dx - \frac{1}{q+1} \int_\Omega |\gamma(t)|^{q+1} dx \\ &= I_\mu(\gamma(t)), \quad \forall t \in [0, 1], \end{aligned} \tag{A.1}$$

e segue que

$$I_\mu(\gamma^+(1)) \leq I_\mu(\gamma(1)) < 0.$$

Assim, concluímos que $\gamma^+ \in \Gamma^+$. Logo, se $\gamma \in \Gamma$, segue de (A.1) que

$$\max_{t \in [0, 1]} I_\mu(\gamma^+(t)) \leq \max_{t \in [0, 1]} I_\mu(\gamma(t)),$$

e portanto

$$c_\mu = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0, 1]} I_\mu(\gamma(t)) \geq \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0, 1]} I_\mu(\gamma^+(t)) \geq \inf_{\beta \in \Gamma^+} \max_{t \in [0, 1]} I_\mu(\beta(t)) = c_\mu^+,$$

e $c_\mu = c_\mu^+$. Concluimos então que os caminhos γ do passo da montanha para definir o nível c_μ (ínfimo em relação aos caminhos) podem ser tomados, sem perda de generalidade, de modo que

$$-\Delta\gamma(t)(x) \geq 0, \forall t \in [0, 1], \text{ q.t.p. } x \in \Omega.$$

Teorema A.2 (Princípio Minimax Geral). *Seja X um espaço de Banach. Seja M_0 um subespaço fechado do espaço métrico M e $\Gamma_0 \subset \mathcal{C}(M_0, X)$. Defina*

$$\Gamma := \{\gamma \in \mathcal{C}(M, X), \gamma|_{M_0} \in \Gamma_0\}.$$

Se $\varphi \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$ satisfaz

$$\infty < c := \inf_{\gamma \in \Gamma} \sup_{u \in M} \varphi(\gamma(u)) > a := \sup_{\gamma_0 \in \Gamma_0} \sup_{u \in M_0} \varphi(\gamma_0(u)),$$

então, para todo $\varepsilon \in (0, (c - a)/2)$, $\delta > 0$ e $\gamma \in \Gamma$ tais que

$$\sup_M (\varphi \circ \gamma) \leq c + \varepsilon,$$

existe $u \in X$ tal que

$$a) \ c - 2\varepsilon \leq \varphi(u) \leq c + 2\varepsilon,$$

$$b) \ \text{dist}(u, \gamma(M)) \leq 2\delta,$$

$$c) \ \|\varphi'(u)\| \leq 8\varepsilon/\delta.$$

Demonstração. Ver [49], Theorem 2.8. □

A demonstração do Teorema A.1 segue do Teorema A.2, fazendo $M = [0, 1]$, $M_0 = \{0, 1\}$, $\Gamma_0 = \{\gamma_0 : \{0, 1\} \rightarrow X; \gamma_0(0) = 0, \varphi(\gamma_0(1)) < 0\}$. Além disso, o item (b) do Teorema A.2 fornece uma localização da sequência $(\text{PS})_c$ obtida pela geometria do passo da montanha.

Do exposto anteriormente, podemos substituir Γ por Γ^+ . Logo, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $(u_n) \subset E(\Omega)$ uma sequência $(\text{PS})_{c_\mu}$ e $\gamma_n \in \Gamma^+$ com $\sup_{t \in [0, 1]} I_\mu(\gamma_n(t)) \leq c + o_n(1)$ tal que

$$\text{dist}(u_n, \gamma_n([0, 1])) = \min_{t \in [0, 1]} \|u_n - \gamma_n(t)\| = \|u_n - \gamma_n(t_n)\| = |\Delta u_n - \Delta \gamma_n(t_n)|_{\frac{p+1}{p}} \leq \frac{1}{n}. \quad (\text{A.2})$$

Como I_μ satisfaz a condição $(\text{PS})_{c_\mu}$, ver Lemas 3.18 e 3.19, a menos de subsequência, existe $u \in E(\Omega)$ tal que

$$u_n \rightarrow u \text{ em } E(\Omega), \text{ o que implica } \Delta u_n \rightarrow \Delta u \text{ em } L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega),$$

e então, de (A.2),

$$\Delta \gamma_n(t_n) \rightarrow \Delta u \text{ em } L^{\frac{p+1}{p}}(\Omega),$$

e como $-\Delta \gamma_n(t_n) \geq 0$ q.t.p. em Ω , segue que $-\Delta u \geq 0$ q.t.p. em Ω e, por fim, do princípio do máximo temos então $u \geq 0$ q.t.p. em Ω .

Temos ainda $\gamma_n(t_n)$ uma sequência $(PS)_{c_\mu}$ para I_μ . De fato

$$\gamma_n(t_n) \rightarrow u \text{ em } E(\Omega) \Rightarrow I_\mu(\gamma_n(t_n)) \rightarrow I_\mu(u) = c_\mu;$$

e

$$\begin{aligned} \|I'_\mu(\gamma_n(t_n))\| &= \|I'_\mu(\gamma_n(t_n)) - I'_\mu(u_n) + I'_\mu(u_n) - I'_\mu(u) + I'_\mu(u_n)\| \\ &\leq \|I'_\mu(\gamma_n(t_n)) - I'_\mu(u)\| + \|I'_\mu(u) - I'_\mu(u_n)\| + \|I'_\mu(u_n)\| \\ &= o_n(1), \end{aligned}$$

pois $I_\mu \in \mathcal{C}^1(E(\Omega), \mathbb{R})$.

Observação A.3. Para operadores elípticos de segunda ordem um argumento semelhante pode ser usado. Desta vez substituindo o caminho $\gamma(t)$ por $|\gamma(t)|$.

Mais geralmente, o argumento anterior também pode ser empregado para o poliharmônico Δ^k com condição de contorno de Navier.

Referências Bibliográficas

- [1] W. Abdelhedi. On a fourth-order elliptic equation involving the critical Sobolev exponent: the effect of the graph topology. *Nonlinear Anal.* 82 (2013), 82–99.
- [2] S. Agmon, A. Douglis, L. Nirenberg. Estimates near the boundary for solutions of elliptic partial differential equations satisfying general boundary conditions. I. *Comm. Pure Appl. Math.* 12 1959 623–727.
- [3] C.O. Alves, Y.H. Ding. Multiplicity of positive solutions to a p -Laplacian equation involving critical nonlinearity. *J. Math. Anal. Appl.* 279 (2003), no. 2, 508–521.
- [4] C.O. Alves, G.M. Figueiredo. Multiplicity of nontrivial solutions to a biharmonic equation via Lusternik-Schnirelman theory. *Math. Methods Appl. Sci.* 36 (2013), no. 6, 683–694.
- [5] A. Alvino, P.-L. Lions, G. Trombetti. A remark on comparison results via symmetrization. *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A* 102 (1986), no. 1-2, 37–48.
- [6] A. Ambrosetti, P. H. Rabinowitz. Dual variational methods in critical point theory and applications. *J. Functional Analysis* 14 (1973), 349–381.
- [7] A.K. Ben-Naoum, C. Troestler, M. Willem. Extrema problems with critical Sobolev exponents on unbounded domains. *Nonlinear Anal.* 26 (1996), no. 4, 823–833.
- [8] F. Bernis, J. García Azorero, I. Peral. Existence and multiplicity of nontrivial solutions in semilinear critical problems of fourth order. *Adv. Differential Equations* 1 (1996), no. 2, 219–240.
- [9] G. Bianchi, J. Chabrowski, A. Szulkin. On symmetric solutions of an elliptic equation with a nonlinearity involving critical Sobolev exponent. *Nonlinear Anal.* 25 (1995), no. 1, 41–59.

- [10] D. Bonheure, E. Moreira dos Santos, M. Ramos. Ground state and non-ground state solutions of some strongly coupled elliptic systems. *Trans. Amer. Math. Soc.* 364 (2012), no. 1, 447–491.
- [11] H. Brezis, E. Lieb. A relation between pointwise convergence of functions and convergence of functionals. *Proc. Amer. Math. Soc.* 88 (1983), no. 3, 486–490.
- [12] H. Brezis, L. Nirenberg. Positive solutions of nonlinear elliptic equations involving critical Sobolev exponents. *Comm. Pure Appl. Math.* 36 (1983), no. 4, 437–477.
- [13] F.E. Browder, D.G. de Figueiredo. J -Monotone nonlinear operators in Banach spaces. *Nederl. Akad. Proc. Ser. A 69=Indag. Math.* 28 (1966), 412–420.
- [14] P. Clément, P. Felmer, E. Mitidieri. Homoclinic orbits for a class of infinite-dimensional Hamiltonian systems. *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4)* 24 (1997), no. 2, 367–393.
- [15] P. Clément, D. G. de Figueiredo, E. Mitidieri. Positive solutions of semilinear elliptic systems. *Comm. Partial Differential Equations* 17 (1992), no. 5-6, 923–940.
- [16] K. El Mehdi, A. Selmi. Concentration and multiplicity of solutions for a fourth-order equation with critical nonlinearity. *Nonlinear Anal.* 64 (2006), no. 3, 417–439.
- [17] A. Ferrero, F. Gazzola, T. Weth. Positivity, symmetry and uniqueness for minimizers of second-order Sobolev inequalities. *Ann. Mat. Pura Appl. (4)* 186 (2007), no. 4, 565–578.
- [18] G.B. Folland. *Real Analysis. Modern Techniques and Their Applications*. 2nd edn. (Wiley-Interscience, 1999).
- [19] J. Garcia Azorero, I. Peral Alonso. Existence and nonuniqueness for the p -Laplacian: nonlinear eigenvalues. *Comm. Partial Differential Equations* 12 (1987), no. 12, 1389–1430.
- [20] J. García Azorero, I. Peral Alonso. Multiplicity of solutions for elliptic problems with critical exponent or with a nonsymmetric term. *Trans. Amer. Math. Soc.* 323 (1991), no. 2, 877–895.
- [21] F. Gazzola, H.-C. Grunau, M. Squassina. Existence and nonexistence results for critical growth biharmonic elliptic equations. *Calc. Var. Partial Differential Equations* 18 (2003), no. 2, 117–143.
- [22] F. Gazzola, H.-C. Grunau, G. Sweers. Polyharmonic boundary value problems. Positivity preserving and nonlinear higher order elliptic equations in bounded domains. *Lecture Notes in Mathematics* 1991. Springer-Verlag (2010).
- [23] D. Gilbarg, N.S. Trudinger. *Elliptic partial differential equations of second order*, Springer-Verlag (1977).

- [24] J. Hulshof, E. Mitidieri, R.C.A.M. van der Vorst. Strongly indefinite systems with critical Sobolev exponents. *Trans. Amer. Math. Soc.* 350 (1998), no. 6, 2349–2365.
- [25] J. Hulshof, R.C.A.M. van der Vorst. Asymptotic behaviour of ground states. *Proc. Amer. Math. Soc.* 124 (1996), no. 8, 2423–2431.
- [26] J. Hulshof, R.C.A.M. van der Vorst. Differential systems with strongly indefinite variational structure. *J. Funct. Anal.* 114 (1993), no. 1, 32–58.
- [27] O. Kavian. *Introduction à la théorie des points critiques et applications aux problèmes elliptiques. Mathématiques & Applications 13*, Springer-Verlag (1993).
- [28] M. Lazzo. Solutions positives multiples pour une équation elliptique non linéaire avec l'exposant critique de Sobolev. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 314 (1992), no. 1, 61–64.
- [29] P.-L. Lions. The concentration-compactness principle in the calculus of variations. The limit case. I. *Rev. Mat. Iberoamericana* 1 (1985), no. 1, 145–201.
- [30] L. Lusternik, L. Schnirelman. *Méthodes topologiques dans les problèmes variationnels.* Hermann, Paris (1934).
- [31] P.J. McKenna, W. Reichel. Radial solutions of singular nonlinear biharmonic equations and applications to conformal geometry. *Electron. J. Differential Equations* 2003, no. 37, 13 pp.
- [32] J.L.F. Melo, E. Moreira dos Santos. A fourth-order equation with critical growth: the effect of the domain topology. To appear in *Topol. Methods Nonlinear Anal.*
- [33] J.L.F. Melo, E. Moreira dos Santos. Positive solutions to a fourth-order elliptic problem by Lusternik-Schnirelmann category. *J. Math. Anal. Appl.* (2014).
- [34] E. Mitidieri. A Rellich type identity and applications. *Comm. Partial Differential Equations* 18 (1993), no. 1-2, 125–151.
- [35] E. Moreira dos Santos. Positive solutions for a fourth-order quasilinear equations with critical Sobolev exponent. *Commun. Contemp. Math.* 12 (2010), no. 1, 1–33.
- [36] W.M. Ni. A nonlinear Dirichlet problem on the unit ball and its applications. *Indiana Univ. Math. J.* 31 (1982), no. 6, 801–807.
- [37] L.A. Peletier, R.C.A.M. van der Vorst. Existence and nonexistence of positive solutions of nonlinear elliptic systems and the biharmonic equation. *Differential Integral Equations* 5 (1992), no. 4, 747–767.
- [38] S.I. Pohožaev. On the eigenfunctions of the equation $\Delta u + \lambda f(u) = 0$. *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 165 (1965) 36–39.

- [39] P. Pucci, J. Serrin. A general variational identity. *Indiana Univ. Math. J.* 35 (1986), no. 3, 681–703.
- [40] P.H. Rabinowitz. On a class of nonlinear Schrödinger equations. *Z. Angew. Math. Phys.* 43 (1992), no. 2, 270–291.
- [41] O. Rey. A multiplicity result for a variational problem with lack of compactness. *Nonlinear Anal.* 13 (1989), no. 10, 1241–1249.
- [42] O. Rey. Proof of two conjectures of H. Brezis and L. A. Peletier. *Manuscripta Math.* 65 (1989), no. 1, 19–37.
- [43] O. Rey. The role of the Green’s function in a nonlinear elliptic equation involving the critical Sobolev exponent. *J. Funct. Anal.* 89 (1990), no. 1, 1–52.
- [44] E.A. de B. e Silva, S.H.M. Soares. Quasilinear Dirichlet problems in $\mathbb{R}^N$ with critical growth. *Nonlinear Anal.* 43 (2001), no. 1, 1–20.
- [45] J. Simon. Régularité de la solution d’une équation non linéaire dans $\mathbb{R}^N$. *Lecture Notes in Math.*, Vol. 665 (Springer, 1978).
- [46] R.C.A.M. van der Vorst. Best constant for the embedding for the space $H^2 \cap H_0^1(\Omega)$ into $L^{2N/(N-4)}(\Omega)$. *Differential Integral Equations* 6 (1993), no. 2, 259–276.
- [47] R.C.A.M. van der Vorst. Fourth order elliptic equations with critical growth. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 320 (1995), no. 3, 295–299.
- [48] R.C.A.M. van der Vorst. Variational identities and applications to differential systems. *Arch. Rational Mech. Anal.* 116 (1991) 375–398.
- [49] M. Willem. Minimax theorems. *Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications*, 24. Birkhäuser (1996).