O problema de Riemann-Hilbert para campos vetoriais complexos

Camilo Campana

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Camilo Campana

O problema de Riemann-Hilbert para campos vetoriais complexos

Tese apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC-USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciências – Matemática. *VERSÃO REVISADA*

Área de Concentração: Matemática

Orientador: Prof. Dr. Adalberto Panobianco Bergamasco

Coorientador: Prof. Dr. Abdelhamid Meziani

USP – São Carlos
Junho de 2017

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi
e Seção Técnica de Informática, ICMC/USP,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

C318o Campana, Camilo
O problema de Riemann-Hilbert para
campos vetoriais complexos / Camilo Campana;
orientador Adalberto Panobianco Bergamasco;
coorientador Abdelhamid Meziani. - São Carlos -
SP, 2017.
150 p.

Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
Matemática) - Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação, Universidade de São Paulo, 2017.

1. Problema de Riemann-Hilbert. 2. Campos
Vetoriais Complexos. 3. Equações Diferenciais
Parciais. 4. Hipocomplexidade. 5. Operadores
Integrais. I. Bergamasco, Adalberto Panobianco,
orient. II. Meziani, Abdelhamid, coorient. III.
Título.

Camilo Campana

The Riemann-Hilbert problem for complex vector fields

Doctoral dissertation submitted to the Instituto de
Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC-
USP, in partial fulfillment of the requirements for the
degree of the Doctorate Program in Mathematics.
FINAL VERSION

Concentration Area: Mathematics

Advisor: Prof. Dr. Adalberto Panobianco Bergamasco

Co-advisor: Prof. Dr. Abdelhamid Meziani

USP – São Carlos

June 2017

*Dedico este trabalho a minha família.
Em especial a minha bisavó Maria.*

AGRADECIMENTOS

A Deus.

Ao programa de pós graduação do ICMC-USP (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação). Aos professores e funcionários que contribuíram para a confecção dessa dissertação.

Agradecimento especial ao Professor Adalberto Panobianco Bergamasco, meu orientador de doutorado, pela amizade, direcionamento e dedicação.

Ao meu coorientador, Professor Abdelhamid Meziani, pelo trabalho engajado, dedicação, disponibilidade e amizade.

Ao Professor Paulo Leandro Dattori da Silva pela grande ajuda, não apenas com a matemática, pela amizade e pelo trabalho conjunto.

A minha família, especialmente, meus pais Lourdes e Judçon. Meus avós, Jovelina e Estevaldo e aos meus bisavós Maria e Américo.

Aos meus amigos. Em especial, Laís, Dione e Rodrigo.

Aos professores da UFES que foram de grande importância no início dessa jornada na matemática.

Gostaria de destacar a importância do estágio no exterior, apoiado pela FAPESP (processo nº 2013/26463 – 7, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)), para realização deste trabalho. Agradeço ao Professor Abdelhamid Meziani pela supervisão durante o período do estágio e a Florida International University por contribuir com o ambiente e estrutura para sua realização.

A todos os citados e às pessoas que não mencionei, mas que fizeram parte da minha trajetória, fica registrado o meu agradecimento.

À CAPES pelo apoio financeiro nos meses iniciais do doutorado.

À FAPESP (processo nº 2013/08452 – 8, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)) pelo apoio financeiro.

“É melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão.”
(Provérbio popular)

RESUMO

CAMPANA, C.. **O problema de Riemann-Hilbert para campos vetoriais complexos**. 2017. 150 f. Tese (Doutorado em Ciências – Matemática) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos – SP.

Este trabalho trata de problemas de contorno definidos no plano. O problema central desta tese é o chamado Problema de Riemann-Hilbert, o qual pode ser descrito como segue. Seja L um campo vetorial complexo não singular definido em uma vizinhança do fecho de um aberto simplesmente conexo do plano com fronteira suave.

O Problema de Riemann-Hilbert para o campo L consiste em obter uma solução para a equação $Lu = F(x, y, u)$ no aberto em estudo, sendo dada uma função F mensurável. Pede-se também que a solução tenha extensão contínua até a fronteira e que satisfaça lá uma condição adicional; trabalha-se aqui no contexto das funções Hölder contínuas.

Foram obtidos resultados para o problema acima no caso em que L pertence a uma classe de campos hipocomplexos.

O caso clássico conhecido é quando o campo vetorial é o operador de Cauchy-Riemann, ou, mais geralmente, quando é um campo elítico.

Palavras-chave: Problema de Riemann-Hilbert, Campos Vetoriais Complexos, Equações Diferenciais Parciais, Hipocomplexidade, Operadores Integrais.

ABSTRACT

CAMPANA, C.. **The Riemann-Hilbert problem for complex vector fields.** 2017. 150 f. Tese (Doutorado em Ciências – Matemática) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos – SP.

This work deals with boundary problems in the plane. The central problem in this thesis is the so-called Riemann-Hilbert problem, which may be described as follows. Let L be a non-singular complex vector field defined on a neighborhood of the closure of a simply connected open subset of the plane having smooth boundary.

The Riemann-Hilbert problem for the vector field L consists in finding a solution to the equation $Lu = F(x, y, u)$ on the open set under study, where the given function F is measurable. It is also required that the solution have a continuous extension up to the boundary and satisfy an additional condition there.

Results were obtained for the above problem when L belongs to a class of hypocomplex vector fields.

The well-known classical case is the one in which the vector field under study is the Cauchy-Riemann operator, or more generally when it is an elliptic vector field.

Key-words: Riemann-Hilbert Problem, Complex Vector Fields, Partial Differential Equations, Hipocomplexity, Integral Operators.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	O problema clássico de Riemann-Hilbert	17
1.2	O problema de Riemann-Hilbert para um campo vetorial complexo L	18
1.3	Descrição do conteúdo da tese	19
2	PRELIMINARES	25
2.1	Espaço de funções	25
2.2	Distribuições	28
2.3	Campos vetoriais	29
2.3.1	<i>Campos vetoriais de tipo finito e infinito</i>	37
2.4	O índice	38
2.5	Transversalidade de uma curva em relação a campo	44
3	A CLASSE DOS CAMPOS VETORIAIS EM ESTUDO	47
3.1	Uma classe de campos hipocomplexos	47
3.2	Normalização	53
3.3	Observações acerca do caso hipoelítico	56
4	LEMAS TÉCNICOS	59
5	A EQUAÇÃO $Lu = f$	71
5.1	O operador integral T_Z	71
5.2	Existência de solução para a equação $Lu = f$	76
5.3	Continuidade Hölder das soluções de $Lu = f$	80
5.4	Equação semilinear $Lu = F(x, y, u)$	85
5.5	Princípio da Similaridade	89
5.5.1	<i>Lemas de diferenciação</i>	90
5.5.2	<i>Princípio da Similaridade para L</i>	95
6	O PROBLEMA DE RIEMANN-HILBERT	99
6.1	O operador integral $T_{\mathcal{L}}^K$	101
6.2	O operador $S_{\mathcal{L}}$	107
6.3	O problema de Riemann-Hilbert para equações do tipo $Lu = F(x, y, u)$	109
6.4	Uma propriedade do operador $T_{\mathcal{L}}$	115

6.5	O problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = au + b\bar{u} + f$. .	118
6.6	O problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = au + f$ quando L é hipoelítico	125
6.6.1	<i>Resolubilidade global para campos hipoelíticos no plano</i>	125
6.6.2	<i>O problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = au + f$</i>	128
ANEXO A	TEOREMAS IMPORTANTES USADOS NO TEXTO . .	131
ANEXO B	ALGUNS RESULTADOS DA TEORIA CLÁSSICA	135
REFERÊNCIAS		145
Índice		149

INTRODUÇÃO

A área de interesse da presente tese refere-se ao estudo de problemas de contorno para campos vetoriais complexos.

A resolubilidade local de sistemas involutivos de equações diferenciais de primeira ordem (sem condições adicionais, tais como de Cauchy, Dirichlet, entre outras) tem experimentado muitos avanços (ver (BERHANU; CORDARO; HOUNIE, 2008) e (TREVES, 1992)). Um próximo passo natural é o estudo de problemas de contorno, como por exemplo, os problemas de Riemann-Hilbert associados a um campo vetorial complexo no plano.

1.1 O problema clássico de Riemann-Hilbert

O problema clássico de Riemann-Hilbert é um problema importante da teoria de problemas de contorno para funções holomorfas (analíticas). O problema é como segue. Dados um aberto simplesmente conexo $D \subset \mathbb{C}$ e funções Λ , ϕ definidas na fronteira ∂D com Λ a valores complexos, sem zeros e ϕ a valores reais, obter uma função holomorfa h em D , contínua em $\bar{D}$, tal que $\Re(\bar{\Lambda}h) = \phi$ em ∂D . Em outras palavras, escrevendo em termos do operador de Cauchy-Riemann, $\partial/\partial\bar{z}$, temos o problema de contorno

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = 0 & \text{em } D, \\ \Re(\bar{\Lambda}h) = \phi & \text{em } \partial D. \end{cases} \quad (1.1)$$

Este problema, bem como sua generalização ao caso em que a busca de uma função analítica é substituída pela busca de uma solução de uma equação elítica (linear ou não linear), tem sido estudado extensivamente sob várias hipóteses envolvendo a fronteira e os dados Λ e ϕ . Suas aplicações a problemas em física e engenharia são numerosas e bem documentadas (ver (ABLOWITZ; CLARKSON, 1991), (BEGEHR; CELEBI; TUTSCHKE, 1999), (BEGEHR; GILBERT; WEN, 1999), (CHEN, 1993), (MUSKHELISHVILI, 1953), (VEKUA, 1962) parte 2, por exemplo).

Para um pequeno apanhado histórico veja (GAKHOV, 1966) e (MUSKHELISHVILI, 1953).

1.2 O problema de Riemann-Hilbert para um campo vetorial complexo L

Seja L um campo vetorial complexo não singular de classe C^ε , $0 < \varepsilon < 1$, definido em uma vizinhança de um aberto simplesmente conexo $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ com fronteira suave e sejam $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{C})$, $|\Lambda| = 1$, $\phi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$. O Problema de Riemann-Hilbert para o campo L consiste em obter uma função contínua em $\bar{\Omega}$ que seja solução do problema de contorno

$$\begin{cases} Lu = 0 & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \phi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.2)$$

ou mais geralmente quando consideramos, no lugar da equação $Lu = 0$ em Ω acima, uma equação da forma $Lu = F(x, y, u)$ em Ω , onde $F : \bar{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função mensurável. Observemos que quando L é elítico em $\bar{\Omega}$ (isto é, L e seu conjugado complexo $\bar{L}$ são linearmente independentes em todo o conjunto $\bar{\Omega}$), então L é equivalente ao operador de Cauchy-Riemann $\partial/\partial\bar{z}$ e o problema se reduz ao problema de Riemann-Hilbert clássico, que em muitos casos já foi resolvido. O problema (1.2) difere do caso clássico quando o conjunto dos pontos não elíticos

$$\Sigma = \{p ; L_p \text{ e } \bar{L}_p \text{ são linearmente dependentes}\},$$

chamado de conjunto característico de L , é não vazio. Neste caso, em que Σ é não vazio, L é chamado de campo elítico com degenerescências. No trabalho (MEZIANI, 2011), foi considerado o problema de Riemann-Hilbert para uma classe de campos vetoriais complexos. Pelo que sabemos, o problema de Riemann-Hilbert (1.2) para campos elíticos com degenerescências não foi considerado antes de (MEZIANI, 2011).

Uma das dificuldades do estudo do Problema de Riemann-Hilbert para um campo vetorial complexo L , definido num vizinhança de Ω como acima, é obter soluções contínuas para a equação $Lu = f$ em Ω , para $f \in L^p(\Omega)$, $p > 1$. Já a resolubilidade local para campos vetoriais complexos (de classe C^∞) teve muitos avanços e é caracterizada pela condição (P) de Nirenberg e Treves (veja (BERHANU; CORDARO; HOUNIE, 2008)).

Os resultados obtidos, que serão descritos na próxima seção, generalizam resultados de resolubilidade para o Problema de Riemann-Hilbert clássico.

Os principais resultados desta tese foram obtidos em trabalho conjunto e podem ser encontrados nos artigos (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2017), (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2016) e (CAMPANA; MEZIANI, 2016).

Muitas das técnicas desenvolvidas nesta tese são generalizações de técnicas da teoria das *Funções Analíticas Generalizadas*, que podem ser encontradas nos livros (VEKUA, 1962), (BEGEHR, 1994) e (GAKHOV, 1966).

1.3 Descrição do conteúdo da tese

Agora vamos detalhar o conteúdo da tese.

O **Capítulo 2** é dedicado a definições, conceitos básicos da área de Equações Diferenciais Parciais Lineares e alguns resultados que servem de base para o texto envolvendo campos hipocomplexos, como, por exemplo, a existência de integral primeira global que denotamos por Z . Também nesse capítulo introduzimos o índice de uma função com respeito a uma curva que será importante no estudo do problema de Riemann-Hilbert (Capítulo 6).

No **Capítulo 3** estabelecemos uma classe de campos vetoriais complexos, definidos em um aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$, que chamaremos de classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$, ou apenas de classe $\mathcal{X}$. Esta classe pode ser caracterizada da seguinte forma. Se L é um campo vetorial pertencente à classe $\mathcal{X}$ então L é hipocomplexo (veja a definição 7 na página 35) e o conjunto característico Σ de L é uma subvariedade mergulhada de $\tilde{\Omega}$ de dimensão 1, com um número finito de componentes conexas, denotadas por Σ_j , $j = 1, 2, \dots, N$. Além disso, para cada componente conexa Σ_j existe uma constante $\sigma_j > 0$ tal que para cada $p \in \Sigma_j$, existem um aberto U , $p \in U \subset \tilde{\Omega}$, coordenadas locais (s, t) centradas em p e uma função β a valores reais tal que a função

$$Z_{\sigma_j, \beta}(s, t) = s + i \left(\frac{t|t|^{\sigma_j}}{1 + \sigma_j} + \beta(s) \right)$$

é uma integral primeira de L .

Denotamos por $\sigma_M = \max\{\sigma_j ; j = 1, 2, \dots, N\}$.

Além de estabelecer a classe, é feito um estudo de normalização local e propriedades inerentes à classe. A normalização local é usada para fazer conexão entre duas partes deste texto, a parte *Hard*, formada por lemas técnicos (Capítulo 4), e a parte *Soft*, (situada nos Capítulos 5, 6 e 7) formada pela aplicação de resultados de Topologia e Análise Funcional.

O **Capítulo 4** é composto por lemas técnicos que dão estimativas de integrais com parâmetros definidas em abertos de $\mathbb{R}^2$. Tais lemas servem de suporte para a boa definição de operadores integrais nos capítulos seguintes bem como estimativas envolvendo os mesmos.

No **Capítulo 5** tratamos de equações envolvendo L . Em especial estudamos, para L pertencente à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$, a equação $Lu = f$ em Ω , com Ω um aberto pré-compacto tal que $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$ e f uma função em um espaço $L^p(\Omega)$ adequado. O caminho tomado, para tal, foi o estudo de operadores integrais relacionados ao campo L . Mais especificamente, dada uma integral

primeira global Z de L no aberto $\tilde{\Omega}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem, definimos o operador integral T_Z , para $f \in L^1(\Omega)$, por

$$T_Z f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} d\xi d\eta, \text{ para } (x, y) \in \overline{\Omega}. \quad (1.3)$$

O operador integral T_Z possui a seguinte propriedades: existe uma constante $M = M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que se $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$, vale

$$|T_Z f(x, y)| \leq M \|f\|_p, \quad \forall (x, y) \in \overline{\Omega}. \quad (1.4)$$

Tal desigualdade nos diz que $T_Z f \in L^\infty(\Omega)$ e, mais que isso, $T_Z : L^p(\Omega) \rightarrow L^\infty(\Omega)$, para $p > 2 + \sigma_M$, é um operador contínuo.

O passo seguinte foi mostrar que $u := T_Z f$, para $f \in L^1(\Omega)$, é uma solução da equação $Lu = f$ em Ω quando L é o Hamiltoniano de Z . Tal resultado é obtido com o estudo de uma fórmula de representação de soluções do tipo Cauchy-Pompeiu.

Depois de estabelecida a resolubilidade, estudamos a regularidade da função $T_Z f$ para $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Foi mostrado que, neste caso, obtemos regularidade Hölder para $T_Z f$. Mais que isso, $T_Z f$ satisfaz a seguinte condição de Hölder

$$|T_Z f(x_1, y_1) - T_Z f(x_2, y_2)| \leq C \|f\|_p |Z(x_1, y_1) - Z(x_2, y_2)|^\mu, \quad \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \overline{\Omega}, \quad (1.5)$$

onde $C = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$, $\mu = (2 - 2q - \tau_M)/q$, $q = p/(p - 1)$ e $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$.

As desigualdades (1.4) e (1.5) nos dizem que o operador T_Z tem um bom comportamento como um operador entre os espaços $L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, e $C(\overline{\Omega})$. Este bom comportamento nos permitiu aplicar o “método topológico” (ver uma explicação para o significado dessa expressão logo abaixo) no estudo de equações semilineares da forma

$$Lu = F(x, y, u) \text{ em } \Omega.$$

A resolubilidade com regularidade Hölder também foi obtida para a equação acima com $F : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ sendo de duas formas, conforme explicado a seguir. Seja $p > 2 + \sigma_M$. A primeira forma de F satisfaz

- $F(\cdot, \zeta) \in L^p(\overline{\Omega})$, para todo $\zeta \in \mathbb{C}$;
- $|F(x, y, \zeta_1) - F(x, y, \zeta_2)| \leq \Psi(x, y) |\zeta_1 - \zeta_2|^\alpha$, para todos $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}$,

onde $\Psi \in L^p(\overline{\Omega}; \mathbb{R}_+)$ e $0 < \alpha < 1$. Já a segunda forma de F , é a seguinte

$$F(x, y, \zeta) = g(x, y)Q(x, y, \zeta) + f(x, y) \quad (1.6)$$

onde $f, g \in L^p(\overline{\Omega})$ e $Q : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função contínua limitada.

Tal método topológico se resume a aplicação do *Teorema do Ponto Fixo de Shauder* ao operador integral contínuo $P : \Lambda_{M_0, C_0} \rightarrow \Lambda_{M_0, C_0}$, dado por

$$Pu = T_Z(F(\cdot, u)),$$

onde Λ_{M_0, C_0} é um subconjunto não vazio, convexo e compacto de $C(\overline{\Omega})$. Note que *grossa modo* a continuidade de P segue da continuidade de T_Z . A partir do ponto fixo e do resultado de resolubilidade da equação $Lu = f$ obtemos a solução da equação semilinear.

Para terminar o Capítulo estudamos o Princípio da Similaridade para a equação

$$Lu = au + b\bar{u} \text{ em } \Omega,$$

o qual nos diz que toda solução contínua da equação pode ser escrita na forma

$$u = (h \circ Z)e^S \text{ em } \Omega, \quad (1.7)$$

onde h é uma função holomorfa em $Z(\Omega)$ e $S \in C^\mu(\overline{\Omega})$, para um certo μ , com $0 < \mu < 1$. A igualdade acima implica que u tem propriedades semelhantes às das soluções do campo (que em geral são escritas da forma $h \circ Z$, com h uma função holomorfa), principalmente quando olhamos para seus zeros, isto é, $u(p) = 0$ se, e somente se, $h(Z(p)) = 0$.

No **Capítulo 6** estudamos problemas de contorno da forma

$$\begin{cases} Lu = F(x, y, u) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \phi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.8)$$

onde Ω é um aberto simplesmente conexo limitado com bordo suave, $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega)$, $|\Lambda| = 1$, $\phi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$.

A existência de solução do problema acima, como veremos, está relacionada com o sinal do índice da função Λ com respeito a $\partial\Omega$ e a orientação da integral primeira do campo.

Para tratar o problema acima, definimos o operador T_Z^K , que é uma modificação do operador T_Z .

Para $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, e $\kappa \geq 0$ inteiro, operador T_Z^K é dado por

$$T_Z^K f(x, y) = T_Z f(x, y) - Z^{2\kappa}(x, y) B_Z f(x, y), \quad (1.9)$$

onde

$$B_Z f(x, y) \doteq \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{Z(x, y) \overline{f(\xi, \eta)}}{1 - Z(x, y) \overline{Z(\xi, \eta)}} d\xi d\eta.$$

A função $B_Z f$ é limitada por um múltiplo constante da norma L^p de f . Além disso, $B_Z f$ é uma função Hölder contínua em $\overline{\Omega}$ e solução do campo vetorial L em Ω (i.e., $L(B_Z f) = 0$ em Ω). Podemos concluir assim que T_Z^K tem boas propriedades como T_Z , isto é, mantém as propriedades

de resolubilidade e satisfaz desigualdades do tipo (1.4) e (1.5). Além disso, $B_Z f$, como visto acima, quando restrita ao bordo, se comporta como $\overline{T_Z} f$. Isto faz com que a função $T_Z^K f$ satisfaça a seguinte condição de contorno:

$$\Re(\overline{Z^K} T_Z^K) = f \text{ em } \partial\Omega.$$

Em seguida estudamos o operador de Schwarz $S_Z : C(\partial\Omega, \mathbb{R}) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ dado por

$$(S_Z \varphi)(x, y) \doteq \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \varphi(\xi, \eta) \frac{Z(\xi, \eta) + Z(x, y)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} \frac{dZ(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta)}. \quad (1.10)$$

O operador S_Z tem a seguinte propriedade: se $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega, \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, então $S_Z \varphi \in C^\alpha(\overline{\Omega})$ e satisfaz

$$\begin{cases} L(S_Z \varphi) = 0 & \text{em } \Omega, \\ \Re(S_Z \varphi) = \varphi & \text{em } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.11)$$

Utilizando os operadores T_Z^K e S_Z definimos um operador integral da forma

$$P^K u(x, y) = T_Z^K(F(\cdot, u))(x, y) + Z^K S_Z \varphi, \quad u \in C(\overline{\Omega}).$$

Note que $\Re(\overline{Z^K} P^K u) = \varphi$ em $\partial\Omega$.

Existem desigualdades semelhantes às desigualdades (1.4) e (1.5) para o operador P^K . Assim, podemos usar, de forma análoga ao que foi feito no Capítulo 5, o Teorema do Ponto Fixo de Schauder para obter uma função Hölder contínua u em $\overline{\Omega}$ tal que $P^K u = u$. Pensando L como H_Z , temos que $Lu = F(x, y, u)$ em Ω . Além disso, $\Re(\overline{Z^K} u) = \varphi$ em $\partial\Omega$. Com uma mudança de incógnita, que depende do índice de Λ com respeito a $\partial\Omega$ e da orientação de Z , obtemos uma solução Hölder contínua para o problema (1.8).

O passo posterior foi estudar o seguinte Problema de Riemann-Hilbert:

$$\begin{cases} Lu = au + b\bar{u} + f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\overline{\Lambda} u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.12)$$

onde $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega)$, $|\Lambda| = 1$, $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, e $a, b, f \in L^p(\overline{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$.

O uso das propriedades do operador integral T_Z^K com a alternativa de Fredholm nos permitiu estabelecer a resolubilidade do problema em termos do sinal do índice de Λ . Vale assinalar que a equação tipo Vekua, $Lu = au + b\bar{u} + f$, presente no problema de Riemann-Hilbert (1.12), é diferente do tipo de equação tratada nos problemas anteriores acima. Assim, não foi aplicada a mesma técnica usada no problema precedente. No entanto pela linearidade do termo $au + b\bar{u}$, na variável u , com u no espaço vetorial das funções contínuas em $\overline{\Omega}$ com escalares reais, é possível definir um operador compacto, de $C(\overline{\Omega})$ sobre si mesmo, da forma

$$G^K u = T_Z^K(au + b\bar{u})$$

que se enquadra na teoria de Fredholm. Obtemos uma solução Hölder contínua para o problema usando o *Teorema da alternativa de Fredholm* para provar a existência de um ponto fixo para uma equação integral envolvendo o operador G^K .

Para finalizar o capítulo, estudamos o problema (1.12), quando L é hipoelítico, a e f são de classe C^∞ e b é a função identicamente nula. Neste caso o problema fica mais simples e pode ser resolvido através da resolubilidade global de L e da teoria clássica do problema de Riemann-Hilbert.

Os **Apêndices A e B** foram incluídos nesta tese no intuito de tornar o texto mais completo e facilitar a leitura. No Apêndice A listamos alguns teoremas importantes que foram usados no texto e no Apêndice B falamos de maneira resumida sobre alguns pontos da teoria clássica. O termo teoria clássica significa a teoria encontrada nos livros (VEKUA, 1962), (BEGEHR, 1994) e (GAKHOV, 1966).

PRELIMINARES

2.1 Espaço de funções

Seja $\mathbb{Z}_+$ o conjunto dos números inteiros não negativos $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Em $\mathbb{R}^2$ o par ordenado será denotado por (x, y) ou por (ξ, η) nesta seção. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ um aberto. Denotamos por $C(\Omega)$ o conjunto funções a valores complexos em Ω que são contínuas, também denotado $C(\Omega, \mathbb{C})$, onde $\mathbb{C}$ denota o conjunto dos números complexos. Assim, seguindo o padrão da notação, denotamos por $C(\Omega, \mathbb{R})$, onde $\mathbb{R}$ denota o conjunto dos números reais, o conjunto das funções definidas em Ω com valores reais.

O espaço das funções de classe C^k , $k \in \mathbb{Z}_+$, em Ω , indicado por $C^k(\Omega)$, consiste de todas as funções f definidas em Ω a valores complexos com derivadas parciais contínuas até ordem k , isto é, $f \in C^k(\Omega)$ se, e somente se,

$$\frac{\partial^{m+n} f}{\partial x^m \partial y^n} \in C(\Omega), \quad m, n \in \mathbb{Z}_+, \quad \text{com } m+n \leq k.$$

Assumimos a notação $C^0(\Omega) = C(\Omega)$. Analogamente, $C^\infty(\Omega)$, consiste das funções definidas em Ω a valores complexos com derivadas parciais contínuas de todas as ordens. Mais explicitamente,

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k \in \mathbb{Z}_+} C^k(\Omega).$$

O suporte de uma função $f \in C^0(\Omega)$, indicado por $\text{supp}(f)$, é o fecho em Ω do conjunto $\{p \in \Omega ; f(p) \neq 0\}$. O suporte de f é o complementar em Ω do maior aberto onde f é nula.

Indicamos por $C_c^k(\Omega)$, o subconjunto de $C^k(\Omega)$ das funções com suporte compacto e por $C_c^\infty(\Omega)$ o subconjunto de $C^\infty(\Omega)$ das funções de suporte compacto.

$$C_c^\infty(\Omega) = \bigcap_{k \in \mathbb{Z}_+} C_c^k(\Omega).$$

Observação 1. Os conjuntos $C^k(\Omega)$, $C^\infty(\Omega)$, $C_c^k(\Omega)$ e $C_c^\infty(\Omega)$ são espaços vetoriais sobre $\mathbb{K}$, onde $\mathbb{K}$ denota $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$, com as operações usuais de funções.

Seja $D = \Omega, \overline{\Omega}$ ou Γ , onde Γ é uma curva em $\mathbb{R}^2$.

Dizemos que uma função f satisfaz a condição de Hölder em D , com expoente α , $0 < \alpha \leq 1$, se existe uma constante $K = K(f, \alpha, D) > 0$ tal que

$$|f(p_1) - f(p_2)| \leq K|p_1 - p_2|^\alpha, \text{ para todos } p_1, p_2 \in D.$$

Neste caso, f também é chamada de Hölder contínua quando $0 < \alpha < 1$ e Lipschitz contínua quando $\alpha = 1$. Denotamos por $C^\alpha(D)$ o espaço vetorial das funções $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfazem a condição de Hölder em D com expoente $0 < \alpha < 1$ e denotamos por $\text{Lips}(D)$ o espaço vetorial das funções $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfazem a condição de Hölder em D com expoente $\alpha = 1$.

Seja $\tilde{\Omega}$ um aberto de $\mathbb{R}^2$ e seja Ω um aberto de $\mathbb{R}^2$, com $\overline{\Omega}$ compacto em $\mathbb{R}^2$ tal que $\overline{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$. (Em outras palavras, Ω está compactamente contido em $\tilde{\Omega}$). Suponha que $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função de classe C^1 . Definimos $C_Z^\alpha(\overline{\Omega})$ como o conjunto das funções $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ tais que

$$|f(p_1) - f(p_2)| \leq K|Z(p_1) - Z(p_2)|^\alpha$$

para todos $p_1, p_2 \in \overline{\Omega}$, onde $K = K(f, \alpha, \Omega, Z) > 0$. Note que $C_Z^\alpha(\overline{\Omega}) \subset C^\alpha(\overline{\Omega})$.

Definimos $C^{k+\alpha}(\Omega)$, $k \in \mathbb{Z}_+$, $0 < \alpha < 1$, pelo espaço das funções $f \in C^k(\Omega)$ que satisfazem

$$\frac{\partial^{m+n} f}{\partial x^m \partial y^n} \in C^\alpha(\Omega), \quad m, n \in \mathbb{Z}_+, \text{ com } m+n = k.$$

Também é usada a notação $C^{k+\alpha}(\Omega)$, $k \in \mathbb{Z}_+$, $0 \leq \alpha < 1$, que indica apenas que $C^{k+\alpha}(\Omega) = C^k(\Omega)$ quando $\alpha = 0$. Dizer que uma função f é de classe $C^{k+\alpha}$ em Ω equivale a dizer que $f \in C^{k+\alpha}(\Omega)$.

Observação 2. Dizer que $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ é uma curva de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 \leq \varepsilon < 1$, equivale a dizer que Γ é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1, de classe $C^{1+\varepsilon}$, de $\mathbb{R}^2$. Em particular, se Γ é de classe $C^{1+\varepsilon}$, então Γ é uma curva simples. Sobre a teoria de variedades diferenciáveis veja [\(LIMA, 2007\)](#).

Sejam U e V abertos de $\mathbb{R}^2$. Um homeomorfismo $F : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo de classe $C^{k+\alpha}$, $k = 1, 2, \dots$, $0 \leq \alpha < 1$, se $F_1, F_2 \in C^{k+\alpha}(U)$ e $(F^{-1})_1, (F^{-1})_2 \in C^{k+\alpha}(V)$, onde F_j denota as funções coordenadas de F e $(F^{-1})_j$ denota as funções coordenadas de F^{-1} .

Seja Ω um aberto de $\mathbb{R}^2$. Seja $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ uma função Lebesgue mensurável que satisfaz

$$\int_{\Omega} |f(\xi, \eta)|^p d\xi d\eta < \infty, \quad 1 \leq p < \infty.$$

O conjunto de tais funções é denotado por $L^p(\Omega)$. Como a relação de equivalência $f \approx g$ se e somente, se $f - g = 0$ a menos de um conjunto de medida nula, $L^p(\Omega)$ é um espaço vetorial com escalares em $\mathbb{K}$ (onde $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$), com a norma

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f(\xi, \eta)|^p d\xi d\eta \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Também denotamos $\|f\|_p$ por $\|f\|_{p,\Omega}$. Neste texto, será muito usada a seguinte desigualdade.

Desigualdade de Hölder. Se $f \in L^p(\Omega)$ e $g \in L^q(\Omega)$, com $1/p + 1/q = 1$, então $fg \in L^1(\Omega)$ e vale

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Definimos por $L^\infty(\Omega)$ como o conjunto das funções Lebesgue mensuráveis e limitadas em Ω , com a relação de equivalência $\approx$ descrita acima. Temos que $L^\infty(\Omega)$ é um espaço vetorial normado, como $L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$, com a norma

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(\xi, \eta)|; (\xi, \eta) \in \Omega\}.$$

Também denotamos $\|f\|_\infty$ por $\|f\|_{\infty,\Omega}$. Para este espaço também vale a desigualdade de Hölder, isto é, se $f \in L^1(\Omega)$ e $g \in L^\infty(\Omega)$, então $fg \in L^1(\Omega)$ e

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

O conjunto das funções localmente integráveis em Ω , indicado por $L^1_{loc}(\Omega)$, é o conjunto das funções f Lebesgue mensuráveis em Ω tais que

$$\int_K |f(\xi, \eta)| d\xi d\eta < \infty,$$

para todo $K \subset \Omega$ compacto.

Ressaltamos que $L^p(\Omega) \subset L^1_{loc}(\Omega)$, $1 \leq p \leq \infty$.

Definição 1. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ uma função contínua, onde U é um aberto de $\mathbb{C}$. Dizemos que f é holomorfa (ou analítica) em U , se para cada $z_0 \in U$ existe o limite

$$f'(z_0) = \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \zeta) - f(z_0)}{\zeta}.$$

Se f é holomorfa em U então a função obtida acima, $U \ni z \mapsto f'(z) \in \mathbb{C}$ é chamada de derivada de f e é denotada por f' .

Sejam U, V abertos de $\mathbb{C}$ e $f : U \rightarrow V$ é uma bijeção. Se f é holomorfa em U e f^{-1} é holomorfa em V , então f é dita um biholomorfismo de U em V .

2.2 Distribuições

A seguir definiremos o conceito de distribuições e faremos alguns comentários. Para um estudo aprofundado veja (HÖRMANDER, a).

Um funcional linear de $C_c^\infty(\Omega)$ sobre $\mathbb{C}$ é uma função $u : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que

$$u(a\phi + b\psi) = au(\phi) + bu(\psi), \text{ para } a, b \in \mathbb{C} \text{ e } \phi, \psi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Denotaremos $\langle u, \phi \rangle$ a ação de um funcional linear $u : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ em sobre $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$, isto é, $\langle u, \phi \rangle = u(\phi)$.

Definição 2. Uma *distribuição* em Ω é um funcional linear $u : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que para cada compacto $K \subset \Omega$, existe uma constante C e um inteiro positivo m tais que

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C \sum_{j+\ell \leq m} \sup_K \left| \frac{\partial^{j+\ell} \phi}{\partial x^j \partial y^\ell} \right|,$$

para toda $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ com $\text{supp}(\phi) \subset K$.

Denotamos por $\mathcal{D}'(\Omega)$ o conjunto de todas as distribuições em Ω .

Na definição acima, se for possível determinar o mesmo m para todo compacto K , dizemos que u tem ordem menor ou igual a m . O conjunto das distribuições em Ω com ordem menor ou igual a $m \in \mathbb{Z}_+$ é denotado por $\mathcal{D}'_m(\Omega)$.

Vamos ver agora alguns exemplos de distribuições

Exemplo 1. Seja $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. Então

$$\langle u_f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(\xi, \eta) \phi(\xi, \eta) d\xi d\eta, \quad \phi \in C_c^\infty(\Omega),$$

define uma distribuição em Ω de ordem zero.

Observação 3. A aplicação $L^1_{loc}(\Omega) \ni f \mapsto u_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ é linear e injetora. Logo $L^1_{loc}(\Omega)$ pode ser considerado como um subespaço de $\mathcal{D}'(\Omega)$. Devido a isso, a distribuição u_f será denotada por f . Em particular, toda função de classe $C^k(\Omega)$, $k = 0, 1, 2, \dots, \infty$ define uma distribuição em Ω .

Uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ é dita $C^{k+\alpha}$, $k \in \mathbb{Z}_+$, $0 \leq \alpha < 1$, (C^∞) no aberto $U \subset \Omega$, se existe uma função $f \in C^{k+\alpha}(U)$ ($C^\infty(U)$) tal que

$$\langle u, \phi \rangle = \int_U f(\xi, \eta) \phi(\xi, \eta) d\xi d\eta, \text{ para toda } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Agora, vamos falar um pouco sobre derivação e multiplicação por funções no contexto de distribuições.

Definição 3. Se $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ e $j, \ell \in \mathbb{Z}_+$, definimos

$$\left\langle \frac{\partial^{j+\ell} u}{\partial x^j \partial^\ell}, \varphi \right\rangle \doteq (-1)^{j+\ell} \left\langle u, \frac{\partial^{j+\ell} \varphi}{\partial x^j \partial^\ell} \right\rangle, \text{ para } \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \quad (2.1)$$

e se $f \in C^\infty(\Omega)$, definimos

$$\langle fu, \varphi \rangle \doteq \langle u, f\varphi \rangle, \text{ para } \varphi \in C_c^\infty(\Omega). \quad (2.2)$$

Segue de facilmente da definição de distribuição que (2.1) e (2.2) definem distribuições que denotaremos, respectivamente, por $\frac{\partial^{j+\ell} u}{\partial x^j \partial^\ell}$ e fu .

Observação 4. Também temos, mas não de maneira imediata, que (2.2) define uma distribuição $fu \in \mathcal{D}'_m(\Omega)$ se $f \in C^m(\Omega)$ e $u \in \mathcal{D}'_m(\Omega)$. Veja (HöRMANDER, a), página 55.

Observação 5. As definições acima e espaços de funções estabelecidos para conjuntos em $\mathbb{R}^2$ podem ser definidos da mesma forma para conjuntos de $\mathbb{C}$ pela identificação $\mathbb{R}^2 \ni (x, y) \mapsto x + iy \in \mathbb{C}$. Por exemplo, seja D um aberto de $\mathbb{C}$. Dizemos que uma função $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ é de classe $C^{k+\alpha}$, isto é, $f \in C^{k+\alpha}(D)$, $k \in \mathbb{Z}^+$, $0 \leq \alpha < 1$, se e somente se, a função $\tilde{f} : \tilde{D} \rightarrow \mathbb{C}$, com $\tilde{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + iy \in D\}$, dada por $\tilde{f}(x, y) = f(x + iy)$, é tal que $\tilde{f} \in C^{k+\alpha}(\tilde{D})$.

2.3 Campos vetoriais

Seja $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$ um aberto. Um campo vetorial de classe $C^{k+\alpha}$, $k = 0, 1, \dots, \infty$, $0 \leq \alpha < 1$, é uma aplicação de $L : C^1(\Omega) \rightarrow C(\Omega)$ dada por

$$L = A(x, y) \frac{\partial}{\partial x} + B(x, y) \frac{\partial}{\partial y}, \quad (2.3)$$

onde $A, B \in C^{k+\alpha}(\tilde{\Omega})$.

Definição 4. Dizemos que um campo L , como em (2.3), é não singular no ponto $p \in \tilde{\Omega}$ se $|A(p)| + |B(p)| > 0$. O campo L é chamado de não singular em $\tilde{\Omega}$ se L é não singular em cada ponto de $\tilde{\Omega}$.

O vetor conjugado de L , como em (2.3), denotado por $\bar{L}$, é o campo

$$\bar{L} = \bar{A}(x, y) \frac{\partial}{\partial x} + \bar{B}(x, y) \frac{\partial}{\partial y},$$

onde $\bar{A}$ e $\bar{B}$ são os conjugados das funções A e B , respectivamente. O simbolo de L é dado por

$$L((x, y), (\xi, \eta)) = A(x, y)\xi + B(x, y)\eta,$$

para $(x, y) \in \tilde{\Omega}$ e $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$.

Definição 5. O campo vetorial L é chamado elítico em $(x, y) \in \tilde{\Omega}$ quando

$$L((x, y), (\xi, \eta)) \neq 0 \text{ para todo } (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

O campo vetorial L é chamado de elítico em $\tilde{\Omega}$ se é elítico em todo $(x, y) \in \tilde{\Omega}$.

Observe que se L é elítico, então L é não singular.

Proposição 1. Seja $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ um campo de classe C^0 em $\tilde{\Omega}$ e seja $p \in \tilde{\Omega}$. As seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) L é elítico em p ;
- (b) L_p e $\bar{L}_p$ são linearmente independentes em p ;
- (c) $\Im(\overline{AB})(p) \neq 0$.

Demonstração. Suponha (a). Temos em particular, $A(p) \neq 0$ e $B(p) \neq 0$. Assim,

$$A(p)\xi + B(p)\eta = A(p)\left(\xi + \Re\left(\frac{\overline{A(p)}B(p)}{|A(p)|^2}\right)\eta + i\Im\left(\frac{\overline{A(p)}B(p)}{|A(p)|^2}\right)\eta\right), \quad (2.4)$$

onde $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$. Daí, segue que $\Im\left(\frac{\overline{A(p)}B(p)}{|A(p)|^2}\right) \neq 0$, o que equivale a $\Im(\overline{AB})(p) \neq 0$. Portanto, (a) $\Rightarrow$ (c). Por outro lado, $\Im(\overline{AB})(p) \neq 0$ implica em particular que $A(p) \neq 0$. Logo vale (2.4), daí $A(p)\xi + B(p)\eta = 0$ e $\Im(\overline{AB})(p) \neq 0$ se, e somente se, $(\xi, \eta) = (0, 0)$. Portanto, (c) $\Rightarrow$ (a). Observe que,

$$2i\Im(\overline{AB})(p) = \begin{vmatrix} A(p) & \overline{A(p)} \\ B(p) & \overline{B(p)} \end{vmatrix}. \quad (2.5)$$

Segue de (2.5) que (c) $\Leftrightarrow$ (b). □

Seja $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ um campo de classe C^0 em $\tilde{\Omega}$. O conjunto

$$\Sigma(\tilde{\Omega}, L) = \{(x, y) \in \tilde{\Omega} \mid \Im(\overline{AB})(x, y) = 0\}$$

é chamado de conjunto característico de L . Quando não há perigo de confusão denotamos $\Sigma(\tilde{\Omega}, L)$ por Σ . Note que Σ é fechado e L restrito a $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ é elítico.

Exemplo 2. No contexto de funções de variáveis complexas surgem naturalmente os campos elíticos

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right) \text{ e } \frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right), \quad z = x + iy,$$

definidos em $\mathbb{R}^2$ (ou em $\mathbb{C}$, pela identificação $x + iy = (x, y)$). Eles são chamados, respectivamente, de operador de Cauchy-Riemann e anti-operador de Cauchy-Riemann.

Observação 6. É conhecido na Análise Complexa o seguinte fato. Seja $h : U \rightarrow \mathbb{C}$ uma função de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. Se

$$\frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = 0 \text{ em } U,$$

então h é uma função holomorfa em U , tendo em mente a identificação de $\mathbb{R}^2$ com $\mathbb{C}$. Isto é, $\tilde{h}(z) := h(x, y)$ definida em no aberto $\tilde{U} = \{z = x + iy; (x, y) \in U\} \subset \mathbb{C}$ possui derivada complexa (veja a definição 1). Se h é holomorfa, vale $\frac{\partial h}{\partial \bar{z}}(x, y) = \tilde{h}'(x + iy)$.

Proposição 2. Seja L um campo em $\tilde{\Omega}$. Se $f \in C^1(U)$, onde U é um aberto de $\tilde{\Omega}$, e $h : V \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função holomorfa, onde V é um aberto de $\mathbb{C}$ tal que $f(U) \subset V$, então

$$L(h \circ f) = (h' \circ f)L(f) \text{ em } U.$$

Em particular, quando f é solução de L em U , i.e., $L(f) = 0$ em U , então $h \circ f$ é solução do campo L em U , i.e., $L(h \circ f) = 0$ em U .

Demonstração. A demonstração segue do teorema da regra da cadeia para funções de variáveis reais. $\square$

Definição 6. Seja L um campo vetorial de classe C^0 , definido no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$. Uma função $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^1 , definida no aberto $U \subset \tilde{\Omega}$, é dita uma integral primeira de L em U se $LZ = 0$ em U e $dZ \neq 0$ em U . Dizemos que L é localmente integrável se para cada $p \in \tilde{\Omega}$ existir uma integral primeira de L definida em uma vizinhança de p .

Seja L um campo vetorial complexo em $\tilde{\Omega}$. Seja $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira de L em U , onde U é um aberto de $\tilde{\Omega}$, e seja $h : V \rightarrow \mathbb{C}$, onde V é um aberto de $\mathbb{C}$ com $Z(U) \subset V$, uma função holomorfa com $h'(\zeta) \neq 0$ para todo $\zeta \in V$. Segue da Proposição 2 que a composta $h \circ Z$ é uma integral primeira de L em U .

Agora, vamos estabelecer a notação para mudança de variáveis em campo vetorial complexo.

Seja L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$. Sejam Ω_1, Ω_2 abertos de $\mathbb{R}^2$ com $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$. Denotaremos por (x, y) um elemento genérico de Ω_1 , e por (s, t) um elemento genérico de Ω_2 . Seja $F : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$, com $F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y)) = (s, t)$, um difeomorfismo de classe C^1 . O campo vetorial L nas novas variáveis dadas por F , que denotaremos por L_F , é dado por

$$L_F = (L(F_1) \circ F^{-1}) \frac{\partial}{\partial s} + (L(F_2) \circ F^{-1}) \frac{\partial}{\partial t} \text{ em } \Omega_2. \quad (2.6)$$

Note que, se $Z : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{C}$ é de classe C^1 , com $LZ = 0$ em Ω_1 , temos que a função $Z_F : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$Z_F := Z \circ F^{-1}$$

é tal que $L_F Z_F = 0$ em Ω_2 .

Observação 7. Seja $f \in C^1(\Omega_2)$. O campo L_F , dado em (2.6), pode ser escrito com

$$L_F f(s, t) = (L(f \circ F) \circ F^{-1})(s, t), \quad (s, t) \in \Omega_2.$$

Observação 8. A mudança de variáveis em um campo, descrita acima, também é chamada de mudança de coordenadas.

Observação 9. Seja L um campo de classe C^α , $0 < \alpha < 1$, em $\tilde{\Omega}$. Dado $p \in \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ existe uma mudança de variáveis, de classe $C^{1+\alpha}$, numa vizinhança de p tal que L pode ser escrito como múltiplo, não nulo, do operador de Cauchy-Riemann $\partial/\partial\bar{z}$. Note que L é elítico em p . Em termos da notação acima, existe um difeomorfismo $F : U \rightarrow V$ de classe $C^{1+\alpha}$, onde U, V são abertos com $p \in U \subset \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, tal que

$$L_F = \lambda_F \frac{\partial}{\partial\bar{z}} \text{ em } V,$$

onde $\lambda \in C^\alpha(V)$, com $|\lambda| > 0$ em V . O difeomorfismo F é obtido através do estudo da equação de Beltrami relacionada ao campo L . Veja (COURANT; HILBERT, 1962), na página 350. Veja também (CAMPANA, 2013).

Proposição 3. Seja L um campo elítico de classe C^0 em $\tilde{\Omega}$. Suponha que $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ é uma integral primeira, de classe C^1 , de L , definida no aberto $U \subset \tilde{\Omega}$, com $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ um homeomorfismo. Se $u \in C^1(U)$ é tal que $Lu = 0$ em U , então existe $h : Z(U) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa tal que $u = h \circ Z$ em U .

Demonstração. Como L é elítico temos que os vetores $\text{grad}(\Re(Z))(p)$ e $\text{grad}(\Im(Z))(p)$ são linearmente independentes para todo $p \in U$. Então $F : U \rightarrow V$, com $V = F(U)$, dado por

$$F(x, y) = (\Re(Z)(x, y), \Im(Z)(x, y))$$

é um difeomorfismo de classe C^1 . Vamos denotar as coordenadas em V por (s, t) . Fazendo a mudança de coordenadas em L através de F obtemos

$$L_F = (L(\bar{Z}) \circ F^{-1}) \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial s} + i \frac{\partial}{\partial t} \right) =: \lambda \frac{\partial}{\partial \bar{w}},$$

onde $w = s + it$, e $\lambda \in C(V)$, com $|\lambda| > 0$ em U . Ou seja, L_F é um múltiplo do operador de Cauchy-Riemann em V . Além disso, $u_F = u \circ F^{-1}$ é de classe C^1 e satisfaz

$$\frac{\partial u_F}{\partial \bar{w}} = 0 \text{ em } V.$$

Daí temos que $h := u \circ Z^{-1}$ é uma função holomorfa em $Z(U)$. Segue o resultado. $\square$

Seja L um campo vetorial de classe C^∞ em $\tilde{\Omega}$. Por dualidade, seguindo as regras de multiplicação por funções e a regra de diferenciação de distribuições, podemos estender L a uma aplicação de $\mathcal{D}'(\tilde{\Omega})$ em si mesmo. Assim, podemos buscar soluções fracas, isto é, soluções distribucionais, de equações envolvendo o campo L , por exemplo a equação $Lu = f$ com $f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$. O próximo teorema ilustra este comentário.

Teorema 1. Se $u \in \mathcal{D}'(\tilde{\Omega})$ é tal que $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = 0$ em $\tilde{\Omega}$, então u é uma função holomorfa em $\tilde{\Omega}$.

Veja demonstração em (HOUNIE, 1979)

□

Observação 10. Seja $L = A\partial_x + B\partial_y$ um campo vetorial complexo de classe C^0 em $\tilde{\Omega}$. Suponha que

$$\partial_x A, \partial_y B \in C(\tilde{\Omega}). \quad (2.7)$$

Sejam $f \in C^1(\tilde{\Omega})$ e $\phi \in C_c^1(\tilde{\Omega})$. Utilizando integração por partes e (2.7) temos

$$\int_{\tilde{\Omega}} Lf(x,y)\phi(x,y)dxdy = \int_{\tilde{\Omega}} f(x,y)^t L\phi(x,y)$$

onde

$${}^tL = -L - (A_x + B_y).$$

Ou seja, a relação de dualidade fica bem definida. Tendo em vista essa relação, definimos Lu em $\tilde{\Omega}$ e $u \in C(\tilde{\Omega})$, por

$$\langle Lu, \phi \rangle = \langle u, {}^tL\phi \rangle, \quad \phi \in C_c^1(\tilde{\Omega}).$$

Segue da Observação 4 (página 29) que $Lu \in \mathcal{D}'_1(\tilde{\Omega})$.

Seja U um aberto de $\mathbb{R}^2$ e seja $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ uma função de classe $C^{1+k+\alpha}$, $k = 0, 1, \dots, \infty$, $0 \leq \alpha < 1$, em U . O campo vetorial complexo

$$H_Z := Z_y \frac{\partial}{\partial x} - Z_x \frac{\partial}{\partial y} \text{ em } U$$

é um campo vetorial de classe $C^{k+\alpha}$ em U . O campo H_Z é chamado de Hamiltoniano de Z em U .

Proposição 4. Seja L um campo não singular de classe $C^{k+\alpha}$, $k = 0, 1, \dots, \infty$, $0 \leq \alpha < 1$, em $\tilde{\Omega}$. Se $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$, U aberto de $\tilde{\Omega}$, é uma integral primeira, de classe $C^{1+k+\alpha}$, de L , então existe $\lambda \in C^{k+\alpha}(U)$, com $|\lambda| > 0$ em U , tal que

$$L = \lambda H_Z \text{ em } U.$$

Demonstração. Como $dZ \neq 0$ em U e pela relação $AZ_x + BZ_y = 0$ em U fica bem definida a função $\lambda : U \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\lambda(p) = \begin{cases} \frac{A(p)}{Z_y(p)}, & \text{se } Z_y(p) \neq 0, \\ -\frac{B(p)}{Z_x(p)}, & \text{se } Z_x(p) \neq 0. \end{cases} \quad (2.8)$$

É fácil verificar que $L = \lambda H_Z$ em U .

Agora vamos demonstrar que $\lambda \in C^{k+\alpha}(U)$ e $|\lambda| > 0$ em U .

Seja $p_0 \in U$. Temos que $Z_x(p_0) \neq 0$ ou $Z_y(p_0) \neq 0$. Podemos supor, sem perda de generalidade, que $Z_y(p_0) \neq 0$, pois o argumento usado a seguir também funciona para o caso $Z_x(p_0) \neq 0$. Como $Z_y(p_0) \neq 0$, existe $V \subset U$ aberto tal que $Z_y(p) \neq 0$ para todo $p \in V$. Então, temos

$$\lambda = \frac{A}{Z_y} \text{ em } V.$$

É fácil ver que λ é de classe $C^{k+\alpha}$ em V . Suponha por contradição que existe $q_0 \in V$ tal que $\lambda(q_0) = 0$. Então, $A(q_0) = 0$. Como

$$A(q_0)Z_x(q_0) + B(q_0)Z_y(q_0) = 0 \text{ e } Z_y(q_0) \neq 0,$$

temos $B(q_0) = 0$. Contradição com o fato de L ser não singular. Portanto λ não tem zeros em V .

Pela arbitrariedade de p_0 temos que o resultado. $\square$

Proposição 5. Sejam L um campo elítico de classe C^1 em $\tilde{\Omega}$ e $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$, com U aberto de $\tilde{\Omega}$, uma integral primeira de L , de classe C^2 em U , tal que $Z : U \rightarrow Z(U)$ é um homeomorfismo. Se $u \in C(U)$ é tal que $Lu = 0$ em U então existe uma função holomorfa $h : Z(U) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $u = h \circ Z$ em U .

Demonstração. Para começar a demonstração, vamos verificar que $F : U \rightarrow F(U)$, dada por $F(x, y) = (\Re(Z)(x, y), \Im(Z)(x, y))$, é um difeomorfismo. Como $Z(U)$ é um aberto de $\mathbb{C}$ segue que $F(U)$ é um aberto de $\mathbb{R}^2$. Podemos escrever

$$L = \lambda H_Z \text{ em } U,$$

com $\lambda \in C^1(U)$ e $|\lambda| > 0$ em U (Proposição 4). Note que L é elítico em U se, e somente se, H_Z é elítico em U . Segue daí que $\Im(Z_y \overline{Z_x})(p) \neq 0$ para todo $p \in U$ (Proposição 1). Por outro lado, note que

$$|\Im(Z_y \overline{Z_x})| = |\det(DF)|.$$

Segue daí que $\det(DF)(p) \neq 0$ para todo $p \in U$ e assim concluímos que F^{-1} é de classe C^1 pelo Teorema da função inversa. Portanto F é um difeomorfismo.

Agora note que

$$Lu = 0 \text{ em } U, \text{ se, e somente se, } H_Z u = 0 \text{ em } U.$$

De fato, segue do fato de $\lambda, 1/\lambda \in C^1(U)$ e $Lu, H_Z u \in \mathcal{D}'_1(U)$.

Seja dado $\psi \in C_c^\infty(V)$. Defina $\phi = \psi \circ F$. Temos

$$\langle H_Z u, \phi \rangle = \langle u, -H_Z \phi \rangle = 0.$$

Por outro lado,

$$\langle u, -H_Z \phi \rangle = - \int_U u(x, y) H_Z \phi(x, y) dx dy$$

$$= - \int_{F(U)} \frac{u(F^{-1}(\xi, \eta))(H_Z \phi)(F^{-1}(\xi, \eta))}{|\det DF(F^{-1}(\xi, \eta))|} d\xi d\eta. \quad (2.9)$$

Note que

$$(H_Z \phi) \circ F^{-1} = (H_Z(\psi \circ F)) \circ F^{-1} = (H_Z(\bar{Z}) \circ F^{-1}) \partial_{\bar{w}} \psi =: \lambda \partial_{\bar{w}} \psi,$$

onde $w = s + it$ (veja a Observação 7). Temos assim

$$\int_V \frac{u(F^{-1}(\xi, \eta)) \lambda(\xi, \eta) (\partial_{\bar{w}} \psi)(\xi, \eta)}{|\det DF(F^{-1}(\xi, \eta))|} d\xi d\eta = 0, \quad (2.10)$$

lembrando que $F(U) = V$. Note que

$$H_Z(\bar{Z}) = 2i\Im(Z_y \bar{Z}_x) = 2i \det(DF).$$

Daí,

$$\frac{\lambda(\xi, \eta)}{|\det(DF)(F^{-1}(\xi, \eta))|} = \frac{2i \det(DF)(F^{-1}(\xi, \eta))}{|\det(DF)(F^{-1}(\xi, \eta))|} = 2ic,$$

onde $c = 1$ ou -1 . Assim, por (2.10),

$$\int_V (u \circ F^{-1})(\xi, \eta) (\partial_{\bar{w}} \psi)(\xi, \eta) d\xi d\eta = 0.$$

Assim, pela arbitrariedade de $\psi \in C_c^\infty(V)$, temos

$$\partial_{\bar{w}}(u \circ F^{-1}) = 0 \text{ em } V.$$

Segue do Teorema 1 que $h : Z(U) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$h = u \circ Z^{-1}$$

é holomorfa em $Z(U)$. Concluimos assim o teorema. $\square$

Neste texto, vamos considerar a seguinte definição de hipocomplexidade:

Definição 7. Um campo vetorial complexo de classe $C^{k+\varepsilon}$, $k = 0, 1, 2, \dots, \infty$, $0 \leq \varepsilon < 1$, é dito $C^{1+k+\varepsilon}$ -hipocomplexo em $\tilde{\Omega}$, se para todo $p \in \tilde{\Omega}$ existir uma integral primeira de classe $C^{1+k+\varepsilon}$, $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$, definida em um conjunto aberto U , com $p \in U$, tal que Z é um homeomorfismo sobre sua imagem, isto é, $Z : U \rightarrow Z(U)$ é um homeomorfismo.

Um campo vetorial C^1 -hipocomplexo é chamado simplesmente de hipocomplexo.

Observação 11. Veja em (TREVES, 1992) e (BERHANU; CORDARO; HOUNIE, 2008) outras definições de hipocomplexidade.

Um conjunto de funções Z , como descritas na Definição 7 acima, é chamado de sistema completo de integrais primeiras que são homeomorfismos de classe $C^{1+k+\varepsilon}$ e é denotado da forma $\{U, Z_U\}_{U \in \mathcal{C}}$.

Segue da escrita local, em termos do operador de Cauchy-Riemann, mencionada na Observação 9, que campos elíticos de classe C^α , $0 < \alpha < 1$, são $C^{1+\alpha}$ -hipocomplexos.

Proposição 6. Seja L um campo vetorial C^1 -hipocomplexo definido em um aberto $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$. Seja $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$, com $U \subset \tilde{\Omega}$, uma integral primeira de L , de classe C^1 , que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Suponha que o conjunto característico Σ de L é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$ de classe C^1 . Se $u \in C^1(U)$ é tal que $Lu = 0$ em U então existe $h : Z(U) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa tal que $u = h \circ Z$ em U .

Demonstração. Defina $h : Z(U) \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$h = u \circ Z^{-1}.$$

Temos que h é uma função contínua em $Z(U)$. Seja $W = Z(U \setminus (\Sigma \cap U))$. Segue da Proposição 3 (página 32) que $h|_W$ é holomorfa. Vamos verificar que h é holomorfa numa vizinhança de cada ponto de $\zeta \in Z(\Sigma \cap U)$. Seja dado $\zeta_0 \in Z(\Sigma \cap U)$. Seja $p_0 = Z^{-1}(\zeta_0)$. Como Σ é uma união disjunta de curvas de classe C^1 existe $\delta > 0$ tal que $\overline{B(p_0, \delta)} \subset U$ e $\overline{B(p_0, \delta)} \cap \Sigma$ é um arco de curva que divide $B(p_0, \delta)$ em dois abertos conexos. Além disso, como Z é de classe C^1 em U e $\overline{B(p_0, \delta)} \subset U$ é compacto, segue que Z é Lipschitz em $\overline{B(p_0, \delta)}$. Segue daí que $Z(\overline{B(p_0, \delta)} \cap \Sigma)$ é um arco de curva contínua retificável. Sejam $D = Z(B(p_0, \delta))$ e $\Gamma = Z(\overline{B(p_0, \delta)} \cap \Sigma)$. Como Z é um homeomorfismo, temos que Γ divide D em duas componentes conexas D_1 e D_2 . Temos os seguintes fatos: h é contínua em D e a restrição $h_j : D_j \rightarrow \mathbb{C}$, $j = 1, 2$ dada por $h_j = h$ em D_j , é holomorfa (como vimos acima). Por um resultado de análise complexa (ver Teorema 23, página 132) h_1 e h_2 formam uma continuação holomorfa uma da outra, ou seja, h é holomorfa em D . Como D é uma vizinhança de ζ_0 , e ζ_0 é arbitrário, segue que h é holomorfa numa vizinhança de $Z(\Sigma \cap U)$ e daí concluímos que h é holomorfa em $Z(U)$. $\square$

A próxima proposição exhibe mais uma boa propriedade de campos hipocomplexos: a existência de integral primeira global que é um homeomorfismo sobre sua imagem, que em geral denotamos por Z . Essa propriedade é fundamental neste texto. Muitos problemas e técnicas que envolvem o operador de Cauchy-Riemann $\partial/\partial\bar{z}$ podem ser generalizadas para L através de Z . Um exemplo é a generalização do operador integral clássico Tf (definido em (B.2), página 136) para o operador integral $T_Z f$ (definido em (5.5), página 72). Na teoria clássica Tf é usado no estudo da equação $\partial u/\partial\bar{z} = f$, enquanto que aqui usaremos, sua generalização, $T_Z f$ para o estudo da equação $Lu = f$ (capítulo 5, página 71).

A demonstração da seguinte proposição é inspirada em (BERGAMASCO; CORDARO; HOUNIE, 1988).

Proposição 7. Seja L um campo vetorial definido no aberto conexo $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$. Suponha que L é um campo $C^{1+\varepsilon}$ -hipocomplexo, $0 \leq \varepsilon < 1$, e que seu conjunto característico Σ é uma subvariedade mergulhada de $\tilde{\Omega}$ de dimensão 1 e classe C^1 . Então L possui uma integral primeira global em $\tilde{\Omega}$ que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Mais precisamente, existe uma função

$$Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{C},$$

de classe $C^{1+\varepsilon}$, tal que Z é um homeomorfismo, $LZ = 0$ e $dZ \neq 0$ em $\tilde{\Omega}$.

Demonstração. Como L é $C^{1+\varepsilon}$ -hipocomplexo existe uma cobertura aberta $\{U_v\}_{v \in I}$ de $\tilde{\Omega}$ e para cada U_v existe uma aplicação $Z_v : U_v \rightarrow \mathbb{C}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, tal que $LZ_v = 0$, $dZ_v \neq 0$ e $Z_v : U_v \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo. Pela Proposição 6 a família $\{U_v, Z_v\}_{v \in I}$ é um atlas de $\tilde{\Omega}$, isto é, $Z_v : U_v \rightarrow Z_v(U_v)$ é um homeomorfismo do aberto U_v de $\tilde{\Omega}$ sobre o aberto $Z_v(U_v)$ em $\mathbb{C}$, $\{U_v\}_{v \in I}$ é uma cobertura de $\tilde{\Omega}$ e se $U_v \cap U_\mu \neq \emptyset$, $v, \mu \in I$, então

$$Z_v \circ Z_\mu^{-1} : Z_\mu(U_v \cap U_\mu) \longrightarrow Z_v(U_v \cap U_\mu)$$

é uma função holomorfa. Como $\tilde{\Omega}$ é conexo, a família $\{U_v, Z_v\}_{v \in I}$ define sobre $\tilde{\Omega}$ uma estrutura de superfície de Riemann. Pelo Teorema de uniformização de Riemann (Teorema 22, página 131) existe uma aplicação holomorfa (no sentido da estrutura diferencial de superfície de Riemann de $\tilde{\Omega}$)

$$Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{C}$$

que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Dizer que Z é uma função holomorfa de $\tilde{\Omega}$ para $\mathbb{C}$, no sentido da estrutura diferencial de superfície de Riemann, quer dizer que

$$h_v := Z \circ Z_v^{-1} : Z_v(U_v) \longrightarrow \mathbb{C} \text{ é holomorfa, no sentido clássico, para todo } v \in I;$$

Assim, $Z|_{U_v} = h_v \circ Z_v : U_v \longrightarrow \mathbb{C}$ para todo $v \in I$. Segue que $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ é de classe $C^{1+\varepsilon}$. Em geral, Z tem a mesma regularidade que a regularidade da família de integrais primeiras usadas como atlas acima. Além disso, $L(Z|_{U_v}) = L(h_v \circ Z_v) = 0$ em U_v , pois h_v é holomorfa e $L(Z_v) = 0$ em U_v . Segue daí que $LZ = 0$ em $\tilde{\Omega}$. Para todo $v \in I$, $d(Z|_{U_v}) = h'_v(Z_v)dZ_v \neq 0$ em U_v , pois $h_v : Z_v(U_v) \rightarrow Z(U_v)$ é um biholomorfismo e assim $h'_v \neq 0$ em $Z_v(U_v)$ e $dZ_v \neq 0$ em U_v . Segue que $dZ \neq 0$ em $\tilde{\Omega}$. $\square$

2.3.1 Campos vetoriais de tipo finito e infinito

Seja L um campo vetorial complexo de classe C^∞ definido no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$. Seja Σ seu conjunto característico em $\tilde{\Omega}$.

Um ponto $p_0 \in \Sigma$ é dito de **tipo finito** se existe um campo vetorial Y na álgebra de Lie gerada por L e $\bar{L}$ tal que L e Y são linearmente independentes em p_0 . Isto significa que existe um colchete de Lie da forma

$$Y = [Y_1, [Y_2, [\dots [Y_{k-1}, Y_k]]]]$$

onde $Y_j = L$ ou $\bar{L}$, tal que L e Y são linearmente independentes em p_0 . O tipo de L no ponto p_0 é o menor k , que aparece na expressão de Y acima, de modo que L e Y sejam linearmente independentes em p_0 . Se o campo Y não existe, então p_0 é dito de **tipo infinito**. O subconjunto de Σ de pontos de tipo finito é denotado por Σ^0 e o subconjunto de pontos de tipo infinito é denotado por Σ^∞ . Temos assim

$$\Sigma = \Sigma^0 \cup \Sigma^\infty \text{ e } \Sigma^0 \cap \Sigma^\infty = \emptyset.$$

Dizemos que L é de tipo finito se $\Sigma = \Sigma^0$ e dizemos que L é de tipo infinito se $\Sigma = \Sigma^\infty$.

Exemplo 3. Considere os campos

$$M = \frac{\partial}{\partial y} - iy \frac{\partial}{\partial x} \text{ e } N = \frac{\partial}{\partial y} - ix \frac{\partial}{\partial x},$$

definidos em $\mathbb{R}^2$. O campo M é de tipo finito e o campo N é de tipo infinito.

Exemplo 4. Seja $k > 0$ um inteiro. O campo

$$M_k = \frac{\partial}{\partial y} - iy^k \frac{\partial}{\partial x}$$

definido em $\mathbb{R}^2$ é de tipo finito k em todos os pontos de seu conjunto característico.

2.4 O índice

Seja $p_0 \in \mathbb{C}$ e $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ um caminho fechado com $\alpha(t) \neq p_0$, para todo $t \in [0, 1]$.

Existe uma função contínua $\tilde{\alpha} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\alpha(t) = p_0 + \rho(t)e^{i\tilde{\alpha}(t)} \text{ para todo } t \in [0, 1]. \quad (2.11)$$

onde $\rho(t) = |\alpha(t) - p_0|$. (Veja (LIMA, 2006)). A função $\tilde{\alpha}$ é chamada de função-ângulo. Qualquer outra função contínua que definida em $[0, 1]$ sobre $\mathbb{R}$ que satisfaz (2.11) difere de $\tilde{\alpha}$ por $2k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$. Daí temos que $n(\alpha; p_0)$ definido por

$$n(\alpha; p_0) = \frac{\tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0)}{2\pi}$$

é um número inteiro que não depende de $\tilde{\alpha}$. O número $n(\alpha; p_0)$ é o número de voltas que $e^{i\tilde{\alpha}(t)}$ dá em $\mathbb{S}^1$ no sentido positivo (contrário aos ponteiros do relógio) menos o número de voltas no sentido negativo quando t varia de 0 a 1. Veja (LIMA, 2006). Veja também (AHLFORS; SARIO, 1960).

Observação 12. Se $a : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ é um caminho, definimos $n(a; p_0)$ por $n(\alpha; p_0)$, onde $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ é tal que $a = (\Re(\alpha), \Im(\alpha))$.

Seja $F : \tilde{\Omega}_1 \rightarrow \tilde{\Omega}_2$ uma aplicação contínua, com $\tilde{\Omega}_1, \tilde{\Omega}_2 \subset \mathbb{R}^2$ abertos simplesmente conexos. Seja $p_0 \in \tilde{\Omega}$. A aplicação F define um homeomorfismo entre os grupos fundamentais de $\tilde{\Omega}_1 \setminus \{p_0\}$ e $\tilde{\Omega}_2 \setminus \{F(p_0)\}$ (que ambos, são isomorfos a $\mathbb{Z}$). Mais especificamente,

$$\mathcal{F} : \pi_1(\tilde{\Omega}_1 \setminus \{p_0\}) \rightarrow \pi_1(\tilde{\Omega}_2 \setminus \{F(p_0)\}),$$

dado por $\mathcal{F}([\alpha]) = [F \circ \alpha]$, onde $[\cdot]$ denota a classe de homotopia do caminho. Como $\tilde{\Omega}_1 \setminus \{p_0\}$ e $\tilde{\Omega}_2 \setminus \{F(p_0)\}$ são isomorfos a $\mathbb{Z}$, existem δ_F inteiro, $[\alpha]$ um gerador de $\pi_1(\tilde{\Omega}_1 \setminus \{p_0\})$ e $[\beta]$ um gerador de $\pi_1(\tilde{\Omega}_2 \setminus \{F(p_0)\})$ tais que

$$\mathcal{F}([\alpha]^m) = [\beta]^{m\delta_F}, \text{ para todo } m \in \mathbb{Z}.$$

Quando F é um homeomorfismo, temos que $\mathcal{F}$ é um isomorfismo e vale

$$n(F \circ \alpha; F(p_0)) = \delta_F n(\alpha; p_0),$$

para todo caminho fechado α em $\tilde{\Omega}_1 \setminus \{p_0\}$, onde $\delta_F = 1$ ou $\delta_F = -1$. Observe que $\delta_F = \delta_{F^{-1}}$. Outro ponto a se observar é que δ_F não depende do ponto p_0 . Veja (AHLFORS; SARIO, 1960).

Observação 13. Seja $F : \tilde{\Omega}_1 \rightarrow \tilde{\Omega}_2$, com $\tilde{\Omega}_1, \tilde{\Omega}_2 \subset \mathbb{R}^2$ abertos simplesmente conexos, um homeomorfismo. Dizemos que F preserva orientação quando $\delta_F = 1$, e dizemos que F inverte orientação quando $\delta_F = -1$. Este conceito de orientação concorda com o conceito de orientação de aplicações suaves dado pelo sinal do determinante da aplicação no seguinte sentido. Suponha F de classe C^1 e seja $p_0 \in \tilde{\Omega}$ tal que $\det(DF)(p_0) \neq 0$. Se $\det(DF)(p_0) > 0$, então F preserva orientação e se $\det(DF)(p_0) < 0$ então F inverte orientação.

Seja $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ uma curva fechada simples de classe C^1 . Seja $G : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ uma função contínua tal que $|G(p)| = 1$ para todo $p \in \Gamma$ (isto é, $G \in C(\Gamma, \mathbb{S}^1)$).

Definição 8. O índice de G com respeito a Γ é definido pelo número inteiro

$$\text{ind}_\Gamma(G) = \frac{1}{2\pi} \int_\Gamma d\arg(G).$$

Observação 14. A integral acima é entendida no sentido da integral de Stieltjes. Veja (GAKHOV, 1966) e (BEGEHR, 1994).

O índice de G com respeito a Γ , $\text{ind}_\Gamma(G)$, pode ser expresso pela seguinte igualdade

$$\text{ind}_\Gamma(G) = n(G \circ \gamma; 0),$$

onde $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ é uma parametrização, orientada positivamente (sentido anti-horário), de Γ . Note que $G \circ \gamma$ denota o caminho $G(\gamma(t))$, $t \in [0, 1]$. Veja (GAKHOV, 1966).

Quando não houver perigo de confusão, denotaremos o índice $\text{ind}_\Gamma(G)$ simplesmente por $\text{ind}(G)$.

Observação 15. $-\text{ind}(G) = n(G \circ \gamma^{-1}; 0)$, onde $\gamma^{-1}(t) = \gamma(t-1)$, $t \in [0, 1]$.

Se G, G_1 e $G_2 \in C(\Gamma, \mathbb{S}^1)$, então

$$\text{ind}(G_1 G_2) = \text{ind}(G_1) + \text{ind}(G_2) \text{ e } \text{ind}(1/G) = -\text{ind}(G) = \text{ind}(\overline{G}). \quad (2.12)$$

Observação 16. Sejam G, Γ e γ como acima. Suponha que $\text{ind}_\Gamma(G) = 0$. Temos que a função $g = G \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ é um caminho fechado. Como vimos no início da seção, existe uma função contínua $\tilde{g}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz

$$g(t) = e^{i\tilde{g}(t)}, \text{ para todo } t \in [0, 1].$$

Como

$$\text{ind}_\Gamma(G) = \frac{\tilde{g}(1) - \tilde{g}(0)}{2\pi}$$

e $\text{ind}_\Gamma(G) = 0$, temos que $\tilde{g}(1) = \tilde{g}(0)$. Segue daí que a função $\vartheta: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\vartheta(p) = \begin{cases} \tilde{g} \circ \gamma^{-1}(p), & \text{se } p \in \Gamma \setminus \{p^*\}, \\ \tilde{g}(0), & \text{se } p = p^*, \end{cases}$$

onde $p^* = \gamma(0)$ (lembrando que $\gamma(0) = \gamma(1)$), é contínua. Além disso, a função ϑ satisfaz

$$G(p) = e^{i\vartheta(p)}, \text{ para todo } p \in \Gamma.$$

Sejam $\tilde{\Omega}$ um aberto simplesmente conexo de $\mathbb{R}^2$, Γ uma curva fechada simples de classe C^1 em $\tilde{\Omega}$ e

$$L = A(x, y) \frac{\partial}{\partial x} + B(x, y) \frac{\partial}{\partial y}, \quad (2.13)$$

com $A, B \in C(\tilde{\Omega})$, um campo não singular C^1 -hipocomplexo em $\tilde{\Omega}$ com conjunto característico sendo uma subvariedade mergulhada de $\tilde{\Omega}$ de dimensão 1 e classe C^1 .

Pela Proposição 7 (página 37) existe uma integral primeira global $Z: \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ de L , de classe C^1 , tal que $Z: \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega})$ é um homeomorfismo. Temos que $\tilde{\Omega} \ni p \mapsto \det(DZ)(p)$ não muda de sinal em $\tilde{\Omega}$. (Essa afirmação segue de um argumento relacionado a orientação e também pode ser provada diretamente. Veja o Lema 2 no fim da seção). Além disso, pela Proposição 4 (página 33) podemos escrever L , dado em (2.13), como

$$L = \lambda H_Z = \lambda \left\{ \partial_y Z \frac{\partial}{\partial x} - \partial_x Z \frac{\partial}{\partial y} \right\} \text{ em } \tilde{\Omega},$$

onde $\lambda \in C(\tilde{\Omega})$ e $\lambda(p) \neq 0$ para todo $p \in \tilde{\Omega}$. Daí,

$$A = \lambda \partial_y Z \text{ e } B = -\lambda \partial_x Z.$$

Como

$$\det(DZ) = \begin{vmatrix} \partial_x \Re(Z) & \partial_y \Re(Z) \\ \partial_x \Im(Z) & \partial_y \Im(Z) \end{vmatrix} = \Im(\overline{\partial_x Z} \partial_y Z) \text{ em } \tilde{\Omega},$$

temos

$$\det(DZ) = \Im(\overline{\partial_x Z} \partial_y Z) = -\Im\left(\left(\frac{B}{\lambda}\right) \frac{A}{\lambda}\right) = -\frac{1}{|\lambda|^2} \Im(AB) \text{ em } \tilde{\Omega}. \quad (2.14)$$

Em particular, $\tilde{\Omega} \ni p \mapsto \Im(AB)(p)$ não muda de sinal em $\tilde{\Omega}$. Segue de (2.14) que Z preserva orientação quando o sinal de $\Im(AB)(p_0)$, $p_0 \in \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, é negativo e inverte orientação quando $\Im(AB)(p_0)$ é positivo.

Definição 9. Definimos por

$$\text{Ind}_{L,\Gamma}(G) = -\text{sgn}(\Im(AB)(p_0)) \text{ind}_{\Gamma}(G),$$

onde p_0 é um ponto qualquer de $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ e sgn denota a função sinal, isto é, $\text{sgn} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$, $\text{sgn}(x) = 1$ se $x > 0$ e $\text{sgn}(x) = -1$ se $x < 0$.

Segue da definição acima que $\text{Ind}_{L,\Gamma}(G)$ possui as mesmas propriedades do índice clássico listadas em (2.12), isto é,

$$\text{Ind}_{L,\Gamma}(G_1 G_2) = \text{Ind}_{L,\Gamma}(G_1) + \text{Ind}_{L,\Gamma}(G_2) \text{ e } \text{Ind}_{L,\Gamma}(1/G) = -\text{Ind}_{L,\Gamma}(G) = \text{Ind}_{L,\Gamma}(\overline{G}). \quad (2.15)$$

Seja $j : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicação de identificação, i.e., $j(z) = (\Re(z), \Im(z))$. Definimos $\tilde{Z} = j \circ Z$. Então $\tilde{Z}(\tilde{\Omega})$ é um aberto de $\mathbb{R}^2$ e $\tilde{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \tilde{Z}(\tilde{\Omega})$ é um homeomorfismo.

Seja Γ uma curva fechada simples de classe C^1 em $\tilde{\Omega}$ tal que $\tilde{Z}(\Gamma)$ é uma curva fechada simples de classe C^1 em $\tilde{Z}(\tilde{\Omega})$.

Seja $G \in C(\Gamma)$, com $|G(p)| = 1$ para todo $p \in \Gamma$. Temos que $\tilde{G} := G \circ \tilde{Z}^{-1} \in C(\tilde{Z}(\Gamma))$ e $|\tilde{G}(p)| = 1$ para todo $p \in \tilde{Z}(\Gamma)$.

Lema 1. Vale a seguinte igualdade:

$$\text{ind}_{\tilde{Z}(\Gamma)}(\tilde{G}) = \delta_{\tilde{Z}} \text{ind}_{\Gamma}(G).$$

Demonstração. Suponha que $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ é uma parametrização orientada positivamente de $\tilde{Z}(\Gamma)$. Seja $\delta = \delta_{\tilde{Z}}$. Assim,

$$(\tilde{Z}^{-1} \circ \gamma)^\delta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

é uma parametrização orientada positivamente de Γ . Então podemos escrever

$$\text{ind}(G) = n(G \circ ((\tilde{Z}^{-1} \circ \gamma)^\delta); 0).$$

Assim,

$$\delta \text{ind}(G) = \delta n(G \circ (\tilde{Z}^{-1} \circ \gamma)^\delta; 0) = n(G \circ ((\tilde{Z}^{-1} \circ \gamma)^{\delta^2}); 0)$$

$$= n((G \circ \tilde{Z}^{-1}) \circ \gamma; 0) = n(\tilde{G} \circ \gamma; 0) = \text{ind}(\tilde{G}).$$

□

Proposição 8. Seja $G \in C(\Gamma)$, com $|G(p)| = 1$ para todo $p \in \Gamma$. Vale a igualdade

$$\text{Ind}_{L,\Gamma}(G) = \text{ind}_{Z(\Gamma)}(\tilde{G}).$$

Demonstração. Sabemos que $\delta_{\tilde{Z}}$ é dado por $\text{sgn}(\det(D\tilde{Z})(p_0))$ para um $p_0 \in \tilde{\Omega}$ tal que $\det(D\tilde{Z})(p_0) \neq 0$ ou equivalentemente para $p_0 \in \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, onde $\text{sgn}(x) = 1$ se $x > 0$ e $\text{sgn}(x) = -1$ se $x < 0$. Por outro lado,

$$\delta_{\tilde{Z}} = \text{sgn}(\det(DZ(p_0))) = \text{sgn}(\det(D\tilde{Z}(p_0))) = -\text{sgn}(\Im(A\bar{B})(p_0)). \quad (2.16)$$

Pelo Lema 1 temos o resultado. □

Observação 17. Seja $h : Z(\tilde{\Omega}) \rightarrow \mathbb{C}$ uma função de classe C^1 , com $h : Z(\tilde{\Omega}) \rightarrow W$, $W = h(Z(\tilde{\Omega}))$, um homeomorfismo e $\det(Dh)(\zeta) > 0$ para todo $\zeta \in Z(\tilde{\Omega})$. Considere $\mathcal{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\mathcal{Z} = h \circ Z.$$

A proposição anterior vale quando trocamos Z por $\mathcal{Z}$. Note que $\mathcal{Z}$ tem a mesma orientação que Z .

O lema a seguir está relacionado com as condições (P) e (Q) descritas em (TREVES, 1971).

Lema 2. Seja L um campo C^1 -hipocomplexo definido no aberto conexo $\tilde{\Omega}$. Seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L , de classe C^1 , que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Então a função

$$\tilde{\Omega} \ni p \rightarrow \det(DZ)(p)$$

não muda de sinal em $\tilde{\Omega}$.

Demonstração. Basta mostrar que $f(x, y) = \det(DZ)(x, y)$, $(x, y) \in \tilde{\Omega}$, não muda de sinal uma vizinhança de cada ponto de conjunto característico Σ de L .

Seja $p_0 \in \Sigma$. Existem um difeomorfismo $F : U \rightarrow (-a, a)^2$, $a > 0$, de classe C^1 , onde U é uma vizinhança aberta de p , e um polinômio de grau 1, H , tal que

$$Z(x, y) = (H \circ Z_\phi \circ F)(x, y), \text{ para todo } (x, y) \in U, \quad (2.17)$$

onde

$$Z_\phi(s, t) = s + i\phi(s, t), \quad (s, t) \in (-a, a)^2,$$

com $\phi : (-a, a)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 .

Segue de (2.17) que

$$\det(DZ)(x, y) = \mu \det(DZ_\phi)(F(x, y)) \det(F)(x, y), \quad (x, y) \in U,$$

onde $\mu \in \mathbb{R}$ é uma constante diferente de zero. Como

$$\det(DZ_\phi)(s, t) = \phi_t(s, t), \quad (s, t) \in (-a, a)^2,$$

para estudar o sinal de f em U , basta estudar o sinal de ϕ_t em $(-a, a)^2$.

Como Z é injetiva, temos $Z_\phi : (-a, a)^2 \rightarrow \mathbb{C}$ injetiva. Assim, para cada $s \in (-a, a)$ fixado, a função

$$(-a, a) \ni t \mapsto \phi(s, t)$$

é injetiva. Então, para cada $s \in (-a, a)$ fixado, a função

$$(-a, a) \ni t \mapsto \phi_t(s, t)$$

não muda de sinal e não se anula em intervalos, *i.e.*, para cada $s \in (-a, a)$, o conjunto

$$\Gamma_s = \{t \in (-a, a) ; \phi_t(s, t) = 0\}$$

não possui intervalos abertos. Então, os conjuntos

$$A^+ = \{s \in (-a, a) ; \sup_t \phi_t(s, t) > 0\}$$

e

$$A^- = \{s \in (-a, a) ; \inf_t \phi_t(s, t) < 0\}$$

são conjuntos disjuntos e $K = (-a, a) \setminus (A^+ \cup A^-)$ é um conjunto fechado tal que $\phi_t = 0$ em $K \times (-a, a)$.

Note que K é o conjunto vazio. De fato, se $K \neq \emptyset$, então existe $s_0 \in K$ tal que

$$(-a, a) \ni t \rightarrow \phi_t(s_0, t)$$

é a função identicamente nula, ou seja, $\Gamma_{s_0} = (-a, a)$. Contradição.

Daí, concluímos que $(-a, a)^2$ é a união dos abertos disjuntos $A^+ \times (-a, a)$ e $A^- \times (-a, a)$. Como $(-a, a)^2$ é conexo, segue que $A^+ = \emptyset$ ou $A^- = \emptyset$. Sem perda de generalidade podemos supor que $A^- = \emptyset$. Assim, temos $A^+ = (-a, a)$, isto é, $(-a, a)^2 = A^+ \times (-a, a)$. Segue daí que

$$\phi_t \geq 0 \text{ em } (-a, a)^2.$$

Portanto f não muda de sinal em U e assim concluímos a demonstração. $\square$

2.5 Transversalidade de uma curva em relação a campo

Esta seção é inspirada em um lema de (MEZIANI, 2011).

Seja $L = A\partial_x + B\partial_y$ um campo vetorial definido em um aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$.

Definição 10. Seja Γ uma variedade mergulhada fechada de dimensão 1 em $\tilde{\Omega}$. Dizemos que Γ é transversal a L se

$$i^*\omega \neq 0, \quad (2.18)$$

onde $\omega = Bdx - Ady$ (é uma 1-forma ortogonal a $L = A\partial_x + B\partial_y$) e $i : \Gamma \rightarrow \tilde{\Omega}$ é a aplicação de inclusão.

Observação 18. A expressão (2.18) significa:

$$\omega(p, v) = B(p)v_1 - A(p)v_2 \neq 0$$

para todo $(p, v) \in T_p\Gamma$ com $(p, v) \neq (p, 0)$ e $v = (v_1, v_2)$.

Suponha que L é um campo hipocomplexo em $\tilde{\Omega}$ e $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma integral primeira global, de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 \leq \varepsilon < 1$, de L que é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Seja $j : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicação de identificação, i.e., $j(z) = (\Re(z), \Im(z))$. Definimos $\tilde{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ por $\tilde{Z} = Z \circ j$. Temos que $\tilde{Z}(\tilde{\Omega})$ é um aberto de $\mathbb{R}^2$ e $\tilde{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \tilde{Z}(\tilde{\Omega})$ é de classe $C^{1+\varepsilon}$ e um homeomorfismo.

Lema 3. Sejam $G \in C^\alpha(\Gamma)$, $0 < \alpha < 1$, e Γ uma variedade mergulhada fechada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, transversal a L . Então

1. $\tilde{Z}(\Gamma)$ é uma variedade mergulhada fechada de dimensão 1 de $\tilde{Z}(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{R}^2$ e de classe $C^{1+\varepsilon}$;
2. $\tilde{G} : \tilde{Z}(\Gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\tilde{G} = G \circ \tilde{Z}^{-1}$ é de classe C^α em $\tilde{Z}(\Gamma)$.

Demonstração. Seja $(p, v) \in T_p\Gamma$ com $(p, v) \neq (p, 0)$ e $v = (v_1, v_2)$. Temos

$$\omega(p, v) = B(p)v_1 - A(p)v_2 \neq 0. \quad (2.19)$$

Como $L = A\partial_x + B\partial_y$ em $\tilde{\Omega}$, pela Proposição 4 (página 33) podemos escrever

$$A = \lambda \partial_y Z \text{ e } B = -\lambda \partial_x Z,$$

com $\lambda \in C(\tilde{\Omega})$ e $|\lambda| > 0$ em $\tilde{\Omega}$. Assim, de (2.19) temos

$$\lambda(p) \{-\partial_x Z(p)v_1 - \partial_y Z(p)v_2\} \neq 0,$$

isto é,

$$\partial_x Z(p)v_1 + \partial_y Z(p)v_2 \neq 0.$$

Daí,

$$\Re(\partial_x Z(p)v_1 + \partial_y Z(p)v_2) \neq 0 \text{ ou } \Im(\partial_x Z(p)v_1 + \partial_y Z(p)v_2) \neq 0.$$

Ou seja,

$$\begin{bmatrix} \partial_x \Re(Z)(p) & \partial_y \Re(Z)(p) \\ \partial_x \Im(Z)(p) & \partial_y \Im(Z)(p) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \neq 0, \text{ para } (p, v) \in T_p \Gamma \text{ com } (p, v) \neq (p, 0).$$

Segue daí que

$$i^* \tilde{Z} := \tilde{Z} \circ i : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^2$$

é uma imersão, onde $i : \Gamma \rightarrow \tilde{\Omega}$ é a aplicação de inclusão. Como Z é um homeomorfismo temos que $i^* \tilde{Z}$ é um mergulho. Logo, $\tilde{Z}(\Gamma)$ é uma variedade mergulhada de $\tilde{Z}(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{R}^2$, o que prova o item 1. Além disso,

$$W := i^* \tilde{Z} = j \circ Z \circ i : \Gamma \rightarrow \tilde{Z}(\Gamma)$$

é um difeomorfismo. Daí, $W^{-1} : \tilde{Z}(\Gamma) \rightarrow \Gamma$ é uma aplicação de classe C^1 . Seja

$$M : \tilde{Z}(\Gamma) \rightarrow \mathbb{R}^2$$

dada por $M(q) = W^{-1}(q)$. Como $\tilde{Z}(\Gamma)$ é uma variedade mergulhada fechada de $\mathbb{R}^2$, pelo Teorema de Tietze diferenciável (veja (LIMA, 2007)) M possui uma extensão C^1 para todo o $\mathbb{R}^2$, isto é, existe

$$M_o : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

de classe C^1 tal que $M_o|_{\tilde{Z}(\Gamma)} = W^{-1}$. Como $\tilde{Z}(\Gamma)$ é compacta, a aplicação M_o é Lipschitz sobre $\tilde{Z}(\Gamma)$, isto é, segue que existe uma constante K tal

$$|M_o(q_1) - M_o(q_2)| \leq K|q_1 - q_2|, \quad q_1, q_2 \in \tilde{Z}(\Gamma).$$

Segue daí que,

$$|\tilde{Z}^{-1}(q_1) - \tilde{Z}^{-1}(q_2)| \leq K|q_1 - q_2|, \quad q_1, q_2 \in \tilde{Z}(\Gamma).$$

Fazendo o cálculo da condição de Hölder para $\tilde{G}$ temos

$$|\tilde{G}(q_1) - \tilde{G}(q_2)| \leq |G(\tilde{Z}^{-1}(q_1)) - G(\tilde{Z}^{-1}(q_2))| \leq C_G |\tilde{Z}^{-1}(q_1) - \tilde{Z}^{-1}(q_2)|^\alpha \leq C_G K^\alpha |q_1 - q_2|^\alpha,$$

para todos $q_1, q_2 \in \tilde{Z}(\Gamma)$. Portanto, $\tilde{G} \in C^\alpha(\tilde{Z}(\Gamma))$. Assim concluímos a demonstração do item 2. $\square$

A CLASSE DOS CAMPOS VETORIAIS EM ESTUDO

Neste capítulo vamos estabelecer a classe de campos vetoriais complexos que estudaremos neste texto.

3.1 Uma classe de campos hipocomplexos

No capítulo anterior vimos que campos hipocomplexos possuem boas propriedades, em especial a existência de integral primeira global. A seguir estabeleceremos uma classe de campos vetoriais hipocomplexos que será objeto de estudo desta tese. Um campo L definido no aberto $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$ pertence a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ se satisfaz as seguintes condições:

- (i) L é um campo não singular de classe C^ε , $0 < \varepsilon < 1$, em $\tilde{\Omega}$;
- (ii) O conjunto característico Σ de L é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, com um número finito de componentes conexas;
- (iii) L é de classe C^1 em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$;
- (iv) Para cada $p \in \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, existe uma integral primeira $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de L , de classe C^2 , com $U \subset \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ aberto e $p \in U$, tal que $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo;
- (v) Para cada $p \in \Sigma$, existem uma integral primeira $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de L , com $U \subset \tilde{\Omega}$ uma vizinhança aberta de p , tal que $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo que satisfaz $Z_{xy}, Z_{yx} \in C(U)$ e $Z_{xy} = Z_{yx}$ em U , e coordenadas locais (s, t) em U , de classe C^2 centradas em p , tal que nas novas variáveis a integral primeira Z se escreve como

$$Z_{\sigma, \beta}(s, t) = s + i \left(\frac{t|t|^\sigma}{\sigma + 1} + \beta(s) \right), \quad (3.1)$$

onde β é uma função a valores reais de classe $C^{2+\varepsilon}$ que depende apenas de s e $\sigma \geq \varepsilon$ é uma constante. Além disso, Z satisfaz a seguinte condição: se $L = A\partial_x + B\partial_y$ em $\tilde{\Omega}$, então a função $\lambda : U \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\lambda(x, y) = \begin{cases} \frac{A(x, y)}{Z_y(x, y)}, & \text{se } Z_y(x, y) \neq 0, \\ -\frac{B(x, y)}{Z_x(x, y)}, & \text{se } Z_x(x, y) \neq 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

é de classe C^1 em U .

Observação 19. Parte das condições do item (v) acima estão relacionadas com a regularidade do campo. Se L é C^2 -hipocomplexo (Definição 7, página 35) e o seu conjunto característico Σ é uma variedade mergulhada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, segue da Proposição 6 (página 36) que qualquer integral primeira de L , $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$, com $U \subset \tilde{\Omega}$ aberto, é de classe C^2 . Logo Z_{xy} , $Z_{yx} \in C(U)$ e $Z_{xy} = Z_{yx}$ em U (Teorema de Schwarz). Além disso, com essas hipóteses sobre L , a condição sobre λ (dada em (3.2)) ser de classe C^1 se verifica trivialmente. A função λ está relacionada com a Proposição 4 (página 33).

Para o número real $\sigma > 0$ considere o campo vetorial complexo

$$L_\sigma = \frac{\partial}{\partial y} - i|y|^\sigma \frac{\partial}{\partial x}$$

definido em $\mathbb{R}^2$. Temos que L_σ possui integral primeira global

$$Z_\sigma(x, y) = x + i \frac{y|y|^\sigma}{\sigma + 1}$$

que é um homeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ sobre $\mathbb{C}$. Assim o campo L_σ é um campo vetorial complexo $C^{1+\sigma}$ -hipocomplexo em $\mathbb{R}^2$. Observe, se $0 < \sigma < 1$ temos que Z_σ não é de classe C^2 e L_σ não é de classe C^1 . O campo vetorial L_σ pertence a classe $\mathcal{X}(\mathbb{R}^2)$. Na verdade, L_σ é mais que um exemplo, L_σ é o campo modelo da teoria desenvolvida nesta tese. (Veja a Proposição 11, página 53). O campo L_σ também será chamado de campo padrão ao decorrer dos capítulos a seguir. O campo L_σ faz parte de uma família de campos vetoriais complexos indexada a um parâmetro real $\sigma \geq 0$, com $L_0 = -2i\partial/\partial\bar{z}$, onde $\partial/\partial\bar{z}$ é o operador de Cauchy-Riemann. Em essência, o que demonstraremos nesta tese é que grande parte dos resultados clássicos de resolubilidade e problemas de contorno para L_0 (isto é, para $\partial/\partial\bar{z}$) se generalizam para os outros campos L_σ , $\sigma > 0$, da família.

A classe $\mathcal{X}$ engloba campos de baixa regularidade, isto é, campos que não são de classe C^∞ . Mesmo assim, é possível estudar equações diferenciais, envolvendo campos de $\mathcal{X}$,

no sentido das distribuições. A Proposição a seguir sustenta essa afirmação como veremos na Observação 20.

Antes da proposição, vamos ressaltar um fato importante. Temos que a classe $\mathcal{X}$ é composta por campos $C^{1+\varepsilon}$ -hipocomplexos. Seja L um campo definido em $\tilde{\Omega}$ e pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Pela Proposição 7 (página 37) o campo L possui uma integral primeira global $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem, isto é, $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo.

Proposição 9. Seja L um campo vetorial complexo definido em $\tilde{\Omega}$ pertencente à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Suponha que $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, é uma integral primeira global de L que é um homeomorfismo sobre a imagem. Então, Z satisfaz $Z_{xy}, Z_{yx} \in C(\tilde{\Omega})$ e $Z_{xy} = Z_{yx}$ em $\tilde{\Omega}$. Além disso, existe $\lambda_Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^1 , que não se anula em $\tilde{\Omega}$, tal que

$$L = \lambda_Z H_Z \text{ em } \tilde{\Omega},$$

onde $H_Z = Z_y \partial_x - Z_x \partial_y$ é o Hamiltoniano de Z .

Demonstração. Seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Pela Proposição 4 (página 33) existe $\lambda_Z \in C^\varepsilon(\tilde{\Omega})$ tal que vale a igualdade

$$L = \lambda_Z \{Z_y \partial_x - Z_x \partial_y\} = \lambda_Z H_Z \text{ em } \tilde{\Omega}. \quad (3.3)$$

Pela Proposição 6 (página 36) e pela condição (iv) temos que Z é de classe C^2 em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$. Em particular, $Z_{xy}, Z_{yx} \in C(\tilde{\Omega} \setminus \Sigma)$ e pelo Teorema de Schwarz $Z_{xy} = Z_{yx}$ em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$. Segue da expressão de L acima e da condição (iii) que λ_Z é de classe C^1 em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$.

Agora, seja $p \in \Sigma$. Pela condição (v), para $\delta > 0$ suficientemente pequeno, existem $F : U_\delta \rightarrow F(U_\delta) \subset \mathbb{R}^2$, com $U_\delta = B(p, \delta)$, um difeomorfismo de classe C^2 tal que $F(\Sigma \cap U_\delta) = (-a, a) \times \{0\}$, com $a > 0$, e

$$Z_{\sigma, \beta}(s, t) = s + i \left(\frac{t|t|^\sigma}{\sigma + 1} + \beta(s) \right) \text{ em } F(U_\delta),$$

com $\sigma > 0$ constante e β a valores reais de classe $C^{2+\varepsilon}$, tais que

$$Z^\bullet := Z_{\sigma, \beta} \circ F \text{ em } U_\delta,$$

é uma integral primeira de L que satisfaz

$$Z_{xy}^\bullet, Z_{yx}^\bullet \in C(U_\delta) \text{ e } Z_{xy}^\bullet = Z_{yx}^\bullet \text{ em } U_\delta.$$

Pela Proposição 6, existe um biholomorfismo $h : Z^\bullet(U_\delta) \rightarrow Z(U_\delta)$ tal que

$$Z = h \circ Z^\bullet \text{ em } U_\delta. \quad (3.4)$$

Assim, $Z_{xy}, Z_{yx} \in C(U_\delta)$ e $Z_{xy} = Z_{yx}$ em U_δ . Além disso, pela condição (v), existe $\lambda_{Z^\bullet} : U_\delta \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^1 tal que

$$L = \lambda_{Z^\bullet} H_{Z^\bullet} \text{ em } U_\delta. \quad (3.5)$$

Segue de (3.4) que

$$H_Z = h'(Z^\bullet) H_{Z^\bullet} \text{ em } U_\delta. \quad (3.6)$$

Logo, por (3.3), (3.5) e (3.6), vale a seguinte igualdade

$$\lambda_Z h'(Z^\bullet) H_{Z^\bullet} = \lambda_{Z^\bullet} H_{Z^\bullet} \text{ em } U_\delta.$$

Como $H_{Z^\bullet}$ é um campo vetorial não singular temos

$$\lambda_Z h'(Z^\bullet) = \lambda_{Z^\bullet} \text{ em } U_\delta.$$

Como as funções $h' \circ Z^\bullet$ e $\lambda_{Z^\bullet}$ são de classe C^1 em U_δ e $h' \circ Z^\bullet$ não se anula em U_δ da igualdade acima temos que λ_Z é de classe C^1 em U_δ . Pela arbitrariedade de $p \in \Sigma$ segue que λ_Z é de classe C^1 numa vizinhança de Σ em $\tilde{\Omega}$. Como λ_Z é de classe C^1 em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, como visto acima, temos que λ_Z é de classe C^1 em $\tilde{\Omega}$. Assim concluímos a demonstração. $\square$

Observação 20. Seja L um campo vetorial pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ e seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L de classe $C^{1+\varepsilon}$ em $\tilde{\Omega}$. Pela Proposição 9 podemos escrever

$$L = \lambda_Z H_Z \text{ em } \tilde{\Omega},$$

com $\lambda_Z \in C^1(\tilde{\Omega})$ e $|\lambda_Z| > 0$ em $\tilde{\Omega}$. Pela Observação 10 (página 33) temos que $Lu, H_Z u \in \mathcal{D}'_1(\tilde{\Omega})$ para $u \in \mathcal{D}'_0(\tilde{\Omega})$. Assim, podemos buscar soluções distribucionais em $\mathcal{D}'_0(\tilde{\Omega})$ para equações envolvendo L , por exemplo, a equação $Lu = f$ em $\tilde{\Omega}$, com $f \in L^p(\tilde{\Omega})$, $p > 1$. Além disso, se $\Omega \subset \tilde{\Omega}$ é um aberto limitado com $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$, estudar a equação,

$$Lu = f \text{ em } \Omega,$$

em $\mathcal{D}'_0(\Omega)$, com $f \in L^p(\Omega)$, $p > 1$, equivale, no sentido das distribuições, a estudar a equação

$$H_Z u = \frac{f}{\lambda_Z} \text{ em } \Omega.$$

Esta relação é um instrumento importante no estudo da equação $Lu = f$. Outro ponto a se observar é que a igualdade $Z_{xy} = Z_{yx}$ em $\tilde{\Omega}$ (Proposição 9) tem importância em varias partes deste texto, por exemplo na *representação de soluções* - veja a demonstração da Proposição 16, página 76 - e também no Teorema 5 (página 78) devido à seguinte relação entre H_Z e seu transposto ${}^t H_Z$:

$${}^t H_Z = -H_Z + \{Z_{yx} - Z_{xy}\} = -H_Z.$$

Proposição 10. Suponha que o campo vetorial $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ definido em $\tilde{\Omega}$ pertença à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. O expoente $\sigma > 0$ que aparece na condição (v) é intrínseco do campo L no seguinte sentido. Para cada componente conexa de Σ , existe um único $\sigma > 0$ para o qual vale (3.1).

Demonstração. Seja $p \in \Sigma$ e sejam $\mathcal{U}_j$, $j = 1, 2$, tais que $p \in \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ e vale a condição (v), isto é, a menos de uma mudança de coordenadas de classe C^2 em cada $\mathcal{U}_j$ temos que

$$Z_{\sigma_j, \beta_j}(s, t) = s + i \left(\frac{t|t|^{\sigma_j}}{\sigma_j + 1} + \beta_j(s) \right)$$

é uma integral primeira de L (com σ_j e β_j descritos na condição (v)). Então

$$\Im(A\bar{B})(x, y) = |\rho_j(x, y)|^{\sigma_j} g_j(x, y), \quad (x, y) \in \mathcal{U}_j, \quad (3.7)$$

com $\rho_j : \mathcal{U}_j \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 com $d\rho_j \neq 0$ em $\mathcal{U}_j$ e g_j de classe C^1 em $\mathcal{U}_j$ com $g_j \neq 0$ em $\mathcal{U}_j$.

Como o conjunto característico Σ é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 em $\tilde{\Omega}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, existe um difeomorfismo de classe $C^{1+\varepsilon}$

$$\Phi : (-\varepsilon, \varepsilon)^2 \rightarrow V,$$

onde $p \in V \subset \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$, tal que

$$\Phi((-\varepsilon, \varepsilon) \times \{0\}) = \Sigma \cap V \text{ e } \Phi(0, 0) = p.$$

Temos por (3.7) que

$$|\rho_1(x, y)|^{\sigma_1} g_1(x, y) = |\rho_2(x, y)|^{\sigma_2} g_2(x, y), \quad (x, y) \in V.$$

Daí,

$$|\vartheta_1(s, t)|^{\sigma_1} \varphi_1(s, t) = |\vartheta_2(s, t)|^{\sigma_2} \varphi_2(s, t), \quad (s, t) \in (-\varepsilon, \varepsilon)^2, \quad (3.8)$$

onde $\vartheta_j = (\rho_j \circ \Phi)$ e $\varphi_j = (g_j \circ \Phi)$, $j = 1, 2$. Temos que $d\vartheta_j \neq 0$ em $(-\varepsilon, \varepsilon)^2$ e $\vartheta_j(s, 0) = 0$ para $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Temos também que $\varphi_j \neq 0$ em $(-\varepsilon, \varepsilon)^2$.

Segue que $\partial_t \vartheta_j(s, 0) \neq 0$ para $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Assim, existe $0 < \varepsilon' \leq \varepsilon$, tal que

$$\partial_t \vartheta_j(s, t) \neq 0, \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2. \quad (3.9)$$

Por outro lado, podemos escrever

$$\vartheta_j(s, t) = t f_j(s, t), \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2, \quad (3.10)$$

onde

$$f_j(s, t) = \int_0^1 \partial_t \vartheta_j(s, t\eta) d\eta, \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2.$$

Por (3.9), segue que $f_j(s, t) \neq 0$ para todo $(s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2$. Por (3.8) e (3.10) temos

$$|tf_1(s, t)|^{\sigma_1} \varphi_1(s, t) = |tf_2(s, t)|^{\sigma_2} \varphi_2(s, t), \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2.$$

Assim temos a igualdade

$$|t|^{\sigma_1} \mu_1(s, t) = |t|^{\sigma_2} \mu_2(s, t), \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2.$$

com $\mu_j = |f_j|^{\sigma_j} \varphi_j$, $j = 1, 2$, em $(-\varepsilon, \varepsilon)^2$. Note que $\mu_j(s, t) \neq 0$, para todo $(s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2$. Daí,

$$\frac{|t|^{\sigma_1}}{|t|^{\sigma_2}} = \frac{\mu_2(s, t)}{\mu_1(s, t)} < \infty, \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2.$$

Segue que $\sigma_1 \geq \sigma_2$. Da mesma forma, temos

$$\frac{|t|^{\sigma_2}}{|t|^{\sigma_1}} = \frac{\mu_1(s, t)}{\mu_2(s, t)} < \infty, \quad (s, t) \in (-\varepsilon', \varepsilon')^2,$$

o que implica $\sigma_1 \leq \sigma_2$. Portanto, $\sigma_1 = \sigma_2$.

Segue daí que a cada componente conexa de Σ podemos associar um único número $\sigma > 0$ tal que vale (3.1), concluindo a demonstração desta proposição. $\square$

Observação 21. O expoente σ de (3.1) associado à componente conexa Σ' de Σ , é chamado de **tipo** de L em Σ' . A palavra **tipo** vem de “tipo finito k ” (k inteiro positivo). Falaremos mais sobre isso na Seção 3.3, página 56. Veja a definição de tipo finito na Seção 2.3.1, página 37.

Exemplo 5. Temos que os campos da classe $\mathcal{X}$ são $C^{1+\varepsilon}$ -hipocomplexos. Mas nem todo campo $C^{1+\varepsilon}$ -hipocomplexo pertence a classe $\mathcal{X}$.

O campo vetorial (de tipo infinito)

$$L = \frac{\partial}{\partial y} - i \frac{e^{-\frac{1}{|y|}}}{y^2} \frac{\partial}{\partial x},$$

é de classe C^∞ , com conjunto característico $\Sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y = 0\}$. Além disso, L é hipocomplexo com integral primeira global

$$Z(x, y) = x + i \frac{y}{|y|} e^{-\frac{1}{|y|}}.$$

No entanto, a condição (v) não é satisfeita, pois $e^{-\frac{1}{|y|}}$ decai mais rapidamente que $|y|^\sigma$ para qualquer $\sigma > 0$.

Vamos terminar essa seção com uma versão do teorema de representação de soluções para soluções contínuas da equação $Lu = 0$, para L pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$.

Teorema 2. Seja L um campo vetorial complexo, definido no aberto $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$, pertencente à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Seja $Z_U : U \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $C^{1+\varepsilon}$, uma integral primeira de L , que é um homeomorfismo sobre sua imagem, isto é, $Z_U : U \rightarrow Z_U(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo. Se $u \in C(U)$ é solução de $Lu = 0$ em U , então existe uma função holomorfa $h : Z_U(U) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $u = h \circ Z_U$ em U .

Demonstração. Considere a função contínua $h : Z_U(U) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$h = u \circ Z_U^{-1}.$$

Temos pela condição (iv) (página 47) e pela Proposição 6 (página 36) que Z_U é de classe C^2 em $U \setminus (U \cap \Sigma)$. Temos que L é elítico em $U \setminus (U \cap \Sigma)$ e pela condição (iii) (página 47) o campo L é de classe C^1 em $U \setminus (U \cap \Sigma)$. Segue da Proposição 5 (página 34) que h é holomorfa em $U \setminus (U \cap \Sigma)$. Como uma argumentação análoga a usada na demonstração da Proposição 6, usando o teorema da extensão de funções holomorfas (Teorema 23, página 132), podemos demonstrar que h é holomorfa. $\square$

No caso em que L é C^∞ -hipocomplexo o teorema de representação de soluções vale para soluções distribucionais do campo. Veja o Teorema 3 na página 57.

3.2 Normalização

A condição (v) estabelece, juntamente com o Teorema 2, a forma local das integrais primeiras do campo numa vizinhança de cada ponto do característico. Tal forma local é dada por (3.1), isto é,

$$Z_{\sigma,\beta}(s,t) = s + i \left(\frac{|t|^\sigma}{\sigma+1} + \beta(s) \right), \quad (3.11)$$

onde β é uma função de classe $C^{2+\varepsilon}$ a valores reais. A próxima proposição elimina β da forma local através de conjugação, deixando assim, a expressão da integral primeira determinada pelo tipo σ .

A seguinte proposição pode ser encontrada em (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2017).

Proposição 11. Seja L um campo vetorial complexo, definido no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$, pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Para cada $p \in \Sigma$, existe uma vizinhança aberta U de p tal que $U \setminus \Sigma$ consiste em duas componentes conexas U^+ e U^- e coordenadas locais (x^+, y^+) (respectivamente (x^-, y^-)) centradas em p tal que L é um múltiplo do seguinte campo vetorial em U^+ (respectivamente U^-):

$$L_\sigma = \frac{\partial}{\partial y^\pm} - i|y^\pm|^\sigma \frac{\partial}{\partial x^\pm}, \quad (3.12)$$

com a integral primeira

$$Z_\sigma(x^\pm, y^\pm) = x^\pm + i \frac{|y^\pm|^\sigma}{\sigma+1} \text{ em } U^\pm. \quad (3.13)$$

Demonstração. Seja $p \in \Sigma$ e seja Z uma integral primeira de L definida em uma vizinhança de p . Pela condição (v) (página 47) e pelo Teorema 2 podemos começar a normalização a partir de $Z_{\sigma,\beta}$, dada em (3.11), numa vizinhança da origem de $\mathbb{R}^2$, com $\beta(0) = 0$. Seja D_δ um disco, de raio δ suficientemente pequeno, centrado em $(0,0)$, de tal forma que D_δ esteja no domínio de definição de $Z_{\sigma,\beta}$, e tal que $\Sigma \subset \{(s,t) \in \mathbb{R}^2 ; t = 0\}$ divide D_δ em dois semidiscos

$$D_\delta^+ = \{(s,t) \in \mathbb{R}^2 ; t > 0\} \text{ e } D_\delta^- = \{(s,t) \in \mathbb{R}^2 ; t < 0\}.$$

Note que $Z_{\sigma,\beta}(D^+)$ e $Z_{\sigma,\beta}(D^-)$ são abertos simplesmente conexos de $\mathbb{C}$ que compartilham a curva $\gamma_\delta = \{s + i\beta(s) ; s \in (-\delta, \delta)\}$, de classe $C^{2+\varepsilon}$, em seu bordo. Seja $0 < \delta_1 < \delta$. Seja $V^\pm \subset Z_{\sigma,\beta}(D^\pm)$ aberto simplesmente conexo com bordo suave de classe $C^{2+\varepsilon}$ tal que γ_{δ_1} faz parte de seu bordo. Pelo Teorema da Aplicação de Riemann (veja o Teorema 21, página 131) podemos encontrar uma função holomorfa

$$H^\pm : V^\pm \longrightarrow H^\pm(V^\pm) \subset \mathbb{C}$$

que envia a curva de bordo γ_{δ_1} sobre o eixo real e $H^\pm$ se estende a um difeomorfismo de classe C^2 sobre $\partial V^\pm$. Em particular, $H^\pm$ está definida numa vizinhança de 0 em $\mathbb{C}$. Podemos supor que $H^\pm(0) = 0$ e $H^\pm(V^\pm) \subset \{\zeta \in \mathbb{C} ; \pm \Im(\zeta) > 0\}$. Assim a função

$$Z_{\sigma,\beta}^\pm = H^\pm \circ Z_{\sigma,\beta}$$

esta bem definida em D_{δ_2} , $0 < \delta_2 \leq \delta_1$, com regularidade C^1 e, além disso, $Z_{\sigma,\beta}^\pm$ é uma integral primeira de L em $D_{\delta_2}^\pm$. Mais ainda, $Z_{\sigma,\beta}^\pm$ satisfaz

$$\Im Z_{\sigma,\beta}^\pm(s, 0) = 0, \quad s \in (-\delta_2, \delta_2).$$

Segue daí que

$$\Im Z_{\sigma,\beta}^\pm(s, t) = t|t|^\sigma \psi^\pm(s, t),$$

para uma função $\psi^\pm$, de classe C^1 , com $\psi^\pm(0,0) > 0$. De fato, para $\zeta = \xi + i\eta$, temos

$$\begin{aligned} \Im(Z_{\sigma,\beta}^\pm)(s, t) &= \Im(Z_{\sigma,\beta}^\pm)(s, 0) + \int_0^1 \Im \left\{ \left(\partial_\zeta H^\pm - \partial_{\bar{\zeta}} H^\pm \right) \left(Z_{\sigma,\beta}(s, t\rho) \right) i|t\rho|^\sigma t \right\} d\rho \\ &= t|t|^\sigma \int_0^1 \partial_\eta \Im(H^\pm) \left(Z_{\sigma,\beta}(s, t\rho) \right) |\rho|^\sigma d\rho =: t|t|^\sigma \psi^\pm(s, t). \end{aligned} \quad (3.14)$$

Como $\pm \Im(Z_{\sigma,\beta}^\pm)(s, t) \geq 0$ para $(s, t) \in D_{\delta_2}^\pm$, segue da igualdade (3.14), que $\psi^\pm \geq 0$. Assim, basta verificar que $\psi^\pm(0,0) \neq 0$. Temos,

$$\psi^\pm(0,0) = \int_0^1 \partial_\eta \Im(H^\pm) \left(Z_{\sigma,\beta}(0,0) \right) |\rho|^\sigma d\rho = \frac{1}{\sigma+1} \partial_\eta \Im(H^\pm)(0).$$

Suponha por contradição que $\partial_\eta \Im(H^\pm)(0) = 0$. Temos assim que

$$\det(DH^\pm)(0) = -\partial_{\bar{\zeta}} \Im(H^\pm)(0) \partial_\eta \Re(H^\pm)(0). \quad (3.15)$$

Por outro lado, temos que

$$f(s) := \Im(H^\pm)(\gamma(s)) = 0, \quad \forall s \in (-\delta_2, \delta_2),$$

onde, lembrando, $\gamma(s) = s + i\beta(s)$, com $\gamma(0) = 0$. Daí, temos $f'(0) = 0$, ou seja,

$$\partial_\xi \Im(H^\pm)(\gamma(0)) + \partial_\eta \Im(H^\pm)(\gamma(0))\beta'(0) = 0.$$

Como $\partial_\eta \Im(H^\pm)(0) = 0$, temos $\partial_\xi \Im(H^\pm)(0) = 0$. Assim, em (3.15), temos

$$\det(DH^\pm)(0) = 0,$$

que é uma contradição, pois $H^\pm$ é um difeomorfismo numa vizinhança de 0. Portanto, $\partial_\eta \Im(H^\pm)(0) \neq 0$ e concluímos a verificação de que $\psi^\pm > 0$ em D_{δ_2} (reduzindo δ_2 se necessário). Assim, podemos escrever

$$\Im Z_{\sigma,\beta}^\pm(s,t) = \frac{t|t|^\sigma}{\sigma+1} \{\chi^\pm\}^{\sigma+1}(s,t),$$

em D_{δ_2} , onde $\chi^\pm := (\sigma+1)^{\frac{1}{\sigma+1}} \{\psi^\pm\}^{\frac{1}{\sigma+1}}$.

Com um argumento análogo ao usado acima, mostramos que $(x^\pm, y^\pm)$ dadas por

$$x^\pm = \Re Z_{\sigma,\beta}^\pm(s,t), \quad y^\pm = t\chi^\pm(s,t)$$

são coordenadas locais de classe C^1 em D_{δ_3} , para $0 < \delta_3 < \delta_2$. Nessas coordenadas $Z_{\sigma,\beta}$ tem o formato desejado.

Demonstramos que existe uma vizinhança U de p , $p \in \Sigma$, tal que $U \setminus \Sigma$ consiste em duas componentes conexas U^+ e U^- , isto é,

$$U = (U \cap \Sigma) \cup U^+ \cup U^-,$$

e existem difeomorfismos $F^\pm : \bar{U} \rightarrow [-\delta, \delta]^2$, $G^\pm : \overline{Z_\sigma((-\delta, \delta)^2)} \rightarrow \bar{V}^\pm$, onde $V^\pm$ é um aberto de $\mathbb{C}$, tais que podemos escrever

$$Z(x,y) = (G^\pm \circ Z_\sigma \circ F^\pm)(x,y), \quad \forall (x,y) \in U, \quad (3.16)$$

onde

$$Z_\sigma(s,t) = s + i \frac{t|t|^\sigma}{\sigma+1}, \quad (s,t) \in (-\delta, \delta)^2, \quad (3.17)$$

com $G^\pm|_{Z_\sigma((-\delta, \delta) \times I^\pm)} : Z_\sigma((-\delta, \delta) \times I^\pm) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa injetiva, onde $I^+ = (0, \delta)$ e $I^- = (-\delta, 0)$.

Usando (3.16) podemos relacionar o Hamiltoniano de Z e com o Hamiltoniano de Z_σ e obter o formato desejado do campo L em $(-\delta, \delta) \times I^\pm$, a menos de um múltiplo contínuo, através da mudança de coordenadas dada por $(F^\pm)^{-1}$. $\square$

A seguir temos corolários que exploram a conjugação local por difeomorfismos.

Corolário 1. (Corolário da demonstração da Proposição 11) Seja

$$Z_{\sigma,\beta}(s,t) = s + i\left(\frac{t|t|^\sigma}{\sigma+1} + \beta(s)\right), (s,t) \in V,$$

onde V é uma vizinhança de 0 em $\mathbb{R}^2$, $\sigma > 0$ é uma constante e β é uma função a valores reais de classe $C^{2+\varepsilon}$. Reduzindo V se necessário, existem um difeomorfismo de classe C^1 , $F : W \rightarrow V$, W vizinhança de $(0,0)$ em $\mathbb{R}^2$, e um difeomorfismo de classe C^1 , $G : Z_{\sigma,\beta}(V) \rightarrow G(Z_{\sigma,\beta}(V)) \subset \mathbb{C}$, tais que

$$Z_\sigma = G \circ Z_{\sigma,\beta} \circ F \text{ em } W,$$

onde

$$Z_\sigma(x,y) = x + i\frac{y|y|^\sigma}{\sigma+1} \text{ em } W. \quad (3.18)$$

□

O corolário abaixo também é consequência da demonstração da proposição acima e será usado para fazer estimativas do operador $T_Z f$ na seção 5.1.

Corolário 2. Seja L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Seja $p \in \Sigma$ e $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$, $U \subset \tilde{\Omega}$ aberto, uma integral primeira de classe $C^{1+\varepsilon}$ de L que é um homeomorfismo sobre a imagem, com $p \in U$. Reduzindo U se necessário, existem $\sigma > 0$ uma constante e difeomorfismos $F : \bar{U} \rightarrow [-\delta, \delta]^2$ e $G : \overline{Z_\sigma((-\delta, \delta)^2)} \rightarrow \bar{V}$, onde V é um aberto de $\mathbb{C}$, tais que podemos escrever

$$Z(x,y) = (G \circ Z_\sigma \circ F)(x,y), \forall (x,y) \in U,$$

onde

$$Z_\sigma(s,t) = s + i\frac{t|t|^\sigma}{\sigma+1}, (s,t) \in (-\delta, \delta)^2. \quad (3.19)$$

□

A constante $\sigma > 0$ é o tipo de campo L na componente conexa de Σ onde p foi tomado. Veja a Proposição 10, página 51, e a Observação 21, página 52.

Referente ao corolário acima, ressaltamos que Z_σ (dada em (3.19)) não é uma integral primeira de L em outras coordenadas, uma vez que G não é holomorfa em U .

3.3 Observações acerca do caso hipoelítico

Seja L um campo não singular suave definido em $\tilde{\Omega}$, isto é,

$$L = A\partial_x + B\partial_y \text{ em } \tilde{\Omega},$$

com $A, B \in C^\infty(\tilde{\Omega})$, $|A| + |B| > 0$ em $\tilde{\Omega}$.

Suponha que L é C^∞ -hipocomplexo, isto é, L possui um sistema completo de integrais primeiras de classe C^∞ que são homeomorfismos. Isto significa que para todo $p \in \tilde{\Omega}$ existe uma função de classe C^∞ , $Z : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{C}$, definida em um conjunto aberto $\mathcal{U} \subset \tilde{\Omega}$, $p \in \mathcal{U}$, tal que $dZ \neq 0$, $LZ = 0$, $Z : \mathcal{U} \rightarrow Z(\mathcal{U}) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo. (Veja a Definição 7).

Definição 11. Dizemos que L é hipoeolítico em $\tilde{\Omega}$ quando se verifica a seguinte condição para todo aberto não vazio $\mathcal{V}$ de $\tilde{\Omega}$: se $Lu = f \in C^\infty(\mathcal{V})$ onde $u \in \mathcal{D}'(\mathcal{V})$, então $u \in C^\infty(\mathcal{V})$.

Proposição 12. As seguintes afirmações são equivalentes:

- (1) L é hipoeolítico;
- (2) L é C^∞ -hipocomplexo.

Veja (BERGAMASCO; CORDARO; HOUNIE, 1988). Esta proposição é consequência do estudo das condições (P) e (Q) descritas em (TREVES, 1971).

Segue do teorema da *Fórmula de Aproximação de Baouendi-Treves* uma versão do Teorema 2, página 53, para L hipoeolítico:

Teorema 3. Seja L um campo hipoeolítico em $\tilde{\Omega}$. Seja $Z : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{C}$, integral primeira de L , de classe C^∞ , definida em um conjunto aberto $\mathcal{U} \subset \tilde{\Omega}$, tal que $Z : \mathcal{U} \rightarrow Z(\mathcal{U}) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo. Se $u \in \mathcal{D}'(\mathcal{U})$ é solução de $Lu = 0$ em $\mathcal{U}$, então existe uma função holomorfa $h : Z(\mathcal{U}) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $u = h \circ Z$ em $\mathcal{U}$.

Demonstração. Como dito acima, esse resultado segue do Teorema da *Fórmula de Aproximação de Baouendi-Treves*. Veja em (TREVES, 1992) e (BERHANU; CORDARO; HOUNIE, 2008). □

Como consequência, temos a versão da Proposição 7, página 37, para o caso hipoeolítico.

Proposição 13. Seja L um campo vetorial hipoeolítico não singular definido no aberto conexo $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$. Então L possui uma integral primeira global em $\tilde{\Omega}$ que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Mais precisamente, existe uma função

$$Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{C},$$

de classe C^∞ , tal que Z é um homeomorfismo, $LZ = 0$ e $dZ \neq 0$ em $\tilde{\Omega}$.

Demonstração. Veja (BERGAMASCO; CORDARO; HOUNIE, 1988). A demonstração é inteiramente análoga à da Proposição 7. Veja também (CAMPANA, 2013). □

Note que nesta seção, até neste momento, não colocamos restrições ao conjunto característico.

Agora, vamos analisar uma classe de campos hipoelíticos que está contida na classe $\mathcal{X}$ (definida na página 47).

Seja L um campo hipoeítico definido no aberto $\tilde{\Omega}$. Suponha que o conjunto característico de L , Σ , é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$ de classe C^∞ com um número finito de componentes conexas, $\Sigma_1, \dots, \Sigma_N$. Para $j \in \{1, \dots, N\}$, suponha que L tenha tipo finito k_j em todo $p \in \Sigma_j$. Isto é, L tem tipo uniforme k_j em Σ_j .

Seja $p \in \Sigma_j$. Seja Z uma integral primeira de L , de classe C^∞ , definida numa vizinhança de p e injetiva. Existem coordenadas locais, de modo que nessas coordenadas, Z está definida numa vizinhança da origem e se escreve como

$$Z(s, t) = s + i\phi(s, t),$$

onde ϕ é uma função a valores reais. A hipótese de tipo uniforme k_j implica que

$$\phi(s, t) = \left(t^{k_j+1} \psi(s, t) + \beta(s) \right),$$

onde ψ e β são funções suaves e $\psi(0, 0) \neq 0$ (veja em (BERHANU; CORDARO; HOUNIE, 2008)). Como se trata de uma análise local, podemos supor sem perda de generalidade, que ψ não muda de sinal. Considere as coordenadas locais

$$x = s \text{ e } y = ct(k_j + 1)^{\frac{1}{k_j+1}} |\psi(s, t)|^{\frac{1}{k_j+1}},$$

com $c = \text{sgn}(\psi)$ (sinal de ψ). Nas coordenadas (x, y) a integral primeira Z se escreve na forma

$$Z_{k_j, \beta}(x, y) = x + i \left(\frac{y^{k_j+1}}{k_j + 1} + \beta(x) \right).$$

Em particular, como $Z_{k_j, \beta}$ é injetiva, segue que k_j é par.

Concluimos assim a seguinte proposição:

Proposição 14. Seja L um campo hipoeítico não singular definido em um aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$, com seu conjunto característico Σ sendo uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 de classe C^∞ e com um número finito de componentes conexas. Se L tem tipo finito uniforme (o qual deve ser par) em cada componente conexa de Σ , então L pertence a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ (definida na página 47).

□

LEMAS TÉCNICOS

Neste capítulo vamos provar alguns lemas técnicos que iremos usar nos próximos capítulos.

Lema 4. Seja $0 < \delta < R$, $0 < \tau < 1$, $a \in \mathbb{R}$, e $q' > 2 - \tau$. Então, existe uma constante $M(\tau, q') > 0$ tal que

$$I = \int_0^{2\pi} \int_\delta^R \frac{dr d\theta}{|a + r \sin \theta|^{\tau} r^{q'-1}} \leq \frac{M(\tau, q')}{\delta^{q'+\tau-2}}.$$

Demonstração. Esta demonstração é uma adaptação da demonstração de um lema de (MEZIANI, 2005).

Para provar esse lema é suficiente considerar $a \geq 0$. De fato, suponha que $a \leq 0$. Então, se $\theta' = -\theta + 2\pi$, temos

$$I = \int_0^{2\pi} \int_\delta^R \frac{dr d\theta}{|a + r \sin \theta|^{\tau} r^{q'-1}} = \int_{2\pi}^0 \int_\delta^R \frac{-dr d\theta'}{|a - r \sin \theta'|^{\tau} r^{q'-1}} = \int_0^{2\pi} \int_\delta^R \frac{dr d\theta'}{|-a + r \sin \theta'|^{\tau} r^{q'-1}}.$$

A demonstração está dividida em três casos.

Caso 1: $a = 0$. Temos,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_\delta^R \frac{dr d\theta}{|r \sin \theta|^{\tau} r^{q'-1}} = \int_0^{2\pi} \int_\delta^R \frac{dr d\theta}{|\sin \theta|^{\tau} r^{q'+\tau-1}} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|\sin \theta|^{\tau}} \int_\delta^R \frac{dr}{r^{q'+\tau-1}} \\ &\leq C(\tau) \int_\delta^R \frac{dr}{r^{q'+\tau-1}} = \frac{C(\tau)}{2 - q' - \tau} \{R^{2-q'-\tau} - \delta^{2-q'-\tau}\} = \frac{C(\tau)}{q' + \tau - 2} \left\{ \left(\frac{1}{\delta}\right)^{q'+\tau-2} - \left(\frac{1}{R}\right)^{q'+\tau-2} \right\} \\ &\leq \frac{C(\tau)}{q' + \tau - 2} \left(\frac{1}{\delta}\right)^{q'+\tau-2}, \end{aligned}$$

onde

$$C(\tau) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|\sin \theta|^{\tau}} < \infty.$$

Caso 2: $0 < a < \delta$. Seja $\theta_1 \in (-\pi/2, 0)$ tal que $\sin \theta_1 = -a/r$. Então,

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\theta}{|a + r \sin \theta|^\tau} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{|\theta - \theta_1|^\tau}{r^\tau |\sin \theta - \sin \theta_1|^\tau} \frac{d\theta}{|\theta - \theta_1|^\tau} \leq \frac{A(\tau)}{r^\tau |\cos \theta_1|^\tau},$$

para uma constante positiva $A(\tau)$. De fato, basta notar que a função $g : [-\pi/2, 0] \times [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(\alpha_1, \alpha) = \cos(\alpha_1) \frac{|\alpha - \alpha_1|}{|\sin \alpha - \sin \alpha_1|}$$

é limitada. É possível obter uma desigualdade semelhante para integral sobre o intervalo $[\pi/2, 3\pi/2]$. O passo seguinte é substituir $|\cos \theta_1|$ por $r/\sqrt{r^2 - a^2}$, e obter

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|a + r \sin \theta|^\tau} \leq \frac{A(\tau)}{(r^2 - a^2)^{\frac{\tau}{2}}}.$$

Então

$$\begin{aligned} I &\leq A(\tau) \int_\delta^R \frac{dr}{(r^2 - a^2)^{\frac{\tau}{2}} r^{q'-1}} \leq A(\tau) \int_\delta^R \frac{dr}{(r^2 - \delta^2)^{\frac{\tau}{2}} r^{q'-1}} \\ &\leq A(\tau) \delta^{2-q'-\tau} \int_1^{\frac{R}{\delta}} \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q'-1}} \leq A(\tau) \delta^{2-q'-\tau} \int_1^\infty \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q'-1}} =: A(\tau) \delta^{2-q'-\tau} H. \end{aligned}$$

Podemos escrever

$$H = \int_1^2 \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q'-1}} + \int_2^\infty \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q'-1}} =: H_1 + H_2.$$

Temos

$$H_1 = \int_1^2 \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q'-1}} \leq \int_1^2 \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}}} \leq \frac{1}{1 - \tau}.$$

Para H_2 temos

$$H_2 = \int_2^\infty \frac{d\rho}{(\rho^2 - 1)^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q'-1}} \leq \int_2^\infty \frac{d\rho}{(\rho - 1)^{\tau+q'-1}} = \frac{1}{q' + \tau - 2}.$$

Portanto, existe uma constante $M(q', \tau) > 0$ tal que $I \leq M(q', \tau) \delta^{2-q'-\tau}$.

Caso 3: $\delta \leq a$. Temos

$$I \leq \int_\delta^a \int_0^{2\pi} \frac{d\theta dr}{|a + r \sin \theta|^\tau r^{q'-1}} + \int_a^\infty \int_0^{2\pi} \frac{d\theta dr}{|a + r \sin \theta|^\tau r^{q'-1}} =: I_1 + I_2.$$

A estimativa da integral I_2 segue do caso anterior.

Assim, resta estimar I_1 .

Note que, para $\delta \leq r \leq a$ temos $|a + r \sin \theta| \geq a - r$. Então,

$$I_1 \leq \int_\delta^a \int_0^{2\pi} \frac{d\theta dr}{(a - r)^\tau r^{q'-1}} = 2\pi \int_\delta^a \frac{dr}{(a - r)^\tau r^{q'-1}} =: 2\pi J.$$

Seja $u = a - r$. Então,

$$J = \int_0^{a-\delta} \frac{du}{u^\tau (a - u)^{q'-1}}.$$

Note que $a = \delta$ implica $J = 0$. Assim, podemos supor $a > \delta$. Vamos dividir o estudo da estimativa para J em casos.

Caso 3.1: $q' - 1 < 1$.

$$J = a^{2-q'-\tau} \int_0^{\frac{a-\delta}{a}} \frac{d\rho}{\rho^\tau(1-\rho)^{q'-1}} \leq \delta^{2-q'-\tau} \int_0^{\frac{a-\delta}{a}} \frac{d\rho}{\rho^\tau(1-\rho)^{q'-1}} \leq \delta^{2-q'-\tau} \int_0^1 \frac{d\rho}{\rho^\tau(1-\rho)^{q'-1}}.$$

Como $0 < \tau < 1$ e $0 < q' - 1 < 1$, temos

$$C(q', \tau) = \int_0^1 \frac{d\rho}{\rho^\tau(1-\rho)^{q'-1}} < \infty.$$

Portanto $J \leq C(q', \tau) \delta^{2-q'-\tau}$.

Case 3.2: $q' - 1 > 1$

Temos $q' - 2 > 0$. Então,

$$J = \int_0^{a-\delta} \frac{du}{u^\tau(a-u)^{q'-2}(a-u)} \leq \frac{1}{\delta^{q'-2}} \int_0^{a-\delta} \frac{du}{u^\tau(a-u)}.$$

Observe que

$$\int_0^{a-\delta} \frac{du}{u^\tau(a-u)} = \frac{1}{(a-\delta)^\tau} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j+1-\tau} \left(\frac{a-\delta}{a}\right)^{j+1} =: \frac{1}{(a-\delta)^\tau} S.$$

Note que,

$$\frac{1}{j+1-\tau} \leq \frac{2}{j+1}, \quad \forall j \geq 1 \text{ e } \frac{1}{1-\tau} \leq 2 \Leftrightarrow \tau \leq \frac{1}{2}.$$

Se $\tau \leq \frac{1}{2}$, então

$$S \leq 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j+1} \left(\frac{a-\delta}{a}\right)^{j+1}.$$

Se $\tau \geq \frac{1}{2}$, então $K(\tau) := \frac{1}{1-\tau} - 2 \geq 0$, e podemos escrever

$$\begin{aligned} S &\leq \frac{1}{1-\tau} \left(\frac{a-\delta}{a}\right) + 2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j+1} \left(\frac{a-\delta}{a}\right)^{j+1} \\ &= \frac{1}{1-\tau} \left(\frac{a-\delta}{a}\right) - 2 \left(\frac{a-\delta}{a}\right) + 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j+1} \left(\frac{a-\delta}{a}\right)^{j+1} \\ &= K(\tau) \left(\frac{a-\delta}{a}\right) + 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j+1} \left(\frac{a-\delta}{a}\right)^{j+1}. \end{aligned}$$

Observe que, $\delta < a$ implica

$$\frac{1}{(a-\delta)^\tau} \left(\frac{a-\delta}{a}\right) = \frac{(a-\delta)^{1-\tau}}{a} \leq \frac{a^{1-\tau}}{a} = \frac{1}{a^\tau} \leq \frac{1}{\delta^\tau}.$$

Portanto, para $0 < \tau < 1$, temos

$$\frac{1}{(a-\delta)^\tau} S \leq |K(\tau)| \frac{1}{\delta^\tau} + \frac{2}{(a-\delta)^\tau} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j+1} \left(\frac{a-\delta}{a}\right)^{j+1}.$$

Agora note que,

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j+1} \left(\frac{a-\delta}{a} \right)^{j+1} = -\ln \left(1 - \frac{a-\delta}{a} \right) = -\ln \left(\frac{\delta}{a} \right) = \ln a - \ln \delta.$$

Como $a > \delta$ podemos escrever $a = \delta(1+y)$ para um $y > 0$. Então,

$$\frac{\ln a - \ln \delta}{(a-\delta)^\tau} = \frac{1}{\delta^\tau} \frac{\ln(1+y)}{y^\tau} \leq \frac{1}{\delta^\tau} B(\tau),$$

onde

$$B(\tau) := \sup_{y>0} \frac{\ln(1+y)}{y^\tau} < \infty \text{ (pois } 0 < \tau < 1 \text{)}.$$

Portanto,

$$J = \frac{1}{\delta^{q'-2}} \frac{1}{(a-\delta)^\tau} S \leq \frac{1}{\delta^{q'-2}} \left\{ |K(\tau)| \frac{1}{\delta^\tau} + 2 \frac{1}{\delta^\tau} B(\tau) \right\} = \frac{C(\tau)}{\delta^{q'+\tau-2}},$$

onde $C(\tau) = |K(\tau)| + 2B(\tau)$. Assim,

$$I_1 \leq \frac{2\pi C(\tau)}{\delta^{q'+\tau-2}}.$$

Assim a demonstração do lema esta completa. □

Como um caso particular do lema anterior temos o seguinte lema:

Lema 5 ((MEZIANI, 2005), Lema 3.1). Seja $0 < \delta < R$, $0 < \tau < 1$, $m > 0$, e $0 \leq \gamma < R$. Então, existe uma constante $C(\tau) > 0$ tal que

$$\int_{\delta}^R \int_0^{2\pi} \frac{d\theta dr}{|\gamma + r \sin \theta|^{\tau} r^{m+1}} \leq \frac{C(\tau)}{\delta^{m+\tau}}.$$

□

O próximo lema pode ser encontrado em (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2017).

Lema 6. Seja $R > 0$, $0 < \tau < 1$, $\gamma \in \mathbb{R}$, e $1 < q < 2 - \tau$. Então, existe uma constante $M(q, \tau) > 0$ tal que

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{dr d\theta}{|\gamma + r \sin \theta|^{\tau} r^{q-1}} \leq M(q, \tau) R^{2-\tau-q}.$$

Demonstração. Para provar este lema é suficiente considerar $\gamma \geq 0$.

Se $\gamma = 0$, então

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{dr d\theta}{|r \sin \theta|^{\tau} r^{q-1}} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|\sin \theta|^{\tau}} \int_0^R \frac{dr}{r^{\tau+q-1}} = C(\tau) \frac{R^{2-\tau-q}}{2-\tau-q},$$

onde

$$C(\tau) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|\sin \theta|^{\tau}} < \infty.$$

Agora, suponha $\gamma > 0$. Seja $r = \rho\gamma$. Temos

$$I = \gamma^{2-\tau-q} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} \doteq \gamma^{2-\tau-q} J. \quad (4.1)$$

Para estimar J , vamos considerar dois casos: $0 < \gamma < R$ e $\gamma \geq R$.

Assuma que $0 < \gamma < R$. Podemos escrever

$$J = \int_0^{\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} + \int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} \doteq J_1 + J_2.$$

Para $\theta \in [0, \pi]$ temos $\sin \theta \geq 0$; consequentemente, $\rho \sin \theta + 1 \geq \rho \sin \theta$ para $\rho \in [0, R/\gamma]$. Assim,

$$J_1 \leq \int_0^{\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta|^{\tau} \rho^{q-1}} \leq \frac{C(\tau)}{2-\tau-q} \left(\frac{R}{\gamma}\right)^{2-\tau-q}.$$

Agora, iremos estimar J_2 . Seja $\pi < \theta_0 < 3\pi/2$ tal que $-\sin \theta_0 = \gamma/2R$. Podemos escrever

$$\begin{aligned} J_2 &= \int_{\pi}^{\theta_0} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} + \int_{\theta_0}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} \\ &\quad + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{3\pi-\theta_0} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} + \int_{3\pi-\theta_0}^{2\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} \\ &\doteq J_{2,1} + J_{2,2} + J_{2,3} + J_{2,4}. \end{aligned}$$

Seja $\varphi = -\theta + 3\pi$. Temos

$$J_{2,3} = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{3\pi-\theta_0} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} = \int_{\theta_0}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\varphi}{|\rho \sin \varphi + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} = J_{2,2}.$$

Também,

$$J_{2,4} = \int_{3\pi-\theta_0}^{2\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} = \int_{\pi}^{\theta_0} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\varphi}{|\rho \sin \varphi + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} = J_{2,1}.$$

Para estimar $J_{2,1}$. Note que

$$0 \leq -\sin \theta \leq \frac{\gamma}{2R} < \frac{1}{2}, \quad \text{para } \theta \in [\pi, \theta_0];$$

consequentemente, para $\theta \in [\pi, \theta_0]$ e $0 < \rho < R/\gamma$, temos

$$\rho |\sin \theta| < \frac{1}{2} < 1 + \rho \sin \theta.$$

Assim,

$$J_{2,1} \leq \int_{\pi}^{\theta_0} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{\rho^{\tau} |\sin \theta|^{\tau} \rho^{q-1}} \leq \frac{C(\tau)}{4(2-\tau-q)} \left(\frac{R}{\gamma}\right)^{2-\tau-q}.$$

Para estimar $J_{2,2}$, considere $\varphi = \theta$ e $t = \rho \sin \theta + 1$. Temos

$$\begin{aligned} J_{2,2} &= \int_{\theta_0}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} = \int_{\theta_0}^{\frac{3\pi}{2}} \int_1^{\frac{R}{\gamma} \sin \varphi + 1} \frac{1}{\sin \varphi} \frac{dt d\varphi}{|t|^{\tau} \left(\frac{t-1}{\sin \varphi}\right)^{q-1}} \\ &= \int_{\theta_0}^{\frac{3\pi}{2}} |\sin \varphi|^{q-2} \left(\int_{\frac{R}{\gamma} \sin \varphi + 1}^1 \frac{dt}{|t|^{\tau} |t-1|^{q-1}} \right) d\varphi \\ &\leq \int_{\theta_0}^{\frac{3\pi}{2}} |\sin \varphi|^{q-2} \left(\int_{-\frac{R}{\gamma}}^1 \frac{dt}{|t|^{\tau} |t-1|^{q-1}} \right) d\varphi \leq C(q, \tau) \left(\frac{R}{\gamma} \right)^{2-\tau-q}, \end{aligned}$$

para uma constante $C(q, \tau) > 0$.

Assim, pelos cálculos acima, podemos encontrar uma constante $C_1(q, \tau) > 0$ tal que

$$J \leq C_1(q, \tau) \left(\frac{R}{\gamma} \right)^{2-\tau-q}. \quad (4.2)$$

Agora, assumamos que $\gamma \geq R$. Neste caso, existe uma constante $C(q, \tau) > 0$ tal que

$$J = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|\rho \sin \theta + 1|^{\tau} \rho^{q-1}} \leq \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{R}{\gamma}} \frac{d\rho d\theta}{|1 - \rho|^{\tau} \rho^{q-1}} \leq C(q, \tau) \left(\frac{R}{\gamma} \right)^{2-\tau-q} \quad (4.3)$$

Finalmente, pelas estimativas (4.1), (4.2) e (4.3) existe uma constante $M(q, \tau) > 0$ tal que

$$I \leq M(q, \tau) R^{2-\tau-q}.$$

□

O próximo lema pode ser encontrado em (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2017).

Lema 7. Seja $R > 0$, $\gamma \geq 0$, $0 < \tau < 1$, $1 \leq q < 2 - \tau$, e $0 \leq \varphi \leq \pi$. Então, existe uma constante $C(q, \tau) > 0$ tal que

$$H = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau} r^q |re^{i\theta} - 1|^q} \leq C(q, \tau). \quad (4.4)$$

Demonstração. Vamos dividir a prova em dois casos: $\gamma = 0$ e $\gamma > 0$.

Caso 1: $\gamma = 0$. Neste caso podemos escrever

$$H = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} r^{q+\tau-1} |re^{i\theta} - 1|^q} = H_1 + H_2 + H_3,$$

com

$$\begin{aligned} H_1 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} r^{q+\tau-1} |re^{i\theta} - 1|^q}, \\ H_2 &= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} r^{q+\tau-1} |re^{i\theta} - 1|^q}, \\ H_3 &= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{3}{2}}^R \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} r^{q+\tau-1} |re^{i\theta} - 1|^q}. \end{aligned}$$

Para $0 < r < \frac{1}{2}$ temos $|re^{i\theta} - 1| \geq \frac{1}{2}$. Assim, podemos encontrar uma constante $C_1(q, \tau) > 0$ tal que

$$H_1 \leq 2^q \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} r^{q+\tau-1}} \leq C_1(q, \tau).$$

Para $\frac{1}{2} < r < \frac{3}{2}$ temos $\left(\frac{2}{3}\right)^{\tau+q} < \frac{1}{r^{\tau+q}} < 2^{\tau+q}$, e daí,

$$\begin{aligned} H_2 &\leq 2^{\tau+q} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} |re^{i\theta} - 1|^q} \\ &= 2^{\tau+q} \sum_{j=1}^4 \int_{\frac{(j-1)\pi}{2}}^{\frac{j\pi}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} |re^{i\theta} - 1|^q} \doteq 2^{\tau+q} \sum_{j=1}^4 H_{2,j}. \end{aligned}$$

Seja $0 < \theta_0 < \pi/2$ tal que

$$1 - \frac{\theta^2}{2} < \cos \theta < 1 - \frac{\theta^2}{4}, \quad \text{para } 0 < \theta < \theta_0.$$

Então

$$H_{2,1} = \int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} |re^{i\theta} - 1|^q} + \int_{\theta_0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} |re^{i\theta} - 1|^q} = H_{2,1}^1 + H_{2,1}^2.$$

Para $0 < \theta < \theta_0$ e $1/2 \leq r \leq 3/2$ temos

$$\frac{(r-1)^2 + \theta^2}{4} \leq (r-1)^2 + \frac{\theta^2}{4} \leq (r-1)^2 + r \frac{\theta^2}{2} \leq |re^{i\theta} - 1|^2$$

e, consequentemente,

$$\frac{1}{|re^{i\theta} - 1|^2} \leq \frac{4}{(r-1)^2 + \theta^2}.$$

Assim,

$$H_{2,1}^1 \leq 2^q \int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^{\tau} [(r-1)^2 + \theta^2]^{\frac{q}{2}}} \doteq 2^q J.$$

Suponha que $0 \leq \varphi \leq \pi/2$. Então, $0 < \theta + \varphi < \pi/2 + \theta_0 < \pi$ e $|\sin(\theta + \varphi)| \geq C|\theta + \varphi|$, para uma constante $C > 0$. Assim,

$$\begin{aligned} C^{\tau} J &\leq \int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\theta + \varphi|^{\tau} [(r-1)^2 + \theta^2]^{\frac{q}{2}}} \leq \int_{D((0,1);1)} \frac{dr d\theta}{|\theta + \varphi|^{\tau} [(r-1)^2 + \theta^2]^{\frac{q}{2}}} \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{dp dt}{|\varphi + \rho \sin t|^{\tau} \rho^{q-1}} \leq M(q, \tau), \end{aligned}$$

onde a última desigualdade foi obtida pelo lema 6 (página 62).

Uma estimativa similar pode ser obtida no caso $\pi/2 < \varphi \leq \pi$. Portanto,

$$\int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q} \leq \frac{2^q M(q, \tau)}{C^\tau}. \quad (4.5)$$

Para $\theta_0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ temos

$$|re^{i\theta} - 1|^2 \geq 1 - \cos \theta \geq 1 - \cos \theta_0$$

e

$$\begin{aligned} H_{2,1}^1 &= \int_{\theta_0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q} \\ &\leq \frac{1}{(1 - \cos \theta_0)^{\frac{q}{2}}} \int_{\theta_0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^\tau} \leq \frac{C_1(\tau)}{(1 - \cos \theta_0)^{\frac{q}{2}}}, \end{aligned} \quad (4.6)$$

para uma constante $C_1(\tau) > 0$. Segue de (4.5) e (4.6), que

$$H_{2,1} \leq \frac{2^q M(q, \tau)}{C^\tau} + \frac{C_1(\tau)}{(1 - \cos \theta_0)^{\frac{q}{2}}}. \quad (4.7)$$

Para estimar $H_{2,2}$, vamos começar usando a mudança de variáveis $\theta = \alpha + \pi$ na integral para obter

$$H_{2,2} = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\alpha}{|\sin(\alpha + \varphi)|^\tau |re^{i\alpha} + 1|^q}.$$

Note que $|re^{i\alpha} + 1| \geq r \cos \alpha + 1 \geq 1$, para $3\pi/2 \leq \alpha \leq 2\pi$; assim,

$$H_{2,2} \leq \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \frac{d\alpha}{|\sin(\alpha + \varphi)|^\tau} = C_2(\tau) < \infty. \quad (4.8)$$

Uma estimativa similar pode ser obtida para $H_{2,3}$ e $H_{2,4}$. Portanto, podemos encontrar uma constante $C_2(q, \tau) > 0$ tal que $H_2 \leq C_2(q, \tau)$.

A estimativa de H_3 é obtida da seguinte forma: como $r > 3/2$, então $|re^{i\theta} - 1| \geq |r - 1| = r - 1 \geq r/3$ e

$$\begin{aligned} H_3 &\leq 3^q \int_0^{2\pi} \int_{\frac{3}{2}}^R \frac{dr d\theta}{|\sin(\theta + \varphi)|^\tau r^{2q+\tau-1}} \\ &\leq 3^q C_3(\tau) \int_{\frac{3}{2}}^R \frac{dr}{r^{2q+\tau-1}} \leq \frac{3^q C_3(\tau)}{2q + \tau - 2} \left(\frac{2}{3}\right)^{2q+\tau-2}, \end{aligned}$$

onde $C_3(\tau)$ é uma constante positiva. Assim, completamos a prova de (4.4) no caso $\gamma = 0$.

Caso 2: $\gamma > 0$. Neste caso, H (dado por (4.4)) pode ser reescrito da forma $H = H_1 + H_2$, onde

$$\begin{aligned} H_1 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\gamma \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^\tau r^q |re^{i\theta} - 1|^q}, \\ H_2 &= \int_0^{2\pi} \int_\gamma^R \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^\tau r^q |re^{i\theta} - 1|^q}. \end{aligned}$$

Para estimar H_1 , consideramos três casos que dependem dos valores de γ .

Primeiro caso: $0 < \gamma < \frac{1}{2}$. Neste caso, como $0 < r < 1/2$, temos $|re^{i\theta} - 1| \geq 1 - r \geq 1/2$. Assim, pelo Lema 6 (página 62),

$$H_1 \leq 2^q \int_0^{2\pi} \int_0^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q - 1}} \leq 2^q M(q, \tau).$$

Segundo caso: $\frac{1}{2} < \gamma < \frac{3}{2}$. Neste caso escrevemos $H_1 = H_{1,1} + H_{1,2}$, onde

$$H_{1,1} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q} |re^{i\theta} - 1|^q},$$

$$H_{1,2} = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q} |re^{i\theta} - 1|^q}.$$

Note que a estimativa de $H_{1,1}$ é dada pelo caso anterior.

Para $H_{1,2}$ temos

$$H_{1,2} \leq 2^{q-1} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q}$$

$$= 2^{q-1} \sum_{j=1}^4 \int_{\frac{(j-1)\pi}{2}}^{\frac{j\pi}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q} = 2^{q-1} \sum_{j=1}^4 H_{1,2}^j.$$

Para estimar $H_{1,2}^1$ escrevemos

$$H_{1,2}^1 = \int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q} + \int_{\theta_0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q},$$

com $0 < \theta_0 < \pi/2$ tal que $1 - \theta^2/2 < \cos \theta < 1 - \theta^2/4$ para $0 < \theta < \theta_0$. Note que essa escolha de θ_0 implica que $|re^{i\theta} - 1| > 1 - \cos \theta_0$ para $\theta \geq \theta_0$. Assim,

$$H_{1,2}^1 \leq 2^q \int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau ((r-1)^2 + \theta^2)^{\frac{q}{2}}} + \frac{\frac{\pi}{2} - \theta_0}{(1 - \cos \theta_0)^{\frac{q}{2}}} \frac{1}{1 - \tau}.$$

Agora, pelo uso das coordenadas polares $r = 1 + \rho \sin \phi$, $\theta = \rho \cos \phi$ na integral, e usando o Lema 6 (página 62), obtemos

$$\int_0^{\theta_0} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau ((r-1)^2 + \theta^2)^{\frac{q}{2}}} \leq \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{d\phi d\rho}{|\gamma - 1 - \rho \sin \phi|^\tau \rho^{q-1}} \leq M(q, \tau).$$

Assim, podemos encontrar uma constante $C_1(q, \tau) > 0$ tal que $H_{1,2}^1 \leq C_1(q, \tau)$. Procedendo como acima, podemos encontrar uma constante $C_2(q, \tau) > 0$ tal que $H_{1,2}^4 \leq C_2(q, \tau)$.

Para $H_{1,2}^2$, temos

$$H_{1,2}^2 = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau |re^{i\theta} + 1|^q} \leq \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^\gamma \frac{dr d\theta}{|\gamma - r|^\tau} \leq \frac{\pi}{2(1 - \tau)},$$

uma vez que $|re^{i\theta} + 1| \geq 1$ para $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$. Uma estimativa análoga pode ser usada para mostrar que $H_{1,2}^3 \leq \frac{\pi}{2(1-\tau)}$. Portanto, podemos encontrar uma constante $C_3(q, \tau) > 0$ tal que $H_1 \leq C_3(q, \tau)$.

Terceiro caso: $\gamma > \frac{3}{2}$. Neste caso, escrevemos $H_1 = H_{1,1} + H_{1,2}$, onde

$$H_{1,1} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{rdrd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^q} |re^{i\theta} - 1|^q},$$

$$H_{1,2} = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{3}{2}}^{\gamma} \frac{rdrd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^q} |re^{i\theta} - 1|^q}.$$

A estimativa para $H_{1,1}$ segue do caso anterior.

Para $H_{1,2}$, note que, como $r \geq 3/2$ temos $|re^{i\theta} - 1| \geq r/2$ e

$$H_{1,2} \leq 2^q \int_0^{2\pi} \int_{\frac{3}{2}}^{\gamma} \frac{drd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^{2q-1}}} = C(q, \tau) < \infty.$$

Agora vamos estimar H_2 . Lembre-se que

$$H_2 = \int_0^{2\pi} \int_{\gamma}^R \frac{rdrd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^q} |re^{i\theta} - 1|^q}.$$

Como feito para H_1 , vamos considerar três casos:

Primeiro caso: $\frac{3}{2} < \gamma < R$. Como $r > \frac{3}{2}$ implica $|re^{i\theta} - 1| \geq \frac{r}{3}$, temos

$$H_2 \leq 3^q \int_0^{2\pi} \int_{\gamma}^R \frac{drd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^{2q-1}}} = 3^q \int_0^{2\pi} \int_{\gamma}^R \frac{drd\theta}{|\gamma + r\sin \theta|^{\tau r^{2q-1}}}.$$

Assim, a estimativa para H_2 segue do Lema 5 (página 62).

Segundo caso: $\frac{1}{2} < \gamma < \frac{3}{2}$. Neste caso vamos escrever $H_2 = H_{2,1} + H_{2,2}$, onde

$$H_{2,1} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{rdrd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^q} |re^{i\theta} - 1|^q} = H_{2,1}^1 + H_{2,1}^2,$$

$$H_{2,2} = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{3}{2}}^R \frac{rdrd\theta}{|\gamma + r\sin(\theta + \varphi)|^{\tau r^q} |re^{i\theta} - 1|^q}$$

e,

$$H_{2,1}^1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{drd\theta}{|\gamma + r\sin \theta|^{\tau r^{q-1}} |re^{i(\theta-\varphi)} - 1|^q},$$

$$H_{2,1}^2 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{drd\theta}{|\gamma + r\sin \theta|^{\tau r^{q-1}} |re^{i(\theta-\varphi)} - 1|^q}.$$

Note que a estimativa de $H_{2,2}$ é dada pelo caso anterior.

Para estimar $H_{2,1}^1$, note que, como $1/2 < \gamma < r < 3/2$ temos $1/3 < \gamma/r < 1$. Seja $\theta_1 \in (-\pi/2, -\alpha_0)$ tal que $-\gamma/r = \sin \theta_1$, onde $\sin \alpha_0 = 1/3$. Temos então,

$$\frac{1}{|\gamma + r \sin \theta|^\tau} = \frac{|\theta - \theta_1|^\tau}{r^\tau |\sin \theta - \sin \theta_1|^\tau} \frac{1}{|\theta - \theta_1|^\tau} \leq \frac{A(\tau)}{r^\tau |\cos \theta_1|^\tau} \frac{1}{|\theta - \theta_1|^\tau},$$

para alguma constante $A(\tau) > 0$; assim, substituindo $\cos \theta_1$ por $\sqrt{r^2 - \gamma^2}/r$ obtemos

$$\frac{1}{|\gamma + r \sin \theta|^\tau} \leq \frac{A(\tau)}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}}} \frac{1}{|\theta - \theta_1(r)|^\tau}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} H_{2,1}^1 &\leq 2^{q-1} A(\tau) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |\theta - \theta_1(r)|^\tau |re^{i(\theta-\varphi)} - 1|^q} \\ &= 2^{q-1} A(\tau) \int_{-\frac{\pi}{2}-\varphi}^{\frac{\pi}{2}-\varphi} \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |\theta - \theta_1(r) + \varphi|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q} \\ &\leq 2^{q-1} A(\tau) \sum_{j=1}^4 \int_{\frac{(j-4)\pi}{2}}^{\frac{(j-3)\pi}{2}} \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |\theta - \theta_1(r) + \varphi|^\tau |re^{i\theta} - 1|^q} \\ &= 2^{q-1} A(\tau) \sum_{j=1}^4 H_{2,1}^{1,j}. \end{aligned}$$

Temos

$$H_{2,1}^{1,1} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |\theta - \pi - \theta_1(r) + \varphi|^\tau |re^{i\theta} + 1|^q}.$$

Para $-\pi/2 \leq \theta \leq 0$ temos $|re^{i\theta} + 1| \geq 1 + r \cos \theta \geq 1$ e

$$H_{2,1}^{1,1} \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \int_{\gamma}^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |\theta - \pi - \theta_1(r) + \varphi|^\tau} \leq C(\tau),$$

para uma constante $C(\tau) > 0$. De forma semelhante, $H_{2,1}^{1,2} \leq \tilde{C}(\tau)$, para alguma constante $\tilde{C}(\tau) > 0$.

Para estimar $H_{2,1}^{1,3}$, seja $0 < \theta_0 < \alpha_0/2$ tal que

$$1 - \frac{\theta^2}{2} < \cos \theta < 1 - \frac{\theta^2}{4}, \quad \text{para } -\theta_0 \leq \theta \leq 0.$$

Note que $-\theta_0 \leq \theta \leq 0$ implica

$$\theta - \theta_1(r) + \varphi \geq -\theta_0 - \theta_1(r) + \varphi \geq \alpha_0 - \frac{\alpha_0}{2} + \varphi \geq \frac{\alpha_0}{2}.$$

Além disso, para $-\pi/2 \leq \theta \leq -\theta_0$ temos

$$|re^{i\theta} - 1|^2 \geq 1 - \cos \theta_0.$$

Assim,

$$\begin{aligned} H_{2,1}^{1,3} &\leq \left(\frac{2}{\alpha_0}\right)^\tau \int_{-\theta_0}^0 \int_\gamma^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |re^{i\theta} - 1|^q} \\ &\quad + \left(\frac{1}{1 - \cos \theta_0}\right)^{\frac{q}{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\theta_0} \int_\gamma^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |\theta - \theta_1(r) + \varphi|^\tau} \\ &\leq \left(\frac{2}{\alpha_0}\right)^\tau \int_{-\theta_0}^0 \int_\gamma^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |re^{i\theta} - 1|^q} + C_1(\tau, q), \end{aligned}$$

para uma constante $C_1(\tau, q) > 0$. Note que, para $r > 1/2$ e $-\theta_0 \leq \theta \leq 0$ temos

$$|re^{i\theta} - 1|^2 \geq \frac{(r-1)^2 + \theta^2}{4};$$

assim, como $r \geq \gamma \geq 1/2$ implica $r^2 - \gamma^2 \geq r - \gamma$, temos

$$\begin{aligned} \int_{-\theta_0}^0 \int_\gamma^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r^2 - \gamma^2)^{\frac{\tau}{2}} |re^{i\theta} - 1|^q} &\leq 2^q \int_{-\theta_0}^0 \int_\gamma^{\frac{3}{2}} \frac{dr d\theta}{(r - \gamma)^{\frac{\tau}{2}} ((r-1)^2 + \theta^2)^{\frac{q}{2}}} \\ &\leq 2^q \int_{D((0,1);1)} \frac{dr d\theta}{(r - \gamma)^{\frac{\tau}{2}} ((r-1)^2 + \theta^2)^{\frac{q}{2}}} \\ &= 2^q \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{dr d\theta}{|1 - \gamma + \rho \sin \alpha|^{\frac{\tau}{2}} \rho^{q-1}} \leq C_2(\tau, q), \end{aligned}$$

onde a última estimativa segue do Lema 6 (página 62). Portanto, podemos encontrar uma constante $C_3(\tau, q) > 0$ tal que $H_{2,1}^{1,3} \leq C_3(\tau, q)$. Podemos usar argumentos similares para estimar $H_{2,1}^{1,4}$ e $H_{2,1}^2$. Portanto, podemos encontrar uma constante $C(\tau, q) > 0$ para qual $H_{2,1} \leq C(\tau, q)$.

Terceiro caso: $0 < \gamma < \frac{1}{2}$. Neste caso, vamos escrever a integral H_2 da seguinte forma

$$H_2 = \int_0^{2\pi} \int_\gamma^{\frac{1}{2}} \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q} |re^{i\theta} - 1|^q} + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{1}{2}}^R \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q} |re^{i\theta} - 1|^q}.$$

A segunda integral pode ser estimada como feito anteriormente. Assim, é suficiente estimar a primeira integral. Como $r < 1/2$ implica $|re^{i\theta} - 1| \geq |r - 1| \geq 1/2$, temos

$$\int_0^{2\pi} \int_\gamma^{\frac{1}{2}} \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q} |re^{i\theta} - 1|^q} \leq 2^q \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau q-1}},$$

que pode ser estimada aplicando o Lema 6 (página 62).

Isto completa a prova do caso $\gamma > 0$ e assim concluímos a demonstração do lema. $\square$

A EQUAÇÃO $Lu = f$

Neste capítulo vamos tratar da equação $Lu = f$, com f em um espaço L^p adequado. Com a técnica desenvolvida, será possível estudar equações da forma $Lu = F(x, y, u)$; em particular, estudaremos também a equação $Lu = au + b\bar{u}$, com $a, b \in L^p$.

5.1 O operador integral T_Z

Seja L uma campo vetorial complexo, no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$, pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Isto é, (como definido no Capítulo 3, página 47) o campo L satisfaz as seguintes condições:

- (i) L é um campo não singular de classe C^ε , $0 < \varepsilon < 1$, em $\tilde{\Omega}$;
- (ii) O conjunto característico Σ de L é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, com um número finito de componentes conexas;
- (iii) L é de classe C^1 em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$;
- (iv) Para cada $p \in \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, existe uma integral primeira $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de L , de classe C^2 , com $U \subset \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ aberto e $p \in U$, tal que $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo;
- (v) Para cada $p \in \Sigma$, existem uma integral primeira $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de L , com $U \subset \tilde{\Omega}$ uma vizinhança aberta de p , tal que $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo que satisfaz $Z_{xy}, Z_{yx} \in C(U)$ e $Z_{xy} = Z_{yx}$ em U , e coordenadas locais (s, t) em U , de classe C^2 centradas em p , tal que nas novas variáveis a integral primeira Z se escreve como

$$Z_{\sigma, \beta}(s, t) = s + i \left(\frac{t|t|^\sigma}{\sigma + 1} + \beta(s) \right), \quad (5.1)$$

onde β é uma função a valores reais de classe $C^{2+\varepsilon}$ que depende apenas de s e $\sigma \geq \varepsilon$ é uma constante. Além disso, Z satisfaz a seguinte condição: se $L = A\partial_x + B\partial_y$ em $\tilde{\Omega}$, então

a função $\lambda : U \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\lambda(x, y) = \begin{cases} \frac{A(x, y)}{Z_y(x, y)}, & \text{se } Z_y(x, y) \neq 0, \\ -\frac{B(x, y)}{Z_x(x, y)}, & \text{se } Z_x(x, y) \neq 0. \end{cases} \quad (5.2)$$

é de classe C^1 em U .

Seja

$$Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{C} \quad (5.3)$$

uma integral primeira global de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem (veja a Proposição 7, página 37).

Defina

$$\sigma_M = \max_{1 \leq j \leq N} \{\sigma_j\}, \quad (5.4)$$

onde $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ são os respectivos tipos de L ao longo das componentes conexas de Σ , a saber, $\Sigma_1, \dots, \Sigma_N$. (Veja a Proposição 10, página 51, e a Observação 21, página 52). Também definimos

$$\tau_M = \frac{\sigma_M}{\sigma_M + 1}.$$

Note que $0 < \tau_M < 1$.

Seja Ω um aberto compactamente contido em $\tilde{\Omega}$, isto é, $\overline{\Omega}$ é um compacto de $\mathbb{R}^2$ e $\overline{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$.

Para $f \in L^1(\Omega)$, definimos o operador integral

$$T_Z f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} d\xi d\eta, \quad (x, y) \in \tilde{\Omega}. \quad (5.5)$$

Veja em (B.2), página 136, o operador integral clássico Tf que foi inspiração para a definição do operador integral acima.

Observação 22. Operadores integrais, como $T_Z f$, foram usados em (MEZIANI, 2008) e (MEZIANI, 2012) em conexão com outras classes de campos vetoriais.

Temos o seguinte teorema:

Teorema 4. Seja σ_M dado por (5.4) e seja $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$. Então, existe uma constante $M = M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que o operador T_Z satisfaz

$$|T_Z f(x, y)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)|}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|} d\xi d\eta \leq M \|f\|_p, \quad \forall (x, y) \in \overline{\Omega}.$$

Demonstração. Seja $(x, y) \in \Omega$. Então, pela desigualdade de Hölder, temos

$$|T_Z f(x, y)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)|}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|} d\xi d\eta \leq \frac{\|f\|_p}{2\pi} \left(\int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \right)^{\frac{1}{q}}, \quad (5.6)$$

onde $q = p/(p-1)$.

Seja $\{V_k\}_{k=1, \dots, k_0}$ uma cobertura finita do compacto $\Sigma \cap \overline{\Omega}$, formada por abertos pré compactos de $\tilde{\Omega}$, tais que cada aberto V_k intercepta apenas uma componente conexa de Σ e para cada k , com $V_k \cap \Sigma_j \neq \emptyset$, podemos escrever

$$Z|_{V_k} = G_k \circ Z_{\sigma_j} \circ F_k \text{ em } V_k, \quad (5.7)$$

onde $F_k : \overline{V_k} \rightarrow \overline{U_k}$, $G_k : \overline{Z_{\sigma_j}(U_k)} \rightarrow \overline{B_k}$ são difeomorfismos de classe C^1 e

$$Z_{\sigma_j}(s, t) = s + i \frac{t|t|^{\sigma_j}}{1 + \sigma_j}, \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

(Veja o Corolário 2, página 56). Como Σ é uma subvariedade mergulhada de $\tilde{\Omega}$ com dimensão 1 e $\overline{\Omega}$ é compacto, existe uma família de abertos de $\tilde{\Omega}$, $\{V_k\}_{k=k_0+1, \dots, m}$, com $\overline{V_k}$ compacto, $\overline{V_k} \cap \Sigma = \emptyset$, e tal que

$$\overline{\Omega} \subset V_1 \cup \dots \cup V_{k_0} \cup V_{k_0+1} \cup \dots \cup V_m,$$

isto é, $\mathcal{C} = \{V_k\}_{k=1, \dots, m}$ é uma cobertura de $\overline{\Omega}$. Seja $\{\varphi_k\}_{k=1, \dots, m}$ uma partição da unidade subordinada a cobertura $\mathcal{C}$. Assim, temos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} &= \int_{\Omega} \frac{\sum_{k=1}^m \varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \\ &= \sum_{k=1}^m \int_{V_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} =: \sum_{k=1}^m I_k(x, y). \end{aligned} \quad (5.8)$$

Vamos estimar $I_k(x, y)$ para $(x, y) \in \tilde{\Omega}$ e $k \in \{1, \dots, m\}$.

Caso 1: $(x, y) \in V_k$ e $k \in \{1, \dots, k_0\}$.

Seja $j \in \{1, \dots, N\}$ tal que $V_k \cap \Sigma_j \neq \emptyset$. Temos,

$$\begin{aligned} \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} &= \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|G_k(Z_{\sigma_j}(F_k(\xi, \eta))) - G_k(Z_{\sigma_j}(F_k(x, y)))|^q} \\ &\leq K \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z_{\sigma_j}(F_k(\xi, \eta)) - Z_{\sigma_j}(F_k(x, y))|^q} \leq KN \int_{F_k(V_k)} \frac{ds dt}{|Z_{\sigma_j}(s, t) - Z_{\sigma_j}(s^\circ, t^\circ)|^q}, \end{aligned}$$

onde, $(s^\circ, t^\circ) = F_k(x, y)$, K é uma constante de Lipschitz para toda G_ℓ^{-1} , isto é,

$$|q_1 - q_2| \leq K |G_\ell(q_1) - G_\ell(q_2)|, \quad q_1, q_2 \in \overline{B_\ell},$$

para todo $\ell \in \{1, \dots, k_0\}$, e $N \geq \sup\{|\det(DF_\ell)(\xi, \eta)|^{-1}; (\xi, \eta) \in V_\ell\}$, para todo $\ell \in \{1, \dots, k_0\}$.

Usando a mudança de variáveis $\xi = s$ e $\eta = \frac{t|t|^{\sigma_j}}{1 + \sigma_j}$ obtemos

$$(1 + \sigma_j)^{\tau_j} \int_{U_k} \frac{dsdt}{|Z_{\sigma_j}(s, t) - Z_{\sigma_j}(s^\circ, t^\circ)|^q} = \int_{Z_{\sigma_j}(U_k)} \frac{d\xi d\eta}{|\eta|^{\tau_j} |\xi - z|^q} \\ \leq \int_{D(z, d_0)} \frac{d\xi d\eta}{|\eta|^{\tau_j} |\xi - z|^q}, \quad \tau_j = \sigma_j/(\sigma_j + 1),$$

onde $\xi = \zeta + i\eta$, $z = Z_{\sigma_j}(s^\circ, t^\circ)$, e $d_0 \geq \text{diam}(Z_{\sigma_n}(U_\ell))$, para todo $\ell \in \{1, \dots, k_0\}$ e para todo $n \in \{1, \dots, N\}$ com $V_\ell \cap \Sigma_n \neq \emptyset$. Agora, com o uso das coordenadas polares (r, θ) dadas por

$$\xi = r \cos \theta + \Re(z) \text{ e } \eta = r \sin \theta + \Im(z)$$

e pelo Lema 6 (página 62) temos

$$\int_{D(z, d_0)} \frac{d\xi d\eta}{|\eta|^{\tau_j} |\xi - z|^q} = \int_0^{2\pi} \int_0^{d_0} \frac{dr d\theta}{|r \sin \theta + \Im(z)|^{\tau_j} r^{q-1}} \leq M(q, \tau_j) d_0^{2-\tau_j-q},$$

pois $p > 2 + \sigma_M$ implica $1 < q < 2 - \tau_M \leq 2 - \tau_n$, para todo $n \in \{1, \dots, N\}$ (lembrando que $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$). Assim, existe uma constante $M_0 = M_0(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$I_k(x, y) \leq M_0.$$

Caso 2: $(x, y) \in V_k$ e $k \in \{k_0 + 1, \dots, m\}$.

Temos

$$I_k(x, y) \leq \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \leq C \int_{Z(V_k)} \frac{d\xi d\eta}{|\xi - Z(x, y)|^q},$$

onde $C \geq \sup\{|\det(DZ)(\xi, \eta)|^{-1}; (\xi, \eta) \in V_\ell\}$, para todo $\ell \in \{k_0 + 1, \dots, m\}$.

Seja $d > 0$ tal que $d \geq \text{diam}(Z(V_\ell)) = \sup\{|\xi_1 - \xi_2|; \xi_1, \xi_2 \in Z(V_\ell)\}$, para todo $\ell \in \{k_0 + 1, \dots, m\}$. Temos,

$$\int_{Z(V_k)} \frac{d\xi d\eta}{|\xi - Z(x, y)|^q} \leq \int_{D(Z(x, y), d)} \frac{d\xi d\eta}{|\xi - Z(x, y)|^q} = \int_{D(0, d)} \frac{d\xi d\eta}{|\xi|^q} = 2\pi \int_0^d s^{1-q} ds = \frac{2\pi}{2-q} d^{2-q}.$$

Assim, $M_1 = M_1(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) := 2\pi C d^{2-q}/(2-q)$ é tal que

$$I_k(x, y) \leq M_1.$$

Caso 3: $(x, y) \in V_k^c$ e $k \in \{1, \dots, m\}$.

Como $\text{supp} \varphi_\ell \subset V_\ell$, para todo $\ell \in \{1, \dots, m\}$, temos que existe $\mu > 0$ tal que

$$0 < \mu \leq \inf\{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|; (\xi, \eta) \in \text{supp} \varphi_\ell, (x, y) \in V_\ell^c\},$$

para todo $\ell \in \{1, \dots, m\}$. Assim,

$$I_k(x, y) = \int_{V_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \leq \int_{\text{supp} \varphi_k \cap \Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \leq \frac{|\text{supp} \varphi_k \cap \Omega|}{\mu^q}.$$

Daí temos, que $M_2 = M_2(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) := |\Omega|/\mu^q$ é tal que

$$I_k(x, y) \leq M_2.$$

Isso conclui o caso 3.

Portanto, para todo $(x, y) \in \tilde{\Omega}$ e todo $k \in \{1, \dots, m\}$ temos

$$I_k(x, y) \leq \max\{M_0, M_1, M_2\} =: M_3.$$

Logo, de (5.8), temos

$$\int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \leq mM_3, \text{ para todo } (x, y) \in \tilde{\Omega}. \quad (5.9)$$

De (5.6) e (5.9) obtemos o resultado. $\square$

O próximo corolário segue da demonstração do Teorema 4 acima.

Corolário 3. Sejam $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ e Ω como acima. Se $1 \leq q < 2 - \tau_M$, então existe uma constante $M = M(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$\int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \leq M, \text{ para todo } (x, y) \in \tilde{\Omega}.$$

$\square$

A demonstração da proposição que vem a seguir é fortemente inspirada na do caso clássico.

Proposição 15. Seja $f \in L^1(\Omega)$. Então, $T_Z f \in L^q(\Omega)$, para todo $1 \leq q < 2 - \tau_M$.

Demonstração. Seja $f \in L^1(\Omega)$ e seja $g \in L^p(\Omega)$ com $p > 2 + \sigma_M$. Pelo Teorema 4 a função

$$g_1(x, y) = \int_{\Omega} |g(\xi, \eta)| \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|}$$

é limitada. Assim, $f g_1 \in L^1(\Omega)$. Aplicando o Teorema de Fubini obtemos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f(x, y)| g_1(x, y) dx dy &= \int_{\Omega} |f(x, y)| \left(\int_{\Omega} |g(\xi, \eta)| \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|} \right) dx dy \\ &= \int_{\Omega} |g(\xi, \eta)| \left(\int_{\Omega} |f(x, y)| \frac{dx dy}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|} \right) d\xi d\eta \\ &= \int_{\Omega} |g(\xi, \eta)| f_1(\xi, \eta) d\xi d\eta, \end{aligned}$$

onde

$$f_1(\xi, \eta) = \int_{\Omega} |f(x, y)| \frac{dx dy}{|Z(x, y) - Z(\xi, \eta)|}.$$

Assim $|g| f_1 \in L^1(\Omega)$. Como $g \in L^p(\Omega)$ é arbitrária, segue da recíproca da desigualdade de Hölder (Teorema 25, página 133) que $f_1 \in L^q(\Omega)$, para $q = p/(p-1)$. Note que $p > 2 + \sigma_M$ implica $1 < q < 2 - \tau_M$. Note também que $|T_Z f| \leq f_1$. Portanto, $T_Z f \in L^q(\Omega)$, para qualquer $1 < q < 2 - \tau_M$. Como Ω é limitado, segue da desigualdade de Hölder que $T_Z f \in L^1(\Omega)$. $\square$

5.2 Existência de solução para a equação $Lu = f$

Sejam $L, Z, \tilde{\Omega}$ e Ω como na seção anterior. O próximo passo é mostrar que $T_Z f$ é solução da equação $H_Z u = f$ em Ω , onde H_Z é o Hamiltoniano de Z . A partir daí, obteremos uma solução para a equação $Lu = f$ em Ω . Para isso, vamos estudar uma fórmula de representação de soluções. Esta fórmula também será importante em outras partes deste texto.

Lema 8. (Teorema de Green) Seja U um aberto conexo tal que $\overline{U}$ é compacto, $\overline{U} \subset \tilde{\Omega}$ e ∂U é de classe C^1 por partes. Se $f, g \in C^1(\tilde{\Omega})$, então

$$\int_U \{\partial_x f(x, y) - \partial_y g(x, y)\} dx dy = \int_{\partial U} g(x, y) dx + f(x, y) dy. \quad (5.10)$$

Essa versão do Teorema de Green para funções a valores complexos segue do caso real. Veja em (LINS-NETO, 2005) e (LIMA, 2008).

□

Seja Z como em (5.3). Considere H_Z como Hamiltoniano de Z em $\tilde{\Omega}$, isto é,

$$H_Z = Z_y \frac{\partial}{\partial x} - Z_x \frac{\partial}{\partial y} \text{ em } \tilde{\Omega}.$$

A próxima proposição é consequência do lema acima.

Proposição 16. Seja U um aberto como no Lema 8. Se $w \in C^1(\tilde{\Omega})$. Então

$$\int_U H_Z w dx dy = \int_{\partial U} w dZ(x, y). \quad (5.11)$$

Demonstração. Pelo Lema 8,

$$\begin{aligned} \int_{\partial U} w dZ &= \int_{\partial U} w \{Z_x dx + Z_y dy\} = \int_{\partial U} (Z_x w) dx + (Z_y w) dy \\ &= \int_U \{(Z_y w)_x - (Z_x w)_y\} dx dy = \int_U \{Z_{yx} - Z_{xy}\} w dx dy + \int_U \{Z_y w_x - Z_x w_y\} dx dy \\ &= \int_U \{Z_{yx} - Z_{xy}\} w dx dy + \int_U H_Z w dx dy. \end{aligned} \quad (5.12)$$

Pela Proposição 9, página 49, Z satisfaz $Z_{xy} = Z_{yx}$ em U . Logo,

$$\int_U \{Z_{yx} - Z_{xy}\} w dx dy = 0,$$

e por (5.12) temos o resultado.

□

O próximo lema é uma pequena adaptação de um teorema em (LINS-NETO, 2005).

Lema 9. (Mudança de variáveis) Seja U um aberto de $\mathbb{R}^2$ e sejam $w \in C(U)$ e $Z \in C^1(U)$ tal que $Z : U \rightarrow Z(U)$ é um homeomorfismo. Se $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ uma curva de classe C^1 por partes em U , tal que $Z \circ \gamma$ é uma curva C^1 por partes em $Z(U)$, então

$$\int_{\gamma} w(x, y) dZ(x, y) = \int_{Z \circ \gamma} (w \circ Z^{-1})(\zeta) d\zeta, \quad \zeta = \xi + i\eta. \quad (5.13)$$

Demonstração. Considere $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, $Z_1 = \Re(Z)$, $Z_2 = \Im(Z)$ e $\tilde{w}(\zeta) = (w \circ Z^{-1})(\zeta)$. Vamos demonstrar a fórmula (5.13) no caso em que γ é de classe C^1 . O caso geral segue dividindo os intervalos de integração convenientemente.

Pela definição de integral sobre curvas e pela regra da cadeia temos

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} w(x, y) dZ(x, y) &= \int_0^1 w(\gamma(t)) \{Z_x(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + Z_y(\gamma(t)) \gamma_2'(t)\} dt \\ &= \int_0^1 \tilde{w}(Z(\gamma(t))) \{[Z_{1x}(\gamma(t)) + iZ_{2x}(\gamma(t))] \gamma_1'(t) + [Z_{1y}(\gamma(t)) + iZ_{2y}(\gamma(t))] \gamma_2'(t)\} dt \\ &= \int_0^1 \tilde{w}(Z(\gamma(t))) \{[Z_{1x}(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + Z_{1y}(\gamma(t)) \gamma_2'(t)] + i[Z_{2x}(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + Z_{2y}(\gamma(t)) \gamma_2'(t)]\} dt \\ &= \int_0^1 \tilde{w}(Z(\gamma(t))) \left\{ \frac{d}{dt} (Z_1 \circ \gamma(t)) + i \frac{d}{dt} (Z_2 \circ \gamma(t)) \right\} dt \\ &= \int_{Z \circ \gamma} \tilde{w}(\zeta) \{d\xi + i d\eta\} = \int_{Z \circ \gamma} \tilde{w}(\zeta) d\zeta. \end{aligned}$$

□

A próxima proposição nos dá uma fórmula de representação que generaliza para L a fórmula de representação de Cauchy-Pompeiu¹.

Proposição 17. Seja U um aberto como no Lema 8. Seja $w \in C^1(\tilde{\Omega})$ e $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Então, para todo $(x, y) \in U$, temos

$$w(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{w(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} dZ(\xi, \eta) - \frac{1}{2\pi i} \int_U \frac{H_Z w(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} d\xi d\eta.$$

Demonstração. Seja $(x_0, y_0) \in U$ fixado. Considere $z_0 = Z(x_0, y_0)$ e seja $\delta > 0$ tal que $\overline{D_\delta} \subset Z(U)$, onde $D_\delta = D(z_0, \delta)$. Defina $K_\delta = Z^{-1}(\overline{D_\delta})$ e $U_\delta = U \setminus K_\delta$. Seja

$$f(x, y) = \frac{w(x, y)}{Z(x, y) - z_0}.$$

¹ A fórmula de representação de Cauchy-Pompeiu também é conhecida como fórmula de Cauchy não homogênea. Veja em (BEGEHR, 1994) e (VEKUA, 1962). Veja também o Teorema 31, página 138.

Temos que f é de classe C^1 em um aberto que contém U_δ . Assim, pela Proposição 16, fórmula (5.11),

$$\begin{aligned} \int_{U_\delta} \frac{H_Z w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dx dy &= \int_{\partial U_\delta} \frac{w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dZ(x, y) \\ &= \int_{\partial U} \frac{w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dZ(x, y) - \int_{\partial K_\delta} \frac{w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dZ(x, y); \end{aligned} \quad (5.14)$$

Pelo Lema 9, fórmula (5.13),

$$\int_{\partial K_\delta} f(x, y) dZ(x, y) = \int_{Z(\partial K_\delta)} (f \circ Z^{-1})(\zeta) d\zeta = \int_{\partial D_\delta} \frac{\tilde{w}(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta,$$

onde $\tilde{w} = w \circ Z^{-1}$, então usando as coordenadas polares $\zeta = z_0 + \delta e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, obtemos

$$\int_{\partial D_\delta} \frac{\tilde{w}(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \int_0^{2\pi} \frac{\tilde{w}(z_0 + \delta e^{i\theta})}{\delta e^{i\theta}} i \delta e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \tilde{w}(z_0), \text{ quando } \delta \rightarrow 0.$$

Portanto,

$$\int_{\partial K_\delta} \frac{w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dZ(x, y) \rightarrow 2\pi i w(x_0, y_0), \text{ quando } \delta \rightarrow 0. \quad (5.15)$$

Por outro lado, pelo Teorema 4 (página 72),

$$(x, y) \mapsto \frac{1}{Z(x, y) - z_0} \in L^1(U).$$

Assim,

$$\int_{U_\delta} \frac{H_Z w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dx dy \rightarrow \int_U \frac{H_Z w(x, y)}{Z(x, y) - z_0} dx dy, \text{ quando } \delta \rightarrow 0. \quad (5.16)$$

O resultado segue de (5.14), (5.15) e (5.16). $\square$

Como anteriormente, seja Ω um aberto compactamente contido em $\tilde{\Omega}$.

Teorema 5. Se $f \in L^1(\Omega)$ então $T_Z f$ satisfaz $H_Z(T_Z f) = f$ em Ω .

Demonstração. Seja $f \in L^1(\Omega)$. Pela Proposição 15, página 75, $T_Z f \in L^1(\Omega)$. Seja $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ uma função de classe C^∞ com suporte compacto em Ω . Existe um aberto simplesmente conexo U com bordo suave de classe C^1 tal que $\bar{U}$ é compacto, $\bar{U} \subset \Omega$ e $\text{supp} \phi \subset U$. Logo,

$$\int_{\partial U} \frac{\phi(x, y)}{Z(x, y) - Z(\xi, \eta)} dZ(x, y) = 0,$$

para $(\xi, \eta) \in U$. Assim, pela Proposição 17, página 77, podemos escrever

$$\phi(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi i} \int_U \frac{H_Z \phi(x, y)}{Z(x, y) - Z(\xi, \eta)} dx dy, \quad (5.17)$$

para $(\xi, \eta) \in U$. Como $\text{supp} \phi \subset U$ segue que a representação de ϕ dada acima, em (5.17), vale para todo $(\xi, \eta) \in \Omega$.

Temos

$$\langle H_Z(T_Z f), \phi \rangle = \int_{\Omega} T_Z f(x, y)^t H_Z \phi(x, y) dx dy = - \int_{\Omega} T_Z f(x, y) H_Z \phi(x, y) dx dy.$$

Daí, temos pelo Teorema de Fubini

$$\begin{aligned} \langle H_Z(T_Z f), \phi \rangle &= - \int_{\Omega} T_Z f(x, y) H_Z \phi(x, y) dx dy = - \int_U T_Z f(x, y) H_Z \phi(x, y) dx dy \\ &= - \frac{1}{2\pi i} \int_U \left(\int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} d\xi d\eta \right) H_Z \phi(x, y) dx dy \\ &= \int_{\Omega} f(\xi, \eta) \left(\frac{1}{2\pi i} \int_U \frac{H_Z \phi(x, y)}{Z(x, y) - Z(\xi, \eta)} dx dy \right) d\xi d\eta \\ &= \int_{\Omega} f(\xi, \eta) \phi(\xi, \eta) d\xi d\eta = \langle f, \phi \rangle. \end{aligned}$$

Portanto, $H_Z(T_Z f) = f$ em Ω . □

Como L é um campo vetorial complexo definido em $\tilde{\Omega}$ pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ e $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma integral primeira global de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem, podemos escrever o campo L como um múltiplo do Hamiltoniano de Z , isto é, podemos escrever

$$L = \lambda H_Z \text{ em } \tilde{\Omega},$$

com $\lambda \in C^1(\tilde{\Omega})$ e $|\lambda| > 0$ em $\tilde{\Omega}$ (Proposição 9, página 49). Tendo isso em mente, vamos provar o corolário a seguir.

Como acima, seja Ω um aberto compactamente contido em $\tilde{\Omega}$.

Corolário 4. Se $f \in L^1(\Omega)$, então $u := T_Z\left(\frac{f}{\lambda}\right)$, onde λ é dado acima, satisfaz a equação $Lu = f$ em Ω .

Demonstração. Temos que $\lambda \in C^1(\tilde{\Omega})$. Como $\overline{\Omega}$ é compacto e $\overline{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$ temos que $1/\lambda \in L^\infty(\Omega)$. Logo $g := f/\lambda \in L^1(\Omega)$. Pelo Teorema 5, $H_Z(T_Z g) = g$ em Ω . Como $\lambda \in C^1(\Omega)$ temos $\lambda H_Z(T_Z g) = \lambda g$ em Ω , ou seja, $L(T_Z g) = f$ em Ω . □

O Teorema 4, página 72, nos diz que se $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$ ($\sigma_M > 0$ dado em (5.4), página 72), então $T_Z f \in L^\infty(\Omega)$. Assim, pelo corolário acima, se $f \in L^p(\Omega)$ para $p > 2 + \sigma_M$, então existe uma solução $u \in L^\infty(\Omega)$ da equação $Lu = f$ em Ω . O próximo exemplo, explora a relação $p > 2 + \sigma_M$ quando estamos procurando soluções limitadas da equação $Lu = f$ em Ω , $f \in L^p(\Omega)$.

Exemplo 6. Para $p \leq 2 + \sigma_M$, existe $f \in L^p(\Omega)$ tal que a equação $Lu = f$ não tem soluções limitadas. Para o campo padrão,

$$L_\sigma = \frac{\partial}{\partial y} - i|y|^\sigma \frac{\partial}{\partial x}, \quad \sigma > 0,$$

a função $v : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $v(x, y) = \ln |\ln |Z_\sigma(x, y)||$, com $Z_\sigma(x, y) = x + i \frac{y|y|^\sigma}{\sigma + 1}$, é não limitada, mas é solução da equação $Lv = f$ com

$$f(x, y) = \frac{-i|y|^\sigma}{Z_\sigma(x, y) \ln |Z_\sigma(x, y)|} \in L^p(\Omega), \quad \text{para } 1 \leq p \leq 2 + \sigma.$$

($f \in L^p(\Omega)$), com $p \leq 2 + \sigma$, segue do fato de que $\int_0^a \frac{dr}{r^s |\ln r|^p} < \infty$, $a > 0$, se, e somente se, $s \leq 1$). Para um campo mais geral, pertencente a classe $\mathcal{X}$, podemos construir um exemplo usando a normalização (estudada no Capítulo 3) perto dos pontos do seu conjunto característico.

5.3 Continuidade Hölder das soluções de $Lu = f$

Seja L um campo vetorial complexo definido em $\tilde{\Omega}$ pertencente à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ como no início do capítulo. Nesta seção vamos provar que as soluções contínuas de $Lu = f$ são Hölder contínuas se $f \in L^p$, com $p > 2 + \sigma_M$, onde $\sigma_M > 0$ é definido em (5.4), na página 72, como o máximo dos tipos $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ do campo L .

Seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Como nas seções anteriores, seja Ω um aberto de $\tilde{\Omega}$ tal que $\bar{\Omega}$ é um compacto de $\mathbb{R}^2$ e $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$. O próximo teorema nos diz que a função $T_Z f$ (dada em (5.5), na página 72) satisfaz uma condição de Hölder.

Teorema 6. Se $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$, então existe uma constante $C = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$|T_Z f(p_1) - T_Z f(p_2)| \leq C \|f\|_p |Z(p_1) - Z(p_2)|^\beta, \quad \forall p_1, p_2 \in \tilde{\Omega}$$

onde $\beta = (2 - q - \tau_M)/q$, com $q = p/(p - 1)$ e $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$.

Demonstração. Sejam $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in \tilde{\Omega}$, com $(x_0, y_0) \neq (x_1, y_1)$. Temos, pela desigualdade de Hölder,

$$|T_Z f(x_1, y_1) - T_Z f(x_0, y_0)| \leq \frac{|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|}{2\pi} \|f\|_p J^{\frac{1}{q}}, \quad (5.18)$$

onde

$$J = J((x_1, y_1), (x_0, y_0)) = \int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q}, \quad (5.19)$$

com $q = p/(p - 1)$.

Como no Teorema 4, página 72, vamos estabelecer uma cobertura de $\bar{\Omega}$ onde podemos explorar as boas propriedades locais de Z .

Seja $\{V_k\}_{k=1, \dots, k_0}$ uma cobertura finita do compacto $\Sigma \cap \bar{\Omega}$, formada por abertos pré compactos de $\tilde{\Omega}$, tais que cada aberto intercepta apenas uma componente conexa de Σ (lembrando

que $\Sigma = \Sigma_1 \cup \dots \cup \Sigma_N$, veja na página 100) e para cada k , com $V_k \cap \Sigma_j \neq \emptyset$, podemos escrever

$$Z|_{V_k} = G_k \circ Z_{\sigma_j} \circ F_k \text{ em } V_k, \quad (5.20)$$

onde $F_k : \overline{V_k} \rightarrow \overline{U_k}$, $G_k : \overline{Z_{\sigma_j}(U_k)} \rightarrow \overline{B_k}$ são difeomorfismos de classe C^1 , e

$$Z_{\sigma_j}(s, t) = s + i \frac{t|t|^{\sigma_j}}{1 + \sigma_j}.$$

Existe uma família de abertos de $\tilde{\Omega}$, $\{V_k\}_{k=k_0+1, \dots, m}$, com $\overline{V_k}$ compacto, $\overline{V_k} \cap \Sigma = \emptyset$, e tal que

$$\overline{\Omega} \subset V_1 \cup \dots \cup V_{k_0} \cup V_{k_0+1} \cup \dots \cup V_m,$$

isto é, $\mathcal{C} = \{V_k\}_{k=1, \dots, m}$ é uma cobertura de $\overline{\Omega}$. Seja $\{\varphi_k\}_{k=1, \dots, m}$ uma partição da unidade subordinada a cobertura $\mathcal{C}$. Assim, temos

$$\begin{aligned} J((x_1, y_1), (x_0, y_0)) &= \int_{\Omega} \frac{\sum_{k=1}^m \varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \\ &= \sum_{k=1}^m \int_{V_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} =: \sum_{k=1}^m J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)). \end{aligned} \quad (5.21)$$

Vamos Estimar $J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0))$, para $k \in \{1, \dots, m\}$.

Suponha que $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)| < 1$.

Caso 1: $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in V_k$ e $k \in \{1, \dots, k_0\}$.

Seja $j \in \{1, \dots, N\}$ tal que $V_k \cap \Sigma_j \neq \emptyset$. Temos,

$$\begin{aligned} &\int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} = \\ &= \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|G_k(Z_{\sigma_j}(F_k(\xi, \eta))) - G_k(Z_{\sigma_j}(F_k(x_1, y_1)))|^q |G_k(Z_{\sigma_j}(F_k(\xi, \eta))) - G_k(Z_{\sigma_j}(F_k(x_0, y_0)))|^q} \\ &\leq K^2 \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z_{\sigma_j}(F_k(\xi, \eta)) - Z_{\sigma_j}(F_k(x_1, y_1))|^q |Z_{\sigma_j}(F_k(\xi, \eta)) - Z_{\sigma_j}(F_k(x_0, y_0))|^q} \\ &\leq K^2 K_1 \int_{F_k(V_k)} \frac{ds dt}{|Z_{\sigma_j}(s, t) - Z_{\sigma_j}(s_1^\circ, t_1^\circ)|^q |Z_{\sigma_j}(s, t) - Z_{\sigma_j}(s_0^\circ, t_0^\circ)|^q} =: Q_{jk}, \end{aligned}$$

onde K é uma constante de Lipschitz para toda G_ℓ^{-1} , isto é,

$$|q_1 - q_2| \leq K |G_\ell(q_1) - G_\ell(q_2)|, \quad q_1, q_2 \in \overline{B_\ell},$$

para todo $\ell \in \{1, \dots, k_0\}$, e $K_1 > 0$ é tal que $K_1 \geq \sup\{|\det(DF_\ell)(\xi, \eta)|^{-1}; (\xi, \eta) \in V_\ell\}$, para todo $\ell \in \{1, \dots, k_0\}$, e $(s_n^\circ, t_n^\circ) = F_k(x_n, y_n)$, $n = 0, 1$.

Usando a mudança de coordenadas $\xi = s$ e $\eta = \frac{t|t|^{\sigma_j}}{\sigma_j + 1}$ temos

$$Q_{jk} = \frac{1}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} \int_{Z_{\sigma_j}(U_k)} \frac{d\xi d\eta}{|\eta|^{\tau_j} |\zeta - w_1|^q |\zeta - w_0|^q}, \quad \zeta = \xi + i\eta,$$

onde $w_n = Z_{\sigma_j}(s_n, t_n)$, $n = 0, 1$, e $\tau_j = \sigma_j / (\sigma_j + 1)$. Podemos assumir, sem perda de generalidade, que $\eta_0 > 0$, (onde $w_0 = \xi_0 + i\eta_0$), e $w_1 - w_0 = |w_1 - w_0|e^{i\varphi}$, com $0 \leq \varphi \leq \pi$. Temos,

$$\begin{aligned} Q_{jk} &\leq \frac{1}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} \int_{D(w_0; d)} \frac{d\xi d\eta}{|\eta|^{\tau_j} |\zeta - w_1|^q |\zeta - w_0|^q} \\ &= \frac{1}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} \int_{D(0; d)} \frac{d\xi d\eta}{|\eta_0 + \eta|^{\tau_j} |\zeta - (w_1 - w_0)|^q |\zeta|^q}, \end{aligned}$$

onde $d \geq \text{diam}(Z_{\sigma_n}(U_\ell))$, para todo $n \in \{1, \dots, N\}$ e todo $\ell \in \{1, \dots, k_0\}$ com $V_\ell \cap \Sigma_n \neq \emptyset$. A seguir, usando a mudança de variáveis $\zeta = |w_1 - w_0|\mu$, com $\mu = a + ib$ e $w_1 - w_0 = |w_1 - w_0|e^{i\varphi}$, obtemos

$$Q_{jk} \leq \frac{1}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} \int_{D(0; \frac{d}{|w_1 - w_0|})} \frac{|w_1 - w_0|^{2-\tau-2q}}{|\frac{\eta_0}{|w_1 - w_0|} + b|^{\tau} |\mu - e^{i\varphi}|^q |\mu|^q} da db.$$

Finalmente, as coordenadas polares $\mu = \zeta e^{i\varphi}$, $\zeta = re^{i\theta}$ e $\gamma = \eta_0 / |w_1 - w_0|$ e o uso do Lema 7 (página 64), nos permite obter a estimativa

$$\begin{aligned} Q_{jk} &\leq \frac{|w_1 - w_0|^{2-\tau_j-2q}}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{d}{|w_1 - w_0|}} \frac{r dr d\theta}{|\gamma + r \sin(\theta + \varphi)|^{\tau_j} |r e^{i\theta} - 1|^q} d\xi d\eta \\ &\leq \frac{C(q, \tau_j)}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} |w_1 - w_0|^{2-\tau_j-2q} \leq \frac{C(q, \tau_j)}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} \left(K |G_k(w_1) - G_k(w_0)| \right)^{2-\tau_j-2q} \\ &= \frac{C(q, \tau_j)}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} K^{2-\tau_j-2q} |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-\tau_j-2q} \\ &\leq \frac{C(q, \tau_j)}{(\sigma_j + 1)^{\tau_j}} K^{2-\tau_j-2q} |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-\tau_M-2q}, \end{aligned}$$

pois, $p > 2 + \sigma_M$ implica $1 < q < 2 - \tau_M \leq 2 - \tau_\ell$, para todo $\ell \in \{1, \dots, N\}$, e pela suposição de $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)| < 1$.

Segue daí que existe uma constante $Q = Q(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$\int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \leq Q |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-\tau_M-2q}.$$

Assim, pelas estimativas feitas acima, existe uma constante $\tilde{Q} = \tilde{Q}(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) \leq \tilde{Q} |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}.$$

Caso 2: $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in V_k$ e $k \in \{k_0 + 1, \dots, m\}$.

Temos

$$\begin{aligned} J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) &\leq \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \\ &\leq C \int_{Z(V_k)} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - Z(x_1, y_1)|^q |\zeta - Z(x_0, y_0)|^q}, \quad \zeta = \xi + i\eta, \end{aligned}$$

onde $C > 0$ é tal que $C \geq \sup\{|\det(DZ)(\xi, \eta)|^{-1}; (\xi, \eta) \in V_\ell\}$, para todo $\ell \in \{k_0 + 1, \dots, m\}$. Pela desigualdade de Hadamard (Lema 18, página 136) existe uma constante $M(q) > 0$ tal que

$$\int_{Z(V_k)} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - Z(x_1, y_1)|^q |\zeta - Z(x_0, y_0)|^q} \leq M(q) |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q}.$$

Como $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)| < 1$, temos $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q} \leq |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}$. Assim, temos

$$J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) \leq CM(q) |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}.$$

Caso 3: $(x_0, y_0) \in V_k$ e $(x_1, y_1) \in V_k^c$, para $k \in \{1, \dots, m\}$.

Como $\text{supp } \varphi_\ell \subset V_\ell$, para todo $\ell \in \{1, \dots, m\}$, temos que existe $\mu > 0$ tal que

$$0 < \mu \leq \inf\{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|; (\xi, \eta) \in \text{supp } \varphi_\ell, (x, y) \in V_\ell^c\}, \quad (5.22)$$

para todo $\ell \in \{1, \dots, m\}$. Assim,

$$\begin{aligned} J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) &= \int_{V_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \\ &\leq \int_{\text{supp } \varphi_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \\ &\leq \frac{1}{\mu^q} \int_{\text{supp } \varphi_k \cap \Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \leq \frac{1}{\mu^q} \int_{V_k} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \leq M_0, \end{aligned}$$

por um argumento semelhante ao usado na demonstração do Teorema 4, página 72.

Como $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)| < 1$, temos

$$1 < |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}, \quad (5.23)$$

pois, $2 - 2q - \tau_M < 0$. Daí,

$$J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) \leq M_0 |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}.$$

Caso 4: $(x_0, y_0) \in V_k^c$ e $(x_1, y_1) \in V_k$, para $k \in \{1, \dots, m\}$.

Este caso é inteiramente análogo ao caso anterior.

Caso 5: $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in V_k^c$, para $k \in \{1, \dots, m\}$.

Temos

$$\begin{aligned} J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) &= \int_{V_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \\ &\leq \int_{\text{supp } \varphi_k \cap \Omega} \frac{\varphi_k(\xi, \eta) d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \\ &\leq \frac{|\text{supp } \varphi_k \cap \Omega|}{\mu^{2q}} \leq \frac{|\Omega|}{\mu^{2q}}, \end{aligned}$$

onde $\mu > 0$ é dado em (5.22). Assim, usando (5.23), temos

$$J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) \leq \frac{|\Omega|}{\mu^{2q}} |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}.$$

Assim terminamos o caso 5.

Portanto, para $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in \tilde{\Omega}$, com $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)| < 1$, existe uma constante $M_1 = M_1(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$J_k((x_1, y_1), (x_0, y_0)) \leq M_1 |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-2q-\tau_M}, \text{ para todo } k \in \{1, \dots, m\}.$$

Assim, por (5.18) e (5.21) temos

$$\begin{aligned} |T_Z f(x_1, y_1) - T_Z f(x_0, y_0)| &\leq \frac{|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|}{2\pi} \|f\|_p (mM_1)^{\frac{1}{q}} |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{\frac{2-2q-\tau_M}{q}} \\ &\leq \frac{(mM_1)^{\frac{1}{q}}}{2\pi} \|f\|_p |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{\frac{2-q-\tau_M}{q}}. \end{aligned}$$

Agora, para $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)| \geq 1$, temos $|Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{\frac{2-q-\tau_M}{q}} \geq 1$ e

$$\begin{aligned} |T_Z f(x_1, y_1) - T_Z f(x_0, y_0)| &\leq |T_Z f(x_1, y_1)| + |T_Z f(x_0, y_0)| \\ &\leq 2M \|f\|_p \\ &\leq 2M \|f\|_p |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{\frac{2-q-\tau_M}{q}}. \end{aligned}$$

onde $M > 0$ é dada pelo Teorema 4 (página 72). Tomando $C = \max\{2M, (mM_1)^{\frac{1}{q}}/2\pi\}$, temos

$$|T_Z f(x_1, y_1) - T_Z f(x_0, y_0)| \leq C \|f\|_p |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{\frac{2-q-\tau_M}{q}},$$

e isso completa a demonstração do teorema. □

Das propriedades relacionadas à hipocomplexidade de L temos o seguinte corolário.

Corolário 5. Seja $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$. Se $u \in C(\Omega)$ satisfaz $Lu = f$ em Ω , então para todo aberto U compactamente contido em Ω temos $u \in C^\alpha(U)$ com $\alpha = (2 - q - \tau_M)/q$, $\tau_M = \sigma/(\sigma_M + 1)$ e $q = p/(p - 1)$.

Demonstração. Sem perda de generalidade podemos supor que $L = H_Z$ em Ω . Veja o Corolário 4 (página 79). Seja $u \in C(\Omega)$ tal que $Lu = f$ em Ω . Defina $v = u - T_Z f$. Temos $Lv = 0$ em Ω . Pelo Teorema 2, página 53, podemos escrever $v = h \circ Z$ em Ω , com $h : Z(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa. Assim,

$$u = h(Z) + T_Z f \text{ em } \Omega.$$

Note que $T_Z f \in C^\alpha(\Omega)$ e $h \circ Z \in C^\alpha(U)$ para todo U aberto compactamente contido em Ω . Segue daí que $u \in C^\alpha(U)$. $\square$

O próximo corolário segue da demonstração do Teorema 6 e é uma generalização (de parte) da desigualdade de Hadamard para Z . (Veja a desigualdade de Hadamard clássica no Lema 18, página 136).

Corolário 6. Sejam Z e Ω como no Teorema 6. Se $1 \leq q < 2 - \tau_M$, então existe uma constante $M = M(q, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$\int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x_1, y_1)|^q |Z(\xi, \eta) - Z(x_0, y_0)|^q} \leq M |Z(x_1, y_1) - Z(x_0, y_0)|^{2-(2q+\tau_M)},$$

para todo $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in \tilde{\Omega}$.

$\square$

Observação 23. Seja $0 < \beta < 1$ como no Teorema 6 (página 80). Considere $C_Z^\beta(\overline{\Omega})$ como sendo o subconjunto de $C^\beta(\overline{\Omega})$ dado pelas funções u tal que

$$|u(p_1) - u(p_2)| \leq C |Z(p_1) - Z(p_2)|^\beta, \quad \forall p_1, p_2 \in \overline{\Omega}$$

para $C = C(u, \beta) > 0$ constante. Pelo Teorema 6, $T_Z f \in C_Z^\beta(\overline{\Omega})$, para $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$.

5.4 Equação semilinear $Lu = F(x, y, u)$

Sejam L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ pertencente à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ como no início do capítulo. Seja Ω um aberto com $\overline{\Omega}$ compacto em $\mathbb{R}^2$ e $\overline{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$. Nesta seção vamos estudar a equação semilinear

$$Lu = F(x, y, u) \text{ em } \Omega, \tag{5.24}$$

para $F : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ em duas famílias funções.

Seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é Z um homeomorfismo sobre a imagem.

Para começar esta seção, vamos definir um conjunto que será de grande importância neste texto. Definimos o conjunto $\Lambda_{M,C} = \Lambda_{M,C}(Z, \Omega, \beta)$, para $M, C > 0$ e $0 < \beta < 1$, como o conjunto

$$\Lambda_{M,C} = \{v \in C(\overline{\Omega}) ; \|v\|_{\infty} \leq M, |v(p_1) - v(p_2)| \leq C|Z(p_1) - Z(p_2)|^{\beta}, \forall p_1, p_2 \in \overline{\Omega}\}. \quad (5.25)$$

O conjunto $\Lambda_{M,C}$ é um subconjunto não vazio, fechado e convexo de $C(\overline{\Omega})$. Ademais, como consequência do Teorema de Arzelà-Ascoli, $\Lambda_{M,C}$ é compacto em $C(\overline{\Omega})$. Note também que $\Lambda_{M,C} \subset C_Z^{\beta}(\overline{\Omega})$.

Como no início do capítulo, seja

$$\sigma_M = \max_{1 \leq j \leq N} \{\sigma_j\}, \quad (5.26)$$

onde $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ são os respectivos tipos de L ao longo das componentes conexas de Σ , a saber, $\Sigma_1, \dots, \Sigma_N$. (Veja a Proposição 10, página 51, e a Observação 21, página 52).

Vamos tratar de dois tipos de equações semilineares. O primeiro tipo vem a seguir e o outro na página 100, descrita por (6.5).

Sejam $\Psi \in L^p(\overline{\Omega}; \mathbb{R}_+)$, $p > 2 + \sigma_M$, e $0 < \alpha \leq 1$. Definimos $\mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$ como sendo o conjunto das funções $F : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfazem

- $F(\cdot, \zeta) \in L^p(\overline{\Omega})$, para todo $\zeta \in \mathbb{C}$;
- $|F(x, y, \zeta_1) - F(x, y, \zeta_2)| \leq \Psi(x, y)|\zeta_1 - \zeta_2|^{\alpha}$, para todos $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}$.

Observação 24. A família $\mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$ é invariante por multiplicação por funções de $L^{\infty}(\Omega)$. Isto é, se $F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$ e $\varphi \in L^{\infty}(\Omega)$, então $\varphi F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$. Podemos escrever $L = \lambda H_Z$, com $\lambda \in C^1(\tilde{\Omega})$ e $|\lambda| > 0$ em $\tilde{\Omega}$, onde H_Z é o Hamiltoniano de Z (Veja a Proposição 9, página 49). Em particular, $\lambda, 1/\lambda \in C^1(\Omega) \cap L^{\infty}(\Omega)$. Assim, sem perda de generalidade, para estudar a existência de soluções para a equação $Lu = F(x, y, u)$ em Ω podemos supor que $L = H_Z$ em $\tilde{\Omega}$. (Veja também a Observação 20, página 50).

Teorema 7. Seja $F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$. Seja $\beta = (2 - q - \tau_M)/q$, sendo $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$ e $q = p/(p - 1)$, com p e σ_M dados na definição da família $\mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$. Então:

1. Se $0 < \alpha < 1$, a equação (5.24) tem solução $u \in C_Z^{\beta}(\overline{\Omega}) \subset C^{\beta}(\overline{\Omega})$.
2. Se $\alpha = 1$ e a constante $M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)$ que aparece no Teorema 4, página 72, satisfaz

$$M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|\Psi\|_p < 1,$$

então (5.24) tem uma solução $u \in C_Z^{\beta}(\overline{\Omega}) \subset C^{\beta}(\overline{\Omega})$.

Demonstração. Vamos supor $L = H_Z$ em $\tilde{\Omega}$ (Veja a Observação 24 acima).

Seja $C(\overline{\Omega})$ o espaço de Banach das funções contínuas em $\overline{\Omega}$ com a norma

$$\|u\|_{\infty} = \sup\{|u(x, y)|; (x, y) \in \overline{\Omega}\}.$$

Para $M_0 > 0$, seja $C_{M_0}(\overline{\Omega})$ o subconjunto fechado de $C(\overline{\Omega})$ dado por

$$C_{M_0}(\overline{\Omega}) = \{u \in C(\overline{\Omega}); \|u\|_{\infty} \leq M_0\}.$$

Suponha que $0 < \alpha < 1$. Então, para M_0 suficientemente grande, temos que

$$M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|\Psi\|_p M_0^{\alpha} + \|F(\cdot, 0)\|_p \} \leq M_0, \quad (5.27)$$

onde $M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ é dado pelo Teorema 4, página 72.

Considere o operador $P : C_{M_0}(\overline{\Omega}) \rightarrow C_{M_0}(\overline{\Omega})$ definido por

$$Pu = T_Z(F(\cdot, u)),$$

onde T_Z é dado por (5.5). O operador P é bem definido. De fato, para $F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\alpha}$ e $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$ temos

$$\|F(\cdot, u)\|_p \leq \|\Psi\|_p M_0^{\alpha} + \|F(\cdot, 0)\|_p, \quad (5.28)$$

e segue de (5.27), (5.28) e do Teorema 4 que para $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$, temos

$$|Pu(x, y)| \leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|\Psi\|_p M_0^{\alpha} + \|F(\cdot, 0)\|_p \} \leq M_0. \quad (5.29)$$

Além disso, para $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \overline{\Omega}$, temos

$$\begin{aligned} |Pu(x_1, y_1) - Pu(x_2, y_2)| &\leq |T_Z(F(\cdot, u))(x_1, y_1) - T_Z(F(\cdot, u))(x_2, y_2)| \\ &\leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|F(\cdot, u)\|_p |Z(x_1, y_1) - Z(x_2, y_2)|^{\beta} \\ &\leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|\Psi\|_p M_0^{\alpha} + \|F(\cdot, 0)\|_p \} |Z(x_1, y_1) - Z(x_2, y_2)|^{\beta} \\ &\leq C_0 |Z(x_1, y_1) - Z(x_2, y_2)|^{\beta}, \end{aligned}$$

onde $C_0 := C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|\Psi\|_p M_0^{\alpha} + \|F(\cdot, 0)\|_p \}$ e $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ é dado pelo Teorema 6, página 80.

Temos assim que $Pu \in \Lambda_{M_0, C_0}$, para todo $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$.

O operador P é contínuo. De fato, para $u, v \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$, temos

$$\begin{aligned} |Pu(x, y) - Pv(x, y)| &\leq |T_Z(F(\cdot, u) - F(\cdot, v))(x, y)| \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|F(\cdot, u) - F(\cdot, v)\|_p \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|\Psi\|_p \|u - v\|_{\infty}^{\alpha}. \end{aligned}$$

Assim, a restrição $P : \Lambda_{M_0, C_0} \rightarrow \Lambda_{M_0, C_0}$ é contínua. Portanto, pelo Teorema do Ponto Fixo de Schauder (Teorema 26, página 133), existe $u \in \Lambda_{M_0, C_0}$ tal que $Pu = u$. O ponto fixo

$$u = T_Z(F(\cdot, u)) \in C_Z^{\beta}(\overline{\Omega})$$

satisfaz $Lu(x, y) = F(x, y, u(x, y))$, $(x, y) \in \Omega$ (Teorema 5, página 78).

Agora, suponha que $\alpha = 1$ e $M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|\Psi\|_p < 1$. Se $M_0 > 0$ é tomado suficientemente grande, a desigualdade (5.27) vale. Deste modo, o mesmo argumento usado quando $\alpha < 1$, mostra a existência de $u \in C_Z^\beta(\bar{\Omega})$ satisfazendo (5.24) em Ω . $\square$

Agora, considere F dada por

$$F(x, y, \zeta) = g(x, y)H(x, y, \zeta) + f(x, y) \quad (5.30)$$

onde $f, g \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, e $H : \bar{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é contínua e limitada, com $\|H\|_\infty < K$ para alguma constante positiva K .

Teorema 8. Seja F dada por (6.5). Então, a equação $Lu = F(x, y, u)$ tem uma solução $u \in C_Z^\beta(\bar{\Omega})$ (β como no teorema anterior).

Demonstração. Como no teorema anterior, seguindo a linha de pensamento da Observação 24, vamos supor $L = H_Z$ em $\bar{\Omega}$.

Considere o operador $P : C(\bar{\Omega}) \rightarrow C(\bar{\Omega})$ definido por

$$Pu = T_Z(gH(\cdot, u) + f).$$

Como $H(\cdot, u) \in L^\infty(\Omega)$ temos $gH(\cdot, u) + f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Segue do Teorema 4, página 72, que para todo $(x, y) \in \bar{\Omega}$ temos

$$\begin{aligned} |Pu(x, y)| &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|gH(\cdot, u) + f\|_p \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|g\|_p \|H(\cdot, u)\|_\infty + \|f\|_p \} \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|g\|_p K + \|f\|_p \} =: M_0. \end{aligned}$$

Além disso, segue do Teorema 6, página 80, que para $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \bar{\Omega}$ e $u \in C(\bar{\Omega})$ existe uma constante $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$\begin{aligned} |Pu(x_1, y_1) - Pu(x_2, y_2)| &\leq |T_Z(gH(\cdot, u) + f)(x_1, y_1) - T_Z(gH(\cdot, u) + f)(x_2, y_2)| \\ &\leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|gH(\cdot, u) + f\|_p |Z(x_1, y_1) - Z(x_2, y_2)|^\beta \\ &\leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|g\|_p K + \|f\|_p \} |Z(x_1, y_1) - Z(x_2, y_2)|^\beta. \end{aligned}$$

Tomando $C_0 = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|g\|_p K + \|f\|_p \}$, obtemos $Pu \in \Lambda_{M_0, C_0}$, para todo $u \in C(\bar{\Omega})$.

O operador $P : \Lambda_{M_0, C_0} \rightarrow \Lambda_{M_0, C_0}$ é contínuo. De fato, H é uniformemente contínua no conjunto compacto $U = \bar{\Omega} \times \{\zeta \in \mathbb{C}; |\zeta| \leq M_0\}$; logo, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|H(x, y, \zeta_1) - H(x, y, \zeta_2)| < \frac{\varepsilon}{M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|g\|_p + 1 \}},$$

para todo $(x, y) \in \overline{\Omega}$ e $|\zeta_1 - \zeta_2| < \delta$. Assim, para $u, v \in \Lambda_{M_0, C_0}$ com $\|u - v\|_\infty < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |Pu(x, y) - Pv(x, y)| &\leq |T_Z(g\{H(\cdot, u) - H(\cdot, v)(x, y)\})| \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|g\{H(\cdot, u) - H(\cdot, v)\}\|_p \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|g\|_p \|H(\cdot, u) - H(\cdot, v)\|_\infty \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|g\|_p \frac{\varepsilon}{M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{\|g\|_p + 1\}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Portanto, pelo Teorema do Ponto Fixo de Schauder (Teorema 26, página 133), P possui um ponto fixo em Λ_{M_0, C_0} que satisfaz a conclusão do teorema. $\square$

5.5 Princípio da Similaridade

Seja $\tilde{\Omega}$ um aberto de $\mathbb{R}^2$ e seja L um campo vetorial complexo definido em $\tilde{\Omega}$ que pertence à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ (descrita na página 71. Veja também o Capítulo 3).

Seja Ω um aberto compactamente contido em $\tilde{\Omega}$. Nesta seção vamos estudar as soluções contínuas da equação

$$Lu = au + b\bar{u} \text{ em } \Omega, \quad (5.31)$$

onde $a, b \in L^p(\Omega)$. Mais precisamente, iremos provar (na página 96) uma versão do teorema que vem a seguir para a equação (5.31).

Teorema 9. (Princípio da Similaridade) *Seja D um aberto limitado de $\mathbb{C}$. Sejam $a, b \in L^p(D)$, $p > 2$. Se $u \in C(D)$ é solução da equação*

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = au + b\bar{u} \text{ em } D, \quad (5.32)$$

então existe uma função h holomorfa em D e uma função Hölder contínua $s \in C^\beta(\overline{D})$, $\beta = (2 - q)/q$, $q = p/(p - 1)$, tal que

$$u(z) = h(z)e^{s(z)}, \quad \forall z \in D. \quad (5.33)$$

Veja a demonstração deste resultado em (COURANT; HILBERT, 1962), (BEGEHR, 1994) e (VEKUA, 1962). As funções que satisfazem a equação (5.32) são chamadas de *funções analíticas generalizadas* (ou *funções pseudo-analíticas*). Tais funções, são objeto de estudo de vários trabalhos pelo fato de compartilharem muitas propriedades com funções analíticas (funções holomorfas de uma variável complexa). Veja também (BERS, 1956).

Em geral, o princípio de similaridade é válido para campos vetoriais elíticos, pois, dado um campo vetorial elítico L , é possível obter uma mudança de variável que torna L um múltiplo (não singular) do operador de Cauchy-Riemann $\partial/\partial\bar{z}$ (veja a Observação 9 na página 32).

O corolário a seguir segue a linha do comentário acima.

Corolário 7. Seja L um campo elítico de classe C^1 em $\tilde{\Omega}$ e seja $Z : V \rightarrow \mathbb{C}$, com V um aberto de $\tilde{\Omega}$, uma integral primeira, de classe C^2 , de L em V . Se $u \in C(U)$, com U um aberto compactamente contido em V , tal que $Lu = au + b\bar{u}$ em U , com $a, b \in L^p(U)$, $p > 2$, então existe uma função holomorfa $h : Z(U) \rightarrow \mathbb{C}$ e uma função Hölder contínua $s \in C^\beta(Z(\bar{U}))$, com $\beta = (2 - q)/q$, $q = p/(p - 1)$, tais que

$$u(x, y) = h(Z(x, y))e^{s(Z(x, y))} \text{ para } (x, y) \in U.$$

Demonstração. Podemos escrever L da forma

$$L = \lambda H_Z \text{ em } V,$$

onde H_Z é o Hamiltoniano de Z e λ é uma função de classe C^1 em V tal que $|\lambda| > 0$ em V (Proposição 4, página 33). Daí, $1/\lambda \in L^\infty(U) \cap C^1(U)$ e $a/\lambda, b/\lambda \in L^p(\Omega)$, $p > 2$.

Logo, como $Lu = au + b\bar{u}$ em U , dado $\psi \in C_c^\infty(Z(U))$, temos

$$\langle H_Z u, \phi \rangle = \left\langle \frac{a}{\lambda} u + \frac{b}{\lambda} \bar{u}, \phi \right\rangle, \text{ para } \phi := \psi \circ Z.$$

Como L é elítico, temos que $\det(DZ)(x, y) \neq 0$ para todo $(x, y) \in V$. Daí, podemos usar Z para fazer mudança de coordenadas. Temos

$$\langle H_Z u, \phi \rangle = - \int_U u(x, y) H_Z(x, y) dx dy = -2ic \int_{Z(U)} (u \circ Z^{-1})(\zeta) \partial_{\bar{\zeta}} \psi(\zeta) d\xi d\eta,$$

onde $c = -1$ ou 1 e $\zeta = \xi + i\eta$. (Veja a demonstração da Proposição 5, página 34). Por outro lado,

$$\left\langle \frac{a}{\lambda} u + \frac{b}{\lambda} \bar{u}, \phi \right\rangle = \int_U \left(\frac{a}{\lambda} u + \frac{b}{\lambda} \bar{u} \right)(x, y) \phi(x, y) dx dy = \int_{Z(U)} (\tilde{a}(u \circ Z^{-1}) + \tilde{b}(\overline{u \circ Z^{-1}}))(\zeta) \psi(\zeta) d\xi d\eta,$$

onde $\tilde{a} = \left(\frac{a}{\lambda \det(DZ)} \right) \circ Z^{-1}$, $\tilde{b} = \left(\frac{b}{\lambda \det(DZ)} \right) \circ Z^{-1}$. Segue daí que

$$\partial_{\bar{\zeta}}(u \circ F^{-1}) = \frac{\tilde{a}}{2ic}(u \circ F^{-1}) + \frac{\tilde{b}}{2ic}(\overline{u \circ F^{-1}}) \text{ em } Z(U).$$

Note que $\tilde{a}/2ic, \tilde{b}/2ic \in L^p(Z(U))$. Pelo Teorema 9 existem h holomorfa em $Z(U)$ e $s \in C^\beta(Z(\bar{U}))$, com $\beta = (2 - q)/q$, $q = p/(p - 1)$, tais que

$$(u \circ Z^{-1})(\zeta) = h(\zeta)e^{s(\zeta)}, \text{ para todo } \zeta \in Z(U).$$

Compondo a igualdade acima com Z obtemos o resultado. □

5.5.1 Lemas de diferenciação

Seja $\tilde{\Omega}$ um aberto conexo de $\mathbb{R}^2$ e seja Ω um aberto conexo compactamente contido em $\tilde{\Omega}$, isto é, $\bar{\Omega}$ é um compacto de $\mathbb{R}^2$ e $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$. Considere o campo vetorial

$$L = A \frac{\partial}{\partial x} + B \frac{\partial}{\partial y} \text{ em } \tilde{\Omega},$$

sendo $A, B \in C^1(\tilde{\Omega})$.

Seja $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, com $\text{supp}(\phi) \subset \{p \in \mathbb{R}^2; |p| \leq 1\}$, $\phi \geq 0$ e $\int_{\mathbb{R}^2} \phi(p) dp = 1$. Para $\varepsilon > 0$ considere $\phi_\varepsilon(p) = \phi(p/\varepsilon)\varepsilon^{-2}$. Para $u \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^2)$ definimos

$$u_\varepsilon(p) := u * \phi_\varepsilon(p) = \int_{\mathbb{R}^2} u(p-q)\phi_\varepsilon(q) dq, \quad p \in \mathbb{R}^2.$$

Temos que $u_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ e $\text{supp}(u_\varepsilon) = \{p \in \mathbb{R}^2; |p| \leq \varepsilon\} + \text{supp}(u)$.

Lema 10. • Se $u \in C_c^k(\mathbb{R}^2)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, então para $0 \leq m+n \leq k$, temos

$$\left\| \frac{\partial^{m+n} u_\varepsilon}{\partial x^m \partial y^n} - \frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n} \right\|_\infty \rightarrow 0 \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0;$$

• Se $u \in L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 \leq p < \infty$, então $\|u_\varepsilon - u\|_p \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Veja (HöRMANDER, a).

□

Vamos utilizar um caso particular do Lema de Friedrichs, o qual pode ser visto em (HöRMANDER, b):

Lema 11. (Friedrichs) Seja $v \in L^p(\mathbb{R}^2)$, $1 \leq p < \infty$, e $a \in C_c^1(\mathbb{R}^2)$. Então

$$\|(a\partial_j v) * \phi_\varepsilon - a\partial_j(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} \rightarrow 0 \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

□

Seja $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ tal que $\chi = 1$ in $\overline{\Omega}$ e $\chi = 0$ in $\mathbb{R}^2 \setminus \tilde{\Omega}$. Considere

$$\tilde{A} = \chi A \text{ e } \tilde{B} = \chi B,$$

onde A e B são os coeficientes do campo L dado no início da seção. Defina

$$\tilde{L} = \tilde{A} \frac{\partial}{\partial x} + \tilde{B} \frac{\partial}{\partial y} \text{ em } \mathbb{R}^2.$$

Observe que $\tilde{L} = L$ em Ω e $\tilde{A}, \tilde{B} \in C_c^1(\mathbb{R}^2)$.

Corolário 8. Seja $v \in L^\infty(\Omega)$ tal que $L(v) \in L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Então

$$\|L(v) - L(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} \rightarrow 0, \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Demonstração. Podemos supor que $v \in L^p(\mathbb{R}^2)$ tomando $v = 0$ em $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$. Temos

$$\begin{aligned} \|Lv - L(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} &= \|\tilde{L}v - \tilde{L}(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} \\ &\leq \|\tilde{L}(v) - (\tilde{L}(v)) * \phi_\varepsilon\|_{p,\Omega} + \|(\tilde{L}(v)) * \phi_\varepsilon - \tilde{L}(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega}. \end{aligned}$$

O resultado segue da desigualdade acima. De fato, analisando os termos da desigualdade acima temos que

$$\|\tilde{L}(v) - (\tilde{L}(v)) * \phi_\varepsilon\|_{p,\Omega} \rightarrow 0 \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0,$$

pelo Lema 10. Temos também que

$$\|(\tilde{L}(v)) * \phi_\varepsilon - \tilde{L}(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} \rightarrow 0 \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0,$$

como uma consequência do Lema 11 devido à seguinte estimativa:

$$\begin{aligned} \|(\tilde{L}v) * \phi_\varepsilon - \tilde{L}(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} &= \|(\tilde{A}\partial_x v) * \phi_\varepsilon + (\tilde{B}\partial_y v) * \phi_\varepsilon - \tilde{A}\partial_x(v * \phi_\varepsilon) - \tilde{B}\partial_x(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} \\ &\leq \|(\tilde{A}\partial_x v) * \phi_\varepsilon - \tilde{A}\partial_x(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega} + \|(\tilde{B}\partial_y v) * \phi_\varepsilon - \tilde{B}\partial_x(v * \phi_\varepsilon)\|_{p,\Omega}. \end{aligned}$$

□

Os Lemas 12 e 13 que veremos a seguir são versões mais simples, em certo sentido, de um lema de (BERHANU; HOUNIE; SANTIAGO, 2001).

Lema 12. Sejam $u, v \in L^\infty(\Omega)$ tais que $f := Lu, g := Lv \in L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Então,

$$L(uv) = fv + ug \text{ em } \Omega.$$

Demonstração. Podemos supor $u, v \in L^\infty(\mathbb{R}^2)$ tomando $u = v = 0$ em $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$. Considere as regularizações,

$$u_\varepsilon = \phi_\varepsilon * u \text{ e } v_\varepsilon = \phi_\varepsilon * v.$$

Seja $f_\varepsilon := L(u_\varepsilon)$ e $g_\varepsilon = L(v_\varepsilon)$. Pelo Corolário 8,

$$f_\varepsilon \rightarrow f \text{ e } g_\varepsilon \rightarrow g \text{ em } L^p(\Omega).$$

Podemos escrever

$$ug - u_\varepsilon g_\varepsilon = u(g - g_\varepsilon) + (u - u_\varepsilon)g_\varepsilon.$$

Logo,

$$\|ug - u_\varepsilon g_\varepsilon\|_p \leq \|u\|_\infty \|g - g_\varepsilon\|_p + \|u - u_\varepsilon\|_\infty \|g_\varepsilon\|_p; \quad (5.34)$$

lembrando que g_ε converge para g em $L^p(\Omega)$, temos que existe uma constante $M > 0$ tal que $\|g_\varepsilon\|_p \leq M$; assim, pela desigualdade (5.34) segue que

$$u_\varepsilon g_\varepsilon \rightarrow ug \text{ em } L^p(\Omega). \quad (5.35)$$

Da mesma forma, temos que

$$v_\varepsilon f_\varepsilon \rightarrow vf \text{ em } L^p(\Omega). \quad (5.36)$$

Como,

$$\|L(u_\varepsilon v_\varepsilon) - fv - ug\|_p \leq \|f_\varepsilon v_\varepsilon - fv\|_p + \|u_\varepsilon g_\varepsilon - ug\|_p,$$

por (5.35) e (5.36) temos

$$L(u_\varepsilon v_\varepsilon) \rightarrow fv + ug \text{ em } L^p(\Omega).$$

Dado $\varphi \in C_c^1(\Omega)$, temos

$$\begin{aligned} |\langle L(u_\varepsilon v_\varepsilon) - (fv + ug), \varphi \rangle| &\leq \int_\Omega |(L(u_\varepsilon v_\varepsilon) - fv - ug)(\xi, \eta) \varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\ &\leq \|\varphi\|_q \|L(u_\varepsilon v_\varepsilon) - fv - ug\|_p, \end{aligned}$$

onde $1/p + 1/q = 1$. Assim,

$$|\langle L(u_\varepsilon v_\varepsilon) - (fv + ug), \varphi \rangle| \rightarrow 0 \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto,

$$L(u_\varepsilon v_\varepsilon) \rightarrow fv + ug \text{ em } \mathcal{D}'(\Omega). \quad (5.37)$$

Por outro lado, dada $\varphi \in C_c^1(\Omega)$,

$$\begin{aligned} |\langle L(u_\varepsilon v_\varepsilon) - L(uv), \varphi \rangle| &= |\langle L(u_\varepsilon v_\varepsilon - uv), \varphi \rangle| \leq \int_\Omega |(u_\varepsilon v_\varepsilon - uv)(\xi, \eta)^t L\varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\ &\leq \|{}^t L\varphi\|_q \|u_\varepsilon v_\varepsilon - uv\|_p \leq \|{}^t L\varphi\|_q \{ \|v_\varepsilon\|_\infty \|u_\varepsilon - u\|_p + \|u\|_\infty \|v_\varepsilon - v\|_p \}, \end{aligned}$$

onde $1/p + 1/q = 1$. Observe que $u, v \in L^\infty(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ e $\|v_\varepsilon\|_\infty \leq \|v\|_\infty$. Segue que

$$L(u_\varepsilon v_\varepsilon) \rightarrow L(uv) \text{ em } \mathcal{D}'(\Omega). \quad (5.38)$$

Por (5.37) e (5.38),

$$L(uv) = fv + ug \text{ em } \mathcal{D}'(\Omega).$$

□

Lema 13. Seja $g \in C(\overline{\Omega})$ tal que $Lg \in L^p(\Omega)$, $1 \leq p < \infty$. Então,

$$L(e^g) = e^g Lg \text{ em } \Omega.$$

Demonstração. Seja $g_\varepsilon = \phi_\varepsilon * g$. Como e^z é uma função Lipschitz no conjunto limitado $\{z \in \mathbb{C} ; |z| \leq 2\|g\|_\infty\}$ e $\|g_\varepsilon\|_\infty \leq \|g\|_\infty$ para todo $\varepsilon > 0$, existe uma constante $K > 0$ tal que

$$\|e^{g_\varepsilon} - e^g\|_\infty \leq K\|g - g_\varepsilon\|_\infty \text{ para todo } \varepsilon > 0.$$

Assim, temos a seguinte estimativa:

$$\|e^g L(g) - e^{g_\varepsilon} L(g_\varepsilon)\|_p \leq \|e^g L(g) - e^{g_\varepsilon} L(g)\|_p + \|e^{g_\varepsilon} L(g) - e^{g_\varepsilon} L(g_\varepsilon)\|_p$$

$$\begin{aligned}
&\leq \|L(g)\|_p \|e^g - e^{g_\varepsilon}\|_\infty + \|e^{g_\varepsilon}\|_\infty \|L(g) - L(g_\varepsilon)\|_p \\
&\leq \|L(g)\|_p K \|g - g_\varepsilon\|_\infty + e^{\|g\|_\infty} \|L(g) - L(g_\varepsilon)\|_p.
\end{aligned}$$

Logo, pelo Corolário 8 temos que

$$\|L(e^{g_\varepsilon}) - e^g L(g)\|_p \rightarrow 0 \text{ quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Segue que

$$L(e^{g_\varepsilon}) \rightarrow e^g L(g) \text{ em } \mathcal{D}'(\Omega). \quad (5.39)$$

Por outro lado, dado $\varphi \in C_c^1(\Omega)$,

$$\begin{aligned}
|\langle L(e^{g_\varepsilon}) - L(e^g), \varphi \rangle| &\leq \int_\Omega |(e^{g_\varepsilon} - e^g)(\xi, \eta)| |{}^t L\varphi(\xi, \eta)| d\xi d\eta \leq |\Omega| \|{}^t L\varphi\|_\infty \|e^{g_\varepsilon} - e^g\|_\infty \\
&\leq |\Omega| \|{}^t L\varphi\|_\infty K \|g_\varepsilon - g\|_\infty.
\end{aligned}$$

Segue que

$$L(e^{g_\varepsilon}) \rightarrow L(e^g) \text{ em } \mathcal{D}'(\Omega). \quad (5.40)$$

Por (5.39) e (5.40)

$$L(e^g) = e^g L(g) \text{ em } \mathcal{D}'(\Omega).$$

□

Agora, vamos demonstrar um resultado análogo aos Lemas 12 e 13 no caso em que L é o campo em estudo nesse texto. Seja L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$ pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Ressaltamos que o estudo que será feito a seguir só tem relevância quando L não é de classe C^1 , uma vez que o caso de L de classe C^1 já está demonstrado acima.

Seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, que é um homeomorfismo sobre sua imagem. Sem perda de generalidade, como fizemos na seção anterior, podemos supor

$$L = H_Z \text{ em } \tilde{\Omega},$$

onde H_Z é o hamiltoniano de Z .

A partir de agora, suponha que $u, v \in C(\overline{\Omega})$ e $f := Lu, g := Lv \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$ (onde $\sigma_M > 0$ é dado em (5.4), página 72)

O campo L é de classe C^1 em $\Omega \setminus \Sigma$ (condição (iii), página 71). Segue do Lema 12 que

$$L(uv) = fv + ug \text{ em } \Omega \setminus \Sigma.$$

Defina

$$F = fv + ug \text{ em } \Omega.$$

Note que $F \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$. Logo, $T_Z F \in C(\overline{\Omega})$ (Teorema 6, página 80) e $L(T_Z F) = F$ em Ω (Teorema 5, página 78). Defina

$$H = uv - T_Z F \text{ em } \Omega.$$

Assim, $H \in C(\overline{\Omega})$ e $LH = 0$ em $\Omega \setminus \Sigma$. Seja $h : Z(\overline{\Omega}) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$h = H \circ Z^{-1}.$$

Temos que h é contínua em $Z(\overline{\Omega})$. Além disso, com um argumento análogo ao da demonstração do Teorema 2 (página 53), usando o Teorema de extensão de funções holomorfas (Teorema 23, página 132), podemos demonstrar que h é holomorfa em $Z(\Omega)$. Segue daí que $H = h \circ Z$ é solução do campo L em Ω , isto é, $LH = 0$ em Ω .

Logo, temos que

$$L(uv) = L(T_Z F + H) = L(T_Z F) = fv + ug \text{ em } \Omega.$$

Usando o Lema 13 e um argumento análogo ao acima, é possível demonstrar que se $g \in C(\overline{\Omega})$ e $Lg \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, então

$$L(e^g) = e^g Lg \text{ em } \Omega.$$

Portanto, fica demonstrado o seguinte lema:

Lema 14. Seja L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ e pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ (descrita na página 71. Veja também o Capítulo 3). Seja Ω um aberto compactamente contido em $\tilde{\Omega}$ e $\sigma_M > 0$ dado por (5.4) (na página 72).

1. Se $u, v \in C(\overline{\Omega})$ e $Lu, Lv \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, então

$$L(uv) = L(u)v + uL(v) \text{ em } \Omega.$$

2. Se $g \in C(\overline{\Omega})$ e $Lg \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, então

$$L(e^g) = e^g L(g) \text{ em } \Omega.$$

□

5.5.2 Princípio da Similaridade para L

Sejam $\tilde{\Omega}$ um aberto de $\mathbb{R}^2$, Ω um aberto conexo compactamente contido em $\tilde{\Omega}$, L um campo vetorial complexo definido em $\tilde{\Omega}$ que pertence a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ (descrita na página 71. Veja também o Capítulo 3) e $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L , de classe $C^{1+\varepsilon}$, com Z homeomorfismo sobre sua imagem.

O Princípio da Similaridade para algumas classes de campos vetoriais já foi estudado em (MEZIANI, 1999), (BERHANU; HOUNIE; SANTIAGO, 2001) e (MEZIANI, 2005). Como consequência dos teoremas de resolubilidade (Teorema 5, página 85, e 8, página 88), iremos provar o Princípio da Similaridade para o campo L .

O teorema a seguir pode ser encontrado em (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2017).

Teorema 10. (Princípio da Similaridade para o campo L) Seja $a, b \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, $\sigma_M > 0$ (dado por (5.4), página 72). Então, para toda $u \in C(\Omega)$ solução da equação

$$Lu = au + b\bar{u} \text{ em } \Omega \quad (5.41)$$

existe uma função h holomorfa em $Z(\Omega)$ e uma função $s \in C^\beta(\bar{\Omega})$, $\beta = (2 - q - \tau_M)/q$, $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$, $q = p/(p - 1)$, tal que

$$u(x, y) = h(Z(x, y))e^{s(x, y)}, \quad \forall (x, y) \in \Omega. \quad (5.42)$$

Reciprocamente, para toda função holomorfa h em $Z(\Omega)$ existe $s \in C^\beta(\bar{\Omega})$ tal que a função u dada por (5.42) é solução da equação (5.41).

Demonstração. Esta demonstração é uma adaptação da prova do Teorema 4.1 do artigo (MEZIANI, 2005).

Como na seção anterior, podemos supor sem perda de generalidade que $L = H_Z$ em $\tilde{\Omega}$.

Suponha que $u \in C(\Omega)$ e que u não é identicamente nula. Como L pertence a classe $\mathcal{R}(\tilde{\Omega})$ segue que L é elítico de classe C^1 em $\Omega \setminus \Sigma$ e Z é de classe C^2 em $\Omega \setminus \Sigma$ (lembrando que Σ denota o conjunto característico de L). Assim, pelo Corolário 7 (página 90) a função u possui uma representação da forma (5.42) em uma vizinhança de cada ponto $(x, y) \notin \Sigma$. Logo, u possui zeros isolados em $\Omega \setminus \Sigma$. Defina a função ϕ em Ω por $\phi = \bar{u}/u$ nos pontos onde u é não nula e $\phi = 0$ sobre Σ e nos pontos onde $u = 0$. Note que $\phi \in L^\infty(\Omega)$. Segue que $a + b\phi \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Considere a equação

$$Ls = -(a + b\phi) \text{ em } \Omega. \quad (5.43)$$

Pelos teoremas 5 (página 78) e 6 (página 80) esta equação possui uma solução $s \in C^\beta(\bar{\Omega})$, com $\beta = (2 - q - \tau_M)/q$, $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$ e $q = p/(p - 1)$. Defina

$$v = ue^s \text{ em } \Omega.$$

Temos que $v \in C(\bar{\Omega})$ e pelo Lema 14 (página 95), aplicado localmente, temos que

$$Lv = 0 \text{ em } \Omega.$$

Então, v pode ser fatorada como

$$v = h \circ Z \text{ em } \Omega,$$

com h holomorfa em $Z(\Omega)$ (Teorema 2, página 53). Isto prova a primeira parte do teorema.

Agora, seja h uma função holomorfa em $Z(\Omega)$. Defina a função ϕ em $Z(\Omega)$ por $\phi = \bar{h}/h$ nos pontos onde h não se anula e $\phi = 0$ nos pontos onde $h = 0$. Então, $\tilde{\phi} = \phi \circ Z \in L^\infty(\Omega)$. Consequentemente, $b\tilde{\phi} \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Assim, pelo Teorema 8 (página 88) a equação

$$Ls = a + b\tilde{\phi}e^{\bar{s}-s} \text{ em } \Omega,$$

tem uma solução $s \in C^\beta(\overline{\Omega})$ ($0 < \beta < 1$ como acima). Segue que, u dada por

$$u(x, y) = h(Z(x, y))e^{s(x, y)}, \quad (x, y) \in \Omega,$$

é solução de (5.41) em Ω .

□

O PROBLEMA DE RIEMANN-HILBERT

Seja L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$. Seja Ω um aberto simplesmente conexo limitado, com bordo de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 < \varepsilon < 1$, compactamente contido em $\tilde{\Omega}$, isto é, Ω é um compacto de $\mathbb{R}^2$ e $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$.

Seja $F : \bar{\Omega} \times V \rightarrow \mathbb{C}$, onde V é um aberto de $\mathbb{C}$, uma função. Neste capítulo vamos estudar o seguinte problema de contorno:

$$\begin{cases} Lu = F(x, y, u) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \phi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.1)$$

onde $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega)$, $|\Lambda| = 1$, $\phi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$.

O Problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = F(x, y, u)$ consiste em encontrar uma solução contínua para o problema de contorno acima. Para L pertencente à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ e $F \in \mathcal{F}_\Psi^\beta \cup \mathcal{F}$ obtemos soluções Hölder contínuas para o problema. Descreveremos a seguir a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ (que é a classe central de estudo dessa tese) e as famílias de funções $\mathcal{F}_\Psi^\beta$ e $\mathcal{F}$.

A classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ foi definida inicialmente na Seção 3.1 (página 47) onde foram estudadas suas propriedades.

Dizemos que um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$ pertence à classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ se L satisfaz as seguintes condições:

- (i) L é um campo não singular de classe C^ε , $0 < \varepsilon < 1$, em $\tilde{\Omega}$;
- (ii) O conjunto característico Σ de L é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1 de $\tilde{\Omega}$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, com um número finito de componentes conexas;
- (iii) L é de classe C^1 em $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$;
- (iv) Para cada $p \in \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, existe uma integral primeira $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de L , de classe C^2 , com $U \subset \tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ aberto e $p \in U$, tal que $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo;

- (v) Para cada $p \in \Sigma$, existem uma integral primeira $Z : U \rightarrow \mathbb{C}$ de L , com $U \subset \tilde{\Omega}$ uma vizinhança aberta de p , tal que $Z : U \rightarrow Z(U) \subset \mathbb{C}$ é um homeomorfismo que satisfaz $Z_{xy}, Z_{yx} \in C(U)$ e $Z_{xy} = Z_{yx}$ em U , e coordenadas locais (s, t) em U , de classe C^2 centradas em p , tal que nas novas variáveis a integral primeira Z se escreve como

$$Z_{\sigma, \beta}(s, t) = s + i \left(\frac{t|t|^\sigma}{\sigma + 1} + \beta(s) \right), \quad (6.2)$$

onde β é uma função a valores reais de classe $C^{2+\varepsilon}$ que depende apenas de s e $\sigma \geq \varepsilon$ é uma constante. Além disso, Z satisfaz a seguinte condição: se $L = A\partial_x + B\partial_y$ em $\tilde{\Omega}$, então a função $\lambda : U \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\lambda(x, y) = \begin{cases} \frac{A(x, y)}{Z_y(x, y)}, & \text{se } Z_y(x, y) \neq 0, \\ -\frac{B(x, y)}{Z_x(x, y)}, & \text{se } Z_x(x, y) \neq 0. \end{cases} \quad (6.3)$$

é de classe C^1 em U .

Seja L um campo vetorial complexo definido no aberto $\tilde{\Omega}$ pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Como no capítulo anterior, seja

$$\sigma_M = \max_{1 \leq j \leq N} \{\sigma_j\}, \quad (6.4)$$

onde $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ são os respectivos tipos de L ao longo das componentes conexas de Σ , a saber, $\Sigma_1, \dots, \Sigma_N$. (Veja a Proposição 10, página 51, e a Observação 21, página 52).

Agora, vamos definir as famílias de funções $\mathcal{F}_\Psi^\beta$ e $\mathcal{F}$. Recorde que no capítulo anterior estudamos a equação $Lu = F(x, y, u)$ para estas famílias de funções.

Seja $\Psi \in L^p(\overline{\Omega}; \mathbb{R}_+)$, com $p > 2 + \sigma_M$, $\sigma_M > 0$ dado em (6.4) e seja β uma constante tal que $0 < \beta \leq 1$. Definimos $\mathcal{F}_\Psi^\beta$ como o conjunto das funções $F : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfazem

- $F(\cdot, \zeta) \in L^p(\overline{\Omega})$, para todo $\zeta \in \mathbb{C}$;
- $|F(x, y, \zeta_1) - F(x, y, \zeta_2)| \leq \Psi(x, y)|\zeta_1 - \zeta_2|^\beta$, para todos $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}$.

Chamamos de $\mathcal{F}$ o conjunto das F que têm a forma

$$F(x, y, \zeta) = g(x, y)Q(x, y, \zeta) + f(x, y) \quad (6.5)$$

onde $f, g \in L^p(\overline{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$ e $Q : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função contínua e limitada.

Um caso particular interessante, que estudaremos na Seção 6.5, é quando a equação diferencial do problema de Riemann-Hilbert é do tipo Vekua, isto é, a função F que aparece no problema de contorno (6.1) pertence à família $\mathcal{F}_\Psi^1$ e é da forma

$$F(x, y, u) = a(x, y)u + b(x, y)\bar{u} + f(x, y), \text{ com } a, b, f \in L^p(\Omega), p > 2 + \sigma_M.$$

Esta equação tem um comportamento linear na variável u , quando consideramos u como elemento do espaço vetorial das funções contínuas em $\bar{\Omega}$ com escalares *reais* (com escalares complexos a linearidade não ocorre). Este caso será tratado separadamente dos outros casos pelo fato da técnica aplicada a ele ser diferente. Veja a Seção 6.5, página 118.

6.1 O operador integral $T_{\mathcal{L}}^K$

Sejam $\tilde{\Omega}$, Ω abertos e L um campo vetorial complexo pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$ como anteriormente. Seja

$$Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C} \quad (6.6)$$

uma integral primeira global de L de classe $C^{1+\varepsilon}$ que é um homeomorfismo sobre sua imagem. A existência de Z é dada pela Proposição 7, página 37.

Na Seção 5.1 definimos o operador integral T_Z , para $f \in L^1(\Omega)$, dado por

$$T_Z f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{Z(\xi, \eta) - Z(x, y)} d\xi d\eta, \quad (x, y) \in \bar{\Omega}.$$

Para facilitar a leitura, vamos listar as boas propriedades do operador T_Z .

- (1) Continuidade: o operador $T_Z : L^p(\bar{\Omega}) \rightarrow C(\bar{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$ (onde $\sigma_M > 0$ é dado em (5.4), na página 72), é contínuo, mais que isso, valem as seguintes desigualdades: para $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, existe uma constante $M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$|T_Z f(x, y)| \leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|f\|_p, \quad \forall (x, y) \in \bar{\Omega},$$

(Teorema 4, página 72) e existe uma constante $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$|T_Z f(p_1) - T_Z f(p_2)| \leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|f\|_p |Z(p_1) - Z(p_2)|^\beta, \quad \forall p_1, p_2 \in \bar{\Omega}$$

onde $\beta = \frac{2-q-\tau_M}{q}$, com $q = \frac{p}{p-1}$ e $\tau_M = \frac{\sigma_M}{\sigma_M + 1}$ (Teorema 6, página 80).

- (2) Resolubilidade: Para $f \in L^1(\Omega)$ temos $H_Z(T_Z f) = f$ em Ω , onde H_Z é o Hamiltoniano de Z (Teorema 5, página 78). Como $L = \lambda H_Z$, com $\lambda \in C^1(\tilde{\Omega})$ e $|\lambda| > 0$ em $\tilde{\Omega}$, temos $u = T_Z(f/\lambda)$ é solução da equação $Lu = f$ em Ω (Corolário 4, página 79).

O operador integral que definiremos a seguir é uma modificação de T_Z para tratarmos do estudo de problemas de contorno. Tal modificação não afeta as boas propriedades descritas acima como veremos nos próximos resultados.

A partir de agora, vamos supor que $\partial\Omega$ é transversal a L , isto é, se $L = A\partial_x + B\partial_y$ em $\tilde{\Omega}$, então

$$i^* \omega \neq 0,$$

onde $\omega = Bdx - Ady$ (é uma 1-forma ortogonal a $L = A\partial_x + B\partial_y$) e $i : \partial\Omega \rightarrow \tilde{\Omega}$ é a aplicação de inclusão.

Como consequência da transversalidade, $Z(\partial\Omega)$ é uma curva fechada simples de classe $C^{1+\varepsilon}$. Veja a Seção 2.5 (página 44).

Proposição 18. Seja Z como em (6.6). Existe um homeomorfismo de classe C^1 , $\mathcal{Z} : U \rightarrow W$, onde $U \subset \tilde{\Omega}$ aberto com $\bar{\Omega} \subset U$ e W um aberto de $\mathbb{C}$ com $\bar{\mathbb{D}} \subset W$, tal que $L\mathcal{Z} = 0$ em Ω e $\mathcal{Z}(\bar{\Omega}) = \bar{\mathbb{D}}$. Mais do que isso, vale a seguinte fatoração

$$\mathcal{Z} = h \circ Z \text{ em } U,$$

onde $h : Z(U) \rightarrow W$ é um difeomorfismo de classe C^1 tal que h é holomorfo em $Z(\Omega)$ e $h(Z(\bar{\Omega})) = \bar{\mathbb{D}}$.

Demonstração. Como $\partial\Omega$ é transversal a L , temos que $Z(\partial\Omega)$ é uma curva fechada simples de classe $C^{1+\varepsilon}$. Pelo Teorema 21, página 131, existe um difeomorfismo $h : \bar{V} \rightarrow \bar{W} \subset \mathbb{C}$, com $V, W \subset \mathbb{C}$ abertos, $Z(\bar{\Omega}) \subset V$ e $\bar{\mathbb{D}} \subset W$, tal que h é holomorfa em $Z(\Omega)$ e $h(Z(\bar{\Omega})) = \bar{\mathbb{D}}$. Assim, $\mathcal{Z} : U \rightarrow W$, $U = Z^{-1}(V) \subset \tilde{\Omega}$, dada por $\mathcal{Z} = h \circ Z$ é um homeomorfismo (de classe C^1) com $L\mathcal{Z} = 0$ em Ω e $\mathcal{Z}(\bar{\Omega}) = \bar{\mathbb{D}}$. $\square$

A função $\mathcal{Z}$, dada pela proposição acima, é uma integral primeira de L em Ω e mantém as boas propriedades da integral primeira Z relativas as estimativas do tipo que se encontram no item (1), da lista de boas propriedades do operador T_Z feita acima, como veremos a seguir.

O próximo resultado é consequência da fatoração descrita na Proposição 18 acima.

Teorema 11. Para $f \in L^1(\Omega)$ considere $T_{\mathcal{Z}}f$ definido por

$$T_{\mathcal{Z}}f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}(x, y)} d\xi d\eta, \quad (x, y) \in \bar{\Omega},$$

sendo $\mathcal{Z}$ dada pela Proposição 18.

(1)' Para $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, existe uma constante $M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$|T_{\mathcal{Z}}f(x, y)| \leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|f\|_p, \quad \forall (x, y) \in \bar{\Omega},$$

e existe uma constante $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$|T_{\mathcal{Z}}f(p_1) - T_{\mathcal{Z}}f(p_2)| \leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|f\|_p |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\beta, \quad \forall p_1, p_2 \in \bar{\Omega},$$

sendo $\beta = \frac{2-q-\tau_M}{q}$, com $q = \frac{p}{p-1}$ e $\tau_M = \frac{\sigma_M}{\sigma_M + 1}$.

(2)' Para $f \in L^1(\Omega)$, temos $H_{\mathcal{Z}}(T_{\mathcal{Z}}f) = f$ em Ω , onde $H_{\mathcal{Z}}$ é o Hamiltoniano de $\mathcal{Z}$.

Demonstração. Usando a notação da Proposição 18 acima podemos escrever

$$\mathcal{Z} = h \circ Z \text{ em } U. \quad (6.7)$$

Seja K a constante de Lipschitz de h^{-1} em $\overline{W}$. Então, para $p_1, p_2 \in U$, temos

$$|Z(p_1) - Z(p_2)| \leq K|h(Z(p_1)) - h(Z(p_2))| = K|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|.$$

Daí,

$$\frac{1}{|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|} \leq \frac{K}{|Z(p_1) - Z(p_2)|}, \quad p_1, p_2 \in U.$$

Aplicando a desigualdade acima podemos generalizar as estimativas de $T_Z f$ para $T_{\mathcal{Z}} f$. Isto é, podemos usar o item (1) acima para provar o item (1)'. De fato, seja $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Usando a desigualdade de Hölder e a desigualdade acima, com $q = p/(p-1)$, temos

$$|T_{\mathcal{Z}} f(x, y)| \leq \|f\|_p \left(\int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|\mathcal{Z}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}(x, y)|^q} \right)^{\frac{1}{q}} \leq K^{\frac{1}{q}} \|f\|_p \left(\int_{\Omega} \frac{d\xi d\eta}{|Z(\xi, \eta) - Z(x, y)|^q} \right)^{\frac{1}{q}} \leq M,$$

para $(x, y) \in U$, onde $M = M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ e a última desigualdade são dados pelo item (1) acima (que correspondem ao Teorema 4, página 72). Da mesma forma demonstramos a estima Hölder.

O item (2)' segue do item (2) acima (que corresponde ao Teorema 5, página 78) e do fato de h ser holomorfa em $Z(\Omega)$. $\square$

Observação 25. Como $L = \lambda H_{\mathcal{Z}}$, com $\lambda \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ e $|\lambda| > 0$ em $\overline{\Omega}$, temos pelo item (2)' do Teorema acima que se $f \in L^1(\Omega)$, então $u = T_{\mathcal{Z}}(f/\lambda)$ é solução da equação $Lu = f$ em Ω .

Observação 26. As famílias de funções $\mathcal{F}_{\Psi}^{\beta}$ e $\mathcal{F}$ (definidas na página 100) são invariantes por multiplicação por funções de $L^{\infty}(\Omega)$. Isto é, se $F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\beta}$ e $\varphi \in L^{\infty}(\Omega)$, então $\varphi F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\beta}$. O mesmo ocorre com a família $\mathcal{F}$. Assim, sem perda de generalidade, no estudo da equação $Lu = F(x, y, u)$ podemos supor que $L = H_{\mathcal{Z}}$ em $\tilde{\Omega}$.

Com base nas Observações 25 e 26 vamos supor daqui em diante que

$$L = H_{\mathcal{Z}} \quad (6.8)$$

em $\tilde{\Omega}$, onde $\mathcal{Z}$ é dada pela Proposição 18.

Seja $\kappa \in \mathbb{Z}^+$. Para $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, definimos

$$T_{\mathcal{Z}}^{\kappa} f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}(x, y)} - \mathcal{Z}^{2\kappa}(x, y) \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{\mathcal{Z}(x, y) \overline{f(\xi, \eta)}}{1 - \mathcal{Z}(x, y) \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}} d\xi d\eta, \quad (6.9)$$

para $(x, y) \in \overline{\Omega}$.

Podemos escrever

$$T_{\mathcal{Z}}^{\kappa} f = T_{\mathcal{Z}} f + H \text{ em } \overline{\Omega}.$$

No próximo teorema mostraremos que H é Hölder contínua em $\overline{\Omega}$ e $LH = 0$ em Ω . Assim, concluiremos que $T_{\mathcal{Z}}^K f$ tem as mesmas boas propriedades de $T_{\mathcal{Z}} f$.

Como no caso do operador $T_{\mathcal{Z}} f$, o operador $T_{\mathcal{Z}}^K f$ é uma generalização de um operador integral clássico relacionado ao operador de Cauchy-Riemann. Veja (BEGEHR, 1994) e (VEKUA, 1962).

Antes de ir para o próximo teorema, vamos provar um pequeno lema.

Lema 15. Sejam $u, v \in \mathbb{C}$, com $|u|, |v| \leq 1$ e $|v| > 0$. Então

$$\left| \frac{v}{|v|^2} - u \right| \geq |v - u|.$$

Demonstração.

$$\left| \frac{v}{|v|^2} - u \right|^2 = \left| \frac{v}{|v|^2} \right|^2 + |u|^2 - 2 \left\langle \frac{v}{|v|^2}, u \right\rangle.$$

e

$$|v - u|^2 = |v|^2 + |u|^2 - 2 \langle v, u \rangle.$$

Então,

$$\begin{aligned} \left| \frac{v}{|v|^2} - u \right|^2 - |v - u|^2 &= \left| \frac{v}{|v|^2} \right|^2 - 2 \left\langle \frac{v}{|v|^2}, u \right\rangle - |v|^2 + 2 \langle v, u \rangle \\ &= \frac{1}{|v|^2} - 2 \frac{1}{|v|^2} \langle v, u \rangle - |v|^2 + 2 \langle v, u \rangle = \frac{1}{|v|^2} \left\{ 1 - |v|^4 - 2 \langle v, u \rangle (1 - |v|^2) \right\} \\ &= \frac{1}{|v|^2} \left\{ (1 + |v|^2)(1 - |v|^2) - 2 \langle v, u \rangle (1 - |v|^2) \right\} = \frac{(1 - |v|^2)}{|v|^2} \left\{ 1 + |v|^2 - 2 \langle v, u \rangle \right\} \\ &\geq \frac{(1 - |v|^2)}{|v|^2} |u - v|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Isto é,

$$\left| \frac{v}{|v|^2} - u \right|^2 \geq |v - u|^2.$$

Isto implica $\left| \frac{v}{|v|^2} - u \right| \geq |v - u|$. □

Teorema 12. Seja $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$, onde $\sigma_M > 0$ é dado por (6.4). Então, $L(T_{\mathcal{Z}}^K f) = f$ em Ω e existem constantes $M = M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ e $C = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tais que

$$|T_{\mathcal{Z}}^K f(x, y)| \leq M \|f\|_p, \quad \forall (x, y) \in \overline{\Omega} \quad (6.10)$$

e

$$|T_{\mathcal{Z}}^K f(p_1) - T_{\mathcal{Z}}^K f(p_2)| \leq C \|f\|_p |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\beta, \quad \forall p_1, p_2 \in \overline{\Omega}, \quad (6.11)$$

onde $0 < \beta < 1$ é dado por $\beta = (2 - q - \tau_M)/q$, com $q = p/(p - 1)$ e $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$.

Demonstração. Seja $(x, y) \in \overline{\Omega}$. Podemos escrever

$$T_{\mathcal{Z}}^{\kappa} f(x, y) = T_{\mathcal{Z}} f(x, y) - \mathcal{Z}^{2\kappa}(x, y) B_{\mathcal{Z}} f(x, y), \quad (6.12)$$

onde

$$B_{\mathcal{Z}} f(x, y) \doteq \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{\mathcal{Z}(x, y) \overline{f(\xi, \eta)}}{1 - \mathcal{Z}(x, y) \mathcal{Z}(\xi, \eta)} d\xi d\eta.$$

Como $|\mathcal{Z}(x, y)| < 1$ para $(x, y) \in \Omega$ e $L\mathcal{Z} = 0$ em Ω , segue que $L(B_{\mathcal{Z}} f) = 0$ em Ω . Assim, como $L(T_{\mathcal{Z}} f) = f$ em Ω (Teorema 11, página 102), temos da igualdade (6.12) que $L(T_{\mathcal{Z}}^{\kappa} f) = f$ em Ω .

Segue do Teorema 11 (página 102) que, para provar as estimativas (6.10) e (6.11) para $T_{\mathcal{Z}}^{\kappa} f$, é suficiente prová-las para $B_{\mathcal{Z}} f$.

Primeiro, note que para $(x_0, y_0) \in \Omega$ tal que $\mathcal{Z}(x_0, y_0) = 0$ temos $B_{\mathcal{Z}} f(x_0, y_0) = 0$. Para $(x, y) \in \overline{\Omega} \setminus \{(x_0, y_0)\}$, temos

$$|B_{\mathcal{Z}} f(x, y)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)|}{\left| \frac{\mathcal{Z}(x, y)}{|\mathcal{Z}(x, y)|^2} - \mathcal{Z}(\xi, \eta) \right|} d\xi d\eta. \quad (6.13)$$

Como $|\mathcal{Z}(x, y)| < 1$ para $(x, y) \in \overline{\Omega}$, temos, pelo Lema 15,

$$\left| \frac{\mathcal{Z}(x, y)}{|\mathcal{Z}(x, y)|^2} - \mathcal{Z}(\xi, \eta) \right| \geq |\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(\xi, \eta)|, \quad (\xi, \eta) \in \Omega. \quad (6.14)$$

Por (6.13) e (6.14) temos

$$|B_{\mathcal{Z}} f(x, y)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)|}{|\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(\xi, \eta)|} d\xi d\eta. \quad (6.15)$$

A estimativa (6.10) segue de (6.15) e do Teorema 11.

Sejam $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2) \in \overline{\Omega}$, com $p_1 \neq p_2$. Temos

$$|B_{\mathcal{Z}} f(p_1) - B_{\mathcal{Z}} f(p_2)| \leq \frac{|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|}{2\pi} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)|}{|1 - \mathcal{Z}(p_1) \mathcal{Z}(\xi, \eta)| |1 - \mathcal{Z}(p_2) \mathcal{Z}(\xi, \eta)|} d\xi d\eta. \quad (6.16)$$

Note que, quando $|\mathcal{Z}(p)| \leq 1/2$, temos

$$|1 - \mathcal{Z}(p) \mathcal{Z}(\xi, \eta)| \geq 1 - \frac{1}{2} |\mathcal{Z}(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{2}, \quad (6.17)$$

para todo $(\xi, \eta) \in \overline{\Omega}$. Assim, no caso em que $|\mathcal{Z}(p_k)| \leq \frac{1}{2}$, para $k = 1, 2$, temos

$$\int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|1 - \mathcal{Z}(p_1) \mathcal{Z}(\xi, \eta)| |1 - \mathcal{Z}(p_2) \mathcal{Z}(\xi, \eta)|} \leq C(p, \Omega) \|f\|_p, \quad (6.18)$$

para $C(p, \Omega) > 0$ constante.

No caso em que $|\mathcal{Z}(p_1)| \leq \frac{1}{2} \leq |\mathcal{Z}(p_2)|$ temos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|1 - \mathcal{Z}(p_1)\overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}||1 - \mathcal{Z}(p_2)\overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}|} &\leq \frac{2}{|\mathcal{Z}(p_2)|} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|\frac{1}{\mathcal{Z}(p_2)} - \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}|} \\ &\leq 2^2 \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|\mathcal{Z}(p_2) - \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}|} \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|f\|_p \end{aligned} \quad (6.19)$$

e, novamente, a última estimativa é obtida do Teorema 11.

Finalmente, quando $|\mathcal{Z}(p_k)| \geq 1/2$, para $k = 1, 2$, temos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|1 - \mathcal{Z}(p_1)\overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}||1 - \mathcal{Z}(p_2)\overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}|} &\leq 4 \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|\frac{1}{\mathcal{Z}(p_1)} - \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}||\frac{1}{\mathcal{Z}(p_2)} - \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}|} \\ &\leq 4 \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|\mathcal{Z}(p_1) - \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}||\mathcal{Z}(p_2) - \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}|} \\ &\leq C_1 \|f\|_p |\mathcal{Z}(x_1, y_1) - \mathcal{Z}(x_2, y_2)|^{\mu}, \end{aligned} \quad (6.20)$$

com $\mu = (2 - (2q + \tau_M))/q$, onde a última desigualdade segue do Teorema 11.

Segue de (6.16), (6.18), (6.19), e (6.20) que podemos encontrar uma constante positiva $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)$ tal que

$$|B_{\mathcal{Z}} f(x_1, y_1) - B_{\mathcal{Z}} f(x_2, y_2)| \leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) |\mathcal{Z}(x_1, y_1) - \mathcal{Z}(x_2, y_2)|^{\frac{2-q-\tau_M}{q}}.$$

Isto completa a demonstração do teorema. □

Proposição 19. Seja $f \in L^p(\Omega)$, com $p > 2 + \sigma_M$. Então, $T_{\mathcal{Z}}^{\mathbf{K}} f$ (dado em (6.9)) satisfaz

$$\begin{cases} L(T_{\mathcal{Z}}^{\mathbf{K}} f) = f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\overline{\mathcal{Z}^{\mathbf{K}}} T_{\mathcal{Z}}^{\mathbf{K}} f) = 0 & \text{em } \partial\Omega. \end{cases}$$

Demonstração. Sabemos, pelo Teorema 12, que $L(T_{\mathcal{Z}}^{\mathbf{K}} f) = f$ em Ω . Assim, precisamos verificar somente a segunda condição. Seja $(x, y) \in \overline{\Omega}$. Podemos escrever

$$T_{\mathcal{Z}}^{\mathbf{K}} f(x, y) = T_{\mathcal{Z}} f(x, y) - \mathcal{Z}^{2\mathbf{K}}(x, y) B_{\mathcal{Z}} f(x, y), \quad (6.21)$$

com

$$B_{\mathcal{Z}} f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{\mathcal{Z}(x, y) \overline{f(\xi, \eta)}}{1 - \mathcal{Z}(x, y) \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}} d\xi d\eta.$$

Para $(x, y) \in \partial\Omega$, temos $|\mathcal{Z}(x, y)| = 1$, logo $1/\mathcal{Z}(x, y) = \overline{\mathcal{Z}(x, y)}$. Daí obtemos

$$B_{\mathcal{Z}}f(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{f(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}(x, y)} d\xi d\eta = \overline{T_{\mathcal{Z}}f(x, y)}, \quad (6.22)$$

para $(x, y) \in \partial\Omega$. Por (6.21) e (6.22), temos para $(x, y) \in \partial\Omega$,

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} T_{\mathcal{Z}}^{\kappa} f(x, y) &= \overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} T_{\mathcal{Z}} f(x, y) - \mathcal{Z}^{\kappa} B_{\mathcal{Z}} f(x, y) \\ &= \overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} T_{\mathcal{Z}} f(x, y) - \mathcal{Z}^{\kappa} \overline{T_{\mathcal{Z}}f(x, y)} = 2i\Im(\overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} T_{\mathcal{Z}} f(x, y)). \end{aligned}$$

Portanto, $\Re(\overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} T_{\mathcal{Z}} f(x, y)) = 0$ para $(x, y) \in \partial\Omega$. $\square$

6.2 O operador $S_{\mathcal{Z}}$

Sejam L e $\mathcal{Z}$ como na seção anterior.

Agora vamos estudar o problema de Riemann-Hilbert homogêneo em um caso particular. Para $\varphi \in C(\partial\Omega; \mathbb{R})$ e $\kappa \in \mathbb{Z}^+$, considere o problema

$$\begin{cases} L(\Phi) = 0 & \text{em } \Omega, \\ \Re(\overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} \Phi) = \varphi & \text{em } \partial\Omega. \end{cases} \quad (6.23)$$

Obtemos as soluções deste problema através do operador de Schwarz, $S_{\mathcal{Z}}$, associado a L , que iremos definir agora.

Seja $S_{\mathcal{Z}} : C(\partial\Omega; \mathbb{R}) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ definido por

$$(S_{\mathcal{Z}}\varphi)(x, y) \doteq \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \varphi(\xi, \eta) \frac{\mathcal{Z}(\xi, \eta) + \mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}(x, y)} \frac{d\mathcal{Z}(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}. \quad (6.24)$$

O leitor familiarizado com a teoria clássica para problemas de contorno para funções holomorfas certamente notou a semelhança com o respectivo operador clássico S (veja o operador de Schwarz clássico (para o disco $\mathbb{D}$) em B.4, página 139. Veja também em (VEKUA, 1962) e (BEGEHR, 1994)). Tal semelhança e bom comportamento da integral primeira $\mathcal{Z}$ em Ω nos permitem generalizar os resultados referentes a S e $\partial/\partial\bar{z}$ para $S_{\mathcal{Z}}$ e L .

Proposição 20. Para $\varphi \in C(\partial\Omega; \mathbb{R})$, a função $S_{\mathcal{Z}}\varphi$ satisfaz

$$\begin{cases} L(S_{\mathcal{Z}}\varphi) = 0 & \text{em } \Omega, \\ \Re(S_{\mathcal{Z}}\varphi) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases}$$

e $\Im(S_{\mathcal{Z}}\varphi)(x_0, y_0) = 0$, onde $(x_0, y_0) \in \Omega$ é tal que $\mathcal{Z}(x_0, y_0) = 0$. Além disso, se $\varphi \in C^{\alpha}(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, então $S_{\mathcal{Z}}\varphi \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha}(\overline{\Omega}) \subset C^{\alpha}(\overline{\Omega})$.

Demonstração. Usamos o fato de que $\partial\Omega$ é de classe C^1 , $\mathcal{Z} : \overline{\Omega} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ é de classe C^1 e um homeomorfismo, para aplicar o lema 9 (página 77) para reescrever $S_{\mathcal{Z}}\varphi$ como

$$\begin{aligned} (S_{\mathcal{Z}}\varphi)(x, y) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}} (\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1})(\zeta) \frac{\zeta + \mathcal{Z}(x, y)}{\zeta - \mathcal{Z}(x, y)} \frac{d\zeta}{\zeta} \\ &= (S(\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1}))(\mathcal{Z}(x, y)), \end{aligned} \quad (6.25)$$

onde S é o operador de Schwarz clássico em $\mathbb{D}$. Da teoria clássica (veja Proposição 25, página 139), temos que $S(\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1})$ é uma função holomorfa em $\mathbb{D}$, $\Re(S(\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1})) = \varphi \circ \mathcal{Z}^{-1}$ sobre $\partial\mathbb{D}$, e $\Im(S(\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1}))(x_0, y_0) = 0$. Além disso, $S(\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1})$ está na classe de funções Hölder contínuas, em Ω , de mesmo expoente de Hölder que $\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1}$ em $\partial\Omega$. Note que, de um argumento proveniente do lema 3 (página 44), a função $\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1}$ tem o mesmo expoente de Hölder em $\partial\Omega$ que φ possui em $\partial\mathbb{D}$. Segue assim que $L(S_{\mathcal{Z}}\varphi) = 0$ em Ω , $\Re(S_{\mathcal{Z}}\varphi) = \varphi$ em $\partial\Omega$, $\Im(S_{\mathcal{Z}}\varphi)(x_0, y_0) = 0$ e se $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$ então $S_{\mathcal{Z}}\varphi \in C_{\mathcal{Z}}^\alpha(\overline{\Omega}) \subset C^\alpha(\overline{\Omega})$ (veja o Corolário 9, na página 140, sobre o caso clássico que é aplicado a $\varphi \circ \mathcal{Z}^{-1}$). $\square$

Com um simples cálculo é possível verificar que

$$\Phi := \mathcal{Z}^\kappa S_{\mathcal{Z}}\varphi$$

é solução do problema (6.23). A próxima proposição diz que toda solução deste problema é a função Φ , a menos de um polinômio, em $\mathcal{Z}$, com grau no máximo 2κ .

Proposição 21. Para $\varphi \in C(\partial\Omega; \mathbb{R})$, a solução geral do problema (6.23) é da forma

$$\Phi(x, y) = \mathcal{Z}^\kappa(x, y)(S_{\mathcal{Z}}\varphi)(x, y) + \sum_{j=0}^{2\kappa} b_j \mathcal{Z}^j(x, y), \quad (6.26)$$

onde $b_j \in \mathbb{C}$, com $b_{2\kappa-j} = -\bar{b}_j$, para $j = 0, 1, \dots, 2\kappa$. Além disso, se $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, então $\Phi \in C_{\mathcal{Z}}^\alpha(\overline{\Omega})$.

Demonstração. Da teoria clássica sobre o estudo do problema de Riemann-Hilbert (veja (BE-GEHR, 1994), (GAKHOV, 1966) e (VEKUA, 1962)) temos que a solução geral do problema

$$\frac{\partial h}{\partial \bar{\zeta}} = 0 \quad \text{em } \mathbb{D} \setminus \{0\} \quad \text{e} \quad \Re(h) = \psi \quad \text{sobre } \partial\mathbb{D},$$

(com $\psi \in C(\partial\mathbb{D}; \mathbb{R})$) tendo um polo de no máximo ordem κ em $\zeta = 0$, tem a forma

$$h(\zeta) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}} \psi(\omega) \frac{\omega + \zeta}{\omega - \zeta} \frac{d\omega}{\omega} + ic_0 + \sum_{j=1}^{\kappa} (c_j \zeta^j - \bar{c}_j \zeta^{-j}), \quad (6.27)$$

com $c_j \in \mathbb{C}$, $c_0 \in \mathbb{R}$.

Seja Φ uma solução do problema (6.23). Seja $H := \Phi / \mathcal{Z}^\kappa$ em $\overline{\Omega} \setminus \{(x_0, y_0)\}$, onde (x_0, y_0) é tal que $\mathcal{Z}(x_0, y_0) = 0$. Como $L\Phi = 0$ em Ω , temos, pelo Teorema 2 (página 53), que $\Phi \circ \mathcal{Z}^{-1}$ é uma função holomorfa em $\mathbb{D}$. Assim

$$H \circ \mathcal{Z}^{-1}(\zeta) = \frac{\Phi \circ \mathcal{Z}^{-1}(\zeta)}{\zeta^\kappa}, \quad \zeta \in \mathbb{D},$$

tem um polo de ordem no máximo κ em 0 e

$$\psi := \Re(H \circ \mathcal{Z}^{-1}) = \Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa \Phi}) \circ \mathcal{Z}^{-1} = \varphi \circ \mathcal{Z}^{-1} \text{ em } \partial\mathbb{D}.$$

Logo,

$$H \circ \mathcal{Z}^{-1}(\zeta) = h(\zeta), \quad \zeta \in \mathbb{D},$$

onde h é dada em (6.27). Assim, $H = h \circ \mathcal{Z}$. Ou seja,

$$\Phi(x, y) = \mathcal{Z}(x, y)^K h(\mathcal{Z}(x, y)), \quad (x, y) \in \overline{\Omega}.$$

Usando o lema 9 (página 77) para fazer a mudança de variável adequada na integral que faz parte da expressão de h , obtemos a forma desejada (6.26). A regularidade Hölder de Φ é igual à regularidade de $S_{\mathcal{Z}}\varphi$ que é estudada na Proposição 20. $\square$

6.3 O problema de Riemann-Hilbert para equações do tipo $Lu = F(x, y, u)$

Nesta seção vamos estudar o problema de Riemann-Hilbert para equações semilineares. Os resultados desta seção podem ser encontrados em (CAMPANA; SILVA; MEZIANI, 2016). Como na seção anterior, $\tilde{\Omega}$ é um aberto de $\mathbb{R}^2$, Ω é um aberto compactamente contido em $\tilde{\Omega}$ e L é um campo vetorial complexo definido em $\tilde{\Omega}$ pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. A equação que faz parte do problema abaixo foi estudada na Seção 5.4; o procedimento de estudo é análogo, porém envolve novos elementos, além da troca do operador T_Z pelo operador $T_{\mathcal{Z}}^K$. Mais especificamente, estudaremos aqui o problema de contorno:

$$\begin{cases} Lu = F(x, y, u) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \phi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.28)$$

onde $F \in \mathcal{F}_{\Psi}^{\beta} \cup \mathcal{F}$, (sendo $\mathcal{F}_{\Psi}^{\beta}$ e $\mathcal{F}$ definidas na Seção 5.4 e que serão descritas a seguir), $\Lambda \in C^{\alpha}(\partial\Omega)$, $|\Lambda| = 1$ e $\phi \in C^{\alpha}(\partial\Omega; \mathbb{R})$, com $0 < \alpha < 1$.

Para maior conveniência do leitor, iremos definir novamente aqui as famílias de funções $\mathcal{F}_{\Psi}^{\beta}$ e $\mathcal{F}$.

Seja $\Psi \in L^p(\overline{\Omega}; \mathbb{R}_+)$, com $p > 2 + \sigma_M$, $\sigma_M > 0$ dado em (6.4), página 100, e seja $0 < \beta \leq 1$. Definimos $\mathcal{F}_{\Psi}^{\beta}$ como o conjunto das funções $F : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfazem

- $F(\cdot, \zeta) \in L^p(\overline{\Omega})$, para todo $\zeta \in \mathbb{C}$;
- $|F(x, y, \zeta_1) - F(x, y, \zeta_2)| \leq \Psi(x, y)|\zeta_1 - \zeta_2|^{\beta}$, para todos $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}$.

Chamamos de $\mathcal{F}$ o conjunto das F que têm a forma

$$F(x, y, \zeta) = g(x, y)Q(x, y, \zeta) + f(x, y) \quad (6.29)$$

onde $f, g \in L^p(\overline{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$ e $Q : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função contínua limitada.

Os Teoremas 13 e 14 abaixo tratam do problema de Riemann-Hilbert quando a condição de contorno é mais simples, *i.e.*, quando em (6.28) trocamos Λ por $\mathcal{Z}^\kappa$, para $\kappa \in \mathbb{Z}^+$. Obteremos a versão mais geral no fim da seção, no Teorema 15, através de uma mudança de incógnita.

Teorema 13. Seja $F \in \mathcal{F}_\Psi^\beta$, com $0 < \beta < 1$, e sejam $q = p/(p-1)$ e $\tau_M = \sigma_M/(\sigma_M + 1)$, onde $\sigma_M > 0$ é dado por (5.4), página 72. Seja $\kappa \geq 0$ um número inteiro. Então, para toda $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, com $0 < \alpha < 1$, o problema de contorno

$$\begin{cases} Lu = F(x, y, u) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\mathcal{Z}^\kappa u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.30)$$

tem uma solução $u \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\overline{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\overline{\Omega})$, com $\alpha_0 = \min \left\{ \alpha, \frac{2-q-\tau_M}{q} \right\}$.

Demonstração. Seja $\Phi = S_{\mathcal{Z}}\varphi$. Lembre que $\Phi \in C_{\mathcal{Z}}^\alpha(\overline{\Omega}) \subset C^\alpha(\overline{\Omega})$ e satisfaz

$$\begin{cases} L\Phi = 0 & \text{em } \Omega, \\ \Re(\Phi) = \varphi & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

(veja a Proposição 20, página 107).

Seja $C(\overline{\Omega})$ o espaço de Banach das funções contínuas em $\overline{\Omega}$, com a norma

$$\|u\|_\infty = \sup\{|u(x, y)|; (x, y) \in \overline{\Omega}\}.$$

Para $M_0 > 0$, seja $C_{M_0}(\overline{\Omega})$ dado por

$$C_{M_0}(\overline{\Omega}) = \{u \in C(\overline{\Omega}) ; \|u\|_\infty \leq M_0\}.$$

Como $F \in \mathcal{F}_\Psi^\beta$, $0 < \beta < 1$, para $M_0 > 0$ suficientemente grande, temos

$$M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|\Psi\|_p M_0^\beta + \|F(\cdot, 0)\|_p \} + \|\Phi\|_\infty \leq M_0, \quad (6.31)$$

sendo $M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ a constante que aparece no Teorema 12, página 104.

Defina o operador $P : C_{M_0}(\overline{\Omega}) \rightarrow C_{M_0}(\overline{\Omega})$ por

$$Pu(x, y) = T_{\mathcal{Z}}^\kappa(F(\cdot, u))(x, y) + \mathcal{Z}^\kappa \Phi,$$

onde $T_{\mathcal{Z}}^\kappa$ é dado por (6.9), página 103. O operador P é bem definido. De fato, para $F \in \mathcal{F}_\Psi^\beta$ e $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$ temos

$$\|F(\cdot, u)\|_p \leq \|\Psi\|_p M_0^\beta + \|F(\cdot, 0)\|_p. \quad (6.32)$$

Então, segue de (6.31), (6.32), e do Teorema 12 (página 104), que para toda $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$ temos

$$|Pu(x, y)| \leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{ \|\Psi\|_p M_0^\beta + \|F(\cdot, 0)\|_p \} + \|\Phi\|_\infty \leq M_0, \quad (6.33)$$

para todo $(x, y) \in \overline{\Omega}$. Além disso, para $p_1, p_2 \in \overline{\Omega}$, temos

$$\begin{aligned} |Pu(p_1) - Pu(p_2)| &\leq |T_{\mathcal{Z}}^K(F(\cdot, u))(p_1) - T_{\mathcal{Z}}^K(F(\cdot, u))(p_2)| + |\mathcal{Z}^K\Phi(p_1) - \mathcal{Z}^K\Phi(p_2)| \\ &\leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|F(\cdot, u)\|_p |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\mu + C_{\mathcal{Z}^K\Phi} |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\alpha, \end{aligned}$$

onde $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ é uma constante que aparece no Teorema 12 (página 104), $\mu = (2 - q - \tau_M)/q$ e $C_{\mathcal{Z}^K\Phi}$ é a $\mathcal{Z}$ -constante de Hölder de $\mathcal{Z}^K\Phi$. Sejam

$$K_1 = \sup\{|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\mu - \alpha_0} ; p_1, p_2 \in \overline{\Omega}\}$$

e

$$K_2 = \sup\{|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\alpha - \alpha_0} ; p_1, p_2 \in \overline{\Omega}\},$$

onde $\alpha_0 = \min\{\alpha, \mu\}$. Segue da desigualdade acima que

$$\begin{aligned} |Pu(p_1) - Pu(p_2)| &\leq [C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|F(\cdot, u)\|_p K_1 + C_{\mathcal{Z}^K\Phi} K_2] |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\alpha_0} \\ &\leq [C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{\|\Psi\|_p M_0^\beta + \|F(\cdot, 0)\|_p\} K_1 + C_{\mathcal{Z}^K\Phi} K_2] |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\alpha_0} \\ &\leq C_0 |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\alpha_0}, \end{aligned}$$

sendo

$$C_0 = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \{\|\Psi\|_p M_0^\beta + \|F(\cdot, 0)\|_p\} K_1 + C_{\mathcal{Z}^K\Phi} K_2.$$

Como em (5.25), página 86, defina $\Lambda_{M_0, C_0} = \Lambda_{M_0, C_0}(\mathcal{Z}, \Omega, \alpha_0)$ como o conjunto das funções $v \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$ que satisfazem

$$|v(x_1, y_1) - v(x_2, y_2)| \leq C_0 |\mathcal{Z}(x_1, y_1) - \mathcal{Z}(x_2, y_2)|^{\alpha_0}, \quad \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \overline{\Omega}.$$

Como visto anteriormente, o conjunto Λ_{M_0, C_0} é convexo e compacto em $C(\overline{\Omega})$. Além disso, pelo que foi mostrado acima, $Pu \in \Lambda_{M_0, C_0}$, para toda $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$.

Afirmamos que o operador P é contínuo. De fato, para $u, v \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$, temos

$$\begin{aligned} \|Pu - Pv\|_\infty &\leq \|T_{\mathcal{Z}}^K(F(\cdot, u) - F(\cdot, v))\|_\infty \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|F(\cdot, u) - F(\cdot, v)\|_p \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) \|\Psi\|_p \|u - v\|_\infty^\beta, \end{aligned}$$

pelo Teorema 12. Assim, a restrição $P : \Lambda_{M_0, C_0} \rightarrow \Lambda_{M_0, C_0}$ é contínua. Pelo Teorema do Ponto Fixo de Schauder (Teorema 26, página 133) o operador P tem um ponto fixo, isto é, existe $u \in \Lambda_{M_0, C_0}$ tal que $Pu = u$. Tal ponto fixo satisfaz

$$u = T_{\mathcal{Z}}^K(F(\cdot, u)) + \mathcal{Z}^K\Phi \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\overline{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\overline{\Omega}).$$

Como $u \in C_{M_0}(\overline{\Omega})$, temos $F(\cdot, u) \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Pela Proposição 19, página 106, $Lu(x, y) = F(x, y, u(x, y))$, para todo $(x, y) \in \Omega$.

Para $(x, y) \in \partial\Omega$, temos

$$\overline{\mathcal{Z}^\kappa(x, y)}u(x, y) = \overline{\mathcal{Z}^\kappa(x, y)}T_{\mathcal{Z}}^\kappa(F(\cdot, u))(x, y) + \Phi(x, y). \quad (6.34)$$

Novamente, pela Proposição 19,

$$\Re\left(\overline{\mathcal{Z}^\kappa(x, y)}T_{\mathcal{Z}}^\kappa(F(\cdot, u))(x, y)\right) = 0 \text{ para } (x, y) \in \partial\Omega. \quad (6.35)$$

Por (6.34) e (6.35) o ponto fixo u satisfaz a condição de contorno

$$\Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa}u) = \Re(\Phi) = \varphi \text{ sobre } \partial\Omega.$$

Portanto, o ponto fixo u é uma solução do problema (6.30). $\square$

Teorema 14. Seja $F \in \mathcal{F}$, isto é,

$$F(x, y, \zeta) = g(x, y)Q(x, y, \zeta) + f(x, y)$$

onde $f, g \in L^p(\overline{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$ e $Q : \overline{\Omega} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função contínua limitada. Se $\kappa \geq 0$ inteiro, então, para $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, o problema

$$\begin{cases} Lu = F(x, y, u) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa}u) = \varphi & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.36)$$

tem uma solução $u \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\overline{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\overline{\Omega})$, com $\alpha_0 = \min\left\{\alpha, \frac{2-q-\tau_M}{q}\right\}$.

Demonstração. Tome $K > 0$ tal que $K \geq \|Q\|_\infty$ e seja $P : C(\overline{\Omega}) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ definido por

$$Pu(x, y) = T_{\mathcal{Z}}^\kappa(gQ(\cdot, u) + f)(x, y) + \mathcal{Z}^\kappa(x, y)\Phi(x, y),$$

onde $\Phi = S_{\mathcal{Z}}\varphi$ (com $S_{\mathcal{Z}}\varphi$ definido em (6.24), página 107). Como $gQ(\cdot, u) + f \in L^p(\overline{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$, segue do Teorema 12 (página 104) que

$$|Pu(x, y)| \leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\{\|g\|_p K + \|f\|_p\} + \|\Phi\|_\infty \doteq M_0,$$

para todo $(x, y) \in \overline{\Omega}$. Além disso, pelo Teorema 12 e pela Proposição 20, para $p_1, p_2 \in \overline{\Omega}$ e $u \in C(\overline{\Omega})$ existe $C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$|Pu(p_1) - Pu(p_2)| \leq C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\{\|g\|_p K + \|f\|_p\}|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\mu + C_{\mathcal{Z}^\kappa\Phi}|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\alpha,$$

onde $\mu = (2 - q - \tau_M)/q$, e $C_{\mathcal{Z}^\kappa\Phi} > 0$ é a $\mathcal{Z}$ -constante de Hölder de $\mathcal{Z}^\kappa\Phi$. Sejam

$$\lambda_1 = \sup\{|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\mu-\alpha_0} ; p_1, p_2 \in \overline{\Omega}\}$$

e

$$\lambda_2 = \sup\{|\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^{\alpha-\alpha_0} ; p_1, p_2 \in \overline{\Omega}\},$$

onde $\alpha_0 = \min\{\alpha, \mu\}$. Segue da desigualdade acima que

$$|Pu(p_1) - Pu(p_2)| \leq [C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\{\|g\|_p K + \|f\|_p\}\lambda_1 + C_{\mathcal{L}^\kappa \Phi} \lambda_2] |\mathcal{L}(p_1) - \mathcal{L}(p_2)|^{\alpha_0}.$$

Seja

$$C_0 = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\{\|g\|_p K + \|f\|_p\}\lambda_1 + C_{\mathcal{L}^\kappa \Phi} \lambda_2.$$

Defina $\Lambda_{M_0, C_0} \subset C(\overline{\Omega})$ como na demonstração do Teorema anterior (Teorema 13). Note que $Pu \in \Lambda_{M_0, C_0}$, para toda $u \in C(\overline{\Omega})$.

A restrição $P : \Lambda_{M_0, C_0} \rightarrow \Lambda_{M_0, C_0}$ é contínua. De fato, como Q é uniformemente contínua no conjunto compacto, $U = \overline{\Omega} \times \{\zeta \in \mathbb{C}; |\zeta| \leq M_0\}$, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|Q(x, y, \zeta_1) - Q(x, y, \zeta_2)| < \frac{\varepsilon}{M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\{\|g\|_p + 1\}},$$

para todo $(x, y) \in \overline{\Omega}$ e $|\zeta_1 - \zeta_2| < \delta$. Segue que se $u, v \in \Lambda_{M_0, C_0}$, com $\|u - v\|_\infty < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |Pu(x, y) - Pv(x, y)| &\leq |T_{\mathcal{L}}^\kappa(g\{Q(\cdot, u) - Q(\cdot, v)\})| \\ &\leq M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\|g\|_p \|Q(\cdot, u) - Q(\cdot, v)\|_\infty \\ &\leq \frac{M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\|g\|_p}{M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega)\{\|g\|_p + 1\}} \varepsilon < \varepsilon. \end{aligned}$$

Portanto a restrição $P : \Lambda_{M_0, C_0} \rightarrow \Lambda_{M_0, C_0}$ é contínua. Pelo Teorema do Ponto Fixo de Schauder (Teorema 26, página 133) o operador P possui um ponto fixo em Λ_{M_0, C_0} , isto é, existe $u \in \Lambda_{M_0, C_0}$ tal que $Pu = u$. Tal ponto fixo satisfaz

$$u = T_{\mathcal{L}}^\kappa(F(\cdot, u)) + \mathcal{L}^\kappa \Phi \in C_{\mathcal{L}}^{\alpha_0}(\overline{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\overline{\Omega})$$

e $Lu(x, y) = F(x, y, u(x, y))$, para todo $(x, y) \in \Omega$. De forma análogo a prova do teorema anterior, Teorema 13, mostramos que u satisfaz a condição de contorno. Portanto u é uma solução do problema (6.36). $\square$

O próximo teorema trata de uma versão do problema de Riemann-Hilbert que é mais geral do que as que foram vistas nos dois teoremas anteriores, a saber, o problema (6.28). A existência de solução do problema está relacionada com o índice de Λ associado a L com respeito a $\partial\Omega$. Se L é expresso por $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ no aberto $\tilde{\Omega}$ (que contém $\overline{\Omega}$), então o índice de Λ associado a L com respeito a $\partial\Omega$ é dado por

$$\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda) = -\text{sgn}\left(\Im(A\overline{B})(p_0)\right) \text{ind}_{\partial\Omega}(\Lambda),$$

onde p_0 é um ponto qualquer de $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ e sgn denota a função sinal, isto é, $\text{sgn} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$, $\text{sgn}(x) = 1$ se $x > 0$ e $\text{sgn}(x) = -1$ se $x < 0$. Quando $-\text{sgn}\left(\Im(A\overline{B})(p_0)\right) > 0$, a aplicação $\mathcal{L} : \overline{\Omega} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ preserva orientação e quando $-\text{sgn}\left(\Im(A\overline{B})(p_0)\right) < 0$ a aplicação $\mathcal{L}$ inverte a orientação. O índice de Λ com respeito a $\partial\Omega$, $\text{ind}_{\partial\Omega}(\Lambda)$, é definido na definição 8 (página 39). (Veja mais na Seção 2.4, página 38).

Teorema 15. Seja $F \in \mathcal{F}_\Psi^\beta \cup \mathcal{F}$, com $0 < \beta < 1$, onde $\mathcal{F}_\Psi^\beta$ e $\mathcal{F}$ são famílias de funções definidas na página 109. Sejam $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega)$, $|\Lambda| = 1$ e $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, com $0 < \alpha < 1$. Se $\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda) \geq 0$, então o problema de Riemann-Hilbert

$$\begin{cases} Lu = F(x, y, u) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases}$$

tem uma solução $u \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\bar{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\bar{\Omega})$, onde $\alpha_0 = \min \left\{ \alpha, \frac{2-q-\tau_M}{q} \right\}$ (como nos Teoremas 13 e 14).

Demonstração. Usaremos uma técnica baseada na teoria clássica do problema Riemann-Hilbert (veja (BEGEHR, 1994), (GAKHOV, 1966) e (VEKUA, 1962)) para trocar a função Λ na condição de contorno por $\mathcal{Z}^\kappa$ através de uma mudança de incógnita. Para isso, faremos uso do operador de Schwarz $S_{\mathcal{Z}}$ definido em (6.24), página 107.

Seja $\kappa := \text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda)$ o índice de Λ associado a L com respeito a $\partial\Omega$ e seja

$$g(x, y) = \mathcal{Z}^{-\kappa}(x, y)\Lambda(x, y) \text{ em } \partial\Omega.$$

Temos que $\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(g) = 0$. Consequentemente, existe uma função $\vartheta : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Hölder contínua (com mesmo expoente de Hölder que g) tal que

$$g(x, y) = e^{i\vartheta(x, y)}, \text{ para todo } (x, y) \in \partial\Omega.$$

Para $(x, y) \in \bar{\Omega}$ defina

$$\gamma(x, y) = (S_{\mathcal{Z}}\vartheta)(x, y).$$

Então, $L\gamma = 0$ em Ω e $\Re(\gamma) = \vartheta$ em $\partial\Omega$ (Proposição 20, página 107). Assim,

$$e^{-i\gamma} = e^{\Im(\gamma) + i\kappa \arg(\mathcal{Z}) - i\arg(\Lambda)} = e^{\Im(\gamma)} \mathcal{Z}^{\kappa} \bar{\Lambda} \text{ em } \partial\Omega. \quad (6.37)$$

Seja $\tilde{F} \in \mathcal{F}_\Psi^\beta \cup \mathcal{F}$ dada por

$$\tilde{F}(x, y, \zeta) = \frac{F(x, y, e^{i\gamma(x, y)} \zeta)}{e^{i\gamma(x, y)}}.$$

Segue dos Teoremas 13 e 14 que o problema

$$\begin{cases} LU = \tilde{F}(x, y, U) & \text{em } \Omega, \\ \Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa} U) = e^{\Im(\gamma)} \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.38)$$

tem uma solução $U \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\bar{\Omega})$, com $\alpha_0 = \min \left\{ \alpha, \frac{2-q-\tau_M}{q} \right\}$. Defina $u = e^{i\gamma} U$ em $\bar{\Omega}$. Temos

$$Lu(x, y) = e^{i\gamma(x, y)} LU(x, y) = e^{i\gamma(x, y)} \tilde{F}(x, y, U(x, y)) = F(x, y, u(x, y)),$$

para todo $(x, y) \in \Omega$. Além disso, por (6.37) e (6.38),

$$\Re(\bar{\Lambda}u) = e^{-\Im(\gamma)} \Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa} u) = \varphi \text{ em } \partial\Omega.$$

Isto completa a prova do teorema. □

6.4 Uma propriedade do operador $T_{\mathcal{Z}}$

Na próxima seção vamos usar uma propriedade técnica do operador integral $T_{\mathcal{Z}}$ que provaremos nessa seção (Proposição 22). Os resultados dessa seção podem ser encontrados em (CAMPANA; MEZIANI, 2016).

Seja L um campo vetorial complexo definido no conjunto aberto $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$ pertencente a classe $\mathcal{K}(\tilde{\Omega})$ e seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega}) \subset \mathbb{C}$ uma integral primeira global de classe $C^{1+\varepsilon}$ que também é um homeomorfismo. Seja Ω um aberto simplesmente conexo, com bordo de classe $C^{1+\varepsilon}$ transversal a L e compactamente contido em $\tilde{\Omega}$, isto é, $\bar{\Omega}$ é um compacto de $\mathbb{R}^2$ e $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$. Pela Proposição 18 (página 102), reduzindo $\tilde{\Omega}$, podemos obter uma função $\mathcal{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$, de classe C^1 , tal que $\mathcal{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathcal{Z}(\tilde{\Omega})$ é um homeomorfismo, $\mathcal{Z}$ é uma integral primeira de L em Ω , $\mathcal{Z}(\bar{\Omega}) = \mathbb{D}$ e $\mathcal{Z}$ mantém as boas propriedades de Z de modo que vale o Teorema 11 (página 102). Sem perda de generalidade podemos supor que

$$L = H_{\mathcal{Z}} \text{ em } \tilde{\Omega}.$$

Veja as Observações 25 e 26 (página 103).

Proposição 22. Seja $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Então, para $(s, t) \in \Omega$, temos

$$\int_{\partial\Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}} f(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} d\mathcal{Z}(x, y) = 0.$$

O restante desta seção é dedicado à prova desta proposição.

Sejam $1 < R_1 < R_2$ tais que $\overline{B_{R_2}(0)} \subset \mathcal{Z}(\tilde{\Omega})$ e sejam $V_1, V_2 \subset \tilde{\Omega}$ dados por

$$V_j = Z^{-1}(B_{R_j}(0)) \quad j = 1, 2.$$

Temos então

$$\bar{\Omega} \subset V_1 \subset \bar{V}_1 \subset V_2 \subset \bar{V}_2 \subset \tilde{\Omega}.$$

Considere $\chi : [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$, uma função C^∞ , satisfazendo

1. $\chi = 1$ em $[0, R_1]$,
2. $\chi = 0$ em $[R_2, \infty)$ e
3. χ é estritamente decrescente em $[R_1, R_2]$.

Seja $\mathcal{Z}_\circ : V_2 \rightarrow \mathbb{C}$ a função de classe C^1 dada por

$$\mathcal{Z}_\circ(p) = \frac{\mathcal{Z}(p)}{\chi(|\mathcal{Z}(p)|)}. \quad (6.39)$$

Lema 16. A função $\mathcal{Z}_\circ : V_2 \rightarrow \mathbb{C}$ é um homeomorfismo.

Demonstração. Primeiro vamos mostrar que $\mathcal{Z}_\circ$ é uma bijeção. Note que, como $\chi(R_2) = 0$ e $V_2 = \mathcal{Z}^{-1}(B_{R_2}(0))$, temos $\mathcal{Z}_\circ(V_2) = \mathbb{C}$.

Sejam $p_1, p_2 \in V_2$. Se $|\mathcal{Z}(p_1)| < |\mathcal{Z}(p_2)|$, então $\chi(|\mathcal{Z}(p_1)|) \geq \chi(|\mathcal{Z}(p_2)|)$ e

$$|\mathcal{Z}_\circ(p_1)| = \frac{|\mathcal{Z}(p_1)|}{\chi(|\mathcal{Z}(p_1)|)} < \frac{|\mathcal{Z}(p_2)|}{\chi(|\mathcal{Z}(p_2)|)} = |\mathcal{Z}_\circ(p_2)|.$$

Assim, para termos $\mathcal{Z}_\circ(p_1) = \mathcal{Z}_\circ(p_2)$, precisamos ter $|\mathcal{Z}(p_1)| = |\mathcal{Z}(p_2)|$. Suponha $\mathcal{Z}_\circ(p_1) = \mathcal{Z}_\circ(p_2)$. Pelo que vimos acima, $|\mathcal{Z}(p_1)| = |\mathcal{Z}(p_2)|$. Olhando para a expressão de $\mathcal{Z}_\circ$ em (6.39) concluímos que $\mathcal{Z}(p_1) = \mathcal{Z}(p_2)$. Logo, $p_1 = p_2$, pois $\mathcal{Z}$ é um homeomorfismo. Portanto, $\mathcal{Z}_\circ : V_2 \rightarrow \mathbb{C}$ é uma bijeção.

Finalmente, vamos provar que $F = \mathcal{Z}_\circ^{-1}$ é contínua. Sejam $\zeta_0 \in \mathbb{C}$ e $(\zeta_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ tais que $\zeta_j \rightarrow \zeta_0$. Então a sequência $(F(\zeta_j))_{j \in \mathbb{N}}$ tem um ponto de acumulação em $\overline{V_2}$. Seja $p \in \overline{V_2}$ tal ponto de acumulação. Então, existe uma subsequência $w_k := F(\zeta_{j_k})$ que converge para p . Temos que $p \in V_2$. De fato, suponha que $p \in \partial V_2$, então,

$$\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_\circ(w_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \zeta_{j_k} = \zeta_0,$$

o que é uma contradição. Como $\mathcal{Z}_\circ$ é contínua no ponto p , temos $\zeta_0 = \mathcal{Z}_\circ(p)$ e $F(\zeta_0) = p$. Isto implica que $F(\zeta_j) \rightarrow F(\zeta_0)$ e assim concluímos que F é contínua. $\square$

Seja $\{\Omega_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de subconjuntos abertos de Ω tais que $\overline{\Omega}_n \subset \Omega_{n+1} \subset \overline{\Omega}_{n+1} \subset \Omega$, para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\Omega_n \rightarrow \Omega$ quando $n \rightarrow \infty$.

Lema 17. Seja $f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$ e considere

$$T_{\mathcal{Z}_\circ, n} f(x, y) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega_n} \frac{f(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\mathcal{Z}_\circ(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_\circ(x, y)}, \quad (x, y) \in V_2.$$

Então $T_{\mathcal{Z}_\circ, n} f(x, y) \rightarrow 0$ (uniformemente) quando $(x, y) \rightarrow \partial V_2$.

Demonstração. Como $|\mathcal{Z}_\circ(x, y)| \geq |\mathcal{Z}_\circ(\xi, \eta)|$ quando $(x, y) \in V_2 \setminus \overline{\Omega}$ e $(\xi, \eta) \in \Omega$, temos

$$|\mathcal{Z}_\circ(x, y)| - |\mathcal{Z}_\circ(\xi, \eta)| \geq |\mathcal{Z}_\circ(x, y)| - 1 \geq 0.$$

Daí, para $(x, y) \in V_2 \setminus \overline{\Omega}$, temos

$$\begin{aligned} |T_{\mathcal{Z}_\circ, n} f(x, y)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_n} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|\mathcal{Z}_\circ(x, y)| - 1} \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega} \frac{|f(\xi, \eta)| d\xi d\eta}{|\mathcal{Z}_\circ(x, y)| - 1} = \frac{1}{2\pi} \frac{\|f\|_1}{|\mathcal{Z}_\circ(x, y)| - 1}. \end{aligned}$$

A conclusão do lema segue da estimativa acima. $\square$

Considere o campo vetorial complexo

$$L_{\circ} = \frac{\partial \mathcal{Z}_{\circ}}{\partial y} \partial_x - \frac{\partial \mathcal{Z}_{\circ}}{\partial x} \partial_y.$$

Note que, como $\mathcal{Z}_{\circ}$ é uma integral primeira global, de classe C^1 , de $L_{\circ}$ e também um homeomorfismo sobre sua imagem, temos que $L_{\circ}$ é um campo C^1 -hipocomplexo em V_2 . Como $T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f \in C^1(V_2 \setminus \overline{\Omega}_n)$ e $L_{\circ}(T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f) = 0$ em $V_2 \setminus \overline{\Omega}_n$ temos pela Proposição 6 (página 36) que

$$T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f(x,y) = h_n(\mathcal{Z}_{\circ}(x,y)), \quad (x,y) \in V_2 \setminus \overline{\Omega}_n, \quad (6.40)$$

onde $h_n : \mathcal{Z}_{\circ}(V_2 \setminus \overline{\Omega}_n) \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função holomorfa.

Para $\varepsilon > 0$ dado, seja $\delta > 0$ (lema 17) tal que

$$\text{dist}((x,y), \partial V_2) < \delta \implies |T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f(x,y)| < \varepsilon.$$

Seja $R \in [R_1, R_2]$ tal que $(x,y) \in \mathcal{Z}_{\circ}^{-1}(\partial B_R(0))$, implica $\text{dist}((x,y), \partial V_2) < \delta$. Segue de (6.40) que,

$$|h_n(\zeta)| < \varepsilon, \quad \forall \zeta \in \partial B_R(0).$$

Se $(x,y) \in \Omega$, temos

$$\begin{aligned} \int_{\partial \Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f(\xi, \eta) dZ_{\circ}(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}_{\circ}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)} &= \int_{\partial \Omega} \frac{h_n(\mathcal{Z}_{\circ}(\xi, \eta)) d\mathcal{Z}_{\circ}(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}_{\circ}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)} \\ &= \int_{\partial \mathbb{D}} \frac{h_n(\zeta) d\zeta}{\zeta - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)} \\ &= \int_{\partial B_R(0)} \frac{h_n(\zeta) d\zeta}{\zeta - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)}, \end{aligned} \quad (6.41)$$

pelo Teorema de Cauchy. Estimando a última integral, obtemos

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial B_R(0)} \frac{h_n(\zeta) d\zeta}{\zeta - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)} \right| &\leq \int_{\partial B_R(0)} \frac{|h_n(\zeta)| |d\zeta|}{|\zeta - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)|} \\ &\leq \int_{\partial B_R(0)} \frac{\varepsilon |d\zeta|}{R-1} \leq \frac{2\pi R\varepsilon}{R-1} \leq \frac{2\pi R_1\varepsilon}{R_1-1}. \end{aligned} \quad (6.42)$$

Segue de (6.41) e (6.42) que

$$\int_{\partial \Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f(\xi, \eta) d\mathcal{Z}_{\circ}(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}_{\circ}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_{\circ}(x,y)} = 0, \quad \forall (x,y) \in \Omega. \quad (6.43)$$

Considere as funções g_n e g definidas em $\overline{\mathbb{D}}$ por

$$g_n(\zeta) = T_{\mathcal{Z}_{\circ},n}f(\mathcal{Z}_{\circ}^{-1}(\zeta)) \text{ e } g(\zeta) = T_{\mathcal{Z}_{\circ}}f(\mathcal{Z}_{\circ}^{-1}(\zeta)).$$

Note que, como $\sup_{\Omega} |T_{\mathcal{Z}_o, n} f - T_{\mathcal{Z}_o} f| \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, temos $\sup_{\mathbb{D}} |g_n - g| \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$.

Seja $(x_0, y_0) \in \Omega$, $z_0 = \mathcal{Z}(x_0, y_0)$ e seja $r = \text{dist}(\partial \mathbb{D}, z_0)$. Usando (6.43) obtemos a estimativa

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial \Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}_o} f(\xi, \eta) d\mathcal{Z}_o(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}_o(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_o(x_0, y_0)} \right| &= \left| \int_{\partial \Omega} \frac{\{T_{\mathcal{Z}_o} f(\xi, \eta) - T_{\mathcal{Z}_o, n} f(\xi, \eta)\} d\mathcal{Z}_o(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}_o(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_o(x_0, y_0)} \right| \\ &= \left| \int_{\partial \mathbb{D}} \frac{\{g(\zeta) - g_n(\zeta)\} d\zeta}{\zeta - z_0} \right| \leq \frac{2\pi}{r} \|g_n - g\|_{\mathbb{D}}. \end{aligned}$$

Isto implica que, para cada $(x_0, y_0) \in \Omega$,

$$\int_{\partial \Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}_o} f(\xi, \eta) d\mathcal{Z}_o(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}_o(\xi, \eta) - \mathcal{Z}_o(x_0, y_0)} = 0.$$

Finalmente, como $\mathcal{Z}_o = \mathcal{Z}$ em V_1 e $\Omega \subset V_1$, temos

$$\int_{\partial \Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}} f(x, y) d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} = \int_{\partial \Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}_o} f(x, y) d\mathcal{Z}_o(x, y)}{\mathcal{Z}_o(x, y) - \mathcal{Z}_o(s, t)} = 0$$

para $(s, t) \in \Omega$. Isto completa a prova da proposição.

6.5 O problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = au + b\bar{u} + f$

Nesta seção, vamos considerar um tipo de problema de Riemann-Hilbert para o campo L em um aberto simplesmente conexo limitado. Vamos assumir, como nas seções anteriores, que L é um campo vetorial complexo definido na aberto conexo $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$ pertencente a classe $\mathcal{X}(\tilde{\Omega})$. Seja Ω um aberto simplesmente conexo compactamente contido em $\tilde{\Omega}$ com bordo, $\partial \Omega$, de classe $C^{1+\varepsilon}$ e transversal a L .

Os resultados dessa seção podem ser encontrados em (CAMPANA; MEZIANI, 2016).

Para tal campo vetorial complexo, vamos considerar o seguinte problema de Riemann-Hilbert

$$\begin{cases} Lu = au + b\bar{u} + f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \varphi & \text{em } \partial \Omega, \end{cases}$$

onde $\Lambda \in C^\alpha(\partial \Omega)$, $|\Lambda| = 1$, $\varphi \in C^\alpha(\partial \Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, e $a, b, f \in L^p(\bar{\Omega})$, $p > 2 + \sigma_M$, onde $\sigma_M > 0$ é dado por (6.4), página 100.

A técnica desenvolvida aqui nesta seção é uma generalização de uma técnica da teoria das *funções analíticas generalizadas*, que pode ser encontrada em (VEKUA, 1962), que em poucas palavras, é utilizada para resolver o problema de Riemann-Hilbert acima quando tomamos no lugar de L o operador de Cauchy-Riemann.

Pela Proposição 18 (página 102), reduzindo $\tilde{\Omega}$, podemos obter uma função $\mathcal{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$, de classe C^1 , tal que $\mathcal{Z} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathcal{Z}(\tilde{\Omega})$ é um homeomorfismo, $\mathcal{Z}$ é uma integral primeira de L em Ω , $\mathcal{Z}(\tilde{\Omega}) = \mathbb{D}$ e $\mathcal{Z}$ mantém as boas propriedades de Z de modo que vale o Teorema 11 (página 102). Sem perda de generalidade podemos supor que

$$L = H_{\mathcal{Z}} \text{ em } \tilde{\Omega},$$

onde $H_{\mathcal{Z}} = \mathcal{Z}_y \partial / \partial_x - \mathcal{Z}_x \partial / \partial_y$. Veja as Observações 25 e 26 (página 103).

Para resolver esse problema, antes vamos tratar de uma versão particular do problema que terá a resolubilidade estabelecida usando o operador $T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}$ (veja em (6.9), página 103) e o Teorema da Alternativa de Fredholm (Teorema 27, página 133).

Para $\kappa \geq 0$ inteiro, considere o seguinte problema

$$\begin{cases} Lu = au + b\bar{u} + f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\overline{\mathcal{Z}^{\kappa}} u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.44)$$

onde a, b, f e φ como acima.

Note que $u \in C(\overline{\Omega})$ é uma solução de (6.44) se, e somente se, u satisfaz a equação integral

$$u = T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}(au + b\bar{u}) + T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}(f) + \Phi \quad (6.45)$$

onde $L\Phi = 0$ em Ω e $\Re(\overline{\mathcal{Z}^{\kappa}}\Phi) = \varphi$ sobre $\partial\Omega$.

Podemos reescrever a equação (6.45) como

$$u = Gu + \phi,$$

onde $\phi = T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}(f) + \Phi$ e com G sendo o operador integral

$$Gu = T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}(au + b\bar{u}), \quad (6.46)$$

definido no espaço de Banach real¹

$$X := \{C(\overline{\Omega}; \mathbb{C}), \|\cdot\|_{\infty}\}.$$

É fácil ver que G é um operador linear em X .

Afim de aplicar o Teorema de Fredholm (Teorema 27, página 133), vamos estudar a compacidade do operador G e o núcleo do operador $I - G$ nas próximas proposições.

Seja $\mathcal{B}_X = \{w \in X ; \|w\|_{\infty} \leq 1\}$ a bola unitária de X .

Proposição 23. O operador $G : X \rightarrow X$ é compacto.

¹ Estamos trabalhando aqui com o espaço vetorial das funções contínuas $w : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ com escalares reais.

Demonstração. Para $u \in \mathcal{B}_X$ temos pelo Teorema 12 (página 104), desigualdade (6.10), que existe uma constante $M = M(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$\|Gu\|_\infty \leq M(\|a\|_p + \|b\|_p)\|u\|_\infty \leq M(\|a\|_p + \|b\|_p) =: M_0. \quad (6.47)$$

Para $p_1, p_2 \in \overline{\Omega}$, temos, pelo Teorema 12, desigualdade (6.11), que existe uma constante $C = C(p, \sigma_1, \dots, \sigma_N, \Omega) > 0$ tal que

$$\begin{aligned} |Gu(p_1) - Gu(p_2)| &\leq C\|au + b\bar{u}\|_p |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\beta \\ &\leq C\{\|a\|_p + \|b\|_p\} \|u\|_\infty |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\beta \\ &\leq C\{\|a\|_p + \|b\|_p\} |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\beta \\ &\leq C_0 |\mathcal{Z}(p_1) - \mathcal{Z}(p_2)|^\beta, \end{aligned} \quad (6.48)$$

com $C_0 := C\{\|a\|_p + \|b\|_p\}$, e $\beta = \frac{2-q-\tau_M}{q}$, onde $\tau_M = \frac{\sigma_M}{\sigma_M+1}$ e $q = \frac{p}{p-1}$.

Das estimativas (6.47) e (6.48) temos que $G(\mathcal{B}_X) \subset \Lambda_{M_0, C_0} = \Lambda_{M_0, C_0}(\mathcal{Z}, \Omega, \beta)$, onde $\Lambda_{M_0, C_0} \subset X$, definido em (5.25) (página 86), é compacto. Segue daí que G é um operador compacto. $\square$

Proposição 24. $\text{Ker}(I - G) = \{0\}$.

Demonstração. Precisamos provar que toda solução $w \in C(\overline{\Omega})$ da equação integral

$$w(x, y) = T_{\mathcal{Z}}(aw + b\bar{w})(x, y) - H(x, y), \quad (6.49)$$

com

$$H(x, y) := \frac{\mathcal{Z}^{2\kappa+1}(x, y)}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{(aw + b\bar{w})(\xi, \eta)}{1 - \mathcal{Z}(x, y)\overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}} d\xi d\eta,$$

é a solução trivial $w = 0$.

Temos que $H \in C(\overline{\Omega})$ e $LH = 0$. Segue da fórmula de representação (Proposição 17, página 77) que para todo $(s, t) \in \Omega$, temos

$$H(s, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{H(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} d\mathcal{Z}(x, y).$$

Assim, se w satisfaz a equação (6.49), então, para $(s, t) \in \Omega$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{w(x, y) d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}}(aw + b\bar{w}) d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} - H(s, t). \quad (6.50)$$

Pela Proposição 22 (página 115), temos

$$\int_{\partial\Omega} \frac{T_{\mathcal{Z}}(aw + b\bar{w}) d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} = 0, \text{ para todo } (s, t) \in \Omega.$$

Assim, a igualdade (6.50) torna-se

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{w(x, y) d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} = -H(s, t), \text{ para todo } (s, t) \in \Omega. \quad (6.51)$$

Seja $\tilde{H} = H / \mathcal{Z}^{2\kappa+1}$. Temos que $\tilde{H} : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ é contínua e $L\tilde{H} = 0$ em Ω . Pelo Teorema 2, página 53, existe $h : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa tal que $\tilde{H} = h \circ \mathcal{Z}$ em Ω . Podemos escrever h em série de potências em $\mathbb{D}$, com expansão em $0 \in \mathbb{D}$. Assim, H pode ser escrita na forma

$$H(s, t) = \mathcal{Z}^{2\kappa+1}(s, t) \sum_{j=0}^{\infty} a_j \mathcal{Z}^j(s, t), \quad (6.52)$$

com $a_j \in \mathbb{C}$.

Por outro lado, para $(x, y) \in \partial\Omega$ e $(s, t) \in \Omega$, temos

$$\frac{w(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} = w(x, t) \cdot \frac{1}{\mathcal{Z}(x, y)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\mathcal{Z}(s, t)}{\mathcal{Z}(x, y)}} = \frac{w(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y)} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\mathcal{Z}(s, t)}{\mathcal{Z}(x, y)} \right)^k,$$

ou seja,

$$\frac{w(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y) - \mathcal{Z}(s, t)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{w(x, y) \mathcal{Z}^k(s, t)}{\mathcal{Z}^{k+1}(x, y)}. \quad (6.53)$$

Segue então de (6.53), (6.52), e (6.51) que

$$\int_{\partial\Omega} \frac{w(x, y)}{\mathcal{Z}^k(x, y)} \frac{d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y)} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, 2\kappa. \quad (6.54)$$

Para $g \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, seja

$$Pg(x, y) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \left\{ \frac{g(\xi, \eta)}{\mathcal{Z}(\xi, \eta) - \mathcal{Z}(x, y)} + \frac{\mathcal{Z}(x, y) \overline{g(\xi, \eta)}}{1 - \mathcal{Z}(x, y) \overline{\mathcal{Z}(\xi, \eta)}} \right\} d\xi d\eta. \quad (6.55)$$

O operador P tem propriedades semelhantes às de $T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}$ (veja em (6.9), página 103, a definição de $T_{\mathcal{Z}}^{\kappa}$). Em particular,

$$L(Pg) = g \text{ em } \Omega \text{ e } \Im(Pg) = 0 \text{ em } \partial\Omega;$$

além disso, $Pg \in C_{\mathcal{Z}}^{\beta}(\overline{\Omega}) \subset C^{\beta}(\overline{\Omega})$.

Como a função w satisfaz (6.49), w também é solução do problema de contorno

$$\begin{cases} Lw = aw + b\bar{w} & \text{em } \Omega, \\ \Re(\mathcal{Z}^{\kappa} w) = 0 & \text{em } \partial\Omega. \end{cases}$$

Pelo Princípio da Similaridade, Teorema 10, página 96, w é similar às soluções da equação $Lu = 0$ em Ω e portanto tem zeros isolados em Ω . Seja $\psi(x, y) = \bar{w}(x, y)/w(x, y)$ se $w(x, y) \neq 0$ e $\psi(x, y) = 0$ caso contrário. Então $\psi \in L^{\infty}(\Omega)$ e $a + b\psi \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$. Para $(x, y) \in \overline{\Omega}$, seja

$$s(x, y) = P(a + b\psi)(x, y).$$

Então, a função

$$\Phi(x, y) := w(x, y)e^{-s(x, y)}$$

satisfaz $L\Phi = 0$ em Ω (aqui foi usado o Lema 14, página 95). Além disso,

$$\Re(\mathcal{Z}^{\kappa} \Phi) = e^{-\Re(s)} \Re(\mathcal{Z}^{\kappa} w) = 0 \text{ em } \partial\Omega.$$

Pela Proposição 21 (página 108), podemos escrever Φ da forma

$$\Phi(x, y) = \sum_{j=0}^{2\kappa} b_j \mathcal{Z}^j(x, y), \quad (6.56)$$

com $b_j \in \mathbb{C}$, $b_{2\kappa-j} = -\bar{b}_j$ para $j = 0, 1, \dots, 2\kappa$. Segue então que a função $w = \Phi e^s$ tem a forma

$$w(x, y) = \left(\sum_{j=0}^{2\kappa} b_j \mathcal{Z}^j(x, y) \right) e^{s(x, y)}. \quad (6.57)$$

Com a expressão de w dada por (6.57), podemos reescrever (6.54) como

$$\sum_{k=0}^{2\kappa} b_k \int_{\partial\Omega} \mathcal{Z}^{k-j}(x, y) e^{s(x, y)} \frac{d\mathcal{Z}(x, y)}{\mathcal{Z}(x, y)} = 0, \quad j = 0, 1, \dots, 2\kappa. \quad (6.58)$$

Então, mudando de variável, (usando o Lema 9, página 77) temos

$$\sum_{k=0}^{2\kappa} b_k \int_{\partial\mathbb{D}} \zeta^{k-j} e^{\tilde{s}(\zeta)} \frac{d\zeta}{\zeta} = 0, \quad j = 0, 1, \dots, 2\kappa, \quad (6.59)$$

com $\tilde{s} = s \circ \mathcal{Z}^{-1}$, com $\tilde{s}(\zeta) = \overline{\tilde{s}(\bar{\zeta})}$, $\zeta \in \partial\mathbb{D}$.

Seja $\mathcal{P}(\mathbb{D}) = \{u \in C(\bar{\mathbb{D}}) ; u(\zeta) = a_0 + a_1\zeta + \dots + a_{2\kappa}\zeta^{2\kappa}, \quad a_1, \dots, a_{2\kappa} \in \mathbb{C}, \quad \zeta \in \mathbb{D}\}$.

Considere o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{P}(\mathbb{D}) \times \mathcal{P}(\mathbb{D}) \rightarrow \mathbb{C}$ dado por

$$\langle u, v \rangle := \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}} u(\zeta) \overline{v(\zeta)} e^{\tilde{s}(\zeta)} \frac{d\zeta}{\zeta}.$$

Assim, podemos reescrever (6.59) como

$$\text{Gr}(v_1, \dots, v_{2\kappa})v = 0,$$

onde

$$\text{Gr}(v_1, \dots, v_{2\kappa}) = \begin{bmatrix} \langle v_0, v_0 \rangle & \langle v_0, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_0, v_{2\kappa} \rangle \\ \langle v_1, v_0 \rangle & \langle v_1, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_{2\kappa} \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_{2\kappa}, v_0 \rangle & \langle v_{2\kappa}, v_1 \rangle & \cdots & \langle v_{2\kappa}, v_{2\kappa} \rangle \end{bmatrix} \text{ e } v = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{2\kappa} \end{bmatrix},$$

com

$$v_j(\zeta) = \zeta^j, \quad j = 0, 1, 2, \dots, 2\kappa. \quad (6.60)$$

A matriz $\text{Gr}(v_1, \dots, v_{2\kappa})$ é chamada matriz de Gramm do conjunto de vetores em (6.60). Pela independência linear dos vetores em (6.60), temos que o determinante de $\text{Gr}(v_1, \dots, v_{2\kappa})$ é não nulo (ver Teorema 24, página 132). Logo, $v = 0$, ou seja,

$$b_k = 0, \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, 2\kappa.$$

Assim, segue de (6.57) que $w = 0$. □

Assim, temos o seguinte teorema

Teorema 16. Sejam $a, b, f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, e $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega, \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$. O problema de contorno (6.44) tem uma única solução $u \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\bar{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\bar{\Omega})$, com $\alpha_0 = \min\{\alpha, (2 - q - \tau_M)/q\}$, onde $q = p/(p - 1)$.

Demonstração. Pela Proposição 21 (página 108) existe $\Phi \in C_{\mathcal{Z}}^\alpha(\bar{\Omega})$ satisfazendo $L\Phi = 0$ em Ω e $\Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa}\Phi) = \varphi$ em $\partial\Omega$.

Como G é compacto (Proposição 23), $\text{Ker}(G - I) = \{0\}$ (Proposição 24) e $\psi = T_{\mathcal{Z}}^\kappa f + \Phi \in X$, pelo Teorema de Fredholm (Teorema 27, página 133) temos que existe $u \in X$ tal que

$$(G - I)u = \psi.$$

Ou seja, existe $u \in C(\bar{\Omega})$ tal que

$$u = T_{\mathcal{Z}}^\kappa(au + b\bar{u}) + T_{\mathcal{Z}}^\kappa(f) + \Phi \text{ em } \Omega. \quad (6.61)$$

Segue da expressão acima que $u \in C_{\mathcal{Z}}^{\alpha_0}(\bar{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\bar{\Omega})$, com $\alpha_0 = \min\{\alpha, (2 - q - \tau_M)/q\}$, onde $q = p/(p - 1)$.

Por (6.61) e pela Proposição 19 (página 106)

$$\Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa}u) = \Re(\overline{\mathcal{Z}^\kappa}\Phi) = \varphi \text{ em } \partial\Omega.$$

Pela Proposição 12 (página 104)

$$Lu = au + b\bar{u} + f \text{ em } \Omega.$$

A unicidade da solução segue da Proposição 24. □

Vamos agora considerar o seguinte problema de Riemann-Hilbert mais geral do que o tratado anteriormente

$$\begin{cases} Lu = au + b\bar{u} + f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.62)$$

com $a, b, f \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$, $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega)$, $|\Lambda| = 1$, $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$.

O próximo teorema trata de uma versão do problema de Riemann-Hilbert que é mais geral do que a versão que foi vista no último teorema, a saber, o problema (6.62). A existência de solução do problema está relacionada com o índice de Λ associado a L com respeito a $\partial\Omega$. Se L é expresso por $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ no aberto $\tilde{\Omega}$ (que contém $\bar{\Omega}$), então o índice de Λ associado a L com respeito a $\partial\Omega$ é dado por

$$\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda) = -\text{sgn}\left(\Im(A\bar{B})(p_0)\right) \text{ind}_{\partial\Omega}(\Lambda),$$

onde p_0 é um ponto qualquer de $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$ e sgn denota a função sinal, isto é, $\text{sgn} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$, $\text{sgn}(x) = 1$ se $x > 0$ e $\text{sgn}(x) = -1$ se $x < 0$. Quando $-\text{sgn}(\Im(AB)(p_0)) > 0$, a aplicação $\mathcal{Z} : \bar{\Omega} \rightarrow \bar{\mathbb{D}}$ preserva orientação e quando $-\text{sgn}(\Im(AB)(p_0)) < 0$ a aplicação $\mathcal{Z}$ inverte a orientação. O índice de Λ com respeito a $\partial\Omega$, $\text{ind}_{\partial\Omega}(\Lambda)$, é definido na definição 8 (página 39). (Veja mais na Seção 2.4, página 38).

De modo análogo ao que foi feito na demonstração do Teorema 15 (página 114), vamos fazer uma mudança de incógnita, usando o índice $\text{Ind}_{L,\partial\Omega}(\Lambda)$, para obter uma solução do problema (6.62) a partir de uma solução do problema (6.44).

Teorema 17. Se $\text{Ind}_{L,\partial\Omega}(\Lambda) \geq 0$, então o problema de Riemann-Hilbert (6.62) tem uma única solução $u \in C^{\alpha_0}_{\mathcal{Z}}(\bar{\Omega}) \subset C^{\alpha_0}(\bar{\Omega})$ (com α_0 como no Teorema 16).

Demonstração. Seja $\kappa = \text{Ind}_{L,\partial\Omega}(\Lambda) \geq 0$. Vamos fazer uma mudança de incógnita usando o operador de Schwarz $S_{\mathcal{Z}}$ (definido in (6.24), página 107) para trocar a função da condição de contorno Λ por $\mathcal{Z}^{\kappa}$ e assim poder aplicar o teorema anterior (Teorema 16).

Seja $\kappa := \text{Ind}_{L,\partial\Omega}(\Lambda)$ e seja $g : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada por

$$g(x, y) = \mathcal{Z}^{-\kappa}(x, y)\Lambda(x, y).$$

Temos que $\text{Ind}_{L,\partial\Omega}(g) = 0$. Consequentemente, existe uma função $\vartheta : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Hölder contínua (com mesmo expoente de Hölder que g) tal que

$$g(x, y) = e^{i\vartheta(x, y)}, \text{ para todo } (x, y) \in \partial\Omega.$$

Para $(x, y) \in \bar{\Omega}$ defina

$$\gamma(x, y) = (S_{\mathcal{Z}}\vartheta)(x, y).$$

Então $L\gamma = 0$ em Ω e $\Re(\gamma) = \vartheta$ em $\partial\Omega$ (Proposição 20, página 107). Assim,

$$e^{-i\gamma} = e^{\Im(\gamma) + i\kappa \arg(\mathcal{Z}) - i\arg(\Lambda)} = e^{\Im(\gamma)} \mathcal{Z}^{\kappa} \bar{\Lambda}. \quad (6.63)$$

Sejam $\tilde{b} = b \frac{e^{i\gamma}}{e^{i\gamma}}$ e $\tilde{f} = f e^{-i\gamma}$. Então $\tilde{b}, \tilde{f} \in L^p(\Omega)$, $p > 2 + \sigma_M$ e pelo Teorema 16 o problema

$$\begin{cases} LU = aU + \tilde{b}\bar{U} + \tilde{f} & \text{em } \Omega, \\ \Re(\mathcal{Z}^{\kappa}U) = e^{\Im(\gamma)}\varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.64)$$

tem solução $U \in C^{\alpha_0}(\bar{\Omega})$, com $\alpha_0 = \min\{\alpha, (2 - q - \tau_M)/q\}$. Defina $u = e^{i\gamma}U$ em $\bar{\Omega}$. Temos

$$Lu = e^{i\gamma}LU = e^{i\gamma}\{aU + \tilde{b}\bar{U} + \tilde{f}\} = au + b\bar{u} + f \text{ em } \Omega,$$

Além disso, por (6.63) e (6.64),

$$\Re(\bar{\Lambda}u) = e^{-\Im(\gamma)}\Re(\mathcal{Z}^{\kappa}u) = \varphi \text{ em } \partial\Omega.$$

Isto completa a prova do teorema. □

Observação 27. A existência de solução para o Problema de Riemann-Hilbert (6.62) quando $\kappa = \text{Ind}_{L, \partial\Omega} \Lambda < 0$ depende do estudo de condições de compatibilidade que envolvem o operador de Schwarz $S_{\mathcal{L}}$, as condições de contorno do problema e o operador $T_{\mathcal{L}}^{\kappa}$. Veja como exemplo o caso clássico descrito na Observação 36, página 141.

6.6 O problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = au + f$ quando L é hipoelítico

Seja $\tilde{\Omega}$ um aberto conexo de $\mathbb{R}^2$ e L um campo vetorial complexo de classe C^∞ não singular definido em $\tilde{\Omega}$, isto é,

$$L = A(x, y) \frac{\partial}{\partial x} + B(x, y) \frac{\partial}{\partial y},$$

com $A, B \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ e $|A| + |B| > 0$ em $\tilde{\Omega}$. Seja Ω um aberto simplesmente conexo com bordo suave de $\mathbb{R}^2$ tal que $\bar{\Omega}$ é um compacto de $\mathbb{R}^2$ e $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$.

Vamos supor nesta seção que L é hipoelítico¹ em $\tilde{\Omega}$.

Nesta seção vamos considerar o seguinte problema de Riemann-Hilbert:

$$\begin{cases} Lu = au + f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.65)$$

onde $a, f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$, $\Lambda, \varphi \in C^\alpha(\partial\Omega)$, $0 < \alpha < 1$, com $|\Lambda| = 1$.

Na Seção 3.3, página 56, definimos hipoeliticidade de um campo vetorial complexo e relacionamos este conceito com a classe de campos estudada neste texto.

Esta seção ilustra, através do estudo do problema acima, o caso em que a equação diferencial, do tipo de problema de contorno estudado nesta tese, é $\mathbb{C}$ -linear em relação a “variável” u . Neste caso a abordagem do problema é mais simples e não é necessário utilizar a teoria desenvolvida para o operador integral T_Z . A existência de solução do problema será consequência da teoria clássica, da resolubilidade local de L , uma vez que campos hipoelíticos (não singulares) satisfazem a condição (P), e da existência de uma integral primeira global de L que é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Assinalamos que não haverá hipóteses sobre o conjunto característico como nos problemas anteriores.

6.6.1 Resolubilidade global para campos hipoelíticos no plano

Sejam $\tilde{\Omega}$ e L como anteriormente. Nesta parte estudaremos um pouco sobre a resolubilidade de L .

¹ veja a definição 11, página 57.

Definição 12. Um campo vetorial complexo L é dito localmente resolúvel em $\tilde{\Omega}$, se para todo ponto $p \in \tilde{\Omega}$ existe $\mathcal{O}_p$ um aberto de $\tilde{\Omega}$, com $p \in \mathcal{O}_p$, e $u_p \in \mathcal{D}'(\mathcal{O}_p)$ tal que $Lu_p = f$ em $\mathcal{O}_p$.

Um campo vetorial não singular hipoelítico é localmente resolúvel. Isso segue do fato de que todo campo vetorial não singular hipoelítico satisfaz a condição (P) de Nirenberg e Treves. (Veja (TREVES, 1971)). A condição (P) é necessária e suficiente para resolubilidade local (veja em (BERHANU; CORDARO; HOUNIE, 2008)).

Definição 13. Um campo vetorial L é dito globalmente resolúvel em $\tilde{\Omega}$ se para toda $f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ existe uma distribuição $u \in \mathcal{D}'(\tilde{\Omega})$ tal que $Lu = f$ em $\tilde{\Omega}$.

Note que, se L é um campo vetorial hipoelítico em $\tilde{\Omega}$ e $f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$, então toda solução u da equação $Lu = f$ em $\tilde{\Omega}$ é uma função de classe C^∞ em $\tilde{\Omega}$.

Teorema 18. Para toda $f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ existe uma função $u \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ tal que $\partial u / \partial \bar{z} = f$ em $\tilde{\Omega}$.

Demonstração. Veja (HÖRMANDER, 1973), página 12, Teorema 1.4.4. □

Observação 28. A demonstração do resultado acima, Teorema 18, que se encontra em (HÖRMANDER, 1973), não é uma consequência imediata do Teorema 32, página 138.

Teorema 19. Se L é um campo hipoelítico não singular em $\tilde{\Omega}$, então L é globalmente resolúvel em $\tilde{\Omega}$, i.e., para toda $f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ existe uma função $u \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ tal que $Lu = f$ em $\tilde{\Omega}$.

Demonstração. Como L é um campo vetorial hipoelítico não singular em $\tilde{\Omega}$, existe $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$, de classe C^∞ , tal que $LZ = 0$ em $\tilde{\Omega}$, $dZ \neq 0$ em $\tilde{\Omega}$ e $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow Z(\tilde{\Omega})$ é um homeomorfismo. (Veja a Proposição 13, na página 57).

Seja $f \in C^\infty(\tilde{\Omega})$. Como L é hipoelítico (e localmente resolúvel) existe uma cobertura aberta $\{\mathcal{O}_v\}_{v=1}^\infty$ de $\tilde{\Omega}$ tal que para cada v natural existe $u_v \in C^\infty(\mathcal{O}_v)$ que satisfaz $Lu_v = f$ em $\mathcal{O}_v$.

Se $\mathcal{O}_j \cap \mathcal{O}_k \neq \emptyset$ então $L(u_j - u_k) = f - f = 0$ em $\mathcal{O}_j \cap \mathcal{O}_k$. Assim, pelo Teorema 3 (página 57), existe $h_{jk} : Z(\mathcal{O}_j) \cap Z(\mathcal{O}_k) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa tal que

$$(u_j - u_k)(p) = h_{jk}(Z(p)) \text{ em } Z(\mathcal{O}_j) \cap Z(\mathcal{O}_k). \quad (6.66)$$

A família $\{h_{jk}\}$ satisfaz:

- (a) $h_{jj} = 0$ em $Z(\mathcal{O}_j)$, $j \in \mathbb{N}$;
- (b) $h_{jk} = -h_{kj}$ em $Z(\mathcal{O}_j) \cap Z(\mathcal{O}_k)$, $j, k \in \mathbb{N}$;
- (c) $h_{jk} + h_{kl} + h_{lj} = 0$ em $Z(\mathcal{O}_j) \cap Z(\mathcal{O}_k) \cap Z(\mathcal{O}_l)$, $j, k, l \in \mathbb{N}$.

Seja $\{\varphi_v\}$ uma partição da unidade subordinada à cobertura aberta $\{Z(\mathcal{O}_v)\}_{v=1}^\infty$ de $Z(\tilde{\Omega})$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, seja

$$w_k := \sum_{v=1}^{\infty} \varphi_v h_{vk} \text{ em } Z(\tilde{\Omega}).$$

A função w_k está bem definida e $w_k \in C^\infty(Z(\tilde{\Omega}))$. Por (b) e (c) temos

$$w_k - w_j = \sum_{v=1}^{\infty} \varphi_v (h_{vk} - h_{vj}) = \sum_{v=1}^{\infty} \varphi_v h_{jk} = h_{jk} \sum_{v=1}^{\infty} \varphi_v = h_{jk} \quad (6.67)$$

em $Z(\mathcal{O}_k) \cap Z(\mathcal{O}_j)$, $j, k \in \mathbb{N}$. Por (6.67) temos

$$\frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}} \text{ em } Z(\mathcal{O}_k) \cap Z(\mathcal{O}_j), j, k \in \mathbb{N}.$$

Assim, existe uma função $\Psi \in C^\infty(Z(\tilde{\Omega}))$ tal que

$$\Psi|_{Z(\mathcal{O}_k)} = \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}} \text{ em } Z(\mathcal{O}_k) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Como o operador de Cauchy-Riemann é globalmente resolúvel (veja o Teorema 18) existe $U \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ tal que

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{z}} = -\Psi \text{ em } Z(\tilde{\Omega}).$$

Seja $h_k := w_k + U$ em $Z(\mathcal{O}_k)$. Assim

$$\frac{\partial h_k}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial U}{\partial \bar{z}} = \Psi - \Psi = 0 \text{ em } Z(\mathcal{O}_k), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Portanto h_k é holomorfa em $Z(\mathcal{O}_k)$, $k \in \mathbb{N}$. Além disso, temos por (6.67)

$$h_k - h_j = w_k + U - w_j - U = w_k - w_j = h_{kj} \text{ em } Z(\mathcal{O}_k) \cap Z(\mathcal{O}_j), \quad \forall j, k \in \mathbb{N}. \quad (6.68)$$

Assim podemos definir a função $u : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$u(p) = u_j(p) - h_j(Z(p)), \text{ se } p \in \mathcal{O}_j.$$

Por (6.68) u está bem definida. De fato, seja $p \in \mathcal{O}_k \cap \mathcal{O}_j$. Então, por (6.66) e (6.68), temos

$$(u_k(p) - h_k(Z(p))) - (u_j(p) - h_j(Z(p))) = u_k(p) - u_j(p) - (h_k(Z(p)) - h_j(Z(p))) =$$

$$(u_k(p) - u_j(p)) - (h_k(Z(p)) - h_j(Z(p))) = h_{kj}(Z(p)) - h_{kj}(Z(p)) = 0.$$

Note que $u \in C^\infty(\tilde{\Omega})$. Agora observe que, se $p \in \tilde{\Omega}$, então existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $p \in \mathcal{O}_j$ e

$$Lu = Lu_j + L(h_j \circ Z) = f \text{ em } \mathcal{O}_j.$$

Como $\{\mathcal{O}_v\}_{v=1}^\infty$ é uma cobertura de $\tilde{\Omega}$, temos que $Lu = f$ em $\tilde{\Omega}$. □

6.6.2 O problema de Riemann-Hilbert para a equação $Lu = au + f$

Seja L um campo hipoelítico não singular definido em um aberto $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^2$ e Ω um aberto simplesmente conexo de $\tilde{\Omega}$ tal que $\bar{\Omega}$ é um compacto de $\mathbb{R}^2$, com $\bar{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$ e $\partial\Omega$ é uma variedade mergulhada de dimensão 1 de $\mathbb{R}^2$, de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 < \varepsilon < 1$, transversal a L no seguinte sentido

$$i^* \omega \neq 0,$$

onde $\omega = Bdx - A dy$ é ortogonal a $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ e $i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ é a aplicação de inclusão. (Veja a Seção 2.5, página 44).

Seja $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ uma integral primeira global de L , de classe C^∞ , que é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Nesta seção vamos provar a existência de solução para o seguinte problema de contorno

$$\begin{cases} Lu = au + f & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\Lambda}u) = \varphi & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.69)$$

onde $\Lambda \in C^\alpha(\partial\Omega)$, com $|\Lambda| = 1$, $\varphi \in C^\alpha(\partial\Omega, \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$ e $f, a \in C^\infty(\tilde{\Omega})$.

Vamos relembrar o conceito de índice usado neste texto. Se L é expresso por $L = A\partial/\partial x + B\partial/\partial y$ no aberto $\tilde{\Omega}$, então o índice de Λ associado a L com respeito a $\partial\Omega$ é dado por

$$\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda) = -\text{sgn}\left(\Im(A\bar{B})(p_0)\right) \text{ind}_{\partial\Omega}(\Lambda),$$

onde p_0 é um ponto qualquer de $\tilde{\Omega} \setminus \Sigma$, onde Σ é o conjunto característico de L , e sgn denota a função sinal, isto é, $\text{sgn} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$, $\text{sgn}(x) = 1$ se $x > 0$ e $\text{sgn}(x) = -1$ se $x < 0$. Quando $-\text{sgn}\left(\Im(A\bar{B})(p_0)\right) > 0$, a integral primeira $Z : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ preserva orientação e quando $-\text{sgn}\left(\Im(A\bar{B})(p_0)\right) < 0$ a integral primeira Z inverte a orientação. O índice de Λ com respeito a $\partial\Omega$, $\text{ind}_{\partial\Omega}(\Lambda)$, é definido na definição 8 (página 39). (Veja mais na Seção 2.4, página 38).

Teorema 20. Se o índice $\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda) \geq 0$, então o problema (6.69) possui uma solução $u \in C^\infty(\Omega) \cap C^\alpha(\bar{\Omega})$.

Demonstração. Pelo Teorema 19, que fala sobre a resolubilidade global de campos hipoelíticos, existem $v \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ tal que $Lv = a$ e $V \in C^\infty(\tilde{\Omega})$ tal que $LV = fe^{-v}$. Então $U := Ve^v$ é de classe C^∞ em $\tilde{\Omega}$ e satisfaz

$$LU = (LV)e^v + Ve^vLv = fe^{-v}e^v + Ve^va = f + Ua = aU + f \text{ em } \tilde{\Omega}.$$

Agora considere o problema

$$\begin{cases} LH = 0 & \text{em } \Omega, \\ \Re(\bar{\chi}H) = \theta & \text{em } \partial\Omega, \end{cases} \quad (6.70)$$

onde $\chi = \Lambda e^v$ e $\theta = \varphi - \Re(\bar{\Lambda}U)$. Temos que $\chi, \theta \in C^\alpha(\partial\Omega)$. Temos também que $\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\chi) \geq 0$, uma vez que $\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\Lambda) \geq 0$ e $|e^v| > 0$ (veja (2.15), página 41).

Sejam $\tilde{\chi} = \chi \circ Z^{-1}$ e $\tilde{\theta} = \theta \circ Z^{-1}$. Temos $\tilde{\chi}, \tilde{\theta} \in C^\alpha(Z(\partial\Omega))$ pela transversalidade de $\partial\Omega$ em relação a L (lema 3, página 44). Como $\text{Ind}_{L, \partial\Omega}(\chi) \geq 0$ temos o índice clássico $\text{ind}_{Z(\partial\Omega)}(\tilde{\chi}) \geq 0$. Pela teoria clássica do problema de Riemann-Hilbert (veja (VEKUA, 1962) e (BEGEHR, 1994); veja também o Corolário 11, página 141), temos que existe $h \in C^\alpha(Z(\bar{\Omega}))$ tal que

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = 0 & \text{em } Z(\Omega), \\ \Re(\tilde{\chi}h) = \tilde{\theta} & \text{em } Z(\partial\Omega). \end{cases} \quad (6.71)$$

Defina $H : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ por $H = h \circ Z$. Temos que $LH = 0$ em Ω pois h é holomorfa em $Z(\Omega)$ e $LZ = 0$ em Ω . (Veja a Proposição 2, página 31).

Seja $(x, y) \in \partial\Omega$. Temos

$$\Re(\tilde{\chi}H(x, y)) = \Re(\tilde{\chi}(\overline{Z(x, y)})h(Z(x, y))) = \tilde{\theta}(Z(x, y)) = \theta(x, y) = \{\varphi - \Re(\bar{\Lambda}U)\}(x, y).$$

Portanto H é uma solução do problema (6.70).

Seja $u := He^v + U$ em $\bar{\Omega}$. Temos que $u \in C^\alpha(\bar{\Omega}) \cap C^\infty(\Omega)$ e

$$Lu = L(He^v) + LU = aHe^v + aU + f = a(He^v + U) + f = au + f \text{ em } \Omega.$$

A condição de contorno:

$$\Re(\bar{\Lambda}u) = \Re(\bar{\Lambda}He^v) + \Re(\bar{\Lambda}U) = \Re(\bar{\Lambda}e^vH) + \Re(\bar{\Lambda}U) = \varphi - \Re(\bar{\Lambda}U) + \Re(\bar{\Lambda}U) = \varphi \text{ em } \partial\Omega.$$

Portanto, u é uma solução do problema (6.69). □

TEOREMAS IMPORTANTES USADOS NO TEXTO

Teoremas de Riemann

Teorema 21. (Teorema da Aplicação de Riemann e Suavidade Sobre o Bordo) Seja D um aberto limitado simplesmente conexo de $\mathbb{C}$ com bordo suave de classe $C^{k+\varepsilon}$, $k = 1, 2, \dots$ e $0 < \varepsilon < 1$. Então, um biholomorfismo de D sobre $\mathbb{D}$ que se estende a um difeomorfismo de classe C^k , de $\overline{D}$ sobre $\overline{\mathbb{D}}$.

Veja em ([POMMERENKE, 1992](#)), ([KRANTZ, 2006](#)).

□

Teorema 22. Seja S uma superfície de Riemann que é homeomorfa a um aberto de $\mathbb{R}^2$. Então existe uma aplicação holomorfa injetiva $f : S \rightarrow \mathbb{C}$.

Veja em ([SPRINGER, 1957](#)).

□

Observação 29. O termo “holomorfa” usado no enunciado do teorema acima é referente a estrutura de superfície de Riemann de S . Dizemos que $f : S \rightarrow \mathbb{C}$ é holomorfa se para cada ponto $p \in S$ existe uma carta (U, Φ) de S , com $p \in U$, tal que

$$f \circ \Phi^{-1} : \Phi(U) \rightarrow \mathbb{C}$$

é uma função holomorfa (no sentido usual da análise complexa).

Veja em ([FARKAS; KRA, 1980](#)) teoremas semelhantes ao Teorema 22. Tais teoremas são chamados de teoremas de uniformização.

Extensão de funções holomorfas

Um arco de Jordan é a imagem de intervalo fechado em $\mathbb{R}$ por uma aplicação contínua e injetiva chegando em $\mathbb{C}$.

Teorema 23. Seja D um aberto conexo de $\mathbb{C}$ e seja Γ um arco de Jordan retificável que divide D em dois abertos conexos D_1 e D_2 . Suponha que $f_j : \Gamma \cup D_j \rightarrow \mathbb{C}$, $j = 1, 2$, é contínua e holomorfa em D_j , $j = 1, 2$. Então a função $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $f = f_j$ em $\Gamma \cup D_j$, $j = 1, 2$, é holomorfa em D .

Veja em (ZALCMAN, 1974).

□

Teorema de Gramm

Seja E um espaço vetorial de dimensão n . Seja $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ um produto interno em E . A matriz de Gramm do conjunto de vetores $v_1, v_2, \dots, v_n \in E$ é a matriz $\text{Gr}(v_1, \dots, v_n)$, $n \times n$, dada por

$$\text{Gr}(v_1, \dots, v_n) = \begin{bmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_2, v_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \langle v_n, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{bmatrix}$$

Teorema 24. Os vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ são linearmente independentes em E se, e somente se, a sua matriz de Gramm $\text{Gr}(v_1, \dots, v_n)$ é não singular.

Demonstração. Suponha que $v_1, v_2, \dots, v_n$ são linearmente dependentes. Então existe um vetor não nulo $a = (a_k)_{k=1, \dots, n} \in \mathbb{C}^n$ tal que

$$\sum_{k=1}^n a_k v_k = 0.$$

Então, para todo $j = 1, 2, \dots, n$,

$$\sum_{k=1}^n a_k \langle v_j, v_k \rangle = 0.$$

Ou seja, $\text{Gr}(v_1, \dots, v_n)a = 0$. Portanto, $\text{Gr}(v_1, \dots, v_n)$ é singular.

Reciprocamente, suponha que $v_1, v_2, \dots, v_n$ são linearmente independentes. Seja $a \in \mathbb{C}^n$ tal que $\text{Gr}(v_1, \dots, v_n)a = 0$. Podemos escrever

$$a = \sum_{k=1}^n a_k v_k,$$

com $a_k \in \mathbb{C}^n$, $k = 1, \dots, n$. Então, para todo $j = 1, 2, \dots, n$,

$$\langle v_j, a \rangle = \sum_{k=1}^n a_k \langle v_j, v_k \rangle = 0,$$

logo a é ortogonal a si mesmo, isto é, $\langle a, a \rangle = 0$. Portanto $a = 0$ e concluímos assim que $\text{Gr}(v_1, \dots, v_n)$ é não singular. $\square$

Recíproca da desigualdade de Hölder

Seja Ω um aberto de $\mathbb{R}^2$. Se $f \in L^p(\Omega)$, $1 < p < \infty$, e $g \in L^q(\Omega)$ com $1/p + 1/q = 1$, temos pela desigualdade de Hölder que $fg \in L^1(\Omega)$. A recíproca desse resultado segue do seguinte teorema:

Teorema 25. (Recíproca da desigualdade de Hölder) Seja Ω um aberto de $\mathbb{R}^2$. Seja $f \in L^1(\Omega)$. Se tivermos $fg \in L^1(\Omega)$, para toda $g \in L^p(\Omega)$, $1 < p < \infty$, então $f \in L^q(\Omega)$ com $1/p + 1/q = 1$.

(Veja, ([YEH, 2006](#)); também, ([LEACH, 1956](#)))

Teoremas de ponto fixo

Teorema 26. (Teorema do Ponto Fixo de Schauder) Seja X um espaço de Banach. Se $T : A \rightarrow A$ é uma aplicação contínua, onde A é um subconjunto não vazio, compacto e convexo de X , então T possui um ponto fixo, *i.e.*, existe $p \in A$ tal que $T(p) = p$.

Veja uma demonstração em ([COURANT; HILBERT, 1962](#)), na página 403.

Seja X um espaço de Banach com a norma $\|\cdot\|_X$ e $\mathcal{B}_X = \{f \in X ; \|f\|_X \leq 1\}$. Dizemos que um operador linear contínuo $G : X \rightarrow X$ é compacto se $G(\mathcal{B}_X)$ é pré-compacto no topologia forte de X .

O nosso próximo teorema refere-se na resolubilidade da equação $(I - G)u = v$.

Teorema 27. (Alternativa de Fredholm). Seja X é um espaço de Banach e $G : X \rightarrow X$ um operador compacto. Temos que $\text{Ker}(I - G) = 0$ se, e somente se, $\text{Im}(I - G) = X$.

Veja ([BREZIS, 2010](#)).

ALGUNS RESULTADOS DA TEORIA CLÁSSICA

Neste apêndice vamos falar um pouco da teoria clássica que trata de equações envolvendo o operador de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad z = x + iy.$$

O conteúdo deste apêndice pode ser encontrado em (BEGEHR, 1994), (VEKUA, 1962) e (GAKHOV, 1966).

Seja Γ uma curva suave por partes em $\mathbb{C}$ e $\varphi \in C(\Gamma)$. Então,

$$\phi(z) := \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (\text{B.1})$$

é holomorfa em $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ e $\phi(\infty) = 0$. Em geral, ϕ não existe sobre a curva Γ .

Seja Γ uma curva fechada simples e suave por partes em $\mathbb{C}$. Se $\varphi \in C^\alpha(\Gamma)$, $0 < \alpha < 1$, então ϕ dada por (B.1) existe sobre Γ como *valor principal de Cauchy*.

O teorema a seguir é conhecido como fórmula de Plemelj-Sokhotzki.

Teorema 28. (PLEMELJ-SOKHOTZKI). Com as mesmas condições acima, temos que

$$\phi^+(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \phi(z), \quad z \in D^+, \quad \text{e} \quad \phi^-(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \phi(z), \quad z \in D^-,$$

onde D^+ é a região delimitada por $\Gamma = \partial D^+$ e $D^- = \mathbb{C} \setminus \overline{D^+}$. Além disso, para $z_0 \in \Gamma$,

$$\phi^+(z_0) - \phi^-(z_0) = \varphi(z_0) \quad \text{e} \quad \phi^+(z_0) + \phi^-(z_0) = 2\varphi(z_0).$$

Mais ainda, $\phi^+ \in C^\alpha(\overline{D^+})$ e $\phi^- \in C^\alpha(\overline{D^-})$.

Seja $D \subset \mathbb{C}$ um aberto limitado.

Definição 14. Para $f \in L^1(D)$ definimos o operador integral

$$Tf(z) = -\frac{1}{\pi} \int_D \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\xi d\eta, \quad \zeta = \xi + i\eta, \quad z \in \mathbb{C}. \quad (\text{B.2})$$

O operador Tf é conhecido como operador de Cauchy-Pompeiu.

Teorema 29. Se $f \in L^p(D)$, com $p > 2$, então

$$|Tf(z)| \leq M(p, D) \|f\|_p, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Demonstração. Seja $z \in D$. Pela desigualdade de Hölder,

$$|Tf(z)| \leq \frac{\|f\|_p}{\pi} \left(\int_D \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z|^q} \right)^{\frac{1}{q}} =: \frac{\|f\|_p}{\pi} I^{\frac{1}{q}}, \quad q = p/(p-1).$$

Seja $d = \text{diam}(D) = \sup\{|\zeta - z|; \zeta, z \in D\}$. Temos assim,

$$I = \int_D \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z|^q} \leq \int_{|\zeta - z| \leq d} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z|^q} = 2\pi \int_0^d r^{1-q} dr = \frac{2\pi}{2-q} d^{2-q}.$$

Portanto, tomando $M(p, D) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2\pi}{2-q} d^{2-q} \right)^{\frac{1}{q}}$ temos o resultado. $\square$

Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ com $0 < \alpha < 2$ e $0 < \beta < 2$. Para $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, com $z_1 \neq z_2$, definimos

$$J_{\alpha, \beta}(z_1, z_2, D) = \int_D \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z_1|^\alpha |\zeta - z_2|^\beta}, \quad \zeta = \xi + i\eta.$$

Lema 18. (Desigualdade de Hadamard) Existem constantes $M_1(\alpha, \beta)$, $M_2(\alpha, \beta, D)$ e $M_3(\alpha, \beta, D) > 0$ tais que

$$J_{\alpha, \beta}(z_1, z_2, D) \leq \begin{cases} M_1(\alpha, \beta) |z_1 - z_2|^{2-\alpha-\beta}, & \text{se } \alpha + \beta > 2, \\ M_2(\alpha, \beta, D) + 8\pi \ln |z_1 - z_2|, & \text{se } \alpha + \beta = 2, \\ M_3(\alpha, \beta, D), & \text{se } \alpha + \beta < 2. \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

Demonstração. Seja $\rho > 0$ tal que

$$\overline{D} \subset \{z \in \mathbb{C}; |z - z_1| < 2\rho\}.$$

Sejam

$$D_1 = \{z \in \mathbb{C}; |\zeta - z_1| < 2\rho\} \text{ e } D_2 = \{z \in \mathbb{C}; |z - z_1| < 2|z_1 - z_2|\}.$$

Temos

$$J_{\alpha, \beta}(z_1, z_2, D) \leq \int_{D_1 \setminus D_2} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z_1|^\alpha |\zeta - z_2|^\beta} + \int_{D_2} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z_1|^\alpha |\zeta - z_2|^\beta} := J_1 + J_2.$$

Para $\zeta \in D_1 \setminus D_2$, temos

$$2|z_1 - z_2| \leq |\zeta - z_1| < 2\rho.$$

Daí,

$$|\zeta - z_2| \geq |\zeta - z_1| - |z_1 - z_2| \geq |\zeta - z_1| - \frac{1}{2}|\zeta - z_1| = \frac{1}{2}|\zeta - z_1|.$$

Assim,

$$J_1 \leq 2^\beta \int_{D_1 \setminus D_2} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z_1|^{\alpha+\beta}} = 2^{\beta+1} \pi \int_{2|z_1 - z_2|}^{2\rho} \frac{dr}{r^{\alpha+\beta-1}}.$$

Logo,

$$J_1 \leq 2^{\beta+1} \pi \begin{cases} \frac{2^{2-\alpha-\beta}}{\alpha+\beta-2} |z_1 - z_2|^{2-\alpha-\beta}, & \text{se } \alpha+\beta > 2, \\ \ln \frac{\rho}{|z_1 - z_2|}, & \text{se } \alpha+\beta = 2, \\ \frac{2^{2-\alpha-\beta}}{2-\alpha-\beta} \rho^{2-\alpha-\beta}, & \text{se } \alpha+\beta < 2. \end{cases}$$

Observe,

$$\ln \frac{\rho}{|z_1 - z_2|} = \ln(\rho) - \ln|z_1 - z_2| \leq |\ln(\rho)| + |\ln|z_1 - z_2||.$$

Estimando J_2 temos

$$J_2 = \int_{D_2} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z_1|^\alpha |\zeta - z_2|^\beta} = |z_1 - z_2|^{-\alpha-\beta} \int_{D_2} \frac{d\xi d\eta}{\left| \frac{\zeta - z_1}{z_1 - z_2} \right|^\alpha \left| \frac{\zeta - z_2}{z_1 - z_2} \right|^\beta}.$$

Temos que

$$\left| \frac{\zeta - z_2}{z_1 - z_2} \right| = \left| \frac{\zeta - z_1}{z_1 - z_2} + \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_2} \right| = \left| \frac{\zeta - z_1}{z_1 - z_2} + 1 \right|.$$

Assim

$$J_2 = |z_1 - z_2|^{-\alpha-\beta} \int_{D_2} \frac{d\xi d\eta}{\left| \frac{\zeta - z_1}{z_1 - z_2} \right|^\alpha \left| \frac{\zeta - z_1}{z_1 - z_2} + 1 \right|^\beta}.$$

Mudando de coordenada através da função $F : D_2 \rightarrow B(0, 2)$ dada por

$$F(\zeta) = \frac{\zeta - z_1}{z_1 - z_2},$$

temos

$$J_2 = |z_1 - z_2|^{2-\alpha-\beta} \int_{B(0,2)} \frac{d\xi d\eta}{|\zeta|^\alpha |\zeta + 1|^\beta} \leq M(\alpha, \beta) |z_1 - z_2|^{2-\alpha-\beta},$$

onde $M(\alpha, \beta)$ é uma constante positiva.

Juntando as estimativas de J_1 e J_2 obtemos a estimativa (B.3). □

Teorema 30. Se $f \in L^p(D)$, com $p > 2$, então

$$|Tf(z_1) - Tf(z_2)| \leq C(p, D) \|f\|_p |z_1 - z_2|^{\frac{2-q}{q}}, \text{ para todos } z_1, z_2 \in \mathbb{C},$$

com $q = p/(p-1)$.

Demonstração. Sejam $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, com $z_1 \neq z_2$. Temos, pela desigualdade de Hölder,

$$\begin{aligned} |Tf(z_1) - Tf(z_2)| &= \left| \frac{(z_1 - z_2)}{\pi} \int_D \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)} d\xi d\eta \right| \\ &\leq \frac{|z_1 - z_2|}{\pi} \|f\|_p \left(\int_D \frac{d\xi d\eta}{|\zeta - z_1|^q |\zeta - z_2|^q} \right)^{\frac{1}{q}} =: \frac{|z_1 - z_2|}{\pi} \|f\|_p J^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

Pela Desigualdade de Hadamard, lema 18, temos

$$J \leq M(q) |z_1 - z_2|^{2-q}.$$

Daí,

$$|Tf(z_1) - Tf(z_2)| \leq \frac{|z_1 - z_2|}{\pi} \|f\|_p \left(M(q) |z_1 - z_2|^{2-2q} \right)^{\frac{1}{q}} = C(q) \|f\|_p |z_1 - z_2|^{\frac{2-q}{q}}.$$

□

Observação 30. Dizer que $\Gamma \subset \mathbb{C}$ é uma curva de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 \leq \varepsilon < 1$, equivale a dizer que $\tilde{G} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + iy \in \Gamma\} \subset \mathbb{R}^2$ é uma subvariedade mergulhada de dimensão 1, de classe $C^{1+\varepsilon}$, de $\mathbb{R}^2$. Veja em (MUSKHELISHVILI, 1953) sobre propriedades de curvas suaves. Sobre a teoria de variedades diferenciáveis veja (LIMA, 2007).

Teorema 31. (Fórmula de representação Cauchy-Pompeiu). Seja $U \subset \mathbb{C}$ um aberto limitado simplesmente conexo com bordo de classe C^1 . Se w é uma função de classe C^1 numa vizinhança de $\overline{U}$, então

$$w(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{w(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \int_U \frac{\partial w}{\partial \bar{z}}(\zeta) \frac{d\xi d\eta}{\zeta - z}, \quad \zeta = \xi + i\eta,$$

para todo $z \in U$.

□

Observação 31. A expressão “função de classe C^1 numa vizinhança de $\overline{U}$ ” no enunciado acima significa que $\tilde{w}$ é uma função de classe C^1 , onde $\tilde{w}(x, y) = w(x + iy)$, numa vizinhança de $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + iy \in \overline{U}\}$ em $\mathbb{R}^2$.

Observação 32. A Fórmula de representação Cauchy-Pompeiu também é conhecida como a Fórmula de Cauchy não-homogênea.

O operador T pode ser usado para obter soluções fracas para a equação $\partial w / \partial \bar{z} = f$ em D , para f com “baixa regularidade” como veremos no próximo teorema. A demonstração é uma consequência do Teorema 31. Veja (BEGEHR, 1994) e (VEKUA, 1962).

Teorema 32. Se $f \in L^1(D)$, então $\frac{\partial Tf}{\partial \bar{z}} = f$ em D .

□

Seja D um aberto simplesmente conexo $\mathbb{C}$ com bordo de classe C^1 e com $0 \in D$.

Definição 15. O problema de contorno de Schwarz consiste em encontrar uma função holomorfa w em D , i.e., $\partial w / \partial \bar{z} = 0$ em D , que satisfaz

$$\Re(w) = \gamma \text{ em } \partial D \text{ e } \Im(w)(0) = c$$

para $\gamma \in C(\partial D; \mathbb{R})$, $c \in \mathbb{R}$ dados.

Definição 16. Um operador

$$S : C(\partial D; \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{A}(D) \cap C(\bar{D}; \mathbb{C})$$

do espaço das funções contínuas a valores reais definidas em D sobre o espaço das funções holomorfas em D , $\mathcal{A}(D)$, que são contínuas em $\bar{D}$ que satisfaz

$$\Re(S\varphi) = \varphi \text{ em } \partial D$$

é chamado de operador de Schwarz.

Seja $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} ; |z| < 1\}$.

Proposição 25. No caso $D = \mathbb{D}$ o operador de Schwarz com o núcleo de Schwarz-Poisson é

$$(S\varphi)(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \varphi(\zeta) \frac{\zeta + z}{\zeta - z} \frac{d\zeta}{\zeta} + ic, \quad z \in \bar{\mathbb{D}}, \quad (\text{B.4})$$

onde $c \in \mathbb{R}$ é uma constante arbitrária.

□

Observação 33. O operador definido na proposição acima satisfaz $\Im\{S\varphi\}(0) = c$.

Teorema 33. (PRIVALOV). Seja $w = u + iv$ uma função holomorfa em $\mathbb{D}$, onde v é contínua em $\bar{\mathbb{D}}$ e Hölder contínua sobre o bordo $\partial\mathbb{D}$, satisfazendo, para $0 < \alpha < 1$,

$$|v(z_1) - v(z_2)| \leq K|z_1 - z_2|^\alpha, \quad \zeta_1, \zeta_2 \in \partial\mathbb{D}.$$

Então, w é Hölder contínua em $\bar{\mathbb{D}}$ com o mesmo expoente e constante cK , $c = c(\alpha)$, i.e.,

$$|w(z_1) - w(z_2)| \leq cK|z_1 - z_2|^\alpha, \quad \zeta_1, \zeta_2 \in \bar{\mathbb{D}}.$$

(Veja (BEGEHR, 1994))

□

Temos assim o seguinte corolário.

Corolário 9. Se $g \in C^\alpha(\partial\mathbb{D}; \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, então $Sg \in C^\alpha(\overline{\mathbb{D}})$.

Demonstração. Segue direto da Proposição 25 e do Teorema 33. $\square$

O Problema de Riemann-Hilbert. Dados $\Lambda \in C^\alpha(\partial D)$, com $|\Lambda| = 1$ em ∂D , $\varphi \in C^\alpha(\partial D, \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$, o Problema de Riemann-Hilbert consiste em encontrar uma função w holomorfa em D , Hölder contínua em $\overline{D}$, e tal que

$$\Re(\overline{\Lambda(\zeta)}w(\zeta)) = \varphi(\zeta) \text{ para } \zeta \in \partial D. \quad (\text{B.5})$$

Observação 34. Em alguns livros a condição de fronteira (B.5) é escrita de uma forma diferente. Se escrevermos w e Λ em termos de suas partes reais e imaginárias, $w = w_1 + iw_2$ e $\Lambda = \Lambda_1 + i\Lambda_2$, então podemos escrever (B.5) como

$$\Lambda_1 w_1 + \Lambda_2 w_2 = \varphi \text{ em } \partial D.$$

Seja Γ uma curva fechada simples de classe C^1 em $\mathbb{C}$.

Definição 17. Seja $G \in C(\Gamma, \mathbb{C})$, $|G| = 1$. O índice de G com respeito a Γ é definido pelo número inteiro

$$\text{ind}_\Gamma(G) = \frac{1}{2\pi} \int_\Gamma d\arg(G).$$

Observação 35. A integral acima é entendida no sentido da integral de Stieltjes. Veja (GAKHOV, 1966) e (BEGEHR, 1994) sobre a definição do índice e propriedades. Veja também a seção 2.4, na página 38.

A partir do operador de Schwarz podemos obter a solução do problema de Riemann-Hilbert. No próximo teorema, o aberto D será o disco aberto $\mathbb{D}$, e S denotará o operador em (B.4).

Teorema 34. (BEGEHR, 1994) O problema de Riemann-Hilbert para o índice $\kappa = \text{ind}_{\partial\mathbb{D}}(\Lambda) \geq 0$ é resolúvel. A solução geral é dada por

$$w(z) = z^\kappa e^{i\gamma(z)} \left[(S\tilde{\varphi})(z) + ic_0 + \sum_{k=1}^{\kappa} (c_k z^k - \overline{c_k} z^{-k}) \right], \quad z \in \mathbb{D},$$

onde

$$\gamma(z) := (S\arg(\zeta^{-\kappa}\Lambda(\zeta)))(z), \quad z \in \mathbb{D},$$

$$\tilde{\varphi}(\zeta) := e^{\mathfrak{I}(\gamma(\zeta))} |\zeta|^{-\kappa} \varphi(\zeta), \quad \zeta \in \partial\mathbb{D},$$

e $c_0 \in \mathbb{R}$, $c_k \in \mathbb{C}$, $1 \leq k \leq \kappa$, são constantes arbitrárias.

$\square$

Observação 36. O caso em que $\kappa = \text{ind}_{\partial\mathbb{D}}(\Lambda) < 0$ o problema de Riemann-Hilbert possui solução se e somente se $S\tilde{\varphi}$ possui um zero de ordem $-\kappa$ em $0 \in \mathbb{D}$. Usando a expressão do operador de Schwarz de $\mathbb{D}$ (dado em (B.4)) podemos mostrar que $S\tilde{\varphi}$ ter um zero de ordem $-\kappa$ em $0 \in \mathbb{D}$ equivale as $-\kappa$ condições de compatibilidade

$$\int_{|\zeta|=1} \tilde{\varphi}(\zeta) \frac{d\zeta}{\zeta^{k+1}}, \quad 0 \leq k \leq -\kappa - 1.$$

Neste caso, a solução fica da forma $w(z) = z^\kappa e^{i\gamma(z)}(S\tilde{\varphi})(z)$, $z \in \overline{\mathbb{D}}$. Veja (BEGEHR, 1994).

Vamos supor que D tenha bordo suave de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 < \varepsilon < 1$. Utilizando o Teorema de Riemann 21 (página 131) podemos obter um operador de Schwarz para o aberto simplesmente conexo D e também uma solução do problema de Riemann-Hilbert.

De fato, seja $\Phi : \overline{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ um difeomorfismo de classe $C^{1+\varepsilon}$ tal que $\partial\Phi/\partial\bar{z} = 0$ em D e $\Phi(\partial D) = \partial\mathbb{D}$ (veja Teorema 21). Temos que $\mathcal{S} : C(\partial D) \rightarrow \mathcal{A}(D) \cap C(\overline{D}; \mathbb{C})$ dado por

$$\mathcal{S}\varphi := (S(\varphi \circ \Phi^{-1}))(\Phi)$$

é um operador de Schwarz para D (definição 16). Assim, o seguinte corolário está provado:

Corolário 10. (Operador de Schwarz para D) Seja D um aberto limitado simplesmente conexo de $\mathbb{C}$ com bordo suave de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 < \varepsilon < 1$. Então existe um operador $\mathcal{S} : C(\partial D) \rightarrow \mathcal{A}(D) \cap C(\overline{D}; \mathbb{C})$ tal que

$$\Re(\mathcal{S}\varphi) = \varphi \text{ em } \partial D, \text{ para todo } \varphi \in C(\partial D).$$

Além disso, se $\varphi \in C^\alpha(\partial D)$, $0 < \alpha < 1$, então $\mathcal{S}\varphi \in C^\alpha(\overline{D})$.

□

Da mesma forma podemos provar uma versão do Teorema 34 usando o difeomorfismo $\Phi : \overline{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ (descrito no paragrafo antes do Teorema 10).

Corolário 11. Seja D um aberto limitado simplesmente conexo de $\mathbb{C}$ com bordo suave de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 < \varepsilon < 1$. Sejam $\Lambda \in C^\alpha(\partial D)$, com $|\Lambda| = 1$ em ∂D , $\varphi \in C^\alpha(\partial D, \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$. Se $\text{ind}_{\partial D}(\Lambda) \geq 0$, então existe uma função w holomorfa em D , com $w \in C^\alpha(\overline{D})$, tal que

$$\Re(\overline{\Lambda(\zeta)} w(\zeta)) = \varphi(\zeta) \text{ para } \zeta \in \partial D. \quad (\text{B.6})$$

Demonstração. Vamos usar a mesma notação usada no paragrafo anterior ao Corolário 10. Sejam $\tilde{\Lambda} := \Lambda \circ \Phi^{-1}$ e $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \Phi^{-1}$. Como $\Phi : \overline{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ é um difeomorfismo de classe $C^{1+\varepsilon}$, temos que $\tilde{\Lambda} \in C^\alpha(\partial\mathbb{D})$ e $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \Phi^{-1} \in C^\alpha(\partial\mathbb{D}, \mathbb{R})$. Além disso, como Φ é uma função

holomorfa em D e D é simplesmente conexo, segue que Φ preserva orientação. Em particular $\text{ind}_{\partial\mathbb{D}}(\tilde{\Lambda}) = \text{ind}_{\partial D}(\Lambda) \geq 0$. Pelo Teorema 34 existe h solução do problema

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = 0 & \text{em } \mathbb{D}, \\ \Re(\tilde{\Lambda}h) = \tilde{\varphi} & \text{em } \partial\mathbb{D}. \end{cases}$$

Então, $w := h \circ \Phi$ é de classe $C^\alpha(\bar{D})$, holomorfa em D e satisfaz a condição de bordo (B.6). $\square$

Usando um *fator integrante* obtido através da função exponencial e da resolubilidade global do operador de Cauchy-Riemann (Teorema 18, página 126) podemos provar um resultado um pouco mais geral do que o corolário acima.

Corolário 12. Seja D um aberto limitado simplesmente conexo de $\mathbb{C}$ com bordo suave de classe $C^{1+\varepsilon}$, $0 < \varepsilon < 1$. Sejam $\Lambda \in C^\alpha(\partial D)$, com $|\Lambda| = 1$ em ∂D , $\varphi \in C^\alpha(\partial D, \mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$. Sejam a, f funções de classe C^∞ numa vizinhança de $\bar{D}$. Se $\text{ind}_{\partial D}(\Lambda) \geq 0$, então o problema de contorno

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = aw + f & \text{em } D, \\ \Re(\bar{\Lambda}w) = \varphi & \text{em } \partial D, \end{cases}$$

possui uma solução Hölder contínua em $\bar{D}$ e suave em D .

Observação 37. O termo suave no enunciado acima significa que $\tilde{w} \in C^\infty(\tilde{D})$, onde $\tilde{w}(x, y) = w(x + iy)$ e $\tilde{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + iy \in D\}$.

Demonstração. (do Corolário 12). A demonstração é análoga ao início da demonstração do Teorema 20 (página 128) trocando L por $\partial/\partial\bar{z}$. $\square$

O Problema de Riemann-Hilbert Generalizado. O problema de contorno que busca uma função $w \in C(\bar{D})$ que seja solução da equação

$$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = aw + b\bar{w} + f \text{ em } D,$$

onde a, b e $f \in L^p(D)$, e que satisfaça a condição de contorno

$$\Re(\bar{\Lambda}w) = \varphi \text{ em } \partial D,$$

com Λ e φ como no Problema de Riemann-Hilbert (página 140) é chamado de Problema de Riemann-Hilbert generalizado e é um dos temas centrais de estudo de (VEKUA, 1962). Em (VEKUA, 1962) é provado que o problema acima possui solução Hölder contínua em $\bar{D}$ quando a, b e $f \in L^p(D)$, com $p > 2$ e $\text{ind}_{\partial D}(\Lambda) \geq 0$. A demonstração desse resultado usa elementos

da Análise Funcional e Topologia para obter a solução do problema acima através de ponto fixo de operadores integrais. O caso em que $\text{ind}_{\partial D}(\Lambda) < 0$ depende da análise de condições de compatibilidade (do mesmo tipo que as mencionadas na observação 36 quando $D = \mathbb{D}$).

REFERÊNCIAS

ABLOWITZ, M.; CLARKSON, P. **Solitons, Nonlinear Evolution Equations and Inverse Scattering**. [S.l.: s.n.], 1991. (London Mathematical Society Lecture Note Series 149, Cambridge University Press). Citado na página 17.

AHLFORS, L.; SARIO, L. **Riemann Surfaces**. [S.l.: s.n.], 1960. (Princeton Math. Series, vol. 2, Princeton University Press, Princeton). Citado 2 vezes nas páginas 38 e 39.

BEGEHR, H. **Complex analytic methods for partial differential equations. An introductory text**. [S.l.: s.n.], 1994. Citado 15 vezes nas páginas 19, 23, 39, 77, 89, 104, 107, 108, 114, 129, 135, 138, 139, 140 e 141.

BEGEHR, H.; CELEBI, A.; TUTSCHKE, W. Complex methods for partial differential equations. 1999. Citado na página 17.

BEGEHR, H.; GILBERT, R.; WEN, G. Partial differential and integral equations. **International Society for Analysis, Applications and Computations, Kluwer Academic Publishers**, 1999. Citado na página 17.

BERGAMASCO, A.; CORDARO, P.; HOUNIE, J. Global properties of a class of vector fields in the plane. **Journal of differential equations**, v. 74, p. 179–199, 1988. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 57.

BERHANU, S.; CORDARO, P.; HOUNIE, J. **An introduction to involutive structures**. [S.l.: s.n.], 2008. (New Math. Mono., 6, Cambridge University Press, Cambridge). Citado 6 vezes nas páginas 17, 18, 35, 57, 58 e 126.

BERHANU, S.; HOUNIE, J.; SANTIAGO, P. A similarity principle for complex vector fields and applications. **Trans. Amer. Math. Soc.** **353**, no. 4, p. 1661–1675, 2001. Citado 2 vezes nas páginas 92 e 95.

BERS, L. An outline of the theory of pseudoanalytic functions. v. 62, p. 291–331, 1956. Citado na página 89.

BREZIS, H. **Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations**. [S.l.: s.n.], 2010. Citado na página 133.

CAMPANA, C. **Campos Hipoelíticos no Plano**. [S.l.: s.n.], 2013. (Dissertação (Mestrado em Matemática)-Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, abril de 2013). Citado 2 vezes nas páginas 32 e 57.

CAMPANA, C.; MEZIANI, A. Boundary value problems for a class of planar complex vector fields. **Jornal of Differential Equations**, **10**, v. 261, p. 5609–5636, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 18, 115 e 118.

CAMPANA, C.; SILVA, P. L. Dattori da; MEZIANI, A. Riemann-hilbert problem for a class of hypocomplex vector fields. **Complex Variables and Elliptic Equations**, **12**, v. 61, p. 1656–1667, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 109.

- _____. Properties of solutions of a class of hypocomplex vector fields. **Contemporary Mathematics**, v. 681, p. 29–50, 2017. Citado 5 vezes nas páginas 18, 53, 62, 64 e 95.
- CHEN, Y. Single crack problem with polynomial traction on the crack. **Engineering Fracture Mechanics**, v. 46, p. 353–355, 1993. Citado na página 17.
- COURANT, R.; HILBERT, D. **Methods of mathematical physics, vol. II**. [S.l.: s.n.], 1962. Citado 3 vezes nas páginas 32, 89 e 133.
- FARKAS, H. M.; KRA, I. **Riemann Surfaces**. [S.l.: s.n.], 1980. (Springer-Verlag, New York). Citado na página 131.
- GAKHOV, F. D. **Boundary Value Problems**. [S.l.: s.n.], 1966. (Dover Publications, Inc.). Citado 8 vezes nas páginas 18, 19, 23, 39, 108, 114, 135 e 140.
- HOUNIE, J. **Teoria Elementar das Distribuições**. [S.l.: s.n.], 1979. (Publicações do IMPA, 12º Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA - Rio de Janeiro). Citado na página 33.
- HÖRMANDER, L. **The Analysis of Linear Partial Differential Operators I, Pseudo-Differential Operators**. [S.l.: s.n.]. v. 1. Citado 3 vezes nas páginas 28, 29 e 91.
- _____. **The Analysis of Linear Partial Differential Operators III, Pseudo-Differential Operators**. [S.l.: s.n.]. v. 3. Citado na página 91.
- _____. **An introduction to complex analysis in several variables**. [S.l.: s.n.], 1973. (Fundamenta Mathematicae). Citado na página 126.
- KRANTZ, S. G. **Geometric Function Theory: Explorations in Complex Analysis**. [S.l.: s.n.], 2006. (Springer Science & Business Media). Citado na página 131.
- LEACH, E. B. On a converse of the hölder inequality. **Proc. Amer. Math. Soc.** 7, p. 607–608, 1956. Citado na página 133.
- LIMA, E. L. **Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento**. [S.l.: s.n.], 2006. (Projeto Euclides, Rio de Janeiro, IMPA, terceira edição). Citado na página 38.
- _____. **Variedades Diferenciáveis**. [S.l.: s.n.], 2007. (Publicações Matemáticas, Rio de Janeiro, IMPA). Citado 3 vezes nas páginas 26, 45 e 138.
- _____. **Curso de Análise**. [S.l.: s.n.], 2008. v. 2. (Projeto Euclides, Rio de Janeiro, IMPA, décima edição, v. 2). Citado na página 76.
- LINS-NETO, A. **Funções de uma variável complexa**. [S.l.: s.n.], 2005. (Projeto Euclides, Rio de Janeiro, IMPA, segunda edição). Citado na página 76.
- MEZIANI, A. On the similarity principle for planar vector fields: application to second order pde. **Jornal of Differential Equations** 157, no. 1, p. 1–19, 1999. Citado na página 95.
- _____. Representation of solutions of planar elliptic vector fields with degeneracies. **Geometric analysis of PDE and several complex variables, 357-370, Contemp. Math., 368, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.**, 2005. Citado 4 vezes nas páginas 59, 62, 95 e 96.
- _____. Representation of solutions of a singular cauchy-riemann equation in the plane. v. 53, p. 1111–1130, 2008. Citado na página 72.

_____. Global solvability of real analytic complex vector fields in two variables. **Jornal of Differential Equations**, **251**, p. 2896–2931, 2011. Citado 2 vezes nas páginas [18](#) e [44](#).

_____. On first and second order planar elliptic equations with degeneracies. **Mem. Amer. Math. Soc.** **217**, no. **1019**, 2012. Citado na página [72](#).

MUSKHELISHVILI, N. I. **Singular Integral Equations, Boundary problems of functions theory and their application to mathematical physics**. [S.l.: s.n.], 1953. (Groningen-Holland). Citado 3 vezes nas páginas [17](#), [18](#) e [138](#).

POMMERENKE, C. **Boundary Behaviour of Conformal Maps**. [S.l.: s.n.], 1992. (Springer-Verlag). Citado na página [131](#).

SPRINGER, G. **Introduction to Riemann Surfaces**. [S.l.: s.n.], 1957. (Addison-Wesley, MA). Citado na página [131](#).

TREVES, F. Hypoelliptic partial differential equations of principal type. sufficient conditions and necessary conditions*. **Comm. Pure Appl. Math.** **24**, p. 631–670, 1971. Citado 3 vezes nas páginas [42](#), [57](#) e [126](#).

_____. Hypo-analytic structures: Local theory. 1992. Citado 3 vezes nas páginas [17](#), [35](#) e [57](#).

VEKUA, I. N. **Generalized Analytic Functions**. [S.l.: s.n.], 1962. v. 25. (Pergamon Press, v. 25). Citado 14 vezes nas páginas [17](#), [19](#), [23](#), [77](#), [89](#), [104](#), [107](#), [108](#), [114](#), [118](#), [129](#), [135](#), [138](#) e [142](#).

YEH, J. **Real analysis. Theory of measure and integration, Second edition**. [S.l.: s.n.], 2006. (World Scientific Publishing, NJ). Citado na página [133](#).

ZALCMAN, L. Real proofs of complex theorems (and vice versa). **Mathematical Association of America; The American Mathematical Monthly**, No. **2**, v. 81, p. 115–137, 1974. Citado na página [132](#).

ÍNDICE

- Analítica, 27
- Arzelà-Ascoli
 - teorema de, 86
- Beltrami
 - equação de, 32
- Biholomorfismo, 27
- Cauchy
 - teorema de, 117
- Cauchy-Pompeiu
 - Fórmula de representação de, 77, 138
 - operador de, 136
- Cauchy-Riemann
 - operador de, 30
- Condição (P), 57, 126
- Condição (Q), 57
- Conjunto característico, 30
- Curva de classe $C^{1+\varepsilon}$, 26, 138
- Desigualdade de Hölder, 27
- Desigualdade de Hadamard, 83, 136
- Distribuições, 28
- Elítico, 30
- Fórmula de Aproximação de Baouendi-Treves, 57
- Fredholm, 119, 133
 - teorema de, 119
- Friedrichs
 - lema de, 91
- Funções analíticas generalizadas, 89
- Funções pseudo-analíticas, 89
- Globalmente resolúvel, 126
- Gramm
 - matriz de, 122, 132
- Green
 - teorema de, 76
- Hamiltoniano, 33
- Hipocomplexo, 35
- Hipoelítico, 57
- Holomorfa, 27, 131
- Integral primeira, 31
- Lipschitz, 26
- Localmente integrável, 31
- Localmente resolúvel, 126
- Mudança de coordenadas, 32
- Mudança de variáveis, 31
- Plemelj-Sokhotzki
 - fórmula de, 135
- Princípio da Similaridade, 89
- Princípio da similaridade, 121
- Privalov, 139
- Problema de Riemann-Hilbert, 140
- Problema de Riemann-Hilbert Generalizado, 142
- Riemann
 - superfície de, 37
 - Teorema da aplicação de, 131
 - teorema de uniformização de, 37
- Schauder
 - Teorema do Ponto Fixo de, 87, 89, 111, 113, 133
- Schwarz

teorema de, [49](#)

O problema de contorno de, [139](#)

Operador de, [107](#), [139](#)

Schwarz-Poisson, [139](#)

Tipo finito, [37](#), [58](#)

Tipo infinito, [38](#), [52](#)

Transversal, [44](#)