= Referências Bibliográficas

7. Referências Bibliográficas

- ADAMS, R. P. 1995. Identification of essential oil components by gas chromatography and mass spectroscopy. Carol Stream, IL: Allured Publ.
- ALEIXO, K. P. et al. 2014. Spatiotemporal distribution of floral resources in a Brazilian city: implications for the maintenance of pollinators, especially bees. *Urban Forestry & Urban Greening*, 13: 689-696.
- ALIFERIS, K. A. et al. 2010 . Botanical discrimination and classification of honey samples applying gas chromatography/mass spectrometry fingerprinting of headspace volatile compounds. *Food Chemistry*, 121: 856–862.
- ALISSANDRAKIS, E. et al. 2007. Aroma investigation of unifloral Greek citrus honey using solid-phase microextraction coupled to gas chromatographic–mass spectrometric analysis. *Food Chemistry*, 100: 396-400.
- ALISSANDRAKIS, E. et al. 2011. Investigation of organic extractives from unifloral chestnut (*Castanea sativa* L.) and eucalyptus (*Eucalyptus globulus* Labill.) honeys and flowers to identification of botanical marker compounds. *Food Science and Technology*, 44: 1042–1051.
- ALMEIDA, J. M. V. 2013. Efeito da fermentação induzida sobre o valor nutritivo de dietas proteicas para abelhas *Apis mellifera*. Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 93 p.
- ALMEIDA-MURADIANA, L. B. 2005. Chemical composition and botanical evaluation of dried bee pollen pellets. *Journal of Food Composition and Analysis*, 18: 105–111.
- ANDERSON, K. E. et al. 2011. An emerging paradigm of colony health: microbial balance of the honey bee and hive (*Apis mellifera*). *Insects Sociaux*. 58: 431–444.
- ANDERSON, K. E. et al. 2014. Hive-stored pollen of honey bees: many lines of evidence are consistent with pollen preservation, not nutrient conversion. *Molecular Ecology*, 23: 5904-5917.
- ARIMURA, G.; KOST, C.; BOLAND, W. 2005. Herbivore-induced, indirect plant defences. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids*, 1734: 91-111.
- ATKIN, S. et al. 2011. UV and visible light screening by individual sporopollenin exines derived from *Lycopodium clavatum* (club moss) and *Ambrosia trifida* (giant ragweed), *Journal of Photochemistry and Photobiology B*, 102: 209–217.

- AUGUSTIN, M. A.; HEMAR, Y. 2009. Nano- and micro-structured assemblies for encapsulation of food ingredients. *Chemical Society Reviews*, 38: 902–912.
- BABENDREIER, D. et al. 2007. Bacterial community structures in honeybee intestines and their response to two insecticidal proteins, FEMS. *Microbiology Ecology*, 59: 600–610.
- BALTRUSAITYTE, V et al. 2007. Radical scavenging activity of different floral origin honey and beebread phenolic extracts. *Food Chemistry*, 101: 502–514.
- BANKOVA, V. et al. 2014. Propolis volatile compounds: chemical diversity and biological activity: a review. *Chemistry Central Journal*, 8: 28.
- BARTH, O. M. 1989. O Pólen no mel brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Luxor, 151p.
- BARTH, O. M. 1990. Pollen in monofloral honeys from Brazil. *Journal of Apicultural Research*, 29: 89-94.
- BARTH, O. M. 2004. Melissopalynology in Brazil: a review of pollen analysis of honeys, propolis and pollen loads of bees. *Scientia Agricola*, 61: 342-350.
- BARTH, O. M.; CORÉ-GUEDES, J. 1999. Caracterização de méis de laranjeiras procedentes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, Brasil, por meio da análise polínica. *LECTA*, 17: 27-35.
- BASTOS, E. M. A. F. 1995. Espectro polínico do mel produzido em algumas áreas antrópicas de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Biologia*, 55: 789-799.
- BASTOS, E. M. et al. 1991. Análise microscópica de amostras de mel do estado de Minas Gerais - I. *Daphne*, 1: 10-13.
- BASTOS, E. M.; OLIVEIRA, V. D. C.; SOARES, A. E. E. 2000. Microscopic characterization of the green propolis, produced in Minas Gerais state, Brazil. *Honeybee Science*, 21: 179-180.
- BIESMEIJER J. C. et al. 2006. Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and The Netherlands. *Science*, 313: 351-354.
- BLOM, H.; MØRTVEDT, C. 1991. Anti-microbial substances produced by food associated micro-organisms. *Biochemical Society Transactions*, 19: 694-698.
- BOHLMANN, J.; MEYER-GAUEN, G.; CROTEAU, R. 1998. Plant terpenoid synthases: Molecular biology and phylogenetic analysis. *Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America*, 95: 4126-4133.
- CABRAL, I. S. R. et al. 2009. Composição fenólica, atividade antibacteriana e antioxidante da própolis vermelha brasileira. *Química Nova*, 32: 1-5.

- CARROLL, M. J. et al. 2017. Honey bees preferentially consume freshly stored pollen. *Plos One*, 12: 1-21.
- CASTRO-VAZQUEZ, L. 2007. Aroma composition and new chemical markers of *Spanish citrus* honeys. *Food Chemistry*, 103: 601–606.
- CASTRO-VAZQUEZ, L. 2009. Differentiation of monofloral citrus, rosemary, eucalyptus, lavender, thyme and heather honeys based on volatile composition and sensory descriptive analysis. *Food Chemistry*, 112: 1022–1030.
- COLLIN, S.; et al. 1995. Heat Treatment of Pollens: Impact on Their Volatile Flavor Constituents. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 43, 444-448.
- COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. 1997. Introdução a métodos cromatográficos. 7. ed. Campinas: Editora da Unicamp. 279p.
- CONNOLLY, J. D.; HILL, R. A. 1991. Dictionary of Terpenoids, Eds.: Chapman & Hall: London, U.K. 2: 853-857.
- COUTO, R. H. N.; COUTO, L. A. 2007. Utilização de polinizadores na conservação e sustentabilidade da agricultura. *Mensagem Doce*, São Paulo, n.90.
- CRAILSHEIM, K. 1990. The protein balance of the honey bee worker. *Apidologie*, 21: 417-429.
- CREMLYN, R.J. 1996. An Introduction to Organosulfur Chemistry; John Wiley & Sons: New York, NY, USA. 262p.
- CREMONEZ, T. M.; DE JONG, D.; BITONDI, M. M. G. 1998. Quantification of hemolymph proteins as a fast method for testing protein diets for honey bees (Hymenoptera: Apidae). *Journal of Economic Entomology*, 91: 1284-1289.
- DE JONG, D. et al. 2006. HoneyBee. In: IMPERATRIZ-FONSECA, V. L. et al. (Eds.) Bees as pollinators in Brazil: assessing the status and suggesting best practices. Ribeirão Preto: Holos, p.63-73.
- DEGRANDI-HOFFMAN, G. et al. 2010. The effect of diet on protein concentration, hypopharyngeal gland development and virus load in worker honey bees (*Apis mellifera* L). *Journal of Insect Physiology*, 56: 1184-1191.
- DEL RISCO, C. et al. 2012, Lactic acid bacteria to silage bee pollen. *CENIC Ciências Biológicas*, 43: 17–21.
- DICKE, M.; LORETO, F. 2010. Induced plant volatiles: from genes to climate change. *Trends in Plant Science*, 15: 115.

- DOBSON, H. E. M.; BERGSTROM, G. 2000. The ecology and evolution of pollen odors. *Plant Systematics and Evolution*, 222: 63-87.
- DOMINGUEZ-VALHONDO, D. 2013. Influence of the industrial processing and the floral origin into the volatile constituents of honeybee-collected pollen. *Science and Technology International*, 19: 167-176.
- DOMINGUEZ-VALHONDO, D. et al. 2013. Influence of the industrial processing and the floral origin into the volatile constituents of honeybee-collected pollen. *Food Science and Technology International*, 19: 167-176.
- DOULL, K. M.; STANDIFER, L. N. 1970. Feeding responses of honeybees in the hive. *Journal of Apicultural Research*, 9: 129-132.
- DUDAREVA, N.; PICHERSKY, E. 2008. Metabolic engineering of plant volatiles. *Current Opinion in Biotechnology*, 19: 181-189.
- DUDAREVA, N.; PICHERSKY, E.; GERSHENZON, J. 2004. Biochemistry of plant volatiles. *Plant Physiology*, Rockville, 135: 1893-1902.
- ELLIS, A. M.; HAYES, JR., G. W. 2009. An evaluation of fresh versus fermented diets for honey bees (*Apis mellifera*). *Journal of Apicultural Research and Bee World*, 48: 215-216.
- ENGELBERTH, J. et al. 2004. Airborne signals prime plants against insect herbivore attack. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Washington, D.C. 101: 1781-1785.
- ERDTMAN, G. 1960. The acetolized method. A revised description. *Sven. Bot. Tids.* 54: 561-564.
- FLAMINI, G.; CIONI, P. L.; MORELLI, I. 2003. Use of solid-phase micro-extraction as a sampling technique in the determination of volatiles emitted by flowers, isolated flower parts and pollen. *Journal of Chromatography A*, 998: 229-233.
- FLAMINI, G.; TEBANO, M.; CIONI, P. L. 2007. Volatiles emission patterns of different plant organs and pollen of *Citrus limon*. *Analytica Chimica Acta*, 589: 120-124.
- FREE, J. B. 1980. A organização social das abelhas (*Apis*) E.P.U., EDUSP, São Paulo. 79p.
- FREITAS, B. M. et al. 2009. Diversity, threats and conservation of native bees in the Neotropics. *Apidologie*, 40: 332-346.

- GILLIAM, M. 1979. Microbiology of pollen and bee bread: the genus *Bacillus*. *Apidologie*, 10: 269-274.
- GILLIAM, M. 1979. Microbiology of pollen and bee bread: the yeasts. *Apidologie*, 10: 43-53.
- GILLIAM, M. 1997. Identification and rules of non-pathogenic microflora associated with honey bees. *FEMS Microbiology Letters*, 155: 1-10.
- HASENACK, H. et al. 2008. Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre: Geologia, Solos, Drenagem, Vegetação/Ocupação e Paisagem. Porto Alegre: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 84 p.
- HERBERT JR. E. W.; SHIMANUKI, H. 1978. Chemical composition and nutritive value of bee collected and bee stored pollen. *Apidologie*, 9: 33-40.
- HERBERT JR. E. W.; SHIMANUKI, H.; CARON, D. 1977. Optimum protein levels required by honey bees (Hymenoptera: Apidae) to initiate and maintain brood rearing. *Apidologie*, 8: 141-146.
- HERBERT JR., E. W. 1992. Honey Bee Nutrition. In *The Hive and The Honey Bee*. Graham, J. M. (ed.), Dadant & Sons. Hamilton, Illinois, 197-233.
- HERBERT JR., E. W. et al. 1980. Sterol utilization in honey bees fed a synthetic diet: effects on brood rearing. *Journal of Insect Physiology*, 26: 287-289.
- HERBERT JR., E. W.; SHIMANUKI, H. 1978. Chemical composition and nutritive value of bee collected and bee stored pollen. *Apidologie*, 9: 33-40.
- HERRMANN, A. 2010. Volatiles - An Interdisciplinary Approach. In: HERRMANN, A. *The chemistry and biology of volatiles*. Genebra: Wiley. 1: 402.
- HRASNIGG, N.; CRAILSHEIM, K. 2005. Differences in drone and worker physiology in honeybees (*Apis mellifera* L.). *Apidologie*, 36: 255-277.
- ISIDOROV, V. A. et al. 2009. Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of the chemical composition of beebread. *Food Chemistry*, 115: 1056-1063.
- KALEV, H; DAG, A; SHAFIR, S. 2002. Feeding pollen supplements to honey bee colonies during pollination of sweet pepper in enclosures. *American Bee Journal*, 142: 675-679.
- KASKONIENE, V. et al. 2008. Composition of volatile compounds of honey of various floral origin and beebread collected in Lithuania. *Food Chemistry*, 111: 988-997.

- KESSLER, A; BALDWIN, I. T. 2001. Defensive function of herbivore-induced plant volatile emissions in nature. *Science*, 291: 2141-2144.
- KLEIJN, D.; RAEMAKERS, A. 2008. A retrospective analysis of pollen host plant use by stable and declining bumblebee species. *Ecology*, 89: 1811–1823.
- KNOBLOCH, K. et al. 1986. Action of terpenoides on energy metabolism. In: BRUNKE, E.J. (ed.). *Progress in essential oil research*. Berlin: Gruyter.
- KOVATS, E. S. 1958 Gas chromatographische Charakterisierung organischer Verbindungen. *Helvetica Chimica Acta*, 41:1915-1932.
- LEDINGHAM, G. A.; NEISH, A. C. 1954. Fermentative production of 2,3-butanediol. In *Industrial Fermentations*, ed. A. Underkofler and R. J. Hickey. Chemical Publishing Co., New York, 2: 27-93.
- LEGRAS, J. L. et al. 1990. Natural nitriles and their metabolism. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 6: 83-108.
- LI, C. et al. 2012. Effects of dietary crude protein levels on development, antioxidant status, and total midgut protease activity of honey bee (*Apis mellifera lingustica*). *Apidologie*, 43: 576.
- LORENZI, H. 1982. *Plantas Daninhas do Brasil*, Nova Odessa: São Paulo, p.21.
- MACHADO, A. L. M. 2005. Ecoturismo, um produto viável: a experiência do Rio Grande do Sul. Senac, p. 151.
- MAIA-SILVA, C. et al, 2012. Guia de plantas visitadas por abelhas na Caatinga. Fortaleza-CE: Editora Fundação Brasil Cidadão, 191p.
- MANYI-LOH, C. E. et al. 2011. Volatile Compounds in Honey: A Review on Their Involvement in Aroma, Botanical Origin Determination and Potential Biomedical Activities. *International Journal of Molecular Sciences*, 12: 9514-9532.
- MONSON, R. K.; HOLLAND, E. A. 2001. Biospheric trace gas fluxes and their control over tropospheric chemistry. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 32: 547–576.
- MONTERO, I.; TORMO, R. 1990. Análisis polínico de mieles de cuatro zonas montañosas de Extremadura. *Nacional Asociación Palinologica Lengua Española*, 5: 71-78.
- MORAIS, M. M. et al. 2013. Evaluation of inexpensive pollen substitute diets through quantification of haemolymph proteins. *Journal of Apicultural Research*, 52: 119-121.

- MORAIS, M. M. et al. 2013. Protein levels and colony development of Africanized and European honey bees fed natural and artificial diets. *Genetics and Molecular Research*, 12: 6915-6922.
- MORETI, A. C. C. C. et al. 2000. Espectro polínico de amostras de mel de *Apis mellifera* L., coletadas na Bahia. *Bragantia*, 59: 1-6.
- NAGAI, T. et al. 2004. Preparation and functional properties of extracts from bee bread. *Nahrung/Food*, 48: 226-229.
- NAIME, J. M.; MORAES, M. C. B.; LAUMANN, R. A.; BORGES, M. 2006. Eletroantenograma para estudo comportamental de insetos. *Comunicado técnico EMBRAPA*, 74: 2-5.
- NICOLSON, S. W. 2011. Bee food: the chemistry and nutritional value of nectar, pollen and mixtures of the two. *African Zoology*, 46: 197–204.
- NOVAIS, J. S.; LIMA, L. C. L.; SANTOS, F. A. R. 2009. Botanical affinity of pollen harvested by *Apis mellifera* L. in a semi-arid area from Bahia, Brazil. *Grana*, 48: 224-234.
- PARK, M. S. 2017. Development of an analytical method for detecting nitrofurans in bee pollen by liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometry. *Journal of Chromatography B*, 1046: 172–176.
- PATTAMAYUTANON, P. et al. 2017. Volatile organic compounds of Thai honeys produced from several floral sources by different honey bee species. *Plos One*, 12: 1-15.
- PEREIRA, A. J. A. C. 2005. Investigação da presença de compostos orgânicos voláteis e semivoláteis (pesticidas) em espécies biológicas com implicações na saúde pública. Dissertação de mestrado apresentada a Faculdade de Ciências do Porto. Porto, 81 p.
- PIASENZOTTO, L. et al. 2003. Solid phase microextraction (spme) applied to honey quality control. *Journal of the science of food and agriculture*, 83: 1037–1044.
- PICHERSKY, E.; GERSHENZON, J. 2002. The formation and function of plant volatiles: perfumes for pollinator attraction and defense. *Current Opinion in Plant Biology*, 5: 237-243.
- PICHERSKY, E.; NOEL, J. P.; DUDAREVA, N. 2006. Biosynthesis of plant volatiles: nature's diversity and ingenuity. *Science*, 311: 808-811.
- POTTS, S. et al. 2015. Status and trends of European pollinators. Key findings of the STEP project. Pensoft Publishers, Sofia, 72 p.

- RADAESKI, J. N.; BAUERMANN, S. G.; PEREIRA, A. B. 2016. Poaceae Pollen from Southern Brazil: Distinguishing Grasslands (Campos) from Forests by Analyzing a Diverse Range of Poaceae Species. *Frontiers in Plant Science*, 7: 1833.
- ROULSTON, T. H.; CANE, J. H. 2000. Pollen nutritional content and digestibility for animals. *Plant Systematics and Evolution*, 222: 187-209.
- SAMPAIO, E. S.; ALMEIDA, A. A. 1995. Morfologia floral e biologia reprodutiva de *Pyrostegia venusta* (Bignoniaceae) na região urbana de Curitiba, Paraná. *Acta Biológica Paranaense*, 24: 25-38.
- SANTOS, I. A. 1997. Melittophilous plants, their pollen and flower visiting bees in Southern Brazil: 3. Pontederiaceae. *Biociências*, 5: 3-18.
- SCHLINDWEIN, C. 1995. Melittophilous plants, their pollen and flower visiting bees in Southern Brazil: 2. Cactaceae. *Biociências*, 3: 35-71.
- SCHMIDT, J. O.; HANNA, A. 2006. Chemical Nature of Phagostimulants in Pollen Attractive to Honeybees. *Journal of Insect Behavior*, 19: 521-532.
- SEISONEN, S. et al. 2015. Characterisation of the aroma profiles of different honeys and corresponding flowers using solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry. *Food Chemistry*, 169: 34-40.
- SEREIA, M. J. 2009. Suplementos protéicos para abelhas africanizadas submetidas à produção de geléia real. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal de Maringá, Maringá, 92 p.
- SHIPP, J. L.; WHITFIELD, G. H.; PAPADOPOULOS, A. P. 1994. Effectiveness of the bumblebee, *Bombus impatiens* Cr. (Hymenoptera: Apidae), as a pollinator of greenhouse sweetpepper. *Scientia Horticulturae*, Amsterdam, 57: 29-39.
- SHULAEV, V.; SILVERMAN, P.; RASKIN, I. 1997. Airborne signalling by methyl salicylate in plant pathogen resistance. *Nature*, 386: 738.
- SILVA, C. I. et al. 2014. Catálogo Polínico das plantas usadas por abelhas no *Campus* da USP de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Holos. 153 p.
- SILVEIRA JR., C. E. A.; SABA, M. D.; JARDIM, J. G. 2012. Pollen morphology of Rubiaceae Juss. species occurring in an area of caatinga (dryland) vegetation in Bahia State, Brazil. *Acta Botanica Brasilica*, 26: 444-455.
- SIMÕES, C. M. O.; SPITZER, V. Óleos Voláteis. In: SIMÕES, C. M. O. et al. 2007. *Farmacognosia: da planta ao medicamento*. Porto Alegre (6 ed.).

- SOMERVILLE, D. 2005. Fat bees skinny bees – a manual on honey bee nutrition for beekeepers. NSW Department of Primary Industries. RIRDC Publication No 05/054. www.rirdc.gov.au
- STANDIFER, L. N. et al. 1973. Value of three protein rations in maintaining honey bee colonies in outdoor flight cages. *Journal of Apiculture Research*, 12: 137-143.
- TIAN, Y. et al. 2014. Optimization of fermentation medium for acetoin production by *Bacillus subtilis* SF4-3 using statistical methods. *Preparative Biochemistry and Biotechnology*, 44: 529-543.
- TORRES, R. N. S. et al. 2008. Constituintes voláteis de própolis piauiense. *Química Nova*, 31: 479-485.
- TSIGARIDIS, K.; KANKIDOU, M. 2007. Secondary organic aerosol importance in the future atmosphere. *Atmos. Environ*, 41: 4682–4692.
- van DEN DOOL, H.; KRATZ, P. D. 1963. A generalization of the retention index system including linear temperature programmed gas-liquid partition chromatography. *Journal of Chromatography*, 11:463-471.
- van DER MEULEN, R. et al. 2006. Kinetic analysis of bifidobacterial metabolism reveals a minor role for succinic acid in the regeneration of NAD⁺ through its growth-associated production. *Applied and Environmental Microbiology*, 72: 5204-5210.
- VANCANNEYT, G. et al. 2001. Hydroperoxide lyase depletion in transgenic potato plants leads to an increase in aphid performance. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Washington, D.C., 98: 8139-8144.
- VÁSQUEZ, A.; OLOFSSON, T. C. 2009. The lactic acid bacteria involved in the production of bee pollen and bee bread. *Journal of Apicultural Research*, 48: 189-195.
- VOLOCH, M., N. B. et al. 1985. 2,3-Butanediol,. In M.-Y. Murray, C. L. Cooney, and A. E. Humphrey (ed.), *Comprehensive biotechnology*. Pergamon Press, New York, NY, p. 933-947
- WINSTON, M. L. 2003. *A biologia da abelha*. 1 ed. Porto Alegre: Magister. 276p.
- WITTMANN, D.; SCHLINDWEIN, C. 1995. Melittophilous plants, their pollen and flower visiting bees in Southern Brazil: 1. Loasaceae. *Biociências*, 3: 19-34.
- YANG, T. et al. 2017. Metabolic engineering strategies for acetoin and 2,3-butanediol production: advances and prospects. *Critical Reviews in Biotechnology*, 0: 1-16.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FFCLRP - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA

Composição dos voláteis do pólen fermentado das abelhas *Apis mellifera* e de dieta proteica artificial fermentada com base em análises cromatográficas.

Joyce Mayra Volpini Almeida Dias

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para a obtenção do título de Doutor em Ciências, Área: ENTOMOLOGIA.

RIBEIRÃO PRETO - SP
2017

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FFCLRP - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA

Composição dos voláteis do pólen fermentado das abelhas *Apis mellifera* e de dieta proteica artificial fermentada com base em análises cromatográficas.

Joyce Mayra Volpini Almeida Dias

Versão Corrigida

(Versão original encontra-se na unidade que aloja o Programa de Pós-graduação).

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para a obtenção do título de Doutor em Ciências, Área: ENTOMOLOGIA.

Orientador: Prof. Dr. David de Jong

RIBEIRÃO PRETO - SP
2017

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Almeida-Dias, Joyce Mayra Volpini

Composição dos voláteis do pólen fermentado das abelhas *Apis mellifera* e de dieta proteica artificial fermentada com base em análises cromatográficas.

Ribeirão Preto, 2017.

137 p.: 46 il. 30 cm.

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Entomologia.

Orientador: De Jong, David.

Versão Corrigida

1. *Apis mellifera*. 2. Voláteis. 3. Pólen fermentado. 4. Regiões do Brasil. 5. Dieta proteica fermentada.

ALMEIDA-DIAS, J. M. V. **Composição dos voláteis do pólen fermentado das abelhas *Apis mellifera* e de dieta proteica artificial fermentada com base em análises cromatográficas.** 2017. 137 f. Tese (Doutorado em Ciências. Área de concentração: Entomologia) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Dedico...

Aos meus pais Sérgio e Marinei,

Ao meu esposo Luis Eduardo,

À minha “cachinhos dourados” Ana Laura.

Agradecimentos

À Deus por tudo que proporcionou em minha vida.

À minha família, em especial meus pais e minha irmã Letícia, por serem minha base, meu apoio em todas as horas e momentos que precisei. Por terem ouvidos para me escutar e darem risadas comigo.

Ao meu esposo por ser o amor da minha vida, e por ter me dado o presente mais divino: nossa filha Ana Laura!

Ao Prof. Dr. David de Jong pelo acolhimento desde o estágio, mestrado e agora doutorado. Pela orientação me dada para a realização deste trabalho.

Aos parceiros desse trabalho: Izabel Cristina C. Turatti, pelos ensinamentos sobre química e cromatografia, ao Prof. Dr. Fábio Santos do Nascimento por abrir as portas do seu laboratório e me ajudar desde o início até o fim deste trabalho, à Dra. Maria Juliana F. Caliman pelo auxílio com os dados polínicos.

Aos colegas do APILAB, obrigada meninas por tantos anos juntas!

À querida amiga de trabalho e vida Profa. Dra. Michelle Manfrini Moraes Vátimo por tudo! Pela orientação, conversas, ideias!!!

Ao meu amado amigo Rogério, pelas risadas e conselhos.

À florzinha, Clycie, por ser tão doce e sempre mostrar o lado mais lindo de tudo! Companheira desde sempre!!!

À minha amiga Pri pelo companheirismo de sempre e por sua sinceridade!

À minha amiga/irmã/afilhada/madrinha...rsrsrs, Yara, pelo apoio em todas as horas...sem você não estaria aqui...obrigada mesmo amiga!!!

Aos professores Dr. Lionel Segui Gonçalves por abrir as portas da UFERSA-Mossoró/RN (Cetapis) para a coleta de amostras; Dr. Aroni Sattler por abrir as portas do Laboratório de Apicultura (LABAPIS) da UFRGS para a coleta de amostras; Dr. Rubens Marcelo de Castro, por abrir as portas do Instituto Federal-Campus Muzambinho para a coleta de amostras.

Às secretárias de Programa de Pós-Graduação em Entomologia/Biologia Comparada, Renata e Vera, pelo apoio.

À Universidade de São Paulo, à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, ao Departamento de Biologia e ao Programa de Pós-Graduação em Entomologia.

À Capes pela bolsa concedida durante o desenvolvimento do trabalho.

Trem Bala

(Ana Vilela)

Não é sobre ter
Todas as pessoas do mundo pra si
É sobre saber que em algum lugar
Alguém zela por ti
É sobre cantar e poder escutar
Mais do que a própria voz
É sobre dançar na chuva de vida
Que cai sobre nós

É saber se sentir infinito
Num universo tão vasto e bonito
É saber sonhar
E, então, fazer valer a pena cada verso
Daquele poema sobre acreditar

Não é sobre chegar no topo do mundo
E saber que venceu
É sobre escalar e sentir
Que o caminho te fortaleceu
É sobre ser abrigo
E também ter morada em outros corações
E assim ter amigos contigo
Em todas as situações

A gente não pode ter tudo
Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso, eu prefiro sorrisos
E os presentes que a vida trouxe
Pra perto de mim

Não é sobre tudo que o seu dinheiro
É capaz de comprar
E sim sobre cada momento
Sorriso a se compartilhar
Também não é sobre correr
Contra o tempo pra ter sempre mais
Porque quando menos se espera
A vida já ficou pra trás

Segura teu filho no colo
Sorria e abraça teus pais
Enquanto estão aqui
Que a vida é trem-bala, parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir

Segura teu filho no colo
Sorria e abraça teus pais
Enquanto estão aqui
Que a vida é trem-bala, parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir

Resumo

ALMEIDA-DIAS, Joyce Mayra Volpini. **Composição dos voláteis do pólen fermentado das abelhas *Apis mellifera* e de dieta proteica artificial fermentada com base em análises cromatográficas.** 2017. 137 f. Tese (Doutorado em Ciências). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

As abelhas são considerados os polinizadores mais importantes das culturas agrícolas ao redor do mundo e os mais efetivos. As necessidades nutricionais desses animais são atendidas através da coleta de néctar (transportado à colônia e armazenado nos favos) e pólen (consumido após a realização de processos fermentativos de microrganismos, denominando-se beebread ou pão de abelha). O beebread possui uma atratividade natural a essas abelhas. Com o desaparecimento das abelhas, pela falta de alimento disponível, entre outras causas, a alimentação suplementar auxilia apicultores na manutenção dessas colônias em períodos críticos, porém esses suplementos muitas vezes não possuem valor nutritivo adequado e fraca atratividade. Verificar assim quais os compostos voláteis presentes no beebread de diferentes regiões do Brasil e uma dieta fermentada a base desse pólen, faz-se hoje uma importante ferramenta para tentar elucidar o problema da atratividade. Foram feitas análises de atratividade, através de testes em túnel Y com duas dietas artificiais: uma dieta não fermentada e outra fermentada com o próprio beebread, durante quatro dias; análises cromatográficas, com beebread coletado de colônias de abelhas *A. mellifera* em: Ribeirão Preto/São Paulo; Mossoró/Rio Grande do Norte; Muzambinho/Minas Gerais; Porto Alegre/Rio Grande do Sul; análise polínica das amostras de beebread de todas as localidades. Os testes em túnel Y confirmaram que as abelhas são atraídas pelo cheiro da dieta fermentada, sendo que quanto mais tempo permanecem sem alimentação proteica, mais rapidamente é a escolha do local onde se encontra a dieta fermentada. Já as análises químicas apontaram que tanto a dieta fermentada quanto o beebread coletado nas diferentes localidades possuem alguns compostos voláteis em comum, oriundos principalmente de fermentação: Acetoína, Ácido Acético e 2,3-Butanodiol. Sendo que a classe química que esteve mais presente foi a de terpenoides. A análise polínica das amostras de beebread confirmou os dados obtidos pela análise química. Nossos dados indicam a grande importância da gama de compostos encontrados no beebread e a presença daqueles que indicam a fermentação. Assim, saber qual desses compostos voláteis são atrativos às abelhas será fundamental para a liofilização dos mesmos e adicioná-los às rações proteicas artificiais, tornando-as mais palatáveis e atrativas para esses insetos.

Palavras-chaves: *Apis mellifera*. Compostos voláteis. Beebread. Regiões do Brasil; Palinologia; Dieta proteica fermentada.

Abstract

ALMEIDA-DIAS, Joyce Mayra Volpini. **Composition of volatiles from fermented honey bee pollen (bee bread) and from fermented artificial protein diet based on gas chromatography analysis.** 2017. 137 pp. Ph.D. Thesis in Entomology. College of Philosophy, Sciences and Letter of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

Honey bees are considered to be the most important and most effective pollinators of agricultural crops throughout the world. The nutritional necessities of these insects are met by collecting nectar (transported to the colony and stored in the comb) and pollen (consumed after it has been fermented by microorganisms, becoming bee bread). Bee bread contains substances that are attractive to the bees. As the increasing need for bees has become hard to meet because of a lack of natural food sources to sustain their colonies, it has become increasingly common for beekeepers to provide pollen substitutes. However, nutritional quality and palatability are often inferior to those of bee bread. In a search for key compounds that could help stimulate the bees to consume artificial diets, we examined the volatile compounds present in bee bread and in artificial protein diets that had been fermented with microorganisms present in bee bread. Attractiveness of fermented versus unfermented artificial protein diets for honey bees was compared using a Y odor choice test, for four days. Additionally, chromatographic analyses were made of bee bread collected from apiaries located in Ribeirão Preto, São Paulo, Mossoró, Rio Grande do Norte, Muzambinho, Minas Gerais, and Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pollen analyses were made of all bee bread samples to determine plant origin. The bees preferred the odors from fermented compared to unfermented diet. The rapidity with which they made this choice was positively correlated with the time that they remained without protein food. Several of the volatiles from bee bread from the different regions of the country were similar, despite considerably different contributing pollen species. These volatiles were also found in the fermented pollen substitute diet, indicating that they were products of fermentation; these included acetoin, ascorbic acid and 2,3-butanediol. The most common class of volatiles in these materials was terpenoids. There was a large variety of volatile compounds in the bee bread samples and in the fermented bee diet; these included substances that are a result of fermentation. A next step would be to determine which of these substances are most attractive to bees that require protein, so that they can be added to artificial bee diets in order to make them more palatable and useful.

Key words: *Apis mellifera*. Volatiles. Bee bread. Brazil regions. Fermented protein diet.

Sumário

1. Introdução	12
2. Objetivos	22
2.1 Objetivo Geral	23
2.2 Objetivos Específicos	23
3. Material e Métodos	24
3.1 Coleta do Material	25
3.2 Teste de escolha de odor em Y	27
3.3 Cromatografia a Gás/Espectrometria de Massas	31
3.3.1. Análises Químicas	33
3.4. Análise Polínica	34
3.4.1.Preparação do material polínico	34
3.4.2. Acetólise	34
3.4.3. Preparação das lâminas	35
3.4.4. Identificação polínica	36
4. Resultados	38
4.1. Teste de escolha de odor em Y	39
4.2. Análises Químicas: Dieta Fermentada	42
4.3. Análises Químicas: Ribeirão Preto/SP	46
4.3.1 Hidrocarbonetos	53
4.3.2 Alcoóis	54
4.3.3 Cetonas	55
4.3.4 Aldeídos	56
4.3.5 Ácidos Graxos	57
4.3.6 Ésteres	58
4.3.7 Terpenos	59
4.4. Análises Químicas: Mossoró/RN	62
4.4.1 Hidrocarbonetos	67
4.4.2 Alcoóis	68
4.4.3 Cetonas	69
4.4.4 Aldeídos	70
4.4.5 Ácidos Graxos	71
4.4.6 Ésteres	72
4.4.7 Terpenos	73
4.4.8 Compostos Nitrílicos	75
4.5. Análises Químicas: Muzambinho/MG	75
4.5.1 Hidrocarbonetos	80
4.5.2 Alcoóis	81
4.5.3 Cetonas	81
4.5.4 Aldeídos	82
4.5.5 Ácidos Graxos	83
4.5.6 Ésteres	84
4.5.7 Terpenos	85
4.5.8 Compostos Nitrílicos	87

4.5.9 Compostos Organossulfurados	87
4.6. Análises Químicas: Porto Alegre/RS	88
4.6.1 Hidrocarbonetos	92
4.6.2 Alcoóis	93
4.6.3 Cetonas	94
4.6.4 Aldeídos	95
4.6.5 Ácidos Graxos	95
4.6.6 Ésteres	96
4.6.7 Terpenos	98
4.6.8 Compostos Nitrílicos	99
4.7. Análise comparativa entre as regiões estudadas e a dieta fermentada	99
4.8. Análise Polínica	108
5. Discussão	115
6. Considerações Finais	123
7. Referências Bibliográficas	128

Introdução

1. Introdução

As abelhas são insetos de grande importância econômica, por causa de seus produtos que são comercializados pelo homem. Possui também um valor ecológico e econômico inestimável que está envolvido no processo de polinização. Assim, estes animais estão entre os poucos insetos cuja importância comercial é o cultivo e não o extermínio (CRAILSHEIM, 1990).

Esses insetos são considerados os polinizadores mais importantes das culturas agrícolas ao redor do mundo e os mais efetivos, correspondendo a 90% do sucesso reprodutivo das plantas com flores. As espécies de abelhas sociais são, geralmente, preferidas pelo homem para a polinização de culturas agrícolas, principalmente, devido à alta densidade de abelhas que podem ser mantidas em determinada área, podendo citar apiários que possuem centenas de colmeias que são utilizadas para a polinização em diversas culturas. (SHIPP et al., 1994).

Apis mellifera Linnaeus (1758) (Hymenoptera: Apidae) é a espécie mais utilizada para a polinização de cultivos comerciais. O padrão de voo dessas abelhas é rápido e agitado entre as flores. Tal comportamento as torna eficientes na dispersão de pólen (COUTO; COUTO, 2007). Apesar de ser uma espécie exótica, atualmente no Brasil há mais de dois milhões de colônias de *A. mellifera* utilizadas para produção de mel, cera, própolis, pólen, geleia real, apitoxina e serviços de polinização, principalmente em cultivos de maçã *Malus domestica*, pertencente a família Rosaceae e melão *Cucumis melon*, pertencente à família Cucurbitaceae (DE JONG et al., 2006).

As necessidades nutricionais das abelhas *A. mellifera*, são atendidas através da coleta de pólen e néctar (HERBERT JR. et al., 1977; HERBERT JR., 1992). Estes materiais são coletados pelas abelhas operárias forrageiras de acordo com as necessidades da colônia e a disponibilidade no campo (FREE, 1980). Para a coleta de recursos, as abelhas, bem como a maioria dos insetos, possuem um olfato altamente desenvolvido, utilizando as antenas que são capazes de detectar e discriminar possíveis compostos voláteis atrativos presentes no ambiente (NAIME et al., 2006).

O néctar (principal fonte de carboidratos), utilizado como fonte de energia para suas funções vitais, é coletado nos nectários florais, transportado à colônia e armazenado nos favos. Este é convertido em mel, após passar por processos físico-químicos, incluindo a desidratação. As operárias adultas são fortemente dependentes das reservas de carboidratos na colônia, e não sobrevivem a longos períodos sem esse tipo de substância em seu organismo, já que elas possuem baixa reserva em seus corpos, ao contrário das larvas (HRASSNIGG; CRAILSHEIM, 2005).

O pólen, além de ser necessário para a reprodução das planta, é atraente e comestível às abelhas. Os polens contêm, normalmente, de 6 a 28% de proteína e é a única fonte proteica disponível na natureza para as abelhas (WINSTON, 2003).

Além de suprir as exigências de aminoácidos, o pólen também preenche as necessidades de lipídeos, variando de 1 a 20%; além de possuir vitaminas e minerais como o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, fósforo, cobre, iodo, manganês, cobalto, zinco e níquel são indispensáveis para o desenvolvimento de sua estrutura corporal (HERBERT JR; SHIMANUKI, 1978) e os esteróis, que estão presentes em quantidades menores no pólen, menos de 0,5%, são essenciais (WINSTON, 2003). Há também os compostos fenólicos, dentre eles os flavonoides, que têm sido considerados como um dos principais constituintes biologicamente ativos nos produtos apícolas, pois possuem a propriedade de serem antioxidantes (CABRAL et al., 2009).

A diversidade do pólen coletado pelas abelhas depende dos tipos vegetais, do crescimento das plantas, das estações do ano, da temperatura do ar, o pH e a fertilidade do solo (LI et al., 2012; MORAIS et al., 2013a). O requerimento anual desse pólen por uma colônia varia consideravelmente dependendo da localização e tamanho populacional da mesma.

Os diversos tipos de pólen possuem diferenças relacionadas à porosidade de suas paredes, espessura e composição. Essas paredes resistem à deterioração e digestão. Embora o pólen seja rico em proteínas (ROULSTON; CANE, 2000), estas aparentemente não estão completamente disponíveis até

terem sido quebradas pelas bactérias no beebread (pólen fermentado) (HERBERT JR; SHIMANUKI, 1978; GILLIAM, 1997).

Essas transformações bioquímicas são necessárias para quebrar a camada externa sobre o pólen conhecido como exina, feito de esporopolenina, um composto que fornece resistência química ao pólen e preserva os compostos que estão dentro dele e responsável pela limitada capacidade para absorção de nutrientes e substâncias bioativas que estão dentro do grão de pólen (ATKIN et al., 2011). Há também uma melhora na digestibilidade e no seu valor nutritivo (HERBERT JR; SHIMANUKI, 1978).

A composição química do beebread é determinada pela composição do pólen coletado pelas abelhas forrageiras (ISIDOROV et al., 2009), e tem pouca importância quanto à quantidade de néctar nele contido, entretanto, é relevante quanto à origem e procedência geográfica da amostra (BARTH, 2004).

As abelhas misturam pólen, mel e outras secreções glandulares, ajudando a preservá-lo de microrganismos nocivos, induzindo fermentação e processos enzimáticos assim, produzindo o beebread. O processo de obtenção deste pólen fermentado dentro da colmeia ocorre em uma progressão de aparecimento/desaparecimento de microrganismos colonizadores, especialmente bactérias ácido-láticas, de acordo com as condições da colmeia e do substrato (DEL RISCO et al., 2012). Além desse tipo de bactéria, Gilliam (1979a) identificou diversas espécies do gênero *Bacillus* associadas ao beebread. E em um trabalho posterior (GILLIAN, 1979b), conseguiu identificar 113 tipos de leveduras presentes no pólen fermentado de abelha. Há redução no pH, tornando-o altamente ácido (ANDERSON et al., 2011; NICOLSON, 2011).

As abelhas consomem, preferencialmente, pólen estocado e fermentado a mais de três dias. Polens recém-coletados possuem uma quantidade pequena de microrganismos. A proporção estimada de microrganismo/grão de pólen foi de 1:1.000.000 (ANDERSON et al., 2014). Carroll et al. (2017) encontraram que as abelhas consomem pólen estocado de 2 a 4 dias, não ultrapassando esse tempo de armazenamento. Após 7 dias de armazenamento, o consumo do pólen fermentado diminuiu.

Além de ser altamente nutritivo, o beebread possui uma atratividade natural para as abelhas, sendo através do gosto ou através do cheiro (compostos voláteis). Isidorov et al. (2009) apontaram a grande variedade de compostos químicos presentes no extrato de beebread. Já Collin et al. (1995), Dobson e Bergstrom (2000), Flamini et al. (2003, 2007) e Dominguez-Valhondo et al. (2013), constataram uma variedade de voláteis, Compostos orgânicos voláteis (COVs) em pólen recém-coletados. Porém há pouca informação sobre os voláteis presentes no beebread.

Os COVs das plantas são liberados por praticamente todos os tecidos vegetais classificados nas seguintes classes: terpenoides, carotenoides, fenilpropanoides/benzenoides, derivados de ácidos graxos (incluindo os produtos da via da lipoxigenase) e os compostos C5-ramificados. Além desses, há também os derivados de aminoácidos, que são frequentemente encontrados como componentes em aromas liberados por flores e frutos (DUDAREVA; PICHERSKY, 2008). Os COVs são normalmente líquidos lipofílicos de alta pressão de vapor e podem atravessar membranas celulares facilmente sendo liberados na atmosfera ou no solo, quando não há alguma barreira de difusão (PICHERSKY et al., 2006).

Desde a antiguidade, sabe-se que tecidos florais e vegetativos emitem substâncias com diferentes odores. (KNOBLOCH et al., 1986). O entendimento da importância, apesar de muitas vezes imperceptíveis aos humanos, e de que estes exercem alguma alteração fisiológica nas plantas, começou após a descoberta do hormônio gasoso etileno em 1934 (DUDAREVA et al., 2004). Hoje, sabe-se que as plantas realizam um incalculável arsenal de diferentes reações biossintéticas e estima-se que dos 100.000 compostos químicos produzidos pelas plantas, aproximadamente 1.700 sejam voláteis (DICKE; LORETO, 2010). A variedade estrutural destes compostos é perfeitamente adaptada ao papel específico que estas moléculas desempenham na natureza (HERRMANN, 2010).

COVs desempenham um papel importante na natureza como compostos mensageiros para transmitir informações seletivas entre espécies (MONSON; HOLLAND, 2001). As funções primárias dos voláteis parecem ser de defesa da planta contra herbívoros ou patógenos ou, através da atração de

polinizadores e dispersores de semente, proporcionar alguma vantagem reprodutiva às plantas (PICHESKY; GERSHENZON, 2002), para a comunicação entre insetos e/ou plantas (MONSON; HOLLAND, 2001; TSIGARIDIS; KANKIDOU, 2007) para acasalamento (insetos) (TSIGARIDIS; KANKIDOU, 2007; AUGUSTIN; HEMAR, 2009). As abelhas e borboletas são insetos frequentemente atraídos por aromas de diversas flores (SIMÕES et al., 2007).

Os voláteis emitidos de tecidos vegetativos, como parte do sistema de defesa da planta, podem repelir (KESSLER; BALDWIN, 2001) ou intoxicar (VANCANNEYT et al., 2001) animais e microrganismos diretamente, ou atrair inimigos naturais, que protegerão a planta indiretamente, via interação tritrófica (ARIMURA et al., 2005). Além disso, esses voláteis podem alertar plantas vizinhas a respeito de um ataque de algum herbívoro ou patógeno (SHULAEV et al., 1997), induzindo defesa ou preparando estas plantas para responder mais rapidamente em um ataque futuro, conhecido como efeito “priming” (ENGELBERTH et al., 2004).

E acordo com Pichersky e Gershenzon (2002), no sistema radicular também há a produção de compostos voláteis que podem atuar como antimicrobianos, anti-herbívoros ou atrair inimigos naturais de herbívoros que se alimentam das raízes. O desenvolvimento de novas ferramentas analíticas e de técnicas moleculares e bioquímicas tem permitido um grande avanço no entendimento das funções dos voláteis e de suas aplicações.

Para que esses compostos sejam identificados em qualquer amostra, é necessário um método eficiente de separação, identificação e quantificação das espécies químicas. Segundo Collins et al. (1997), a cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura, realizada por meio da distribuição destes entre duas fases, que estão em contato íntimo: a fase estacionária e uma fase móvel. Durante a passagem da fase móvel pela fase estacionária, os componentes da mistura são distribuídos entre as duas, de tal forma que cada um dos componentes é seletivamente retido pela fase estacionária, resultando em migrações diferenciais.

Existem diversas formas de realizar o processo cromatográfico, mas a que se encaixa na identificação de substâncias volatilizáveis é a cromatografia a gás. A amostra, através de um sistema de injeção, é introduzida em uma coluna contendo a fase estacionária. O uso de diferentes temperaturas no local da injeção da amostra e na coluna possibilita a vaporização destas substâncias que, de acordo com suas propriedades, são retidas por tempos determinados e chegam à saída da coluna em tempos diferentes. O uso de um espectrômetro de massa na saída da coluna torna-se possível a detecção e a quantificação destas substâncias (COLLINS et al., 1997).

Porém, saber escolher o tipo de injeção torna-se tão importante quanto o uso da técnica adequada. A extração e injeção por uma fibra de microextração de fase sólida (SPME) possibilitam muitas vantagens relativamente aos métodos analíticos tradicionais, por combinar amostragem, pré-concentração e a transferência direta (num só passo) de analitos para um cromatógrafo a gás.

A parte fulcral da SPME reside numa fibra de sílica (ou outro material adequado) com cerca de um centímetro de comprimento, que está revestida com um polímero que tem afinidade para as espécies químicas que se pretende amostrar (Figura 1a e 1b). Os revestimentos das fibras diferem uns dos outros não só pelo tipo de revestimento, mas também na espessura, uma vez que ambos influenciam a adsorção/absorção dos analitos. Geralmente, os compostos voláteis requerem revestimentos espessos, enquanto que revestimentos com menor espessura são mais eficientes para analitos semi-voláteis. A escolha da fibra é feita em função da polaridade dos analitos que se pretende estudar (PEREIRA, 2005).

Figura 1: **A:** Diagrama de um sistema de fibra de SPME; **B:** Processo de extração por SPME.

Fonte: Almeida, J. M. V.

Apesar de toda importância mencionada, as abelhas encontram-se em processo de desaparecimento em várias partes do mundo, principalmente na Europa e em alguns países da América do Norte (POTTS et al., 2015). Pesquisas recentes estão mostrando um grande declínio das abelhas nativas e abelhas melíferas, em vários países do mundo (BIESMEIJER et al., 2006; KLEIJN; RAEMAKERS, 2008; FREITAS et al., 2009).

Em algumas épocas do ano, há um decréscimo da fonte natural proteica (pólen), comprometendo assim o desenvolvimento e o crescimento da colônia (SOMERVILLE, 2005). Dessa maneira, com a falta de alimento estocado na colônia, ou sua diminuição na natureza, ocorre o início antecipado do forrageamento. Como a longevidade das operárias é afetada pelo começo do forrageamento, as operárias que se tornam forrageiras mais cedo, morrem antes do que as operárias que executam tarefas dentro do ninho. Sendo assim, colônias que apresentam baixos estoques de alimento, principalmente proteína armazenada nos favos, tem como consequência um declínio na quantidade de

abelhas jovens presentes para as gerações seguintes e também um tempo de vida mais curto de suas operárias em geral (DEGRANDI-HOFFMAN et al., 2010).

Doenças, ácaros, inseticidas, ou até mesmo manipulações frequentes nas colmeias do apiário levam a um stress nutricional nas abelhas. Assim, apicultores muitas vezes tentam aliviar os efeitos desse stress oferecendo rações artificiais (suplementares) com ou sem pólen como uma suplementação nutricional (DOULL; STANDIFER, 1970; STANDIFER et al., 1973; HERBERT; SHIMANUKI, 1978; HERBERT et al., 1980; CREMONEZ et al., 1998; KALEV et al., 2002; MORAIS et al., 2013a).

A alimentação suplementar é muito importante tanto para a manutenção da colônia como para o crescimento e multiplicação do número de colmeias (HERBERT, 1992). Além disso, tal suplemento resulta em benefícios, pois assegura um desenvolvimento contínuo das colônias em lugares e épocas de escassez de néctar e pólen, além de prepará-los para aproveitar melhor o fluxo de néctar (SEREIA, 2009).

Porém, esses suplementos nutricionais sofrem graves problemas, incluindo baixo valor nutricional e principalmente a fraca atratividade, por não possuírem compostos voláteis iguais ou similares aos encontrados no beebread fazendo com que não haja aceitabilidade pelas abelhas (SCHMIDT; HANNA, 2006). Ou seja, para que essas dietas artificiais sejam além de nutritivas, atrativas para essas abelhas, elas devem ser o mais parecido com o alimento natural, o beebread.

Várias rações artificiais proteicas foram desenvolvidas, contendo ingredientes altamente proteicos e com valores acessíveis ao apicultor, mas ainda se embarram no problema da atratividade. Não basta ter uma ração nutritiva se não for atrativa para as abelhas (MORAIS et al., 2013b).

Partindo desse princípio, foram feitos alguns testes e verificou-se uma maior aceitação de uma dieta fermentada com o próprio beebread da colônia. Além do pH dessa dieta ser reduzido, o que aumenta a semelhança ao beebread, (ALMEIDA, 2013), acredita-se que as abelhas consomem mais uma dieta fermentada, do que a não fermentada, pois percebe-se a existência de compostos voláteis presentes no pólen que atraem essas abelhas. Verificar assim quais os

compostos orgânicos voláteis presentes no beebread faz-se hoje uma importante informação para tentar elucidar o problema da atratividade pelas abelhas, sendo este um trabalho pioneiro no Brasil.

Objetivos

3. Objetivo Geral

Investigar os compostos voláteis do alimento proteico natural das abelhas dentro da colmeia, o beebread, ou pão da abelha (pólen fermentado no favo pelas abelhas), a fim de encontrar atrativos naturais para serem, futuramente, adicionados aos suplementos proteicos oferecidos a essas abelhas.

3.1 Objetivos Específicos

Sob estas perspectivas, tornam-se objetivos principais deste trabalho:

- ✓ Realizar testes de atratividade (Túnel Y) com duas dietas, uma fermentada e outra não, a fim de verificar se o odor da dieta fermentada é mais atrativo do que o odor da dieta não fermentada;
- ✓ Identificar os constituintes voláteis de uma ração fermentada, testada à priori, e que apresentaram atratividade e comparar com o perfil químico de voláteis encontrado no “beebread”;
- ✓ Identificar e comparar os constituintes voláteis de amostras de “beebread”, de diferentes regiões do Brasil: Ribeirão Preto/SP; Muzambinho/MG; Mossoró/RN e Porto Alegre/RS;
- ✓ Identificar a origem dos tipos polínicos representados nas amostras coletadas.

==== *Material e Métodos*

3. Material e Métodos

Os experimentos realizados nesse trabalho foram desenvolvidos no Laboratório de Biologia e Genética de Abelhas, Departamento de Genética da Faculdade de medicina de Ribeirão Preto – USP, em parceria com o Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP e com o Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS), Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciência Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP.

3.1. Coleta do Material

A espécie de abelha utilizada para a coleta do material foi *Apis mellifera*. Toda a coleta do pólen fermentado foi realizada em apiários padronizados, com colmeias de modelo Langstroth. Foram coletados polens fermentados de quatro regiões distintas do Brasil: (1) município de Ribeirão Preto, localizado no interior do Estado de São Paulo (21° 10' 40" S, 47° 48' 36" O), com clima tropical úmido, caracterizado pelo verão chuvoso e pelo inverno seco; (2) município de Muzambinho, localizado no Estado de Minas Gerais (21° 22' 33" S, 46° 31' 33" O), com clima tropical de altitude, caracterizado com um verão mais frio devido à altitude em que a cidade é localizada; (3) município de Mossoró, localizado no Estado do Rio Grande do Norte (5° 11' 16" S, 37° 20' 38" O), com clima semiárido quente, estando entre os municípios mais quentes do Rio Grande do Norte; (4) município de Porto Alegre, localizado no Estado do Rio Grande do Sul (30° 1' 58" S, 51° 13' 48" W), com clima subtropical úmido. Dados obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia-INMET (Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/>) (Tabela 1).

Tabela 1: Localidades do Brasil em que foi coletado amostras de pólen fermentado, juntamente com a quantidade de amostras de cada cidade (n) e época da coleta.

Localidade	Quantidade de amostras por localidade	Época da coleta
Ribeirão Preto/SP	41	Setembro/2014
Muzambinho/MG	47	Fevereiro/2015
Mossoró/RN	48	Novembro/2014
Porto Alegre/RS	46	Abril/2015

Cada amostra foi coletada de uma célula por favo, em uma única colônia por localidade. O beebread foi coletado com o auxílio de um espátula de material cirúrgico e colocado em frasco do tipo vial de 4 ml (Figura 2), vedados logo em seguida com tampas com septos e mantidas sob refrigeração (-10°C a -5°C), visando evitar perdas dos constituintes voláteis. Todos os instrumentos utilizados para a coleta do material, foram limpos com hexano PA.

Figura 2: Amostras de beebread coletadas e colocadas em frascos de 2 mL do tipo vial, posteriormente armazenadas em freezer à -10°C a -5°C .

Fonte: Almeida, J. M. V.

3.2. Teste de escolha de odor em Y

Na primeira etapa do experimento, foram realizados testes em túneis de acetato no formato de Y, com 22 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro (cada braço) (Figura 3), higienizado com hexano P.A. em toda repetição, com duas dietas artificiais previamente testadas, sendo uma dieta não fermentada a base de farinha de soja, levedura de cana, farelo de arroz, sacarose e xarope de água com sacarose e essa mesma dieta fermentada com o próprio beebread coletado diretamente dos favos, ficando 28 dias em estufa á 35 °C antes da utilização (ALMEIDA, 2013) (Tabela 2).

Figura 3: Túnel de acetato em formato de “Y” com três braços. Braço A: entrada livre onde são introduzidas as abelhas uma a uma; Braço B: recipiente contendo 5 gramas da dieta Proteica não fermentada com uma tela impedindo o acesso da probóscide da abelha; Braço C: recipiente contendo 5 gramas da dieta proteica fermentada com uma tela impedindo o acesso da probóscide da abelha.

Fonte: Almeida, J. M. V.

Embora existam outras dietas fermentadas descritas na literatura (ELLIS e HAYES JR., 2009), que utilizam microrganismos de outras fontes além do pólen, a intenção do inóculo fermentado para este trabalho, foi fermentar a dieta usando os microrganismos naturais presentes no próprio beebread, para que assim se aproximasse do processo de fermentação natural.

Tabela 2: Dietas energético-proteicas elaboradas e fornecidas às operárias de abelhas africanizadas *Apis mellifera*.

Dietas	Ingredientes
Dieta Proteica	20 g de levedura de cana 16,7 g de farinha de soja 43,3 g de farelo de arroz 20 g de sacarose 50 mL de Xarope de sacarose 70% (v/v)
Dieta Proteica Fermentada	20 g de levedura de cana 16,7 g de farinha de soja 43,3 g de farelo de arroz 20 g de sacarose 40 mL de inóculo fermentado 20 mL de Xarope de sacarose 70% (v/v)

Todos os equipamentos e materiais foram esterilizados utilizando álcool a 70% antes da preparação do inóculo fermentado. Para prepará-lo, o beebread foi retirado diretamente a partir de quatro colônias distintas. Adicionou-se 10 gramas de beebread a 300 ml de xarope de sacarose (50% v/v). Esta mistura foi manualmente homogeneizada, armazenada em frascos de cor âmbar (250 ml) com tampa de rosca, posteriormente colocado numa estufa incubadora á 35 °C com umidade controlada (70%) durante vinte e cinco dias.

Para libertar o CO₂ produzido durante a fermentação, os frascos foram brevemente abertos a cada 48 horas. Após o final deste período de fermentação, os frascos foram selados e armazenados em freezer á 8°C durante 20 dias. Um novo inóculo foi preparado a cada 20 dias para assegurar a máxima fermentação e evitar o crescimento de fungos oportunistas e outros microrganismos.

Inicialmente, foram retirados quadros de crias de operárias operculadas pré-emergentes de duas colônias localizadas no Apiário Experimental no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e colocados em gaiolas de madeira cobertas por telas de nylon e introduzidas em uma estufa com temperatura e umidade controladas, em torno de 34°C e 80%, respectivamente, onde ocorreu a emergência das operárias. Após a

emergência dessas abelhas (dentro de um período de 12 – 16 horas), aproximadamente 500 destas foram marcadas no tórax com caneta de tinta de água inodora e atóxica da marca Decocolor (Figura 4).

Figura 4: Abelhas marcadas no tórax com caneta de tinta de água inodora e atóxica.

Fonte: Almeida, J. M. V.

Todas as abelhas marcadas foram introduzidas em uma colmeia diferente da original, localizada no apiário. Após 4 dias, foram coletadas 60 abelhas destas marcadas para análise, pois com quatro dias de idade, essas abelhas são responsáveis pela alimentação das crias, rainha e zangões dentro da colmeia, então são estas que objetivamos que tenham mais interesse no consumo e na atratividade das dietas. Elas foram coletadas e introduzidas em gaiola plástica de confinamento (21,5 cm x 13 cm x 13 cm), com uma tela na parte frontal para a ventilação no interior da gaiola (Figura 5) e alimentadas somente com xarope de água com açúcar (70% v/v).

Figura 5: Gaiola plástica de confinamento (21,5 cm x 13 cm x 13 cm), com uma tela na parte frontal para a ventilação no interior da gaiola.

Fonte: Almeida, J. M. V.

As dietas foram colocadas em recipientes de plástico com 3 cm de diâmetro e 3 cm de altura cobertos com telas de nylon nos dois braços do túnel em Y (5 gramas de cada) (Figura 6), para que as abelhas não tivessem contato direto com o alimento; só podiam sentir o odor que estas dietas exalavam. Após o confinamento, durante quatro dias, 10 abelhas foram retiradas da gaiola e colocadas, uma a uma, no túnel de acetato em formato de Y, sendo que a sala estava climatizada a uma temperatura de 35°C. Foi observado por um período de 30 minutos, qual caminho cada abelha seguiu para posterior análise.

Figura 6: Recipientes de plástico com 3 cm de diâmetro e 3 cm de altura cobertos com telas de nylon com as dietas testadas (5 gramas de cada).

Fonte: Almeida, J. M. V.

3.3 Cromatografia a Gás / espectrometria de massas

As análises dos compostos voláteis por cromatografia a gás foram realizadas em um sistema de Cromatografia a Gás acoplado a Espectrometria de Massas SHIMADZU, modelo GCMA QP2010 equipado com uma coluna DB 5 MS 30 m e hélio como gás carreador à 1ml/min., empregando o programa de temperatura utilizado para a análise (Figura 7).

Figura 7: Aparelho de Cromatografia a Gás/Espectrometria de Massas SHIMADZU, modelo GCMA QP2010 equipado com uma coluna DB 5 MS 30 m e hélio como gás carreador à 1ml/min.

Fonte: Almeida, J. M. V.

As condições de operação do equipamento foram: modo do injetor em splitless, com o tempo de injeção da amostra de 1,5 minutos. Injetor á 250°C, coluna programada para operar á 50°C, permanecendo durante 4 minutos, após aumento de temperatura para 180°C em rampa por 5°C/min., permanecendo a essa temperatura por 10 minutos e novamente elevação de temperatura á 260°C (em rampa por 10°C/min.), ficando a essa temperatura por 7 minutos. O tempo total de corrida foi de 55 minutos (Figura 8).

Figura 8: Condições de operação do equipamento (CG/MS) para a corrida de todas as amostras.

Fonte: Software CGMS Analysis Editor.

Para a injeção manual do conteúdo volátil das amostras no aparelho, utilizou-se uma fibra de microextração de fase sólida (SPME), nesse caso foi utilizada uma fibra de polidimetilsiloxano (PDMS).

Cada amostra contida no vial foi presa com uma garra em um suporte e aquecida á 50°C em banho-maria, para que houvesse a liberação dos compostos voláteis. Após o aquecimento, uma fibra de microextração de fase sólida (SPME) foi exposta dentro do vial para a adsorção dos compostos voláteis presentes na amostra, durante 30 minutos (Figura 9).

Figura 9: Fibra PDMS sendo exposta para a adsorção dos compostos voláteis da amostra armazenada em vial, aquecida em banho-maria á 50°C por 30 minutos.

Fonte: Almeida, J. M. V.

3.3.1 Análises Químicas

Os dados foram analisados com o auxílio do programa GCMS Solutions para Windows (Shimadzu Corporation). Devido aos diferentes tempos de retenção de cada soluto na coluna cromatográfica os picos cromatográficos apresentaram-se em diferentes posições. Cada pico possui todas as informações obtidas pelo espectrômetro de massa. Assim, realizou-se a quantificação com base nas áreas de pico obtidas nos cromatogramas.

Os compostos foram identificados com o auxílio do tempo de retenção e respectivo índice de retenção (IR). Uma amostra de solução de padrões de alcanos (C_8 - C_{20} , C_8 - C_{40} e C_7 - C_{30}) foi submetida à cromatografia sob as mesmas condições as quais foram submetidas todas as amostras de beebread. A partir dos tempos de retenção dos alcanos da amostra padrão e dos tempos de retenção dos compostos das amostras, utilizou-se a seguinte fórmula para a determinação dos índices de retenção (adaptada de Kovàts, 1958 por van Den Dool e Kratz, 1963), para temperaturas não isotérmicas:

$$IR_c = 100.N + 100. \left[\frac{TR_c - TR_a}{TR_p - TR_a} \right]$$

No qual:

IR_c = Índice de retenção do composto;

N = Número de carbonos do alcano de tempo de retenção inferior ao composto;

TR_c = Tempo de retenção do composto;

TR_a = Tempo de retenção do alcano anterior ao composto;

TR_p = Tempo de retenção do alcano posterior ao composto.

Os índices de retenção encontrados foram então comparados com os índices encontrados por Adams (1995) e pelas bibliotecas digitais FFNSC Library (Flavor and Fragrance Natural and Synthetic Compounds), WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011.

3.4 Análise Polínica

3.4.1 Preparação do material polínico

Para a análise polínica, um pool de três amostras que foram coletadas e analisadas das diferentes localidades, foi armazenado em álcool 70% para o procedimento de acetólise proposto por ERDTMAN (1960). Esse processo é o mais indicado para a preparação dos grãos de pólen, pois permite a melhor visualização das características morfológicas para sua descrição (SILVA et al., 2014). Todo o procedimento, desde a preparação do material polínico, acetólise e preparação de lâminas foi adaptado de SILVA et al. (2014).

Cada amostra de beebread foi transferida para um tubo fálcon de 15 mL. Foi adicionado 2 mL de álcool 70% em cada tubo. O material permaneceu por 24 horas nessa condição, em seguida os tubos foram centrifugados a 2000rpm/10min. Após a centrifugação, o álcool foi retirado.

Posteriormente, adicionou-se 2 mL de ácido acético em cada tubo fálcon, deixando novamente em repouso por 24 horas. Depois desse período, o material foi centrifugado a 3000rpm/3min.

3.4.2. Acetólise

Utilizou-se anidrido acético e ácido sulfúrico (9:1). A mistura foi feita em balão de vidro de 250 mL que estava dentro de um Becker de 1000 mL com gelo. Colocou-se o anidrido acético com o auxílio de uma pipeta, e adicionou-se vagarosamente o ácido sulfúrico, por gotejamento. Essa solução (mistura de acetólise) foi misturada com um bastão de vidro até estar homogeneizada.

O material polínico foi centrifugado a 3000 rpm/3min para a retirada do ácido acético. À esse material, foi adicionado 5 mL da mistura de acetólise. Os tubos foram mantidos abertos e com um bastão de vidro em seu interior e levados ao banho-maria (100°C) por 3 minutos. Com o bastão de vidro, misturou-se o material sedimentado. Após o cozimento em banho-maria, foi retirado o bastão de vidro e todos os tubos foram tampados, agitados manualmente e centrifugados a 3000rpm/3min.

Após centrifugação, a mistura de acetólise foi retirada, adicionou-se então 10 mL de água destilada em cada tubo para que o material polínico estivesse totalmente lavado da mistura de acetólise. Após a lavagem, o material foi centrifugado novamente a 3000rpm/3min e posteriormente a retirada da água, adicionou-se 4 mL de glicerina 50% (glicerina PA. + água destilada).

3.4.3. Preparação das lâminas

Para o preparo da gelatina de Kisser, foi utilizado 24g de gelatina incolor e 10mL de fenol PA. (P.M. 94,11). Foram cortados cubos de aproximadamente 2x2x2mm com o auxílio de uma espátula.

Os tubos foram centrifugados a 3000rpm/3min. Depois de homogeneizar o material polínico, um cubo de gelatina de Kisser foi introduzido até o fundo de cada tubo, com o auxílio de um estilete. Assim que os grãos de pólen entraram em contato com a gelatina de Kisser, retirou-se do fundo de cada tubo (Figura 10A e 10B) e foi depositado sobre a lâmina, colocou-se então a lamínula sobre cada material, colocando-as em uma placa aquecedora a uma temperatura de 60°C por alguns minutos até que a gelatina derretesse (Figura 11A e 11B). Para cada amostra, foram preparadas três lâminas (trélicas).

Figura 10 A: Cubo de aproximadamente 2x2x2mm de gelatina de Kisser sendo inserido no tubo falcon contendo a amostra; **B:** Cubo de aproximadamente 2x2x2mm de gelatina de Kisser sendo retirado do tubo falcon, já com os grãos de pólen aderidos.

Fonte: Adaptado de Silva *et al.*, 2014.

Figura 11A: Material depositado na lâmina; **B:** Lâmina pronta com material polínico após o aquecimento em chapa a 60°C.

Fonte: Almeida, J.M.V.

3.4.4. Identificação polínica

Para a identificação polínica, utilizou-se um microscópio óptico binocular, Leica® DM4000B do Laboratório de Ecologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP, com um aumento de até 2560 vezes com uma câmera fotográfica acoplada (Leica® DFC500). O programa de computador LAS versão 3.8 foi utilizado para o registro das imagens dos grãos de pólen com escala (20µm).

A análise polínica iniciou-se com uma análise qualitativa, na qual todos os tipos polínicos foram fotografados e identificados através da comparação destes com bases de referência (SILVA et al., 2014; MAIA-SILVA et al., 2012). Já na análise quantitativa feita posteriormente, cada lâmina foi colocada no microscópio e o foco foi ajustado, após isso foi feita a contagem dos 400 primeiros grãos de pólen de cada lâmina (MONTERO; TORMO, 1990). Então, somou-se a ocorrência dos grãos e calculou-se a porcentagem de ocorrência do determinado tipo polínico em relação ao total de grãos contados.

===== *Resultados*

4. Resultados

4.1. Teste de escolha de odor em Y

Os resultados dos testes em abelhas recém-coletadas (1º grupo) mostraram que a maioria delas (70%) permaneceu por mais tempo no braço onde estava a dieta proteica fermentada (Figura 12), sendo que a média±desvio padrão de cada entrada foi: entrada livre 0,266min.±0,0994min.; braço com dieta proteica 0,267min.±0,131min.; braço com dieta proteica fermentada 0,467±0,171. Apresentando diferença significativa, $P=0.003$ (One Way ANOVA).

Figura 12: Percentagem com desvio padrão, em relação aos 30 minutos do tempo de permanência de cada abelha, no dia 0, dia de coleta, em cada braço do túnel em formato de Y.

Após um período de 24 horas, foram coletas mais 10 abelhas e estas colocadas no túnel uma por vez e também observadas durante 30 minutos. Conforme o tempo sem alimentação proteica, observamos que o tempo de decisão de cada abelha diminuiu, e elas optaram pelo braço onde havia a dieta fermentada mais rapidamente quando compradas às abelhas do dia 0, sendo que das 10 abelhas observadas, 8 permaneceram por mais tempo no braço com a dieta proteica fermentada (Figura 13). Sendo que a média±desvio padrão de cada entrada foi: entrada livre 0,210 min.±0,205 min.; braço com dieta proteica 0,281

min. $\pm$ 0,175 min.; braço com dieta proteica fermentada 0,510 min. $\pm$ 0,192 min., apresentando diferença significativa, $P=0.004$ (One Way ANOVA).

Figura 13: Percentagem com desvio padrão em relação aos 30 minutos do tempo de permanência de cada abelha, no 2º dia, em cada braço do túnel em formato de Y.

Depois de um período de dois dias sem alimentação proteica, podemos observar que 100 % das abelhas colocadas no túnel em Y preferiram o braço onde estava a dieta fermentada, ou seja, elas passaram a maior parte dos 30 minutos perto desta entrada, porém elas ainda passaram uma pequena parte do tempo no braço com a dieta não fermentada. Somente uma abelha não se deslocou para nenhum dos braços com dieta, permanecendo na entrada do túnel. (Figura 14). Sendo que a média $\pm$ desvio padrão de cada entrada foi: entrada livre 0,210min. $\pm$ 0,279min.; braço com dieta proteica 0,189min. $\pm$ 0,129min.; braço com dieta proteica fermentada 0,591min. $\pm$ 0,237min., apresentando diferença significativa, $P=0.007$ (One Way ANOVA).

Figura 14: Percentagem com desvio padrão em relação aos 30 minutos do tempo de permanência de cada abelha, no 3º dia, em cada braço do túnel em formato de Y.

Ao observarmos a Figura 15, mostrando a preferência das abelhas por qual braço do túnel em Y de 3 dias sem alimentação proteica, podemos notar que 100% das abelhas permaneceram mais tempo no braço com a dieta fermentada do que nos demais. Houve diferença significativa ao compararmos a permanência das abelhas na entrada da dieta fermentada e na entrada da dieta não fermentada ($P=0.001$). Sendo que a média $\pm$ desvio padrão de cada entrada foi: entrada livre 0,114min. $\pm$ 0,056min.; braço com dieta proteica 0,126min. $\pm$ 0,123min.; braço com dieta proteica fermentada 0,761min. $\pm$ 0,131min., apresentando diferença significativa, $P\leq 0.001$ (One Way ANOVA).

Figura 15: Percentagem com desvio padrão em relação aos 30 minutos do tempo de permanência de cada abelha, no 4º dia, em cada entrada do túnel em formato de Y.

Na figura abaixo (Figura 16), onde houve a junção dos resultados obtidos durante os 4 dias de experimentos em Túnel Y, podemos observar que as abelhas preferiram o braço onde estava localizada a Dieta Proteica Fermentada. E que conforme o aumento de tempo durante o qual essas abelhas ficaram sem nenhum tipo de alimentação proteica, a preferência por essa entrada foi maior.

Figura 16: Somatório da porcentagem do tempo de permanência de cada abelha, em cada braço do túnel em formato de Y, ao longo dos quatro dias de experimento.

4.2 Análises Químicas: Dieta Fermentada

Feitos os testes em túnel Y, a dieta fermentada foi analisada no cromatógrafo a gás, igualmente aquele utilizado para as análises das amostras de beebread das quatro localidades do país. Com essa análise, observou-se a presença de 22 compostos voláteis, segundo a metodologia feita, sendo que destes, 20 foram identificados (Tabela 3).

Foram encontrados hidrocarbonetos (3 compostos), alcoóis (2 compostos), cetona (1 composto), aldeídos (4 compostos), ácidos graxos (2 compostos), ésteres (4 compostos), monoterpenos (3 compostos) e um composto organossulfurado.

Dos compostos voláteis identificados, podemos destacar o ácido acético com a maior concentração dentre todos os demais (51%) e o com a segunda maior concentração, o éster decanoato de etila com 8.26%.

As duas classes de compostos que mais apareceram na análise cromatográfica da dieta fermentada foram as de aldeídos e ésteres, com quatro compostos identificados em cada uma.

Tabela 3: Compostos voláteis da dieta fermentada utilizada no teste em túnel Y, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção calculado (IRc), Índice de Retenção encontrado na literatura (Bibliotecas do CG) (IRl) e Porcentagem Relativa (PR).

Classificação	Compostos (biblioteca)	Compostos (IUPAC)	IRc	IRl	PR
Hidrocarboneto	n-Hexadecano	hexadecane	1600	1600	1.55
	n-Pentadecano	pentadecane	1500	1500	3.02
	n-Tetradecano	tetradecane	1400	1400	3.43
Álcool	3-metil-1-butanol	3-methylbutan-1-ol	730;732	731	0.19
	2,3-Butanodiol	butane-2,3-diol	743	743	0.46
Cetona	Neril acetona	(5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one	1429;1430	1428	1.51
Aldeído	2-Metil butanal	2-methylbutanal	660	662	1.68
	3-Metil butanal	3-methylbutanal	649	643	3.74
	n-Hexanal	hexanal	801	801	4.3
	n-Pentanal	pentanal	703	707	0.22
Ácido Graxo	Ácido acético	acetic acid	622;625	625	51.2
	Ácido propanoico	propanoic acid	740	765	3.62
Éster	(Z)-2- hexenil etílico butanoico	[(Z)-hex-2-enyl] butanoate	1189	1191	5.43
	Decanoato de etila	ethyl decanoate	1379	1381	8.26
	Dodecanoato de etila	ethyl dodecanoate	1598;1599	1598	3.86
	etil 9-decanoato	ethyl dec-9-enoate	1379	1371	0.4
Terpeno	Monoterpeno				
	Limoneno	1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene	1029;1031;1032	1030	0.4
	Safranal	2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde	1202;1203	1201	0.31

	Carvona	2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one	1250	1246	2.39
Composto organossulfurado	Dimetil disulfide	(methyldisulfanyl)methane	740	742	3.01
	-	-	743	-	
Não identificados	-	-	797	-	

4.3 Análises Químicas: Ribeirão Preto/SP

Análises dos cromatogramas das amostras de Ribeirão Preto/SP mostraram 71 compostos voláteis segundo a metodologia feita, sendo que 62 foram identificados (Tabela 4). Dentre esses compostos se encontram: hidrocarbonetos, alcoóis, cetonas, aldeídos, ácidos graxos, ésteres, terpenos.

Através da comparação de presença ou ausência de cada composto nas 41 amostras da localidade de Ribeirão Preto (Teste Kruskal-Wallis ANOVA), podemos observar que houve diferença estatística entre as amostras, apresentando $H=421.594$ com 40 graus de liberdade ($P=<0.001$). Após a identificação de uma amostra, os outros cromatogramas foram sobrepostos de oito em oito a fim de compararmos qualitativamente e quantitativamente (porcentagem relativa) os compostos de cada cromatograma. Nas figuras 17A e 17B, há a exemplificação de como é essa sobreposição, no qual as diferentes cores identificam as diferentes amostras.

Tabela 4: Compostos da localidade de Ribeirão Preto/SP, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRe), Índice de Retenção encontrado na literatura (Bibliotecas do CG) (IRI).

Classificação	Compostos (biblioteca)	Compostos (IUPAC)	IRe	IRI
Hidrocarboneto	1,4-dimetoxibenzeno	1,4-dimethoxybenzene	1163; 1164; 1165	1168
	n-Tridecano	tridecane	1298; 1299; 1300	1300
	n-Tetradecano	tetradecane	1398; 1399; 1400	1400
	n-Hexadecano	hexadecane	1460; 1461; 1462	1600
	n-Heptadecano	heptadecane	1692; 1699; 1700; 1701	1700
	n-Octadecano	octadecane	1797;1798;1799;1800	1800
	n-Nonadecano	nonadecane	1897; 1899; 1900	1900
Álcool	Álcool fenetílico	2-phenylethanol	1112	1113
	2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil	(2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octan-5-yl)	1210; 1224	1247
Cetona	2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil 4H-4-Piranona	3,5-Dihydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one	1142	1130
	Alfa-Ionona	(E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one	1429; 1430; 1431	1421
	Beta-Ionona	(E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one	1483; 1484; 1485; 1486	1490
	Iso-Leptospermona	2,2,4,4-Tetramethyl-6-(3-methylbutanoyl)cyclohexane-1,3,5-trione	1621; 1622; 1623	1626
Aldeído	Nonanal	nonanal	1103; 1104; 1105	1104
	n-Decanal	decanal	1205; 1206	1208
	n-Dodecanal	dodecanal	1407; 1408; 1409; 1410; 1411	1410
	n-Tetradecanal	tetradecanal	1609; 1610; 1612; 1613; 1614	1614
	Hexadecanal	hexadecanal	1813; 1815; 1818	1800
	4,8,12-Tetradecatrienal, 5,9,13-trimetil-	(4E,8E)-5,9,13-Trimethyl-4,8,12-tetradecatrienal	1833; 1834; 1836; 1841	1855
	Ácido caprílico	octanoic acid	1176; 1177; 1178; 1179;	1173

Ácido Graxo			1181	
	Ácido pelargônico	nonanoic acid	1270; 1271; 1272	1289
	Ácido cáprico	decanoic acid	1366; 1368; 1369; 1373; 1374	1398
Éster	Octanoato de metila	methyl octanoate	1125	1125
	Octanoato de etila	ethyl octanoate	1197; 1198	1202
	Nonanoatode etila	ethyl nonanoate	1295; 1296; 1297	1297
	Tetradecanoato de metila	methyl tetradecanoate	1725; 1726	1727
	Tetradecanoato de etila	ethyl tetradecanoate	1792; 1793; 1794	1794
	1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-metilpropil)	bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate	1865; 1867	1908
	Palmitato de metila	methyl hexadecanoate	1921; 1922; 1923	1925
	Palmitato de etila	ethyl hexadecanoate	1992; 1994; 1995	1993
Terpeno	Monoterpeno			
	Terpenil acetato	2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate	1350; 1351; 1352	1349
	Naftaleno, 1,2,3,4,4a,7-hexahidro-1,6-dimetil-4-(1-metiletil)-	1,6-dimethyl-4-propan-2-yl-1,2,3,4,4a,7-hexahydronaphthalene	1533; 1536; 1537; 1540	1536
	Sesquiterpeno			
	Bicicloelemeno	(1R,4R,5R,6R)-4-ethenyl-4,7,7-trimethyl-5-prop-1-en-2-ylbicyclo[4.1.0]heptane	1338; 1339; 1340	1331
	Beta-Elemeno	(1S,2S,4R)-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(prop-1-en-2-yl)cyclohexane	1390; 1393; 1394; 1396	1390
	Gama-Elemeno	(1S,2S)-1-ethenyl-1-methyl-4-propan-2-ylidene-2-prop-1-en-2-ylcyclohexane	1432; 1433; 1434; 1468	1431
	Ilangeno	(1S,2R,6R,7R,8S)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.0 ^{2,7}]dec-3-ene	1372; 1373; 1374	1371
	Alfa-Copaeno	(1R,2S,6S,7S,8S)-8-Isopropyl-1,3-	1378; 1379	1375

Terpeno		dimethyltricyclo[4.4.0.0 ^{2,7}]dec-3-ene		
	Alfa-Gurjuneno	(1aR,4R,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydrocyclopropa[e]azulene	1412; 1413; 1414	1406
	Cariofileno	(4Z)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	1422; 1423; 1424	1424
	9-epi Cariofileno	(1S,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	1464; 1465; 1466	1464
	Biciclogermacreno	(1R,4E,8E,10S)-4,8,11,11-tetramethylbicyclo[8.1.0]undeca-4,8-diene	1435; 1437; 1439	1497
	Germacreno-D	(1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-ylcyclodeca-1,6-diene	1479; 1480; 1481; 1484	1480
	Aromadendreno	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene	1442; 1443; 1444	1438
	Aloaromadendreno	(4aS,7R,7aR)-1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene	1487; 1488; 1489	1458
	Alfa-Himachaleno	3,5,5-trimethyl-9-methylidene-2,4a,6,7,8,9a-hexahydro-1H-benzo[7]annulene	1453; 1454; 1455	1449
	Alfa-Humuleno	(1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcycloundeca-1,4,8-triene	1454; 1457; 1458; 1459	1454
	Gama-Muroleno	(1S,4aS,8aR)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene	1470	1478
	Alfa-Muroleno	(1S,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-1,2,4a,5,6,8a-hexahydronaphthalene	1503; 1504; 1505	1497
	Alfa-Bulneseno	(3S,3aS,5R)-3,8-dimethyl-5-prop-1-en-2-yl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene	1492; 1493; 1494	1505
	Alfa-Farneseno	(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene	1508; 1509; 1510; 1511; 1512	1504
	Gama-Cadineno		1517; 1518; 1519	1512

Terpeno		(1R,4aS,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene		
	Delta-Cadineno	(1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene	1525; 15226; 1527; 1528	1518
	Nerolidol	3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol	1558; 1564; 1565; 1566	1561
	Espatulenol	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-1a,2,3,4a,5,6,7a,7b-octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol	1575; 1582; 1583; 1584	1576
	Viridiflorol	(1aR,4S,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[el]azulen-4-ol	1588; 1589; 1590	1594
	Guaiol	2-[(3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulen-5-yl]propan-2-ol	1601	1603
	Beta-Eudesmol	2-[(2R,4aR,8aS)-4a-methyl-8-methylidene-1,2,3,4,5,6,7,8a-octahydronaphthalen-2-yl]propan-2-ol	1619; 1620; 1628; 1629; 1630	1656
	Epicubenol	(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-2,3,4,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalen-4a-ol	1625; 1626; 1629; 1634; 1635	1631
	Alfa-Murolol	(1R,4R,4aR,8aS)-1,6-dimethyl-4-propan-2-yl-3,4,4a,7,8,8a-hexahydro-2H-naphthalen-1-ol	1645; 1646; 1647; 1648; 1649	1651
	Bulnesol	2-(3,8-dimethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulen-5-yl)propan-2-ol	1675; 1676	1676
	Nerolidil acetato	[(6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-yl]acetate	1715; 1716	1754
	Diterpeno			
	6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona	6,10,14-trimethylpentadecan-2-one	1839; 1840; 1841	1841
Não identificados	-	-	1438	-
	-	-	1547	-

	-	-	1597	
	-	-	1651	-
	-	-	1658	-
Não identificados	-	-	1661	-
	-	-	1664	-
	-	-	1678	-

Figura 17 A e B: Exemplificação da junção de oito cromatogramas das amostras de Ribeirão Preto/SP, a fim de identificar picos semelhantes.

4.3.1 Hidrocarbonetos

Dentre todos os 71 compostos identificados, 7 (9.9% do total de compostos) são classificados como hidrocarbonetos, 3 tiveram presença majoritária, são eles: n-tetradecano (em 100% das amostras), n-heptadecano (em 100% das amostras) e n-nonadecano (em 97.56% das amostras), porém sem diferença estatística com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (tabela 5). Ao observarmos a porcentagem relativa de cada composto, ou seja, a concentração encontrada do composto na amostra em relação aos demais nota-se que o composto n-heptadecano possui maior concentração (Figura 18).

Tabela 5: Composto classificados como hidrocarboneto, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras em que se encontram	Porcentagem relativa
1,4-dimetoxibenzeno	51.22	1.86
n-Tridecano	75.61	0.92
n-Tetradecano	100	0.83
n-Hexadecano	56.09	1.64
n-Heptadecano	100	5.05
n-Octadecano	43.9	0.27
n-Nonadecano	97.56	4.14
Média ± Desvio Padrão	74.91 ± 24.66	2.10 ± 1.81
Soma Total dos quadrados	524.39	14.70
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.123, H=50.526 com 40 graus de liberdade.		

Figura 18: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como hidrocarbonetos nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

4.3.2 Alcoóis

Apenas 2 compostos (2.8% do total de compostos) foram identificados na classe dos alcoóis, são eles: álcool fenetílico (4.88% das amostras o continham) e 2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil (em 7.31% das amostras), não houve diferença significativa com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra. Já a porcentagem relativa de cada composto, mostra que, apesar de bem baixa a concentração, o segundo ácido foi majoritário com 0.09% (Tabela 6).

Tabela 6: Composto classificados como álcool, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras	Porcentagem relativa
Álcool fenetílico	4.88	0.05
2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil	7.32	0.09
Média ± Desvio Padrão	6.09 ± 1.72	0.07 ± 0.03
Soma Total dos quadrados	12.19	0.132
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.099, H=51.868 com 40 graus de liberdade.		

4.3.3 Cetonas

Quatro compostos (5.63%) do total foram classificados como cetona: 2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil 4H-4-piranona (em 2.44% das amostras), alfa-ionona (em 21.95% das amostras), beta-ionona (em 65.85% das amostras) e iso-leptospermona (em 9.76% das amostras), não havendo diferença estatística com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 7). Já a porcentagem relativa de cada composto, mostra uma diferença, porém não significativa, já que a concentração do composto beta-ionona (3.39%) é maior do que os demais, sendo este majoritário nas amostras, como descrito acima (Figura 19).

Tabela 7: Composto classificados como cetona, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras	Porcentagem relativa
2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil 4H-4-Piranona	2.44	0.004
Alfa-Ionona	21.95	0.16
Beta-Ionona	65.85	3.38
Iso-Leptospermona	9.771	0.028
Média ± Desvio Padrão	25.0 ± 28.40	0.896 ± 1.662
Soma Total dos quadrados	100.0	3.582
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.269, H= 45.057 com 40 graus de liberdade.		

Figura 19: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como cetonas nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

4.3.4 Aldeídos

Dos 71 compostos voláteis, 6 (8.45%) foram identificados com aldeídos. Dentre eles, os que possuem maior presença nas amostras são: n-tetradecanal com 60.98% e o hexadecanal com 70.73%, havendo diferença estatística com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 8). Porém ao observarmos a figura 20, o composto que possui maior concentração é o nonanal com 1.28%.

Tabela 8: Composto classificados como aldeído, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras	Porcentagem relativa
Nonanal	46.34	1.28
n-Decanal	31.70	0.28
n-Dodecanal	48.78	0.25
n-Tetradecanal	60.97	0.36
Hexadecanal	70.73	0.76
4,8,12-Tetradecatrienal, 5,9,13-trimetil-	19.51	0.19
Média ± Desvio Padrão	46.34 ± 18.70	0.52 ± 0.42
Soma Total dos quadrados	278.05	3.125
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= <0.001, H= 114.164 com 40 graus de liberdade.		

Figura 20: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como aldeídos nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

4.3.5 Ácidos Graxos

Os ácidos graxos que foram encontrados nas amostras de Ribeirão Preto/SP (4.23% do total) foram: ácido octanoico, encontrado em 46.34% das amostras, ácido nonanoico, encontrado em 51.22% das amostras e o ácido decanoico, encontrado em 24.40% das amostras, havendo diferença estatística com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 9). Sendo que o que possui maior concentração é o ácido nonanoico com 1.23% (Figura 21).

Tabela 9: Composto classificados como ácido graxo, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras	Porcentagem relativa
Ácido octanoico	46.34	0.712
Ácido Nonanoico	51.22	1.23
Ácido Decanoico	24.39	0.17
Média ± Desvio Padrão	40.65± 14.29	0.70 ± 0.53
Soma Total dos quadrados	121.95	2.11
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.008, H= 64.443 com 40 graus de liberdade.		

Figura 21: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

4.3.6 Ésteres

Dentre os compostos identificados, 8 (11.27% do total) são ésteres, no qual um teve baixa presença nas amostras (octanoato de metila) com 4.88%), com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra não houve diferença significativa (Tabela 10). A porcentagem relativa de cada composto foi bem variada, porém a maior concentração foi a do palmitato de etila, conforme apresentado na figura 22.

Tabela 10: Composto classificados como éster, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras	Porcentagem relativa
Octanoato de metila	4.88	0.02
Octanoato de etila	80.49	6.49
Nonanoato de etila	75.61	2.54
Tetradecanoato de metila	29.27	0.13
Tetradecanoato de etila	85.37	1.46
1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-metilpropil)	56.10	0.74
Palmitato de metila	97.56	5.07
Palmitato de etila	95.12	20.05
Média ± Desvio Padrão	65.55 ± 33.17	4.56± 6.68
Soma Total dos quadrados	524.4	36.49
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.781, H= 32.868 com 40 graus de liberdade.		

Figura 22: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ésteres nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

4.3.7 Terpenos

O tipo de composto químico mais encontrado nas amostras foram os terpenos, pois esse grupo de compostos formam uma diversificada classe de substâncias naturais, ou metabólitos secundários de origem vegetal. Ao observarmos a tabela 11, nota-se que há alguns compostos que estão presentes na maioria das amostras analisadas (delta-cadineno, viridiflorol, terpenil acetato e cariofileno), havendo diferença significativa em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra. Podemos observar o mesmo em relação à porcentagem relativa, no qual os quatro compostos que possuem uma maior concentração são aqueles que estão na maioria das amostras (Figura 23).

Tabela 11: Composto classificados como terpeno, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostra de Ribeirão Preto/SP.

Compostos	Porcentagem de amostras	Porcentagem relativa
Terpenil acetato	97.6	3.087
Naftaleno, 1,2,3,4,4a,7-hexahidro-1,6-dimetil-4-(1-metiletil)-	43.9	0.18
6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona	22.0	0.11
Bicicloelemeno	56.1	0.64
Beta-Elemeno	53.7	1.12
Gama-Elemeno	26.8	0.29
Ilango	58.5	0.53
Alfa-Copaeno	65.9	0.56
Alfa-Gurjuneno	41.5	0.19
Cariofileno	90.2	4.07
9-epi Cariofileno	73.2	0.74
Biciclogermacreno	22.0	0.32
Germacreno D	31.7	0.37
Aromadendreno	43.9	0.66
Aloaromadendreno	12.2	0.09
Alfa-Himachaleno	68.3	0.84
Alfa-Humuleno	68.3	0.82
Gama-Muroleno	7.3	0.03
Alfa-Muroleno	31.7	0.32
Alfa-Bulneseno	31.7	0.12
Alfa-Farneseno	39.0	0.59
Gama-Cadineno	39.0	0.64
Delta-Cadineno	100.0	2.99
Nerolidol	87.8	1.80
Espatuleno	51.2	0.37
Viridiflorol	97.6	4.69
Guaiol	2.4	0.05
Beta-Eudesmol	36.6	0.16
Epicubenol	73.2	1.003
Alfa-Murolol	36.6	0.59
Bulnesol	7.3	0.048
Nerolidil acetato	34.1	0.19
Média ± Desvio Padrão	48.48± 27.58	0.88 ± 1.17
Soma Total dos quadrados	1551.3	28.27
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= <0.001, H= 303.331 com 40 graus de liberdade.		

Figura 23: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas amostras de Ribeirão Preto/SP.

4.4 Análises Químicas: Mossoró/RN

Análises dos cromatogramas das 48 amostras de Mossoró/RN mostraram 92 compostos voláteis, sendo que 82 foram identificados (Tabela 12). Esses compostos foram classificados como: hidrocarbonetos, alcoóis, cetonas, aldeídos, ácidos graxos, ésteres, terpenos e compostos nitrílicos.

Ao observarmos a presença ou ausência de cada composto nas amostras da localidade de Mossoró (Teste Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks), notou-se que não houve diferença estatística entre as amostras, apresentando $H=45.084$ com 49 graus de liberdade ($P = 0.633$).

Após a identificação de uma amostra de cada localidade, os outros cromatogramas foram sobrepostos de oito em oito a fim de compararmos qualitativamente e quantitativamente (porcentagem relativa) os compostos de cada cromatograma.

Tabela 12: Compostos da localidade de Mossoró/RN, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRE), Índice de Retenção encontrado na literatura (Bibliotecas do CG) (IRI).

Classificação	Compostos (biblioteca)	Compostos (IUPAC)	IRE	IRI
Hidrocarboneto	4,6-Dimetildodecano	4,6-dimethyldodecane	1277;1282	1285
	2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-	tridecane	1031	1032
	n-Docosano	docosane	2199	2200
	n-Hexadecano	hexadecane	1600	1600
	n-Heptadecano	heptadecane	1700	1700
	n-Octadecano	octadecane	1800	1800
	n-Nonadecano	nonadecane	1899	1900
	n-Iodonano	1-iodononane	1326;1329	1330
	n-Octano	octane	805	800
	n-Pentacosano	pentacosane	2499	2500
	n-Pentadecano	pentadecane	1500	1500
	n-Tetradecano	tetradecane	1400	1400
	n-Tridecano	tridecane	1300	1300
Álcool	2-metil, 1-Butanol	2-methylbutan-1-ol	725	729
	3-metil, 1-Butanol	3-methylbutan-1-ol	730;731;733	731
	2,3-Butanodiol	butane-2,3-diol	740;741;742;743	743
	Benzenoetanol	benzene;1,2-dimethoxyethane;ethanol	1110	1113
	5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimetil	6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-ol	1447;1449	1446
Cetona	6-metil-5-Hepten-2-ona	6-methylhept-5-en-2-one	981;985	986
	Acetol	1-hydroxypropan-2-one	695;698	698
	(E)-Geranilacetona	(5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one	1444; 1442; 1440	1452
	(Z)-Geranilacetona	(5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one	1425;1428	1428
Aldeído	Dietil acetal, acetaldeído	1,1-diethoxyethane	702;704	705
	n-Decanal	decanal	1201	1204
	n-Dodecanal	dodecanal	1404;1405	1402
	n-Hexanal	hexanal	801	801

	n-Nonanal	nonanal	1100	1104
Ácido Graxo	Ácido acético	Acetic acid	625;628;629	625
	Ácido cáprico	decanoic acid	1369;1370	1372
	Ácido láurico	dodecanoic acid	1564;1569	1570
	Ácido mirístico	tetradecanoic acid	1764;1768;1769	1769
	Ácido palmítico	hexadecanoic acid	1964;1966	1968
	Ácido pelargónico	nonanoic acid	1272	1272
	Ácido pentadecanoico	pentadecanoic acid	1869	1869
	Ácido esteárico	octadecanoic acid	2165;2167	2167
Éster	1,2,3- ácido Propanotricarboxílico, 2-(acetiloxi)-, tributil éster	tributyl 2-acetyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate	2256;2255	2254
	9,12-Octadecanoato de etila	ethyl (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoate	2158;2159	2159
	Acetato de etila	ethyl acetate	588;589;590	586
	Bezoato de metila	methyl benzoate	1189;1191	1192
	Decanoato de etila	ethyl decanoate	1392;1398;1399	1399
	Decanoato de metila	methyl decanoate	1326	1327
	Dodecanoato de etila	ethyl dodecanoate	1598;1599	1598
	Palmitato de metila	methyl hexadecanoate	1923;1924;1925	1925
	Palmitato de etila	ethyl hexadecanoate	1987;1988;1992	1993
	Nonanoato de etila	ethyl nonanoate	1291;1296;1297	1297
	Octanoato de etila	ethyl octanoate		
			1192	1183
	Pentadecanoato de etila	ethyl pentadecanoate	1880	1878
	Pentalactona	5-methyloxolan-2-one		
			956	954
	Ácido ftálico, dibutil éster	bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate	1847;1849	1847
	Ácido Propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-dimetiletil)-2-metil-1,3-propanodil éster	[2,4,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate	1585;1586;1587	1587
	Ácido Tetradecanoico, 1-metiletil éster	propan-2-yl tetradecanoate	1818	1814
Terpeno	Hemiterpeno			
	2,6-dimetil, Pirazina	2,6-dimethylpyrazine	902;905	904
	Monoterpeno			
	(Z)- óxido de Linalol	2-(5-ethenyl-5-methyloxolan-2-yl)propan-2-ol	1068;1069	1069
	Delta-Decalactona	6-pentyloxan-2-one	1483	1481

Terpeno	Eugenol	2-methoxy-4-prop-2-enylphenol	1353;1355;1358	1357
	Metil lavanda	1-hydroxydecan-3-one	1087	1089
	Sulcatol	6-methylhept-5-en-2-ol	991	995
	Sesquiterpeno			
	Aromadendreno	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene	1436;1438;1439	1438
	(E)-Alfa-Bisaboleno	1-methyl-4-[(2E)-6-methylhepta-2,5-dien-2-yl]cyclohexene	1546	1540
	Beta-Bourboneno	1-methyl-5-methylidene-8-(propan-2-yl)tricyclo[5.3.0.0 ^{2,6}]decane	1385;1389	1382
	Delta-Cadineno	(1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene	1515;1519;1521	1518
	Gama-Cadineno	(1R,4aS,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene	1510;1512	1512
	Calareno	(1aR,7R,7aR,7bS)-1,1,7,7a-tetramethyl-2,3,5,6,7,7b-hexahydro-1aH-cyclopropa[a]naphthalene	1433;1434	1434
	Óxido de cariofileno	4,12,12-trimethyl-9-methylidene-5-oxatricyclo[8.2.0.0 ^{4,6}]dodecane	1589	1587
	(E)Cariofileno	(4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	1424; 1425	1424
	Cariofileno-9-epi	(1S,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	1466	1464
	Alfa-Copaeno	(1R,2S,6S,7S,8S)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.0 ^{2,7}]dec-3-ene	1377;1379	1375
	Alfa-Cubebeno	4,10-dimethyl-7-(propan-2-yl)tricyclo[4.4.0.0 ^{1,5}]dec-3-ene	1345;1349	1344
	Beta-Elemeno	(1S,2S,4R)-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(prop-1-en-2-yl)cyclohexane	1395	1390
	Delta-Elemeno	(3R,4R)-4-ethenyl-4-methyl-1-propan-2-yl-3-prop-1-en-2-ylcyclohexene	1335;1339	1335
	Germacreno D	(1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-ylcyclodeca-1,6-diene	1479;1485	1480
	Alfa-Humuleno	(1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcycloundeca-1,4,8-triene	1456;1458	1454

Terpeno	Intermedeol	1,4a-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-decahydronaphthalen-1-ol	1665;1668;1669	1668
	Gama-Muroleno	(1S,4aS,8aR)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene	1480;1481;1482	1478
	Beta-Selineno	(3S,4aR,8aS)-8a-methyl-5-methylidene-3-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,6,7,8-octahydronaphthalene	1491	1492
	Espatulenol	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-1a,2,3,4a,5,6,7a,7b-octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol	1580	1576
	Ilangeno	1S,2R,6R,7R,8S)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.0 ^{2,7}]dec-3-ene	1375	1371
	Diterpeno			
	Epimanol	(3S)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]-3-methylpent-1-en-3-ol	1942;1944	1944
	Rosa-5,15-dieno	2-ethenyl-2,4a,8,8-tetramethyl-3,4,4b,5,6,7,10,10a-octahydro-1H-phenanthrene	1934;1936	1938
	Triterpeno			
	Esqualeno	2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexene	2811;2812	2809
Composto nitrílico	Benzil nitrila	phenylacetoneitrile	1128	1138
	n-nonanonitrila	nonanenitrile	1175	1161
Não identificados	-	-	1045	-
	-	-	1667	-
	-	-	1070	-
	-	-	1288	-
	-	-	1302	-
	-	-	1311	-
	-	-	1459	-
	-	-	1461	-
	-	-	1521	-
	-	-	1535	-

4.4.1 Hidrocarbonetos

Dentre todos os compostos identificados, 13 (14.6% do total de compostos) são classificados como hidrocarbonetos, não houve a presença de majoritários, não ocorrendo diferença estatística entre os mesmos em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 13). A porcentagem relativa indica que o composto n-hexadecano possui maior concentração. (Figura 24).

Tabela 13: Composto classificados como hidrocarbonetos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem das amostras	Porcentagem Relativa
n-Iodonano	33.71	0.66
2-Oxabiciclo[2.2.2]octano, 1,3,3-trimetil-	7.86	9.61
4,6-Dimetildodecano	37.08	0.22
n-Docosano	33.71	0.16
n-Heptadecano	32.58	0.24
n-Hexadecano	51.68	13.43
n-Nonadecano	29.21	1.39
n-Octadecano	51.68	0.47
n-Pentacosano	55.06	0.08
n-Pentadecano	26.97	0.76
n-Tetradecano	47.19	1.22
n-Octano	41.57	7.91
n-Tridecano	51.68	0.17
Média ± Desvio Padrão	38.46±13.29	2.79±4.46
Soma Total dos quadrados	500	36.32
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.999, H=23.655 com 49 graus de liberdade.		

Figura 24: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como hidrocarbonetos nas amostras de Mossoró/RN.

4.4.2 Alcoóis

Do total de compostos identificados, 9 foram classificados como alcoóis, ou seja, 5.61% e comparando as concentrações nas amostras de cada álcool, não houve diferença estatística entre eles em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 14). O álcool benzenotanol é o que possui maior concentração dentre os demais (Figura 25).

Tabela 14: Composto classificados como alcoóis, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem das amostras	Porcentagem Relativa
2-metil, 1-Butanol	44.94	0.24
3-metil, 1-Butanol	44.94	0.09
2,3-Butanodiol	31.461	0.57
Benzenoetanol	43.82	3.09
5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimetil	16.85	0.3
Média ± Desvio Padrão	36.40±12.3237	0.858±1.259
Soma Total dos quadrados	182.02	4.29
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.918, H=35.911, com 49 graus de liberdade.		

Figura 25: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como alcoóis nas amostras de Mossoró/RN.

4.4.3 Cetonas

Quatro compostos do total foram classificados como cetona (4.39%), nos quais o que possuiu menor concentração nas amostras foi 6-metil, 5-hepten-2-ona com 16.85%, em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve diferença significativa (Tabela 15). O composto majoritário, observando a porcentagem relativa, foi o (Z)-geranilacetona (Figura 26).

Tabela 15: Composto classificados como cetonas, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem das amostras	Porcentagem Relativa
(E)-geranilacetona	47.19	0.2
(Z)-geranilacetona	47.19	2.29
6-metil-5-Hepten-2-ona	16.85	1.02
Acetol	56.18	0.18
Média ± Desvio Padrão	41.85±17.19	0.92±0.99
Soma Total dos quadrados	167.41	3.69
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.221, H=50.277, com 49 graus de liberdade.		

Figura 26: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como cetonas nas amostras de Mossoró/RN.

4.4.4 Aldeídos

Cinco compostos foram identificados com aldeídos (5.49%). Dentre eles, os que possuem maior presença nas amostras são: n-decanal e n-nonanal, ambos com 52%, porém não houve diferença estatística em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra. Observando a tabela 16, n-nonanal foi o composto que possuiu maior concentração entre os cinco identificados com aldeídos.

Tabela 16: Composto classificados como aldeídos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Dietil acetal, acetaldeído	3.37	0.24
n-Hexanal	35.95	1.07
n-Decanal	52.81	0.94
n-Dodecanal	46.07	0.31
n-Nonanal	52.92	1.2
Média ± Desvio Padrão	38.22±20.6774	0.75±0.44
Soma Total dos quadrados	191.12	3.76
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.861, H= 38.449, com 49 graus de liberdade.		

4.4.5 Ácidos Graxos

Dos 82 compostos identificados nas amostras de Mossoró/RN, 7.69% foram classificados como ácidos graxos. Comparando a concentração destes compostos nas amostras, o ácido acético foi o que possuiu maior concentração nas amostras, já a análise de presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve diferença estatística (Tabela 17). Sendo que o que possui maior concentração é o ácido acético com 17.5% (Figura 27).

Tabela 17: Composto classificados como ácidos graxos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Ácido acético	94.00	17.55
Ácido cáprico	49.44	2.88
Ácido láurico	34.83	0.61
Ácido mirístico	46.07	7.42
Ácido palmítico	33.71	0.31
Ácido pelargônico	49.44	0.08
Ácido pentadecanoico	56.18	0.19
Ácido esteárico	46.07	0.1
Média± Desvio Padrão	51.22±18.86	3.64±6.16
Soma Total dos quadrados	409.73	29.14
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.531, H= 47.577, com 49 graus de liberdade.		

Figura 27: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas amostras de Mossoró/RN.

4.4.6 Ésteres

Dentre os compostos identificados, 16 foram classificados como ésteres, no qual não houve a presença de majoritários, porém com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra houve diferença significativa (Tabela 18). Já ao observarmos a figura 28, um composto obteve uma maior porcentagem relativa em relação aos demais (palmitato de metila).

Tabela 18: Composto classificados como ésteres, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
1,2,3- ácido Propanotricarboxílico, 2-(acetiloxi)-, tributil éster	4.5	0.13
9,12-Octadecanoato de etila	38.2	0.21
Acetato de etila	56.2	0.18
Bezoato de metila	47.2	0.09
Decanoato de etila	39.3	0.78
Decanoato de metila	40.4	0.23
Dodecanoato de etila	44.9	0.59
Palmitato de metila	50.6	14.07
Palmitato de etila	43.8	5.73
Nonanoato de etila	32.6	0.17
Octanoato de etila	40.4	0.4
Pentadecanoato de etila	38.2	1.22
Pentalactona	50.6	1.66
Ácido ftálico, dibutil éster	42.7	0.15
Ácido Propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-dimetiletil)-2-metil-1,3-propanodil éster	2.2	0.55
Ácido Tetradecanoico, 1-metiletil éster	10.1	0.84
Média ± Desvio Padrão	36.37±16.37	1.69±3.57
Soma Total dos quadrados	581.9	27
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.033, H= 68.788, com 49 graus de liberdade.		

Figura 28: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ésteres nas amostras de Mossoró/RN.

4.4.7 Terpenos

Assim como as amostras de Ribeirão Preto/SP, os compostos classificados como terpenos são a maioria em todas as amostras de Mossoró/RN. Foram identificados 29 compostos (31.9%), mas entre eles não foi detectada diferença significativa em relação à presença/ausência de cada terpeno em cada amostra (Tabela 19). E o terpeno que se destacou entre os demais por conta de sua alta concentração foi o (E)-cariofileno (Figura 29).

Tabela 19: Compostos classificados como terpenos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Aromadendreno	46.1	4
(E)-Alfa-Bisaboleno	36.0	1.11

Beta-Bourboneno	51.7	2.1
Delta-Cadineno	38.2	4.64
Gama-Cadineno	38.2	1.39
Calareno	15.7	1.31
Óxido de Cariofileno	49.4	2.72
(E)- Cariofileno	52.8	14.25
Cariofileno -9-epi	52.8	1.44
Alfa-Copaeno	49.4	2.29
Alfa-Cubebeno	32.6	1.08
Beta-Elemeno	50.6	0.77
Delta-Elemeno	49.4	4.16
Epimanol	37.1	1.36
Eugenol	39.3	1.3
Germacreno D	40.4	4.43
Alfa-Humuleno	46.1	2.99
Intermedeol	28.1	1.77
Metil lavanda	10.1	0.1
Gama-Muroleno	29.2	1.59
2,6-dimetil, Pirazina	39.3	0.47
Rosa-5,15-dieno	51.7	1.07
Beta-Selineno	55.1	2.18
Espatuleno	50.6	3.37
Esqualeno	34.8	5.12
Sulcatol	50.6	0.89
Ilango	56.2	0.76
(Z)- óxido de Linalol	21.3	0.19
Delta-Decalactona	27.0	0.84
Média ± Desvio Padrão	40.68±12.14	2.40 ±2.67
Soma Total dos quadrados	1179.8	69.69
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.828, H= 39.633, com 49 graus de liberdade.		

Figura 29: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas amostras de Mossoró/RN.

4.4.8 Compostos Nitrílicos

Nas amostras de Mossoró/RN foram encontrados 2 compostos cuja estrutura pertence aos compostos nitrílicos. Ambos aparecem em concentrações semelhantes nas amostras, porém apresentaram diferença estatística em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra. Ao compararmos a concentração nas amostras com a porcentagem relativa, o composto que se encontra em menor número de amostras é aquele em que a porcentagem relativa é maior (Tabela 20).

Tabela 20: Composto classificados como nitrílicos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Mossoró/RN.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Benzil nitrila	42.9	5.99
n-Nonanonitrila	45.1	3.15
Média ± Desvio Padrão	44±1.56	4.57±2.008
Soma Total dos quadrados	88	9.14
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= <0.001, H=92.812 , com 49 graus de liberdade.		

4.5 Análises Químicas: Muzambinho/MG

Das 47 amostras de Muzambinho/MG analisadas no cromatógrafo á gás, observou-se 78 compostos voláteis, e destes, 70 foram identificados. Igualmente às localidades já citadas (Ribeirão Preto e Mossoró), os compostos foram classificados como: hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido graxo, éster, terpenoide e composto nitrílico (Tabela 21).

Ao observarmos a presença ou ausência de cada composto nas 47 amostras da localidade de Muzambinho/MG (Teste Kruskal-Wallis ANOVA), notou-se que não houve diferença estatística entre as amostras, apresentando H= 38.461 com 49 graus de liberdade (P = 0.861).

Posteriormente à identificação de uma amostra, os outros cromatogramas foram sobrepostos de oito em oito a fim de compararmos qualitativamente e quantitativamente (porcentagem relativa) os compostos de cada cromatograma.

Tabela 21: Compostos da localidade de Muzambinho/MG, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRe), Índice de Retenção encontrado na literatura (Bibliotecas do CG) (IRI).

Classificação	Compostos (biblioteca)	Compostos (IUPAC)	IRe	IRI
Hidrocarboneto	8-Heptadeceno	(E)-heptadec-8-ene	1676	1676
	n-Docosano	docosane	2199;2200	2200
	Neofitadieno	7,11,15-trimethyl-3-methylidenehexadec-1-ene	1832;1835;1836	1836
	n-Heptadecano	heptadecane	1699	1700
	n-Hexadecano	hexadecane	1600	1600
	n-Nonadecano	nonadecane	1899;1900	1900
	n-Nonano	nonane	899	900
	n-Octadecano	octadecane	1799;1800;1801	1800
	n-Octano	octane	800	800
	n-Pentadecano	pentadecane	1500	1500
	n-Tetracosano	tetracosane	2100;2099	2100
	n-Tetradecano	tetradecane	1400	1400
	n-Tridecano	tridecane	1300	1300
	n-Undecano	undecane	1100	1100
Álcool	1,7-Octadieno-3,6-diol, 2,6-dimetil-	2,6-dimethylocta-1,7-diene-3,6-diol	1268;1270	1271
	2-metil, 1-Butanol	2-methylbutan-1-ol	725;728	729
	3-metil, 1-Butanol	3-methylbutan-1-ol	730;731;733	731
	2,3-Butanodiol	butane-2,3-diol	743	743
	Álcool benzílico	phenylmethanol	1028;1032;1034	1036
	Álcool octadecílico	octadecan-1-ol	2075;2084	2073
	Álcool fenetílico	2-phenylethanol	1107;1110	1113
Cetona	5-Hepten-2-ona, 6-metil-	6-methylhept-5-en-2-one	977;980	986
	Acetoína	3-hydroxybutan-2-one	715	716
	Metil nonil	undecan-2-one	1290;1291	1294
	Neril acetona	(5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one	1430	1428
Aldeído	Benzaldeído	benzaldehyde	951;958	960
	Benzaldeído, 4-metoxi-	4-methoxybenzaldehyde	1247;1253	1257
	Benzenoacetaldeído	2-phenylacetaldehyde	1046	1050

	Isovaleraldeído	3-methylbutanal	642;650	646
	Miristaldeído	tetradecanal	1608	1601
	n-Decanal	decanal	1201	1208
	n-Dodecanal	dodecanal	1404	1402
	n-Hexanal	hexanal	797;801	801
	n-Undecanal	undecanal	1303	1309
Ácido Graxo	Ácido acético	acetic acid	620;624	625
	Ácido cáprico	decanoic acid	1370	1372
	Ácido caprílico	octanoic acid	1171;1174;1175	1173
	Ácido caproico	hexanoic acid	1018;1020;1021	1020
	Ácido isobutírico	2-methylpropanoic acid	1570;1573	1573
	Ácido isovalérico	3-methylbutanoic acid	845;848;851	842
	Ácido láurico	dodecanoic acid	1563;1569	1570
	Ácido Mirístico	tetradecanoic acid	1760	1769
	Ácido palmítico	hexadecanoic acid	1956	1968
	Ácido tetradecanoico	tetradecanoic acid	1769;1770	1770
Éster	Acetato de etila	ethyl acetate	613	613
	Ácido acético, 2-metilpropil éster	2-methylpropyl acetate	765;770	770
	(Z)-Ácido butanoico, 3-hexenil éster	[(Z)-hex-3-enyl] butanoate	1185;1187;1190	1191
	Palmitato de etila	ethyl hexadecanoate	1920;1923	1925
	Palmitato de metila	methyl hexadecanoate	1991	1993
	Acetato de butila	butyl acetate	809;812	812
	1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-metilpropil)	bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate	1847	1847
Terpeno	Hemiterpeno			
	2,6-dimetil, pirazina	2,6-dimethylpyrazine	904	904
	Monoterpeno			
	Óxido de Linanol	2-(5-ethenyl-5-methyloxolan-2-yl)propan-2-ol	1060;1067	1069
	Acetato de isoamila	3-methylbutyl acetate	877	876
	Eugenol	2-methoxy-4-prop-2-enylphenol	1355;1356;1357	1357
	(E)-Beta-Ocimeno	(3E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene	1044	1046
	Terpenil acetato	2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate	1349	1349
	Sesquiterpeno			

	Aromadendreno	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene	1433;1436;1437	1438
	Bulnesol	2-(3,8-dimethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulen-5-yl)propan-2-ol	1676	1676
	Epicubenol	(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-2,3,4,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalen-4a-ol	1629;1630	1631
	Eucaliptol	1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane	1033	1031
	(E)-Beta-Farneseno	(6E)-7,11-dimethyl-3-methylidenedodeca-1,6,10-triene	1452	1452
	Germacreno D	(1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-ylcyclodeca-1,6-diene	1480	1480
	Nerolidol	3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol	1561;1562	1561
	Espatuleno	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-1a,2,3,4a,5,6,7a,7b-octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol	1576;1579	1576
	Ilangeno	1S,2R,6R,7R,8S)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.0 ^{2,7}]dec-3-ene	1371	1371
Composto nitrílico	Benzil nitrila	phenylacetone nitrile	1130;1135	1138
	n-Nonanonitrila	nonanenitrile	1159;1161	1161
Composto organossulfurado	Dimetil disulfide	(methylthio)ethane	740;741	742
Não identificados	-	-	1026	-
	-	-	1238	-
	-	-	1278	-
	-	-	1491	-
	-	-	1534	-
	-	-	1585	-
	-	-	1590	-
	-	-	1624	-

4.5.1 Hidrocarbonetos

Os hidrocarbonetos encontrados nas amostras de Muzambinho/MG representam 19.23% do total de compostos voláteis encontrados. Quatro destes compostos estão presentes em todas as amostras analisadas, são eles: n-tetracosano, n-tetradecano, n-octano e n-undecano. Em relação à presença/ausência de cada hidrocarboneto em cada amostra, não houve diferença estatística. Ao analisarmos a porcentagem relativa, nenhum composto se destacou nesse quesito (Tabela 22).

Tabela 22: Composto classificados como hidrocarbonetos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
8-Heptadeceno	62	2.23
n-Docosano	52	0.61
Neofitadieno	56	0.27
n-Heptadecano	74	0.62
n-Hexadecano	68	0.81
n-Nonadecano	66	0.53
n-Nonano	98	1.11
n-Octadecano	34	0.44
n-Octano	100	2.74
n-Pentadecano	58	2.16
n-Tetracosano	100	0.38
n-Tetradecano	100	0.86
n-Tridecano	70	0.17
n-Undecano	100	0.36
Média ± Desvio Padrão	73.3±21.28	0.977±0.79
Soma Total dos quadrados	1100	14.65
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.971, H=32.003, com 49 graus de liberdade.		

4.5.2 Alcoóis

Sete compostos foram identificados como álcool, representando 8.97% do total de voláteis encontrados em Muzambinho/MG. No que se refere à concentração destes compostos no total de amostras, três destes alcoóis se encontram nas 47 amostras: 2-metil, 1-butanol; 3-metil, 1-butanol; álcool fenetílico. Quanto à presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve diferença significativa (Tabela 23).

Tabela 23: Composto classificados como alcoóis, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
1,7-Octadieno-3,6-diol, 2,6-dimetil-	78	0.55
2-metil, 1-Butanol	100	0.15
3-metil, 1-Butanol	100	0.11
2,3-Butanodiol	88	0.39
Álcool benzílico	82	0.54
Álcool octadecílico	84	1.2
Álcool fenetílico	100	0.27
Média ± Desvio Padrão	90.28±9.55	0.45±0.3701
Soma Total dos quadrados	632	3.21
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.995, H=27.416, com 49 graus de liberdade.		

4.5.3 Cetonas

Do total de compostos voláteis analisados, 4 foram classificados como cetona (5.13%) e a acetoína foi aquela que esteve presente em todas as amostras. Com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve diferença significativa. O composto majoritário, observando a porcentagem relativa, foi o metil nonil (Tabela 24).

Tabela 24: Composto classificados como cetonas, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
5-Hepten-2-ona, 6-metil-	78	0.2
Acetoína	100	0.11
Metil nonil	78	2.25
Neril acetona	52	1.94
Média ± Desvio Padrão	77±19.63	1.12±1.13
Soma Total dos quadrados	308	4.5
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.429, H=50.115, com 49 graus de liberdade.		

4.5.4 Aldeídos

Os aldeídos que foram identificados nas amostras de beebread representam 11.54% do total de compostos analisados. Desses 9 compostos, 2 estiveram presentes em todas as amostras: n-hexanal e n-dodecanal, porém não houve diferença estatística quando observado a presença/ausência de cada composto em cada amostra. Em relação à concentração de cada composto, o majoritário foi o benzenoacetaldeído com 1.35% (Tabela 25).

Tabela 25: Composto classificados como aldeídos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Benzaldeído	72	0.22
Benzaldeído, 4-metoxi-	80	0.31
Benzenoacetaldeído	72	1.35
Isovaleraldeído	24	0.98
Miristaldeído	46	0.58
n-Decanal	42	0.74
n-Dodecanal	100	0.66
n-Hexanal	100	0.87
n-Undecanal	86	0.15

Média ± Desvio Padrão	69.1±26.53	0.65±0.39
Soma Total dos quadrados	622	5.86
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.992, H=28.345, com 49 graus de liberdade.		

4.5.5 Ácidos Graxos

Dez compostos do total foram classificados como ácido graxo, sendo que 70% deles estavam presentes em todas as amostras: ácido acético, ácido cáprico, ácido caproico, ácido isobutírico, ácido láurico, ácido mirístico e ácido tetradecanoico. Ao observarmos a presença/ausência de cada ácido graxo em cada amostra, não houve diferença estatística (Tabela 26). Já o composto que possui maior concentração (porcentagem relativa) foi o ácido cáprico com 7.44% (Figura 30).

Tabela 26: Composto classificados como ácidos graxos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Ácido acético	100	0.92
Ácido cáprico	100	7.44
Ácido caprílico	42	3.33
Ácido caproico	100	4.2
Ácido isobutírico	100	1.05
Ácido isovalérico	60	3.48
Ácido láurico	100	2.08
Ácido Mirístico	100	0.72
Ácido palmítico	70	1.44
Ácido tetradecanoico	100	5.39
Média ± Desvio Padrão	87.2±21.67	3.005±2.206
Soma Total dos quadrados	872	30.05
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.748, H=42.076, com 49 graus de liberdade.		

Figura 30: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas amostras de Muzambinho/MG.

4.5.6 Ésteres

Os ésteres encontrados nas amostras de Muzambinho/MG representam 8.97% do total de compostos voláteis analisados. Dois destes ésteres estão presentes em todas as amostras de beebread: acetato de etila e acetato de butila. Porém teste estatístico mostrou a não significância entre os 7 compostos em relação à presença/ausência de cada um em cada amostra (Tabela 27). No que diz respeito à concentração de compostos (porcentagem relativa), os que tiveram uma maior taxa foram: ácido acético, 2-metilpropil éster (12.33%) e acetato de etila (9.5%) (Figura 31).

Tabela 27: Composto classificados como ésteres, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Ácido acético, 2-metilpropil éster	54	12.33
Acetato de etila	100	9.5
(Z)-Ácido butanoico, 3-hexenil éster	28	3.12
Palmitato de etila	40	2.89
Palmitato de metila	98	0.31
Acetato de butila	100	0.21
1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-metilpropil)	6	2.14
Média ± Desvio Padrão	60.86±38.76	4.36±4.69
Soma Total dos quadrados	426	30.5

Kruskal-Wallis ANOVA

P=1.000, H=17.713, com 49 graus de liberdade.

Figura 31: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como éteres nas amostras de Muzambinho/MG. **4.5.7 Terpenos**

Dezesseis compostos (20.53%) do total de compostos voláteis foram classificados como terpenoides. Confirmando novamente, que esses compostos oriundos de plantas são a maioria dentre os encontrados nas localidades até aqui descritas. Ao observarmos a presença destes nas amostras, a metade (oito compostos) está em mais de 90% das amostras; o único terpeno que se encontra em poucas amostras é o Bulnesol, apenas em 8%. Só que a análise de presença/ausência de cada composto em cada amostra não apresentou diferença estatística (Tabela 28). Já o terpeno com maior concentração (porcentagem relativa) foi o ilangeno, com 9.52% (Figura 32).

Tabela 28: Composto classificados como terpenos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Aromadendreno	98	5.37
Bulnesol	8	0.89
Epicubenol	64	4.15
Eucaliptol	100	2.63
Eugenol	52	1.02
(E)-Beta-Farneseno	80	1.68
Germacreno D	100	1.39
Acetato de isoamil	52	1.67
Óxido de linalol	44	5.12
Nerolidol	100	2.14
(E)-Beta-Ocimenol	66	0.44
2,6-dimetil, pirazina	84	3.38
Espatulenol	96	1.03
Terpenil acetato	92	6.66
Ilangeno	100	9.52
Média ± Desvio Padrão	75.73±27.47	3.14±2.58
Soma Total dos quadrados	1136	47.09
Kruskal-Wallis ANOVA		
P=0.750, H= 42.005, com 49 graus de liberdade.		

Figura 32: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas amostras de Muzambinho/MG.

4.5.8 Compostos Nitrílicos

Igualmente nas amostras de Mossoró/RN, aqui também foram identificados 2 compostos cuja estrutura pertence aos compostos nitrílicos. Ambos aparecem em 100% das amostras de Muzambinho/MG, confirmando assim a não significância entre as taxas de presença/ausência de cada uma em cada amostra. O composto que possui maior concentração é o benzil nitrila (Tabela 29).

Tabela 29: Composto classificados como nitrílicos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Muzambinho/MG.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Benzil nitrila	100	5.99
n-Nonanonitrila	100	3.15
Média ± Desvio Padrão	100±0.0	4.57±2.0082
Soma Total dos quadrados	200	9.14
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 1.000, H=0.000, com 49 graus de liberdade.		

4.5.9 Compostos Organossulfurados

O único composto que foi identificado nas amostras como organossulfurado foi o Dimetil, disulfide que apareceu em 31% das amostras com a concentração de 1.36% (porcentagem relativa).

4.6 Análises Químicas: Porto Alegre/RS

Na cidade de Porto Alegre/RS foram coletadas 46 amostras de beebread. As mesmas passaram pelo cromatógrafo á gás, observou-se 60 compostos voláteis, e destes, 56 foram identificados. Os compostos foram classificados como: hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido graxo, éster, terpenoide composto organossulfurado (Tabela 30).

No que se concerne à presença ou ausência de cada composto nas 46 amostras da localidade de Porto Alegre/RS (Teste Kruskal-Wallis ANOVA), detectou-se diferença estatística, apresentando $H = 69.613$ com 49 graus de liberdade ($P = 0.028$).

Como em todas as localidades estudadas, todos os picos foram distinguidos de uma amostra, os outros cromatogramas foram sobrepostos de oito em oito a fim de obter uma comparação qualitativa/quantitativa (porcentagem relativa) dos compostos de cada cromatograma.

Tabela 30: Compostos da localidade de Porto Alegre/RS, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRE), Índice de Retenção encontrado na literatura (Bibliotecas do CG) (IRI).

Classificação	Compostos (biblioteca)	Compostos (IUPAC)	IRE	IRI
Hidrocarboneto	n-Heneicosano	heneicosane	2099;2101	2100
	n-Heptadecano	heptadecane	1699	1700
	n-Nonadecano	nonadecane	1899;1900	1900
	n-Nonano	nonane	899	900
	n-Octano	octane	800	800
	n-Pentacosano	pentacosane	2498;2499;2500	2500
	n-Tricosano	tricosane	2298	2300
Álcool	1,3- Butanodiol	Butane-1,3-diol	799;800;801	801
	3-metil, 1-Butanol	3-methylbutan-1-ol	733	731
	2,3-Butanodiol	butane-2,3-diol	752;753	743
Cetona	Alfa-Ionona	(E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one	1428;1431	1421
	2-Heptanona	heptan-2-one	895	898
	Acetoína	3-hydroxybutan-2-one	715	716
	Acetil valeril	heptane-2,3-dione	879;882	885
	Metil Heptil cetona	nonan-2-one	1095	1093
	(E)-Geranilacetona	(5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one	1456	1452
Aldeído	n-Decanal	decanal	1208	1208
	n-Hexanal	hexanal	804;806	801
	n-Nonanal	Nonanal	1106	1104
	n-Octanal	octanal	1004;1005;1006	1005
Ácido Graxo	Ácido acético	acetic acid	620;628	625
	Ácido caprílico	octanoic acid	1178;1180	1173
	Ácido palmítico	hexadecanoic acid	1963	1968
	Decanoato de etila	ethyl decanoate	1379	1381
	Palmitato de etila	ethyl hexadecanoate	1920;1923	1925
	Heptanoato de etila	ethyl heptanoate	1994;1996	1993
	Isovalerato de etila	ethyl 3-methylbutanoate	853	850
	Linoleato de etila	ethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate	2168	2169

Éster	Nonoato de etila	ethyl nonanoate	1295;1298	1297
	Octanoato de etila	ethyl octanoate	1199	1202
	2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila	methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate	979;981	983
	Pentanoato de etila	ethyl pentanoate	905	899
	3-metilbutil 2-oxopropanoato	3-methylbutyl 2-oxopropanoate	10;561063	1051
	Tetradecanoato de etila	ethyl tetradecanoate	1795	1794
Terpeno	Monoterpeno			
	Alfa-Pineno	4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene	934	948
	Alfa-Pelandreno	2-methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene	1004	1007
	Alfa-Terpenil acetato	2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate	1352	1349
	Gama-Terpineno	1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene	1060	1058
	Limoneno	1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene	1029;1031;1032	1030
	Para-Cimeno	1-methyl-4-propan-2-ylbenzene	1025	1025
	Safranal	2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde	1202;1203	1201
	Sesquiterpeno			
	(E)-Cariofileno	(1S,4E,9R)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	1423	1424
	(E)-Nerolidol	(6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol	1563;1567	1561
	Alfa-Copaeno	(1R,2S,6S,7S,8S)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene	1377;1379	1375
Terpeno	Alfa-Gurjuneno	(1aR,4R,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydrocyclopropa[e]azulene	1413	1406
	Alfa-Himachaleno	3,5,5-trimethyl-9-methylidene-2,4a,6,7,8,9a-hexahydro-1H-benzo[7]annulene	1453	1449
	Aromadendreno	1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene	1443	1438
	Beta-Elemeno	(1S,2S,4R)-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(prop-1-en-2-yl)cyclohexane	1395	1390
	Beta-Selineno	(3R,4aS,8aR)-8a-methyl-5-methylidene-3-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,6,7,8-octahydronaphthalene	1477	1479
	Cariofileno	(4Z)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	1423	1424
	Delta-Cadineno	(1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene	1518	1528
	Gama-Elemeno	(1S,2S)-1-ethenyl-1-methyl-4-propan-2-ylidene-2-prop-1-en-2-ylcyclohexane	1437	1432

	Germacreno B	(1E,5E)-1,5-dimethyl-8-propan-2-ylidenecyclodeca-1,5-diene	1563	1557
	Germacreno D	(1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-ylcyclodeca-1,6-diene	1486	1480
	Viridiflorol	(1aR,4S,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol	1591;1592	1594
Composto organossulfurado	Dimetil, disulfide	(methyldisulfanyl)methane	744	742
Não Identificados	-	-	945	-
	-	-	1275	-
	-	-	1299	-
	-	-	2474	-

4.6.1 Hidrocarbonetos

Os hidrocarbonetos encontrados e identificados nas amostras de Porto Alegre somaram 11.66% da totalidade de compostos voláteis presentes. Dentre esses 7 compostos, não houve a presença de predominantes. No que se refere à análise de presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve diferença significativa (Tabela 31). Já a figura 31, mostrou que o composto n-nonadecano foi o que esteve em maior concentração comparando-o com os demais (Figura 33).

Tabela 31: Composto classificados como hidrocarbonetos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
n-Heneicosano	66	3.1
n-Heptadecano	38	3.76
n-Nonadecano	64	4.84
n-Nonano	56	0.35
n-Octano	52	0.81
n-Pentacosano	54	0.74
n-Tricosano	42	2.29
Média ± Desvio Padrão	53.14±10.38	2.27±1.72
Soma Total dos quadrados	372	15.89
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.737, H= 42.378, com 49 graus de liberdade.		

Figura 33: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como hidrocarbonetos nas amostras de Porto Alegre/RS.

4.6.2 Alcoóis

Três compostos foram identificados como alcoóis (5% do total). Todos eles estiveram presentes em 100% das amostras de Porto Alegre/RS, assim também não houve diferença estatística em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra. Dentre eles, o que teve menor concentração (porcentagem relativa) foi o 3-metil,1-butanol (Tabela 32).

Tabela 32: Composto classificados como alcoóis, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
1,3-Butanodiol	100	2.73
3-metil, 1-Butanol	100	0.64
2,3-Butanodiol	100	2.09
Média ± Desvio Padrão	100±0.000	1.82±1.07
Soma Total dos quadrados	300	5.46
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 1.000, H= 0.000, com 49 graus de liberdade.		

4.6.3 Cetonas

As cetonas que foram identificadas nas amostras de beebread representam 8.33% do total de compostos analisados. Dois compostos estavam presentes em todas as amostras, são eles: (E)-geranilacetona e acetoína. Porém não houve diferença estatística significativa em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 33). A cetona acetoína também foi aquela com maior concentração (10.8%), comparada com as outras cetonas (Figura 34).

Tabela 33: Composto classificados como cetonas, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
(E)-Geranilacetona	100	0.28
Alfa-Ionona	84	5.76
2-Heptanona	36	0.24
Acetoína	100	10.8
Acetil valeril	58	5.9
Metil Heptil cetona	82	0.33
Média±Desvio Padrão	75.2±27.8783	3.51±4.76
Soma Total dos quadrados	376	17.55
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 1.000, H= 18.286, com 49 graus de liberdade.		

Figura 34: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como alcoóis nas amostras de Porto Alegre/RS.

4.6.4 Aldeídos

Do total de sessenta compostos voláteis analisados, 4 (6.67%) estão na classe dos aldeídos. Três aldeídos estiveram presentes em 100% das amostras: n-decanal, n-nonanal e n-octanal, não apresentando diferença estatística em relação à presença/ausência da cada composto em cada amostra. E o aldeído em maior concentração comparado aos outros foi o n-nonanal (Tabela 34).

Tabela 34: Composto classificados como aldeídos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Composto	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
n-Decanal	100	1.29
n-Hexanal	64	2.9
n-Nonanal	100	3.08
n-Octanal	100	1.16
Média±Desvio Padrão	91±18	2.11±1.02
Soma Total dos quadrados	364	8.43
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.934, H= 34.989, com 49 graus de liberdade.		

4.6.5 Ácidos Graxos

Os ácidos graxos encontrados e identificados nas amostras de Porto Alegre representaram 5% do total de compostos voláteis. Destes, 2 estão presentes em todas as cinquenta amostras (ácido acético e ácido caprílico). Não houve diferença estatística quando foi observada a presença/ausência de cada composto/amostra (Tabela 35). Foi notória a diferença nas concentrações dos três ácidos, quando comparados entre si. O composto que estava em maior concentração foi o ácido acético com 21.52% em relação aos demais (Figura 35).

Tabela 35: Composto classificados como ácidos graxos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Ácido acético	100	21.52
Ácido caprílico	100	1.6
Ácido palmítico	72	0.66
Média±Desvio Padrão	90.67±16.17	7.93±11.78
Soma Total dos quadrados	272	23.78
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.834, H= 39.441, com 49 graus de liberdade.		

Figura 35: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas amostras de Porto Alegre/RS.

4.6.6 Ésteres

A classe de ésteres encontrados nas amostras de Porto Alegre é a segunda maior com 18.33% do total de compostos voláteis, ou seja, 11 ésteres foram identificados. Dentre eles 2 se destacam por estarem presentes nas cinquenta amostras: linoleato de etila e octanoato de etila. Só que ao analisarmos a relação entre presença/ausência de cada composto em cada amostras, não houve diferença significativa (Tabela 36). O éster que se destacou devido a sua concentração foi o 2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila (Figura 36).

Tabela 36: Composto classificados como ésteres, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
Decanoato de etila	82	0.2
Heptanoato de etila	34	0.79
Hexadecanoato de etila	42	3.06
Isovalerato de etila	84	0.31
Linoleato de etila	100	1.09
Nonanoato de etila	64	1.9
Octanoato de etila	100	1.34
2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila	80	6.24
Pentanoato de etila	66	0.44
3-metilbutil 2-oxopropanoato	88	0.45
Tetradecanoato de etila	50	0.28
Média±Desvio Padrão	71.82±22.49	1.46±1.80
Soma Total dos quadrados	790	16.1
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.931, H= 35.195, com 49 graus de liberdade.		

Figura 36: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ésteres nas amostras de Porto Alegre/RS.

4.6.7 Terpenos

Como em todas as demais localidades descritas nesse trabalho, a classe dos terpenos foi a que teve maior ocorrência de compostos, quando comparadas com as outras (hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido graxo, éster, composto nitrílico e composto organossulfurado). Do total de compostos voláteis encontrados, os terpenoides somam mais de 36% (vinte e um compostos). Em meio a esses terpenos, 7 se encontram em 100% das amostras. Apesar de somente 7 compostos apresentarem 100% de presença nas amostras, a análise total de presença/ausência de cada composto em cada amostra não foi significativa (Tabela 37). O terpeno que se destaca no que se diz respeito à concentração dos compostos, é o alfa-terpenil acetato, com 2.24% de porcentagem relativa (Figura 37).

Tabela 37: Composto classificados como terpenos, juntamente com a porcentagem das amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto Alegre/RS.

Compostos	Porcentagem nas amostras	Porcentagem Relativa
(E)-Cariofileno	84	1.92
(E)-Nerolidol	48	0.62
Alfa-Pineno	100	0.65
Alfa-Copaeno	78	0.98
Alfa-Gurjunene	100	0.83
Alfa-Himachaleno	54	0.16
Alfa-Pelandreno	100	1
Alfa-Terpenil acetato	64	2.24
Aromadendreno	82	1.37
Beta-Elemeneno	84	0.51
Beta-Selineno	84	0.53
Cariofileno	72	0.49
Delta-Cadineno	98	0.79
Gama-Elemeneno	100	0.5
Gama-Terpineno	58	0.39
Germacreno B	70	0.57
Germacreno D	100	1.97
Limoneno	100	0.53
Para-Cimeno	42	0.31
Safranál	66	0.72
Viridiflorol	100	1.05

Média±Desvio Padrão	80.36±18.82	1.08±1.18
Soma Total dos quadrados	1768	23.89
Kruskal-Wallis ANOVA		
P= 0.536, H= 47.449, com 49 graus de liberdade.		

Figura 37: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas amostras de Porto Alegre/RS.

4.6.8 Compostos Organossulfurados

Igualmente em Muzambinho, o único composto classificado como organossulfurado é o dimetil, disulfide, aparecendo em 33% das amostras da cidade de Porto Alegre, com 1.01% de concentração quando comparado aos demais compostos voláteis.

4.7. Análise comparativa entre as regiões estudadas e a dieta fermentada

Após toda a parte de identificação por localidade (Ribeirão Preto/SP: RP; Mossoró/RN: MOS; Muzambinho/MG: MUZ; Porto Alegre/RS: POA) e separação dos compostos por grupos químicos (hidrocarboneto: Hidroc; álcool: Alc.; cetona: Cet.; aldeído: Ald.; ácido graxo: Ac.G.; éster: Est.; terpeno: Terp.;

Composto nitrílico: Comp.Nitr.; composto organossulfurado: Comp.Org.), foi feita a comparação desses grupos de compostos entre as amostras de uma localidade e outra, a fim de definir quais compostos estavam mais/menos presentes e em quais amostras que qual cidade (Tabela 38; Figura 38). Vale ressaltar que a diferença entre as amostras de cada localidade se deve ao fato da diversidade de vegetação ao redor do apiário e o clima local.

Tabela 38: Comparação entre as amostras das localidades (Ribeirão Preto/SP: RP; Mossoró/RN: MOS; Muzambinho/MG: MUZ; Porto Alegre/RS: POA) em relação à quantidade (%) de cada classe de compostos identificados (hidrocarboneto: Hidroc; álcool: Alc.; cetona: Cet.; aldeído: Ald.; ácido graxo: Ac.G.; éster: Est.; terpeno: Terp.; Composto nitrílico: Comp.Nitr.; composto organossulfurado: Comp.Org.) e não identificados (Ni).

	Ni	Hidroc	Alc.	Cet.	Ald.	Ac.G.	Est.	Terp.	Comp. Nitr.	Comp. Org.
RP	12.68	9.86	2.82	5.63	8.45	4.23	11.2 7	45.07	0	0
MOS	12.09	14.29	5.49	4.40	5.49	7.69	17.5 8	31.87	2.20	0
MUZ	10.26	19.23	8.97	5.13	11.5 4	12.82	8.97	20.51	2.56	1.28
POA	6.67	11.67	5	8.33	6.67	5	18.3 3	36.67	0	1.67
Média ± Desv.Pad.	11.17 ± 2.71	13.76 ± 4.07	5.57 ± 2.55	5.87 ± 1.71	8.04 ± 2.63	7.43 ± 3.88	14.0 4 ± 4.63	33.53 ± 10.25	1.19 ± 1.38	0.74 ± 0.87
Soma Total dos quadrados	41.7	55.05	22.2 8	23.4 9	32.1 5	29.74	56.1 5	134.1 2	4.76	2.95

Figura 38: Comparação entre as amostras de cada localidade (Ribeirão Preto/SP; Mossoró/RN; Muzambinho/; Porto Alegre/RS) em relação à quantidade (%) de cada classe de compostos identificados (Hidrocarboneto; Álcool; Cetona; Aldeído; Ácido Graxo; Éster; Terpeno; Composto Nitrílico; Composto Organossulfurado) e não identificados (Ni).

No que se refere aos compostos não identificados, houve diferença estatística entre as amostras das quatro localidades, na qual as amostras da cidade de Porto Alegre foram a que possui menos compostos não identificados, apresentando $P=0.002$ (Kruskal-Wallis ANOVA).

Quando comparado os hidrocarbonetos, todas as amostras das quatro localidades possuem quantidades similares desses compostos, não apresentando diferença estatística significativa, $P=0.218$ (Kruskal-Wallis ANOVA). Os hidrocarbonetos n-Heptadecano e n-Nonadecano foram identificados nas quatro localidades. Os compostos exclusivos de cada localidade foram dispostos na tabela 39.

Tabela 39: Hidrocarbonetos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Hidrocarbonetos exclusivos	
Ribeirão Preto/SP	1,4-dimetoxibenzeno
Mossoró/RN	n-Iodonano
	2-Oxabiciclo[2.2.2]octano,1,3,3-trimetil-
	4,6-Dimetildodecano
Muzambinho/MG	8-Heptadeceno
	n-Tetracosano
	Neofitadieno
	n-Undecano
Porto Alegre/RS	n-Heneicosano
	n-Tricosano

Ao observamos os alcoóis presentes nas amostras das quatro localidades, notou-se que a cidade de Muzambinho possui o maior número de compostos classificados como tal (8.97%), apresentando diferença estatística com $P=0.041$ (Kruskal-Wallis ANOVA). Nenhum dos alcoóis esteve presente em 100% das amostras das quatro localidades. Na tabela 40 estão os compostos exclusivos de cada localidade.

Tabela 40: Alcoóis presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Alcoóis exclusivos	
Ribeirão Preto/SP	2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil
Mossoró/RN	Benzenoetanol
	5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimetil
Muzambinho/MG	Álcool benzílico
	1,7-Octadieno-3,6-diol, 2,6-dimetil
	Álcool octadecílico
Porto Alegre/RS	1,3-Butanodiol

A presença de cetonas foi bem similar nas amostras de três das quatro cidades, pois Porto Alegre possuiu um maior número de cetonas em suas amostras (8.33%). Porém não houve diferença estatística significativa, $P=0.452$ (Kruskal-Wallis ANOVA). Nenhuma cetona esteve presente em todas as cidades. E as cetonas exclusivas de cada localidade estão descritas abaixo (Tabela 41).

Tabela 41: Cetonas presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Cetonas exclusivas	
Ribeirão Preto/SP	2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl 4H-Pyran-4-one
	Beta-Ionona
	Iso-Leptospermona
Mossoró/RN	(Z)-geranilacetona
	Acetol
Muzambinho/MG	Nerilacetona
	Metil nonil
Porto Alegre/RS	2-Heptanona
	Acetil valeril
	Metil Heptil cetona

Os compostos classificados com aldeídos estão presentes nas amostras das quatro localidades, porém foi em Muzambinho/MG em que eles apareceram em maior frequência (11.54%). Assim houve diferença estatística entre as

amostras das cidades, apresentando $P=0.039$ (Kruskal-Wallis ANOVA). O único aldeído que esteve presente em todas as amostras das quatro localidades é o n-Decanal. Os compostos exclusivos de cada localidade estão na tabela 42.

Tabela 42: Aldeídos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Aldeídos exclusivos	
Ribeirão Preto/SP	n-Tetradecanal
	4,8,12-Tetradecatrienal, 5,9,13-trimetil-
Mossoró/RN	Acetaldeído, dietil acetal
Muzambinho/MG	Benzaldeído, 4-metoxi-
	n-Undecanal,
	Miristaldeído
	Benzenoacetaldéido
	Isovaleraldeído
Porto Alegre/RS	n-Octanal

A classe química de ácidos graxos está nas amostras das quatro cidades estudadas e novamente a cidade de Muzambinho/MG foi a que mais teve a presença desses compostos em suas amostras (12.8%). Apesar dessa diferença entre as localidades, não houve diferença significativa, $P= 0.198$ (Kruskal-Wallis ANOVA). Das amostras das quatro localidades, somente as de duas tiveram compostos exclusivos: Mossoró/RN e Muzambinho/MG (Tabela 43). Não houve nenhum ácido graxo que esteve presentes em todas as amostras das quatro cidades.

Tabela 43: Ácidos Graxos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Ácidos Graxos exclusivos	
Mossoró/RN	Ácido esteárico
	Ácido Pentadecanoico
Muzambinho/MG	Ácido caproico
	Ácido isobutírico
	Ácido isovalérico
	Ácido Tetradecanoico

Os ésteres são a segunda classe de compostos que mais aparecem nas amostras das quatro localidades. Comparando-os entre elas, notou-se que as amostras da cidade de Porto Alegre foram as que mais possuíram esses compostos em suas amostras, com 18.33%. Porém não houve diferença estatística entre as amostras das localidades, com $P=0.171$ (Kruskal-Wallis ANOVA). Aqui há vários compostos que foram exclusivos das amostras de cada cidade (Tabela 44), porém nenhum esteve presente em todas as localidades.

Tabela 44: Ésteres presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Ésteres exclusivos	
Ribeirão Preto/SP	Octanoato de metila
	Tetradecanoato de metila
	1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-metilpropil)
Mossoró/RN	1,2,3- ácido Propanotricarboxílico, 2-(acetiloxi)-, tributil éster
	9,12-Octadecanoato de etila
	Benzoato de metila
	Decanoato de metila
	Dodecanoato de metila
	Pentalactona
	Ácido Propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-dimetiletil)-2-metil-1,3-propanodil éster
	Ácido Tetradecanoico, 1-metiletil éster
Muzambinho/MG	(Z)-Ácido butanoico, 3-hexenil éster
	Acetato de butila
	Ácido acético, 2-metilpropil éster
Porto Alegre/RS	Heptanoato de etila
	Isovalerato de etila
	Linoleato de etila
	2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila
	3-metilbutil 2-oxopropanoato

A classe de compostos que esteve mais presente nas amostras das quatro localidades foi a dos terpenos. E a cidade que mais teve esses compostos em suas amostras foi a de Ribeirão Preto/SP, com 45.07%. Observando as médias dos terpenos das amostras das localidades, houve diferença estatística entre as mesmas, $P \leq 0.001$ (Kruskal-Wallis ANOVA). Dois terpenos estiveram presentes

em todas as amostras das quatro localidades: aromadendreno e germacreno D. Muitos compostos foram exclusivos de cada cidade (Tabela 45).

Tabela 45: Terpenos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade.

Terpenos exclusivos	
Ribeirão Preto/SP	Aloaromadendreno
	Alfa-Bulneseno
	Alfa-Farneseno
	Alfa-Muuroleno
	Alfa-Murolol
	Beta-Eudesmol
	Bicicloelemeno
	Biciclogermacreno
	Guaiol
	Naftaleno, 1,2,3,4,4a,7-hexahidro-1,6-dimetil-4-(1-metiletil)-
	Nerolidil acetato
	6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona
Mossoró/RN	(E)- Alfa-Bisaboleno
	Beta-Bourboneno
	Delta-Cadineno
	Calareno
	Óxido de Cariofileno
	Alfa-Cubebeno
	Delta-Elemenno
	Epimanol
	Intermedeol
	Metil lavenda
	Rosa-5,15-dieno
	Espatuleno
	Esqualeno
	Sulcatol
	(Z)- Óxido de Linalol
	Delta-Decalactona
Muzambinho/MG	Eucaliptol
	(E)-Beta-Farnesene
	Isoamil acetato
	Óxido de Linanol
	(E)-Beta-Ocimeno
Porto Alegre/RS	(E)-Nerolidol
	Alfa-Pineno
	Alfa-Pelandreno
	Alfa-Terpenil acetato
	Gama-Terpineno
	Germacreno B
	Limoneno
	Para-Cimeno
	Safranal

Os compostos nitrílicos somam uma minoria entre todas as classes de compostos encontrados nas amostras das quatro localidades. Somente em Mossoró/RN (2.2%) e Muzambinho/MG (2.6%) eles estão presentes e em quantidades semelhantes. Em ambas as localidades apareceram os mesmos compostos: benzil nitrila e n-nonanonitrila, não apresentando diferença estatística, $P=0.467$ (Kruskal-Wallis ANOVA).

Há também um composto que apareceu nas amostras de Muzambinho/MG (1.3%) e Porto Alegre/RS (1.7%) que foi classificado como organossulfurado: dimetil, disulfide, não apresentando também diferença significativa, $P=0.42$ (Kruskal-Wallis ANOVA).

No que diz respeito à dieta fermentada, observou que esta possui a menor quantidade de compostos voláteis (vinte e dois no total), quando comparada às amostras das quatro localidades descritas anteriormente. A dieta apresentou alguns compostos exclusivos voláteis (Tabela 46), que não foram encontrados nas quatro cidades. Já os demais compostos voláteis encontrados estavam presentes nas amostras de beebread das quatro localidades.

Tabela 46: Compostos presentes exclusivamente na dieta proteica fermentada.

Compostos exclusivos	
Aldeídos	2-Metilbutanal
	3-Metilbutanal
Ácido Graxo	Ácido propanoico
Ésteres	(Z)-2- hexenil etílico butanoico
	etil 9-decenoato
Terpeno	Carvona

4.8 Análise Polínica

Foi feita a análise polínica das amostras, a fim de identificarmos quais tipos polínicos as abelhas *A. mellifera* coletaram para fazer o beebread que foi analisado nas localidades estudadas: Ribeirão Preto/SP; Mossoró/RN; Muzambinho/MG; Porto Alegre/RS.

As amostras de beebread coletadas em Ribeirão Preto mostraram cinco tipos polínicos: *Eucalyptus* sp (Myrtaceae), *Pyrostegia venusta* (Bignoniaceae), *Eugenia uniflora* (Myrtaceae), tipo Poaceae e tipo Anarcadeacea (Figura 39). Ao observarmos a figura 40, o tipo polínico *Eucalyptus* sp foi o que estava mais abundante nas amostras (47.83%). Quando comparados os tipos polínicos, houve diferença estatística, $P \leq 0.001$ e $H = 37.069$ (Kruskal-Wallis ANOVA).

Figura 39: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Ribeirão Preto/SP. *Eucalyptus* sp (a); *Pyrostegia venusta* (b); tipo Poaceae (c); tipo Anarcadeacea (d); *Eugenia uniflora* (e).

Figura 40: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade de Ribeirão Preto/SP.

Não conseguimos chegar à espécie do gênero *Eucalyptus*, pois as três espécies (*Eucalyttus citriodora*, *Eucalyptus grandis* e *Eucalyptus moluccana*) que circundam o apiário florescem na mesma época do ano, dificultando a identificação da espécie, já que as três possuem o mesmo tipo polínico. Os dois últimos tipos polínicos não foram possíveis chegar ao Gênero e nem a espécie da planta, pois possuem uma diversidade muito grande dessas famílias ao redor do apiário, onde foram coletadas as amostras, já que a espécie *A. mellifera* é generalista, ou seja, coleta pólen/néctar em diversas espécies de plantas.

Ao observarmos os resultados das lâminas com grãos de pólen da cidade de Mossoró/RN, verificamos que os tipos polínicos encontrados estão dentro do esperado em relação à vegetação local (caatinga). Foram encontrados seis tipos polínicos: *Borreria verticillata* (Rubiaceae), *Chamissoa altíssima* (Amaranthaceae), *Mimosa tenuiflora* (Fabaceae), tipo Poaceae, *Richardia grandiflora* (Rubiaceae) e *Spondias tuberosa* (Anacardiaceae) (Figura 41).

Figura 41: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Mossoró/RN. *Chamissoa altíssima* (a); *Borreria versillata* (b); *Mimosa tenuiflora* (c); tipo Poaceae (d); *Spondias tuberosa* (e); *Richardia grandiflora* (f).

As diferenças nos valores médios entre os grupos de tratamento foram maiores do que seria esperado por acaso, portanto houve diferença estatisticamente significativa, $P \leq 0.001$ e $H = 27.702$ (Kruskal-Wallis ANOVA). O tipo polínico com maior abundância foi *Chamissoa altissima*, com 54.4% (Figura 42). O único tipo polínico que não conseguimos chegar a espécie foi o da Família Poaceae, pois essa Família possui uma alta diversidade e a anatomia do pólen é muito semelhante entre as espécies.

Figura 42: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade de Mossoró/RN.

Os grãos de pólen encontrados nas amostras de Muzambinho/MG são de seis tipos polínicos diferentes: *Ceiba speciosa* (Bombacaceae), *Eucalyptus* sp (Myrtaceae), *Mimosa* sp (Fabaceae), tipo Poaceae, tipo Asteraceae, tipo Arecaceae (Figura 43). Na figura 44, podemos observar que o tipo polínico Poaceae e Arecaceae foram os que tiveram em maior abundância nas amostras dessa localidade. O único tipo polínico que conseguimos identificar até a espécie (*Ceiba speciosa*) foi o que teve menor abundância, comparado com os demais tipos. Ao compararmos os tipos polínicos, houve diferença estatística entre eles, $P \leq 0.001$ e $H = 24.285$ (Kruskal-Wallis ANOVA).

Figura 43: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Muzambinho/MG. *Ceiba speciosa* (a); *Mimosa* sp (b); *Eucalyptus* sp (c); tipo Arecaceae (d); tipo Poaceae (e); tipo Asteraceae (f).

Figura 44: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade de Muzambinho/MG.

Nas amostras de Porto Alegre/RS foram identificados sete tipos polínicos: *Eucalyptus* sp (Myrtaceae), *Ceiba speciosa* (Bombacaceae), tipo Anarcadeaceae, *Mimosa* sp (Fabaceae), tipo Myrtaceae, tipo Poaceae e

Brugmansia sp (Solanaceae) (Figura 45). A figura 46 nos mostra que o tipo polínico *Eucalyptus* sp foi o que esteve em maior abundância nas amostras dessa localidade. E ao relacionar todos os sete tipos polínicos, houve diferença estatística, com $P \leq 0.001$ e $H = 52.677$ (Kruskal-Wallis ANOVA).

Figura 45: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Porto Alegre/RS. *Eucalyptus* sp (a); *Ceiba speciosa* (b); tipo Anarcadeaceae (c); tipo Poaceae (d); *Mimosa* sp (e); tipo Myrtaceae (f); *Brugmansia* sp (g).

Igualmente ao ocorrido em Muzambinho/MG, o único tipo polínico que conseguimos identificar até a espécie foi a planta *Ceiba speciosa*, também estando entre as duas que tiveram menor abundância.

Figura 46: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade de Porto Alegre/RS.

Ao observarmos os tipos polínicos identificados nas quatro localidades, houve alguns que estiveram presentes em mais de uma cidade, e outros que foram exclusivos em cada uma (Tabela 47). O tipo polínico que esteve presente em todas as localidades foi o da Família Poaceae, pois essa família possui muitas espécies e tais plantas são cosmopolitas, ou seja, possuem grande poder de adaptação em diferentes climas e ambientes.

Tabela 47: Presença ou ausência dos tipos polínicos em cada localidade estudada.

	Ribeirão Preto/SP	Mossoró/RN	Muzambinho/MG	Porto Alegre/RS
<i>Borreria verticillata</i>				
<i>Brugmansia</i> sp				
<i>Ceiba speciosa</i>				
<i>Chamissoa altissima</i>				
<i>Eucalyptus</i> sp				
<i>Eugenia uniflora</i>				
<i>Mimosa</i> sp				
<i>Mimosa tenuiflora</i>				
<i>Pyrostegia venusta</i>				

Richardia grandiflora

Spondias tuberosa

tipo Anacardiaceae

tipo Arecaceae

tipo Asteraceae

tipo Myrtaceae

tipo Poaceae

==== *Discussão*

5. Discussão

Muitos apicultores utilizam suplementos artificiais para alimentar as abelhas em épocas que o alimento natural proteico (pólen) não está disponível ou se está, em pouca quantidade. Porém, é comum que haja um entrave na hora do consumo dessas rações: a atratividade. Não basta ser nutritiva, se as abelhas não a consumirem. Alguns trabalhos visaram formular dietas fermentadas para que estas se aproximassem do pólen fermentado (beebread) que é consumido dentro da colônia (ELLIS; HAYES, 2009; ALMEIDA, 2013). O teste em túnel Y confirmou que uma dieta fermentada é mais atrativa do que uma que não passou por tal processo, corroborando com Almeida, 2013, na qual o consumo maior foi o da dieta fermentada do que uma dieta não fermentada.

Baseando-se nesse princípio de que a fermentação é um atrativo às abelhas, foram feitas análises da ração proteica fermentada (Tabela 2) em um cromatógrafo a gás acoplado a um espectômetro de massas, a fim de identificarmos os voláteis presentes. Foram encontrados 22 compostos, sendo que 20 foram identificados. Entre estas substâncias, álcool 2,3 butanodiol e ácido acético indicam fortemente a fermentação, pois ambos os compostos são frutos de processos fermentativos (VOLOCH et al., 1985; VASQUEZ; OLOFSSON, 2009).

A fermentação de xilose, bem como de glicose por *Klebsiella oxytoca*, ATCC 8724 (anteriormente conhecida como *Klebsiella pneurnoniae* e *Aerobacter aerogenes*) produz 2,3-butanodiol como o principal produto. Outros micro-organismos capazes de produzir 2,3-butanodiol incluem *Bacillus*, *Aeromonas* e várias espécies de *Serratia* (LEDINGHAM; NEISH, 1954). Gilliam (1979a) descreveu vários *Bacillus* presentes no beebread, sugerindo que esse composto 2,3-butanodiol, encontrado nas amostras de dieta fermentada, pertence ao beebread utilizado para o processo fermentativo da mesma.

Ácidos orgânicos como o ácido fórmico, produzido pelo gênero *Bifidobacterium* (van DER MEULEN et al., 2006) e ácido acético e láctico, peróxido de hidrogênio, diacetil, benzoato, são substâncias antimicrobianas e produzidas pelas bactérias do ácido láctico (LAB), encontrados no estômago da abelha *A. mellifera* (BABENDREIER et al., 2007; VASQUEZ; OLOFSSON,

2009). Nós também encontramos ácido acético como a substância volátil mais comum na dieta fermentada.

A identificação de compostos voláteis do beebread de diferentes localidades do Brasil propicia uma gama de informações sobre a espécie de estudo (*A. mellifera*) onde essas abelhas coletaram o pólen e o tipo coletado. A identificação de compostos voláteis do beebread em diferentes regiões do Brasil é um trabalho pioneiro. Há pouco estudo publicado que visa à análise desses compostos em pólen fermentado (KASKONIENE et al., 2008).

A maioria dos trabalhos sobre voláteis relacionados às abelhas identificam compostos voláteis do mel (PIASENZOTTO et al., 2003; CASTRO-VAZQUEZ et al. 2007; ALIFERIS et al., 2010; SEISONEN et al., 2015; PATTAMAYUTANON et al., 2017), própolis (TORRES et al., 2008; BANKOVA et al., 2014), flores (FLAMINI et al., 2003; CASTRO-VAZQUEZ et al., 2009;), pólen fresco ou desidratado (ALMEIDA-MURADIANA et al., 2005; FLAMINI et al., 2007; DOMÍNGUEZ-VALHONDO et al., 2013).

As informações químicas existentes sobre o beebread estão relacionadas ao extrato desse pólen fermentado, utilizando tanto a técnica de CG/MS (cromatografia a gás/espectrometria de massas) quanto HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência) (NAGAI et al., 2004; BALTRUSAITYTE et al., 2007; ISIDOROV et al., 2009; PARK et al., 2017).

Em todas as amostras de beebread, tanto de Ribeirão Preto/SP, Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS foram encontrados grupos químicos semelhantes. Kaskoniene et al. (2008) encontraram apenas 32 compostos voláteis em suas amostras, sendo que a localidade em que obtivemos um menor número de compostos foi Porto Alegre/RS com 60.

Nas amostras da cidade de Ribeirão Preto/SP não conseguimos detectar os compostos relacionados à fermentação (acetoína; 2,3-butanodiol; ácido acético) devido ao tempo de aquisição do equipamento que foi maior do que o das outras localidades (Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS), pois tais compostos apareceram logo no início da inserção da fibra PDMS no equipamento de cromatografia a gás.

Os compostos classificados como hidrocarbonetos estão presentes em qualquer estrutura, pois servem como esqueleto para as demais funções, ou seja, as cadeias carbônicas dos hidrocarbonetos servem de base para a formação de todas as demais funções orgânicas. Foram encontrados vários hidrocarbonetos que se volatilizaram, Kaskoniene et al. (2008) identificou mais de 15 compostos classificados como tal. Em extratos de beebread também se encontrou hidrocarbonetos, porém em maior constância, cerca de 30 substâncias (ISIDOROV et al., 2009).

Dos alcoóis presentes e identificados nas amostras das quatro localidades, ressaltamos o 2,3-butanodiol que também foi encontrado nas amostras de dieta fermentada. Este composto relacionado à fermentação apareceu em Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS. Segundo Ledingham e Neish (1954), esse composto é produzido por diversas espécies de bactérias, dentre elas as do gênero *Bacillus*, que são encontradas no trato intestinal das abelhas *A. mellifera* (GILLIAM, 1979a), como discutido anteriormente. Kaskoniene et al. (2008) não encontraram tal composto no pólen fermentado.

O grupo das cetonas esteve presente nas quatro localidades, variando em relação à quantidade de compostos e concentração dos mesmos dentro de cada amostra de cada cidade. Kaskoniene et al. (2008) encontraram apenas uma cetona em suas amostras de beebread, 2-heptanona. Encontramos tal composto em Porto Alegre/RS, mostrando que mesmo sendo em países diferentes, alguns compostos são iguais. Isidorov et al. (2009) não identificaram qualquer cetona no extrato de beebread, mesmo usando hexano, metanol e éter como solventes, diferentemente dos resultados por nós obtidos. A cetona denominada popularmente como acetoína, é um composto oriundo de fermentação feita por diferentes espécies de bactérias, inclusive as do gênero *Bacillus* (TIAN et al., 2014; YANG et al., 2017).

Os ésteres encontrados formam o segundo grupo químico com mais compostos identificados. Mossoró/RN foi a cidade em que mais teve a presença de ésteres. Kaskoniene et al. (2008) reportaram apenas um composto classificado

como éster. Já em extratos de beebread, mesmo com vários solventes, foi identificados uma maior quantidade desse grupo químico (ISIDOROV et al., 2009).

Os aldeídos também foram identificados em todas as quatro localidades estudadas, sendo que o local que teve a maior presença desses compostos foi Muzambinho/MG. Kaskoniene et al. (2008) também encontrou aldeídos nos voláteis de beebread, porém eles não foram encontrados em extratos de pólen fermentado, segundo Isidorov et al. (2009).

Dentre os ácidos graxos encontrados nas localidades, podemos destacar o ácido acético, composto proveniente de processos fermentativos bacterianos (BLOM; MØRTVEDT, 1991), que foi encontrado na dieta fermentada e nas amostras de beebread das localidades: Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS. Kaskoniene et al. (2008) também encontrou tal composto em altas concentrações ao ser observado a porcentagem relativa. Em uma análise dos compostos do extrato de beebread (ISIDOROV et al., 2009), foi encontrado apenas o ácido fenilacético, que é um derivado do ácido acético.

O grupo químico dos terpenos foi o mais comum encontrado em todas as localidades estudadas, diferente do encontrado por Kaskoniene et al. (2008), que quase não encontrou terpenos. Isidorov et al. (2009) encontraram números similares de compostos químicos classificados como terpenoides, porém tal trabalho foi realizado em extratos e não compostos voláteis. Os terpenos representam o grupo mais antigo de produtos de pequenas moléculas sintetizado por plantas e provavelmente o grupo mais difundido de produtos naturais (CONNOLLY; HILL, 1991). Mono e sesquiterpenos são os principais componentes dos óleos essenciais, enquanto os outros terpenos são componentes de bálsamos, resinas, ceras e borrachas, e há mais de 1.000 monoterpenos, mais de 7.000 sesquiterpenos e mais de 3.000 diterpenos (BOHLMANN; MEYER-GAUEN; CROTEAU, 1998).

Nas localidades de Mossoró/RN e Muzambinho/MG apareceram apenas dois compostos classificados como nitrílicos (benzil nitrila e n-nonanonitrila). As nitrilas são numerosas e bastante difundidas no ambiente natural. A função

nitrilo (-CN) está presente em mais de 2000 espécies de plantas (LEGRAS et al., 1990). Kaskoniene et al. (2008) também encontram o composto benzil nitrila em suas amostras. Porém Isidorov et al. (2009) não encontraram qualquer composto da classe das nitrilas no extrato de beebread.

Um composto encontrado em Porto Alegre/RS e na dieta fermentada foi classificado como organossulfurado: dimetil,disulfide. Esses compostos são normalmente orgânicos e contém pelo menos uma ligação covalente entre carbono e enxofre. São frequentemente associados com odores marcantes. A natureza é abundante nesses compostos, dado que o enxofre é essencial à vida (CREMLYN, 1996). Kaskoniene et al. (2008) também encontraram dimetil,disulfide, porém Isidorov et al. (2009) não encontram compostos organossulfurados em amostras de extratos de beebread.

Muitos dos compostos voláteis encontrados no beebread foram também encontrados no mel (ALISSANDRAKIS et al., 2007; 2011; MANYI-LOH et al., 2011; SEISONEN et al., 2015; PATTAMAYUTANON et al., 2017). DEL RISCO et al., 2012 sugere que as abelhas adicionam ao pólen fresco mel regurgitado além de secreções glandulares, induzindo fermentação e processos enzimáticos assim, produzindo o beebread.

No Brasil, devido ao sua extensão territorial, há diversos tipos de clima e vegetação. Portanto, as abelhas de um modo geral têm uma gama de opções de coleta de alimento, e especificamente as da espécie *A. mellifera*, sendo generalistas no ponto de vista de coleta de recursos naturais. Investigamos assim em quais espécies vegetais essas abelhas coletaram pólen para a produção do beebread que foi analisado durante esse trabalho.

O clima da cidade de Ribeirão Preto é tropical úmido, caracterizado por um verão chuvoso e inverno seco. Aos arredores do local de coleta (Apiário do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP). Segundo Aleixo et al. (2014) área do entorno do campus, é representada por aproximadamente 289 espécies de plantas distribuídas em 232 gêneros e 73 famílias botânicas. Desse total, 270 espécies são de uso ornamental, e dessas 65% são nativas do Brasil. Os tipos polínicos que foram encontrados nas amostras de

beebread em Ribeirão Preto/SP (*Eucalyptus* sp, *Pyrostegia venusta*, *Eugenia uniflora*, tipo Poaceae e tipo Anarcadeacea) corroboram com os dados obtidos por Silva et al. (2014), no qual caracterizam as 100 espécies de plantas que foram utilizadas pelas abelhas, no quesito de alimentação. Exceto o tipo polínico da espécie *Pyrostegia venusta*, que até então era visto como uma planta melitófila (rica em néctar).

A polinização natural de *P. venusta* é feita pela espécie de beija-flor *Leucochloris albicollis*, embora esta planta seja visitada frequentemente por abelhas e, eventualmente por moscas e vespas. As abelhas *A. mellifera* são um visitante floral bem típico, coletando néctar e pólen, porém não foram vistas polinizando (SAMPAIO; ALMEIDA, 1995). Lorenzi (1982) menciona registros de casos de envenenamento por bovinos, após a ingestão de flores dessa planta, levando a suspeita de sua toxicidade. Porém não há estudos relacionados à toxicidade em abelhas.

A cidade de Mossoró/RN é caracterizado pelo clima semi-árido e cobertura vegetal formada por caatinga. Nas amostras de beebread coletadas nessa localidade, foram encontrados seis tipos polínicos: *Borreria verticillata*, *Chamissoa altissima*, *Mimosa tenuiflora*, tipo Poaceae, *Richardia grandiflora* e *Spondias tuberosa*. Nossos resultados vão ao encontro aos encontrados por Novais, Lima e Santos (2004), no qual também identificaram esses tipos polínicos, pelo menos a mesma família botânica, em um mesmo tipo de vegetação na região nordeste do Brasil. Já Moreti et al. (2000) encontraram mais tipos polínicos, incluindo do gênero *Eucalyptus*, sendo o mais abundante. Em nossos resultados, o tipo polínico mais abundante foi o da espécie *Chamissoa altissima*. Silveira Jr, Saba e Jardim (2012) encontraram espécies de plantas da família Rubiaceae na vegetação caatinga no nordeste brasileiro, igualmente aos dados encontrados.

No que se refere ao município de Muzambinho/MG, com clima tropical de altitude, vários trabalhos foram publicados a fim de identificar os tipos polínicos encontrados no mel, na própolis armazenada e no próprio beebread estocado nos favos no Estado de Minas Gerais (BASTOS et al., 1991; BASTOS,

1995; BASTOS; OLIVEIRA; SOARES, 2000). Os tipos polínicos identificados nas amostras de beebread na cidade de Muzambinho/MG (*Ceiba speciosa*, *Eucalyptus* sp, *Mimosa* sp, tipo Poaceae, tipo Asteraceae, tipo Arecaceae) estão de acordo com a revisão de melissopalínogia do Estado de Minas Gerais feita por Barth (2004). O pólen de *Eucalyptus* sp foi o mais encontrado nas regiões de Barão dos Cocais, Bom Jesus, Caraça, São Gonçalo e Serra da Piedade, diferente do encontrado no nosso estudo, no qual o pólen da família Arecaceae foi o mais abundante e o de *Eucalyptus* sp estando em terceiro lugar.

A última cidade estudada foi Porto Alegre/RS, localizada na região sul do Brasil, possui clima subtropical úmido e atualmente preserva pouco de sua vegetação original. Como ocorre em toda a região metropolitana, os ambientes naturais foram extensamente modificados pelo homem (MACHADO, 2005). É localizada na zona limítrofe entre os biomas da Mata Atlântica e do Pampa, apresentando características de ambos (HASENACK et al., 2008). Os tipos polínicos encontrados nas amostras de Porto Alegre/RS foram: *Eucalyptus* sp, *Ceiba speciosa*, tipo Anarcadeaceae, *Mimosa* sp, tipo Myrtaceae, tipo Poaceae e *Brugmancia* sp, estando de acordo com os identificados por Barth (1989, 1990) e Barth e Coré-Guedes (1999). Radaeski, Bauermann e Pereira (2016) também encontraram diversas espécies de plantas da família Poaceae na região sul do Brasil. Porém outros trabalhos encontraram mais tipos polínicos no estado do Rio Grande do Sul, como espécies da família Loasaceae (WITTMANN; SCHLINDWEIN, 1995), Cactaceae (SCHLINDWEIN, 1995) e Pontederiaceae (SANTOS, 1997).

====*Considerações Finais*

6. Considerações Finais

Durante o desenvolvimento dos testes em túnel Y, verificamos que as abelhas ficaram por mais tempo no braço do túnel em que estava a dieta proteica fermentada, e conforme o passar dos quatro dias de confinamento, sendo submetidas a uma dieta exclusiva de carboidratos, mais rapidamente elas optaram pelo braço com essa dieta. Não houve testes com mais tempo de confinamento (de cinco dias em diante), pois percebemos uma alta taxa de mortalidade após o quarto dia sem que essas abelhas confinadas recebessem algum alimento proteico. Assim, podemos concluir nessa etapa do trabalho que as abelhas *A. mellifera* foram atraídas pelos voláteis exalados pela dieta proteica fermentada, ou seja, utilizando uma ração artificial preparada com uma isca feita do próprio beebread, no qual já possui os microrganismos necessários para a realização do processo fermentativo, a aceitação dessa ração pelas abelhas é mais garantida do que se fosse uma ração altamente nutritiva, porém não fermentada. Desse modo, apicultores poderiam utilizar rações com ingredientes regionais e de baixo custo, porém com o diferencial da fermentação com iscas preparadas com o beebread, para oferecerem às abelhas em épocas de escassez alimentar, mantendo-as nutridas para aguardar o próximo período de floradas, pois como esse processo fermentativo se aproxima do natural, a aceitabilidade poderia ser maior.

No que diz respeito às análises químicas, verificamos que a metodologia utilizada (cromatografia á gás; fibra de PDMS), foi eficaz para a captação dos voláteis presentes tanto na dieta proteica fermentada quanto nas amostras de beebread das quatro localidades estudadas. A temperatura utilizada para o aquecimento de cada amostra em banho-maria foi próxima à que encontramos dentro de uma colmeia. Isso fez com que pudéssemos ter a noção de quais compostos são liberados dentro da colmeia pelo beebread., na metodologia utilizada.

Os compostos indicativos de fermentação, 2,3-butanodiol, ácido acético e acetoína foram encontrados nas amostras tanto da dieta proteica fermentada quanto no beebread das localidades de Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS, apontando assim a presença de processos fermentativos.

Os compostos químicos voláteis encontrados na ração proteica fermentada foram semelhantes aos das amostras de beebread coletadas. Portanto, além de ser mais atrativa às abelhas, essa dieta possui compostos parecidos aos encontrados na natureza, não sendo tão diferente do alimento proteico que esses insetos consomem normalmente, o pólen fermentado.

Com relação às análises químicas das amostras da cidade de Ribeirão Preto/SP, o método utilizado no programa para a aquisição dos compostos voláteis deveria ter sido iniciado em um tempo menor (cerca de 1 minuto) para que o equipamento conseguisse captar os compostos mais voláteis, como o 2,3-butanodiol e o ácido acético. Por essa razão, nas amostras de beebread dessa localidade não houve a presença nos resultados dos compostos que se volatilizam mais rapidamente. Porém encontramos diversos compostos voláteis que foram iguais às demais localidades estudadas, mostrando assim que apesar de não ter sido 100% eficaz a metodologia utilizada para essas amostras, o beebread da cidade de Ribeirão Preto/SP também possui muitos compostos voláteis, mais precisamente 71 compostos, destacando os terpenos, como maioria.

As amostras da cidade de Mossoró/RN apresentaram uma gama de compostos voláteis inesperada, sendo que foi a localidade em que o beebread possui o maior número de constituintes voláteis (92 compostos), visto que a região onde se encontra o apiário em que as amostras foram coletadas se encontra em uma área bastante seca. Contudo, havia pasto apícola para que essas abelhas pudessem coletar pólen e fermentá-lo para o consumo. Vale ressaltar que não foi analisada a qualidade do pólen, em relação ao seu teor proteico, mas sim os componentes químicos voláteis.

Os constituintes voláteis da cidade escolhida de Minas Gerais, Muzambinho, foram bem variados. Dentre os 78 compostos encontrados, a

maioria desses pertencia á classe dos terpenos, o mesmo ocorrendo nas demais localidades. Esse município foi o que ficou em segundo lugar, quando comparamos a quantidade de compostos.

Porto Alegre/RS foi a cidade em que identificamos o menor número de compostos voláteis presentes no beebread (60 compostos). Apesar de possuir pasto apícola para a coleta de pólen, pois durante os meses que antecederam a coleta não houve nenhum tipo de alimentação suplementar artificial, esse pólen fermentado não obteve um número esperado, comparado às demais localidades, de constituintes voláteis. No entanto, os compostos que indicam fermentação estavam presentes.

Dentre os cinco tipos polínicos encontrados nas amostras de Ribeirão Preto/SP, o do gênero *Eucalyptus* sp foi o mais abundante, corroborando com a vegetação existente ao redor do apiário. Porém o terpeno eucalitpol (1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane) não foi detectado nas análises químicas das amostras de beebread. Isso ocorreu devido à concentração de cada composto no cromatograma, ou seja, como havia compostos com uma maior concentração, alguns picos não são identificáveis, devido à baixa concentração quando comparados um com outro.

Já os dados polínicos da localidade de Mossoró/RN nos mostraram seis tipos polínicos encontrados no beebread. Todas as espécies de plantas identificadas através do pólen, exceto a *Chamissoa altissima* que também é encontrada na região sudeste, são características da vegetação caatinga e em relatos de apicultores, essas plantas são muito visitadas pelas abelhas *A. mellifera*. O pólen da planta erva-de-santa-maria (*Chamissoa altissima*) foi o mais abundante, embora não seja tão característico da vegetação lá existente.

No beebread coletado em Muzambinho/MG foram identificados seis tipos polínicos, dentre eles o do gênero *Eucalyptus* sp que também foi encontrado em Ribeirão Preto/SP e em Porto Alegre/RS. O tipo polínico mais abundante foi os da família Asteraceae. Por ser uma família botânica abundante, é justificável ser o mais presente, pois existem diversas espécies dessa família ao redor do apiário.

A localidade que possuiu a maior quantidade de polens identificados foi a de Porto Alegre/RS, com sete diferentes tipos polínicos. Contrariando o resultado encontrado nas análises químicas, já que essa cidade gaúcha foi a que apresentou menos compostos químicos voláteis. Uma hipótese dessa controvérsia seria a de que essas plantas possuem outros atrativos nas pétalas, folhas e néctar, que atraíam mais essas abelhas, do que o cheiro do pólen propriamente dito. Aqui, igualmente à Ribeirão Preto/SP, o tipo polínico mais abundante é o do gênero *Eucalyptus* sp.

Mediante a todos os resultados obtidos através dos testes em túnel Y, análises químicas dos compostos orgânicos voláteis e identificação dos tipos polínicos encontrados no beebread, podemos concluir que não há diferença entre as amostras das localidades, levando em conta esses parâmetros, a grande importância foi a gama de compostos encontrados no beebread e a presença daqueles que indicam a fermentação. Saber qual dentre esses compostos voláteis são atrativos às abelhas será um plano futuro para a liofilização dos mesmos e adicioná-los às rações proteicas artificiais, tornando-as mais palatáveis e atrativas para esses insetos.