UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA FÍSICA

THEREZA CHRISTINA COSTA MEDEIROS

**Padrões de Campo Sujo Seco na paisagem da bacia hidrográfica do
ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas – TO**

(Versão Corrigida)

São Paulo
2013

THEREZA CHRISTINA COSTA MEDEIROS

**Padrões de Campo Sujo Seco na paisagem da bacia hidrográfica do
ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas – TO**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Física, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de doutor em Geografia Física.

Área de Concentração: Geografia Física

Orientador: Prof. Dr. Yuri Tavares Rocha

São Paulo

2013

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catálogo na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

M488p Medeiros, Thereza Christina Costa
Padrões de Campo Sujo Seco na paisagem da bacia
hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande no município
de Palmas - TO / Thereza Christina Costa Medeiros ;
orientador Yuri Tavares Rocha. - São Paulo, 2013.
268 f.

Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Departamento de Geografia. Área de concentração:
Geografia Física.

1. Campo Sujo. 2. Padrões florísticos e
fitogeográficos. 3. Vellozia seubertiana. 4.
Vochysia cinnamomea. 5. Byrsonima subterranea. I.
Rocha, Yuri Tavares, orient. II. Título.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Thereza Christina Costa Medeiros
Padrões de Campo Sujo Seco na paisagem da bacia
hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande no
município de Palmas – TO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Geografia Física, do Departamento de Geografia da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de
doutor em Geografia Física.

Aprovada em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. ___Yuri Tavares Rocha_____

Instituição:___FFLCH - USP_____ Assinatura:_____

Prof. Dr. ___Jose Bueno Conti_____

Instituição:___ FFLCH - USP_____ Assinatura:_____

Prof. Dra. ___Fabiana de Gois Aquino_____

Instituição:___EMBRAPA/Cerrados_____ Assinatura:_____

Prof. Dr. ___José Roberto Rodrigues Pinto_____

Instituição:___Universidade de Brasília_____ Assinatura:_____

Prof. Dr. ___Ana Maria Marques Camargo Marangoni_____

Instituição:___ FFLCH - USP _____ Assinatura:_____

Aos meus pais, *Mário e Tereza*,

e aos meus irmãos,

Emanuella Thereza

Marcelo

Nemésio

Maria Clotilde

e

Mário Júnior,

Dedico.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Dr. *Yuri Tavares Rocha*, mestre e amigo, pela orientação, compreensão e confiança a mim depositada, ao longo da trajetória da realização desta tese.

Ao *Curso de Doutorado em Geografia Física* do Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), pela oportunidade da realização da presente tese.

À *Universidade Federal do Tocantins* (UFT) e ao *Colegiado de Geografia/Porto Nacional*, pelo afastamento concedido para a realização do curso de doutorado.

Ao *Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia* (CNPq), pelo apoio financeiro e concessão da bolsa de estudo.

À *Direção do Campus de Porto Nacional* (UFT), na pessoa da Professora Dra. *Jucéia Aparecida V. Garbelini*, pela valiosa contribuição na disponibilização de transporte no início das atividades de campo.

Ao Prof. Msc. *Rodney Haulien Oliveira Viana* Curador do Herbário HTO, do Núcleo de Estudos Ambientais (NEAMB)/UFT/Porto Nacional, e ao *Wagner* e *Davi* (técnicos do Herbário), pelo uso das instalações, estufa, e apoio no uso de exsicatas no processo de identificação de plantas e no tratamento e encaminhamentos do material botânico para especialistas.

Ao Professor Dr. *Renato de Mello Silva* Curador do Herbário SPF da Universidade de São Paulo pela determinação da espécie *Vellozia seubertiana* Goethart & henrard.

À Dra. *Maria Cândida Henrique Mamede* Curadora do Herbário SP do Instituto de Botânica de São Paulo e ao Prof. Dr. *Tarciso Filgeiras* pelo recebimento de material botânico para determinação.

Ao Professor, Dr. *Everardo Valadares se Sá Barretto Sampaio* da Universidade Federal de Pernambuco por esclarecimentos estatísticos.

Aos Professores Dr. *Fernando de Moraes* e Dr. *Lucas Barbosa* Coordenadores do Laboratório de Análise Geo-Ambiental, do Curso de Geografia (UFT/Proto Nacional) pelo uso de equipamentos.

Aos professores Dr. *Sandro Sidinei Vargas de Cristo* e Dr. *Emerson Figueiredo Leite* Coordenadores do Laboratório de Geoprocessamento, do Curso de Geografia (UFT/Porto Nacional) pelo uso de equipamentos e contribuições com os mapas.

Ao professor MSc. *Maurício Alves da Silva* Coordenador do Laboratório de Cartografia, do Curso de Geografia (UFT/Porto Nacional) pelo uso de equipamentos.

Ao *Laboratório de Biogeografia* do Departamento de Geografia (FFLCH/USP) pelo uso das instalações e equipamentos.

Ao *Setor de Transporte* da UFT/Porto Nacional, e aos motoristas Sr. *José Florentino*, Sr. *Carlos* e Sr. *João*, pela colaboração nos trabalhos de campo.

À *todos* da Secretaria da Pós-Graduação do Departamento de Geografia/FFLCH/USP.

Aos *Proprietários* das Fazendas: BR (área 1), Dom Emanuel (área 2), Brejo do Meio (área 3), do Senhor Maurício (área 4), e Estância Cantilenas (área 5), pela permissão do acesso às suas propriedades para realização do trabalhos de campo e fitossociológico.

Ao *Leandro Alves da Silva* (graduando do Curso de Ciências Biológicas da UFT/Porto Nacional), à *Maria Oneide S. Bofim Caraíba* (ex-aluna do Curso de Geografia Bacharelado da UFT/Porto Nacional) e *Josenir Alves Ferreira de Souza* (aluna do Curso de Geografia Bacharelado da UFT/Porto Nacional) pelas valiosas e imprescindíveis contribuições nas atividades de campo.

À *minha família* presente em todos os momentos da minha vida.

Ao meu irmão *Marcelo* pelas contribuições diagramáticas.

Ao *Ari Fonseca*, pela calorosa acolhida e importante apoio à minha chegada em São Paulo para a realização do Curso.

À amiga *Eliza Segvhenian* e *Família*, pelo companheirismo, contribuições e apoio em São Paulo.

Aos *amigos* que estiveram presentes e me acompanharam nessa trajetória.

À *Deus*, todo poderoso, toda honra e toda glória.

“A natureza é o reino da liberdade e para pintar vivamente as concepções e os prazeres que faz nascer um sentimento profundo da natureza é preciso que o pensamento possa se revestir livremente assim dessas formas e dessa elevação da linguagem, que são dignas da grandeza e da majestade da criação”.

Alexander Von Humboldt

RESUMO

MEDEIROS, T. C. C. **Padrões de Campo Sujo Seco na paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas (TO)**. 2013. 252 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2013.

O presente trabalho visou compreender os padrões florísticos e fitogeográficos de Campo Sujo Seco na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, no município de Palmas (TO). A análise de sua paisagem baseou-se na produção de mapas de vegetação; localização e medição da área de distribuição; caracterização fitossociológica e florística, buscando identificar padrões de Campo Sujo Seco; e, verificação da influência dos solos e do relevo na formação de tais padrões. O trabalho foi realizado em etapas de laboratório e campo. O mapeamento foi feito com base na carta da Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) do Ministério do Exército e IBGE de 1979 e imagens LANDSAT de 2011. Utilizou-se o *software* SPRING 5.1.8 (INPE). A caracterização pedológica foi feita por meio de delineamento em blocos casualizados, com aplicação do teste “T” e análise de variância com comparação das médias pelo teste de Tukey, usando o *software* Bio Estat 5.0. A caracterização da vegetação foi feita pelo método de parcelas e os parâmetros biométricos medidos foram diâmetro a altura do solo e altura de arbustos e árvores. Os parâmetros fitossociológicos analisados foram densidade, frequência, dominância absolutas e relativas e valor de importância específica. Foram calculados índices de similaridade de Sørensen, de diversidade de Shannon-Wiener e de uniformidade de Pielou. A análise de agrupamento entre áreas foi feita pela classificação UPGMA, pelo índice de Jaccard e ordenação por Análise em Componentes Principais, utilizando-se o *software* Fitopac 2, e pelo método Twinspan, com o *software* WinTWIN. A paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande é composta pelos geofácies Mata de Galeria, Mata Ciliar, Mata Seca, Cerradão, Cerrado Sentido Restrito, Babaçual, Vereda, Campo Sujo Seco, Campo Limpo Úmido, Campo Rupestre, Lago, ribeirões, córregos e brejos, Área Urbana e Agropecuária/Silvicultura. O Campo Sujo Seco teve uma área de 7.478,82 ha (16,2% da bacia hidrográfica), localiza-se nos planaltos e chapadas da serra do Lageado e nas planícies secas da depressão do Tocantins. Os solos são do tipo Plintossolos Pétricos e se caracterizaram como bem drenados e com baixo teor de água, ácidos, distróficos, álicos com altos teores de ferro e de textura média. A flora pertence à divisão Magnoliophyta (angiospermas) é, predominantemente, da classe Magnoliopsida, com 39 famílias, 82 gêneros e 121 espécies. A densidade total foi de 2.761,47 indivíduos.ha⁻¹; a dominância de 5,64 m². ha⁻¹; o diâmetro média de 4,61 cm e a altura média de 1,12 m. Existe alta similaridade florística entre topo e encosta (0,79) e alta diversidade alfa (3,533 nats.indivíduo⁻¹). De acordo com a densidade de plantas, há padrões de campos sujos secos densos, típicos e ralos em relevos de topos e encostas. Pelos métodos de agrupamento UPGMA, Coordenadas Principais e Twinspan, há padrões florísticos representados, principalmente, pelas espécies *Vochysia cinnamomea*, *Byrsonima subterranea* e *Vellozia seubertiana*. Os campos de *V. cinnamomea* localizam-se no sul da bacia, os de *B. subterranea* no norte e os de *V. seubertiana* no centro-norte, que constituíram os geótopos do geofácies Campo Sujo Seco. Existem padrões estruturais, florísticos e fitogeográficos diversos de campo sujo seco na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande e as condições ambientais de relevo e edáficas tiveram influência na formação desses padrões.

Palavras-chave: Campo Sujo. Padrões florísticos e fitogeográficos. *Vellozia seubertiana*. *Vochysia cinnamomea*. *Byrsonima subterranean*.

ABSTRACT

MEDEIROS, T. C. C. **Field patterns in the landscape of *Campo Sujo Seco* River watershed Taquaruçu Grande in the municipality of Palmas (TO).** 2013. 252 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2013.

The present work aimed to understand the patterns floristic and phytogeographical countryside of *campo sujo* in River watershed *Taquaruçu Grande*, municipality of Palmas (TO). The analysis of the landscape was based on the production of vegetation maps, location and measurement range; floristic and phytosociological characterization, seeking to identify patterns of *Campo Sujo Seco*; and check the influence of soils and relief in the formation of such patterns. The work was carried out in steps of laboratory and field. The mapping was done based on the letter from the Board of Geographic Service (DSG) of the Brazilian Army (EB) and IBGE 1979 and digital images were used LANDSAT 2011. The software used was the SPRING 5.1.8 (INPE). The pedological characterization was made by means of a randomized block design, with application of the "t" test and analysis of variance for comparison of means by Tukey's test, using the software Bio Stat 5.0. The vegetation characterization was done by the method of plots and biophysical parameters measured were diameter at ground height and height of shrubs and trees. The phytosociological parameters analyzed were density, frequency, dominance of absolute and relative amount of specific importance. Sørensen's similarity indices were calculated, as well as the Shannon-Wiener Diversity Index and the Equitability of Pielou. Cluster analysis between areas was done by UPGMA classification, the Jaccard index and ranking by Principal Component Analysis, using the software Fitopac 2, and the method Twinspan with software WinTWIN. The landscape of the basin of the *Taquaruçu Grande* comprises the geofacies Gallery Forests, Riparian Forests, Dry Forests, *Cerradão*, Cerrado Sensus Stricto, *Babaçual*, *Veredas*, *Campo Sujo Seco*, *Campo Limpo Úmido*, Campo Rupestre, lake, creeks, streams and swamps, Urban area and Agricultural area. The *Campo Sujo Seco* with patches of cerrado sensu stricto had an area of 7.478,82 ha (16,2% of the watershed), located in the highlands and plateaus of the Serra do Lageado and the dry plains of depression Tocantins. Soils are the type Petric Plinthosols and were characterized as well-drained, low water content, acidic, dystrophic, alic with high levels of iron and medium textured. The flora belongs to the division Magnoliophyta (angiosperms) is predominately class Magnoliopsida, with 39 families, 82 genera and 121 species. The total density was 2761.47 individuals.ha⁻¹, the dominance of 5.64 m². ha⁻¹, the mean diameter of 4.61 cm and height of 1.12 m. There is high floristic similarity between top and slope (0.79) and high alpha diversity (3,533 nats.individual⁻¹). According to the density of plants, there are patterns of *Campo Sujo Seco* dense and sparse typical reliefs on the tops and slopes. By cluster UPGMA, Principal Coordinates and Twinspan, there are floristics patterns represented mainly by species *Vochysia cinnamomea*, *Byrsonima subterranea* and *Vellozia seubertiana*. The *V. Cinnamomea* fields located in the southern basin, the *B. subterranean* in the north and those of *V. seubertiana* in north-central, which constituted the geotopes the geofacie Campo Seco Seco. There are structural patterns, floristic and phytogeographical various *Campo Sujo Seco* in River watershed *Taquaruçu Grande* and environmental conditions of relevant and soil influenced the formation of these patterns.

Keywords: Campo sujo. Patterns floristic and phytogeographical. *Vellozia seubertiana*. *Vochysia cinnamomea*. *Byrsonima subterrânea*.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 2.1 - Sub-regiões da região Neotropical: 1, Caribenha; 2, Amazônica, 3, Chaquenha; e 4, Paranaense (a); e as Províncias da sub-região Chaquenha: 1, Caatinga; 2, Cerrado; 3, Chaco; 4, Pampa; e 5, Monte (b). Fonte: Morrone (2001).....	50
Figura 2.2 - Mapa Fitogeográfico do Brasil, elaborado por Karl Friedrich Philipp von Martius, em 1858. Fonte: Henriques (2008).....	52
Figura 2.3 - Floresta Ombrófila Densa. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	62
Figura 2.4 - Floresta Ombrófila Aberta (Faciação da Floresta Ombrófila Densa). Adaptado de Veloso et al. (1991).....	62
Figura 2.5 - Floresta Ombrófila Mista. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	63
Figura 2.6 - Floresta Estacional Semidecidual. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	63
Figura 2.7 - Floresta Estacional Decidual. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	64
Figura 2.8 - Campinarana. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	64
Figura 2.9 - Savana. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	64
Figura 2.10 - Savana Estépica. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	65
Figura 2.11 - Estepe. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	66
Figura 2.12 - Formações Pioneiras. Adaptado de Veloso et al. (1991).....	66
Figura 2.13 - Domínios morfoclimáticos brasileiros. Fonte: Ab' Saber, 2003.....	70
Figura 2.14 - Mapa de biomas brasileiros.....	71
Figura 2.15 - Mapa da ecorregiões do Cerrado. Fonte: Arruda et al. (2008).....	72
Figura 2.16 - Ecorregiões no Cerrado contínuo. Fonte: Pinheiro et al. (2008).....	73
Figura 2.17 - Regiões fitoecológicas do Estado de Tocantins. Fonte: SEPLAN (2012).....	78
Figura 3.1 - Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas e no Estado do Tocantins. (Autores do Mapa: Thereza C. C. Medeiros e Adriano Dias Souza Andrade).....	86

Figura 3.2 – Diagrama climático para a estação meteorológica de Palmas - TO, segundo a metodologia proposta por Walter e Lieth (1967). Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), (Organização: T. C. C. Medeiros).....	88
Figura 3.3 - Vista parcial da Serra do Lageado, município de Palmas (TO) (Fotografia por Y. T. Rocha, 2012).....	91
Figura 3.4 – Demonstração da coleta de solo sob vegetação de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO (Fotografias por: T. C. C. Medeiros, 2012).....	99
Figura 3.5 - Pontos de amostragem fitossociológica e florística do geótopo Campo Sujo da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	103
Figura 3.6 – Desenho esquemático da disposição das parcelas no relevo de topo e de vertente, no Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO.....	104
Figura 3.7 - Demonstração de aspectos da amostragem da caracterização florístico-estrutural com a disposição das parcelas de 100 m ² e sub-parcelas de 1 m ² na posição mediana da vertente (a); sub-parcela de 1 m ² para caracterização do estrato herbáceo-subarbustivo (b); medida de altura (c) e circunferência de base de plantas (d), da vegetação de Campo Sujo Seco, na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - TO. Fotografia de T.C.C. Medeiros em 2011).....	106
Figura 3.8 - Mata Ciliar representada em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 80 m de comprimento por 4 m de largura, nos períodos seco e chuvoso. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	111
Figura 3.9 - Mata de Galeria não inundável representada em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 80 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	112
Figura 3.10 - Mata Seca representada em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 80 m de comprimento por 10 m de largura, em diferentes épocas chuvosa e seca, onde: Ca = cobertura arbórea;, A = Mata Seca Sempre-Verde, B = Mata Seca Semidecídua, C = Mata Seca Decídua com afloramento de rocha. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	113
Figura 3.11 - Cerradão representado em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	113
Figura 3.12 - Cerrado Denso (a), Típico (b) e Ralo (c) representado em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	115
Figura 3.13 – Tipos de Palmeirais (Guerobal, Babaçual e Buritizal) representados em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	116

Figura 3.14 - Veredas representada em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	116
Figura 3.15 - Campo Sujo representado em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	117
Figura 3.16 - Campo Limpo representado em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	118
Figura 3.17 - Campo Rupestre representado pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008).....	118
Figura 4.1 – Unidades da paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO.....	123
Figura 4.2 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da DSG, de 1979.....	128
Figura 4.3 – Figura 4.3 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da Diretoria do Serviço Geográfico, Ministério do Exército e IBGE (1979)	129
Figura 4.4 – Figura 4.4 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da Diretoria do Serviço Geográfico, Ministério do Exército e IBGE (1979) e imagem Landsat 2011.....	130
Figura 4.5 - Mapa Topográfico da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da DSG, de 1979.....	132
Figura 4.6 – Imagem mostrando o relevo com planícies, vales, encostas, cânions, chapadas e planaltos na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO (Organização: T.C.C. Medeiros e S.S.V. de Cristo)	133
Figura 4.7 – Mapa de unidades de paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO.....	135
Figura 4.8 –Mata Ciliar no ribeirão Taquaruçuzinho, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fonte: Projeto Taquaruçu. Disponível em: < www.projetoaquarussu.com.br > Acesso em 08 dez. 2013.....	139
Figura 4.9 – Matas de Galeria do Brejo da Lagoa, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2010.....	141
Figura 4.10 – Matas de Galeria inundável do ribeirão Taquaruçuzinho, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2010.....	141

Figura 4.11 – Mata Seca em vertentes à margem direita do córrego Mutum, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011.....	142
Figura 4.12 - Cerradão em área de chapada entre o vale do ribeirão Taquaruçuzinho e o ribeirão Taquaruçu Grande, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T. C. C. Medeiros, 2011.....	143
Figura 4.13 – Cerrado Sentido Restrito em área de chapada entre o vale do ribeirão Taquaruçuzinho e o ribeirão Taquaruçu Grande, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011.....	144
Figura 4.14 - Cerrado Rupestre, no vale do Vai Quem Quer, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011.....	145
Figura 4.15 - Vereda em área adjacente ao vale de tributário do córrego Mutum, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T. C. C. Medeiros, 2011.....	146
Figura 4.16 – Campo Sujo Seco em área de topo e encostas suavemente onduladas de chapadas, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T. C. C. Medeiros, 2011.....	147
Figuras 4.17 – Fósseis de Crinóides em Campo Sujo Seco em chapada, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T. C. C. Medeiros, 2011.....	148
Figura 4.18 – Campo limpo úmido em área de baixadas suavemente onduladas, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T. C. C. Medeiros, 2013.....	148
Figura 4.19 - Campo Rupestre em vertente íngreme de morro à margem esquerda do Brejo da Lagoa, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011.....	149
Figura 4.20 - Babaçual em área de chapada entre o vale do ribeirão Taquaruçuzinho e o córrego Mutum, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T. C. C. Medeiros, 2011.....	150
Figura 4.21 – Aspecto da área urbana da cidade de Palmas (Palácio dos Girassóis e Assembléia Legislativa), município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013.....	151
Figura 4.22 - Aspecto da área urbana do distrito de Taquaruçu, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013.....	151
Figura 4.23 - Aspecto da área urbana de Palmas (TO), onde se observa fragmentos florestais e savânicos, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: <i>Google Earth</i> , 2013.....	152

Figura 4.24 – Atividades Agropecuárias/Silvicultura como reflorestamento de <i>Eucalyptus</i> sp. (a), e desmatamento (b), na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011/2013.....	153
Figura 4.25 – Atividades Agropecuárias/Silvicultura, com aspectos da agricultura (a) e da pecuária (b), na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia disponível em: < www.portalnorte.com.br >; < www.memorialduke.com.br >. Acesso em 08 dez. 2013.....	153
Figura 4.26 – Lago e ribeirão Taquaruçuzinho, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013	154
Figura 4.27 – Cachoeira da Roncadeira, na borda de chapadão, no Brejo da Lagoa, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: Y. T. Rocha, 2012.....	155
Figura 4.28 – Altitude dos Campos Sujos Secos em relevos de topo e vertente, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	156
Figura 4.29 – Aspectos da paisagem mostrando a variação de altitude de topos em relação a vertentes, em área de Campo Sujo Seco (A4), em planalto com relevo ondulado, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	157
Figura 4.30 – Aspectos do Plintossolo sob vegetação de Campo Sujo Seco em corte vertical de topo (a), em corte vertical em vertente (b), em superfície de topo (c) e em superfície de vertente (d), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	160
Figura 4.31 – Água presente no solo do Campo Sujo Seco nos meses de fevereiro (fev), março (mar), abril (abr), junho (jun) e agosto (ago) de 2013, em áreas de topo e vertente, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	162
Figura 4.32 – Percentuais médios de água presente no solo do Campo Sujo Seco, relativos aos meses de fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2013, em áreas de topo e vertente, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	162
Figura 4.33 – Relações entre teores de M.O. (%) com CTC Total e CTC Efetiva (cmol./dm ³) em solos de Campo Sujo Seco, em 2012, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	170
Figura 4.34 – Síntese da sistemática da comunidade de plantas do campo sujo seco, da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	176
Figura 4.35 – Formas de vida das espécies da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	194

Figura 4.36 – Distribuição do número de espécies, por famílias com ≥ 2 espécies, da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	195
Figura 4.37 – Número de espécies, gêneros e famílias de alguns estudos em áreas de campo sujo do Cerrado brasileiro e do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	196
Figura 4.38 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo, da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	197
Figura 4.39 – Distribuição do número de plantas, por espécie com ≥ 10 indivíduos.ha ⁻¹ , no campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	198
Figura 4.40 – Distribuição das espécies com índice de valor de importância (IVI) acima de 7%, da comunidade de plantas do campo sujo seco (A1E; A1T; A2E; A2T; A3E; A3T; 4E; A4T; A5E; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	203
Figura 4.41 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo, da comunidade de plantas do campo sujo seco (topo), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	204
Figura 4.42 – Distribuição do número de plantas, por espécie com ≥ 10 indivíduos, no campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	205
Figura 4.43 – Distribuição das espécies com índice de valor de importância (IVI) acima de 7%, da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	208
Figura 4.44 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo, da comunidade de plantas do campo sujo seco (encosta), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	209
Figura 4.45 – Distribuição do número de plantas, por espécie com ≥ 10 indivíduos, no campo sujo seco (encosta), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	210
Figura 4.46 – Distribuição das espécies com índice de valor de importância (IVI) acima de 7, da comunidade de plantas do campo sujo seco (A1E; A2E; A3E; A4E; A5E), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	212
Figura 4.47 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato herbáceo-subarbustivo, da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	214

Figura 4.48 – Índice de cobertura do solo das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo do campo sujo seco, por áreas do topo (A1T; A2T; A3T; A4T; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	216
Figura 4.49 – Índice de cobertura do solo das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo do campo sujo seco, por áreas da encosta (A1E; A2E; A3E; A4E; A5E), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	217
Figura 4.50 - Dendograma de similaridade de Jaccard das comunidades de plantas do campo sujo seco, em cinco áreas de relevo de topo (T) e encosta (E), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com ligação dos grupos pela média não ponderada (UPGMA).....	220
Figura 4.51 – Grupo 1 (área 3- topo e encosta), por número de indivíduos das espécies, das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	221
Figura 4.52 – Grupo 1 (área 3 - encosta), com <i>Vochysia cinnamomea</i> , em campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T.C.C. Medeiros (2012).....	221
Figura 4.53 – Grupo 2 (área 1 - topo e encosta), por número de espécies, das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	222
Figura 4.54 – Grupo 2 (área 1- topo), com <i>Vellozia seubertiana</i> , em campo sujo, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T.C.C. Medeiros (2012).....	222
Figura 4.55 – Grupo 3 (área 5 - topo e encosta), por número de espécies, das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	223
Figura 4.56 – Grupo 3 (área 5 - topo), com <i>Byrsonima subterranea</i> , em campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T.C.C. Medeiros (2012).....	223
Figura 4.57 – Grupo 4 (área 2 - topo), por número de plantas das comunidades do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)....	224
Figura 4.58 – Grupo 4 (área 2 - topo), com <i>V. seubertiana</i> , <i>S. comosa</i> e outras espécies, em campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T.C.C. Medeiros (2012).....	224
Figura 4.59 – Grupos 5 (área 4 - topo) por número de plantas da comunidade do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)....	225
	211

Figura 4.60 – Grupos 6 (área 5 - encosta), por número de plantas da comunidades do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)...	
Figura 4.61 – Grupos 5 (A - topo) e Grupo 6 (B - encosta) representados pela área 4, com <i>Vellozia seubertiana</i> , em campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia por T.C.C. Medeiros (2012).....	226
Figura 4.62 – Dendograma da classificação Twinspan (até o 4º nível de divisão) das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	228
Figura 4.63 – Análise de Coordenadas Principais (PCO) das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	235
Figura 4.64 – Densidade de plantas registrada no Campo Sujo Seco, por área de topo (T) e de vertente (V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	237
Figura 4.65 - Correlação entre grau de inclinação da encosta e número de espécie (número de espécies/ha), das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	242
Figura 4.66 - Correlação entre grau de inclinação da encosta e número de indivíduos (número de ind./ha), das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	242
Figura 4.67 - Correlação entre grau de inclinação da encosta e dominância absoluta das espécies (m^2/ha), das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	243
Figura 4.68 - Correlação entre grau de inclinação da encosta e número de espécies herbáceas-subarbustivas, das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	244

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Valores de áreas para tipos de formação vegetal para o Estado do Tocantins segundo fontes diferentes.....	79
Tabela 3.1 - Principais aplicações potenciais das bandas espectrais do Landsat 5 TM. Fonte: SANO (1987).....	90
Tabela 3.2 - Coordenadas das áreas de amostragem no campo sujo da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	95
Tabela 4.1 – Classificação da paisagem com base nos Geópos na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), para o ano de 2011.....	134
Tabela 4.2 – Índices das classes temáticas de diversos mapeamentos da paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - TO.....	138
Tabela 4.3 - Água (% de água/1 kg de solo) presente em solos do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	161
Tabela 4.4 – Teores médios de água (% de água/1 kg de solo) presente em áreas de solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO) ao longo do período de fevereiro a agosto de 2013.....	163
Tabela 4.5 – Propriedades químicas do solo sob vegetação de Campo Sujo Seco, em área de topo (T) e de vertente (V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	164
Tabela 4.6 – Teores médios de Ca (cmol _c /dm ³), para áreas (blocos), em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	165
Tabela 4.7 – Teores médios de Mg (cmol _c /dm ³), para áreas (blocos), em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	166
Tabela 4.8 – Teores médios de H+Al (%), para áreas, em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	169
Tabela 4.9 – Teores médios de Saturação por Bases (V%) para áreas (blocos), em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	172
Tabela 4.10 - Espécies vivas do campo sujo seco (A1E; A1T; A2E; A2T; A3E; A3T; A4E; A4T; A5E; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO) com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsF); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelD) em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI).....	199

Tabela 4.11 - Parâmetros fitossociológicos da comunidade subarbustiva-arbustivo-arbórea do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com informações de densidade, dominância, diâmetro médio e altura média relacionados às parcelas de amostragem de topo e de encosta, com respectivos percentuais totais de plantas vivas e mortas.....	212
Tabela 4.12 – Parâmetros fitossociológicos (densidade, área basal e altura média) para campo sujo de diversas localidades do Cerrado brasileiro e da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	204
Tabela 4.13 - Espécies do campo sujo seco (topo), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com área de ocorrência, densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI).....	206
Tabela 4.14 – Número de famílias, gêneros e espécies, da comunidade de plantas do campo sujo seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	208
Tabela 4.15 – Densidade absoluta (AbsDe), dominância absoluta (AbsDo), diâmetro (média) e altura (média) da comunidade de plantas do campo sujo seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	209
Tabela 4.16 - Espécies do campo sujo seco (encosta), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI).....	211
Tabela 4.17 – Número de famílias, gêneros e espécies, da comunidade de plantas do campo sujo seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	213
Tabela 4.18 – Densidade absoluta (AbsDe), dominância absoluta (AbsDo), diâmetro (médio) e altura (média) da comunidade de plantas do campo sujo seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	213
Tabela 4.19 - Espécies do campo sujo seco (topo e encosta), do estrato herbáceo-subarbustivo, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), em ordem alfabética, com respectivos índices de cobertura do solo.....	2015
Tabela 4.20 – Diversidade de espécies pelo índice de Shannon-Wiener (H') e equitabilidade de Pielou (J'), em relevo de topo (A1T; A2T; A3T; A4T; A5T), e encosta (A1E; A2E; A3E; A4E; A5E), da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	218

Tabela 4.21 - Índices de diversidade de Shannon (H') nats.indivíduo ⁻¹ e equitabilidade de Pielou (J') em diversas fitofisionomias no campo sujo e no campo sujo seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas	204
--	-----

Tabela 4.22 –Parâmetros fitossociológicos e de diversidade florística para o campo sujo seco (topo e encosta), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	239
--	-----

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Sistema de classificação de fitogeografia brasileira de Lima (1966).....	59
Quadro 2.2 - Sistema de classificação de Veloso (1966)	60
Quadro 2.3 - Classificação fitogeográfica do Projeto Radambrasil (BRASIL, 1981).....	60
Quadro 3.1 - Síntese dos procedimentos técnicos e metodológicos da pesquisa.....	120
Quadro 3.1 - Esquematização da análise sintética da paisagem segundo Bertrand (2004).....	109
Quadro 4.1 – Unidades da paisagem e respectivas categorias da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	134
Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica.....	177
Quadro 4.3 - Florística da comunidade de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Liliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica.....	186
Quadro 4.4 – Espécies da comunidade de plantas do campo sujo seco (topo e encosta), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com formas de vida (Fan = Fanerófitas; Hem = Hemicriptófitas; Cam = Caméfitas; Ter = Terófitas; Geo = Geófitas).....	191
Quadro 4.5 – Espécies preferenciais e não preferenciais das divisões estabelecidas pelo método Twinspan, das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	229
Quadro 4.6 – Similaridade florística entre campos sujos de várias localidades do Cerrado e o campo sujo seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	237
Quadro 4.7 - Distribuição de espécies no topo em grupos de predominância baixa, média, alta, e exclusivas, de acordo com a sua respectiva densidade em relevo de topo ou encosta no campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	240
Quadro 4.8 - Distribuição de espécies na encosta em grupos de predominância baixa, média, alta, e exclusivas, de acordo com a sua respectiva densidade em relevo de topo ou encosta no campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	241

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	26
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	30
2.1	Estudo da Paisagem.....	30
2.1.1	Paisagem e Geografia.....	30
2.1.2	Ecologia da Paisagem e a Abordagem Sistêmica na Geografia	39
2.2	Sistemática Fitogeográfica e o Cerrado.....	44
2.2.1	Fitogeografia Mundial e da América Latina.....	44
2.2.2	Fitogeografia Brasileira.....	51
2.2.3	Fitogeografia do Cerrado	73
2.3	Campo Sujo.....	79
3.	MATERIAL E MÉTODOS.....	85
3.1	Área de Estudo.....	85
3.1.1	Clima.....	87
3.1.2	Geologia.....	88
3.1.3	Geomorfologia.....	89
3.1.4	Solos.....	91
3.1.5	Vegetação.....	93
3.2	Procedimentos Metodológicos.....	95
3.2.1	3.2.1. Primeira Etapa: <u>Levantamento, Produção e Processamento de Dados</u>	95
3.2.1.1	Levantamentos bibliográfico, cartográfico e de imagens de sensores orbitais.....	95
3.2.1.2	Levantamento, produção e processamento de dados.....	96
3.2.1.2.1	Etapa de mapeamento.....	96
3.2.1.2.2	Caracterização pedológica.....	99
3.2.1.2.3	Caracterização da vegetação.....	101
3.2.1.2.4	Análise da Paisagem.....	108
3.2.1.2.4.1	Caracterização dos Geofácies.....	110
3.3	Segunda Etapa: <u>Correlações das Informações</u>	119
3.4	Terceira Etapa: <u>Análise e Interpretação das Variáveis que Estruturam a Paisagem</u>	119
3.5	Quarta Etapa: <u>Concepção da Evolução da Paisagem</u>	119

4.	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	121
4.1	Análise sintética da paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO).....	121
4.2	Geofácia Campo Sujo Seco.....	156
4.2.1	Aspectos do Meio Físico.....	156
4.2.1.1	Altitude.....	156
4.2.1.2	Relevo.....	159
4.2.1.3	Solos.....	159
4.2.1.3.1	Umidade.....	161
4.2.1.3.2	Atributos químicos do solo.....	163
4.2.1.3.2.1	pH e acidez potencial.....	163
4.2.1.3.2.2	Macronutrientes	165
4.2.1.3.2.2.1	Cálcio.....	165
4.2.1.3.2.2.2	Magnésio.....	165
4.2.1.3.2.2.3	Fósforo.....	166
4.2.1.3.2.2.4	Potássio	167
4.2.1.3.2.3	Micronutriente Ferro.....	167
4.2.1.3.2.4	Alumínio.....	167
4.2.1.3.2.5	Matéria Orgânica.....	168
4.2.1.3.2.6	Capacidade de Troca Catiônica	168
4.2.1.3.2.7	Saturação por Bases.....	171
4.2.1.3.3	Atributos físicos do solo.....	172
4.2.1.3.4	Caracterização geral dos solos.....	173
4.2.2	Aspectos Fitogeográficos.....	175
4.2.2.1	Sistemática e distribuição geográfica	175
4.2.2.3	Formas de vida vegetal.....	190
4.2.2.3	Florística e fitossociologia.....	195
4.2.2.3.1	Estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo do Campo Sujo Seco.....	197
4.2.2.3.1.1	Estrato subarbustiva-arbustivo-arbórea do Campo Sujo Seco: topo.....	204
4.2.2.3.1.2	Estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo do Campo Sujo Seco: encosta.....	209
4.2.2.3.2	Estrato herbáceo-subarbustivo do Campo Sujo Seco.....	213
4.2.2.3.3	Diversidade e similaridade florística do Campo Sujo Seco.....	218
4.2.2.3.3.1	Índice de Diversidade de Shannon-Wiener.....	218

4.2.2.3.3.2	Análise de Agrupamento	219
4.2.2.3.3.3	Análise de Ordenação.....	235
4.2.2.3.3.4	Análise de variações estruturais.....	236
4.2.2.3.3.5	Similaridade florística com outros campos sujos.....	237
4.2.2.4	Relevo e vegetação.....	238
5.	CONCLUSÕES.....	232
6.	SUGESTÕES DE USOS.....	248
7.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	251

1. INTRODUÇÃO

O Cerrado está localizado na região do Brasil Central e ocupava desde aproximadamente seis mil anos até o presente uma área com cerca de 2.000.000 km² (MACHADO et al., 2004). É considerado um domínio muito antigo, pois edafologicamente os solos do Planalto Central estão entre os mais velhos do mundo e sendo intemperizados desde o Cretáceo, há 100 milhões de anos (GOODLAND, 1971). Segundo Ab' Saber (1971), a vegetação dos cerrados se adaptou e se desenvolveu em algum momento do Quaternário (ou mesmo nos fins do Terciário) e esta estrutura de paisagens, de planaltos interiorizados, dotados de solos lateríticos, é certamente um dos quadros de vegetação mais arcaicos do país.

Levando em consideração o tempo geológico e evolutivo, as dimensões do domínio do Cerrado modificaram-se refletindo as pulsações climáticas em nosso planeta (AB'SABER, 2003). Atualmente, a ampla ocorrência do Cerrado no território central brasileiro, estendendo-se de 5° a 20° de latitude Sul e de 45° a 60° de longitude Oeste (ALHO; MARTINS, 1995), em altitudes variadas, ocupando diferentes bacias hidrográficas (Amazonas, Tocantins, Paraná, Paraguai, São Francisco e Parnaíba) e exibindo grande diversidade de solos e climas, levam a uma diversificada biota (FELFILI et al., 2007). Há um consenso entre os estudiosos que essa biodiversidade constitui padrões fitogeográficos que integram formações florestais, savânicas e campestres (EITEN 1994; RIBEIRO; WALTER, 1998; 2008; WALTER, 2006).

O Cerrado é considerado o representante do bioma das savanas de maior biodiversidade e estudos realizados por Machado et al. (2004), Sano (2007) e MMA/IBAMA (2011) têm demonstrado a redução da sua área, fato que resulta em ameaças à biodiversidade. Tal situação colocou o Cerrado entre as áreas prioritárias para conservação, fazendo parte do *hotspot* de biodiversidade do mundo (MYERS et al., 2002, SILVA; BATES, 2002). Embora seja o segundo maior bioma da América do Sul, o Cerrado possui a menor porcentagem de áreas com proteção integral. Atualmente, apenas 8,21% do Cerrado estão protegidos pelas unidades de conservação, uma das razões que fazem do Cerrado o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ação humana¹. Nestes anos de fragmentação e degradação das formações naturais, foram poupadas apenas as regiões serranas, por serem impróprias para práticas agrícolas. Dentre os territórios desmatados que se destacaram nos mapeamentos

¹ Disponível em:

<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/cerrado.html> .
Acesso em 20 nov. 2013.

realizados por Machado et al. (2004), Sano (2007) e MMA/IBAMA (2011) está o Estado do Tocantins. Porém, a bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas, por abranger a região dos planaltos residuais do Tocantins (serra do Lageado), ainda tem fragmentos preservados de Cerrado nas regiões serranas.

As informações sobre vegetação no Estado do Tocantins têm sido produzidas, principalmente, em macroescala com a delimitação de unidades fitogeográficas e diferentes padrões de riqueza de espécies que apontam para uma diferenciação entre as florestas tocaninenses, podendo-se citar SEPLAN (2012) e Haidar et al. (2013).

Verifica-se que há poucas informações básicas como, por exemplo, a composição florística e a estrutura dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo que compõem as formações savânicas e campestres. Estas informações florísticas e estruturais, assim como dados sobre a riqueza de espécies, refletem não só fatores evolutivos e biogeográficos, como também o histórico de perturbação natural ou antrópica (GENTRY, 1992; HUBBELL; FOSTER, 1986).

No âmbito do Cerrado, ainda são poucos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de compreender melhor a sua estrutura, florística e funcionamento e estes têm se concentrado na região do Distrito Federal e têm focado especialmente duas fitofisionomias, o Cerrado e o Cerrado Sentido Restrito (CASTRO, 1987; CASTRO, 1994; CASTRO et al., 1999; MANTOVANI; MARTINS, 1993; DURIGAM et al., 1994; BATALHA et al., 1997; BATALHA; MANTOVANI, 2001; BRANDO; SAPARETTI, 2003; DURIGAN, 2004; ASSUNÇÃO; FELFILI, 2004; FONSECA; SILVA JÚNIOR, 2004; AMARA et al., 2006; LÍBANO; FELFILI, 2006; MIRANDA et al., 2006; ROSSATO et al., 2008; PINTO et al., 2009).

No Estado do Tocantins, estudos que focalizam o campo sujo, uma das fitofisionomias do Cerrado, são inexistentes. Considerando outros aspectos, a bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, no município de Palmas (TO), algumas pesquisas já foram realizadas:

- Camargo (2005) estudou a aplicação de indicadores perceptivos para análise das paisagens cênicas do trajeto entre o distrito de Taquaruçu, Polo Ecoturístico deste Município;
- Souza (2006) realizou estudos a respeito da dinâmica da paisagem na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, mapeando o uso e a cobertura vegetal para construir os cenários ambientais tendenciais e normativos;
- Guarda (2006) pesquisou a expansão urbana do entorno do lago do reservatório da usina hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, também localizado no município de Palmas, nos anos

de 1990, 1993, 1999, 2002 e 2005, fazendo um acompanhamento por dados de sensoriamento remoto do LANDSAT e CBERS;

- Gama Junior (2008) pesquisou os braquiópodes da Formação Pimenteiras (Devoniano Médio/Superior), na região sudoeste da bacia sedimentar do Parnaíba, no também em Palmas;
- Martins e Martins (2008) estudaram a quantificação e qualificação dos problemas ambientais por atores sociais na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande;
- Milagres (2009) pesquisou a percepção da paisagem por parte da comunidade local do distrito de Taquaruçu, no que se refere às paisagens mais agradáveis e desagradáveis com finalidades turísticas;
- Marques (2011) fez uma avaliação da qualidade da água da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande e da área de sua influência no reservatório da Usina Hidroelétrica Luis Eduardo Magalhães, no médio curso do rio Tocantins.
- Ferreira (2011) em estudo a respeito do planejamento sistemático das unidades de conservação do Estado do Tocantins apontou dentre as áreas de maior diversidade e relevância para a conservação, a porção central do rio Tocantins, que inclui o Parque Estadual do Lageado e a parte da Área de Proteção Ambiental da Serra do Lageado, que está ao sul do referido Parque, dentro da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, é destacada.
- e Martins e Monteiro (2013) investigaram o uso de geotecnologia para análise de fragmentação do cerrado na paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande.

Apesar dos estudos realizados que trabalharam a paisagem na referida bacia hidrográfica, estes trataram enfaticamente das ações antrópicas como fator de redução das áreas de Cerrado pela degradação e ocupação com fins diversos, e não há um foco relacionado à fitogeografia.

A bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas constitui-se uma unidade importante de pesquisa por ser, em área geográfica, a maior bacia do município, sendo responsável por 65% do seu abastecimento público de água e abrigar uns dos últimos remanescentes do Cerrado do Tocantins, além de possuir um papel importante no ecoturismo do Estado.

Tendo em vista tais aspectos, levantaram-se as seguintes hipóteses:

- 1- A bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande apresenta uma diversidade de fitofisionomias do Cerrado.
- 2- Os Campos Sujos Secos localizam-se nos topos nos planaltos.

3- O solo e o relevo são fatores ambientais que influenciam a diversidade dos tipos de Campo Sujo.

4- Existe mais de um tipo de campo sujo.

5- A composição e a diversidade florística, são os fatores de diferenciação entre tipos de campos sujos.

Assim, o presente estudo objetivou analisar a paisagem e o geofácio Campo Sujo Seco, verificar a influência dos solos e do relevo em relação a este geofácio com o intuito de compreender a fitogeografia e os padrões de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, no município de Palmas (TO).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estudo da Paisagem

2.1.1 Paisagem e Geografia

O termo paisagem, nas línguas latinas, é derivado do termo *pagus*, que significa país, traduzindo o sentido de lugar e unidade territorial, do qual derivou várias formas: *paisaje* (castellano), *paysage* (francês), *paesaggio* (italiano). Nas línguas germânica, *landschaft*, inglesa, *landscape* (BOLÓS I CAPDEVILA, 1992) e portuguesa, paisagem, também derivam do latim.

A paisagem corresponde ao material clássico de estudo do geógrafo e é fundamental na Geografia. Qualquer parte da superfície terrestre constitui uma paisagem (DELPOX, 1974). Pelo fato da geografia consistir em localizar fatos, ou apreender as diferenças do espaço terrestre e em comparar conjuntos desvendando seu dinamismo interno e suas relações recíprocas, além de estudar paisagens morfológicas, vegetais, agrárias, urbanas, etc., a geografia está no âmago da ciência da paisagem (ROUGERIE, 1969). Na história da paisagem na geografia, podem ser identificadas quatro principais escolas: Alemã, Russo-Soviética, Anglo-Saxônica e Francesa.

Escola Alemã

Tem como um dos primeiros contribuidores A. Hommeyerem, que introduziu o conceito de paisagem na Geografia, no século XIX, mediante a forma *landschaft*, significando o conjunto de elementos observáveis desde um ponto alto, podendo esta ser classificada como paisagem morfológica, de vegetação, agrária, urbana, cultural, etc. (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). A ciência da paisagem é uma realidade antiga e foi criada a partir dos relatos de viajantes e exploradores cientistas do século XVIII, em especial Alexander Von Humboldt, ao qual é atribuído, no âmbito científico, o emprego do termo paisagem no início do século XIX (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). Humboldt apresentou, de forma coerente, a estrutura da superfície terrestre em suas duas obras consideradas fundamentais: *Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo* e *El Cosmos* (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992; BERNALDEZ, 1981). Nesse sentido, Humboldt é considerado o fundador da Geografia moderna pelo pioneirismo do estudo da natureza sob a ótica geográfica, valorizando os princípios da

causalidade e da comparação, enfatizando a ideia de paisagem por uma concepção holística (CONTI, 1998).

Na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, são estabelecidas a concepção científica e a maior parte das bases teóricas da ciência da paisagem. A ideia de unidade e complexidade da superfície terrestre de interconexão das três esferas: atmosfera, litosfera e hidrosfera, gerando a quarta esfera, a biosfera, lançada por Humboldt, tem continuidade com seus discípulos (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Outra figura de destaque é Siegfried Passarge pelos seus estudos na África, sendo o primeiro autor que dedicou um livro à paisagem, dando origem a uma ciência que no início se considerou um ramo da Geografia e que recebeu o nome de “Geografia da paisagem”. Carl Troll, por sua vez, teve uma importância ligada ao conceito de paisagem vinculada à ecologia; foi quem definiu “ecotopo” como a extensão do conceito de “biótopo”, desenhando, dessa maneira, o futuro conceito de geossistema (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). A expressão paisagem ecológica ou ecologia da paisagem foi introduzida por ele (ODUM; BARRET, 2011), no fim da década de 1930, quando observou que todos os métodos de ciência natural estão aprisionados na área da ciência da paisagem, definindo a ecologia da paisagem de acordo com o conceito de ecossistema de Tansley, em 1935: “A ecologia da paisagem é o estudo do complexo inteiro da rede de causa-efeito entre as comunidades vivas e suas condições ambientais que predominam em um setor da paisagem” (ODUM; BARRET, 2011, p. 375). Posteriormente, a ecologia da paisagem foi denominada “Geoecologia” por Carl Troll (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Segundo Boesch e Carol (1956), os geógrafos alemães utilizavam a palavra *Landschaft* ou paisagem para designar o objetivo da geografia. Para esses autores, Hettner, geógrafo alemão utilizou o termo paisagem na concepção de “partes do mundo, países, paisagens e localidades” para uma unidade de caráter específico. Na década de 1950, a maioria dos geógrafos alemães entendia como paisagem as áreas homogêneas definidas, mormente regiões naturais (BOESCH; CAROL, 1968).

Na década de 1920, foram lançadas as bases da Teoria Geral de Sistemas pelo biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy e o conceito de “sistemas” invadiu todos os campos da ciência e, desde então, tem penetrado no pensamento e na fala populares e nos meios de comunicação de massas (BERTALANFFY, 2003). Portanto, na Alemanha surgiram as primeiras ideias a cerca da paisagem do ponto de vista científico, a partir do século XIX e início do século XX.

Na escola alemã, seguindo a linha da globalidade da paisagem, também se destacou J. Schmithüsen, orientando seu trabalho para os aspectos dinâmicos da paisagem. Ele se propôs a distinguir entre os conceitos de paisagem (*Landschaft*) e região (*Länder*), argumentando que na paisagem interessa definir as relações causais, ou seja, aquilo que se acha sujeito a normas e a leis gerais, enquanto que o conceito de região, embora utilize métodos e resultados iguais ou parecidos aos da linha da paisagem, não interessam as leis gerais como objetivo específico, mas se baseia no particular e único de cada uma delas (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Outro alemão de destaque foi O. Schluter, que definiu a visão fisionômica da paisagem como a primeira aproximação junto à realidade estudada. A partir da ciência ecológica, o conceito de sistema ficou plenamente incorporado aos estudos da paisagem, passando também a inserir o papel da sociedade humana. Nessa nova abordagem dos estudos da paisagem, as figuras de destaque na Alemanha passaram a ser E. Neef e G. Haase (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Na primeira metade do século XX, também aparecem as contribuições das escolas de paisagem russo-soviética e anglo-saxônica. Nas décadas de 1930 e 1940, a humanidade começa a ter clareza de que também é parte integrante do complexo conjunto “Natureza” e como consequência se popularizou a problemática de conservação da paisagem (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). Para compreensão desse fato, no âmbito da Geografia, faz-se necessário buscar acontecimentos históricos de maior destaque de forma a mostrar a evolução do pensamento geográfico em relação à paisagem, que teve seus fundamentos lançados pela escola alemã, principalmente na figura de Humboldt e seus discípulos, mas também uma grande participação da escola russo-soviética.

Escola Russo-Soviética

Nesta escola, a ciência da paisagem tem início no final do século XIX com o nome de Geografia física complexa e tem suas origens conectadas com as concepções da escola alemã (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). A primeira metade do século XX marca uma grande ruptura na visão da paisagem pelos geógrafos e naturalistas russos. A geografia russa desenvolveu-se pela necessidade de colonização dos vastos espaços próximos (Ural, Cáucaso, Sibéria) durante o século XIX. Nesta época, a geografia estava junto às práticas de explorações militares, experiências de viagens e descrições estatísticas, firmando-se como disciplina universitária. Fruto da investigação de meios eficazes de gestão do seu imenso espaço e a criação rápida de mapas do vasto território, a geografia russa, assim como na Alemanha, tenta substituir o estudo das relações funcionais pelos dados fisionômicos (ROUGERIE, 1991 apud

FROVOLA, 2007, p. 160)¹. Os cientistas russos, com base na investigação geográfica proposta por Humboldt, continuam a refletir sobre a paisagem como objeto específico do estudo geográfico que tem um caráter abrangente na relação universal entre os diversos componentes do meio e a sua subordinação no espaço (FRÓVOLA, 2007).

No século XIX, são estabelecidas as bases da nova ciência geográfica que, no século XX, passou a ser chamada pelos cientistas russos de *Landschaftovedinie* ou ciência da paisagem. Entretanto, no início do século XX, a paisagem dos geógrafos russos se distancia da representação sensível da paisagem e passa a ser, sobretudo, influenciada pela doutrina marxista que domina a Rússia a partir de 1917. Com isso, passa a haver uma contradição no âmago da noção de paisagem, que vai provocar discussões contínuas entre os geógrafos a respeito da morfologia, da sua estrutura e os seus métodos de estudo (FRÓVOLA, 2007).

A geografia russa teve muita influência das escolas geográficas de Anoutchine e de Dokoutchaev, formadas no fim do século XIX, que propuseram métodos de investigação mais concretos e definiram a paisagem como objeto investigador da geografia. Anoutchine utilizou muito o método da comparação geográfica (concepções da geografia alemã), dando, ao mesmo tempo, uma atenção específica à história da formação dos objetos e dos fenômenos naturais, e aposta nos seus relatórios de causalidade. Dokoutchaev apoia suas reflexões na ideia filosófica espalhada no século XIX de que a natureza é única, contínua e indivisível e na análise da prática agrária que o conduz a propor questões sobre o papel do solo nos sistemas territoriais, que considera pela primeira vez como *corpus* natural específico. Com Dokoutchaev, a ideia de que o solo é, ao mesmo tempo, um corpo natural e histórico, cada zona geográfica representa uma região genética, seria necessário estudá-lo sob o ponto de vista da variabilidade da natureza no tempo e no espaço. Essa nova abordagem fortaleceu as interações entre a vegetação, o relevo, a geologia, o clima e a atividade humana e orientou a geografia russa para a análise sintética da paisagem e a história da sua formação. Suas ideias foram integradas no século XX não somente nos trabalhos de seus discípulos, mas também em qualquer investigação físico-geográfica na Rússia (FRÓVOLA, 2007).

Sob a influência das ideias de Dokoutchaev e de Hetter, outro importante geógrafo russo, Berg, discípulo de Anoutchine, propôs no início do século XX, como objeto de estudo geográfico, as unidades espaciais de escalas diferentes (da paisagem à zona geográfica), tendo a geografia como objeto a paisagem e o seu método a regionalização. Berg definiu a paisagem como uma região na qual as particularidades do relevo, do clima, das águas, do solo, da

¹ ROUGERIE, G.; BEROUTCHACHVILI N. *Geosistmas et paysages*. Bilans et méthodes. Paris: Armand Colin, 1991, 302 p.

vegetação e da atividade antrópica são organizadas em um conjunto geográfico harmonioso. Porém, questionou “qual lugar é necessário atribuir ao homem na paisagem?” Ele considerou o homem como uma força externa à paisagem. No decorrer do século XX, os geógrafos da paisagem irão hesitar entre a abordagem que totaliza o homem como parte da paisagem e a abordagem dualista, ou seja, o homem como força externa à paisagem (FRÓVOLA, 2007).

Nos anos 1930 e 1940, a ciência da paisagem afirmou-se definitivamente na Rússia como um ramo da geografia, assim como também a geomorfologia, a biogeografia e a pedologia, mas, embora se apresentando como uma ciência com seus próprios objetos, seus métodos de análise continuavam descritivos. As mudanças do capitalismo para o socialismo na sociedade russa promoveram importantes reflexos nas ciências, tendo em vista a nacionalização da terra e dos seus recursos (água, florestas, solos, etc.), o que também levou a uma mudança radical nas relações da sociedade russa com o meio. No que se refere à geografia da paisagem, o seu aspecto de investigação mais importante era o aspecto utilitário, ou seja, a aplicabilidade prática, sendo a finalidade nessa época, dos estudos geográficos, a mudança racional do meio geográfico em conformidade com os objetivos da construção socialista. As mudanças que o novo regime político impôs à análise geográfica da paisagem requereram da Geografia novos métodos de análise como modelo qualitativo e quantitativo, de modo a permitir o controle do meio geográfico e a abordagem quantitativa se firmou rapidamente (FRÓVOLA, 2007).

Verificou-se uma evolução no pensamento geográfico quando Grigoriev, em seu artigo “Estudo físico-geográfico da URSS” publicado em 1931 (ABRAMOV, 1972 apud FRÓVOLA, 2007, p. 166)², escreveu que o método descritivo e qualitativo não podia mais conservar sua importância na geografia. Ele colocou a esfera geográfica ou geosfera no centro dos estudos geográficos, composta por suas massas aéreas, águas e a base litológica que, sob a influência da energia solar, levam ao aparecimento dos solos, dos vegetais e animais, cuja expressão dos processos físico-geográficos é a paisagem. Segundo Grigoriev, é “impossível estudar a fisionomia da paisagem sem analisar seu conteúdo material que pode ser exprimido em fórmulas e equações” (FRÓVOLA, 2007, p.166).

Da mesma forma, essa evolução do pensamento geográfico é expressa quando outro geógrafo soviético, Armand (1949 apud FRÓVOLA, 2007, p. 167)³ afirmou que o mapa não

² ABRAMOV, L. S. *Descriptions naturalistes de notre pays: Développement de l'approche physico-géographique*. АБРАМОВ Л. С. Описания природы нашей страны: Развитие физико-географических характеристик: Moscou: Myisl, 1972. 277 p.

³ ARMAND, D. L. Relations fonctionnelles et corrélatives en géographie physique: *Mémoires de la Société géographique de*

pode ser mais um objetivo principal da investigação geográfica, que a informação do mapa deve ser completada por um gráfico ou um quadro que represente o dinamismo temporal do fator geográfico estudado. A nova concepção da investigação geográfica alcançou seu auge na década de 1960, quando a geografia moderna não é apenas uma ciência descritiva, mas deve oferecer uma base científica completa a trabalho da humanidade. Dessa forma, a base teórica e metodológica em relação à paisagem não se aplica mais a essas novas esferas (FRÓVOLA, 2007). De acordo com Guérassimov (1966 apud FRÓVOLA, 2007, p. 167)⁴, “a ciência da paisagem não resolveu os problemas metodológicos ligados à investigação e à elaboração dos métodos objetivos e precisos de divulgação e descrição científica dos seus objetos de investigação”.

Na segunda metade do século XX, nos anos 1960-1970, surge a doutrina do geossistema. Sotchava, membro do Instituto de Geografia da Sibéria, em 1962, introduziu o termo geossistema na ciência soviética (CRUZ, 1985), cuja nova concepção visava resolver os problemas metodológicos de estudo da paisagem. Porém, apesar do conceito de geossistema ter nascido na escola soviética, é resultado da influência dos pressupostos teóricos lançados por Humboldt, da escola alemã, que tinha uma orientação naturalista e que por sua vez influenciou o pedólogo Dokoutchaev (VICENTE; PEREZ FILHO, 2003; FRÓVOLA, 2007). Sotchatva definiu o geossistema como:

“um sistema natural, de nível local, regional ou global, no qual o substrato mineral, o solo, as comunidades de seres vivos, a água e as massas de ar, particulares às diversas subdivisões da superfície terrestre, são interconectadas por trocas de matéria e de energia, em só um conjunto” (ROUGERIE; BEROUTCHACHVILI, 1991 apud FRÓVOLA, 2007, p. 167)¹.

Para Sotchava, o geossistema inclui todos os elementos da paisagem como um modelo global, territorial e dinâmico aplicável a qualquer paisagem (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). A partir de então, o que passa a interessar aos geógrafos da paisagem são as dinâmicas espaciais e temporais das paisagens e seu funcionamento (FRÓVOLA, 2007).

O geossistema, assim como o ecossistema, é um modelo teórico aplicável a qualquer paisagem de qualquer tamanho (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). Apesar disso, a nova doutrina do geossistema gerava questionamentos entre os geógrafos russos, que enfrentavam conflituosos direcionamentos de metodologias no estudo do geossistema no que se refere, por

I'URSS АРМАНД Д. Л. “Функциональные и коррелятивные отношения в физической географии “ в Известия Всес. Геогр. о-ва. v. 81, n. 1, p. 81-94, 1949.

⁴ GUIERASSIMOV, I. P. *Géographie constructive: buts, méthodes, résultats. Mémoires de la Société Géographique de l'URSS* (ГЕРАСИМОВ И. П. “Конструктивная география: цели, методы, результаты “ в Известия Всесоюзного Географического общества), v. 98, n. 5, p. 389-403, 1966. (en russe).

exemplo, à inclusão ou não dos feitos humanos como integrantes do geossistema (FRÓVOLA, 2007).

Escola Francesa

Esta escola está representada por um conjunto de centros universitários e trouxe também importantes contribuições, particularmente metodológicas, para a ciência da paisagem (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992). Os estudos da paisagem iniciaram com Vidal De La Blache, para o qual esta é uma fisionomia do espaço, algo que se vê e se descreve como combinação dos feitos físicos, biológicos e humanos, cujo estudo teria seu marco adequado na região, sem deixar de mostrar sua profunda raiz com o meio natural, mostrava também a capacidade humana em dominar o meio, dando início a uma abertura da geografia para as ciências sociais, mas sem perder a tradição naturalista (MARTINEZ, 1979). Também Martinez (1979) questionou uma possível ruptura “postvidaliana” com os estudos da paisagem que se seguiram com Bertrand, chamando atenção de que Vidal De La Blache aparece cada vez menos como pai do conceito paisagístico que a geografia regional francesa ia por em prática.

O estudo da paisagem, na França, em linhas gerais seguiu as diretrizes da geografia alemã e soviética, tendo como um dos centros de estudos da paisagem a Universidade de Toulouse-Le Mirail, com o professor Georges Bertrand (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992), que definiu a paisagem como:

“uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução” (BERTRAND, 2004, p. 141).

Bertrand (2004) afirmou que estudar uma paisagem é antes de tudo apresentar um problema de método; a paisagem total integra a paisagem natural e as implicações das ações antrópicas; e, ainda, as paisagens fortemente urbanizadas, alguns dos seus aspectos são estudados por métodos análogos. Ele fez críticas à análise da paisagem de modo fragmentado, pois, a paisagem é um todo, isto é, uma entidade global e estabeleceu uma taxonomia para seu estudo, cujas unidades de paisagem da maior para a menor são: Zona, Domínio, Região Natural, Geossistema, Geofácies e Geótopo. Entretanto, mencionou que é na escala do geossistema que se situa a maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem que envolve as combinações dialéticas mais interessantes para o geógrafo.

Dentre outros pesquisadores de universidades francesas, G. Cabussel também é um nome concreto no estudo das paisagens, que concebeu a paisagem como uma forma de

adaptação-fisionômica-estrutural do conjunto formado pela vegetação natural e é transformada pela ação do homem (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

No estudo da paisagem dentro da Universidade de Paris, destaca-se G. Rougerie, cuja tese de doutorado tratou do significado da evolução dos solos na paisagem, especialmente na Costa de Marfil; G. Soutadé, da Universidade de Paris X, com estudos da paisagem a grande escala em meios de alta montanha; na Universidade de Estrasburgo, destacaram-se J. Tricart que representa a tendência de estudos de paisagem aplicada a partir da geomorfologia, e M. Phipps, G. Allaire, J.C. Weiber e D. Marthieu, com estudos de aplicação especialmente para a agricultura. Destacam-se também F. Moraud, seguindo a escola soviética com estudo a cerca de geossistema, e A. Dauphiné, dedicado a estudos de potencialidade da paisagem e planificação territorial, dentre outros (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Escola Anglo-Saxônica

A escola anglo-saxônica teve como berço os Estados Unidos e se difundiu rapidamente pelo mundo na década de 1960 (MOREIRA, 1981). Representa uma segunda fase na formação da ciência da paisagem. Recebeu influências das escolas germânica e russa, cujo conhecimento gerado por tais escolas foram utilizados e necessários para elaborar a teoria da paisagem integrada e permitiram uma concepção científica melhor estruturada (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Do ponto de vista da ciência da paisagem, esta escola despontou na primeira metade do século XX com o surgimento da doutrina do “holismo”. Smuts, anglo-saxão, foi o criador desta doutrina com sua obra *Holism and evolution* em 1926, que tem uma abordagem a cerca das características dos conjuntos ou unidades que se formam na superfície terrestre. Segundo essa doutrina, o universo e suas partes constituintes têm tendência a originar unidades que formam um todo (*hólos*) de complicação crescente. Nelas participam a matéria inerte, a matéria viva e a matéria pensante (o homem). Após as teorias de Smuts, as concepções holísticas se fizeram patentes e foram profundamente consideradas, generalizando-se a ideia de que os conjuntos constituintes da superfície terrestre apresentam tamanhos e complicação crescente (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Seguindo seu caráter revolucionário, a partir da década de 1960, a escola anglo-saxônica introduziu mudanças principalmente no plano do método, sendo este uma combinação do método quantitativo com a teoria dos sistemas e a teoria dos modelos, isto é, representando um salto da geografia descritiva (fase pré-científica) para a fase da cientificidade, o que significou uma revolução na geografia, passando-se assim, da descrição

da paisagem à matematização da paisagem, da descrição da morfologia da paisagem à rigorosa tipologia de padrões espaciais, da descrição subjetiva à objetividade descritiva da linguagem matemática. Dentre seus produtores, incluem-se geógrafos de todos os países, com menor difusão entre os franceses, pelo fato dessa escola apresentar a “geografia quantitativa e teórica” como uma “nova geografia”, contraposta à geografia de origem europeia, a “velha geografia” (MOREIRA, 1981).

Dentro da escola anglo-saxônica, distinguem-se linhas de estudo como “paisagem e geomorfologia”, na qual se destacam Strhaler e Power, e, a linha do *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (C.S.I.R.O), ou método australiano como também se denomina, que teve início durante a segunda guerra mundial, entre 1943 e 1945, e se baseia no uso sistemático da fotointerpretação do meio natural. Por se basear em fotografias aéreas, as unidades obtidas são basicamente fisionômicas e só se definem tipos de paisagem com a ajuda de transectos sobre o terreno, pelos quais se pode obter informações complementares como o conhecimento das principais espécies vegetais, tipos de rochas, de solos, etc. O trabalho completa-se com o estudo de mapas e trabalhos já existentes. Existem outras linhas que atualmente trabalham no estudo global do território com caráter aplicado voltado para o uso da terra (BÓLOS I CAPDEVILA, 1992).

Paisagem e Geografia no Brasil

No Brasil, segundo Conti (2011), os estudos geográficos e da paisagem surgem na Universidade de São Paulo (USP) com a implantação do curso de Geografia como ensino superior, seguindo a orientação metodológica de tradição francesa e cita entre os grandes mestres que lançaram as bases da Geografia brasileira em 1935, Pierre Deffontaines, que deixou vários trabalhos, entre os quais “Regiões e paisagens do Estado de São Paulo”; Pierre Monbeig que permaneceu por 11 anos (1935-1946) no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH) da USP, que muito contribuiu com orientações de tese de doutorado a respeito da geografia paulista. Tamanho avanço era notado que o Boletim Paulista de Geografia, lançado em 1949, teve frequentes publicações de Ab’Saber, Azevedo, França, Muller e Penteado, na década de 1950, quando a geografia no Brasil se iniciava (CONTI, 2011).

Outros nomes de destaque trabalhando a geografia e a paisagem foram citados por Conti (2011), como Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, Percy Lau, Dora do Amarante Romariz, Lindalvo Bezerra dos Santos, Lúcio de Castro Soares, Elza Coelho de Souza Keller, José Veríssimo da Costa Pereira, Fábio de Macedo Soares Guimarães e Ney Strauch.

Também é destacada por Conti (2011) a tese de doutoramento do Prof. Adilson Avansi de Abreu, de 1973, que se intitulou “Introdução ao Estudo das Paisagens do Médio Vale do Jaguari-Mirim”, ressaltando a importância do estudo pelo fato de, pela primeira vez, ser analisado o papel fundamental da geomorfologia na organização paisagística regional.

Os avanços do estudo da paisagem no Brasil são também registrados pela introdução de a “Fisiologia da Paisagem” como disciplina curricular na USP, em 1968, no currículo de bacharelado do curso de Geografia da FFLC/USP, de autoria do Prof. Aziz Nacib Ab’Saber (CONTI, 2011). Outra contribuição de destaque de Aziz Ab’Saber foi “Um Conceito de Geomorfologia a Serviço das Pesquisas sobre o Quaternário” em 1969 (CONTI, 1998).

Ab’Saber possui outras obras de relevância dentro do estudo das paisagens, e algumas que contemplam o Cerrado, como “O Relevo Brasileiro e Seus Problemas” (AB’SABER, 1964); “Domínios Morfoclimáticos e Províncias Fitogeográficas no Brasil”, (AB’SABER, 1967); “Os Domínios Morfoclimáticos da América do Sul” (AB’SABER, 1977); “Contribuição à Geomorfologia da área do Cerrado” (AB’SABER, 1982); O Pantanal Matogrossense e a Teoria dos Refúgios’ (AB’SABER, 1990); “Cerrados e Mandacarus” (AB’SABER, 2002); e, “Os Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas” (AB’SABER, 2003).

2.1.2 Ecologia da Paisagem e a Abordagem Sistêmica na Geografia

A Ecologia da Paisagem, segundo Odum e Barrett (2007), é uma ciência emergente que tem como pedra angular o estudo das causas e consequências dos padrões espaciais na paisagem. Ela considera o desenvolvimento e a heterogeneidade espacial, as interações temporais e espaciais e trocas por meio de paisagens heterogêneas, as influências da heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos e o manejo da heterogeneidade espacial para o benefício e a sobrevivência da sociedade Risser et al., 1984 (apud ODUM; BARRETT, 2007)⁵.

Estes aspectos são também relacionados por Turner (1989), que descreve a Ecologia da Paisagem como uma ciência que dá ênfase a amplas escalas espaciais e aos efeitos ecológicos da produção de padrões espaciais nos ecossistemas, considerando especificamente o desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade espacial, interações e intercâmbio ao

⁵ RISSER, P. G.; KARR, J. R.; FORMAN, R. T. T. **Landscape ecology**: Direction and approaches. Champaign, III.: Natural History Survey, Number 2. 1984.

longo de paisagens heterogêneas, influências da heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos e o manejo da heterogeneidade espacial.

A ecologia da paisagem, de acordo com Odum e Barrett (2007), teve início na América do Norte na década de 1980, quando Gary W. Barrett (Diretor do Programa de Ecologia da Fundação Nacional da Ciência) recomendou fundos para um seminário realizado em Allerton Park, no município de Piatt, Illinois, em abril de 1983. Essa reunião serviu como elemento catalisador para as reuniões anuais da Associação Internacional da Ecologia da Paisagem dos Estados Unidos (IALE).

Apesar de ser uma ciência nova, segundo Turner (1989) a expressão “Ecologia da Paisagem” foi usada pela primeira vez por Troll (1939 apud TURNER, 1989)⁶, tendo surgido de tradições européias de geografia regional e de ciência vegetal. Várias disciplinas contribuíram para o recente desenvolvimento da Ecologia da Paisagem, como por exemplo, economistas e geógrafos desenvolveram muitas técnicas para ligar padrões e processos em amplas escalas tais como o desenvolvimento de modelos espaciais para abordar problemas de geografia humana. Também está integrada com o planejamento e tomada de decisão em relação ao uso da terra, na Europa. A Ecologia da Paisagem também se desenvolveu em caminhos mais teóricos de pesquisa e muitas aplicações práticas simultaneamente, enfatizando os processos ecológicos (TURNER, 1989).

Segundo Bernaldez (1981), se nos interessássemos pelos tipos de processos que ocorrem na paisagem natural e que são responsáveis pela manutenção do seu aspecto ou fisionomias características, iríamos obter um catálogo notável. O estudo em torno de uma paisagem concreta pode nos proporcionar a matéria para um amplo curso de ciências do meio ambiente. Para esse autor, em alguns livros como o de Strahler e Strahler, dedicados a ciências do ambiente há um excelente compêndio sistemático dos tipos de processos cujo conhecimento é mais necessário na interpretação das paisagens. Ele considerou como o mais importante a possibilidade de conceber o conjunto de mecanismos subjacentes ao fenômeno “paisagem” como um sistema de interações. E refere que a Geografia e a Ecologia têm chamado a atenção sobre a necessidade de estudar a natureza não em forma analítica ou setorial, descobrindo processos isolados e sem conexão, mas enfocando visões de conjunto.

Metzger (2001) se refere à Ecologia da Paisagem como uma disciplina holística, integradora das ciências sociais (sociologia, geografia humana), geo-físicas (geografia física, geologia, geomorfologia) e biológicas (ecologia, fitossociologia, biogeografia) que visa em

⁶ TROLL, C. *Luftbildplan and ökologische Bodenforschung*. Z. Ges. Erdkunde, Berlin, p. 241-98. 1939.

particular a compreensão global da paisagem (essencialmente cultural) e o ordenamento territorial.

A Ecologia da Paisagem tem duas abordagens. A abordagem geográfica (ecologia humana de paisagens), centrada nas interações do homem com seu ambiente, onde a paisagem é vista como o fruto da interação da sociedade com a natureza, e a abordagem ecológica (ecologia espacial de paisagens), particularmente preocupada na compreensão das consequências do padrão espacial nos processos ecológicos. Mas, reconhece que essas abordagens não são tão distintas quanto parecem, e aponta como sendo um dos principais desafios da sociedade internacional de ecologia de paisagem a unificação dos conceitos básicos e o estabelecimento de um sólido arcabouço teórico comum (METZGER, 2001).

A Geografia é uma ciência com abrangência interdisciplinar. De acordo com Mendonça (1998) o tratamento dos aspectos sociais e naturais dentro de uma mesma ciência, a Geografia, constitui-se em um dos seus grandes problemas desde sua origem, o que significa por em evidência a velha questão dicotômica da Geografia: Geografia Humana *versus* Geografia Física (referida apenas para mostrar essas duas abordagens da Geografia).

Segundo Christofolitti (1981), no contexto científico do século XIX, a focalização geográfica era global, sintética. A Geografia surgia como disciplina posicionada no entremeio das ciências humanas e das ciências da natureza, objetivando o estudo global do ambiente humano. Vidal de La Blache (1922 apud CHRISTOFOLITTI, 1981)⁷ ofereceu exposição clara dessa perspectiva. Entretanto, embora usufruindo conceitualmente o direito de estudar globalmente o ambiente natural, os geógrafos também promoveram o aprofundamento de questões particulares sobre determinados conjuntos de fenômenos. Tal perspectiva integrava-se no processo de especialização reinante no transcurso da primeira metade do século XX. Os geógrafos contribuíram de modo decisivo para o desenvolvimento dos estudos tópicos, setoriais. A expansão dos trabalhos relacionados com a Climatologia, Biogeografia, Geomorfologia, Hidrologia e Pedologia criou condições para que se individualizassem como ciências autônomas (CHRISTOFOLITTI, 1981).

Mendonça (1998) fala a respeito do surgimento da Geografia Física, tendo este ocorrido sequenciadamente à Escola Possibilista com o desenvolvimento dos ramos específicos de estudo e pesquisas científicos da Geografia Física, como a Climatologia, Geomorfologia, Biogeografia, Hidrologia, etc... que se baseando em outras ciências como a Meteorologia, Geologia e Biologia etc... influenciaram o conhecimento geográfico produzido

⁷ Blache, B. V. de La. **Principes de Géographie Humaine**. Librairie Armand Colin, Paris. 1922.

a partir de então, chegando à atualidade (MENDONÇA, 1998). Assim, a Geografia Física, não é uma abordagem apenas das ciências da terra, mas também das ciências biológica através dos aspectos ecológicos e da Biogeografia, abordagem esta que fica expressa na a lei que regulamenta a profissão do geógrafo:

Decreto Nº 85.138, DE 15 SET 1980 que regulamenta a Lei nº 6.664, de 26 JUN 1979. Lei Nº 7.399, de 4 de novembro de 1985 que altera a redação da Lei 6.664, e Decreto Nº 92.290, de 10 de janeiro de 1986, que regulamenta a Lei n. 7.399, de 4 de novembro de 1985, disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras providências [...] Art. 3º - É da competência do Geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, das entidades autárquicas ou de economia mista e particulares: I - reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoconômico e as realizadas nos campos gerais e especiais da Geografia, que se fizerem necessárias: [...] f) na caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas conexos⁸.

Brown (1977) define Geografia Física como: terra, ar, água, plantas e animais, e solos. Para ele, é de se esperar que a ênfase relativa dada pelos geógrafos físicos a esses cinco elementos depende do tipo de abordagem centrada na paisagem.

Vale (2012) em uma análise da abordagem sistêmica na Geografia Física, fez referência a Moraes (1983 apud Vale, 2012)⁹, para o qual a perspectiva de fisiologia da paisagem se fundamenta na Biologia, em particular na ideia de organismo. A paisagem seria um organismo, com funções vitais e elementos que interagem. Caberia à Geografia conhecer as inter-relações entre fenômenos de qualidades distintas que coabitam numa determinada porção do espaço terrestre. Para Vale (2012) esta perspectiva introduz a Ecologia no domínio geográfico. Ela comenta que, dentro da Geografia, o interesse conceitual da Ecologia ficou mais restrito aos biogeógrafos. A influência dos conceitos biológicos ou ecológicos na Geografia foi mais profunda do que se pode supor, pois vários termos e conceitos foram e ainda são utilizados de forma corrente, principalmente na Biogeografia.

A fronteira entre Ecologia e Geografia nunca foi clara porque ambas lidam com a paisagem (FRIEDRICHS, 1958 apud VALE, 2012)¹⁰. A Ecologia da Paisagem trabalha com o conceito de ecossistema tanto quanto a Geografia, não obstante as críticas ao conceito feitas posteriormente à criação do mesmo, principalmente pelos geógrafos russos e franceses, principalmente pela carência de unidade espacial (VALE, 2012).

⁸ Disponível em <<http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=6>>. Acesso em 25/nov/2013.

⁹ MORAES, A. C. R. **Geografia: pequena história crítica**. São Paulo: Editora HUCITEC, 1983.

¹⁰ FRIEDERICHS, K. **A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts**. Ecology 39:154–159. 1958.

A acusação de que o estudo dos ecossistemas “não é geografia” repousa no fato, presumivelmente, de que a definição de eco-sistema não define explicitamente a superfície da terra como campo de operação. “A ecologia é o estudo das relações ambientais; a geografia é o estudo das relações do espaço”, declara Davies (1961, p.415), mas continua acrescentando que “o que não está claro é onde acaba uma e começa a outra (CHORLEY; HAGGETT, 1974, p. 86 apud VALE, 2012, p. 99)¹¹.

O termo “Ecologia da Paisagem” cunhado por Troll é fruto da influência que a Ecologia exerceu sobre a Geografia, cujos princípios repousam na visão horizontal do geógrafo somada à visão vertical do ecólogo, vindo a ser uma referência aos estudos, sobretudo biogeográficos, visando entender as relações sociedade-natureza. Carl Troll também utilizou o termo *geoecologia*. Para ele, o nascimento da Ecologia da Paisagem significou a ligação mais importante entre Geografia (paisagem) e Biologia (ecologia). A perspectiva dos geógrafos incluía, além das paisagens naturais, as paisagens antrópicas (VALE, 2012).

A proposta do estudo das paisagens por Bertrad (2004), da Escola Francesa de Geografia, em “Paisagem e Geografia Física Global” contempla a abordagem ecológica nos estudos da paisagem pelos geógrafos, pois o geossistema se define a partir dos dados ecologicamente estáveis e resulta da combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes...), climáticos (precipitações, temperatura...) e hidrológicos (lençóis freáticos, epidérmicos, e nascentes, pH das águas, tempo de ressecamento do solo...) que correspondem ao potencial ecológico do geossistema. O geossistema se define também por certo tipo de exploração biológica (vegetação, solo e fauna), além da ação antrópica, estando em clímax quando há equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica (BERTRAND, 2004).

A abordagem ecológica no estudo das paisagens na Geografia não é recente, pode-se observar essa tendência a partir de estudos de Humboldt e DeCandolle no século XIX, por exemplo, quando estes relacionaram seus estudos botânicos com as influências do ambiente (comentados a seguir), e ao longo do histórico do estudo da paisagem na Geografia (comentado anteriormente), cuja abordagem ecológica foi se aprofundando à medida que as bases científicas desse estudo foram se tornando mais sólidas, se definindo, acompanhando o avanço científico de cada época. Atualmente, os estudos da paisagem pelos geógrafos não possuem apenas aspectos humanos, mas também biogeográficos e ecológicos.

¹¹ CHORLEY, J. R.; HAGGETT, P. **Modelos físicos e de informações em Geografia**. São Paulo: Editora da USP, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1974.

2.2 Sistemática Fitogeográfica e o Cerrado

2.2.1 Fitogeografia Mundial e da América do Sul

Desde o século XIX aos dias atuais, são inúmeras as contribuições dos biogeógrafos no traçado das regionalizações fitogeográficas. Tem-se uma sistematização de informações que se iniciou em uma escala macro com grandes regiões fitogeográficas ou reinos florísticos, em termos mundiais, para uma escala de mais detalhes com classificações fitofisionômicas de áreas com dimensões regionais.

Dentre os primeiros biogeógrafos que contribuíram com conhecimentos a respeito da geografia das plantas, pode-se citar Humboldt (1805), com sua obra “*Essay on the Geography of Plants*”, na qual já visualizava a distribuição dos seres vivos no planeta (especialmente os vegetais) sob a influência dos parâmetros físico-ambientais; ele mencionou que a “geografia de plantas” considera as plantas pelas relações de suas associações locais em diferentes climas. A geografia das plantas não só organiza as plantas de acordo com as zonas e as altitudes em que elas são encontradas, mas distingue habitats entre plantas (HUMBOLDT, 1805), reconhecendo a relação entre a latitude e altitude na distribuição dos vegetais.

De Candolle (1820), em sua obra “*Essai Élémentaire de Geoography of Plants*”, comentou que a geografia das plantas nos faz conhecer a distribuição atual de plantas na terra e nas águas, e atribuiu ao seu crescimento as causas externas como o clima, a temperatura, a elevação do solo acima da superfície do mar, e a distância do equador, condições químicas do solo, geomorfologia e as circunstâncias acidentais externas que operam sobre a produção de plantas. Ele expôs com muitos exemplos e comparações as diferenças das floras entre hemisférios e regiões, possibilitando uma visualização da fitogeografia regional.

Este mesmo autor relatou a respeito do grande número de plantas que pertenciam exclusivamente aos trópicos, que nunca passavam além deles, sendo encontradas também na Ásia e África, na América e as ilhas dos Mares do Sul, e mesmo em Nova Holanda como muito famílias como Palmae, Sapindaceae e Annonaceae, dentre outras. Para De Candolle (1820), havia muitas exceções a esta regra, no entanto, dependia das circunstâncias. Em primeiro lugar, os países que estão acostumados a compartilhar suas floras com as regiões vizinhas, em particular as ilhas situadas sob a mesma latitude, como os Açores possuem as floras da Europa e do norte da África, em vez das da América, porque elas são escassas (ou dificilmente encontradas aí), e também Malta, possui uma flora composta por aquelas do sul da Europa e o norte da África. O mesmo grau de latitude, no hemisfério sul e norte, é

conectado com temperaturas muito diferentes e produz uma vegetação completamente diferente. Isso, porém, deve ser entendido pelo fato do verão ser mais curto no hemisfério sul, porque o movimento da terra em seu perigeu é mais rápido. No verão, há também mais frio porque a grande quantidade de gelo sobre a vasta extensão de mar exige mais calor para dissolvê-la, como também, porque os raios solares não são refletidos em tal quantidade a partir da superfície clara da água mar, para proporcionar o grau apropriado de calor. E, portanto, no hemisfério sul, a flora do polo se estende mais perto do equador, que no norte. Sob o grau 53 e 54 de latitude sul, são encontradas plantas que correspondem com a flora ártica. Na Terra de Magalhães, e na Terra do Fogo, *Betula antartica* corresponde com *Betula nana* na Lapónia; *Empetrum nigrum*, - *Arnica montana* - *Genum magellanicum* com *Genu rivale*, na Inglaterra, - *Sxifraga magellanica* com *Saxifraga rivularis*, em Finmark (DE CANDOLLE, 1820).

Do mesmo modo que Humboldt, De Candole destacou a importância das condições físicas na distribuição das floras mundiais. Mas, apesar dessas grandes contribuições, segundo Cox e Moore (2009), foi o botânico alemão Adolf Engler o primeiro a produzir, em 1879, um planisfério detalhado e compreensível com limites da distribuição de floras regionais distintas; seu mapa também apresentava diferentes tipos de vegetação em cada das grandes áreas. Ele identificou quatro grandes regiões florais ou domínios botânicos mundiais: Domínio boreal extratropical (América do Norte, Europa e Ásia), Domínio Paleotropical (da África às Índias Orientais), Domínio sul-americano e Domínio do Velho Oceano (da costa chilena, via sul da África, ilhas do Atlântico sul e Oceano Índico até Austrália e parte da Nova Zelândia), tendo observado também algumas famílias de plantas ou gêneros que eram dominantes ou característicos de cada domínio, exceto por modificações comparativamente pequenas. O sistema de plantas aceito atualmente com base em Good e Tarktajan é muito similar ao de Engler (COX; MOORE, 2009).

Em outra contribuição a respeito da flora mundial, Udivardy (1975), em sua obra “*A classification of the Biogeographical Provinces of the World*”, propôs um sistema biogeográfico unificado (flora e fauna), principalmente para fins de conservação com oito reinos: Paleártico, Neártico, Áfricotropical, Indomalásico, Oceânico, Australiano e Neotropical. No que se refere à flora, assim como Cox e Moore (2009), Udvardy (1975) comentou que todos os esquemas florísticos são baseados em Engler, dentre estes ele também destaca as classificações de Good e Takhtajan. Nesta classificação de Edvardy (1975) o reino Neotropical é composto de 47 províncias e o Brasil tem seu território dentro de 15 destas

províncias que são: 4 (Guiana); 5 (Amazônia); 6 (Madeira); 7 (Serra do Mar); 8 (Floresta Úmida Brasileira); 9 (Planalto Brasileiro); 20 (Caatinga); 21 (Gran Chaco); 27 (Llanos); 28 (Campos Limpos); 29 (Babaçu); 30 (Campos Cerrados); 31 (Pampas Argentinos); 45 (Ilha Fernando de Noronha) e 46 (Ilha Trindade Sul). Nota-se que o Cerrado constitui uma província independente.

Por sua vez Takhtajan (1986), autor de uma das regionalizações da flora mundial atualmente aceita, estabeleceu seis reinos florísticos, seguindo uma hierarquia de sub-reinos, região, e províncias. Os reinos estabelecidos foram: Holártico, Paleotropical, Neotropical, Cape, Australiano, e Holantártico.

O reino Neotropical ocupa a parte tropical da Península da Flórida, parte das terras baixas e costeiras do México, toda a América Central, ilhas das Antilhas e grande parte da América do Sul. Contém famílias endêmicas e subendêmicas: Hymenophyllopsidaceae, Stylocerataceae, Caryocaraceae, Pelliceraceae, Lissocarpaceae, Brunelliaceae, Thurniaceae, dentre outras. A flora neotropical tem uma origem comum com a Paleotropical e é assumido que, pelo menos para as plantas com flores, que estas tiveram seu núcleo inicial no reino Paleotropical. São muitas as famílias com distribuição pantropical, que inclui ambos os trópicos do Velho e Novo Mundo, como por exemplo, as famílias Annonaceae, Canellaceae, Myristicaceae, Lauraceae, Piperaceae, Ochnaceae, Sapotaceae, Bombacaceae, dentre outras. Um considerável número de gêneros é encontrado nos trópicos de ambos os hemisférios, provavelmente não menos que 450. O número total de gêneros não é conhecido, mas são estimados aproximadamente de 3.000 a 3.600 gêneros neotropicais. Subdivide-se em cinco regiões: Caribenha, de Terras Altas das Guianas, Amazônica, Brasileira e Andina (TAKHTAJAN, 1986). A região Brasileira subdivide-se em província Caatinga, Planalto do Brasil Central, Chaco, Atlântica e Paraná.

Existem outras regionalizações ou classificações fitogeográficas, em escala mundial, com enfoques não florísticos, mas fisionômicos. Nas primeiras décadas do século XX, surgiu o termo “formação” que, segundo Coutinho (2006), foi empregado por Griesebach, cuja origem seria uma derivação da palavra alemã *vegetationsform* utilizada por Martius. No Congresso de Botânica de 1910 (Bruxelas), sua Comissão de Nomenclatura estabeleceu que uma formação “se compõe de associações que se diferenciam em sua composição florística, mas coincidem, em primeiro lugar, nas condições estacionais e, em segundo lugar, nas suas formas biológicas”. A partir de então, vários conceitos monoclimáticos foram propostos por Weaver e Clements, Clements, Mueller-Dombois e Ellemberg, e Colinvaux (COUTINHO,

2006). Posteriormente, surgiu o termo “bioma” que Clements (1949 apud COUTINHO, 2006, p. 15)¹² descreveu como: “*Biome – A community of plants and animals, usually of the rank of a formation: a biotic community*”. Segundo Coutinho (2006), o que diferenciou “formação” de bioma foi a inclusão da fauna no novo termo; entretanto, a fisionomia permite reconhecer os diferentes biomas.

Há várias classificações de biomas, como a de Cailleux (1953), que contribuiu para o entendimento das floras mundiais com a delimitação fisionômica das grandes formações naturais em que reconheceu oito principais formações naturais terrestres: tundra, floresta subártica e temperada, durisilva, savana, floresta tropical de folhas caducas, estepe e pradarias, semidesertos e desertos, e floresta equatorial.

Odum e Barrett (2011): citaram as tundras ártica e alpina, Calota de gelo dos polos e dos picos de montanhas, Florestas de coníferas boreais, florestas decíduas temperadas, campos temperados, campos tropicais e savanas, chaparraais, desertos, florestas tropicais semidecíduas, e florestas úmidas tropicais sempre-verdes. Cox e Moore (2009) citaram os desertos, tundra gelada de altas latitudes e grandes altitudes, floresta boreal de coníferas ou taiga, floresta temperada, floresta tropical úmida, *grassland* temperada, e chaparral. Brow e Lomolino (2006) consideraram tundra e gelo, floresta boreal, Floresta temperada decídua e floresta subtropical de sempre-vivas, pradarias temperadas, desertos e semidesertos, floresta tropical decídua e savana, floresta tropical úmida, e tundra alpina; dentre outras classificações, mas todas evidenciam o forte vínculo dos biomas com o clima, e a percepção dessa relação do clima com as zonas de vegetação do mundo vem desde os primeiros biogeógrafos.

Segundo Cox e Moore (2009), existe um zoneamento geral dos biomas em função da latitude ou altitude. Nesse sentido, Walter e Lieth (1960 apud COUTINHO, 2006, p. 16)¹³ elaboraram uma classificação dos climas do mundo em nove zonas climáticas distribuídas como zonas latitudinais da Terra, representando cada zona uma grande unidade ecológica da geobiosfera, que eles denominaram de zonobioma, que foram posteriormente publicados em Walter (1986):

Zonobioma I – Florestas pluviais tropicais sempre verdes

Zonobioma II – Florestas tropicais estacionais ou savanas

Zonobioma III – Desertos quentes

¹² CLEMENTS, F.E. **Dynamics of Vegetation**. New York, The H.W. Wilson Co. 1949.

¹³ Walter, H.; Lieth, H. **Klimadiagramm-Weltatlas**. Veb. Gustav Fischer Verlag, Jena. 1960.

Zonobioma IV – Vegetação esclerofila (chaparral, maqui)

Zonobioma V – Florestas subtropicais sempre verdes

Zonobioma VI – Florestas temperadas subcaducifólias

Zonobioma VII – Estepes ou desertos

Zonobioma VIII – Floresta de coníferas (Taiga)

Zonobioma IX – Tundras

Tendo em vista a atual crise da biodiversidade, que exige ações para conter a perda da biodiversidade, Olson et al. (2001) estabeleceram um novo mapa da vida na Terra por meio do traçado de ecorregiões terrestres com o objetivo de subsidiar a discussão sobre estratégias de conservação da biodiversidade terrestre.

A regionalização proposta por Udvardy (1975), que teve um cunho conservacionista, serviu de base para a delimitação das ecozonas e ecorregiões por Olson et al. (2001), que afirmaram: *“as Ecoregiões refletem a distribuição de espécies e comunidades com mais eficiência do que as Unidades baseadas em modelos globais e regionais derivados apenas dos dados biofísicos, tais como chuva e temperatura”* (OLSON et al., 2001, p. 933). Eles subdividiram o mundo terrestre em 14 biomas: Florestas tropical e subtropical úmidas latifoliadas; Florestas tropical e subtropical secas latifoliadas; Florestas tropical e subtropical latifoliadas de coníferas; Florestas temperadas e mistas latifoliadas; Floresta temperadas de coníferas; Floresta Boreal/Taiga; Campos tropicais e subtropicais, savanas e arbustos; Campos temperados, savanas e arbustos; Campos úmidos e savanas, Campos montanhosos e arbustivos; Tundra; Florestas Mediterrâneas, lenhosas e arbustivas; Desertos e xéricas arbustivas; e Maguezais; e, em oito reinos biogeográficos: Neártico, Paleártico, Neotropical, Afrotropical, Indo-Malásico, Australiano, Oceânico, e Antártico, que abrigam 867 ecorregiões.

Para Olson et al. (2001), o modelo de ecorregião oferece funcionalidades que melhoram a sua utilidade para o planejamento da conservação em escalas globais e regionais por ter abrangente cobertura, uma estrutura de classificação que se baseia no conhecimento biogeográfico existente e um nível detalhado de resolução biogeográfica. Estes autores consideram que a nova regionalização é aproximadamente um aumento de quatro vezes na resolução sobre as 198 províncias bióticas de Dasmann (1973) e 193 unidades de Udvardy (1975).

Em todas as classificações fitogeográficas em nível mundial, o reino Neotropical manteve-se, significando a individualidade de sua flora. Para a América do Sul, que compõe grande parte desse reino, existem várias classificações ou regionalizações biogeográficas estabelecidas, dentre elas a de Cabrera e Willink (1973), Ab'Saber (1977) e Morrone (2001), que contemplam aspectos fitogeográficos.

Cabrera e Willink (1973) estabeleceram uma classificação de táxons animais e vegetais para a América do Sul, estando esta representada em quatro grandes regiões biogeográficas: Região Holártica (pequena porção do norte da península da Baixa Califórnia); Região Neotropical (ocupa quase todo o México, América Central, e a maior parte da América do Sul); Região Antártica (cobre a cordilheira austral desde os 37° de latitude sul até o cabo de Hornos, as ilhas Malvinas, as ilhas de Juan Fernández e a Antártica); e a Região Oceânica (nos mares costeiros).

Na proposta de regionalização de Cabrera e Willink (1973), o continente sul-americano compõe-se de cinco domínios pertencentes à Região Neotropical: Domínio Caribe (Províncias Guajira, das Ilhas Galápagos), Domínio Amazônico (Províncias Amazônica, Pacífica, Yungas, Venezuelana, do Cerrado, Paranaense, da Savana, Atlântica, e Páramo), Domínio Guiano, Domínio Chaqueño (Províncias Caatinga, Chaquenha, Espinal, Prepunenha, do Monte, e Pampeana), e Domínio Andino-Patagônico (Províncias Altoandina, Punenha, do Deserto, Chilena Central, Patagônica); e um pertencente à Região Antártica, o Domínio Subantártico (é um domínio sul-americano que faz parte das regiões Antártica e Oceânica, ao qual pertencem as províncias Subantártica, Insular e de Juan Fernández). O Cerrado, neste sistema de regionalização, é uma província do Domínio Amazônico e chega a adentrar o leste paraguaio, da mesma forma que a Província do Chaco também chega a adentrar o sudoeste do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ab'Saber (1977) propôs uma regionalização da América do Sul com base em critérios climáticos, geomorfológicos, fitogeográficos e ecológicos, com 23 domínios: Domínios Equatorial Amazônico, Equatorial Pacífico, Tropical Atlântico, dos Cerrados, Roraimo-Guianense, Intermontano Subequatorial, dos Andes Equatoriais, das Caatingas, do Chaco Central, dos Desertos Costeiros Pacíficos, das Punas e Desertos de Cordilheira dos Andes Centrais, dos Planaltos Sub-brasileiros com Araucárias, Andino Subtropical com Araucárias, das Pradarias Mistas Subtropicais, Pampa Úmida, Páramos, do Monte, do Monte Estético, Patagônico, dos Andes Subantárticos, de Finisterra Subúmida das Terras Patagônicas e Magalhânicas, e das Tundras Subantárticas; e, com quatro paisagens diferentes: das Serras

Úmidas e Piemontes da Faixa Tucano-Boliviana, Rochosas, de Glaciais Residuais: sul dos Andes, de Encraves Glaciários de Altura. Nesta regionalização da América do Sul, o Cerrado constitui um domínio independente.

Morrone (2001), em sua obra *“Biogeografía de América Latina y El Caribe”*, estabeleceu uma classificação biogeográfica composta de regiões, sub-regiões e províncias, determinando nesta classificação as regiões Neártica, Neotropical e Andina para a América Latina e o Caribe. A região Neotropical compreende a região dos trópicos americanos, desde o norte do México até o centro da Argentina; entretanto, existem evidências de que a biota sul-americana da região Neotropical se expandiu mais para o sul em tempos pré-quaternários, chegando até a Patagônia (Figura 2.1). Esta região integra o reino Holotropical, juntamente com as regiões Afrotropical ou Etiópica, Oriental e Australiana Tropical e compõe-se das sub-regiões: Caribenha, Amazônica, Chaqueña e Paranaense (MORRONE, 2001).

Figura 2.1 - Sub-regiões Neotropicais: 1, Caribenha; 2, Amazônica, 3, Chaqueña; e 4, Paranaense (a); e as Províncias da sub-região Chaqueña: 1, Caatinga; 2, Cerrado; 3, Chaco; 4, Pampa; e 5, Monte (b). Fonte: Morrone (2001)

A sub-região Chaqueña estabelecida por Morrone (2001) ocupa o norte e o centro da Argentina, sul da Bolívia, oeste e centro do Paraguai, e centro e noroeste do Brasil. Equivale ao “corredor de savana” de Schmidt e Inger (1951) e à “diagonal de formações abertas” de Vanzolini (1963), revisados por Prado e Gibbs (1963), também segundo Morrone (2001).

Morrone (2001) reconheceu cinco províncias na sub-região Chaqueña (Figura 2.1): Caatinga, Cerrado, Chaco, Pampa e Monte. Considerando-se a flora, os traços individuais de

Enterolobium contortisiliquum, *Astronium urundeuva* e *Aramigus* são característicos desta sub-região, como também os táxons de angiospermas: *Copernicia* e *Trithrinax* (Arecaceae), *Bromelia* e *Dyckia* (Bromeliaceae), *Holocheilus* e *Panphalea* (Asteraceae), *Opuntia*, *Quiabentia* e *Trichocereus* (Cactaceae), *Gymnosporia* e *Schaefferia* (Celastraceae), *Pouteria gardneriana* (Sapotaceae), *Acacia*, *Amburana cearensis*, *Caesalpinia*, *Enterolobium contortisiliquum*, *Hymenaea martiana*, *Nachaerium acutifolium* e *Pterogyne nitens* (Fabaceae), *Aspidosperma pyrifolium* e *Vallesia* (Apocynaceae), *Combretum leprosum* (Combretaceae), *Acanthosyris* e *Jodina* (Santalaceae), *Astronium urundeuva* (Anacardiaceae), *Bulnesia*, *Larrea* e *Plectrocarpa* (Zygophyllaceae) e *Celtis* (Ulmaceae).

Para a América Latina, além destas regionalizações expostas anteriormente, também foi estabelecida uma classificação em ecorregiões com fins conservacionistas. Pelo planejamento ecorregional da América Latina e do Caribe, há um consenso atual que existem 18 ecorregiões terrestres, 77 ecorregiões de água doce e 42 ecorregiões marinhas; estas ecorregiões têm se convertido nas unidades básicas de planejamento e conservação (THE NATURE CONSERVANCY, 2007).

Em todos os sistemas de regionalização com o objetivo de classificar as floras ou fitofisionomias, quer seja em nível de reinos, regiões, províncias, ou ecorregiões o Cerrado tem sido individualizado dentro destas classificações, embora apareça às vezes com a denominação de Planalto Brasileiro ou Planalto Central do Brasil e, em outras, com o próprio nome Cerrado.

2.2.2. Fitogeografia Brasileira

No Brasil, a primeira regionalização fitogeográfica foi feita pelo botânico alemão Karl Friedrich Philipp von Martius, que veio ao Brasil fazendo parte da Missão Austríaca, que integrava a comitiva da arquiduquesa Leopoldina na vinda ao Brasil para se casar com D. Pedro, época em que o Brasil era colônia do Reino de Portugal, Brasil e Algarve. A viagem de Martius de três anos (1817-1820) resultou em muitas publicações e importantes obras como a monumental “Flora Brasiliensis”¹⁴.

Martius, ao produzir mapa fitogeográfico do Brasil no século XIX (Figura 2.2), utilizou um sistema de classificação baseado em divindades gregas: Nayades - ninfas dos lagos, rios, fontes; Oreades - ninfas das montanhas, companheiras de Diana, deusa grega da

¹⁴ Disponível em: <www.fapesp.br/publicações/flora>. Acesso: DATA: 20/10/2011.

caça; Hamadryades - ninfas que ressuscitam e protegem bosques e árvores; Dryades - ninfas protetoras dos bosques e árvores; Napaeae - ninfas protetoras dos vales e prados (HENRIQUES, 2008), que representam Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Campos e Florestas Meridionais, respectivamente. Em 1958, o mapa fitogeográfico de Martius foi anexado ao volume XXI da Flora Brasiliensis (VELLOSO et al., 1991).

Figura 2.2 - Mapa Fitogeográfico do Brasil, elaborado por Karl Friedrich Philipp von Martius, em 1858. Fonte: Henriques (2008)

Após Martius, mais de meio século depois, no início do século XX, uma nova classificação fitogeográfica brasileira foi estabelecida por Gonzaga de Campos em 1912.

A classificação de Campos tinha cunho fitofisionômico estrutural e incluiu como grandes divisões: Matas; Campos; Caatingas; Vegetação Costeira; e, Pantanal.

I – Matas: nesta categoria ele estabeleceu as seguintes subdivisões:

A - Florestas da Zona Equatorial (Hileia Amazônica), compondo-se de:

- a) Matas de Aluviões Marítimas (ou manguezais)
- b) Matas de Aluviões Fluviais (ou das várzeas)
- c) Matas de Terra Firme

B – Floresta da Encosta Atlântica (desde a altura do cabo de São Roque, na latitude 5°,5 Sul até o Rio Grande do Sul, na latitude de 30°. Subdivide-se em:

- a) Floresta de Encosta
- b) Pinheirais (Araucárias)

C - Matas Pluviais do Interior

Campos (1912) justificou a inclusão dos Pinheirais na categoria “Matas”, tendo em vista ocorrerem conjuntamente com espécies da floresta atlântica, a exemplo do Paraná, os pinheirais ocorrem com grandes quantidades de embuias, tapinhoans, canelas, araçás, guaraiuvias, guaynviras e outras árvores de grande porte.

Outro aspecto que aqui merece esclarecimento é que as Matas Pluviais do Interior, a que Campos (1912) se refere, ocorrem em uma zona que no geral é megatérmica, porém com chuvas reduzidas e estacionais, concentradas em curto prazo, de modo que as secas prolongadas dão a certas zonas o caráter dos climas xerófilos com ocorrência de Cerradões, Catanduvas¹⁵, Faxinas¹⁶, Campos Cerrados, Campos Limpos, e Quissassas¹⁷.

Mas não são essas as Matas Pluviais do interior, e sim aquelas decorrentes de fatores geomorfológicos como grandes formas do relevo como serras, cordilheiras, encostas dos planaltos que, como degraus para o interior do país, se sobrepõem ao planalto da borda atlântica, juntando-se a outros tantos fatores de condensação, produzindo florestas de grande porte por áreas extensas, mas que na realidade representam apenas manchas locais dentro do ambiente de Cerrado. Como por exemplo, em Minas, Campos (1912) cita as matas da serra das Vertentes, que revestem o curso superior do Paraopeba, rios Pará, Boa Vista e Itapecerica; das encostas orientais da serra da Canastra e da Mata da Corda que revestem as cabeceiras do rio São Francisco; em Goiás, a serra do Duro, o chapadão de Tabatinga, chapadão da Mangabeira que representam o último divisor prolongado a norte, oferece, principalmente, nas escarpas de oeste, zonas de condensação cobertas de matas. As vertentes mais orientais do Paraná, do rio Palmas, do Manoel Alves de Natividade, do rio do Sono constituem-se de largas manchas de boas matas (CAMPOS, 1912).

O divisor entre o Paraná e o Tocantins-Araguaia, orientado a nordeste, oferece nas duas encostas os mesmos resultados de uma condensação mais abundante: matas das cabeceiras do Descoberto, do Areias, dos afluentes mais meridionais do Corumbá, cabeceiras do Maranhão, do rio das Almas, vertentes do rio Vermelho, do rio Claro, Cayapozinho, Bonito e Caiapó Grande (CAMPOS, 1912).

Em Mato Grosso, o mesmo prolongamento do mesmo divisor avança até as raias do Paraguai e por ele ocorrem algumas manchas de matas nas cabeceiras dos afluentes setentrionais do Botas e de outros afluentes ocidentais do rio Pardo e pelas cabeceiras do

¹⁵ Matas ralas de árvores esguias e ramos tortos, com solos secos e arenosos. Às vezes com tapete de capim.

¹⁶ Catanduvas do sul. Denominação mais ao sul de São Paulo e daí para Estados do sul.

¹⁷ Cerrado sujo.

Anhanduhy e do Vacaria aparecem matas na encosta sul do divisor; para o norte, ocupa as vertentes do Taquary e do Coxim, do Tabôco e do Aquidauana; mais ao norte, as matas ocupam uma faixa quase contínua circundando a grande depressão ou Pantanal do Paraguai (CAMPOS, 1912).

D – Matas Ciliares

Mata que se limita à faixa que acompanha os rios e seus afluentes. No Amazonas, é a vegetação das “pestanas” dos rios. Atendendo à origem e em correspondência à denominação empregada de “matas pluviais”, poderiam ser chamadas de “matas de condensação”. No Brasil, tem sido usado o termo “mata de anteparo”; Os botânicos europeus adotam “matas em galeria” (CAMPOS, 1912).

E – Capoeirões, Capoeiras

Corresponde às matas que não se encontram no estado primitivo; já não são matas virgens, são de segundo crescimento ou capoeirões (CAMPOS, 1912).

F – Pastos

Este grupo é formado pelos locais em que os traços de mata têm desaparecido quase totalmente; onde a mata é derrubada, queimada para plantar capim para criação ou as espécies mais vigorosas de capim e outras plantas se alastram e dominam vastas áreas onde a mata foi devastada, a exemplo das pastagens com capim Gordura, Jaraguá e Provisório em Goiás, Mato Grosso e Noroeste de São Paulo (CAMPOS, 1912).

II – Campos: este grupo corresponde a áreas com predomínio de vegetação de gramíneas e plantas herbáceas e subdivide-se em:

- a) Campinas (campos de várzea e estão presentes nos grupos A; B; C; D);
- b) Campos do Sul (campos paleáceos, de vacaria, gerais, em parque, arbóreos e subarbustivos);
- c) Campos Cerrados (característicos dos planaltos interiores, ocorrendo em chapadas e tabuleiros).
- d) Campos Alpinos (característicos de grandes altitudes e ocorrem de modo acentuado em Minas, na serra do Espinhaço, da Canastra e nos Gerais da Bahia; as plantas que dão cunho alpino são as Velloziáceas com seus gêneros *Vellozia* e *Barbacenia*; onde estas ocorrem a altitude é superior a 1000 m e chegam a ter até de 20 a 30 cm de diâmetro e até 3 a 4 m de altura; em Goiás a formação alpina tem grande desenvolvimento na área das chapadas divisoras das bacias do Paranaíba e do Tocantins; de Bomfim

a Pirenópolis existe uma verdadeira transição de campos cerrados para os campos alpinos e um dos elementos citados é a canela d'ema (CAMPOS, 1912).

III - Caatingas

Tipo de vegetação especial do nordeste brasileiro e que melhor se caracteriza na parte setentrional da bacia do São Francisco ao norte do paralelo de 10°. Segundo Campos (1912), tanto Martius quanto Warming, ao se referir às características da Caatinga, destacaram a perda de folhas como proteção às secas prolongadas; a caatinga está presente nas Florestas Tropicais e nos Campos Cerrados e é uma mata verde na estação chuvosa (CAMPOS, 1912).

IV - Vegetação Costeira

Corresponde ao grupo complexo de praias de areia e dunas e da região baixa mais ou menos embrejada que se estende terra adentro por trás das praias cobertas de uma vegetação especial chamada restinga (CAMPOS, 1912).

V - Pantanal

Vasta depressão com altitudes que variam de 100 a 200 m, cuja zona mais característica está em Mato Grosso, como parte de uma entidade muito maior: o *Gran Chaco*. Apesar de ser uma zona tipicamente de campo, o Pantanal possui muitas formações vegetais, como a de florestas onde o “carandasil” é muito abundante, perto das margens do rio Paraguai; parques de “paratidal”, mais afastados do rio, formados por paratudo (*Tecoma caraiba* Mart.); nas partes mais embrejadas ocorre a palmeira *Mauritia vinifera*, porém os buritizais localizam-se mais para o norte, nos pantanais do Miranda, do rio Negro e do Taquari; o “pajal” é um tipo dos campos paleáceos (campos do sul) que aparecem em volta das depressões; o “espinhal” correspondem às fitas de vegetação seca e espinhenta que aparecem pela orla da baixada e mesmo ao longo de alguns rios; no Pantanal, acham-se representados todos os tipos de vegetação do país, das diversas regiões, exceto os campos alpinos (CAMPOS, 1912).

Depois de Campos (1912), surge a classificação fitogeográfica brasileira de Alberto J. de Sampaio, em 1938. É uma classificação florística com base no sistema geobotânico de Engler. De acordo com Sampaio (1938), a flora brasileira estava dividida em duas grandes Províncias, Amazônica e Extra Amazônica, que podem ser subdivididas:

I – Flora Amazônica ou Hileia Brasileira:

1 - Zona do Baixo Amazonas (da boca do rio Negro ao litoral)

1. Sub-zona sul

2. Sub-zona norte

- 2 - Zona do Alto Amazonas (da boca do rio Negro ao Acre)

1. Sub-zona sul

2. Sub-zona norte

II – Flora Extra Amazônica ou Flora Geral (ocupava maior extensão do nosso país e mesmo na Hileia tinha repercussão em campos ali inclusos). Esta flora era composta por:

- 1- Zona dos Cacaiais

- 2- Zona das Caatingas

- 3- Zona das Florestas Orientais (ou das matas costeiras)

- 4- Zona dos Pinhais ou Sul Brasileira da Araucária

- 5- Zona dos Campos

- 6- Zona Marítima

- a. Vegetação Halófila ou do Litoral

- b. Flora Insular

1. Das Ilhas Afastadas

2. Das Ilhas Costeiras

- c. O Phytoplankton ou flora flutuante

Segundo Sampaio (1938), a flora Amazônica é parte da chamada “Hyleae” de Humboldt, ou seja, desta grande floresta equatorial, que partindo das vertentes orientais dos Andes, estende-se pelo vale do Amazonas e de seus numerosos afluentes, prosseguindo ao norte, na zona do Orenoco e Guianas (SAMPAIO, 1938).

No Brasil a flora Amazônica não se restringe à Amazônia (Acre, Amazonas e Pará), mas, estende-se até às cabeceiras dos afluentes do Amazonas nos Estados do Mato Grosso e de Goiás, e penetra o Maranhão até Imperatriz e, provavelmente, nos médios cursos dos rios Pindaré e Grajaú (SAMPAIO, 1938). Este autor ainda comentou que na flora brasileira, assim como na América do Sul, domina a vegetação campestre, que está presente tanto na Flora Amazônica como em todas as zonas da Flora Geral; entretanto sua área principal é no Brasil Central, ou seja, a zona dos “Campos” e “zona Oreades” de Martius, mas não se restringe ao Brasil Central, uma vez que os campos ocorrem desde o norte da Amazônia ao Arroio Chuí.

Após a classificação de Sampaio (1938), pode-se citar a de Lindalvo Bezerra dos Santos em 1943. Segundo Santos (1943) a paisagem brasileira diversifica-se em grandes

quadros típicos, tanto pelo seu aspecto da vegetação, quanto pela sua flora; estes quadros podem ser de zonas ou regiões fitogeográficas que no Brasil possuem oito aspectos gerais principais: florestas tropicais, pinhais, cerrados, campinas, caatingas, babaçuais, vegetação litorânea, complexo do Pantanal.

A classificação de Santos (1943) inclui:

I – Florestas Tropicais

Este quadro é representado por três formações: floresta Amazônica ou Hiléia brasileira, floresta de encosta Atlântica e floresta do vale do rio Paraná.

II – Pinhais

Os Pinhais de *Araucaria angustifolia* representam uma grande ocorrência florestal na região dos campos gerais.

III – Cerrados

As formações campestres revestem, em maior extensão, o planalto brasileiro. O campo é a vegetação dominante na América do Sul e característico do Brasil Centro-Oeste. Tem uma larga dispersão, campos do Alto Rio Branco, campos de Marajó, campos do norte do rio Amazonas (no Pará), na região das Caatingas e no Planalto Meridional (campos Gerais), sendo encontrado no Brasil desde as latitudes setentrionais do Rio Branco até as planícies sul-rio-grandenses, assim como afirmou Sampaio (1938). Estas formações campestres apresentam-se sob dois aspectos principais: Cerrados, semelhantes a savanas tropicais, sendo que este é o tipo predominante no Planalto. É comum em Mato Grosso, Goiás e grande parte de Minas, ocorrendo também de modo considerável no Maranhão, Piauí, Bahia, São Paulo, em regiões de clima semiúmido tropical, com estacionalidade climática (SANTOS, 1943).

IV – Campinas

Ocorrem em áreas com clima dos Cerrados, mas de forma mais extensa em regiões de clima subtropical semiúmido com chuvas distribuídas uniformemente. Estas são soberbamente representadas pelos campos sul-rio-grandenses e constituem a Campanha Gaúcha. No altiplano, ocorrem os campos Gerais com larga ocorrência dispersa no Paraná. No sudeste catarinense, é bem representado pelos campos de Lages e se prolongam pelo nordeste do Rio Grande do Sul com os campos de Vacaria (SANTOS, 1943).

Extensas áreas de campinas também ocorrem no planalto brasileiro entre 10 e 15° Sul. Esta ocorrência se dá na chapada do divisor de águas Tocantins/São Francisco. No sul de Mato Grosso, destacam-se os campos de Vacaria (SANTOS, 1943). Este autor enfatiza que

dentro dos Cerrados e das Campinas ocorrem as florestas beira-rio (ciliares ou em galeria) e os capões (ilhas de mata em meio aos campos).

V – Caatingas

Vegetação de árvores pequenas, arbusto e grande número de cactáceas que compõem um conjunto com aspecto de mato xerófilo, refletindo as condições climáticas. A área de ocorrência das Caatingas é o bloco norte oriental do planalto brasileiro (sertões dos estados nordestinos) A Caatinga possui diversos tipos e, nesta zona, ocorre também a carnaúba (SANTOS, 1943).

VI – Babaçuais

Superfície de ocorrência predominante da palmeira babaçu que se apresenta em agrupamentos adensados. Os babaçuais ocorrem de modo intercalado entre a floresta Amazônica e a região semiárida das Caatingas nordestinas; entretanto, os maiores adensamentos desses palmeirais estão na planície maranhense, entre o litoral e o planalto, no sentido noroeste/sudeste (SANTOS, 1943).

VII – Vegetação Litorânea

Estreita faixa de vegetação “beira-oceano”, condicionada às particularidades climáticas e dos solos litorâneos; também fazem parte desta zona: os coqueirais, a vegetação de restinga e os mangues (SANTOS, 1943).

VIII – Complexo do Pantanal

Baixada mato-grossense, entre a borda ocidental do grande planalto e o sulco do rio Paraguai. Do ponto de vista da vegetação, é um complexo com ocorrência de florestas amazônicas, matas de encosta, palmeirais, cerrados, campinas, matas beira-rio, vegetação dos alagados, vegetação aquática, etc. Entretanto, o aspecto mais geral é o campestre, com vários matizes (SANTOS, 1943).

De acordo com Veloso et al. (1991), Santos (1943) pode ser considerado como precursor da fitogeografia fitofisionômica no Brasil, cujas três divisões maiores por ele determinadas (formações florestais, campestres e complexas) foram seguidas pelo Projeto RADAMBRASIL no início da década de 1970. Foi o primeiro a conceituar, de modo correto, o termo “formação”, de acordo com seu criador Grisebach. Almeida (2009) considerou que, no campo biogeográfico, foi o primeiro trabalho classificatório da vegetação brasileira.

Em 1963, Carlos Toledo Rizzini estabeleceu uma divisão fitogeográfica baseada nos métodos de Braun-Blanquet que admite, dentro de um reino florístico, quatro categorias de

territórios regionais (região¹⁸, província¹⁹ setor²⁰ e distrito²¹). Esta divisão considerou o aspecto florístico-vegetacional e foi estruturada em três províncias geobotânicas: Amazônica, Atlântica e Central. Tais províncias se subdividem em sub-províncias e setores. A Província Atlântica composta pelas subprovíncias Nordestina (Agreste, Sertão, Seridó, e Ilha de Fernando de Noronha) e Astro-Oriental (Litoral, Cordilheira, Pinheiral, e Ilha da Trindade); Província Central (Subprovíncia do Planalto Central, Subprovíncia da Depressão Matogrossense, Subprovíncia do Meio Norte); e Província Amazônica (Subprovíncia do Alto Rio Branco, Subprovíncia do Jari-Trombetas, Subprovíncia do Rio Negro, e Subprovíncia da Planície Terciária com cinco setores: Oceânico, Sudeste, Setor Sul, Oeste, Sudoeste ou Acre). Esta divisão fitogeográfica foi reafirmada em Rizzini (1997).

Na década de 1960, outros sistemas de classificação fitogeográficos, para o território brasileiro, foram realizados, como o de Lima (1966), com nomenclatura fitogeográfica-fisionômica e regional, e o de Velloso (1966). Lima (1966) estabeleceu 24 categorias incluindo florestas, campos, dentre outros (Quadro 2.1). Já Velloso (1966) estabeleceu duas grandes categorias (classes de formação e tipos de vegetação), ambas com subdivisões (Quadro 2.2). Tanto no sistema de classificação de Lima (1966) quanto no de Velloso (1966), o Cerrado constituiu uma categoria extra à de campo.

Quadro 2.1 - Sistema de classificação fitogeográfica brasileira de Lima (1966)

Categorias fitogeográficas-fitofisionômicas	
1. Floresta de terra firme do baixo Amazonas	13. Florestas esclerófilas, caatingas amazônicas e floresta de restinga
2. Floresta de terra firme do alto Amazonas	14. Floresta xerófila; cerradão
3. Igapó	15. Cerrados
4. Floresta de várzea amazônica e lacustre	16. Mangues
5. Hileia bahiana	17. Mata seca; Mata de cipó; Agreste
6. Floresta sub-tropical	18. Caatinga arbórea densa e Agreste
7. Floresta de araucária	19. Caatinga arbustiva densa
8. Floresta costeira	20. Caatinga arbustiva esparsa
9. Floresta mesófila	21. Campinas de várzea
10. Floresta de babaçu	22. Campos limpos e Pampas
11. Floresta ciliar de carnaúba	23. Complexo do Pantanal
12. Floresta serrana	24. Complexos de Roraima e do Cachimbo

¹⁸ Com várias formações climáticas e endemismos de alto nível, como famílias, tribos e grupos afins.

¹⁹ Distingue-se pela posse de pelo menos uma formação-clímax e gêneros e espécies peculiares.

²⁰ Definido pela ausência de gêneros endêmicos e presenças de espécies notáveis.

²¹ Caracteriza-se por apresentar comunidades raras ou ausentes nas áreas circunvizinhas (serve para designar inclusões de uma vegetação dentro de outra mais ampla).

Quadro 2.2 - Sistema de classificação fitogeográfica brasileira de Veloso (1966)

Categorias fitogeográficas-fitofisionômicas	
I – Classes de formação - Floresta pluvial tropical 1. Perenifólia Amazônica de várzea 2. Perenifólia Amazônica de planície 3. Semicaducifólia amazônica e perenifólia sul bahiana - Floresta pluvial estacional 4. Perenifólia da encosta atlântica do Nordeste 5. Perenifólia da encosta atlântica do leste-sul 6. Perenifólia da encosta atlântica mista de palmares 7. Perenifólia do planalto centro-sul - Floresta caducifólia tropical 8. do Nordeste 9. do planalto Centro-Oeste 10. da baixada do Paraguai	- Floresta pluvial subtropical 11. Montana de Laureles (<i>Laurel Rainforest</i>) 12. Mista e Coniferales II – Tipos de vegetação 13. Caatinga 14. Cerrado 15. Campo limpo do planalto Centro-Sul 16. Campo limpo da Campanha gaúcha 17. Campo inundável (<i>overflow of prairie</i>) 18. Campo de altitude (<i>meadow</i>) - Tipos edáficos 19. Mangues-Dunas 20. Pantanal matogrossense

Na década de 1970, foi publicada a obra “Aspectos da vegetação do Brasil” de autoria de Romariz (1974). Nesta publicação, a autora forneceu uma visão mais global da distribuição das principais formações vegetais brasileiras e estabeleceu quatro formações vegetais para o território nacional: formações florestais (floresta latifoliada equatorial, floresta latifoliada tropical, floresta latifoliada tropical úmida da encosta, e mata de Araucária), formações herbáceas (ampos), formações complexas (cerrado, caatinga e complexo do Pantanal) e formações litorâneas (vegetação do litoral).

Nas décadas de 1970 e 1980, a fitogeográfica brasileira teve outra contribuição com a classificação produzida pelo Projeto Radambrasil (BRASIL, 1981), que estabeleceu um sistema fitogeográfico fitofisionômico-ecológico brasileiro com 12 categorias, sob a orientação de Henrique Pimenta Veloso e Luis Góes-Filho (Quadro 2.3).

Quadro 2.3 – Classificação fitogeográfica brasileira do Projeto Radambrasil (BRASIL, 1981)

Categorias fitofisionômico-ecológicas	
1. Savana (Cerrado e Campos Gerais) 2. Estepe (Caatinga e Campanha Gaúcha) 3. Savana Estépica 4. Vegetação Lenhosa Oligotrófica dos Planaltos 5. Floresta Ombrófila Densa 6. Floresta Ombrófila Aberta	7. Floresta Ombrófila Mista 8. Floresta Estacional Semidecidual 9. Floresta Estacional Decidual 10. Área das Formações Pioneiras 11. Área de Tensão Ecológica 12. Refúgios Ecológicos

Veloso e Góes-Filho (1982), a partir da classificação do Radambrasil, apresentaram a “Classificação fisionômica ecológica das formações neotropicais”, adaptada ao sistema universal, que incluiu as seguintes categorias:

- 1- Região ecológica da savana (Cerrado e Campo)
- 2- Região ecológica da estepe (Caatinga e Campanha Gaúcha)

- 3- Região ecológica da savana estépica (vegetação de Roraima)
- 4- Região ecológica da vegetação lenhosa oligotrófica pantanosa tropical
- 5- Região ecológica da floresta ombrófila densa (Floresta pluvial tropical)
Sendo da 1 à 5 com a subdivisão:
 - a – Arbórea densa
 - b – Arbórea aberta
 - c – Parque
 - d – Gramíneo-lenhosa
- 6- Região ecológica da floresta ombrófila Aberta (4 fâcies da Floresta Densa)
 - a – Das terras baixas
 - b – Submontana
 - c – Montana
- 7- Região ecológica da floresta ombrófila mista (Floresta das Araucárias)
 - a – Aluvial
 - b – Submontana
 - c – Montana
 - d – Alto montana
- 8- Região ecológica da floresta estacional semidecidual (Floresta Subcaducifólia)
- 9- Região ecológica da floresta estacional decidual (Floresta Caducifólia)
Da 8 à 9 com as subdivisões:
 - a – Aluvial
 - b – Das terras baixas
 - c – Submontana
 - d – Montana
- 10- Áreas das formações pioneiras
 - a – Com influência marinha
 - b – Com influência fluviomarinha
 - c – Com influência fluvial
- 11- Áreas de tensão ecológica (contato entre regiões)
 - 11.1 – Com misturas florísticas;
 - 11.2 – Com encaves florísticos
- 12- Refúgios ecológicos
- 13- Disjunções ecológicas

Na década de 1990, Veloso et al. (1991) estabeleceram uma nova classificação da vegetação brasileira, considerando seis sistemas:

I – Sistema fisionômico ecológico, com nove divisões:

1. Floresta ombrófila densa (Floresta Pluvial Tropical)

O termo “ombrófila densa” foi criado por Ellemberg e Miller Dombois (1965/66) e substituiu “pluvial” (de origem latina) por ombrófila (de origem grega), mas com o mesmo significado “amigo das chuvas” (VELOSO et al., 1991). É um tipo de vegetação caracterizado por fanerófitos (macro e mesofanerófitos), além de lianas e epífitos em abundância. Este tipo vegetacional foi dividido em cinco formações: Formação Aluvial; Formação de Terras Baixas; Formação Submontana; Formação Montana; e Formação Alto Montana (Figura 2.3).

Figura 2.3 - Floresta Ombrófila Densa. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

2. Floresta Ombrófila Aberta (Faciação da Floresta Ombrófila Densa)

Antes considerada como transição entre a floresta Amazônica e áreas extra-amazônicas. Possui quatro faciações florísticas: com cipó, com palmeira, com bambu e com sororoca (Figura 2.4).

Figura 2.4 - Floresta Ombrófila Aberta (Faciação da Floresta Ombrófila Densa). Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

3. Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária)

Conhecida como “Mata de Araucária ou Pinheiral”, é característica do planalto meridional e apresenta disjunções em refúgios nas serras do Mar e Mantiqueira. A

composição florística é dominada por *Drymis*, *Araucaria* e *Podocarpus*. Apresenta quatro formações distintas (Figura 2.5): Floresta Ombrófila Mista Aluvial, Floresta Ombrófila Sub-Montana, Floresta Ombrófila Montana e Floresta Alto Montana (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.5 - Floresta Ombrófila Mista. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

4. Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia)

Vegetação condicionada pela dupla sazonalidade climática: uma com intensas chuvas de verão seguidas por estiagens acentuadas e outra subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica resultante do intenso frio do inverno com temperaturas médias inferiores a 15°C, com quatro formações (Figura 2.6): Aluvial, Terras Baixas, Sub-Montana e Montana (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.6 - Floresta Estacional Semidecidual. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

5. Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia)

Caracterizada por duas estações climáticas bem marcadas: uma chuvosa seguida por um longo período biologicamente seco. Ocorre em forma de disjunções florestais, predominantemente caducifólias com mais de 50% dos indivíduos sem folhagem no período desfavorável e possui quatro formações (Figura 2.7): Aluvial, Terras Baixas, Sub-Montana e Montana (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.7 - Floresta Estacional Decidual. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

6. Campinarana (Campina)

Vegetação típica das bacias dos rios Negro, Orenoco e Branco. Região ecológica que ocorre nos solos Podzol Hidromórfico²² e Areias Quartzosa²³, com predominância florística de ecotipos amazônicos raquíticos com pelo menos um gênero monotípico endêmico, como por exemplo a *Barcella odora*, da família Palmae, de dispersão pantropical. Esta classe está dividida em três subgrupos de formação (Figura 2.8): Arbórea Densa ou Florestada, Arbórea Aberta ou Arborizada e Gramíneo-Lenhosa (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.8 - Campinarana. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

7. Savana (Cerrado)

Vegetação xeromórfa, preferencialmente de clima estacional com mais ou menos seis meses secos, podendo, não obstante, ser encontrada também em clima ombrófilo. Foi dividida em quatro subgrupos de formação (Figura 2.9): Florestada, Arborizada, Parque e Gramíneo-Lenhosa (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.9 - Savana. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

²² No sistema atual de solos EMBRAPA (SANTOS et al., 2006) Podzol Hidromórfico é Espodossolo.

²³ No sistema atual de solos EMBRAPA (SANTOS et al., 2006) Areias Quartzosas é Neossolo Quartzarênico.

8. Savana Estépica (Savana seca e/ou úmidas: Caatinga do sertão árido, Campos de Roraima, Chaco sul-matogrossense e Parque de espinilho da barra do rio Quari).

O termo foi empregado para denominar a área do “sertão árido nordestino”, com dupla estacionalidade climática, sendo uma área disjunta no norte do Estado de Roraima e duas outras áreas chaquenhais disjuntas (uma no extremo sul de Mato Grosso do Sul e outra na barra do rio Quari no Rio Grande do Sul). A Savana Estépica foi subdividida em quatro subgrupos de formação (Figura 2.10): Florestada, Arborizada, Parque, e Gramíneo-Lenhosa (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.10 - Savana Estépica. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

9. Estepe (Campos Gerais Planálticos e Campanha Gaúcha)

Área subtropical onde as plantas são submetidas à dupla estacionalidade climática (uma fisiológica devido ao frio e outra seca com déficit hídrico). Foi dividida em três subgrupos de formação em dois tipos de relevo (Figura 2.11): o pediplano gaúcho e o planalto meridional: Arborizada, Parque, e Gramíneo-Lenhosa (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.11 - Estepe. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

II – Sistema Edáfico de Primeira Ocupação (Formações Pioneiras)

São comunidades vegetais consideradas de primeira ocupação de caráter edáfico que ocupa terrenos rejuvenecidos pelas seguidas deposições de areias marinhas nas praias e restingas, os aluviões flúviomarinhas nas embocaduras dos rios e os solos aluviais e lacustres. As comunidades pioneiras são (Figura 2.12): comunidades de influência marinha (restinga), podendo estas serem herbáceas, arbustivas e arbóreas; comunidades de influência flúvio-marinha, podendo ser herbáceas e arbóreas (mangue); e, comunidades de influência fluvial podendo ser herbáceas, arbustivas e buritizal (VELOSO et al., 1991).

Figura 2.12 - Formações Pioneiras. Fonte: Adaptado de Veloso et al. (1991)

III – Sistema de Transição (Tensão Ecológica)

Entre duas ou mais regiões ecológicas ou tipos de vegetação. São comunidades indiferenciadas, onde as floras se interpenetram constituindo as transições florísticas ou contatos edáficos. Constituem ecótonos, que são uma mistura florística entre tipos de vegetação, e encraves, que são áreas disjuntas que se contactam (VELOSO et al., 1991).

IV – Sistema de Refúgios Vegetacionais (Relíquias)

Toda e qualquer vegetação floristicamente diferente e fisionômico-ecológica também diferente do contexto geral da flora dominante na região ecológica ou no tipo de vegetação. Muitas vezes, os refúgios constituem uma vegetação relíquia, como é o caso das comunidades localizadas acima de 1.800m de altitude (VELOSO et al., 1991).

V – Sistema da Vegetação Disjunta

Diferente de refúgio, disjunções são repetições, em escala menor, de um outro tipo de vegetação próximo que se insere no contexto da região ecológica dominante. Como por exemplo, duas vegetações são ecologicamente disjuntas, sendo uma por influência paleoclimática, como por exemplo as disjunções da floresta mista situadas nas serras da Mantiqueira e da Bocaina), e outra por influência pedológica, como por exemplo a savana – cerrado – dos tabuleiros costeiros do Nordeste e do vale do Paraíba do Sul (VELOSO et al., 1991).

VI – Sistema de Vegetação Secundária (tratos Antrópicos)

Inclui todas as comunidades secundárias brasileiras como:

- 1) Sucessão natural de várias fases: primeira da sucessão natural, segunda, terceira, quarta e quinta;
- 2) Uso da terra para a agropecuária tem várias finalidades como: agricultura, pecuária e reflorestamento e/ou florestamento (VELOSO et al., 1991).

Em 1992, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), que estabeleceu o sistema de classificação fitogeográfica vigente, cuja primeira meta foi o sistema de classificação fisionômico-ecológica e como segunda meta o sistema de classificação florística. Estabeleceu um sistema

primário e um sistema secundário. Pode-se dizer que é totalmente baseado no sistema de classificação de Veloso et al. (1991).

O sistema primário (ou natural) inclui todos os tipos de vegetação que estão organizadas em quatro grandes temas, ou seja, Regiões Fitoecológicas Brasileiras, Formações Pioneiras, Refúgios Vegetacionais e Faixas de Tensão Ecológica (IBGE, 1992), como se segue:

1 – Regiões Fitoecológicas

1.1 Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical)

1.2 Floresta Ombrófila Aberta

1.3 Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária)

1.4 Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia)

1.5 Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia)

a) Floresta Estacional Decidual Aluvial

b) Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas

c) Floresta Estacional Decidual Submontana

d) Floresta Estacional Decidual Montana

1.6 Campinarana (Campinas)

a) Florestada

b) Arborizada

c) Gramíneo-Lenhosa

1.7 Savana (Cerrado)

a) Savana Florestada

b) Savana Arborizada (campo cerrado)

c) Savana Parque

d) Savana Gramíneo-Lenhosa

1.8 Savana Estépica (Caatinga)

a) Savana Estépica Florestada

b) Savana Estépica arborizada

c) Savana Estépica Parque

d) Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa

1.9 Estepe (Campos Gerais Planálticos e Campanha Gaúcha)

a) Estepe Arborizada

b) Estepe Parque

c) Estepe Gramíneo-Lenhosa

2. Áreas de Formações Pioneiras

2.1 Vegetação com influência marinha (restinga)

2.2 Vegetação com influência flúvio marinha (manguezal e campo salino)

2.3 Vegetação com influência fluvial (comunidades aluviais) ao longo do litoral como nas planícies fluviais e ao redor das depressões aluvionares em terrenos instáveis cobertos de vegetação em constante sucessão. Trata-se de uma vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico.

3. Áreas de Tensão Ecológica (vegetação de transição)

3.1 Ecotonos (mistura florística entre tipos de vegetação)

3.2 Encraves (áreas disjuntas que se contactam)

4. Refúgios Vegetacionais (comunidades relíquias): toda e qualquer vegetação floristicamente diferente, como o caso de comunidades localizadas em altitudes acima de 1800m.

O sistema secundário (ou antrópico) inclui todas as comunidades secundárias brasileiras, isto é, são as áreas nas quais houve intervenções humanas para o uso da terra com finalidades diversas como mineração, agricultura, pecuária e descaracterização da vegetação primária. Estas áreas, após serem abandonadas do uso antrópico, reagem de acordo com o tempo e o uso, mas a vegetação que surge sempre reflete os parâmetros ecológicos do ambiente por meio do processo de sucessão ecológica natural. Tal processo tem várias fases (primeira, segunda, terceira, quarta e quinta fases).

Além da sucessão ecológica natural, existem os usos da terra pela agropecuária que incluem agricultura e pecuária (pastagem) e pelo reflorestamento, como por exemplo de *Eucalyptus* e de *Pinus* (IBGE, 1992).

Outras classificações com o sentido de regionalização do território brasileiro podem ser citadas por terem como um dos seus critérios de estabelecimento a vegetação, como é o caso dos Domínios Morfoclimáticos (AB' SABER, 1971; 2003), Biomas (IBAMA, 2012) e Ecorregiões (DINNERSTEIN, 1995).

Percebe-se que não há um consenso para a nomenclatura regional do Cerrado na literatura científica, que ora é considerado domínio, ora bioma, e mais recentemente ecorregião. A esse respeito já existem discussões na literatura científica e as principais discussões giram em torno dos termos domínio e bioma, tendo sido realizadas por Coutinho (2006) e Batalha (2011), que consideram o Cerrado como um domínio.

Segundo Ab'Saber (1971, 2003), o território brasileiro, tendo em vista a sua magnitude espacial, comporta um mostruário bastante completo das principais paisagens e ecologias do mundo tropical. Ele reconheceu seis grandes domínios paisagísticos e macroecológicos em nosso país, quais sejam, Amazônico (domínio das terras florestadas da Amazônia), Cerrado (chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas-galeria), Mares de Morros (áreas mamelonares tropicais-atlânticas florestadas), Caatingas (depressões intermontanas e interplanálticas semiáridas), Araucárias (planaltos subtropicais com araucárias) e Pradarias (coxilhas subtropicais com pradarias mistas), existindo entre estes, as faixas de transição (Figura 2.13).

Figura 2.13 – Domínios morfoclimáticos brasileiros. Fonte: Ab' Saber, 2003

Estes grandes domínios foram definidos pelos principais quadros de vegetação e por feições morfoclimáticas de grande extensão e generalidade. Cada um deles apresenta padrões de paisagens, de caráter sub-regional e eventuais enclaves de paisagens exóticas, sob a forma de recorrência de paisagens vegetais relacionadas a outros domínios de paisagem vegetal (AB'SABER, 1971).

Considerando escalas regionais, outra classificação foi estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), resultando no Mapa de Biomas do Brasil como produto do termo de cooperação assinado entre o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente em agosto de 2003. Os biomas brasileiros são: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa (Figura 2.14).

Figura 2.14 – Mapa de biomas brasileiros. Fonte: http://www.brasil.gov.br/infograficos/biomas-brasileiros/image_galeria5. (Acesso: 22 jul. 2013)

Bioma é conceituado como um “conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria”²⁴.

Segundo Arruda et al. (2008) e com o objetivo de conservação da biodiversidade brasileira, uma ação conjunta em 1998 do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente (MMA) e as principais organizações não governamentais (ONGs) de cunho conservacionista e atuantes no Brasil (World Wildlife Fund - WWF, The Nature Conservance - TNC, *Conservation*

²⁴ Disponível em: < <http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-territorio/biomas> >. Acesso em 22 jul. 2013.

International - CI - e Biodiversitas) resultou na divisão dos biomas brasileiros em 33 ecorregiões²⁵, tendo como base a metodologia de Dinerstein et al. (1995). Depois, outro estudo de 2003, também coordenado pelo IBAMA, sugeriu a divisão dos mesmos biomas em 74 ecorregiões, sendo o Cerrado subdividido em 22 ecorregiões.

Também de acordo com Arruda et al. (2008), o Cerrado pode ser subdividido em 22 ecorregiões, o que mostra uma grande diversidade de ambientes físicos (Figura 2.15).

Figura 2.15– Mapa das 22 ecorregiões do Cerrado. Fonte: Arruda et al. (2008)

Em estudo específico para apenas a área contínua do Cerrado, Pinheiro et al. (2008) sugeriram 21 ecorregiões (Figura 2.16).

²⁵ Ecorregião: “Um conjunto de comunidades naturais, geograficamente distintas, que compartilham a maioria das suas espécies, dinâmicas e processos ecológicos, e condições ambientais similares, nas quais as interações ecológicas são críticas para sua sobrevivência em longo prazo” (DINERSTEIN ET al., 1995).

Figura 2.16 – Ecorregiões no Cerrado contínuo. Fonte: Pinheiro et al. (2008)

Como se pôde constatar, somente a partir de meados do século XX, com Santos (1943), o Cerrado estabeleceu-se nos sistemas de classificação das floras do Brasil, com a denominação de “Cerrado”, evidenciando o avanço e a ampliação da visão dos geobotânicos do país, nas suas propostas de regionalização fitogeográfica, pois antes dessa época estava sempre inserido em uma divisão espacialmente mais abrangente, na categoria campestre, o que é uma herança dos naturalistas do século XIX que, em suas descrições de viagens ao Brasil Central, o Cerrado era concebido como campo por se tratar de uma vegetação mais aberta, diferente da Mata Atlântica (primeira impressão da vegetação brasileira aos estrangeiros que chegavam ao Brasil); o termo Cerrado apareceu nas descrições dos campos quando estes se apresentavam mais fechados, a exemplo dos escritos de Warming : “A três ou quatro dias de Lagoa Santa, a vegetação tornou-se mais abundante e, em volta de Lagoa Santa, havia muitos campos cerrados, isto é, sobretudo campos fechados” (KLEIN, 2002, p. 69).

2.2.3. Fitogeografia do Cerrado

O Cerrado constitui um dos domínios morfoclimáticos na classificação de Ab’Saber (1971; 2003) e conta com muitos estudos que estabeleceram classificações fitofisionômicas.

Dentre os viajantes naturalistas que adentraram o Brasil Central, somente com Löfgren (1898 apud WALTER, 2006, p.69)²⁶ é que o termo “Cerrado” passou a ser empregado como fisionomia, havendo, portanto, a primeira adoção formal da palavra “cerrado”, com o sentido fitofisionômico, que se mantém até hoje, e o estabelecimento da primeira sequência clássica em uso atual: Cerradão (*caatanduva*), Cerrado (propriamente dito) e Campo Cerrado (*caatininga*) como se pode observar nos seus escritos:

“Os Cerrados pouco se distingue dos Cerradões, e suas principais diferenças consistem no porte menor das árvores que são ali mais contorcidas; no aumento dos vegetais de casca suberosa e folhas coriáceas e na maior quantidade de plantas herbáceas. Formam a transição para o Campo Cerrado, ou caatininga, onde há ainda maior quantidade de plantas herbáceas, árvores mais baixas e contorcidas ainda tornando-se cada vez mais espaçada a vegetação alta, começando pouco a pouco, a predominância dos vegetais sublenhosos até transformar-se na vegetação particular e característica do Campo Limpo”. (LÖFGREN, 1898 apud WALTER, 2006, Capítulo 2, p. 69)¹⁵.

No século XIX, além de Löfgren, Warming (1973)²⁷ deu importantes contribuições para o conhecimento a respeito da flora do Cerrado com seus estudos em Lagoa Santa (MG). Parte da sua obra é relacionada aos campos, cujos estudos deveriam ser em três degraus: a) a vegetação herbácea e subarbustos; b) os arbustos; c) as árvores. Foi o primeiro a relacionar o termo savana ao Cerrado: “Os brasileiros chamam essa paisagem de Campo, isto é, campo de gramíneas; os espanhóis a chamam Savana” (KLEIN, 2002, p. 67).

Após isso, existiram outras tentativas de estabelecer uma classificação fitofisionômica para o Cerrado brasileiro, dentre elas a de Eiten (1993), que estabeleceu tipos de interflúvio com ocorrência de cerrado (cerradão, cerrado sentido restrito, campo cerrado, campo sujo, e campo limpo), floresta mesofítica de interflúvio, campo rupestre, campos litossólicos miscelâneos, vegetação de afloramento de rocha maciça; e tipos associados a cursos d’água como florestas galeria e florestas de encosta associadas, buritizais e veredas, campo úmido, brejos permanentes, pantanal, e plantas aquáticas e brejeiras.

Ferri (1977) distinguiu diferentes tipos de cerrado no território brasileiro, estando estes agrupados em duas principais áreas, a área *core*, essencialmente de cerrados no Planalto Central (Estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, e Minas Gerais), e a área periférica no Norte (região Amazônica), no Nordeste (região das caatingas) e no Sul, ocorrendo seus últimos vestígios no Paraná. Ferri reconheceu também áreas reduzidas de cerrado em Rondônia, Paraíba e Pernambuco. Ele descreveu a vegetação de cerrado em três grupos: o das

²⁶ Löfgren, A. **Ensaio para uma distribuição dos vegetais nos diversos grupos florísticos no estado de São Paulo**. São Paulo, 1898.

²⁷ Obra reeditada a partir do original de 1892.

plantas permanentes, que reúne todas as árvores e muitos arbustos que possuem sistemas radiculares profundos (*Anacardium pumilum* e *Andira humilis*); o das espécies efêmeras composto pelas plantas herbáceas (*Ipomoea procumbens*, *Gomphrena prostata*, *Vernonia grandiflora*); e o grupo das gramíneas que podem ser permanentes ou efêmeras, dependendo da duração do seu ciclo de vida.

Ferri (1977) também descreveu a vegetação arbustivo-arbórea do cerrado com características bem peculiares, como a presença de galhos tortuosos, casca grossa, folhas coriáceas, de superfície brilhante, com aspectos de envernizadas ou revertidas por pelos ou escamas, e de viverem em um ambiente com escassez de água. Mas, igualmente chamou atenção para a existência de espécies que não possuem características de adaptação às condições de seca, como é o caso de *Tocoyena formosa*, *Kielmeyera coriacea*, dentre outras; *Dimorphandra mollis* e *Stryphnodendron barbadetinum*, por exemplo, que possuem um limbo enorme, dividido e subdividido em folíolos mais ou menos numeroso; e, ao fato de muitas espécies produzirem muitas flores e brotos vegetativos em plena estação seca, antes das chuvas.

Coutinho (1978) considerou o cerrado *lato sensu* como um complexo de formações oreádicas, que inclui três biócoros: biócoro de campo composto pelas formações campestres (campo limpo); biócoro de savana composto pelas formações savânicas ecotonais (campo sujo, campo cerrado, cerrado *stricto sensu*); e biócoro de floresta com formação florestal (cerradão).

Rizzini (1979), tratando da vegetação brasileira, ao se referir à área do cerrado, mencionou matas secas, cerradão, savana (termo análogo para o cerrado), reconhecendo quatro tipos de savanas, com: estrato arborescente com 8-20 m de altura e cobertura arbórea raramente de 40%; estrato arbustivo com 2-7 m, mais denso, podendo alcançar 60% de cobertura; estrato herbáceo superior, até 2,5 m, com gramíneas, subarbustos e arbustos pequenos, chegando a 100% de cobertura na estação favorável; e, estrato herbáceo inferior, chegando a 1 m de altura, dominado por gramíneas, ciperáceas e leguminosas. Este mesmo autor também reconhecer a existência de campo limpo da área central ou campos centrais de ocorrência em Minas e Goiás ou da periferia (Mato Grosso, São Paulo e Bahia), distinguindo cinco tipos: a) campo ferruginoso que inclui campo de canga couraçada e campo de canga nodular; b) campo quartzítico, sendo campo quartzítico com gramíneas, campo quartzítico com gramíneas e subarbustos, e campo quartzítico das afloramentos; c) campos gerais, campo planáltico; d) campo arbustivo.

Ribeiro et al. (1983) consideraram as fisionomias de mata de galeria, mata mesofítica, cerradão, cerrado (cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, parque cerrado, e vegetação rupestre de altitude), campo sujo, campo limpo e vereda, cujos parâmetros para diferenciação entre as fitofisionomias foram: a estrutura da vegetação (altura, estratificação, percentagem de cobertura arbórea) e as características do solo (grau de umidade, profundidade e afloramento de rochas).

Radambrasil, publicado em Veloso et al. (1991), estabeleceu uma Região Ecológica da Savana, incluindo Cerrado e Campo com fisionomias arbórea densa, arbórea aberta, parque e gramíneo-lenhosa. Veloso et al. (1991) e IBGE (1992) adotaram também o termo Savana para o Cerrado, com a seguinte classificação: Savana florestada (cerradão), Savana arborizada (campo cerrado), Savana parque (parque cerrado) e Savana gramíneo-lenhosa (campo), como já descrito anteriormente.

Mais recentemente, Ribeiro e Walter (1998; 2008) adotaram e ampliaram a classificação definida por Ribeiro et al. (1983), que utilizou uma nomenclatura mais simples e termos regionais consagrados, em que os critérios adotados para diferenciar os tipos fitofisionômicos foram baseados na fisionomia (forma), que é definida pela estrutura, pelas formas de crescimento dominantes e por possíveis mudanças estacionais. Este autores também consideraram os aspectos do ambiente (fatores edáficos) e a composição florística, descrevendo 11 tipos fitofisionômicos gerais inclusos em: formações florestais (mata ciliar, mata galeria, matas secas e cerradão); formações savânicas (cerrado sentido restrito, parque cerrado, palmeirais e veredas); e, em formações campestres (campo sujo, campo limpo e campo rupestre). Muitos dos tipos gerais apresentam subtipos.

Haidar et al. (2013) reconheceram apenas três regiões fitoecológicas para o Estado do Tocantins (Florestas, Savanas e Formações Pioneiras), com cerca de 20 tipos de vegetação (fitofisionomias), e destacam a dominância do Cerrado *Stricto Sensu*, além de encaves e ecótonos.

1- Florestas:

1.1 - Floresta Estacional Semidecidual (Aluvial; Terras Baixas, Submontana; Montana);

1.2 - Floresta Estacional Decidual (Submontana; Montana)

2- Savana (Cerrado):

2.1 - Savana Florestada (Cerradão)

2.2 - Savana Arborizada

- Cerrado Denso com Mata de Galeria e Cerrado Denso sem Mata de Galeria

- Cerrado Típico com Mata de Galeria e Cerrado Típico sem Mata de Galeria
- Cerrado Rupestre com Mata de Galeria e Cerrado Rupestre sem Mata de Galeria
- Cerrado Inundável com Mata de Galeria e Cerrado Inundável sem Mata de Galeria

2.3 - Savana Parque

- Parque Cerrado Inundável com Murundu
- Campo Sujo Seco e Campo Sujo Úmido
- Cerrado Ralo com Mata de Galeria e Cerrado Ralo sem Mata de Galeria

2.4 - Savana Gramíneo-lenhosa

- Campo Limpo Seco, Campo Limpo Úmido e Campo Limpo com Murundu

3 – Formação Pioneira

3.1 – Formação Fluvial Lacustre

4 – Áreas de Contato (Encrave)

- Cerrado/ Floresta Estacional

5- Áreas de Contato (Ecótono)

- Floresta Estacional/Floresta Ombrófila

O Cerrado no Estado do Tocantins está dentre as regiões fitoecológicas na regionalização estabelecida por SEPLAN (2012) e ocupa maior área do Estado (181.092,423 km² – 65,23%) seguido pela Floresta Estacional (36.350,441 km² – 13,09%), Enclave Cerrado/Floresta Estacional (21.460,361 km² – 7,73%), Ecótono Floresta Estacional/Floresta Ombrófila (19.638,205 km² -7,07%), Floresta Ombrófila (14.706,479 km² – 5,30%), e Enclave Cerrado/Floresta Ombrófila (616,232 km² – 0,22%) (Figura 2.18).

Em termos comparativos com outros trabalhos que quantificam áreas para a vegetação do Tocantins, utilizou-se SEPLAN (2012) para esta comparação (Figura 2.17; Tabela 2.1).

Figura 2.17 - Regiões fitoecológicas do Estado de Tocantins. Fonte: SEPLAN (2012)

Trabalhos envolvendo mapeamentos do Cerrado atribuem outros valores de áreas para tipos de formação vegetal para o Estado do Tocantins, como por exemplo, Machado et al. (2004) e Sano et al. (2007), como pode ser visto na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 - Tipos de formação vegetal para o Estado do Tocantins segundo fontes diferentes.

Machado et al. (2004)			Sano et al. (2007)			SEPLAN (2012)		
Tipo	Área	%	Tipo	Área	%	Tipo	Área	%
A	25.057,9km ²	9%	FF	50.115,73 km ²	18%	C	181.092,423 km ²	65%
C	253.362,8km ²	91%	FS	144.778,76 km ²	52%	FE	36.350,441 km ²	13%
			FC	25.057,86 km ²	9%	EC/FE	21.460,361 km ²	8%
			CA	58.468,35 km ²	21%	EFE/O	19.638,205 km ²	7%
						FO	14.706,479 km ²	5%
						EC/FO	616,232 km ²	0,2%
Total	278.420,7km ²	100%		278.420,7 km ²	100%		273.864,141km ²	100%

Obs.: A=Amazônia; C=Cerrado; FF=Formação Florestal; FS=Formação Savânica; FC=Formação Campestre; CA=Cobertura Antrópica; FE=Floresta Estacional I; EC/FE=Encrave Cerrado/ Floresta Estacional; EFE/O=Ecótono Floresta Estacional/Floresta Ombrófila; FO=Floresta Ombrófila; EC/FO=Encrave Cerrado/Floresta Ombrófila).

Com relação a essas divergências entre áreas apresentadas por Machado et al. (2004) e Sano et al. (2007), estes últimos explicaram que é necessário considerar que as propostas possuem critérios e sistemas de classificação regionais diferentes. Outro fator a considerar é a escala e a data das imagens orbitais utilizadas no mapeamento, assim como o sensor gerador dessas imagens. O mesmo pode-se justificar em relação à SEPLAN (2012).

Considerando o exposto a respeito das regionalizações nas diversas escalas, os esboços de regionalização são bastante diversos e, ao longo do tempo, mostraram mudanças acompanhando a evolução científica e tecnológica e de ocupação humana, passando de estudos de fitogeografia com focos florísticos e ou fisionômicos em escalas mundiais, que tiveram início no século XVIII, a estudos fitogeográficos regionais, atualmente, mais detalhados com categorias fitofisionômicas em uma escala de paisagem. Em se tratando do Cerrado, considerando-se o avanço da fitogeografia brasileira, as classificações atuais têm mostrado cada vez mais a riqueza de padrões florísticos e estruturais desse domínio, província, bioma ou ecorregião.

2.3. Campo Sujo

Como exposto anteriormente, Sampaio (1932) comentou que na flora brasileira, assim como na América do Sul, domina a vegetação campestre, que no Brasil está presente desde o

norte da Amazônia ao Arroio Chuí; porém sua área principal é no Brasil Central, ou seja, a zona dos “Campos” e “zona Oreades” de Martius.

Barbosa et al. (1993), ao estudarem elementos da paleogeografia no que se refere à oscilação climática e a presença do homem pré-histórico no sudoeste de Goiás, delinearão subsistemas do passado e destacaram o grande significado dos campos no período mais antigo da ocupação humana. Para esses autores, no final do Pleistoceno e início do Holoceno, os campos deveriam abranger uma área maior que a atual, de modo a ter se expandido pelas áreas hoje ocupadas pelo cerrado. Eles acreditam que na evolução paisagística, os campos sejam mais antigos, que foram gradativamente invadidos pela vegetação de arbustos maiores e pelo cerrado, e que a parte de campos hoje existente deve estar condicionada a microclimas atuais que não se refizeram totalmente das agressões climáticas do Quaternário, sendo vestígios de áreas que ocuparam espaços maiores e dominantes na paisagem final do Pleistoceno.

No Brasil Central, ocorrem campos sujos, campos limpos e campos rupestres (RIBEIRO; WALTER, 2008). O campo sujo, objeto desta tese, tem sido pouco estudado e os trabalhos realizados, em geral, têm uma abordagem florística, fenológica ou estrutural e se concentram na região Sudeste e no Distrito Federal.

Oliveira-Filho e Fluminhan-Filho (1999) estudaram a ecologia da vegetação do Parque Florestal Quedas do Rio Bonito, sul de Minas Gerais, com o propósito de classificar, mapear e descrever os tipos fisionômicos da vegetação, dentro de uma abordagem interpretativa, na qual as variações da vegetação são associadas a variações ambientais. Estes autores reconheceram cinco tipos fisionômicos: floresta, candeal, cerrado, campo de altitude e campo rupestre; também verificaram que a distribuição dos mesmos na paisagem obedece basicamente à conjunção de dois fatores: o regime de água nos solos e a frequência de incêndios.

Munhoz (2003) estudou os padrões de distribuição sazonal e espacial das espécies do estrato herbáceo- subarbustivo em comunidades de campo limpo úmido e de campo sujo com o objetivo de analisar a florística, a fitossociologia, a fenologia e o relacionamento entre a composição da comunidade e as variáveis ambientais. O estudo de campo sujo foi realizado na Fazenda Água Limpa (Brasília - DF) e de campo limpo, na Fazenda Água Fria (Alto Paraíso de Goiás - GO). O campo sujo apresentou uma grande riqueza florística de 264 espécies distribuídas em 141 gêneros e 45 famílias, sendo Asteraceae, Poaceae, Leguminosae e Rubiaceae as que apresentaram maior número de espécies. No campo limpo úmido, foram

encontradas 190 espécies em 95 gêneros e 37 famílias, sendo que as famílias de maior número de espécies foram: Poaceae, Cyperaceae, Asteraceae e Polygalaceae. A maioria dos gêneros amostrados apresentou uma única espécie, sugerindo uma alta diversidade genérica nessas fisionomias. Quanto à fenologia, a floração no campo limpo úmido apresentou a distribuição apenas na estação chuvosa; a produção de frutos foi também maior no período chuvoso. No campo sujo, a floração ocorreu distribuída por todo o período estudado (abril de 2000 a março de 2001), com concentração das espécies florescendo na estação chuvosa. Segundo a autora, são necessários mais estudos da camada rasteira de cerrado para ampliar o conhecimento sobre a distribuição de suas espécies e dos fatores ambientais determinantes de seus padrões de distribuição espaciais e sazonal.

Tannus e Assis (2004) estudaram a composição de espécies vasculares de campo sujo e campo úmido em área de cerrado em Itirapina (SP). Eles amostraram 384 espécies, 211 gêneros e 76 famílias de plantas vasculares. Do total de espécies, 255 foram consideradas exclusivas do campo sujo e 114 do campo úmido. Apenas 10 espécies tiveram ocorrência comum entre as duas fisionomias. Dentre as famílias mais ricas do campo sujo, destacaram-se: Asteraceae, Leguminosae e Poaceae. No campo úmido, as famílias mais ricas foram: Cyperaceae, Poaceae, Lentibulariaceae e Eriocaulaceae. No campo sujo, o componente herbáceo-subarbustivo prevaleceu sobre o arbustivo-arbóreo numa proporção de 3,6:1. No campo úmido, foram encontradas apenas espécies herbáceo-subarbustivas. O estudo revelou acentuadas distinções florísticas entre o campo sujo e o campo úmido, tendo em vista o reduzido número de espécies compartilhadas.

Tannus et al. (2006) estudaram a fenologia reprodutiva em campo sujo e campo úmido em uma área de cerrado em Itirapina (SP). As espécies vegetais do Cerrado apresentaram variações periódicas nos padrões de crescimento e reprodução, fortemente relacionados com a sazonalidade climática. Em ambas as fitofisionomias, os padrões fenológicos foram, em geral, significativamente sazonais, usualmente com pico na estação úmida, mas diferiram de acordo com o hábito e modo de dispersão. Tais diferenças foram relacionadas às características ambientais de cada fisionomia, especialmente ao regime hídrico dos solos. O hábito das espécies mostrou grande influência nos padrões fenológicos observados e os padrões de frutificação nem sempre se relacionaram aos modos de dispersão, como observado em outras fisionomias do Cerrado, ressaltando a importância do desenvolvimento de estudos fenológicos detalhados em campo sujo e campo úmido.

Munhoz e Felfili (2006) investigaram a fenologia do estrato herbáceo-subarbusivo de uma comunidade de campo sujo na Fazenda Água Limpa (Brasília - DF), com o objetivo de avaliar a influência das mudanças sazonais sobre a fenologia vegetativa (foliação) e reprodutiva (floração e frutificação) do componente herbáceo. A floração na comunidade apresentou-se distribuída por todo o período de um ano estudado (nov./1999 a dez./2000), com concentração na estação chuvosa. O período de produção de frutos foi similar ao de produção de flores e a maioria das espécies amadureceu seus diásporos do meio da estação chuvosa até o fim da seca. Na estação seca, houve grande percentagem de espécies com folhas secas. No entanto, nem todas as espécies secaram completamente suas folhas nesse período, sendo que 3,2% produziram folhas novas e 31% mantiveram suas folhas verdes. Os eventos vegetativos e reprodutivos das plantas da camada herbáceo-subarbusiva mostraram-se dependentes da pluviosidade.

Também Munhoz e Felfili (2006) estudaram a fitossociologia do estrato herbáceo-subarbusivo de uma área de campo sujo na Fazenda Água Limpa (Brasília - DF) em diferentes períodos de amostragem. Foram amostradas 163 espécies, incluídas em 78 gêneros e 39 famílias. As famílias mais importantes foram: Poaceae (25), Asteraceae (22), Fabaceae (18), Rubiaceae (11), Lamiaceae (9) e Myrtaceae (9), somando 57,67% das espécies amostradas. As famílias com maiores porcentagens de cobertura foram: Poaceae, Myrtaceae, Asteraceae, Fabaceae e Euphorbiaceae. A família mais importante foi Poaceae, com 67,04% de cobertura. *Andropogon leucostachyus*, *Arthropogon villosus*, *Baccharis humilis*, *Echinolaena inflexa* e *Leptocoryphium lanatum* estiveram entre as dez principais espécies em porcentagem de cobertura nesta família. A similaridade de Sørensen foi alta, entre 0,60 e 0,69, provavelmente devido à homogeneidade do solo da área. A similaridade entre os cinco períodos de inventário também foi alta, pois as espécies mais importantes variam pouco em suas taxas de cobertura ao longo do ano.

Amaral (2008) estudou as mudanças estruturais e florísticas do estrato herbáceo-arbusivo em campo sujo e campo limpo úmido na fazenda Água Limpa (Brasília - DF) entre 2000 e 2007. Foram registradas 509 espécies em 220 gêneros e 64 famílias para as duas comunidades no levantamento florístico. No inventário fitossociológico, foram amostradas, para as mesmas comunidades, 253 espécies em 150 gêneros e 46 famílias. No campo sujo, foram registradas 295 espécies em 153 gêneros e 46 famílias. As famílias de maior ocorrência foram: Asteraceae (57), Poaceae (40), Fabaceae (34), Myrtaceae (16), Rubiaceae (14), Malpighiaceae (12), Melastomataceae (11), e Lamiaceae (10). Foi constatada a redução de 9%

nas espécies herbáceas e um aumento de 16% nos subarbustos. A similaridade florística pelo índice de Sørensen entre os dois períodos foi alta (60%). A autora concluiu que a lenta substituição na composição das espécies sugere que as espécies de campo sujo estão sob influência das alterações ocorridas, devido à falta da frequência de distúrbios com o fogo ocorrido no primeiro levantamento.

Araújo et al. (2012) estudaram a composição florística e estrutura fitossociológica de áreas de campo sujo e cerrado sentido restrito na Floresta Nacional de Silvânia (GO), com o objetivo de analisar a estrutura fitossociológica das vegetações de cerrado sentido restrito e campo sujo da unidade de conservação. Foram registradas 60 espécies em 46 gêneros distribuídas em 28 famílias, sendo 52 espécies no cerrado sentido restrito e 27 no campo sujo. As famílias que apresentaram mais espécies foram: Malpighiaceae (7), Fabaceae (6) e Vochysiaceae (5). As espécies com maior Índice de Valor de Importância foram: *Qualea grandiflora*, *Kielmeyera coriacea* e *Styrax ferrugineus* para o sentido restrito, e *S. ferrugineus*, *Piptocarpha rotundifolia* e *Erythroxylum deciduum* para o campo sujo. No cerrado sentido restrito, a densidade e área basal foram de 1125 indivíduos/ha e 5,32 m²/ha respectivamente. Já no campo sujo, foram 730 indivíduos/ha e 1,96 m²/ha. O índice de Shannon (H') encontrado para o cerrado sentido restrito foi de 3,48, e para o campo sujo 2,91, valores que evidenciam uma alta diversidade de espécies para a área em estudo.

Giácomo et al. (2013) estudaram a florística e a fitossociologia em áreas de campo sujo e cerrado *stricto sensu* com o objetivo de caracterizar a florística e calcular os parâmetros fitossociológicos das espécies presentes nestas duas áreas na Estação Ecológica de Pirapitinga (Morada Nova de Minas - MG). Nas duas áreas de estudo, foram amostrados um total de 3.224 indivíduos distribuídos em 81 espécies, 70 gêneros e 40 famílias. As famílias mais ricas foram Fabaceae e Vochysiaceae. O cerrado foi a formação vegetal com maior riqueza de espécies (81) e maior densidade (2.257 ind ha⁻¹). Na área de campo sujo, a densidade absoluta foi de aproximadamente 926 ind ha⁻¹. As espécies com as maiores densidades absolutas foram: *Miconia burchellii*, *Qualea parviflora*, *Heteropterys byrsonimifolia*, *Salvertia convallariaeodora*, com 91,25, 78,75, 77,50, 62,50 ind. ha⁻¹, respectivamente. As dez espécies com os maiores valores de importância (VI) foram: *Qualea parviflora*, *Salvertia convallariaeodora*, *Miconia burchellii*, *Heteropterys byrsonimifolia*, *Byrsonima coccolobifolia*, *Bowdichia virgilioides*, *Miconia ferruginata*, *Acosmium dasycarpum*, *Curatella americana* e *Vatairea macrocarpa*, representando 55,40 % do total do VI encontrado. Ambas as áreas estudadas apresentaram alta diversidade e baixa dominância

ecológica e possuem distribuição diamétrica em forma de J-invertido, indicando o predomínio de indivíduos jovens.

Esta informação teórica levantada que perpassa pela história da paisagem na Geografia, a sistemática fitogeográfica e o Cerrado, e o Campo Sujo tem a finalidade de fundamentar cientificamente este trabalho, que faz uma análise da paisagem e do Campo Sujo Seco (um tipo de vegetação do Cerrado), com uma abordagem biogeográfica, e dará suporte às etapas seguintes do trabalho como a caracterização da área de estudo, os procedimentos metodológicos e a discussão dos resultados.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

A bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, localiza-se no município de Palmas - TO. A capital Palmas foi implantada em 1990 logo após a criação do Estado do Tocantins pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), em uma área de 1.056,10 km² (0,29% do Estado) do recém-emancipado, na época, município de Taquaruçu, passando este à condição de distrito de Palmas. O seu nome foi escolhido em homenagem a Comarca de São João da Palma, sede do primeiro movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do Rio Palma com o Rio Paranã. Outro fator que influenciou o nome foi a grande quantidade de palmeiras na região (MIRANDA, 2007).

O povoamento do Tocantins, embora só Estado a partir de 1988, é um processo que se iniciou entre 1633 e 1658 com a chegada dos jesuítas (MIRANDA, 2007). A mineração aurífera do século XVIII fez surgir vários arraiais mineradores que deram origem às cidades de Natividade (1734); Pontal (1738), arraial que está na origem do arraial de Porto Real do Pontal, época do Reinado, depois Porto Imperial, época do Brasil Monárquico e, finalmente Porto Nacional, a partir da proclamação da República no Brasil; Arraias (1730); Arraial do Carmo, hoje cidade de Monte do Carmo (1746), além de outras cidades tocantinenses que se tornaram históricas (MIRANDA, 2007). Nos fins do século XIX a ocupação do norte de Goiás, hoje Tocantins, adquiriu um caráter mais sistemático, iniciando a história dos conflitos pela posse da terra. Esse processo de ocupação foi acentuado no início do século XX e se intensificou com a implantação de grandes projetos, principalmente com a construção da rodovia Belém-Brasília. Após muitos anos de luta do povo em busca da autonomia do Tocantins (CAVALCANTE, 2003), Palmas surge de um descampado no meio do Cerrado (MIRANDA, 2007).

A bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande pertencente à bacia do rio Tocantins, está localizada na região centro-sul do município de Palmas (Figura 3.1), entre as coordenadas geográficas de 10° 10'33" e 10° 25'18" de latitude sul e 48° 03'57" e 48°23'03" de longitude oeste. Possui uma área de 46.177,47 hectares, o que representa 20% da área total do município, sendo 73,67% da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Lajeado. Esta APA foi criada pela Lei n. 906, de 20 de maio de 1997, constituindo-se de uma gleba de terras com 121.417,7659 hectares, situada nos municípios de Palmas, Aparecida do Rio Negro,

Tocantínia e Lajeado do Tocantins, incluindo a Serra do Lajeado, o vale do ribeirão Lajeado e a Serra do Carmo (UNITINS, 1999).

Figura 3.1 – Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas e no Estado do Tocantins (Organização: T. C. C. Medeiros e A. D. S. Andrade)

3.1.1 Clima

Pelo método de Thornthwaite, a regionalização climática Estado do Tocantins inclui os tipos climáticos (SEPLAN, 2012):

- úmido: B1wA'a', clima úmido com moderada deficiência hídrica, e B1wA'a', clima úmido com pequena ou nula deficiência hídrica;
- úmido subúmido: C2r2A'a', clima úmido subúmido com pequena deficiência hídrica, e C2wA'a'', clima úmido subúmido com moderada deficiência hídrica.

A bacia do ribeirão Taquaruçu Grande está dentro da faixa de clima úmido subúmido, tipo C2wA'a'', clima úmido subúmido com moderada deficiência hídrica (SEPLAN, 2012).

O clima C2wA'a'' é um clima úmido subúmido com moderada deficiência hídrica no inverno. A evapotranspiração potencial média anual é de 1.500 mm, distribuindo-se no verão em torno de 420 mm ao longo de três meses consecutivos com temperatura mais elevada. A precipitação média anual é de 1.700 a 1.800 mm e a temperatura do ar média anual é de 28°C (SEPLAN, 2012).

O diagrama climático para a estação meteorológica de Palmas - TO, a 280 m de altitude, com base nos dados climáticos de temperatura e precipitação para uma série temporal de 19 anos (INMET)¹, mostra o clima com estacionalidade definida, início da estação chuvosa em setembro e início da estação seca entre maio e junho (Figura 3.2), que perdura por todo inverno. As chuvas mais intensas ocorrem no período de outubro a abril com índices pluviométricos acima de 100 mm. Janeiro, fevereiro e março são os meses mais chuvosos (chuvas de verão), quando a pluviosidade atinge valores em torno de 200 mm, com média anual de 1648 mm.

A temperatura média anual foi de 26,7°C, com temperaturas mais frias nos meses mais chuvosos e nos meses de junho e julho por influência do inverno no hemisfério sul. A temperatura mínima absoluta do período foi 15°C (médias das temperaturas mínimas, 21,1°C), e a temperatura máxima absoluta 38,6°C (média das máximas, 32,8°C) (Figura 3.2).

¹ Disponível em < www.inmet.gov.br >. Acesso em: 20/12/2012.

Figura 3.2 – Diagrama climático para a estação meteorológica de Palmas - TO, segundo a metodologia proposta por Walter e Lieth (1967). Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)², (Organização: T. C. C. Medeiros).

3.1.2 Geologia

O Estado do Tocantins possui os seguintes ambientes geológicos: depósitos sedimentares inconsolidados, bacias sedimentares, faixas orogênicas, sequência metavulcano-sedimentares e embasamentos de estilos complexos (SEPLAN, 2012). Dentre estes, estão presentes na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, os terrenos da bacia sedimentar do Parnaíba (SEPLAN, 2008) e de embasamentos de estilos complexos que, segundo Seplan (2008), correspondem aos complexos metamórficos do Arqueano e Proterozóico inferior.

² Disponível em < www.inmet.gov.br >. Acesso em: 20/12/2012.

3.1.3 Geomorfologia

O relevo tocanтинense apresenta Formas Estruturais, Formas Erosivas, Tipos de Dissecação e Formas de Acumulação. Na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, ocorrem relevos do tipo Formas Estruturais com superfícies tabulares estruturais e patamares estruturais e Formas Erosivas com superfícies tabulares erosivas, superfícies de pediplanos, inselbergs e terraços fluviais (SEPLAN, 2008).

A Depressão do Tocantins, que faz parte da compartimentação de Formas Erosivas, corresponde ao corredor deprimido do vale do rio Tocantins com altitudes entre 200 e 300 metros, relevos de dissecação suave e o predomínio de formas tabulares, com grande diversidade de expressão areolar. Também ocorrem em escala menor, trechos com relevos aplanados ainda conservados. As seções de aplanamento bordejam áreas serranas ou trechos marginais do rio Tocantins. Nesta área, com superfície rebaixada, emergem blocos de relevos residuais, denominados regionalmente de serras do Lajeado, da Malhada Alta, Maria Antonia, Santo Antônio, Manuel do Carmo, que fazem parte do Planalto Residual do Tocantins (BRASIL, 1981).

Nesta unidade geomorfológica, os processos que atuaram quando da elaboração das depressões foram as mesmas e ocorreram de forma simultânea que a da depressão do Araguaia que ocorreu em duas fases distintas: a) fase climática com período seco prolongado, elaborando a superfície por processo de pediplanação; b) fase de clima de savana, com retomada de erosão recente. Assim, a paisagem atual é explicada pela conjugação dessas fases climáticas e pela proximidade do nível de base (BRASIL, 1981).

As concreções superficiais de aspecto glomerular ocorrem em diversos tipos de terreno e de compartimento do relevo. A presença generalizada de concreções ferruginosas na superfície do terreno e acompanhando a topografia, levou a duas hipóteses principais: a) as concreções estariam se formando ou se reelaborando sob o clima atual, devido à ascensão por capilaridade das soluções até o nível da superfície onde ocorre a evaporação; b) as concreções teriam se formado ao longo do perfil do solo e foram expostas pela ablação dos níveis superiores (BRASIL, 1981).

Em se tratando da Depressão Tocantins, existe alguns pontos específicos que merecem ser relatados, como a presença de concreções de forma constante, dentre eles, de Porto Nacional até Tocantínia (sentido S-N), trecho em que se situa a bacia do ribeirão Taquaruçu Grande. Estes registros sugerem que a área foi submetida a processos erosivos típicos de fases

climáticas agressivas (semiárida) que resultaria em pediplanação, cuja idade foi considerada plio-pliestocênica por Barbosa et al. (1973 apud BRASIL, 1981, p. 224)³.

O Planalto Residual do Tocantins, que corresponde às Formas Estruturais, é representado por três unidades de relevo regionalmente denominadas de serra do Lageado e do Carmo, Malhada Alta e Maria Antônia, com cota média de 500 m, atingindo 600 m nas bordas ocidentais do planalto. O Planalto é individualizado pela presença de escarpas abruptas, sob a forma de frente de “cuestas” e por superfícies estruturais tabulares e foi esculpido em litologias constituídas de folhelho, siltitos e arenitos que fazem parte da borda sudoeste da bacia sedimentar do Parnaíba e que são datadas como devonianas da Formação Pimenteiras (BRASIL, 1981).

O fato de haver superfícies alteradas com altitudes variando de 450 a 750 m, elas foram consideradas por Brasil (1981) como superfícies elevadas com nível de cimeira regional, que se encontram interpenetradas por amplos corredores rebaixados. Esses relevos compõem o Planalto Residual do Tocantins e constituem os trechos mais elevados do Planalto do Interflúvio Araguaia-Tocantins, considerados de idade pliocênica de aplanamento. A similaridade altimétrica com o Planalto Dissecado do Sul do Pará e o Planalto do Interflúvio Araguaia-Tocantins levou Brasil (1981) inferir que estes relevos estiveram submetidos ao mesmo processo de pediplanação que truncaram o topo desses planaltos. Boaventura (1974 apud BRASIL, 1981, p. 222)⁴, analisando esse nível de aplanamento, considerou-o de idade pliocênica.

A serra do Lageado (Figura 3.3) compõe o bloco mais compacto do Planalto Residual do Tocantins, juntamente com a serra do Carmo. Neste bloco, a escarpa oeste, de direção norte-sul, voltada para o rio Tocantins é denominada serra do Lageado, uma frente de “cuestas” com escarpas abruptas que revelam a estrutura sub-horizontal da Formação Pimenteiras. O reverso tem mergulho suave para leste com formas tabulares amplas. A frente de “cuestas” da serra do Lageado possui restos de superfícies estruturais tabulares, sobre as quais há cobertura arenosa.

³ BARBOSA, G.V.; BOAVENTURA, R.S.; PINTO, M.N. Geomorfologia. In: **BRASIL**. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAM. Parte das Folhas SC 23 Rio São Francisco e SC 24 Aracaju. Rio de Janeiro, 1973 (Levantamento de Recursos Naturais, 1).

⁴ BOAVENTURA, R.S. Geomorfologia. In: **BRASIL**. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAM Folhas SB 22 Araguaia e parte da Folha SC 22 Tocantins. Rio de Janeiro, 1974 (Levantamento de Recursos Naturais, 4).

Figura 3.3 – Vista parcial da Serra do Lageado, município de Palmas - TO (Fotografia por Y. T. Rocha, 2012)

Esta serra é marcada por três feições dominantes: 1) extensa chapada de topo suavemente ondulado do Lageado, pertencente à orográfica faixa que se prolonga desde a altura de Monte do Carmo até as margens do rio Tocantins, próximo à cidade de Tocantinia; 2) a segunda feição contrasta fortemente com os topos aplainados, é a zona entalhada e dissecada a partir dessa superfície, que se apresenta acidentada, declivosa e localmente escarpada; 3) a terceira estende-se pelo piemonte ocidental do Lageado, correspondendo à calha do rio Tocantins. A articulação da superfície do topo com a superfície baixa se faz por meio de pedimentos em morfogêneses de Cerrado (BRASIL, 1981). A serra do Lageado exerce a função de divisor de águas entre o rio Tocantins e o rio Sono (BRASIL, 1981). O ribeirão Taquaruçu Grande faz parte dessa divisão de águas tendo suas nascentes nesta serra e sendo afluente da margem direita do rio Tocantins.

3.1.4 Solos

Os solos encontrados no Estado do Tocantins são os seguintes: Argissolos, Cambissolos, Chernossolos, Neossolos, Planossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Nitossolos e Plintossolos (SEPLAN, 2012).

Reatto et al., (2008) em estudo dos solos do Cerrado, citaram para o Estado do Tocantins, Latossolo, Argissolo, Neosolo Quartzarênico, Plintossolo, Plintossolo Pétrico, Neossolo Litólico, Gleissolo, Nitossolo, Cambissolo, onde os quatro primeiros tipos de solos dominam em percentual de ocorrência no Cerrado e no Estado (Tabela 3.1). Na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande ocorrem Latossolos e Plintossolos, com predominância dos Plintossolos (SEPLAN, 2012).

Tabela 3.1 – Solos do Tocantins: percentual em relação ao Cerrado e ao Estado (Fonte: REATTO, et al., 2008)

Solo	% no Cerrado	% no Estado
Latossolo	2,89	21,85
Argissolo	2,33	17,56
Neosolo Quartzarênico	1,97	14,89
Plintossolo	1,69	12,73
Plintossolo Pétrico	0,89	6,75
Neossolo Litólico	0,66	5,01
Gleissolo	0,46	3,47
Nitossolo	0,23	1,76
Cambissolo	0,04	0,33

De acordo com Santos et al. (2006), os Latossolos são constituídos por material mineral com horizonte B latossólico, sendo solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo; variam de fortemente a bem drenados e são normalmente muito profundos, sendo a espessura do *solum* raramente inferior a 1 m; têm sequência de horizontes pouco diferenciada e são, em geral, fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, podendo ser distróficos a alumínicos. São típicos das regiões equatoriais e tropicais, mas ocorrem também em zonas subtropicais, distribuídos por amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos em relevo plano a suave ondulado, apesar de ocorrer em relevo acidentado montanhoso. Originam-se dos mais variados tipos de rochas, sob as mais diversas condições climáticas e tipos de vegetação.

Os Plintossolos são solos constituídos por material mineral, que apresentam horizonte plíntico ou litoplíntico ou concrecionário, que podem iniciar dentro de 40 cm da superfície; ou dentro de 200 cm da superfície quando precedidos de horizonte glei, ou imediatamente abaixo do horizonte A, ou E, ou de outro horizonte que apresente cores pálidas, variegadas ou com mosqueados em quantidade abundante (SANTOS et al., 2006). Quando precedidos de horizonte ou camada de coloração pálida (acinzentadas, pálidas ou amarelado claras), estas

cores deverão ter matizes e cromas (a: matiz 5Y; ou b: matizes 7,5YR, 10YR ou 2,5Y com croma menor ou igual a 4), podendo ocorrer ou não mosqueados de coloração desde avermelhadas até amareladas. Quando precedidos de horizontes ou camadas de coloração variegada, pelo menos uma das cores deve satisfazer as condições dos itens “a” e “b” definidos anteriormente. Quando precedidos de horizontes ou camadas com mosqueados, estes deverão ocorrer em quantidade abundante (> 20% em volume), numa matriz de coloração avermelhada ou amarelada e deverão apresentar matizes e cromas conforme itens “a” e “b” definidos anteriormente (SANTOS et al., 2006).

3.1.5 Vegetação

A vegetação do Estado do Tocantins, segundo SEPLAN (2012) possui seis Regiões Fitoecológicas (Cerrado, Floresta Estacional, Floresta Ombrófila, Ecótono Floresta Estacional/Floresta Ombrófila, Enclave Cerrado/Floresta Ombrófila e Enclave Cerrado/Floresta Estacional), com a dominância do Cerrado.

Haidar et al. (2013) reconheceram apenas três regiões fitoecológicas para o Estado do Tocantins (Florestas, Savanas e Formações Pioneiras), com cerca de 20 tipos de vegetação (fitofisionomias), e destacam a dominância do Cerrado *Stricto Sensu*, além de encaves e ecótonos:

- Florestas (Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual), onde ocorrem *Alismataceae*, *Gomphrena*, *Hippeastrum*, *Schinopsis brasiliensis*, *Spondias mombin*, *Tapirira guianensis*, *Annona crassiflora*, *Guatteria australis*, *Guatteria citriodora*, *Oxandra reticulata*, *Xylopia frutescens*, *Aspidosperma cuspa*, *Aspidosperma multiflorum*, *Aspidosperma pyriforme*, *Himatanthus obovatus*

- Savana (Cerrado) inclui:

Savana Florestada (Cerradão) com *Curatella americana*, *Diospyros hispida*, *Machaerium acutifolium*, *Magonia pubescens*, *Protium heptaphyllum*, *Qualea grandiflora* e *Qualea parviflora*.

Savana Arborizada com *Bowdichia virgiloides*, *Byrsonima coccolobifolia*, *Byrsonima crassifolia*, *Connarus suberosus*, *Curatella americana*, *Lafoensia pacari*, *Qualea grandiflora*, *Qualea parviflora*, *Sclerolobium paniculatum*, *Vatairea macrocarpa*, *Salvertia convalariodora*, *Tabebuia áurea*, *Caryocar coriaceum*, *Dimorphandra gardineriana*, *Mouriri pusa*, *Mouriri elliptica*, *Kielmeyera lathophyton*, *Stryphnodendron coriaceum*,

Stryphnodendron obovatum, *Buchenavia tomentosa*, *Diospyros coccolobifolia*, *Parkia platycephalla* e *Vochysia gardneri*;

Savana Parque com *Tabebuia aurea*, *Curatella americana*, *Byrsonima orbigniana*, *Annona coriacea*, *Tabebuia serratifolia*, *Erythroxylum suberosum*, *Acosmium dasycarpum*, *Andira cuyabensis*, *Dipteryx alata*, *Byrsonima sericea*, *Heteropterys byrsonimiifolia*, *Brosimum gaudichaudii*, *Myrcia multiflora*, *Myrcia rostrata*, *Ouratea castaneifolia*, *Simarouba versicolor*, *Qualea parviflora* e *Vochysia rufa*, *Justicia lanstykii*, *Annona*, *Funastrum clausum*, *Mandevilla*, *Aspilia*, *Bauhinia acuruana*-

Savana Gramíneo-lenhosa com *Xanthosoma striatipes*, *Aeschynomene rostrata*, *Zornia latifolia*

- Formação Pioneira (Formação Fluvial Lacustre), com *Protium heptaphyllum*, *Tapirira guianensis*, *Licania apetala*, *Duguetia marcgraviana*, *Tabebuia serratifolia*, *Copaifera langsdorffii*, *Hymenaea courbaril*, *Physocalymma scaberimum*, *Himatanthus sucuuba*, *Brosimum lactescens*, *Caraipa densiflora*, *Ceiba pentandra*, *Cochlospermum orinocense*, *Diospyros poeppigiana*, *Cynometra marlenea*, *Mezilaurus itauba*, *Piranhea trifoliata*, *Pterocarpus santalinoides*, *Ruizteranea wittrockii*, *Sloanea eichleri*, *Terminalia lucida*, *Zygia inaequalis*.

- Áreas de Contato (Encrave): Cerrado/ Floresta Estacional, com *Aiouea macedoana*, *Ocotea aciphylla*, *Antonia ovata*, *Phthirusa*, *Banisteriopsis gardneriana*, *Byrsonima viminifolia*, *Pseudobombax longiflorum*, *Myrcia guianensis*.

- Áreas de Contato (Ecótono): Floresta Estacional/Floresta Ombrófila, com *Callisthene minor*, Myrtaceae (*Eugenia* aff. *patrissi* e *Eugenia cupulata*), *Martiodendron mediterraneum*, *Capaifera coriacea*, *Ephedranthus parviflorus*, *Aspidosperma discolor*, *Aspidosperma multiflorum*; *Manilkara salzmännii*, *Bocageopsis mattogrossensis*, *Chrysophyllum gonocarpum*. *Mouriri*, *Dipteryx*, *Vantanea* cf. *parviflora*, *Pagamea guianensis*, *Tabernaemontana*, *Sacoglottis guianensis*, *Brosimum rubescens*, *Sloanea guianensis*, *Crepidospermum rhoifolium*, *Thyrsodium spruceanum*, *Myrcia amazônica*, *Protium heptaphyllum*, *Tabebuia serratifolia*, *Apeiba tibourbou*, *Pseudobombax tomentosum*, *Astronium fraxinifolium* e *Guazuma ulmifolia*, *Aspidosperma subincanum*, *Hymenaea courbaril* e *Anadenanthera colubrina*.

Na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, seguindo a classificação de Ribeiro e Walter (2008) ocorrem formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata

Seca e Cerradão), formações savânicas (Cerrado Sentido Restrito, Palmeiral, Vereda) e formações campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre).

3.2 Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento desta pesquisa tem seus procedimentos metodológicos baseados na proposta por Libault (1971) para a pesquisa geográfica, cujos procedimentos se enquadram em quatro níveis:

Nível 1 - Compilatório: refere-se à constatação de fatos e fenômenos a serem pesquisados. Compreende os levantamentos e coleta de dados de formatos diversos.

Nível 2 - Correlatório: trata da comparabilidade dos dados referentes a valores numéricos, localização e representação das variáveis utilizadas para caracterizar os elementos ou fenômenos geográficos.

Nível 3 - Semântico ou Interpretativo: representa a análise e a síntese, permitindo chegar aos resultados.

Nível 4 – Normativo: refere-se à tradução dos resultados em produtos que podem ter diferentes modos de codificação representativa dos resultados por meio de modelos numéricos, mapas temáticos, gráficos e tabelas.

Considerando isso, os níveis dos procedimentos metodológicos adotados são descritos a seguir.

3.2.1. Primeira Etapa: Levantamento, Produção e Processamento dos Dados

Compreendeu o levantamento de dados bibliográficos e cartográficos existentes, quando foi feita a seleção e compilação das informações coletadas. Esta etapa também se constituiu de levantamento e processamento de dados incluindo etapas de trabalho de campo e de laboratório.

3.2.1.1 Levantamentos bibliográfico, cartográfico e de imagens de sensores orbitais

O levantamento bibliográfico constituiu da seleção e leitura de bibliografias relacionadas à temática, assim como de trabalhos específicos a respeito da área de estudo e teve continuidade durante todo o tempo de execução da pesquisa.

O levantamento cartográfico compreendeu de: cartas da Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) do Ministério do Exército e do IBGE de 1979, na escala de 1:100.000; imagens de satélite LANDSAT TM5 (30 m de resolução), além de imagens do *Google Earth* e Atlas do Estado do Tocantins. Esses materiais possibilitaram o mapeamento da vegetação.

3.2.1.2 Levantamento, produção e processamento de dados

Esta fase teve início com o reconhecimento da área de estudo com base no material cartográfico e em imagens de sensores orbitais (LANDSAT e *Google Earth*) e definição dos pontos de amostragem. Incluiu a caracterização do meio físico com a produção e processamento de dados que se constituiu da etapa de mapeamento (caracterização topográfica, hidrográfica e vegetação), caracterização pedológica, vegetação (florística e fitossociológica) e análise da paisagem.

3.2.1.2.1 Etapa de mapeamento

Foram solicitadas ao Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) as Imagens LANDSAT da área de estudo, tendo em vista a seleção feita a partir do catálogo disponível no *site* do INPE (2010a). As imagens solicitadas foram: LANDSAT 5 TM - ORBITA 222 - PONTO 067 de 12 de maio de 2011. Optou-se por realizar o mapeamento a partir de imagens do mês de maio por ser transicional entre a estação úmida e seca e no qual há mais evidência na distinção dos padrões da vegetação de Cerrado *sentido amplo (lato sensu)* e quando ainda não se iniciou a época de queimadas na região, facilitando a interpretação das imagens no processo de mapeamento.

Para o geoprocessamento de imagens e o mapeamento da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, utilizou-se o Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), versão 5.1.8., *software* livre produzido pelo INPE (2010b) e seus aplicativos IMPIMA e SCARTA.

Para os mapas produzidos a partir da imagem do LANDSAT 5 TM, foram utilizadas as bandas 3, 4 e 5 para a composição da imagem colorida e processo de mapeamento devido as informações a serem coletadas e necessárias para este processo, tendo em vista as suas principais aplicações (Tabela 3.2), e resolução de 30 m. A imagem LANDSAT com as respectivas bandas foi, primeiramente, convertida no IMPIMA, do modo “tiff” para o modo

“grib”, para posteriormente ser georreferenciada e processada no SPRING. Utilizou-se a Imagem LANDSAT do mosaico da NASA (2010) já georreferenciada disponível⁵ para georreferenciar as imagens LANDSAT a serem trabalhadas.

Tabela 3.2 – Principais aplicações potenciais das bandas espectrais do Landsat 5 TM. Fonte: SANO (1987)

Banda	Comprimento de Onda (µm)	Faixa espectral	Aplicações Principais
3	0,63 – 0,69	Vermelho	■ Absorção da clorofila, significativa na diferenciação de espécies vegetais
4	0,77 – 0,90	Infravermelho próximo	■ Estudos de volume da biomassa e delimitação de corpos d’água
5	1,55 – 1,75	Infravermelho médio	■ Estresse da vegetação por desequilíbrio de água na cobertura foliar

Após obter o mosaico da NASA este foi corrigido pelo *software GeoExpress View by ILS* da LizardTech (2010)⁶. O arquivo da NASA foi importado para o SPRING para a realização do registro da imagem LANDSAT, associando-se o azul (B) à banda 3, o verde à banda 4 (G) e o vermelho à banda 5 (R), para a montagem da composição colorida RGB (do inglês: *Red, Green, Blue*), procedendo-se, posteriormente, as etapas seguintes para a realização do mapeamento: a) contraste linear; b) segmentação; c) classificação; d) pós-classificação; e) mapeamento; f) edição matricial. No SCARTA, foi feita a edição do mapa.

Na etapa de classificação, o processo utilizado foi de "pixel a pixel", que é definida como técnica de classificação multiespectral com treinamento supervisionado (utilizando-se pontos controle com coordenadas geográficas coletadas em campo) na qual o classificador utilizado foi o MAXVER-ICM (Iterated Conditional Modes).

No “treinamento” (etapa da classificação), as classes temáticas que compuseram o mapa de unidades de paisagem foram:

a) Floresta, que incluiu Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Vereda e Campo Limpo Úmido. A Vereda foi inserida nessa unidade da paisagem por constituir áreas úmidas, próximas às Matas Ciliares ou Matas de Galeria e o Campo Limpo Úmido por ocorrer associado às essas Matas e à Vereda.

b) Cerradão;

c) Cerrado Sentido Restrito;

⁵ Disponível em: <https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid>. Acesso em 05/01/2011.

⁶ Disponível em: <http://www.lizardtech.com/solutions/geo>. 05/01/2011.

- d) Campo Sujo Seco;
- e) Área urbana e rural edificadas;
- f) Agropecuária/Silvicultura;
- g) Lago reservatório, ribeirões, córregos e brejos.

O Babaçual, por compor pequenas áreas, no mapeamento está representado tanto na unidade de paisagem Floresta, quanto em Cerradão e Cerrado Sentido Restrito, da mesma forma que o Campo Rupestre está inserido na classe temática Cerrado Sentido Restrito. O Lago reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães representa o curso superior do ribeirão Taquaruçu Grande inundado com o enchimento do referido Lago. A amplitude de determinadas classes temáticas foi em decorrência da resolução das imagens LANDSAT TM-5 ($30 \times 30 \text{ m} = 900 \text{ m}^2$).

Utilizou-se também a Folha de Vila Canela (DSG, 1979), na forma digital (formato “tiff”), para a composição do mapa base da área de estudo, passando pelas etapas do Módulo IMPIMA, com a seleção da banda monocromática e delimitação de uma área menor, na qual o retângulo envolvente do Projeto de Mapeamento esteja inserido. Em seguida, utilizou-se o SPRING para o processo de mapeamento por meio da vetorização da hidrografia e topografia da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande.

A delimitação da bacia foi com base em critérios hidrográficos, divisores de água e cotas altimétricas. Utilizou-se a carta da Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) do Ministério do Exército e do IBGE de 1979, na escala de 1:100.000, Folha de Vila Canela SC.22-Z-B-III MI-1644. Estes temas foram atualizados com vetorização complementar utilizando-se a imagem LANDSAT classificada, concluindo-se a edição do mapa no SCARTA. Foram produzidos os mapas de hidrografia (1977-2011), topográfico (1979) e de unidades de paisagem (2011).

Para a determinação da hierarquia fluvial foi utilizada a classificação de Strahler (1957 apud CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 106)⁷ que considera que os menores canais sem tributários são de primeira ordem; os de segunda ordem se originam da confluência de dois canais de primeira ordem e só recebem afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda e primeira ordens; os canais de quarta ordem são resultantes da confluência de dois canais de terceira ordem, podendo receber canais de ordens inferiores, e assim sucessivamente.

⁷ STRAHLER, A. N. Dimensional analysis of watershed Geomorphology. **Amer. Geoph. Union Trans.** 1957, 38, p. 913-920.

3.2.1.2.2 Caracterização pedológica

A caracterização química e física do solo foi realizada em novembro de 2012 e a de umidade do solo, de fevereiro a agosto de 2013. Ambas incluíram etapas de campo e laboratório. Teve-se como base um delineamento experimental em blocos casualizados (5 blocos x 2 tratamentos) que corresponderam às áreas de estudo da vegetação de Campo Sujo Seco, com área total de 2000 m² em cada bloco e os tratamentos à situação de disposição das parcelas de amostragem no tipo de relevo, ou seja: situação de topo de morro (1000 m²) e de vertente (1000 m², na posição mediana).

As amostras de solo para análises químicas e físicas foram do tipo deformada, coletadas com Amostrador de Solo Semi-automático SACI N° de série 090413, 12 Volts e 30 amperes (Figura 3.4), de forma aleatória a partir de caminhada em ziz-zag dentro das áreas das parcelas do inventário florístico (Figura 3.5), que correspondem aos blocos no estudo de solos.

Figura 3.4 – Demonstração da coleta de solo sob vegetação de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO (Fotografias por: T. C. C. Medeiros, 2012)

Foram coletadas 10 amostragens simples de solo a profundidade de 0-20 cm, para cada bloco (áreas), tendo-se o cuidado de remover folhas e outros detritos da superfície do solo a ser amostrado. As amostras foram colocadas juntas em saco plástico limpo, homogeneizadas, compondo uma amostra final, composta, de 500 g, seguindo-se a metodologia da EMBRAPA⁸. Foram devidamente lacradas, etiquetadas, transportadas ao Laboratório de Solos e Biogeografia (Geografia/UFT/Porto Nacional), e secas ao ar natural.

As análises químicas e físicas do solo foram realizadas pelo Laboratório Solo Fértil (Porto Nacional - TO). Na análise química foram obtidos dados analíticos de pH em CaCl₃; Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio (K), Alumínio (Al), Acidez Potencial (H+Al), Fósforo (P), Ferro (Fe) e Matéria Orgânica (M.O.), de acordo com a metodologia da EMBRAPA (1999). Em função dessas determinações, foram calculadas a Saturação por Bases (V%), a Capacidade de Troca Catiônica (CTC), a Saturação de Al (m%), a Saturação com H+Al. A análise física (textura) foi realizada por quantificação das frações areia, silte e argila dispersas em água tendo sido calculado o grau de floculação de acordo com EMBRAPA (1999).

Para a determinação da umidade dos solos as coletas foram realizadas no período de fevereiro a agosto de 2013, considerando-se a estacionalidade climática, seguindo-se a metodologia de Almeida (2005), com adaptações. Foram coletadas quatro amostras simples, deformadas de solo, em cada bloco (área), sendo duas amostras no topo e duas na vertente (posição mediana), na profundidade de 0-20 cm. As duas amostras do topo ou da vertente formaram uma amostra composta com cerca de 1 kg de solo para cada situação do relevo, totalizando 2 kg de solo por bloco. A coleta do solo foi feita manualmente, com pá e imediatamente acondicionada, sem peneiramento, em saco plástico, que foi envolvido com densa camada de filme plástico, para evitar a perda de umidade. As amostras foram devidamente etiquetadas, acomodadas em caixa plástica que foi mantida no interior do veículo, protegida do sol e transportada ao Laboratório de Solos e Biogeografia (Geografia/UFT/Porto Nacional).

Foi feito o peso úmido das amostras de solo, em balança digital de precisão, que foram secas em estufa a 65°C, durante o período de três dias no Laboratório de Análise Geo-Ambiental (Geografia/UFT/Porto Nacional). Após a secagem foi feito o peso seco e, a partir dos dados de peso seco e úmido, foi calculado o percentual de água presente no solo, de acordo com Troeh e Thompson (2007, p. 133), como no exemplo a seguir:

⁸ http://www.cnps.embrapa.br/servicos/metodo_coleta.html> Acesso em 10 nov/2012.

Massa do solo úmido = 75 g

Massa do solo seco em estufa = 60 g

Massa de água presente = 15 g

Assim: % de água presente = $15 \text{ g} / 60 \text{ g} \times 100 = 25\%$

Para a análise estatística dos tratamentos (topo e vertente), foi realizado o teste “T” não pareado (dados independentes) e teste “T” pareado (cada topo com sua vertente). Para análise estatística entre áreas (blocos), foi realizada análise de variância (ANOVA) de um fator e a comparação das médias foi feita pelo teste de Tukey, usando o programa *Bio Estat* versão 5.0 de Ayres et al. (2007). Os parâmetros avaliados foram: pH, M.O., Ca, Mg, K, P, Fe, Al, H+Al, CTC Total, CTC Efetiva, Saturação de Al, Saturação com H+Al, Saturação por Bases, textura e água presente nos solos. Foram construídos gráficos e tabelas para representar os resultados das análises de solos.

3.2.1.2.3 Caracterização da vegetação

A caracterização da vegetação foi feita com base no mapeamento realizado da cobertura vegetal, considerando o geofácio Campo Sujo Seco, identificado em campo com a chave de identificação de fitofisionomias desenvolvida por Ribeiro e Walter (2008).

Com base no mapeamento e nos trabalhos de campo, foram selecionadas cinco áreas de estudo (Figura 3.5 e Tabela 3.3). A disposição das unidades amostrais dentro de cada uma das áreas obedeceu ao critério sistemático de acordo com Matteucci e Colma (1982). A amostragem foi pelo método de parcelas (MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974), por tratar-se de um método em estudos da vegetação de Cerrado bastante difundido (FIDELIS e GODOY, 2003; ASSUNÇÃO e FELFILI, 2004; FONSECA e SILVA JÚNIOR, 2004; FELFILI et al., 2007).

O total da área amostrada foi de um hectare, com o tamanho das parcelas de 10 m x 10 m (100 m^2), totalizando 100 parcelas, sendo 50 parcelas em situação de relevo topo de morro e 50 parcelas em situação de relevo de vertente (posição mediana), totalizando 20 parcelas por área (10 parcelas no topo e 10 parcelas na vertente, Figura 3.6).

De acordo com Felfili et al. (2005), o número mínimo de parcelas para cálculos de variância em um inventário exploratório é dez, e para inventários florestais em florestas tropicais é desejável que a área da amostra (conjunto de parcelas ou unidades amostrais) seja

de um hectare. Amostragens em áreas campestres do Cerrado, em geral, realizam inventários com áreas bem inferiores a um hectare (MUNHOZ; FELFILI, 2005; MUNHOZ; FELFILI, 2006; CONCEIÇÃO; PIRANI, 2006).

Figura 3.5 – Pontos de amostragem fitossociológica, florística e solos do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - TO

Tabela 3.3 – Coordenadas das áreas de amostragem no Campo Sujo da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO (Organização: T. C. C. Medeiros)

Área	Latitude Sul	Longitude Oeste
Área 1 topo	10° 16' 06,7"	48° 08' 41,5"
Área 1 vertente	10° 16' 08,6"	48° 08' 43,9"
Área 2 topo	10° 18' 41,7"	48° 07' 21,3"
Área 2 vertente	10° 18' 37,2"	48° 07' 20,1"
Área 3 topo	10° 20' 53,8"	48° 05' 43,2"
Área 3 vertente	10° 20' 53,6"	48° 05' 40,0"
Área 4 topo	10° 12' 41,9"	48° 07' 27,8"
Área 4 vertente	10° 12' 48,6"	48° 07' 50,6"
Área 5 topo	10° 11' 17,5"	48° 09' 28,1"
Área 5 vertente	10° 11' 03,9"	40° 09' 39,6"

Figura 3.6 – Desenho esquemático da disposição das parcelas no relevo de topo e de vertente, no Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - TO

O critério de inclusão na medida da vegetação lenhosa foi de circunferência de caule $\geq 3,0$ cm no nível do solo (livrando-se as imperfeições do caule). Esta circunferência de caule foi adotada tendo em vista a ocorrência de subarbustos e arbustos de algumas espécies com altura ≥ 1 m possuírem caules nessa medida de circunferência, a exemplo de espécies do gênero *Bauhinia*, *Chamaecrista* e *Mimosa*. A medida de circunferência ao nível do solo foi devido a própria estrutura de altura do Campo Sujo, e à abundância de ramificações de subarbustos, arbustos e árvores que dificultaram a medida de altura do peito. Os parâmetros biométricos medidos foram circunferência no nível do solo (com fita métrica) e altura de subarbustos, arbustos e árvores (com fita métrica, ou escala graduada, ou telêmetro com alcance de 4 a 30 m), registrando-se a espécie medida (Figura 3.7).

Para a amostragem da vegetação herbácea-subarbustiva, no centro de cada uma das 100 parcela de 100 m², para amostragem da vegetação lenhosa, foram feitas duas sub-parcelas de 1 m² para a caracterização do estrato herbáceo-subarbustivo, de acordo com Meira-Neto e Martins (2000), com adaptações. O critério de inclusão foi utilizado apenas para a vegetação subarbustiva, incluindo-se indivíduos com circunferência ≤ 3 cm de caule não incluídos na amostragem fitossociológica. Para a vegetação herbácea não houve critério de inclusão, tendo sido registrados todos os componentes inclusos na sub-parcela de 1m². A cobertura do solo pela vegetação herbácea-subarbustiva foi calculada da seguinte forma: foi medida a área ocupada pela espécie em 1 m² (pelo fato de terem sido feitas duas parcelas de 1 m² por parcela de 100 m², foi feita a média da área da espécies nestas duas parcelas). Utilizou-se o valor médio da área ocupada pela espécie nas duas parcelas de 1m² e calculou-se a área da espécie, para 100 m², por “Regra de Três” simples. A partir desse valor, foi calculado, também por “Regra de Três” simples, a cobertura do solo, em área de 10.000 m², pela espécie.

Os parâmetros fitossociológicos (CURTIS; MCINTOSH, 1950; 1951) analisados foram densidade, frequência, dominância absolutas e relativas e, a partir destas, o valor de importância específica (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974).

Para avaliar a diversidade e similaridade, foram calculados o Índice de Similaridade de Sørensen e o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H') e o Índice de Uniformidade de Pielou - equabilidade (J'), como indicadores de heterogeneidade (PIELOU, 1975). A similaridade florística entre as áreas foi calculada com base na presença e ausência de espécies, pelo índice de Jaccard e coeficiência de distância de Bray Curtis e, com base nestes, foi feita a análise de agrupamento por *Unweighted Pair Groups Method using Arithmetic Averages* (UPGMA) (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974. Foi utilizado o método de ordenação Análise em Componentes Principais (ACP). Para análise dos referidos parâmetros, foi utilizado o *software* Fitopac 2 (SHEPHERD, 1995).

Na análise de agrupamento também foi utilizado o *software* WinTWINS (HILL, 1979) para separar grupos florístico-estruturais de Campo Sujo Seco. Por ser um método sensível às características estruturais, a análise com o Twinspan não incluiu as espécies do estrato herbáceo-subarbustivo, nem as do estrato arbustivo-arbóreo com altura $\leq 0,4$ m e $\leq 3,0$ cm.

Figura 3.7 - Demonstração de aspectos da amostragem da caracterização florístico-estrutural com a disposição das parcelas de 100 m² e sub-parcelas de 1 m² na posição mediana da vertente (a); sub-parcela de 1 m² para caracterização do estrato herbáceo-subarbustivo (b); medida de altura (c) e circunferência de base de plantas (d), da vegetação de Campo Sujo Seco, na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - TO. Fotografia de T.C.C. Medeiros em 2011)

Foram utilizadas as seguintes fórmulas:

1. Densidade

DA = número de árvores /hectare

DR de cada espécie = DA da espécie/DA de todas as espécies x100

Onde:

DA = Densidade Absoluta

DR = Densidade Relativa

2. Dominância

DoA = Área basal de cada espécie/hectare

DoR = Área basal de cada espécie.ha⁻¹/Área basal total x100

Onde:

DoA = Dominância Absoluta

DoR = Dominância Relativa

3. Frequência

FA= nº de parcelas em que ocorre uma espécie/nº total de parcelas x 100

FR da espécie = FA da espécie/FT x 100

$$\sum_{i=1}^n \text{FA da espécie}$$

Onde:

FA = Frequência Absoluta

FR = Frequência Relativa

FT = Frequência Total ($\sum$ de todas as FA)

4. Índice de Valor de Importância (IVI)

IVI = Densidade relativa + Frequência relativa + Dominância relativa

5. Índice de Shannon

$$H' = - \sum_{i=1}^n p_i \cdot \ln(p_i)$$
$$H_{\max} = \ln S$$

Onde:

H' = índice de diversidade de Shannon

Ln = logaritmo neperiano

$p_i = n_i/N$

n_i = números de indivíduos amostrados da espécie i

N = número total de indivíduos amostrados

H max = entropia máxima (nats/ind.)

S = número total de espécies

6. Índice de uniformidade de Pielou

$$J' = H'/H_{\max}$$

Onde:

J' = equabilidade

H' = índice de diversidade de Shannon

H max = entropia máxima (nats/ind.)

7. Índice de Sørensen – varia de 0 a 1

$$I_s = 2a/2a + b + c$$

Onde:

a = número de espécies em comum às duas comunidades

b = número de espécies da comunidade 1

c = número de espécies da comunidade 2

8. Índice de Jaccard

$$I_J = a/a + b + c$$

Onde:

a = número de espécies em comum às duas comunidades

b = número de espécies da comunidade 1

c = número de espécies da comunidade 2

Em se tratando das espécies subarbustivo-arbustivo-arbóreas, a preferência das espécies pelo topo ou pela vertente foi caracterizada como: exclusiva - 100% de ocorrência; alta - de 66,6 a 99,9% de ocorrência; média - 33,3 a 66,6% de ocorrência; e, baixa - até 33,3%.

O material botânico coletado foi identificado por meio de consulta a bibliografia específica, por comparação com exsicatas depositadas no Herbário HTO, do Núcleo de Estudos Ambientais (NEAMB)/UFT/Porto Nacional e, quando necessário, foi enviado a especialistas. O sistema taxonômico utilizado foi o APG III (2009) e o nome das categorias taxonômicas (ordem, família, gênero e espécie) foi confirmado em www.floradobrasil.jbrj.gov.br (Acesso: 05 nov. 2013).

3.2.1.2.4 Análise da Paisagem

A análise da paisagem foi realizada com base na bibliografia, na interpretação visual da imagem LANDSAT/2011, com o auxílio da observação da imagem orbital *Geoeye*, disponível no *Google Earth* (2011) e visitas à área de estudo. O sistema de classificação para análise da paisagem baseou-se em Bertrand (2004), cujo sistema possui seis níveis temporo-espaciais (Quadro 3.1), descritos a seguir:

- 1) Zona: unidade de 1ª grandeza, zonalidade planetária que se define primeiramente por seu clima e seus biomas.
- 2) Domínio: unidade de 2ª grandeza, paisagens com dimensões subcontinentais e que são vigorosamente individualizadas podendo ser caracterizado por certa combinação de relevos e de climas.
- 3) Região Natural: unidade entre a 3ª e 4ª grandeza, compreende tanto conjuntos físicos, estruturais ou climáticos como domínios caracterizados pela sua vegetação, culturas humanas, dentre outros.
- 4) Geossistema: unidade entre a 4ª e 5ª grandeza temporo-espacial, unidade dimensional compreendida entre alguns quilômetros quadrados e algumas centenas de quilômetros quadrados. Em seu modelo teórico da paisagem ele se define pelo potencial ecológico (clima, hidrologia, geomorfologia), exploração biológica do espaço (vegetação, solos, fauna) e ação antrópica.

5) Geofácies: unidade de 6ª grandeza, corresponde a um setor fisionomicamente homogêneo onde se desenvolve a mesma fase de evolução geral do geossistema. Representa assim uma malha na cadeia das paisagens que se sucedem no tempo e no espaço no interior de um mesmo geossistema. Em relação à superfície coberta, corresponde a algumas centenas de quilômetros quadrados em média. Pode-se ter cadeias progressivas e cadeias regressivas de geofácies, como também um geofácie-clímax que constitui um estágio final da evolução natural do geossistema.

6) Geótopos: unidade de 7ª grandeza, último nível de análise da escala espacial, representando sub-unidades do nível de análise Geofácies. Em Biogeografia (Unidades Elementares, Quadro 3.1) corresponde ao complexo biótopo-biocenose (menor unidade homogênea discernível no terreno). Em algumas vezes é indispensável conduzir a análise ao nível das micro-formas na escala do metro quadrado ou mesmo do decímetro quadrado, como por exemplo, uma diáclise alagada pela dissolução, uma cabeceira de nascente, um fundo de vale que o sol nunca atinge, uma face montanhosa, constituem igualmente biótopos. É o refúgio de biocenoses originais, às vezes relictuais ou endêmicas.

Quadro 3.1 - Esquematização da análise sintética da paisagem segundo Bertrand (2004)

UNIDADES DA PAISAGEM	ESCALA TEMPORO-ESPACIAL (A. CAILLEUX J. TRICART)	EXEMPLO TOMADO NUMA MESMA SÉRIE DE PAISAGEM	UNIDADES ELEMENTARES				
			RELEVO (1)	CLIMA (2)	BOTÂNICA	BIOGEOGRAFIA	UNIDADE TRABALHADA PELO HOMEM (3)
ZONA	G I grandeza G. I	Temperada		Zonal		Bioma	Zona
DOMÍNIO	G. II	Cantábrico	Domínio estrutural	Regional			Domínio Região
REGIÃO NATURAL	G. III-IV	Picos da Europa	Região estrutural		Andar Série		Quarteirão rural ou urbano
GEOSSISTEMA	G. IV-V	Atlântico Montanhês (calcário sombreado com faia higrofila a <i>Asperula odorata</i> em “terra fusca”)	Unidade estrutural	local		Zona equipotencial	
GEOFÁCIES	G. VI	Prado de ceifa com <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> em solo lixiviado hidromórfico formado em depósito morainico			Estádio Agrupamento		Exploração ou quarteirão parcelado (pequena ilha ou cidade)
GEÓTOPO	G. VII	“Lapiés” de dissolução com <i>Aspidium lonchitis</i> em microsolo úmido carbonatado em bolsas		Microclima		Biótopo Biocenose	Parcela (casa em cidade)

Nota: As correspondências entre as unidades são muito aproximadas e dadas somente a título de exemplo. 1 – conforme A. Cailleux, J. Tricart e G. Viers; 2 – conforme M. Sorre; 3 – conforme R. Brunet (Fonte: Bertrand, 2004).

3.2.1.2.4.1 Caracterização dos Geofácies

O sistema de classificação adotado na análise da paisagem para a caracterização dos geofácies de vegetação natural foi o de Ribeiro e Walter (2008). Este sistema se baseia na fisionomia (forma) definida pela estrutura, pelas formas de crescimento dominantes e por possíveis mudanças estacionais, além de considerar aspectos do ambiente (fatores do solo) e da composição florística, adotando para as fitofisionomias uma nomenclatura regional de uso difundido.

Nesta proposta de classificação de vegetação do Cerrado Ribeiro e Walter (2008) descrevem 11 tipos principais de vegetação para o Cerrado, que estão enquadrados: em formações florestais (Mata ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado Sentido Restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre); também reconhece 25 fitofisionomias, incluídos os subtipos para algumas fitofiosionomias, como é o caso da Mata de Galeria (Mata Galeria Inundável e Mata de Galeria Não Inundável), Mata Seca (Mata Seca Sempre Verde, Mata Seca Semidecídua e Mata Seca Decídua), Cerrado Sentido Restrito (Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre), Palmeiral (Macaubal, Guerobal, Babacual e Buritizal), Campo Sujo (Campo Sujo Seco, Campo Sujo Úmido e Campo Sujo com Murundus) e Campo Limpo (Campo Limpo Seco, Campo Limpo Úmido e Campo Limpo com Murundus).

As fitofisionomias dos geofácies da área de estudo, descritas com maior detalhe na sequência, segundo descrição feita por Ribeiro e Walter (2008), são: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerrado Sentido Restrito, Palmeiral, Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre.

Mata Ciliar: vegetação florestal que acompanha rios de médio e grande portes, não formando galerias. Diferencia-se da Mata de Galeria por apresentar certa deciduidade e pela composição florística, tendo em vista ser a Mata de Galeria considerada perenifólia (Figura 3.8). As árvores são predominantemente eretas com altura que variam de 20 a 25 m e com poucos indivíduos emergentes que chegam a 30 m. A cobertura arbórea é variável entre as estações do ano, na estação chuvosa é de 50 a 90% e na estação seca pode chegar a ser inferior a 50% (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Figura 3.8 – Mata Ciliar representada em um diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 80 m de comprimento por 4 m de largura, nos períodos seco e chuvoso. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Mata de Galeria: vegetação de tipo florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central formando corredores fechados (galerias) sobre os cursos de água (Figura 3.9). Em geral, essas matas localizam-se nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem onde os cursos de água ainda não escavaram um curso definitivo e são perenifólias. São matas cujo estrato arbóreo varia de 20 a 30 m de altura e a superposição das copas fornece cobertura arbórea de 70 a 90%. Pode ser ou não inundável (RIBEIRO; WALTER, 2008) (Figura 3.9).

Figura 3.9 - Mata de Galeria não inundável representada pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 80 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Mata Seca: caracterizada por diversos níveis de caducifolia durante a estação seca. Possuem estrato arbóreo médio de 15 a 25 m de altura. Ocorrem, geralmente, nos interflúvios e nos locais mais ricos em nutrientes, sendo dependentes das condições químicas e físicas do solo mesotrófico, principalmente da profundidade. Na estação chuvosa, a cobertura arbórea varia de 70 a 95%. Conforme a Figura 3.10, pode ser sempre-verde, com cobertura arbórea de 60 a 90%; semidecídua, com cobertura arbórea de 50 a 60%); e, decídua, com cobertura arbórea de 30 a 50% (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Cerradão: formação florestal do Cerrado, que apresenta dossel contínuo e cobertura arbórea que varia de 50 a 90%, sendo maior na estação chuvosa (Figura 3.11). A altura média do estrato arbóreo varia de 8 a 15 m. Tais características proporcionam condições de luminosidade e favorecem a formação do estrato arbustivo e herbáceo diferenciados. Tem um padrão geral vegetal de semideciduidade, embora possa ser perenifólio (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Figura 3.10 - Mata Seca representada pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 80 m de comprimento por 10 m de largura, em diferentes épocas chuvosa e seca, onde: Ca = cobertura arbórea, A = Mata Seca Sempre-Verde, B = Mata Seca Semidecídua, C = Mata Seca Decídua com afloramento de rocha. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Figura 3.11 - Cerradão representado pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Cerrado Sentido Restrito: tem como características a presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidência de queimadas (RIBEIRO; WALTER, 2008). Possui 4 subtipos:

- Cerrado Denso - predominantemente arbóreo, forma mais densa e alta, com altura média de 5 a 8m e cobertura arbórea de 50 a 70%;

- Cerrado Típico - predominantemente arbóreo-arbustivo, é a forma comum e intermediária entre o Cerrado Denso e o Cerrado Ralo, tem altura média de 3 a 6 m e cobertura arbórea de 20 a 50%);

- Cerrado Ralo - predominantemente arbóreo-arbustivo, a forma mais baixa e menos densa, o estrato arbustivo-herbáceo é mais destacado em relação aos subtipos anteriores, tem altura média de 2 a 3 m e cobertura arbórea de 5 a 20%;

- Cerrado Rupestre – vegetação arbóreo-arbustiva que ocorre em ambiente rupestre (rochosos), tem altura média de 2 a 4 m e cobertura arbórea de 5 a 20%, podendo ocorrer em trechos contínuos, mas geralmente aparece em mosaicos, incluído em outros tipos de vegetação (Figura 3.12, respectivamente a, b, c).

Palmeiral: fitofisionomia da formação savânica caracterizada por uma única espécie de palmeira (Figura 3.13). Podem ser formados *Attalea speciosa* Mart. ex Spreng. (Babaçual), por *Acrocomia aculeata* (Macaubal), *Syagrus oleraceae* (Mart.) Becc (Guerobal) e *Mauritia flexuosa* L. F. (Buritizal). Ocorrem em terrenos bem drenados (interflúvios), exceto o Buritizal pelo fato de *Mauritia flexuosa* ser uma espécies de ambientes úmidos. Os palmeirais têm uma altura média de 8-15 m e cobertura arbórea de 30 a 60 % (RIBEIRO; WALTER, 2008).

a

b

c

d

Figura 3.12 - Cerrado Denso (a), Típico (b), Ralo (c) e Rupestre (d), representados pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Figura 3.13 – Tipos de Palmeirais: Guerobal (A), Babaçual (B) e Buritizal (C) representados pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Vereda: fitofisionomia com a palmeira *Mauritia flexuosa* L. F. (Buriti) emergente (Figura 3.14) que ocorre em agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. São circundadas por campos típicos, geralmente úmidos e os Buritis não formam dossel, como no tipo de Palmeiral chamado Buritizal (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Figura 3.14 - Veredas representada pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

As Veredas ocorrem em vales pouco íngremes ou áreas planas, acompanhando linhas de drenagem pouco definidas, sendo também comuns em posições intermediárias do terreno, próximas às nascentes (chamados de “olhos d’água”) ou nas bordas das cabeceiras de Matas de Galeria. A altura média varia de 12 a 15 m e a cobertura arbórea de 5 a 10%. O conjunto fitofisionômico caracteriza-se como uma savana.

Campo Sujo: tipo fisionômico exclusivamente herbáceo-arbustivo, com arbustos e subarbustos esparsos (Figura 3.15). Sua flora pode ser semelhante à do Cerrado Sentido Restrito, mas com indivíduos menos desenvolvidos. Devido às peculiaridades ambientais locais, pode haver três subtipos desta fisionomia: Campo Sujo Seco, Campo Sujo úmido e Campo Sujo com Murundus. Tem baixa cobertura arbórea, não ultrapassando 5% e a altura média de 2 m (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Figura 3.15 - Campo Sujo representado pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Campo Limpo: é um tipo fisionômico exclusivamente herbáceo, sem árvores e com raros arbustos (Figura 3.16). Pode ser encontrado em diversas posições topográficas, com diferentes variações no grau de umidade, profundidade e fertilidade do solo. É encontrado mais frequentemente nas vertentes, nas chapadas, nos olhos d’água, circundando Veredas e nas bordas das matas de galeria. Devido às peculiaridades ambientais locais, pode haver três subtipos desta fisionomia: Campo Limpo Seco, Campo Limpo úmido e Campo Limpo com Murundus. Tem cobertura arbórea < 1% e a altura média < 2 m (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Figura 3.16 - Campo Limpo representado pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

Campo Rupestre: tipo fitofisionômico predominantemente herbáceo-arbustivo com a presença eventual de arvoretas de até 2 m de altura. Compreende um complexo de vegetação que agrupa paisagens em micro-relevos com espécies típicas, que ocupam trechos de afloramentos rochosos. Ocorre, geralmente, em altitudes superiores a 900 m, ocasionalmente a partir de 700 m, onde os ventos são constantes e há variações extremas de temperatura, com noites quentes e dias frios. Os indivíduos lenhosos concentram-se nas fendas das rochas (Figura 3.17). Há locais em que os arbustos dominam a paisagem, enquanto em outros predomina a flora herbácea. A cobertura arbórea < 5% (RIBEIRO; WALTER, 2008).

Figura 3.17 - Campo Rupestre representado pelo diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) em uma faixa de 40 m de comprimento por 10 m de largura. Fonte: Ribeiro e Walter (2008)

3.3 Segunda Etapa: Correlações das Informações

Foram feitas as correlações entre todos os elementos do meio físico-biótico investigados a partir das informações dos mapas temáticos (topografia/hidrografia e vegetação), gráficos e tabelas dos dados de solos, florísticos e fitossociológicos.

3.4 Terceira Etapa: Análise e Interpretação das Variáveis que Estruturam a Paisagem

Constituiu-se da análise e interpretação de todas as informações coletadas, tabuladas e sintetizadas nos mapas, tabelas, gráficos e demais índices produzidos durante a pesquisa que caracterizam os geótopos integrantes da paisagem do Campo Sujo Seco, com a compreensão dos parâmetros ambientais e suas influências nos padrões florísticos e estruturais na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande.

3.5 Quarta Etapa: Concepção da Evolução da Paisagem

Constituiu-se da síntese de todas as informações coletadas, correlacionadas, analisadas e interpretadas nas etapas anteriores, evidenciando as características dos padrões fitogeográficos de Campo Sujo Seco, com a produção de uma diagnose do espaço a partir do mapeamento de 2011, do inventário florístico e fitossociológico e da caracterização do meio físico, a partir da qual foram feitas conclusões e sugestões de usos para a paisagem do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande. O Quadro 3.2 resume os procedimentos técnicos e metodológicos adotados nesta pesquisa.

Quadro 3.2 - Síntese dos procedimentos técnicos e metodológicos utilizados na pesquisa

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise sintética da paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

A análise sintética da paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande seguiu a hierarquia dos componentes geográficos de acordo com Bertrand (2004), estabelecendo a seguinte ordem: Zona, Domínio, Região Natural, Geossistema, Geofácies e Geótopos. (Quadro 4.1 e Figura 4.1).

4.1.1 Zona: Zonobioma II - Florestas tropicais estacionais ou savanas

A Terra possui zonas climáticas distintas, cujas extensões são determinadas pelos padrões de radiação solar e redistribuição do calor e umidade pelos ventos e correntes marinhas (RICKLEFS, 2010).

O Zonobioma II - Florestas tropicais estacionais ou savanas - constitui uma das zonas vegetacionais da geobiosfera estabelecidas por Walter (1986), com base na relação clima e vegetação e ocupa a faixa de clima tropical úmido-árido de chuvas estivais que, nas Américas, cobre uma grande área ao sul da bacia Amazônica e áreas menores que se estendem além dos 20° norte na América Central e na Venezuela (WALTER, 1986), localizando-se, portanto, na Zona Intertropical, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio (RICKLEFS, 2010).

Caracteriza-se como sendo de baixa pressão em torno do Equador, essencialmente de origem térmica, ou seja, causada pelo aquecimento solar. É chamada de Zona Intertropical de Convergência, para a qual convergem os ventos predominantes de leste, que são os alísios de nordeste e os alísios de sudeste (AYOADE, 1998). Possui climas quentes que se distinguem pela variação da quantidade de chuvas e de temperaturas como os climas equatorial, tropical, subtropical, continental e temperado, predominando os climas equatorial e tropical (RICKLEFS, 2010).

A zona Intertropical, fitogeograficamente, abrange parte dos reinos florísticos Neotropical, Paleotropical, Australiano e pequena parte do reino Holártico, estabelecidos por Takhtajan (1986). Nestes reinos, pela influência climática, ocorrem biomas do tipo Floresta Pluvial Tropical, Floresta Sazonal Tropical Savana, Deserto Subtropical, Campo Temperado Deserto e Bosque/Arbusto (RICKLEFS, 2010). Dessa forma, possui a mais alta biodiversidade do Planeta.

Quadro 4.1 – Unidades de paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Zona	Florestas tropicais estacionais ou savanas
Domínio	Domínio dos chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas-galeria - Cerrado
Região Natural	Ecorregião Araguaia Tocantins
Geossistema	Bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande
Geofácies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata Ciliar 2. Mata de Galeria 3. Mata Seca 4. Cerradão 5. Cerrado Sentido Restrito 6. Babaçual 7. Vereda 8. Campo Sujo Seco 9. Campo Limpo 10. Campo Rupestre 11. Área urbana 12. Agropecuária/Silvicultura 13. Lago reservatório, ribeirões, córregos e brejos
Geótopos do Campo Sujo Seco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campo Sujo Seco com <i>Vochysia cinnamomea</i>, <i>Byrsonima coccobolifolia</i> e <i>Vellozia seubertiana</i> em topo e vertente de morro na área 3 2. Campo Sujo Seco com <i>Vellozia seubertiana</i> e <i>Syagrus comosa</i> em topo e vertente de morro na área 1 e em vertente na área 2 3. Campo Sujo Seco com <i>Byrsonima subterrânea</i> em topo e vertente de morro na área 5 4. Campo Sujo Seco Misto com <i>Syagrus comosa</i>, <i>Vellozia seubertiana</i>, <i>Erythroxylum suberosum</i>, <i>Ouratea spectabilis</i>, <i>Piptocarpha rotundifolia</i>, <i>Dimorphandra mollis</i> em topo de morro da área 2 5. Campo Sujo Seco com <i>Vellozia seubertiana</i> em topo de morro na área 4

Figura 4.1 – Unidades de paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO. Mapa de biomas (Fonte: RICKLEFS, 2010); mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil (Fonte: AB' SABER, 2003); mapa de ecorregiões do Cerrado (Fonte: PINHEIRO et al, 2008)

Outra característica da Zona Intertropical é a falta da formação florestal, que é substituída pela vegetação do tipo savana¹ (WALTER, 1986). No Brasil, o “Domínio dos chapadões tropicais, a duas estações, recobertos por cerrados e penetrados por florestas-galerias”, estabelecido por Ab’Saber (1967), faz parte do Zonobioma II.

4.1.2 Domínio: Cerrado - Domínio dos chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas-galeria

O Cerrado, “Domínio dos chapadões tropicais interiores com cerrados e floresta-galeria” constituem um dos grandes domínios paisagísticos do Brasil. Segundo Ab’Saber (1967), existe superposição muito expressiva entre os domínios morfoclimáticos e as províncias fitogeográficas brasileiras. Este autor estabeleceu seis grandes domínios paisagísticos: 1. Domínios dos chapadões tropicais interiores com cerrados e floresta-galeria; 2. Domínio das regiões serranas, tropicais úmidas, ou dos mares de morros; 3. Domínio das depressões intermontanas semiáridas, pontilhadas de *inselbergs*, dotadas de drenagem intermitente, e recobertas por caatingas extensivas; 4. Domínio de planaltos subtropicais, recobertos por araucárias e pradarias de altitude; 5. Domínio das coxilhas subtropicais uruguaio-sul-rio-grandenses; 6. Domínio das terras baixas equatoriais, extensivamente florestas, da Amazônia brasileira.

Cada domínio possui área *core* (área nuclear) e zonas ou faixas de transição, onde se interpenetram, se diferenciam e se misturam as vezes, formando mosaicos complexos resultantes de duas ou mais áreas de contato. As áreas *core* têm individualidade plena, não havendo qualquer relação destas com as províncias geológico-estruturais do país, pois dentro dos *cores* existem terrenos de idades diferentes e de litologia variada, estando estes profundamente amarrados aos quadros de superposição dos fatos geomórficos, hidrológicos e geopedológicos e possuem filiação evolutiva muito direta com a história paleoclimática quaternária das áreas ou zonas onde eles se expandiram e se fixaram (AB’SABER, 1967). Os “Domínios dos chapadões tropicais interiores com cerrados e floresta-galeria” são descritos por Ab’Sáber (1971) como:

¹ Savanas são sistemas ecológicos formados por pradarias tropicais, nas quais algumas espécies isoladas de lenhosas vivem em competição com gramíneas e outras herbáceas. São tipos vegetacionais antagônicos (um exclui o outro) e se mantêm em equilíbrio ecológico exclusivamente nas zonas tropicais. O antagonismo deve-se às diferenças relacionadas ao sistema radicular e ao balanço hídrico (WALTER, 1986).

Área de primeira grandeza espacial avaliada entre 1,8 e 2 milhões de quilômetros quadrados. Posição geral da área: grosso-modo zonal, à semelhança das faixas de savanas na África. Região de maciços planaltos de estrutura complexa e planaltos sedimentares compartimentados; cerradões e cerrados nos interflúvios e florestas-galerias contínuas, ora mais largas ora mais estreitas; cabeceiras em “dales”, ou seja, ligeiros anfiteatros pantanosos; solos de fraca fertilidade primária, em geral; drenagens perenes para os cursos d’água principais e secundários, com desaparecimento dos “caminhos d’água” das vertentes e dos interflúvios, na época das secas; interflúvios muito largos e vales bastante esgarçados entre si, com pouca ramificação geral da drenagem na área “core” dos cerrados; enclaves de matas em manchas de solos ricos, ou áreas de cais de nascentes ou olhos d’água perenes; ausência de mamelonização, calhas aluviais de tipo particularizados, em geral não meândricas nos planaltos; níveis de pediplanação nos compartimentos de planaltos, pedimentos escalonados e terraços com cascalhos; sinais de flutuações climáticas e paisagens vinculadas nas depressões intermontanas centrais ou periféricas da grande área dos cerrados; climas de tipo sudanês, com precipitações globais variando entre 1.300 e 1.800 mm, concentradas no verão e relativamente baixas no inverno. Enclaves de *matas*, na forma de capões, de diferentes ordens de grandeza espacial.” (AB’SABER, 1971, p. 2).

4.1.3 Região Natural: Ecorregião Araguaia Tocantins

Arruda et al. (2008) estabeleceram ecorregiões, unidades de conservação e representatividade ecológica do bioma Cerrado. A Ecorregião Araguaia Tocantins foi descrita por esses autores em abordagens geomorfológica, hidrográfica, pedológica e florística com a descrição do índice de raridade distribucional e endemismo (IRD, índice de representatividade ecológica por unidades de conservação de proteção integral (UCPI) e de unidades de conservação de uso sustentável (UCUS), como exposto a seguir.

A Ecorregião Araguaia Tocantins está localizada no noroeste do domínio do Cerrado, possui uma área de 244.598,1 km², o que representa 12,2% do Cerrado. Faz parte da unidade geomorfológica regional de superfícies de aplanamentos que corresponde a extensa área com caimento regional em direção norte. Os relevos dominantes incluem-se em padrão de formas de topo convexo, medianamente extensas, e formas de topos tabulares amplas a medianamente extensas, com a presença de relevos residuais que constituem pequenas serras. Na porção norte, trunca sedimentos da bacia sedimentar do Parnaíba. As altitudes variam de 150 a 500 m e seus principais rios são o Araguaia e o Tocantins com muitos afluentes. Os solos predominantes são o Latossolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Vermelho-Amarelo, Concrecionários, Neossolos Litólicos e Neossolos Quartzarênicos (ARRUDA et al., 2008).

A flora caracteriza-se por dois complexos vegetacionais comuns no Cerrado: 3A2 no norte da ecorregião e 3B2 no sul. As espécies indicadoras são: *Cyrtopodium blanchetii*, *C. eugenii*; *Habenaria anisitsii*, *H. cryptophila*, *H. obtusa*, *H. pratensis*, *Jacaranda brasiliana*, *J. mutabilis*, *J. rufa*, *Mimosa brachycarpa*, *M. clausenii*, *M. distans*, *M. foliolosa*, *M. gracilis*,

M. hirsutissima, *M. laticifera*, *M. nuda*, *M. polycephala*, *M. xanthocentra*, *M. xavantina*, *Phoradendron crassifolium*, *P. bathyoryctum*, *Psittacanthus biternatus*, *P. robustus*, *Tabebuia aurea*, *T. impetiginosa*, *T. ochracea* e *T. roseoalba* (ARRUDA et al., 2008).

O índice de raridade distribucional e endemismo (IRD) dessa ecorregião apresentou valor médio de 0,068, ocupando a 17ª posição entre as 22 ecorregiões do Cerrado, indicando que, as espécies presentes têm ampla distribuição. Entre os táxons indicadores foram registradas nove espécies endêmicas (*Mimosa cyclophylla*, *M. densa*, *M. hypnodes*, *M. longepedunculata*, *M. manidea*, *M. rheiptera*, *M. somnambulans*, *M. vestita* e *Vernonia echinocephala*) e nove não endêmicas (*Dyckia racemosa*, *Habenaria goulieana*, *Miconia pileata*, *Phoradendron jenmani*, *P. multifoveolatum*, *Phthirusa theloneura*, *Struthanthus uruguayensis*, *S. vulgaris* e *Vernonia eriolepis*), exclusivas dessa ecorregião, o que leva a aumentar o IRD.

O índice de representatividade ecológica por unidades de conservação de proteção integral (UCPI) foi de 2,83% e de 0,01% de unidades de conservação de uso sustentável (UCUS). As unidades de conservação nessa ecorregião são: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Nascentes de Rio Parnaíba, Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual do Jalapão, Floresta Estadual do Araguaia e Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Águas de São João (ARRUDA et al., 2008).

Também fazem parte dessa ecorregião no Estado do Tocantins, de acordo com o Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS)², o Parque Nacional do Araguaia, a Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do Tocantins, Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins, Parque Estadual do Lageado, Monumento Natural Municipal Canyons e Corredeiras do rio Sono e as seguintes Áreas de Proteção Ambiental (APA): Serra da Tabatinga, Nascentes de Araguaína, Lago de Palmas, Serra do Lageado, Foz do rio Santa Teresa, Ilha do Bananal/Cantão, do Jalapão e Lago de Peixe/Angical, Lago de São Salvador do Tocantins, Paranã e Palmeirópolis, do Lago Santa Isabel. Além dessas unidades de conservação há Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN): Fazenda Sonhada, Canguçu, Bela Vista, Reserva Sítio Ecológico Monte Santo, Catedral do Jalapão, Água Bonita, Fazenda Calixto, Reserva Minnehaha.

Estas unidades de conservação acima citadas para o Estado do Tocantins totalizaram 30.518,072 km², não inclusos nos índices de representatividade ecológica por UCPI e UCUS

² Disponível em: <<http://naturatins.to.gov.br/biodiversidade-e-reas-protegidas/>> Acesso em 8 dez. 2013.

calculado por Arruda et al. (2008), significando que a área de preservação dessa ecorregião é maior, o que contribui para elevar tais índices dessa ecorregião.

4.1.4 Geossistema: Bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande

A bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande localiza-se na parte centro sul do município de Palmas, entre as coordenadas geográficas de 10°10'33" e 10°25'18" de latitude sul e 48°03'57" a 48°23'03" de longitude oeste, estando totalmente inserida neste município que faz parte da IX Região Metropolitana de Palmas, na região norte do Brasil (SEPLAN, 2012).

Na hierarquia fluvial, o ribeirão Taquaruçu Grande constitui uma bacia de 5ª ordem do rio Tocantins pela margem direita do seu curso médio (Figura 4.2). Tem como rio principal o próprio ribeirão Taquaruçu Grande, no qual se destacam, pela margem direita, os córregos Tiúba e Macacão e, pela margem esquerda, os córregos Machado, Buritizal e o ribeirão Taquaruçuzinho, seu principal tributário. O ribeirão Taquaruçu Grande tem parte de seu curso na unidade de relevo de Depressão do Tocantins e outra parte no Planalto Residual do Tocantins, mais especificamente, na serra do Lageado, onde tem suas nascentes.

Espacialmente, esta bacia hidrográfica se apresenta na forma triangular (CHRISTOFOLETTI, 1980), podendo-se considerar dois momentos distintos, ou seja, antes e depois da formação do lago reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (UHE Luís Eduardo Magalhães). No primeiro momento, a bacia possuía área de 46.307,31 hectares, que correspondiam a aproximadamente 20% do município de Palmas (Figura 4.3). E, no segundo momento (Figura 4.4), com enchimento do referido lago, reduziu 129,84 hectares da área original ao atingir sua cota máxima de enchimento (212 m) em 2000 (INVESTICO)³, passando a 46.177,47 hectares.

Geomorfologicamente, registram-se altitudes que variam de aproximadamente 200 a 700 m. Esta variação topográfica confere categorias geomorfológicas à área que incluem vales fluviais, planícies, planaltos e chapadas, que se interconectam por vertentes e cânions. Os vales constituem as cotas mais baixas com altitudes em torno de 200 m, enquanto que os planaltos e chapadas, com topos aplainados ou suavemente ondulados, constituem as áreas de cimeira e chegam a cerca de 700 m de altitude (Figura 4.5). As planícies estendem-se entre a

³ Disponível em: <<http://www.divulgueja.com.br/investco/index.php?inv=ap/emp/historico.php>>. Acesso em 15/10/2011.

Figura 4.2 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da Diretoria do Serviço Geográfico, Ministério do Exército e IBGE (1979) e imagem Landsat 2011

Figura 4.3 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da Diretoria do Serviço Geográfico, Ministério do Exército e IBGE (1979)

Figura 4.4 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base na Carta da Diretoria do Serviço Geográfico, Ministério do Exército e IBGE (1979) e imagem Landsat 2011

serra do Lageado e o rio Tocantins, trecho hoje em parte transformado em lago reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. Estas planícies são parte da feição geomorfológica Depressão do Tocantins, onde as altitudes estão entre 200 e 300 m (Figura 4.5).

Característica peculiar desta bacia é sua rede hidrográfica ser formada por córregos que correm, em geral, em vales fluviais estreitos e encaixados, formando cânions em meio aos planaltos e chapadas no centro, norte, nordeste, leste, sudeste e sul da bacia, ocupando grande parte de sua área, na serra do Lageado.

Neste cenário topográfico (Figur 4.6), há variada biota vegetal, onde ocorrem campos, cerrados e matas localizados nas áreas de chapadas e planaltos e descendo pelas vertentes pediplanadas e cânions, também ocorrem nas planícies secas. Já nas planícies ou vales úmidos, há Veredas, enquanto nos fundos dos vales fluviais há Matas de Galeria ou Ciliar, que formam um sistema conjunto com as Matas Secas, que sobem vertentes e cânions fazendo a conexão entre as geofácies na bacia.

A diversidade vegetal da bacia compõe-se de espécies que englobam fitofisionomias florestais, savânicas e campestres, incluindo Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Vereda, Cerrado Sentido Restrito e Campo Sujo, que compõem os geofácies do ambiente natural na paisagem, como resultado da dinâmica histórica geológica, geomorfológica e climática à qual pertence esta bacia.

Figura 4.5 - Mapa Topográfico da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base Carta da Diretoria do Serviço Geográfico, Ministério do Exército e IBGE (1979) e imagem Landsat 2011

Figura 4.6 – Relevo com planícies, vales, vertentes, cânions, chapadas e planaltos na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO, com base na imagem Landsat 2011 (Organização: T.C.C. Medeiros e S.S.V. de Cristo)

4.1.5 Geofácies e Geótopos

A espacialização dos geofácies na paisagem na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande está fortemente relacionada à geomorfologia e a disposição da rede de drenagem (Figura 4.7) e aos solos. Os geofácies Mata Ciliar, Mata de Galeria, Vereda, Campo Limpo e Lago reservatório, ribeirões, córregos e brejos estão associados às áreas dos vales e planícies fluviais. Já a Mata Seca, o Cerradão, o Cerrado Sentido Restrito e o Campo Sujo Seco, Campo Rupestre, Babaçual estão associados às vertentes e aos ambientes de topo (chapadas e planaltos ou a planícies secas). O geofácie Área Urbana localiza-se especificamente na planície seca e Agropecuária/Silvicultura ocorre nas várias formas do relevo.

Na classificação da paisagem a unidade de paisagem Floresta (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Vereda e Campo Limpo Úmido) tem dominância na bacia hidrográfica com uma área de 15.261,48 hectares, estando em segundo lugar o Cerradão, seguido pelo Campo Sujo Seco e Cerrado Sentido Restrito (Tabela 4.1).

Tabela 4.1 – Classificação da paisagem (com respectivas áreas), com base nas Geofácies na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), para o ano de 2011

Unidades de Paisagem	Área (ha)	Área (%)
Floresta	15.763,32	34,1
Cerradão	12.850,92	27,8
Campo Sujo	7.478,82	16,2
Cerrado Sentido Restrito	4.964,31	10,7
Área urbana ou rural edificadas	2.844,09	6,2
Agropecuária/Silvicultura	1.872,81	4,0
Lago Reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães	403,20	1,0
Total	46.177,47	100

Figura 4.7 – Mapa de unidades de paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO, com base na imagem Landsat 2011

Outros estudos já mapearam a bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande. Comparando o mapeamento das unidades de paisagem com outros já realizados em datas anteriores (Tabela 4.2), verificou-se uma redução de 2,7% nas áreas de Mata de Galeria, Mata Ciliar e Matas Secas entre 1998 (SOUZA, 2006) e 2011 e diminuição de 0,9% entre 2006 (SOUZA, 2006) e 2011. Em relação aos dados apresentados por Martins e Monteiro (2013), a diferença foi de 5,4 % para o período entre 1998/2006 e 2011.

Em relação ao Campo Sujo e Cerrado Sentido Restrito, torna-se difícil estabelecer comparações tendo em vista que o sistema de classificação utilizado no mapeamento foi diferente entre os três trabalhos.

O Cerradão apresentou uma área bem mais elevada (15,8%) que em Martins e Monteiro (2013), estando mais próxima da área estabelecida por Souza (2006), muito embora neste sistema de classificação o Cerradão esteja agrupado com cerrado e campo (Tabela 4.2). Porém, muitas áreas de Campo Sujo foram consideradas como pastagem por Souza (2006) em comparação com a área no presente mapeamento. Mas, se considerarmos as áreas de Cerradão, Cerrado e Campo, com parte da pastagem estabelecidas por Souza (2006), que é Campo, chega-se a valores semelhantes aos do mapeamento de 2011 (Tabela 4.2).

Quanto às áreas urbanizadas, há valores semelhantes com a área apresentada por Martins e Monteiro (2013), considerando o alto valor para pastagem em Souza (2006). A área ocupada pelo lago da UHE Luís Eduardo Magalhães foi semelhante entre 2006 e 2011.

As diferenças existentes os diferentes mapeamentos analisados podem estar relacionadas a questões metodológicas, assim como as características das imagens utilizadas no mapeamento. Souza (2006) e Martins e Monteiro (2013) utilizaram imagens LANDSAT no mapeamento de 1998 e no mapeamento de 2005 (SOUZA, 2006) e de 2006 (MARTINS; MONTEIRO, 2013), utilizaram imagens CBERS-2. Estas imagens possuem resolução de 20 x 20 m, enquanto a imagem LANDSAT TM 5 utilizada no presente estudo tem resolução de 30 x 30 m. Um outro fator a considerar é que tais imagens possuem sistemas sensores com imageadores diferenciados: no LANDSAT, o *Thematic Mapper* e no CBERS o Imageador por Varredura de Média (IRMSS), Imageador de Amplo Campo de Visada (WFI) e a Câmera Imageadora de Alta Resolução (CCD).

Além desses aspectos, os sistemas de classificação utilizados nos mapeamentos também foram diferentes e, no processo de classificação da imagem, optou-se pela classificação supervisionada a partir de pontos controle e realização de checagem de campo, usando-se a chave de identificação de fitofisionomias produzidas por Ribeiro e Walter (2008)

para a identificação das fitofisionomias no ambiente natural. Souza (2006) fez trabalho de campo, enquanto Martins e Monteiro (2013) realizaram a classificação em tela do computador.

Tabela 4.2 – Índices das unidades de paisagem de diversos mapeamentos da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Unidades de Paisagem	Imagem de 2011 Este Trabalho	Imagem de 1998 Sousa (2006)	Imagem de 2005 Sousa (2006)	Imagem de 1998 Martins e Monteiro (2013)	Imagem de 2006 Martins e Monteiro (2013)
Floresta	34,1 %				
Floresta de Galeria/ Vertente		36,8 %	35,0 %		
Mata de Galeria + Floresta Estacional Semidecidual + Mata Ciliar				39,07 %	39,05%
Cerradão	27,8 %			14,0 %	12,0 %
Campo Sujo Seco	16,2 %				
Cerrado Sentido Restrito	10,7 %			30,0 %	29,0 %
Cerrado (Cerrado + Cerradão + Campo)		38,9 %	37,0 %		
Agropecuária/Silvicultura	6,2 %				
Áreas urbanizadas/antropizadas		3,9 %	10,0 %		
Área Urbana				4,0 %	8,0 %
Agropecuária/Silvicultura	4,0 %				
Lago Reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães	1,0 %				1,0 %
Pastagem		16,6 %	18,0 %	2,0 %	4,0 %
Queimadas		3,8 %	-		
Culturas perenes				3,0 %	0 %
Cerrado Campestre				8,0 %	7,0 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.1.5.1 GeofÁCie Mata Ciliar

A Mata Ciliar está presente principalmente no curso inferior dos ribeirões Taquaruçuzinho e Taquaruçu Grande, quando estes ficam mais largos (Figura 4.8). Ocorrem as espécies *Inga* sp. (ingás), *Tabebuia* sp. (ipês), *Mauritia flexuosa* L. f. (Buriti), *Xylopia ermaginata* Mart. (Pindaíba-d'água), *Vochysia haenkeana* Mart, *Physocalymma* sp, *Hymenaea stagnocarpa* Mart. Ex Hayne (Jatobá) e *Cecropia* sp. (Embaúba) *Jacaranda cuspidifolia* (Caroba), *Cuspidaria* sp.,

Este geofÁCie apresentou uma dinâmica espacial, tendo-se como base a tipologia dinâmica de geossistemas estabelecida por Bertrand (2004), que corresponde à geofÁCies em “resistasia” do tipo “resistasia verdadeira”, pela destruição total da vegetação e do solo (nos trechos inundados com o enchimento do Lago Reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães), dando lugar a um novo geofÁCie na paisagem (área inundada pelo Lago), no curso inferior do ribeirão Taquaruçu Grande. A Mata Ciliar original foi submersa pelo Lago e muitos trechos da paisagem, atualmente, apresentam-se fortemente humanizados com práticas agropecuárias (Figura 4.8)..

Figura 4.8 – Mata Ciliar no ribeirão Taquaruçuzinho, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fonte: Projeto Taquaruçu. Disponível em: < www.projetotaquarussu.com.br > Acesso em 08 dez. 2013

4.1.5.2 GeofÁCie Matas de Galeria

As Matas de Galeria ocorrem nos vales encaixados entre os chapadões e planaltos, com margens com topografia acidentada. São encontradas ao longo dos ribeirões⁴ Taquaruçu Grande e Taquaruçuzinho e córregos⁵ Tiúba, Macacão, Machado e Buritizal e Brejo da Lagoa. As espécies que ocorrem nessas matas são: *Inga edulis* Mart., *Inga* sp. (Ingás), *Tabebuia* spp. (Ipês), *Mauritia flexuosa* L. f. (Buriti), *Xylopia ermaginata* Mart. (Pindaíba-d'água), *Xylopia* sp., *Mandevilla* spp. e *Vochysia haenkeana* (Spreng.) Mart., *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith, entre outras.

Este geofÁCie apresentou subtipos, podendo-se observar Mata de Galeria não inundável e Mata de Galeria inundável (Figura 4.9; 4.10), seguindo-se a classificação fitofisionômica de Ribeiro e Walter (2008). A transição com as matas de vertente (Cerradão ou Matas Secas) ocorre de forma imperceptível, como comentado por Ribeiro e Walter (2008).

A Mata de Galeria na tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), enquadra-se em mais de uma tipologia. Em determinadas áreas observou-se o tipo “biostasia”, onde a atividade geomorfológica é fraca ou nula. O potencial ecológico é mais ou menos estável. O sistema de evolução é dominado pela pedogêneses, competição entre espécies vegetais, etc... A intervenção antrópica pode provocar dinâmica regressiva da vegetação e dos solos, mas, não compromete gravemente o equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica. Correponde a geofÁcies “climácicos”, “plesioclimácicos” ou “subclimácicos”, paisagens onde o clímax é mais ou menos conservado, a intervenção humana é de caráter limitado, sem comprometer o equilíbrio de conjunto. Em caso de ocorrência de desmatamento ou eventos de ordem natural a reconstrução da cobertura vegetal e dos solos ocorre bem rapidamente; o potencial ecológico não parece modificado.

Por outro lado, há setores onde se observa o tipo “biostasia” com dinâmica regressiva sem modificação importante do potencial ecológico, mas a vegetação foi modificada ou destruída e os solos transformados pelas atividades antrópicas.

⁴ Ribeirão: curso de água maior do que o regato, mas menor que um rio (KOOGAN: HOUAISS, 2000).

⁵ Córrego: Riacho, robeiro, regato (KOOGAN: HOUAISS, 2000).

Figura 4.9 – Matas de Galeria do Brejo da Lagoa, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2010

Figura 4.10 – Matas de Galeria inundável do ribeirão Taquaruçuzinho, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2010

4.1.5.3 GeofÁCie Mata Seca

As Matas Secas ocorrem nos topos ou nas vertentes dos interflúvios e planícies secas (Figura 4.11). Neste geofÁCie foram observadas Mata Seca Sempre Verde, Mata Seca SemidecÍdua, Mata Seca DecÍdua (subtipos de Mata Seca de acordo com a classificação de RIBEIRO; WALTER, 2008).

Algumas espécies ocorrentes são: *Handroanthus ochraceus* (Cham.) Standley (Ipê do Cerrado), *Tabebuia* spp. (ipês), *Caryocar brasiliense* Camb. (Pequi), *Anadenantera* spp. (Angicos), *Vatairea macrocarpa* (Benth.) (Angelim-do-Cerrado), *Maximiliana maripa* (Aubl.) Drude, (InajÁ) *Vochysia tucanorum* Mart. (Pau-Tucano), *Vochysia* spp., *Bowdichia virgilioides* H. B. K., *Pterodon ermaginatus* Vog., e *Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart. (Macaúba).

Figura 4.11 – Mata Seca em vertentes à margem direita do córrego Mutum, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

Quanto à tipologia dinâmica de geossistema (BERTRAND, 2008) há setores mais preservados que se enquadram como do tipo “biostasia”, correspondendo a geofÁCies “climÁcicos”, “plesioclimÁcicos” ou “subclimÁcicos”, como já descrito para o geofÁCie Mata de Galeria. E há setores do tipo “biostasia” com dinâmica regressiva sem modificação importante do potencial ecológico, mas fortemente humanizados, onde a vegetação foi modificada ou destruída e os solos transformados pelas atividades agropecuÁrias, porém, sem haver o rompimento do equilíbrio ecológico, em chapadas, planaltos e vertentes da serra do Lageado. Já nas planícies secas (Depressão do Tocantins), a dinâmica corresponde ao tipo

geofácies em “resitasia” com “resistasia verdadeira”, pela destruição total da vegetação e do solo (nos trechos urbanizados), dando lugar a um novo geofácie, o urbano, a cidade de Palmas.

A Mata Ciliar, a Mata de Galeria e a Mata Seca constituem formações florestais (RIBEIRO; WALTER, 2008) e na classificação da paisagem, esses geofácies compuseram a unidade “Floresta”, que totalizou 15.763,32 ha (34,1%) da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande (Tabela 4.1; Figura 4.7).

4.1.5.4 Geofácie Cerradão

Assim como as Matas Secas, o Cerradão (Figura 4.12) ocorre nos topos ou nas vertentes dos interflúvios, ou nas planícies secas. Ocupa uma área de 12.850,92 ha (27,8%) na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande (Tabela 4.1; Figura 4.7). Sua flora constitui um misto de espécies de mata e de cerrado com *Curatela americana* Lin. (Sambaíba), *Caryocar brasiliense* Camb. (Pequi), *Bowdichya virgilioides* H. B. K. (Sucupira preta), *Pterodon ermagenatus* Vog. (Sucupira branca), *Vatairea macrocarpa* (Benth.) (Angelim-do-cerrado), *Kielmeyera coriacea* (Spreng.) Mart. (Pau-santo), *Hymenaea stignocarpa* Mart. Ex Hayne (Jatobá), *Qualea parviflora* Mart. (Pau-terra-de-folha-grande), *Qualea grandiflora* Mart. (Pau-terra-de-folha-pequena) e *Vochysia tucanorum* Mart. (Pau-tucano), entre outras.

Figura 4.12 - Cerradão em área de chapada entre o vale do ribeirão Taquaruçuzinho e o ribeirão Taquaruçu Grande, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

Assim como na Mata Seca, enquadra-se na tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), como do tipo “biostasia”, correspondendo a geofácies “climácicos”, “plesioclimácicos” ou “subclimácicos”, bem como do tipo “biostasia” com dinâmica regressiva, além de se observar também o tipo “resistasia” com “resistasia verdadeira”, como já comentado para a Mata Seca.

4.1.5.5 Geofície Cerrado Sentido Restrito

Este geofície Ocorre nos topos, nas vertentes dos interflúvios ou nas planícies secas, assim como a Mata Ciliar, Mata de Galeria e Mata Seca. Ocupa uma área de 4.964,31 ha (10,7%) da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande (Tabela 4.1; Figura 4.7), onde ocorrem as espécies *Caryocar brasiliense* (Pequi), *Anacardium microcarpum* Ducke (Cajuí), *Astronium fraxifolium* Schott., *Aspidosperma tomentosa* Mart., *Hancornia speciosa* Gomez (Mangaba), *Tabebuia* spp., (Ipês), *Piptocarpa rotundifolia* (Less.) Baker (Cabelo de negro), *Bulbostylis paradoxa* Ness (Capim barba-de-bode), *Rincosphora* sp., *Curatela americana* Linn. (Sambaíba), *Bauhinia* spp. (Pata de vaca) e *Byrsonima* spp. (Muricis), entre outras.

Assim como a Mata Seca e o Cerradão, enquadra-se na tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), do tipo “biostasia”, correspondendo a geofácies “climácicos”, “plesioclimácicos” ou “subclimácicos”; do tipo “biostasia” com dinâmica regressiva; e do tipo “resistasia” com “resistasia verdadeira”, como já comentado para a Mata Seca. O geofície Cerrado Sentido Restrito apresentou os seguintes subtipos: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo (Figura 4.13), Cerrado Rupestre (Figura 4.14), fitofisionomias descritas por Ribeiro e Walter (2008).

Figura 4.13 – Cerrado Sentido Restrito em área de chapada entre o vale do ribeirão Taquaruçuzinho e o ribeirão Taquaruçu Grande, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

Figura 4.14 - Cerrado Rupestre, no vale do Vai Quem Quer, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

4.1.5.6 Geofácie Vereda

A Vereda (Figura 4.15) ocorre em vales mais amplos na planície da Depressão do Tocantins, bem como nas áreas de topo no interior de planaltos ou chapadas da Serra do Lageado (Planalto Residual do Tocantins). A ocorrência de Vereda está condicionada à presença de afloramento ou proximidade com a superfície do lençol freático, em áreas de solos Gleis (hidromórficos). É, geralmente, circundada por Campo Limpo Úmido.

Outra característica da Vereda é a presença da palmeira *Mauritia flexuosa* L.f. (Buriti), que ocorre com espécies dicotiledôneas com altura e adensamentos variados como, *Miconia albicans* (Sw.) Triana, *Myrcia splendens* (Sw.) DC., *Vochysia tucanorum* Mart. (Pau tucano), *Jacaranda* spp. *Mandevilla* sp., dentre outras.

A Vereda enquadra-se na tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), do tipo “biostasia”, correspondendo a geofácies “climácicos”, “plesioclimácicos” ou “subclimácicos”, mas também do tipo “resentasia” com “resistasia verdadeira”, correspondendo aos trechos em que as Veredas foram substituídas pelas estradas.

Figura 4.15 - Vereda em área adjacente ao vale de tributário do córrego Mutum, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

4.1.5.7 Geofácie Campo Sujo Seco

O Campo Sujo Seco (subtipo de Campo Sujo na classificação fitofisionômica do Cerrado de RIBEIRO; WALTER, 1998; 2008), é caracteristicamente herbáceo-arbustivo, ocorrendo predominantemente, nos topos da serra do Lageado (chapadas e planaltos), em altitudes elevadas em torno de 600 a quase 700 m, em relevo suavemente ondulado, mas também em áreas de planícies secas, porém, com baixa expressividade (Figura 4.16). Ocupa uma área de 7.478,82 ha (16,2%) da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande (Tabela 4.1; Figura 4.7).

No Campo Sujo Seco ocorrem *Anacardium humile* A.St.-Hil (Cajuí), *Annona macrocarpa* Barb. Rodr. (Bruto), *Himatanthus obovatus* (M. Arg.) Woods. (Pau de leite), *Trimezia juncifolia* (Klatt.) Benth., *Connarus suberosus* Planch., *Piptocarpa rotundifolia* (Less.) Baker (Cabelo de negro), *Bulbostylis paradoxa* Ness. (Capim barba de bode), *Rhyncosphora consanguinea* (Kunth.) Böeckeler, *Panicum maximum* Hochst. Ex Rich (Capim colônia), *Davilla elliptica* St. Hill, *Manihot violacea* Pohl e *Kilmeyera coriacea* (Spr.) Mart., *Velozia seubertiana* Goethart & Henrard (Canela de ema), dentre outras.

Na tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), este geofácie enquadra-se como do tipo “biostasia”, correspondendo a geofácies “climácicos”, “plesioclimácicos” ou “subclimácicos”.

Figura 4.16 – Campo Sujo Seco em área de topo e vertentes suavemente onduladas de chapadas, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

No geofácie Campo Sujo Seco pode-se observar trechos em que a exploração biológica (vegetação) tem composição florística bem específica, constituindo-se em geótopos deste geofácie:

- a) Campo Sujo Seco com *Vochysia cinnamomea*, *Byrsonima coccobolifolia* e *Vellozia seubertiana* em topo e vertente na área 3;
- b) Campo Sujo Seco com *Vellozia seubertiana* e *Syagrus comosa* em topo e vertente na área 1 e em vertente na área 2;
- c) Campo Sujo Seco com *Byrsonima subterrânea* em topo e vertente na área 5;
- d) Campo Sujo Seco Misto com *Syagrus comosa*, *Vellozia seubertiana*, *Erythroxylum suberosum*, *Ouratea spectabilis*, *Piptocarpha rotundifolia*, *Dimorphandra mollis* em topo da área 2;
- e) Campo Sujo Seco com *Vellozia seubertiana* em topo na área 4

O geofácie Campo Sujo Seco foi estudado de forma individualizada a partir do item 4.2.

Na área de ocorrência de Campo Sujo Seco, ocorrem afloramentos da Formação Pimenteiras, com ocorrência de fósseis de Crinóides (animais marinhos), indicando a invasão do mar em épocas pretéritas na região central do Brasil, devido a processos de subsidência que acometeram a Plataforma Sul-Americana em épocas geológicas passadas, a partir do Siluriano/Devoniano Inferior e que ocasionou a formação da Bacia sedimentar do Parnaíba, posteriormente soerguida por processo decorrentes da orogênese andina (SCHOBENHAUS; NEES, 2003) (Figura 4.17).

Figura 4.17 – Fósseis de Crinóides em Campo Sujo Seco em chapada, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

4.1.5.8 Geofácie Campo Limpo

O Campo Limpo (uma das fitofisionomias do Cerrado estabelecidas por RIBEIRO; WALTER, 1998; 2008), é predominantemente herbáceo, possui poucos arbustos e não tem árvores (Figura 4.18). Ocorre, geralmente, associado às Matas Ciliares e de Galeria ou Veredas, onde o terreno não é acidentado, caracterizando-se como Campos Limpos Úmidos, embora que sazonalmente em alguns trechos. Por ocorrer em pequenas áreas associadas às Matas Ciliares e de Galeria e Veredas, na classificação da paisagem foi incluso na unidade Floresta.

Figura 4.18 – Campo Limpo úmido em área de Vereda, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013

Apresenta uma grande ocorrência do Gênero *Rhynchospora* Vahl da família Cyperaceae. Outros gêneros ocorrentes são *Eleocharis* sp., também da família Cyperaceae e *Pteridium* sp. (Samambaia). Assim como o Campo Sujo Seco enquadra-se na tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), como do tipo “biostasia”, correspondendo a geofácies “climácicos”, “plesioclimácicos” ou “subclimácicos”.

4.1.5.9 Geofície Campo Rupestre

O Campo Rupestre (uma das fitofisionomias do Cerrado estabelecidas por RIBEIRO; WALTER, 1998; 2008), é caracteristicamnte herbáceo-arbustivo e com pouca presença de arvoretas. Ocorre em vertentes íngrimes das bordas dos chapadões e planaltos com altitudes em torno de 700 m, onde há afloramentos rochosos e geralmente, associado ao Cerrado Sentido Restrito (Figura 4.19). Por ocorrer em áreas mais restritas, na classificação da paisagem foi incluso na unidade Cerrado Sentido Restrito.

Ocorrem espécies como: *Schefflera macrocarpa* (Cham. & Schltdl.) Frodin (Manfdiocão), *Ananas ananassoides* (Baker) l. B Sm. (Abacaxi do Cerrado), *Bulbostylis paradoxa* Ness. (Capim barba de bode), *Bulbostylis* sp. e espécies dos gêneros *Miconia*, *Rhynchospora*, *Trimezia*, *Calliandra*, *Chamaecrista*, *Mimosa*, *Diplusodon*, *Axonopus*, *Panicum*, *Trachypogon*, *Manihot* e *Vellozia*.

Figura 4.19 - Campo Rupestre em vertente íngreme de morro à margem esquerda do Brejo da Lagoa, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

Com relação à tipologia dinâmica de geossistemas (BERTRAND, 2004), este geofácio enquadra-se no tipo em “resistasia” com “geomorfogênese natural”, comum em regiões mais secas e em altitudes elevadas, onde a erosão faz parte do “clímax”, contribuindo para limitar naturalmente o desenvolvimento da vegetação e dos solos.

4.1.5.10 Geofácio Babaçal

O Babaçal é um palmeiral de babaçu (*Attalea speciosa* Mart. ex Spreng.), um subtipo de Palmeiral na classificação fitofisionômica do Cerrado de Ribeiro e Walter (1998; 2008). Ocorre nos planaltos, planícies ou encostas, sem associação com os ribeirões e córregos (Figura 4.20). Geralmente está associado às atividades antrópicas como ações de desmatamentos e queimadas, ocorrendo em áreas desmatadas nos geofácies Cerrado Sentido Restrito, Cerradão e Matas Secas. Juntamente com o Babaçu também ocorrem gramíneas, ciperáceas e outras plantas herbáceas.

Figura 4.20 - Babaçal em área de chapada entre o vale do ribeirão Taquaruçuzinho e o córrego Mutum, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011

Este geofácio substituiu os geofácies naturais em decorrência do processo de “resistasia verdadeira” (Bertrand (2004), provocada pela ação antrópica (desmatamentos e queimadas) em trechos de Mata Seca, Cerradão e Cerrado Sentido Restrito. Na classificação da paisagem foi inserido nas unidades Floresta, Cerradão e Cerrado Sentido Restrito.

4.1.5.11 GeofÁCie Área Urbana

A Área Urbana compreende a cidade de Palmas e a sede do Distrito de Taquaruçu, no município de Palmas (TO). A cidade de Palmas localiza-se na área de planície fluvial do rio Tocantins (Depressão do Tocantins) e o distrito de Taquaruçu na serra do Lageado. Este geofÁCie ocupa uma área de 2.844,09 ha (6,2%) da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande (Tabela 4.1; Figura 4.7) e expressa a ação antrópica que se caracteriza por meio das edificações e equipamentos urbanos destinados às funções de habitação, trabalho, serviços, recreação e circulação, entre outros (Figura 4.21 e 4.22).

Figura 4.21 – Aspecto da área urbana da cidade de Palmas (Palácio dos Girassóis e Assembleia Legislativa), município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013

Figura 4.22 - Aspecto da área urbana do distrito de Taquaruçu, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013

O geofácio Área Urbana na dinâmica da paisagem substituiu o ambiente natural em decorrência do processo de “resistasia verdadeira” (BERTRAND, 2004), provocada pela ação antrópica (total remoção) em trechos de Mata Seca, Cerradão e Cerrado Sentido Restrito, para instalação dos equipamentos urbanos, cujo processo de transformação é progressivo pela expansão das cidades de Palmas e Taquaruçu. Em meio à área urbana de Palmas pode-se ainda observar fragmentos florestais e savânicos (Figura 4.23).

O município de Palmas possuía uma população de 228.332 habitantes em 2010, estimada para o ano de 2013 em 257.904 habitantes⁶, a população de Taquaruçu, entretanto, foi de 4.739 habitantes em 2010, correspondendo a apenas 2,1% da população de Palmas .

Figura 4.23 - Aspecto da área urbana de Palmas (TO), onde se observa fragmentos florestais e savânicos, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: *Google Earth*, 2013⁷

4.1.5.12 Geofácio Agricultura/Silvicultura

Compreende áreas de usos antrópicos diversos fora da área urbana como os usos agropecuários (arroz, feijão, mandioca e milho, dentre outras culturas, pastagens e criações de

⁶Disponível em:

<<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=172100&search=tocantins|palmas>> Acesso em 09 dez. 2013.

⁷ Google Earth. Imagens de Palmas (TO).Disponível em: <<http://www.google earth.com.br/>> . Acesso em: 08 dez. 2013.

animais), áreas de reflorestamento com *Eucalyptus* sp. e solo exposto (Figura 4.24 e 25) e ocupam uma área de 1.872,81 ha (4,0 %) da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande (Tabela 4.1; Figura 4.7).

Figura 4.24 – Atividades Agropecuárias/Silvicultura como reflorestamento de *Eucalyptus* sp. (a), e desmatamento (b), na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2011/2013

Figura 4.25 – Atividades Agropecuárias/Silvicultura, com aspectos da agricultura (a) e da pecuária (b), na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia disponível em: <www.portalnorte.com.br>; <www.memorialduke.com.br>. Acesso em 08 dez. 2013

Este geofácio na dinâmica da paisagem substituiu o ambiente natural em decorrência do processo de “resistasia verdadeira” (Bertrand (2004), provocada pela ação antrópica (desmatamentos e queimadas) em trechos de Mata Seca, Cerradão e Cerrado Sentido Restrito, para instalação das áreas agrícolas, pastagens e criação de animais.

4.1.5.13 Geofácio Lago Reservatório, Ribeirões, Córregos e Brejos

Corresponde à rede de drenagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, em geral formada por córregos, sendo os principais: Tiúba, Macacão Machado, Buritizal e o ribeirão Taquaruçuzinho, principal tributário do ribeirão Taquaruçu Grande, além Lago Reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães (Figura 4.26), com área de 403,20 ha, correspondendo a 1% da área da bacia hidrográfica (Tabela 4.1, Figura 4.7), no curso inferior do ribeirão Taquaruçu Grande.

Figura 4.26 – Lago e ribeirão Taquaruçuzinho, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: T. C. C. Medeiros, 2013

Uma característica peculiar da hidrografia da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande são as cabeceiras de drenagem em anfiteatro devido à geomorfologia e a geologia da área. Vários córregos são originados e alimentados pela drenagem que devido à erosão do terreno, formam cachoeiras nas bordas dos chapadões (Figura 4.27).

A dinâmica da paisagem hídrica mostra transformações do ambiente natural em decorrência de alterações, já comentadas, nos diversos geofácies da bacia hidrográfica, contribuindo para a degradação dos corpos d' água.

A paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande apresentou níveis diferenciados na sua dinâmica geossitêmica. Na área de planície (Depressão do

Tocantins), principalmente, a transformação geossistêmica foi drástica em virtude da implantação da capital do Estado, Palmas. Também houve mudanças hidrológicas drásticas no curso inferior do Ribeirão Taquaruçu Grande com o enchimento do Lago Reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães. Dessa forma, na Depressão do Tocantins a dinâmica geossistêmica dos geofácies foi mais rápida e em maior escala para “resistasia verdadeira”. Na serra do Lageado (Planalto Residual do Tocantins), entretanto, a dinâmica geossistêmica para “resistasia verdadeira” tem sido mais lenta e em menor escala, embora também ocorram mudanças drásticas na paisagem.

Figura 4.27 – Cachoeira da Roncadeira, na borda de chapadão, no Brejo da Lagoa, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, município de Palmas (TO). Fotografia: Y. T. Rocha, 2012

Em se tratando da hidrografia, segundo Guarda (2006) o ribeirão Taquaruçuzinho tem quase toda sua extensão formada por fazendas e chácaras, com ocorrências de diversas cachoeiras que são visitadas e muito freqüentadas. O ribeirão Taquaruçu Grande tem seu percurso natural dentro de chácaras e fazendas onde é notado o assoreamento anualmente no período chuvoso, quando na época de plantio os agricultores fazem o preparo do solo sem práticas de conservação. Destaca impactos negativos, principalmente, para a captação de água, nas estações de tratamento, com finalidade de abastecimento da população da cidade de Palmas, que recebem os sedimentos carregados pelos corpos hídricos que se encontram desprotegidos pelo desmatamento de suas matas.

4.2 GeofÁCie Campo Sujo Seco

4.2.1 Aspectos do Meio Físico

4.2.1.1 Altitude

As áreas de Campos Sujos Secos da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande variaram pouco em termos de altitude. No relevo do tipo topo, estiveram entre 674 m e 636 m. Os topos mais altos foram na Área 4, Área 1 e Área 5; nas Áreas 2 e 3 foram mais baixos. Já nas vertentes, variou de 660 m a 617 m, onde a Área 2 apresentou menor altitude (Figura 4.28), podendo-se observar que as altitudes dos topos e vertentes foram variáveis, há vertentes mais altas que topos e vice-versa.

Figura 4.28 – Altitude dos Campos Sujos Secos em relevos de topo e vertente, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

A Figura 4.5 mostra a topografia da paisagem da bacia hidrografia em estudo, onde os planaltos e chapadas, em uma escala ampla, apresentam altitudes variadas com 640 m a 682 m. A Figura 4.28, que mostra altitudes em uma escala restrita, pontual, indicou haver vertentes com altitudes superiores ao topo de 640 m. Isto indica que há situações no relevo em que a altitude de topo pode ser mais baixa ou semelhante à de vertente em planalto com relevo ondulado (Figura 4.29).

Figura 4.29 – Aspectos da paisagem mostrando a variação de altitude de topos em relação a vertentes, em área de Campo Sujo Seco (A4), em planalto com relevo ondulado, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande (serra do Lageado) os níveis topográficos superiores são inferiores a 900 m. No Brasil os campos rupestres, geralmente, ocorrem acima desta altitude (RIBEIRO; WALTER, 2008; VASCONCELOS, 2011). A altitude em torno de 700 m do Campo Sujo Seco do ribeirão Taquaruçu Grande é transicional, em escala regional, para a de 900 m do campo rupestre, o que leva a existência de uma flora com elementos do cerrado e de campo rupestre, onde a *Vellozia seubertiana* é a espécie dominante.

Alguns pesquisadores discutem o caráter de altitude dos campos, já abordado desde o início do século XIX, como por exemplo, Martius (1943 apud WALTER, 2006, p.59)¹ referiu-se aos campos rupestres como “campos mais altos” ou “campos altos”... muitas vezes compráveis aos campos alpinos”, e faz comentários específicos relatando a presença de algumas espécies como Liliáceas e os gêneros de *Vellozia* e *Barbacenia*. Langsdorff em seus diários em 1820 se referiu aos campos rupestres como “Vegetação alpina”, “regiões elevadas

¹MARTIUS, C. P. Ph. von. **A fisionomia do reino vegetal no Brasil**. Arquivos do Museu Paraense, Curitiba. V. 3, n. 1, p. 239-271, 1943. (Tradução de E. Niemeyer e C. Stellfeld. Die Physiognomie des pflanzenreiches in Brasilien. Rede zur oeffentl. Sitz. Akad. Wiss. München, 1824).

alpinas” ou “ campos alpinos” (SILVA, 1997 apud WALTER, 2006, p.59)².

Campos (1912) em seu sistema de classificação para a fitogeografia brasileira, ao descrever uma das grandes divisões do seu sistema de classificação, os “campos alpinos”, citou as serras do Espinhaço, Canastra e os Gerais da Bahia como exemplos de locais de ocorrência deste tipo de campo e fez referência às *Vellozias* como plantas que dão esse cunho alpino. Este autor também tratou da ocorrência desses campos em Goiás, nas chapadas divisoras das bacias do Parnaíba e do Tocantins onde, segundo ele, existe uma verdadeira transição de campos cerrados para os campos alpinos, citando a “canela d’ema” de Bomfim a Pirenópolis. De onde se depreende que a serra do Lageado, em uma escala regional, é parte desse conjunto físico transicional da biodiversidade dos campos cerrados, do relevo residual do Tocantins (setor norte do Planalto Central), para os campos rupestres de Goiás, da serra do Espinhaço, Canastra e dos Gerais da Bahia.

Também Stannard et al. (1998) comentaram que os cerrados de altitude, assim como os campos rupestres, ocorrem em regiões serranas brasileiras seguindo uma continuidade na serra do Espinhaço (da Bahia a Minas Gerais) e em manchas nas áreas montanhosas, como na serra da Mantiqueira e da Canastra; também citaram as espécies do gênero *Vellozia* como “marcadoras desse tipo de vegetação”.

O termo “campos alpinos” foi posteriormente substituído por “campo rupestre” e utilizado primeiramente por Magalhães (1966) ao se referir à vegetação dos topos de montanha da Cadeia do Espinhaço.

Vasconcelos (2011), entretanto, estabeleceu diferenciações entre campos rupestres e campos de altitude, estando os primeiros distribuídos em altitudes acima de 900 m, em montanhas de origem pé-cambriana que foram remodeladas por movimentos tectônicos a partir do Paleógeno, estando associados a afloramentos de quartzito, arenito e minério de ferro, principalmente, ao longo da Cadeia do Espinhaço, embora possam ser encontrados nas serras do Brasil Central (chapada dos Veadeiros, e serra dos Pirineus, ambas em Goiás, e serra da Canastra, no sudoeste de Minas Gerais) ou montanhas da região de São João Del Rei (serra do Lenheiro), Tiradentes (serra de São José) e Ipatinga (MG), sendo as três últimas consideradas como pertencentes a serra da Mantiqueira.

Já os campos de altitude são típicos dos pontos mais elevados de montanhas que se soergueram durante o Terciário (serra do Mar e Mantiqueira), geralmente situados acima de

² SILVA, D. G. B. (Ed.). **Os diários de Langsdorff**: Rio de Janeiro e Minas Gerais. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff: Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997.v.1 400p. (Tradução: Márcia Lyra Nascimento Egg e outros).

1.500 m de altitude, associados a rochas ígneas e metamórficas como granito, gnaíse, e nefelino-sienito, como no caso de Itatiaia. Em termos de domínios vegetacionais, em geral, os campos rupestres da cadeia do Espinhaço estão situados em áreas de transição entre o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, enquanto os campos de altitude das serras do Mar e Mantiqueira estão totalmente inseridos na região da Mata Atlântica (VASCONCELOS, 2011).

4.2.1.2 Relevô

Os campos encontram-se nas áreas mais altas, nas “cimeiras”, da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, em alguns locais descem as vertentes, mas também ocorrem nas áreas secas de baixa altitude, como a depressão do Tocantins (com cerca de 200 m de altitude, segundo RADAMBRASIL, 1981).

Nas cinco áreas de estudo, o relevo variou de plano a levemente ondulado. As vertentes apresentaram graus de inclinação variados, de ondulos (8 a 20°) a fortemente ondulos (20 a 45°) com formas côncavas e convexas. As vertentes com menor inclinação foram encontradas nas Área 2 (12°), Área 3 (21°) e Área 5 (17°). As Áreas 1 e 4 apresentaram maior inclinação, sendo que na Área 1 o grau de inclinação da vertente foi de 26°, enquanto na Área 4 foi de 40°. Em escala regional, enquadra-se no domínio dos chapadões com superfícies aplainadas, seguindo as descrições de Ab’Saber (1963) e Christofolletti (1966) ao se referirem a respeito da geomorfologia do Cerrado.

4.2.1.3 Solos

Os solos sob a vegetação de Campos Sujos Secos nas áreas cinco estudadas são do tipo Plintossolos (SEPLAN, 2012) (Figura 4.30). No atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos a classe dos Plintossolos, caracteriza-se por ser constituída de material com horizonte plântico ou litoplântico ou concrecionário (SANTOS et al., 2006). São, portanto, solos minerais que se formam sob condições de restrição à percolação da água, sujeitos ao efeito temporário do excesso de umidade, considerados, de forma geral, como imperfeitamente ou mal drenados, que têm como característica fundamental a expressiva plintização com ou sem petroplintita.

a

b

c

d

Figura 4.30 – Aspectos do Plintossolo sob vegetação de Campo Sujo Seco em corte vertical de topo (a), em corte vertical em vertente (b), em superfície de topo (c) e em superfície de vertente (d), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

O Plintossolo possui uma parte de solos que ocorre em terrenos de várzeas em áreas geomórficas de depressão e outra parte (com horizonte concrecionário, principalmente), que possui melhor drenagem e ocupa posições mais elevadas em relação aos primeiros (SANTOS et al., 2006).

Em mapa de solos do Estado do Tocantins (REATTO et al., 2008), no ambiente de cerrado, o Plintossolo ocupa uma área correspondente a 1,69% e o Plintossolo Pétrico, 0,89%. Estes solos apresentam, em índice de ocorrência, menores percentuais apenas que o Latossolo (2,89%), o Argissolo (2,33%) e o Neossolo Quartzarênico (1,97%), entretanto, a classe de Plintossolo (2,58%) é menor apenas que a ocorrência de Latossolo.

4.2.1.3.1 Umidade

A água presente no solo, no período de fevereiro a agosto de 2013, variou de 9 a 28% (Tabela 4.3). O maior índice de umidade nos solos foi registrado no mês de abril; em março, apenas algumas áreas apresentaram maiores teores de água. O ano de 2013 caracterizou-se como um ano atípico no que tange à periodicidade das chuvas, que se prolongaram até meados de junho.

Tabela 4.3 - Água (% de água/1 kg de solo) presente em solos nas áreas de topo (T) e vertente (V) do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas	Meses de 2013					Média
	Fevereiro	Março	Abril	Junho	Agosto	
A1T	9,6	15,7	20,4	8,4	7,7	12,4
A2T	13,0	28,7	27,4	15,0	11,6	19,1
A3T	11,7	10,6	19,7	8,3	9,1	11,9
A4T	9,5	10,6	12,9	10,2	12,7	11,2
A5T	9,4	9,1	15,8	9,6	10,3	10,4
A1V	12,2	17,4	26,9	8,3	12,2	15,4
A2V	11,1	13,2	22,1	12,9	11,1	14,8
A3V	12,2	10,3	19,0	10,5	10,6	12,5
A4V	9,1	13,3	15,2	9,0	8,0	10,9
A5V	10,0	11,1	19,4	8,9	9,9	11,9
Média	10,8	14,0	19,9	10,1	10,3	13,0

Segundo Brady (1989), os teores de água no solo são extremamente variáveis, mas o solo com percentual de água entre 20 e 30% apresenta boas condições de crescimento para as plantas. Lepsch (2002) indica que uma boa condição para as plantas é quando a água ocupa 25% dos componentes do solo. Observou-se que esses índices foram atingidos por algumas áreas na estação chuvosa.

Os solos são bem drenados e, ao longo do período de observação, a Área 2 (topo) manteve um índice de água no solo superior às demais Áreas (Figuras 4.31 e 4.32). Um fator a considerar em relação ao maior teor de água no solo da Área 2, é a inclinação da vertente,

tendo sido a área com menor grau de inclinação (12°). Nesta condição a água das chuvas tem maior infiltração (LEPSCH, 2002). Os meses com maior quantidade de água nos solos foram março e abril (Figuras 4.31).

Figura 4.31 – Água presente no solo do Campo Sujo Seco nos meses de fevereiro (fev), março (mar), abril (abr), junho (jun) e agosto (ago) de 2013, em áreas de topo e vertente, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.32 – Percentuais médios de água presente no solo do Campo Sujo Seco, relativos aos meses de fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2013, em áreas de topo e vertente, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Mas, apesar dessas variações quanto ao teor de água nos solos, estatisticamente as médias da água presente no solo não diferiram entre si entre topo e vertente (tratamento). Entre áreas (blocos), só houve diferença no mês de junho, na Área 2, quando o teor de água foi maior em relação a todas as demais áreas, que não diferiram entre si (Tabela 4.4).

Tabela 4.4 – Teores médios de água (% de água/1 kg de solo) presente em áreas de solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO) ao longo do período de fevereiro a agosto de 2013

Áreas	Fevereiro	Março	Abril	Junho	Agosto
A1	10,9b	16,5b	23,6b	8,3b	9,9b
A2	12,0b	20,9b	24,7b	13,9a*	11,3b
A3	11,9b	10,4b	19,3b	9,4b	9,8b
A4	9,3b	11,9b	14,0b	9,6b	10,3b
A5	9,7b	10,1b	17,6b	9,2b	10,1b

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si.

*: significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

4.2.1.3.2 Atributos químicos do solo

4.2.1.3.2.1 pH e Acidez Potencial

Os valores de pH no solo ou acidez ativa variaram de 4,0 na A5V a 4,59 na A2T (Tabela 4.3). Os solos, com base em Tomé-Júnior (1997), apresentaram níveis de acidez ativa muito alta ($\text{pH} \leq 4,3$); isso correspondeu a 90% dos solos amostrados. Na A2T a acidez foi considerada alta, pH entre 4,0 a 4,59 (Tabela 4.5). Segundo Tomé-Júnior (1997), a acidez é considerada alta quando o pH é da ordem de 4,4 a 5,0. Lopes e Guilherme (1994) também consideraram alta a acidez de $\text{pH} < 5,0$. Para Tomé-Júnior (1997), valores de pH abaixo de 4,5 ou acima de 7,5 restringem bastante o crescimento, pois esses valores indicam a existência de várias condições desfavoráveis às plantas, como pobreza de cálcio e magnésio, e altos teores de alumínio. O pH é um índice que fornece o grau de acidez ou alcalinidade de um extrato aquoso do solo, é utilizado como indicativo das condições gerais de fertilidade do solo (TOMÉ-JÚNIOR, 1997).

Os valores de pH do solo, entre áreas (blocos), não diferiram estatisticamente entre si. Mas, diferiram entre topo e vertente (tratamentos). As médias entre topo (4,3) e vertente (4,1) foram significativamente diferentes ao nível de 2% de probabilidade pelo teste “T” ($p = 0,02$).

Tabela 4.5 – Propriedades químicas do solo sob vegetação de Campo Sujo Seco, em área de topo (T) e de vertente (V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Área	pH CaCl ₂	cmol _c /dm ³ (meq/100ml)					mg/dm ³ (ppm)			CTC Total	CTC Efetiva	Saturação por Bases (V%)	Saturação por Al (m%)	% na CTC H+Al
		Ca	Mg	Al	H+Al	K	P Mehlich	Fe	M.O.					
A1T	4,30	0,23	0,18	0,4	6,93	0,09	4,2	101,0	23,3	7,4	0,90	6,7	44,4	93,6
A2T	4,59	0,45	0,37	0,2	6,10	0,10	5,6	156,0	15,7	7,0	1,12	13,1	14,0	87,1
A3T	4,20	0,20	0,16	0,3	6,35	0,07	3,6	41,0	18,9	6,8	0,73	6,3	44,9	93,4
A4T	4,15	0,22	0,18	0,4	8,91	0,15	13,	43,0	32,7	9,5	0,95	5,8	45,0	93,8
A5T	4,32	0,18	0,07	0,2	5,19	0,05	4,8	78,0	8,0	5,5	0,5	5,5	40,0	94,4
A1V	4,23	0,15	0,13	0,4	6,84	0,07	5,0	186,0	13,7	7,2	0,75	4,9	53,3	95,0
A2V	4,00	0,40	0,37	0,6	8,41	0,17	3,4	44,0	35,0	9,3	1,54	10,1	39,0	90,4
A3V	4,10	0,15	0,16	0,5	6,93	0,08	4,5	65,0	21,0	7,3	0,83	4,5	60,2	94,9
A4V	4,00	0,19	0,14	0,8	9,48	0,15	4,7	53,0	31,0	10,0	1,28	4,8	61,0	94,8
A5V	4,00	0,19	0,13	1,0	9,65	0,16	6,0	52,0	35,0	10,1	1,48	4,7	67,6	95,5

A acidez dos solos é também medida pela Acidez Potencial (H+Al), que variou de 5,19 cmol_c/dm³ (A5T) a 9,65 cmol_c/dm³ (A5V), Tabela 4.5. Os teores da Acidez Potencial não diferiram entre áreas, nem entre topo e vertente. Esse tipo de acidez foi considerada por Lopes et al. (1990) como a mais prejudicial ao crescimento da maioria das plantas.

4.2.1.3.2.2 Macronutrientes

4.2.1.3.2.2.1 Cálcio

O teor de cálcio (Ca) trocável foi baixo em todas as áreas, variou de 0,15 cmol_c/dm³ (A1V) a 0,45 cmol_c/dm³ (A2T), Tabela 4.5. O teor de Ca é considerado baixo quando < 2,0 cmol_c/dm³ (Tomé-Júnior, 1997). Lopes (1984) e Souza e Lobato (2004), em relação ao cerrado, consideraram baixos os teores de Ca trocável em solos com menos de 1,5 cmol_c/dm³. Segundo Lopes (1984), o que está abaixo de 0,4 cmol_c/dm³ indica uma extrema deficiência. A extrema deficiência de Ca foi observada em 80% das amostras, exceto para A2T E A2V (Tabela 4.5).

Os teores de Ca dos solos, para tratamento (relevo de topo e vertente), não diferiram entre si. Mas, houve diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de Tukey, para os teores de Ca dos solos entre áreas (blocos). Os solos da A2 apresentaram teores de Ca significativamente mais elevados em relação os demais (Tabela 4.6).

Tabela 4.6 – Teores médios de Ca (cmol_c/dm³), para áreas (blocos), em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas (blocos)	Médias
A1	0,19 b
A2	0,42 a **
A3	0,17 b
A4	0,20 b
A5	0,18 b

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si.

**: significativo pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

4.2.1.3.2.2.2 Magnésio

Os teores de magnésio (Mg) variaram de 0,07 cmol_c/dm³ (A5T) a 0,37 cmol_c/dm³ (A2T e A2V). Foram baixos em todas as áreas, inferiores a 0,4 cmol_c/dm³, sendo que os solos da A5T e da A3V apresentaram os menores teores (Tabela 4.5).

Teores de Mg são considerados baixos quando $< 0,4 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ (Tomé-Júnior, 1997). Souza e Lobato (2004) consideraram baixos os teores de Mg $< 0,5 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$. De acordo com Lopes (1984), deficiências de Mg trocável são também uma tônica marcante nos solos do Cerrado. Este autor classificou como baixos os teores $\leq 0,5 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ e considerou que valores $\leq 0,1 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ indicam extrema deficiência deste nutriente, situação da A3V e A5T, que corresponde a 20% das amostras.

Os teores de Mg nos solos não diferiram estatisticamente para os tratamentos (relevo tipo topo e tipo vertente). Para o Mg, assim como para Ca, houve diferença significativa a 1 % de probabilidade entre médias das áreas (blocos) pelo teste de Tukey. Os solos da A2 possuem teores de Mg significativamente mais altos que os demais (Tabela 4.7).

Tabela 4.7 – Teores médios de Mg ($\text{cmol}_c/\text{dm}^3$), para áreas (blocos), em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas (blocos)	Médias
A1	0,15 b
A2	0,37 a**
A3	0,13 b
A4	0,16 b
A5	0,10 b

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si.

** : significativo pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

4.2.1.3.2.2.3 Fósforo

Os teores de P variaram de $3,4 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ (A2V) a $13,0 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ (A5T), Tabela 4.5. A classificação do teor de fósforo (P) disponível, em solos, depende do extrator e da textura (TOMÉ-JÚNIOR, 1997). De acordo com o teor de argila na classe 210-400 g/kg para a região do Cerrado, pelo extrator Mehlich, considerando a textura dos solos da área de estudo, o teor de fósforo variou de muito baixo com teores $< 5 \text{ mgP}/\text{dm}^3$ (A1T; A2V; A3T; A3V; A4V; e A5V), a baixo (A2T e A5V) com $5,6\text{-}6,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$ (Tabela 4.3). Apenas a A4T apresentou teor considerado médio ($13,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$), tomando-se como referência Tomé-Júnior (1997). Apesar da variação dos dados, estatisticamente, os teores de P não diferiram entre os tratamentos, nem entre blocos.

4.2.1.3.2.2.4 Potássio

Os teores de potássio (K) trocável variaram de baixo ($\leq 0,10 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) a médios ($0,11\text{-}0,30 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) de acordo com a classificação de Tomé-Júnior (1997). A5T apresentou o menor teor ($0,05 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) e A2V, o maior teor ($0,17 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$, Tabela 4.5). Lopes (1984) considerou solos com $< 0,15 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ como deficientes em K. Dos solos amostrados, 60% estão dentro dessa faixa (deficientes) e os demais valores são próximos a esse valor. Estatisticamente, os teores de K não diferiram entre tratamentos, e nem entre blocos.

4.2.1.3.2.3 Micronutriente Ferro

Os teores de ferro (Fe) variaram de $41,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$ (ppm) na A3T a $186,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$ (ppm) na A1V (Tabela 4.5). Estes teores foram considerados muito altos, principalmente nas A1T e A1V e A2T. Segundo Tomé-Júnior (1997), os valores de Fe são considerados altos quando $>12 \text{ mg}/\text{dm}^3$. Estatisticamente não houve diferença significativa entre os teores de topo e de vertente (tratamentos), nem entre áreas (blocos).

4.2.1.3.2.4 Alumínio

Os teores de alumínio (Al) trocável variaram de baixos ($0,2 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) nas A2T e A5T a médios ($1,0 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) na A5V (Tabela 4.5). Apesar da acidez dos solos, os teores de Al não são extremamente altos, mas como os teores de cálcio, magnésio e potássio são muito baixos (Tabela 4.8) e têm pouca contribuição no balanço de troca catiônica, os teores de Al com muito baixos teores de bases trocáveis se constituem em importantes limitações destes solos.

Para as plantas nativas, especialmente as do cerrado, o alumínio pode até ser essencial (JANSEN et al., 2003). O óxido de Al é um agente que contribui de maneira eficaz na estrutura do solo tropical, sendo, portanto, altamente benéfico. Se o Al trocável não ultrapassar determinada porcentagem dos cátions existentes na CTC efetiva, dependendo da textura do solo, possivelmente não será maléfico (JANSEN et al., 2003).

De acordo com Osaki (1991), teores menores que $5 \text{ mmol}_c/\text{dm}^3$ (muito baixos) não são prejudiciais, de $5\text{-}10$ (baixos) são pouco prejudiciais e de $10,1\text{-}1,20 \text{ mmol}_c/\text{dm}^3$ são medianamente prejudiciais. Segundo Malavolta (1989), solos com mais que $0,3 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ de

Al são chamados de álicos. Na área de estudo, em 80% dos solos estudados, os teores de Al foram $\geq 0,3 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$, exceto nas áreas 2 e 5 (topo), nas quais os teores foram de $0,2 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$.

A saturação de Al foi alta, acima de 30 m% e chegando a muito alta ($> 50 \text{ m\%}$), portanto, muito prejudicial, situação encontrada nos solos das vertentes das A1, A3, A4, e A5, exceto na A2T, na qual a saturação de Al foi baixa, não prejudicial (14,0 m%).

Os teores de Al não foram diferentes entre áreas (blocos), mas, foram diferentes entre topo e vertente (tratamento). Os teores médios do topo ($0,30 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) diferiram dos da vertente ($0,66 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$) ao nível de 2% de probabilidade pelo teste de Tukey. Os topos apresentaram menores teores de Al que as vertentes.

4.2.1.3.2.5 Matéria Orgânica

Os teores de matéria orgânica (M.O.) variaram de baixos a médios (Tabela 4.5), sendo que A5T apresentou o menor teor ($8,0 \text{ g}/\text{dm}^3$) e A2E o maior teor ($35,0 \text{ g}/\text{dm}^3$). Lopes (1984) e Tomé-Júnior (1997) consideraram como baixos os teores de M.O. $< 15 \text{ g}/\text{dm}^3$ e como altos os teores $> 50 \text{ g}/\text{dm}^3$. Segundo Tomé-Júnior (1997), altos teores de M.O., dentre outros aspectos, significa alta Capacidade de Troca Catiônica (CTC) Total, o que representa maior capacidade de retenção de cátions e também maior resistência à variação de pH (alto poder tampão). Já no tocante a baixos teores de M.O., estes indicam solos arenosos, baixa CTC Total e CTC Efetiva, portanto, baixo poder tampão e alta possibilidade de lixiviação de bases (Ca, Mg e K). Estatisticamente, os valores de M.O. não diferiram entre topo e vertente (tratamentos), nem entre áreas (blocos).

4.2.1.3.2.6 Capacidade de Troca Catiônica

Os teores da capacidade de troca catiônica (CTC) foram calculados para a CTC Total e para a CTC Efetiva (Tabela 4.5). Os teores de CTC Total (soma de bases + H+Al) variaram de $5,5 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ (A5T) a $10,1 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ (A5V). Foram baixos ($\leq 15 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$), de acordo com Sousa e Lobato (2004). Mas, apesar dos baixos valores, as maiores contribuições para os teores da CTC Total foram de Acidez Potencial (H+Al), cátions potencialmente tóxicos, segundo Tomé-Júnior (1997), cujos índices, geralmente, estiveram acima de 90% (Tabela 4.5).

Analisando a participação da Acidez Potencial na CTC Total, os teores foram diferentes entre áreas. Na A2 a Acidez Potencial foi significativamente diferente ao nível de probabilidade de 2% pelo teste de Tukey, apresentando-se com menor participação na CTC Total que nas demais áreas (Tabela 4.8). Houve também diferença entre topo vertente ao nível de 2% de probabilidade pelo teste “T” pareado, sendo que o topo apresentou menor Acidez Potencial na CTC (92,5%b) que a vertente (94,1%a).

Tabela 4.8 – Teores médios de H+Al (%), para áreas, em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas (blocos)	H+Al (% na CTC)
A1	94,3a
A2	88,7b*
A3	94,1a
A4	94,3a
A5	94,9a

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si.

*: significativo pelo teste de Tukey a 2% de probabilidade

A CTC Efetiva (Ca + Mg + K + Al) apresentou teores variando de 0,5 a 1,5 cmol_c/dm³. Em 60% das amostras, os teores foram extremamente baixos, < 1 cmol_c/dm³. A Saturação de Al também representou altos índices na CTC Efetiva (Tabela 4.5). Lopes e Guilherme (1994) consideraram teores de CTC baixos quando são da ordem de 0-2,5 cmol_c/dm³ para a região do Cerrado. Lopes e Guilherme (2004) consideraram que o valor de CTC Efetiva de 2,05 cmol_c/dm³ é extremamente baixo e indica que o solo apresenta baixa capacidade de reter cátions.

Analisando a participação dos teores de Saturação de Al na CTC Efetiva, estes não diferiram entre áreas (blocos), mas, diferiram entre topo e vertente (tratamentos). A média dos teores do topo (37,7 cmol_c/dm³) foi significativamente menor que da vertente (56,2 cmol_c/dm³) a 5% de probabilidade pelo teste de “T” não pareado.

Os teores de CTC Total e CTC Efetiva, não diferiram estatisticamente entre topo e vertente (tratamentos), nem entre áreas (blocos).

Os teores da CTC Total e CTC Efetiva foram altamente correlacionados, positivamente, com os teores de M.O. de acordo com o Coeficiente de Determinação (R²) = 0.9153 e 0,6885 para CTC Total e CTC Efetiva, respectivamente (Figura 4.33).

Figura 4.33 – Relações entre teores de M.O. (%) com CTC Total e CTC Efetiva ($\text{cmol}_c/\text{dm}^3$) em solos de Campo Sujo Seco, em 2012, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Neto et al. (2009), estudando os solos do cerrado, encontraram valores de M.O. coincidentes com os valores médios de CTC e, segundo estes autores, essa coincidência indica a importância da M.O. como condicionadora de cargas em solos de clima tropical. Por ser, o Campo Sujo Seco do ribeirão Taquaruçu Grande, uma fisionomia de vegetação mais baixa e esparsa e o solo de textura média, a M.O., evidenciou essa relação. A área mais arenosa (área 5 topo) apresentou menor valor de M.O. e consequentemente menor CTC (Tabela 4.5).

Lopes (1984), em estudos dos solos do cerrado, encontrou teores de M.O. variando de médios a altos. O autor concluiu que apesar dos solos apresentarem, na sua maioria, níveis de médios a altos de M.O., indicando que esta é a principal fração envolvida na formação de cargas negativas e troca de cátions, os valores de CTC Efetiva, apresentaram-se muito baixos ($97\% < 4 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$).

As explicações dadas por Lopes (1984) para a pequena contribuição da fração orgânica, medido pela baixa CTC Efetiva desses solos são de que esse pequeno efetivo é devido à abundância de óxidos, hidróxidos e óxidos-hidróxidos de Fe e Al na fração argila de solos intemperizados, ocorrendo em partículas discretas e/ou em camadas revestindo as partículas de argila. Esses materiais podem desenvolver cargas positivas sob condições de baixo pH, fazendo com que haja interação entre os efeitos dos compostos orgânicos e inorgânicos nestes solos, diminuindo as cargas negativas líquidas quando esses componentes se encontram associados. Outro aspecto é que, sob condições edáfico-biótico-climáticas que ocorrem na área de Cerrado, haveria menor formação de grupos funcionais efetivos no processo de troca de cátions como resultado da composição da M.O.. Neste caso, a maior ou menor formação de grupos funcionais depende não somente da natureza da M.O., como

também das condições associadas ao meio ambiente.

Sob condições de pH ácido como é o caso dos solos do Cerrado, há uma diminuição da atividade microbiana e, conseqüentemente, menor formação de grupos funcionais efetivos no processo de troca catiônica. Na amplitude de pH 4,8-5,2 nos solos do Cerrado, possivelmente não ocorreria suficiente ionização dos grupos funcionais da M.O. (carboxílicos, fenólicos, enólicos e imídicos), para produzir a formação de grande número de cargas negativas (LOPES, 1984). Esta situação se aplica aos solos dos Campos Sujos Secos da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, tendo em vista que eles apresentaram níveis de $\text{pH} < 5,0$ (Tabela 4.5).

4.2.1.3.2.7 Saturação por Bases

A Saturação por Bases variou de 4,5% (A3E) a 13,1% (A2T) (Tabela 4.3). Os maiores índices de saturação de bases foram para os solos da A2T e A2V, como reflexo dos maiores teores de Ca, Mg e K (Tabela 4.5). Para Tomé-Júnior (1997), a saturação por bases fornece uma ideia do estado de ocupação das cargas da CTC Total, ou seja, qual a proporção ocupada pelos cátions úteis (Ca, Mg e K) do total das cargas negativas existentes no solo. Assim, a Saturação por Bases é excelente indicativo das condições gerais da fertilidade do solo, que de acordo com a Saturação por Bases (V%) e Saturação por Alumínio (m%) podem ser divididos em três grupos: solos eutróficos ou férteis ($V\% \geq 50\%$), solos distróficos ou pouco férteis ($V\% < 50\%$), e solos álicos ou muito pobres ($\text{Al trocável} \geq 0,3 \text{ cmolc/dm}^3$ e $m\% \geq 50\%$).

Os solos em todas as áreas apresentaram teores de Saturação por Bases inferiores a 50% (Tabela 4.5), sendo que 80% das amostras apresentaram $\text{Al trocável} \geq 0,3 \text{ (cmol/dm}^3\text{)}$ e 40% das amostras apresentaram $m\% > 50\%$. Segundo Haridasan (2007), o critério mínimo de 2,0 cmol (+)/kg de Ca e Mg trocáveis tem sido utilizado para separar solos mesotróficos de solos distróficos, desta forma, os solos dos Campos Sujos Secos estudados caracterizam-se como distróficos e álicos

Os valores de Saturação por Bases (V%) foram significativamente diferentes para tratamento (topo e vertente). Os solos dos topos ($V\% = 7,48$) apresentaram maiores índices de Saturação por Bases que os das vertentes ($V\% = 5,8\%$), a 2% de probabilidade pelo teste “T” pareado, indicando que são menos distróficos que os da vertente.

Para os blocos (áreas), também houve diferença entre os teores de Saturação por Bases. Pois, A2 é significativamente diferente das demais ao nível de 2% de probabilidade pelo teste de Tukey (Tabela 4.9). Essa diferença significativa, assim como ocorreu para os

relevos de topo e vertente, é devido os teores de Ca, Mg e K, que foram maiores na A2T e A2V em relação às demais áreas e que influenciaram os resultados da Saturação por Bases.

Tabela 4.9 – Teores médios de Saturação por Bases (V%) para áreas (blocos), em solos de Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas (blocos)	V%
A1	5,8b
A2	11,6a*
A3	5,4b
A4	5,3b
A5	5,1b

Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si.

*: significativo pelo teste de Tukey a 2% de probabilidade

4.2.1.3.3 Atributos físicos do solo

A textura dos solos foi considerada média com percentuais: de argila, variando de 20% a 33%; silte, variando de 13% a 23%; e areia variando de 51% a 64% (Tabela 4.5). A textura média significa teor de argila + silte >150g/kg e argila < 350g/kg. Os solos com esse tipo de textura apresentam: baixo-moderada susceptibilidade à erosão; médios a baixos valores de retenção de água; e, densidade pode ser elevada, próxima a 1,4 g/cm³, sem que isso signifique que ele está compactado (TOMÉ-JÚNIOR, 1997).

Em estudos de densidade de solos de fitofisionomias do Cerrado mato-grossense, Souza et al. (2010) apresentaram resultados que indicaram valores mais elevados de densidade de solos de campo sujo em relação ao cerradão, mata ciliar e pastagens, em decorrência do campo sujo ter textura mais arenosa e baixa quantidade de serapilheira sobre o solo, encontrando-se abaixo do índice crítico ao desenvolvimento radicular.

Os percentuais de argila e de areia não diferiram, estatisticamente, entre topo e vertente (tratamento), nem entre áreas (blocos). Já os percentuais de silte não foram diferentes entre áreas, mas, foram diferentes entre topo e vertente ao nível de probabilidade de 1% pelo teste “T” pareado, sendo que os solos da vertente (18,8% a) tiveram maiores teores de silte que os solos do topo (15,8 % b).

Verificou-se uma característica muito expressiva quanto à pedregosidade, que variou de muito pedregosa (15 - 50%) nas áreas 2 e 3, a extremamente pedregosa (> 50%), nas áreas 1, 4 e 5, tanto no topo quanto na vertente. Em relação à presença de matações, foi variável

entre as áreas, não ultrapassando 15%, sendo as áreas de topo (áreas 2, 3 e 5) apresentaram menores índices de ocorrência de matacões (0,1-3,0%) e as demais ficaram na faixa de 3-15%.

Quanto à rochosidade que se caracteriza, segundo Santos et al. (2005), pela exposição de rochas do embasamento na superfície ou presença de matacões com mais de 1 m de diâmetro, tanto as áreas de topo como as de vertente, caracterizaram-se pela condição de serem não rochosas.

4.2.1.3.4 Caracterização geral dos solos

No que se refere à erosão dos solos, não foi constatado nenhum processo erosivo aparente na área. Há indícios de rolamentos de materiais nodulares da parte alta e média das vertentes para a região da base, principalmente nas Áreas 1 e 4, cujas vertentes possuem maior grau de inclinação.

Os solos dos Campos Sujos Secos na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande caracterizaram-se como solos:

- com baixo teor de água disponível, mesmo durante a estação chuvosa;
- ácidos, pelos baixos valores de pH, distróficos pelos baixos teores de bases, em que Ca e Mg apresentaram valores inferiores a $2,0 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$;
- álicos, pelos altos teores de Al trocável e saturação de Al, e de textura média com mais alta fração de areia que de argila e silte.
- altos teores de Fe;
- e, pela própria característica dos Plintossolos pétricos, pela presença de concreções ferruginosas, foram extremamente pedregosos.

Quanto ao relevo, as condições de topo e vertente não influenciaram nos teores de umidade, matéria orgânica e dos nutrientes, quando analisados isoladamente, Ca, Mg, P, K, e Fe, não havendo diferença significativa entre os teores de topo e vertente. O mesmo não foi constatado em relação ao pH, Al e Saturação por Bases, que apresentaram teores diferentes entre topo e vertente. Os solos do topo foram menos ácidos e menos distróficos que os da vertente. Já as vertentes tiveram maiores teores de Al

Em se tratando da comparação entre áreas, apenas Ca e Mg apresentaram diferenças e em consequência disso, a Saturação por Bases apresentou diferenças significativas. Além desses nutrientes, também houve diferença entre os teores de água presente no solo. Área 2 se

distinguiu das demais por ter mais Ca e Mg e menor saturação com H+Al e, portanto, maior Saturação por Bases, bem como maior quantidade de água nos solos no mês de junho (quase metade do período seco).

Dessa forma, Saturação por Bases mostrou haver diferença significativa na fertilidade dos solos entre topo e vertente, em que os solos dos topos indicaram ser menos distróficos que os da vertente. Também entre as áreas, houve diferença significativa: a área 2 indicou ter solos menos distróficos e ter mais água no período seco que as demais áreas.

Quanto à textura, não houve diferença significativa para os teores de argila e de areia entre topo e vertente nem entre as áreas. Mas, para o silte houve diferença significativa entre topo e vertente, em que a vertente apresentou maiores teores que o topo.

4.2.2 Aspectos Fitogeográficos

4.2.2.1 Sistemática e distribuição geográfica

A flora da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, amostrada nas parcelas A1V¹, A1T², A2V, A2T, A3V, A3T, A4V, A4T, A5V e A5T, da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande (Palmas – TO) pertence à divisão Magnoliophyta (Angiospermas) e é composta de plantas vasculares, com espécies monocotiledôneas (classe Liliopsida) e dicotiledôneas (classe Magnoliopsida), que se distribuem em ordens, famílias, gêneros e espécies (Figura 4.34).

Do ponto de vista taxonômico a flora é predominantemente da classe Magnoliopsida, com a presença de 17 ordens, 33 famílias, 71 gêneros e 100 espécies. As ordens com maiores números de famílias foram Malpighiales (7) e Myrtales (5); as demais tiveram de 1 a 3 famílias (Figura 4.26). A ordem Fabales, embora com apenas uma família, teve 20 gêneros e 25 espécies. Além de Fabales, as ordens com maiores números de espécies foram: Malpighiales (18) e Myrtales (17). A classe Liliopsida foi composta por 4 ordens, 6 famílias, 10 gêneros e 21 espécies. A ordem Poales teve mais famílias (3), gêneros (7) e espécies (18) que as demais (Figura 4.27; Quadros 4.2 e 4.3).

¹ V (vertente)

² T (topo)

Figura 4.34 – Síntese da sistemática da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com base no APG III (2009)

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continua)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera</i>	<i>Schefflera macrocarpa</i> (Cham. & Schltdl.) Frodin	Caatinga Mata Atlântica Cerrado	Nativa; endêmica; BA, MT, GO, DF, MG, SP (FORZZA, et al., 2010); e em Mato Grosso do Sul (ALMEIDA et al., 1998).
Asterales	Asteraceae	<i>Aspilia</i>	<i>Aspilia foliacea</i> (Spreng.) Baker	Cerrado Pampa	Nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS) (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
			<i>Aspilia leucoglossa</i> Malme	Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Lessingianthus</i>	<i>Lessingianthus obtusatus</i> (Less.) H. Rob.	Cerrado	Nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010).
		<i>Piptocarpha</i>	<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	Mata Atlântica Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, RJ, SP, TO (ALMEIDA et al., 1998).
Celastrales	Celastraceae	<i>Salacia</i>	<i>Salacia crassifolia</i> (Mart. ex Schult.) G. Don	Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ) (FORZZA et al., 2010). Maranhão (ALMEIDA et al., 1998).
Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Curatella</i>	<i>Curatella americana</i> L.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010; ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Davilla</i>	<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
Ericales	Ebenaceae	<i>Diospyros</i>	<i>Diospyros hispida</i> A. DC.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
Fabales	Fabaceae	<i>Leptolobium</i>	<i>Leptolobium dasycarpum</i> Vogel	Amazônia Cerrado	Nativa; não endêmica; TO, RO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Andira</i>	<i>Andira humilis</i> Mart. ex Benth.	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Paraíba (ALMEIDA et al., 1998).
		<i>Bauhinia</i>	<i>Bauhinia curvula</i> Benth.	Amazônia Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Fabales	Fabaceae	<i>Bauhinia</i>	<i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.	Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
		<i>Bowdichia</i>	<i>Bowdichia virgiloides</i> Kunth	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Acre, Rio de Janeiro (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Suriname, Venezuela (FILARDI et al., 2007). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
		<i>Camptosema</i>	<i>Camptosema scarlatium</i> (Mart. Ex Benth.) Burkart	Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). Paraguai, Argentina e no Brasil (FILARDI et al., 2007). No Brasil (CE, BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, RS) (ANDRADE et al., 2009; MEDEIROS, 2011).
		<i>Centrosema</i>	<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.	Amazônia Caatinga Mata Atlântica Cerrado	Nativa; não endêmica; AC, PI, CE, PB, PE, BA, MT, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS (FORZZA et al., 2010;). Em Minas Gerais, nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço (Brandão et al. 1995, Lewis 1995, Zappi et al. 2005). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
		<i>Calliandra</i>	<i>Calliandra dysantha</i> Benth.	Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, CE, DF, GO, MT, MS, MG, SP, TO (ALMEIDA et al., 1998).
		<i>Chamaecrista</i>	<i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ) (FORZZA et al., 2010). México, Caribe e América Central até a América do Sul (QUEIROZ; LOIOLA, 2009).
			<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	Cerrado	Nativa; endêmica (FORZZA et al., 2010). BA,DF, GO, MG, MS (Proença et al., 2006)
			<i>Chamaecrista serpens</i> (L.) Greene	Cerrado Caatinga	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, PI (www.cnip.org.br), América Central e América do Sul. Brasil (PA, RR, MA, RN, PE, BA, MT, GO, MG e SP (QUEIROZ; LOIOLA, 2009).
		<i>Clitoria</i>	<i>Clitoria guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). RR, AM, PA, AM, TO, MA, PI, CE, PE, BA, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, PR (MEDEIROS, 2011). México, Caribe, América Central e América do Sul (ILDIS, 2005). No Brasil, em MG na Cadeia do Espinhaço (FILARDI et al., 2007). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
		<i>Crotalaria</i>	<i>Crotalaria unifoliolata</i> Benth.	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Minas Gerais na Cadeia do Espinhaço (FILARDI et al., 2007). São Paulo, Bolívia (www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id)

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Fabales	Fabaceae	<i>Dimorphandra</i>	<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	Amazônia Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Pará (ALMEIDA et al., 1998).
		<i>Dipteryx</i>	<i>Dipteryx alata</i> Vogel	Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
		<i>Hymenaea</i>	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). AM, BA, CE, DF, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PI, SP, TO (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
		<i>Mimosa</i>	<i>Mimosa albolanata</i> var. <i>brasiliensis</i> Barneby	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010). Restrita ao Brasil Central, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais (DUTRA, 2009).
			<i>Mimosa radula</i> var. <i>imbricata</i> (Benth.) Barneby	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010). Endêmica do Brasil Central (GO, DF, MT, MS, MG na serra de Canastra e Cadeia do espinhaço), SP (DUTRA, 2009).
		<i>Platypodium</i>	<i>Platypodium elegans</i> Vogel	Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010)
		<i>Pterodon</i>	<i>Pterodon emarginatus</i> Vogel	Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010; ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
		<i>Tachigali</i>	<i>Tachigali rugosa</i> (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Puipoly	Mata Atlântica	Nativa; endêmica; BA, MG, ES, SP, RJ (FORZZA et al., 2010). Ocorre também em Goiás, (LORENZI, 2009; MEDEIROS, 2011).
		<i>Senna</i>	<i>Senna velutina</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010).
		<i>Stryphnodendron</i>	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	Caatinga Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). MA, PI, TO (ALMEIDA et al., 1998).
		<i>Vigna</i>	<i>Vigna firmula</i> (Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Paraguai e Brasil (Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, FILARDI et al., 2007). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
			<i>Vigna speciosa</i> (Kunth) Verdc.	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). América Central até a Colômbia, Equador e Venezuela Piper (1926) e Maréchal et al. (1978) apud Snak (2011).

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Gentianales	Apocynaceae	<i>Hancornia</i>	<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	Cerrado Caatinga Pantanal	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). AL, AP, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, SP, TO) (ALMEIDA et al., 1998) e em outros países da América do Sul (POTT; POTT, 1994). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Himatanthus</i>	<i>Himatanthus obovatus</i> (Mull. Arg.) Woodson	Cerrado Pantanal	Nativa; endêmica (FORZZA et al., 2010) Cerrados do Brasil Central (POTT; POTT, 1994). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	Gentianaceae	<i>Deianira</i>	<i>Deianira chiquitana</i> Herzog	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	Rubiaceae	<i>Borreria</i>	<i>Borreria eryngioides</i> Cham.& Schltdl.	Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal, Pampa	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). Brasil (BA, DF, GO, MT, MS, MG, PR, RS, SP e SC), Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, inclusive no Chaco (POTT; POTT, 1994).
		<i>Tocoyena</i>	<i>Tocoyena formosa</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Ampla distribuição Neotropical, América Central e do Sul, do México a Argentina, de Marajó a São Paulo, Mato Grosso do Sul (POTT; POTT, 1994). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Mitracarpus</i>	<i>Mitracarpus frigidus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC) (FORZZA et al., 2010). Ampla distribuição, ocorrendo na Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Brasil, de Roraima até o de Santa Catarina (Delprete et al., 2005).
		<i>Palicourea</i>	<i>Palicourea rigida</i> Kunth	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica. AC, AM, PA, RO, BA, ES, MG, SP, PR (FORZZA et al., 2010). Brasil Central, nos cerrados brasileiros e em outras savanas neotropicais (MACHADO et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
Lamiales	Lamiaceae	<i>Amasonia</i>	<i>Amasonia campestris</i> (Aubl.) Moldenke	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES) (FORZZA et al., 2010).
		<i>Hyptis</i>	<i>Hyptis peduncularis</i> Benth.	Cerrado	Nativa; endêmica; DF, GO e MG (FORZZA, et al., 2010)

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Lamiales	Lamiaceae	<i>Peltodon</i>	<i>Peltodon tomentosus</i> Pohl	Amazônia Caatinga Mata Atlântica Cerrado	Nativa; não endêmica; No Norte (RO), Nordeste (BA), Centro Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PA), (FORZZA, et al., 2010; TANUS; ASSIS, 2004). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	Verbenaceae	<i>Casselia</i>	<i>Casselia</i> Nees & Mart.	Cerrado	6 espécies (4 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Lippia</i>	<i>Lippia florida</i> Cham.	Cerrado	Nativa; endêmica; Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010).
	Bignoniaceae	<i>Tabebuia</i>	<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Também em Roraima (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
			<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ) (FORZZA et al., 2010; LORENZI, 2008). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Zeyheria</i>	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bur. ex Verlot	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ) (FORZZA et al., 2010). De Minas Gerais até o norte do Paraná (Lorenzi, 2008).
Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona</i>	<i>Annona coriacea</i> Mart	Cerrado Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010; LORENZI, 2008).
			<i>Annona crassiflora</i> Mart.	Cerrado Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Piauí (ALMEIDA et al., 1998).
Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum</i>	<i>Erythroxylum</i> cf. <i>citrifolium</i> A.St.-Hil.	Amazônia Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
			<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St. Hil.	Amazônia Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). RO, AP, PA, AM, TO, RR, MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, MT, GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR (MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
			<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (FORZZA et al., 2010).

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton</i>	<i>Croton goyazensis</i> Mull. Arg.	Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF) (FORZZA et al., 2010; ALMEIDA et al., 1998).
		<i>Manihot</i>	<i>Manihot acuminatissima</i> Mull.Arg.	Caatinga Cerrado	Nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO) (FORZZA et al., 2010). Também no Distrito Federal (RODRIGUES, 2007).
			<i>Manihot sparsifolia</i> Pohl	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO) (FORZZA et al., 2010). Distrito Federal (RODRIGUES, 2007)
	Malpighiaceae	<i>Byrsonima</i>	<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth	Amazônia Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR), (FORZZA et al., 2010; LORENZI, 2008; MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
			<i>Byrsonima pachyphylla</i> A.Juss.	Amazônia, Cerrado	Nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS) (FORZZA et al., 2010).
			<i>Byrsonima subterranea</i> Brade & Marckgr.	Amazônia Cerrado Pantanal	Nativa; endêmica(?); Norte (RR, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Mato Grosso do Sul (MARIMON et al., 2012).
			<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) DC.	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Também no Amazonas, Pará, Tocantins (ALMEIDA et al., 1998; LORENZI, 2008). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
	Caryocaraceae	<i>Caryocar</i>	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Cerrado	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, CE, DF, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PI, RJ, SP, TO (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera</i>	<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart. & Zucc.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). CE, DF, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PI, SP, TO (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
			<i>Kielmeyera lathrophyton</i> Saddi	Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010; LORENZI, 2009).
			<i>Kielmeyera rosea</i> Mart. & Zucc.	Cerrado	Nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG) (FORZZA, et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
	Clusiaceae	<i>Platonia</i>	<i>Platonia insignis</i> Mart.	Amazônia Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA) (FORZZA et al., 2010; LORENZI, 2008).

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Malpighiales	Ochnaceae	<i>Ouratea</i>	<i>Ouratea hexasperma</i> (A.St.-Hil.) Baill.	Amazônia Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
			<i>Ouratea spectabilis</i> (Mart.) Engl.	Cerrado	Nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Também na Bahia, (ALMEIDA et al., 1998).
	Salicaceae	<i>Casearia</i>	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pampa Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS) (FORZZA et al., 2010). Do México às Antilhas, das Guianas ao Rio Grande do Sul e Tocantins, Paraguai, Uruguai e Argentina (ALMEIDA et al., 1998).
Malvales	Malvaceae	<i>Eriotheca</i>	<i>Eriotheca pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.	Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010).
		<i>Peltaea</i>	<i>Peltaea edouardii</i> (Hochr.) Krapov. & Cristobal	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS) (FORZZA et al., 2010).
Myrtales	Lythraceae	<i>Diplusodon</i>	<i>Diplusodon microphyllus</i> Pohl	Cerrado	Nativa; endêmica; Sudeste (MG) (FORZZA, et al., 2010).
			<i>Diplusodon sessiliflorus</i> Koehne	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF) (FORZZA et al., 2010)
Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia</i>	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); (FORZZA et al., 2010).
			<i>Miconia ferruginata</i> DC.	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
		<i>Tibouchina</i>	<i>Tibouchina aegopogon</i> (Naudin) Cogn.	Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org)
	Myrtaceae	<i>Myrcia</i>	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS) (FORZZA et al., 2010). Distrito Federal, Goiás ao Rio Grande do Sul (SILVA JUNIOR, 2009).
	Myrtaceae	<i>Psidium</i>	<i>Psidium firmum</i> O.Berg	Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); (FORZZA et al., 2012; ALMEIDA et al., 1998).

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Myrtales	Myrtaceae	<i>Psidium</i>	<i>Psidium</i> L.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pantanal	Nativa; endêmica. Norte (AC, AM, PA, RO, TO), Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI RN SE), Centro Oeste (DF, GO, MS, MT), Sudeste (ES, MG, RJ, SP), Sul (PR, RS, SC) (FORZZA et al., 2010)
		<i>Qualea</i>	<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). MS, TO (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	<i>Qualea parviflora</i> Mart.		Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).	
	<i>Salvertia</i>	<i>Salvertia convallariodora</i> A.St.-Hil.	Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). MS, TO (ALMEIDA et al., 1998).	
	<i>Vochysia</i>	<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Paraguai (POTT; POTT, 1994).	
		<i>Vochysia divergens</i> Pohl	Cerrado	Nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO) (FORZZA et al., 2010). Também em Mato Grosso do Sul e na Bolívia (LORENZI, 2009).	
		<i>Vochysia rufa</i> Mart.	Cerrado	Nativa; endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, DF, GO, MA, MG, MT (PROENÇA et al., 2006). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).	
		<i>Vochysia</i> cf. <i>thyrsoides</i> Pohl	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP) (FORZZA et al., 2010). Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, (ALMEIDA et al., 1998).	
		<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, MT, GO, DF, MG, SP, RJ, PR, SC (MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).	
		<i>Vochysia elliptica</i> Mart.	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica. Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ) (FORZZA et al., 2010)	
Oxalidades	Connaraceae	<i>Connarus</i>	<i>Connarus suberosus</i> Planch.	Cerrado	Nativa; endêmica (FORZZA et al, 2010). Norte (PA), Planalto Central (BA, PI, MA, MS) e Sul (PR), (LORENZI, 2009). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Rourea</i>	<i>Rourea induta</i> Planch.	Cerrado Amazônia	Nativa; não endêmica (PA, RO, PI, BA, MG, GO, MA, CE, PE, MT, MS, TO, SP (FORZZA et al., 2010).

Quadro 4.2 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Magnoliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continuação)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Oxalidales	Oxalidaceae	<i>Oxalis</i>	<i>Oxalis densifolia</i> Mart. & Zucc. ex Zucc.	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
Rosales	Moraceae	<i>Brosimum</i>	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). PA, PI, TO (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
Santalales	Opiliaceae	<i>Agonandra</i>	<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers ex Benth. & Hook.f.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica (FORZZA et al., 2010). BA, DF, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PI, SP, TO (ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
Sapindales	Anacardiaceae	<i>Anacardium</i>	<i>Anacardium humile</i> A.St.-Hil.	Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010; Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
			<i>Anacardium occidentale</i> L.	Amazônia, Caatinga Cerrado Mata Atlântica Pampa Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); BA, DF, GO, MT, MS, MG, SP (ALMEIDA et al., 1998).
			<i>Anacardium nanum</i> A. St. Hil.	Cerrado	Nativa; endêmica. DF, MT, GO, MG
Solanales	Convolvulaceae	<i>Merremia</i>	<i>Merremia tomentosa</i> (Choisy) Hallier	Cerrado	Nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011)
			<i>Merremia flagellaris</i> (Choisy) O'Donnell	Caatinga Cerrado	Nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011)
		<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea procumbens</i> Mart. ex. Choisy	Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011).
	Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.	Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). AM, MA, PA, TO (ALMEIDA et al., 1998, MEDEIROS, 2011).

Quadro 4.3 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Liliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (continua)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Arecales	Arecaceae	<i>Syagrus</i>	<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.	Amazônia Cerrado	Nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG) (FORZZA et al., 2010).
Asparagales	Iridaceae	<i>Trimezia</i>	<i>Trimezia juncifolia</i> (Klatt.) Benth. & Hook.	Amazônia Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FOORZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011)
Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia</i>	<i>Vellozia seubertiana</i> Goethart & Henrard	Caatinga Cerrado	Nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); MT no Parque Estadual do Cristalino (SMITH; AYENS, 1976; NEVES, 2009; FUNDAÇÃO ECOLÓGICA DO CRISTALINO -WEB 2013).
Poales	Bromeliaceae	<i>Ananas</i>	<i>Ananas ananassoides</i> (Baker) L. B. Sm.	Amazônia, Caatinga, Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010; ALMEIDA et al., 1998). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	Cyperaceae	<i>Bulbostylis</i>	<i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng.) Lindm.	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (FORZZA et al., 2010; MEDEIROS, 2011). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Eleocharis</i>	<i>Eleocharis</i> R. Br.	Amazônia Caatinga, Cerrado Mata Atlântica Pampa, Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (FORZZA et al., 2010).
		<i>Fimbristylis</i>	<i>Fimbristylis</i> Vahl.	Amazônia Caatinga, Cerrado Mata Atlântica Pampa, Pantanal	Nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (FORZZA et al., 2010).
		<i>Rhynchospora</i>	<i>Rhynchospora brasiliensis</i> Boeckeler	Amazônia Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (FORZZA et al., 2010).
			<i>Rhynchospora consanguinea</i> (Kunth.) Böeckeler	Amazônia Caatinga Cerrado	Nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (FORZZA et al., 2010; PROENÇA et al., 2006). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
	Poaceae	<i>Axonopus</i>	<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhl.	Amazônia Caatinga Cerrado Mata Atlântica	Nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR) (FORZZA et al., 2010). Bolívia (www.cerradosdebolivia.org).
		<i>Panicum</i>	<i>Panicum maximum</i> L.	Amazônia Cerrado	Amazônia Oriental (DIAS-FILHO; SERRÃO, 1995), Brasil Central (ANJOS et al., 2009).

Quadro 4.3 - Florística da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com espécies da classe Liliopsida, segundo a ordem, família, gênero, ambiente de ocorrência e distribuição geográfica (conclusão)

Ordem	Família	Gênero	Espécie	Domínio/Bioma	Distribuição geográfica
Poales	Indeterminada 1	Indeterminada 1	Indeterminada 1	-	-
	Indeterminada 2	Indeterminada 2	Indeterminada 2	-	-
	Indeterminada 3	Indeterminada 3	Indeterminada 3	-	-
	Indeterminada 4	Indeterminada 4	Indeterminada 4	-	-
	Indeterminada 5	Indeterminada 5	Indeterminada 5	-	-
	Indeterminada 6	Indeterminada 6	Indeterminada 6	-	-
	Indeterminada 7	Indeterminada 7	Indeterminada 7	-	-
	Indeterminada 8	Indeterminada 8	Indeterminada 8	-	-
	Indeterminada 9	Indeterminada 9	Indeterminada 9	-	-
	Indeterminada 10	Indeterminada 10	Indeterminada 10	-	-

Ainda há poucos registros a respeito da flora tocantinense (FELFILI; FAGG, 2007; CARAÍBA; MEDEIROS, 2009; LIRA; MEDEIROS, 2009; HAIDAR et al., 2011; MEDEIROS et al., 2012; LEMOS, 2013). Das 121 espécies ocorrentes no Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, apenas 42 (34,7%) são citadas como ocorrentes no Estado do Tocantins (Quadros 4.2 e 4.3) em publicações científicas como Almeida et al. (1998), Lorenzi (2002; 2008; 2009), Forzza et al. (2010) e Medeiros (2011), que têm uma abordagem de distribuição geográfica de espécies vegetais no Brasil. A flora dos campos é bem diversificada, pois 74,4% dos gêneros são compostos por apenas uma espécie. A sua distribuição geográfica é, por vezes, ampla, ocorrendo não apenas no Cerrado brasileiro; algumas espécies ocorrem em outros Domínios/Biomas brasileiros, nos cerrados bolivianos e em outras localidades da América do Sul e América Central (Quadros 4.2 e 4.3).

Um total de 30 espécies (27%), das 111 ocorrentes nas comunidades de plantas dos Campos Sujos estudados, identificadas, é citado na literatura científica como de ocorrência exclusiva no Cerrado; 17 espécies (15,3%) ocorrem no Cerrado, Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica; 10 espécies (9%) no Cerrado e na Caatinga; assim como no Cerrado e Amazônia, e também no Cerrado e Mata Atlântica, 9 espécies (8,1%) no Cerrado, Amazônia e Caatinga; 3 espécies (2,7%) no Cerrado e Pantanal, 6 espécies (5,4%) no Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal; 4 espécies (3,6%) no Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, como também no Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica, e no Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa; e, uma espécie (0,9%) no Cerrado e Pampa, no Cerrado, na Caatinga e Pantanal, no Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal, e na Mata Atlântica.

Essa análise indica haver, em se tratando de domínios morfoclimáticos e fitogeográficos brasileiros, um trânsito maior destas espécies entre Cerrado, Caatinga, Amazônia e Mata Atlântica. Essa complexa conexão do Cerrado com os domínios fitogeográficos circundantes tem sido abordada por Oliveira-Filho e Ratter (2000), que mostraram que a interação de fatores, tais como a precipitação sazonal, a baixa fertilidade dos solos, drenagem moderada a alta, incêndios e as flutuações climáticas do quaternário, influenciam a distribuição da vegetação do Cerrado. Estes autores ainda afirmaram que este domínio fitogeográfico, embora visto como corredor seco, não constitui essencialmente uma barreira, pois constitui um corredor para muitas espécies da Amazônia e Mata Atlântica, da mesma forma em relação à Caatinga e ao Chaco.

Entretanto, nem todas as espécies foram exclusivas do território brasileiro; das 111, identificadas, um total de 37 (33,3%) ocorrem nos cerrados da Bolívia oriental. Em se

tratando das 30 espécies que são reconhecidas como ocorrentes só no Cerrado (Quadro 4.2; 4.3), 10 espécies (*Vochysia rufa*, *Connarus suberosus*, *Tibouchina aeopogon*, *Caryocar brasiliense*, *Aspilia leucoglossa*, *Kielmeyera rosea*, *Clitoria guianensis*, *Crotalaria unifoliata*, *Hymenaea stignocarpa*, *Casselia* sp.) também são referidas como de ocorrência nos cerrados da Bolívia oriental (WOOD, 2011), da mesma forma que das 17 espécies que ocorreram no Cerrado, Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica, 11 espécies (*Ananas ananassoides*, *Qualea grandiflora*, *Qualea parviflora*, *Peltodon tomentosum*, *Curatella americana*, *Vigna firmula*, *Palicourea rígida*, *Kielmeyera coriacea*, *Brosimum gawdichaudii* e *Agonandra brasiliensis*) são referidas como de ocorrência nos cerrados da Bolívia pela mesma publicação e assim como todas que as seguem.

Das 10 espécies que ocorreram no Cerrado e Caatinga, *Dipteryx alata* e *Peltodon emerginatus*, também têm ocorrência na Bolívia; das 9 espécies que ocorreram no Cerrado, Amazônia e Caatinga, três espécies (*Byrsonima verbascifolia*, *Rhyncosphora consanguinea* e *Davila eliptica*) têm ocorrência na Bolívia; bem como das 10 espécies que ocorreram no Cerrado e Mata Atlântica apenas *Deianira* cf. *chiquitana* tem ocorrência na Bolívia; das 10 espécies ocorrentes no Cerrado e Amazônia, duas (*Byrsonima coccobolifolia* e *Leptolobium dasycarpum*) têm ocorrência na Bolívia; das 3 espécies que ocorreram no Cerrado e Pantanal, *Himatanthus obovatus*, também tem ocorrência na Bolívia; das 6 espécies que ocorreram no Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal, quatro (*Bowdichia virgilioides*, *Tocoyena formosa*, *Tabebuia aurea* e *Tabebuia roseoalba*) ocorreram na Bolívia; a espécie *Hancornia speciosa*, que ocorreu no Cerrado, Caatinga e Pantanal, também tem ocorrência na Bolívia, da mesma forma que a espécie *Aspilia foliaceae*, que ocorreu no Cerrado e no Pampa.

Isso evidencia que a flora do Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, na serra do Lageado, tem conexões geográficas diversas, parecendo haver grande afinidade florística com a flora do cerrado oriental boliviano, fato que ocorre porque os cerrados bolivianos são uma extensão territorial dos cerrados brasileiros, do qual ainda se tem pouco conhecimento, como mostram os estudos de Segarra (2011) e Wood (2011).

Poucas espécies que ocorreram no Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande têm uma área de distribuição geográfica de ampla distribuição Neotropical, como é o caso da *Tocoyena formosa* (jenipapo) com ocorrência desde o México, Brasil, Argentina (FORZZA et al., 2010) e Bolívia (WOOD, 2011). Da mesma forma que a *Casearia sylvestris*, do México às Antilhas, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina (FORZZA

et al., 2010); e, *Bowdichia virgilioides*, que ocorre desde a Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Brasil, onde só não tem ocorrência registrada para o Domínio Pampa (FORZZA, et al., 2010).

Do ponto de vista da importância da biodiversidade, o Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande abriga espécies que apresentam distribuição geográfica de certa forma restrita no Cerrado brasileiro, como:

- *Vellozia seubertiana*, que tem ocorrência citada apenas para Mato Grosso, no Parque Estadual do Cristalino (SEMA/MT, 2009), Mato Grosso e Goiás (SMITH; AYENSU, 1976) e Chapada Diamantina - BA (NEVES, 2009);
- *Byrsonima subterranea* que foi considerada presumivelmente extinta no estado de São Paulo (SMA-SP, 1998);
- espécies do gênero *Mimosa* como *Mimosa albolanata* cf. var. *brasiliiana* de ocorrência restrita no Brasil Central (GO, MG e DF); nos campos rupestres de Minas é restrita ao Espinhaço Central (DUTRA, 2009);
- *Mimosa radula* cf. var. *imbricata*, ocorre em pequenas populações isoladas em poucas localidades. Sua ocorrência é restrita aos campos rupestre de Minas Gerais (serra da Canastra, área disjunta da Cadeia do Espinhaço) e às serras de Goiás entre 990-1.370 m de altitude (DUTRA, 2009).

4.2.2.3 Formas de vida vegetal

Outro aspecto importante que se deve considerar a respeito da flora da comunidade de plantas do Campo Sujo, uma vez que este tem em destaque o componente herbáceo-subarbustivo-arbustivo, é a influência do clima na dinâmica anual da vida de tais plantas. Sendo o Cerrado um Domínio de clima tropical sujeito à estacionalidade climática, este tem efeitos determinantes na composição florística do estrato herbáceo e subarbustivo, com mudanças na paisagem entre as estações seca e chuvosa. Segundo Muller-Dombois e ElleMBERG (1974) o caráter da paisagem é fortemente influenciado pelos tipos de vegetação e formas de vida que evidenciam mudanças sazonais.

Nas áreas de Campo Sujo Seco na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande. ocorreram as formas de vida tipo Fanerófitas (árvores, arbustos e lianas, cujas gemas localizam-se a cima de 30 cm do nível do solo), Caméfitas (plantas perenes com base lenhosa nas quais as gemas estão a menos de 30 cm do solo), Hemicriptófitas (plantas escondidas ou

semi-escondidas durante a estação do ano desfavorável, com gemas ao nível do solo), Terófitas (plantas anuais) e Geófitas (plantas perenes com gemas subterrâneas contidas em bulbo ou rizoma), porém com predomínio de Fanerófitas, Hemicriptófitas e de Caméfitas (Quadro 4.4; Figura 4.35), de acordo com a classificação de formas de vida das plantas de Raunkiaer (1934), segundo o seu comportamento na estação mais desfavorável do ano. As famílias mais expressivas quanto à forma de vida foram Fabaceae e Vochysiaceae, que são do tipo fanerófita (Quadro 4.4).

Quadro 4.4 – Espécies da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (topo e vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com formas de vida (Fan = Fanerófitas; Hem = Hemicriptófitas; Cam = Caméfitas; Ter = Terófitas; Geo = Geófitas) (continua)

Família/ Espécie	Topo	Vertente	Forma de vida
ANACARDIACEAE			
<i>Anacardium humile</i>	x	x	Fan
<i>Anacardium nanum</i>	x	x	Cam
<i>Anacardium occidentale</i>	x	x	Fan
ANNONACEAE			
<i>Annona coriacea</i>	x	x	Fan
<i>Annona crassiflora</i>	x	x	Fan
APOCYNACEAE			
<i>Hancornia speciosa</i>	x	x	Fan
<i>Himatanthus obovatus</i>	x	x	Fan
ARALIACEAE			
<i>Schefflera macrocarpa</i>	x	x	Fan
ARECACEAE			
<i>Syagrus comosa</i>	x	x	Fan
ASTERACEAE			
<i>Aspilia foliacea</i>	x		Geo
<i>Aspilia leucoglossa</i>	x		Geo
<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	x	x	Fan
<i>Lessigianthus obtusatus</i>	x	x	Can
BIGNONIACEAE			
<i>Tabebuia aurea</i>		x	Fan
<i>Tabebuia roseoalba</i>	x		Fan
<i>Zeyhera tuberculosa</i>	x	x	Fan
BROMELACEAE			
<i>Ananas ananassoides</i>		x	Hem
CARYOCARACEAE			
<i>Caryocar brasiliense</i>	x		Fan
CELASTRACEAE			
<i>Salacia crassifolia</i>	x	x	Fan
CALOPHYLLACEAE			
<i>Kielmeyera coriacea</i>	x	x	Fan
<i>Kielmeyera lanthrophyton</i>		x	Fan
<i>Kielmeyera rosea</i>	x		Fan

Quadro 4.4 - Espécies da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (topo e vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com formas de vida (Fan = Fanerófitas; Hem = Hemicriptófitas; Cam = Caméfitas; Ter = Terófitas; Geo = Geófitas) (continuação)

Família/ Espécie	Topo	Vertente	Forma de vida
CLUSIACEAE			
<i>Platonia insignis</i>		x	Fan
CONNARACEAE			
<i>Connarus suberosus</i>	x	x	Fan
<i>Rourea induta</i>	x	x	Fan
CONVOLVULACEAE			
<i>Ipomoea procumbens</i>	x	x	Hem
<i>Merremia flagellaris</i>	x	x	Hem
<i>Merremia tomentosa</i>		x	Hem
CYPERACEAE			
<i>Bulbostylis pradoxa</i>	x	x	Cam
<i>Eleocharis</i> sp	x	x	Geo
<i>Fimbristylis</i> sp	x	x	Hem
<i>Rhynchospora brasiliensis</i>	x	x	Hem
<i>Rhynchospora consanguinea</i>	x	x	Hem
DILLENIACEAE			
<i>Curatella americana</i>	x	x	Fan
<i>Davilla elliptica</i>	x	x	Fan
EBENACEAE			
<i>Diospyros hispida</i>	x	x	Fan
ERYTHROXYLACEAE			
<i>Erythroxylum cf. citrifolium</i>	x		Fan
<i>Erythroxylum suberosum</i>	x	x	Fan
<i>Erythroxylum tortuosum</i>		x	Fan
EUPHORBIACEAE			
<i>Manihot acuminatissima</i>		x	Cam
<i>Manihot sparsifolia</i>	x	x	Cam
<i>Croton goyazensis</i>	x	x	Cam
FABACEAE			
<i>Andira humilis</i>	x	x	Fan
<i>Bauhinia curvula</i>	x	x	Fan
<i>Bauhinia rufa</i>	x	x	Fan
<i>Bowdichia virgilioides</i>	x	x	Fan
<i>Calliandra dysantha</i>	x	x	Fan
<i>Chamaecrista orbiculata</i>	x	x	Fan
<i>Dimorphandra mollis</i>	x	x	Fan
<i>Dipteryx alata</i>	x	x	Fan
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	x	x	Fan
<i>Leptolobium dasycarpum</i>	x	x	Fan
<i>Mimosa albolanata</i> cf. var. <i>brasiliiana</i>	x	x	Fan
<i>Mimosa radula</i> cf. var. <i>imbricata</i>	x	x	Cam
<i>Platypodium elegans</i>	x		Fan
<i>Pterodon emarginatus</i>	x		Fan
<i>Senna velutina</i>		x	Fan
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	x	x	Fan
<i>Tachigali rugosa</i>	x	x	Fan
<i>Captosema scarlatium</i>	x	x	Hem

Quadro 4.4 - Espécies da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (topo e vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com formas de vida (Fan = Fanerófitas; Hem = Hemicriptófitas; Cam = Caméfitas; Ter = Terófitas; Geo = Geófitas) (continuação)

Família/ Espécie	Topo	Vertente	Forma de vida
FABACEAE			
<i>Centrosema virginianum</i>	x		Hem
<i>Chamaecrista diphylla</i>	x		Cam
<i>Chamaecrista serpens</i>	x	x	Cam
<i>Clitoria guianensis</i>	x	x	Hem
<i>Crotalaria unifoliolata</i>	x	x	Cam
<i>Vignia firmula</i>	x	x	Cam
<i>Vignia speciosa</i>	x		Cam
GENTIANACEAE			
<i>Deianira cf. chiquitana</i>	x		Cam
IRIDACEAE			
<i>Trimezia juncifolia</i>	x	x	Geo
LAMIACEAE			
<i>Amasonia campestris</i>	x	x	Hem
<i>Hyptis peduncularis</i>	x		Hem
<i>Peltodon tomentosus</i>	x		Hem
LYTHRACEAE			
<i>Diplusodon microphyllus</i>	x		Cam
<i>Diplusodon sessiliflorus</i>	x		Cam
MALPIGHIACEAE			
<i>Byrsonima coccobolifolia</i>	x	x	Fan
<i>Byrsonima pachyphylla</i>	x	x	Fan
<i>Byrsonima subterrânea</i>	x	x	Fan
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	x	x	Fan
MALVACEAE			
<i>Eriotheca pubescens</i>	x		Fan
<i>Pelteia edouardii</i>	x	x	Hem
MELASTOMATACEAE			
<i>Miconia albicans</i>		x	Fan
<i>Miconia ferruginata</i>	x		Fan
<i>Tibouchina aegopogon</i>	x	x	Cam
MORACEAE			
<i>Brosimum gaudichaudii</i>	x	x	Fan
MYRTACEAE			
<i>Myrcia splendens</i>	x	x	Fan
<i>Psidium firmum</i>	x	x	Fan
<i>Psidium</i> sp.	x		Fan
OCHNACEAE			
<i>Ouratea hexasperma</i>	x	x	Fan
<i>Ouratea spectabilis</i>	x	x	Fan
OPILIACEAE			
<i>Agonandra brasiliensis</i>		x	Fan
OXALIDACEAE			
<i>Oxalis densifolia</i>	x	x	Cam
POACEAE			
<i>Axonopus brasiliensis</i>	x	x	Hem
Indeterminada 1		x	Hem
Indeterminada 2	x	x	Hem
Indeterminada 3	x	x	Hem
Indeterminada 4	x	x	Hem

Quadro 4.4 - Espécies da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (topo e vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com formas de vida (Fan = Fanerófitas; Hem = Hemicriptófitas; Cam = Caméfitas; Ter = Terófitas; Geo = Geófitas) (conclusão)

Família/ Espécie	Topo	Vertente	Forma de vida
POACEAE			
Indeterminada 5	x	x	Hem
Indeterminada 6	x	x	Hem
Indeterminada 7	x	x	Hem
Indeterminada 8	x	x	Hem
Indeterminada 9	x		Hem
Indeterminada 10	x	x	Hem
<i>Panicum maximum</i>		x	Hem
RUBIACEAE			
<i>Palicourea rigida</i>		x	Fan
<i>Tocoyena formosa</i>	x		Fan
<i>Borreria eryngioides</i>		x	Ter
<i>Mitracarpus frigidus</i>	x	x	Ter
SALICACEAE			
<i>Casearia sylvestris</i>	x	x	Fan
SOLANACEAE			
<i>Solanum lycocarpum</i>	x		Fan
VELLOZIACEAE			
<i>Vellozia seubertiana</i>	x	x	Fan
VERBENACEAE			
<i>Casselia</i> sp.	x		Hem
<i>Lippia florida</i>	x		Hem
VOCHYSIACEAE			
<i>Qualea grandiflora</i>	x	x	Fan
<i>Qualea parviflora</i>	x	x	Fan
<i>Salvertia convallariodora</i>	x	x	Fan
<i>Vochysia cf. divergens</i>		x	Fan
<i>Vochysia rufa</i>	x	x	Fan
<i>Vochysia cf. thyrsoides</i>		x	Fan
<i>Vochysia cinnamomea</i>	x	x	Fan
<i>Vochysia elliptica</i>	x		Fan
<i>Vochysia tucanorum</i>	x	x	Fan

Figura 4.35 – Contribuição das formas de vida das espécies da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

4.2.2.3 Florística e fitossociologia

O Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, cujas parcelas de amostragem foram A1V; A1T; A2V; A2T; A3V; A3T; 4E; A4T; A5V; A5T, teve um total de 39 famílias, 82 gêneros e 121 espécies, sendo 77 espécies componentes do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo e 44 do estrato herbáceo-subarbustivo (Quadro 4.2; 4.3).

A família Fabaceae destacou-se entre as demais com 25 espécies, seguida pela Poaceae com 12 e Vochysiaceae com 9 (Figura 4.36). Em levantamentos fitossociológicos do Cerrado, essas famílias estão sempre entre as que apresentam maiores números de espécies. A maioria das famílias (92,3%) teve um número de espécies inferior a 9 (Figura 4.36) e, deste percentual, as famílias Velloziaceae, Arecaceae, Araliaceae, Ebenaceae, Celastraceae, Moraceae, Salicaceae, Oxalidaceae, Iridiaceae, Clusiaceae, Opiliaceae, Bromeliaceae, Solanaceae, Caryocaraceae e Gentianaceae foram representadas apenas por uma espécie.

Figura 4.36 – Distribuição do número de espécies, por famílias com ≥ 2 espécies, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Comparando a flora do Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande com a de outros Campos Sujos em número de espécies, gêneros e famílias, o Campo Sujo Seco desta pesquisa apresentou maior semelhança com o Campo Sujo da Fazenda Água Limpa (DF) estudado por Munhoz e Felfili (2006). Outros Campos Sujos também foram

estudados: da fazenda Água Limpa (DF) estudados por Amaral (2008); de Itirapina (SP), por Tanus e Assis (2004); da Estação Ecológica do Panga (MG), por Moreno et al. (2008); da Floresta Nacional de Silvânia (GO), por Araújo et al. (2012); e, da Estação Ecológica de Pirapitinga (MG), estudados por Giácomo et al. (2013) (Figura 4.37).

Figura 4.37 – Número de espécies, gêneros e famílias de alguns estudos em áreas de Campo Sujo do Cerrado brasileiro e do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Quanto aos Campos Sujos de Itirapina, é preciso que se considere a sua localização geográfica. Segundo Durigan et al. (2004), os cerrados de São Paulo possuem características peculiares, formando um bloco particular, por se situarem no limite sul do Cerrado e estarem sujeitos a geadas e a períodos de seca menos prolongados que os do Brasil Central.

Por outro lado, o Campo Sujo da Fazenda Água Limpa estudado por Amaral (2008), estava a sete anos sem ocorrência de queimadas e isso é um fator que deve ser considerado, pois a autora comentou ter havido decréscimo de 9% das plantas herbáceas, mas também aumento de 16% de subarbustos nesses campos.

A área de Campos Sujos da Estação Ecológica do Panga (MG) era uma fazenda que possuía como atividade principal a agropecuária até 1984, que foi comprada em 1985 pela Universidade Federal de Uberlândia e se tornou uma área de preservação ambiental e a partir de então a vegetação vem se reconstituindo naturalmente, além de ocorrerem em altitudes mais elevadas (MORENO et al., 2008) que os Campos Sujos Secos do ribeirão Taquaruçu Grande.

Da mesma forma, os Campos Sujos da Floresta Nacional de Silvânia (GO) estão em altitudes bem mais elevadas, 900 m em média (ARAÚJO et al., 2012).

Os Campos Sujos da Estação Ecológica de Pirapitinga na ilhas das Três Marias (MG) estão localizados nas margens do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, sujeito à oscilação do nível da barragem entre a cota máxima de 568 m até a mínima de 559 m acima do nível do mar, sendo que em sua cota máxima, a Estação assume feição de ilha. Pode ser que essa condição ambiental tenha influências sobre a flora dos campos desta localidade, pois em termos de altitude são semelhantes ao da bacia do Taquaruçu Grande.

4.2.2.3.1 Estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo do Campo Sujo Seco

A vegetação do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo do Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande foi composta por 31 famílias, 53 gêneros, 77 espécies. As famílias Fabaceae e Vochysiaceae tiveram maiores números de espécies e 97,4% das famílias tiveram menos que cinco espécies, sendo que deste percentual, 14 famílias tiveram apenas uma espécie (Figura 4.38).

Figura 4.38 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Do total de 77 espécies, 48,1% tiveram ≥ 10 plantas (Figura 4.39) e 51,9% tiveram menos que 10 plantas (espécies que apresentaram densidade absoluta $\leq 9,0$ indivíduos.ha⁻¹,

Tabela 4.10). A densidade total foi 2.761,47 indivíduos.ha⁻¹, a dominância foi 5,64 m². ha⁻¹, o diâmetro médio foi 4,61 cm e a altura média de 1,118 m (Tabela 4.11). Estes valores incluem plantas vivas e seus galhos mortos e plantas mortas registradas em condições de relevo dos tipos topo e vertente.

Figura 4.39 – Distribuição do número de plantas, por espécie com ≥ 10 indivíduos.ha⁻¹, no Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Tabela 4.10 - Espécies vivas do Campo Sujo Seco (A1V; A1T; A2V; A2T; A3V; A3T; A4V; A4T; A5V; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI) (continua)

Espécies	AbsDe (ind/ha)	RelDe (%)	AbsFr (%)	RelFr (%)	AbsDo (m ² /ha)	RelDo (%)	IVI (%)
<i>Vellozia seubertiana</i>	671.0	29.20	78.00	8.20	1.97	34.98	72.38
<i>Syagrus comosa</i>	289.0	12.58	71.00	7.47	0.50	8.78	28.82
<i>Erythroxylum suberosum</i>	83.0	3.61	44.00	4.63	0.22	3.88	12.12
<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	64.0	2.79	40.00	4.21	0.25	4.50	11.49
<i>Connarus suberosus</i>	68.0	2.96	38.00	4.00	0.20	3.61	10.57
<i>Byrsonima coccobolifolia</i>	80.0	3.48	34.00	3.58	0.16	2.86	9.92
<i>Dimorphandra mollis</i>	56.0	2.44	33.00	3.47	0.18	3.22	9.13
<i>Ouratea spectabilis</i>	60.0	2.61	36.00	3.79	0.11	1.96	8.35
<i>Byrsonima pachyphylla</i>	55.0	2.39	33.00	3.47	0.13	2.30	8.17
<i>Davilla elliptica</i>	52.0	2.26	37.00	3.89	0.10	1.80	7.96
<i>Byrsonima subterranea</i>	95.0	4.13	24.00	2.52	0.07	1.30	7.95
<i>Vochysia cinnamomea</i>	80.0	3.48	16.00	1.68	0.15	2.59	7.75
<i>Salvertia convallariodora</i>	16.0	0.70	14.00	1.47	0.25	4.48	6.64
<i>Bauhinia curvula</i>	57.0	2.48	38.00	4.00	0.01	0.11	6.59
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	26.0	1.13	23.00	2.42	0.09	1.67	5.22
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	25.0	1.09	21.00	2.21	0.09	1.65	4.94
<i>Psidium firmum</i>	26.0	1.13	18.00	1.89	0.08	1.40	4.42
<i>Anacardium occidentale</i>	18.0	0.78	13.00	1.37	0.11	2.01	4.16
<i>Anacardium humile</i>	30.0	1.31	19.00	2.00	0.04	0.72	4.03
<i>Anacardium nanum</i>	25.0	1.09	16.00	1.68	0.05	0.90	3.67
<i>Himatanthus obovatus</i>	29.0	1.26	17.00	1.79	0.03	0.59	3.64
<i>Kielmeyera coriacea</i>	22.0	0.96	20.00	2.10	0.03	0.45	3.51
<i>Schefflera macrocarpa</i>	16.0	0.70	10.00	1.05	0.08	1.45	3.20
<i>Qualea grandiflora</i>	16.0	0.70	11.00	1.16	0.07	1.20	3.05
<i>Salacia crassifolia</i>	25.0	1.09	13.00	1.37	0.02	0.42	2.87
<i>Bauhinia rufa</i>	23.0	1.00	17.00	1.79	0.00	0.06	2.85
<i>Manihot sparsifolia</i>	25.0	1.09	15.00	1.58	0.01	0.15	2.82
<i>Vochysia cf. thyrsoides</i>	20.0	0.87	13.00	1.37	0.02	0.42	2.66
<i>Tachigali rugosa</i>	15.0	0.65	12.00	1.26	0.04	0.74	2.65
<i>Annona crassiflora</i>	12.0	0.52	11.00	1.16	0.04	0.79	2.47
<i>Diospyros hispida</i>	8.0	0.35	8.00	0.84	0.05	0.93	2.12
<i>Casearia sylvestris</i>	14.0	0.61	13.00	1.37	0.01	0.11	2.08
<i>Brosimum gaudichaudii</i>	11.0	0.48	9.00	0.95	0.04	0.64	2.06
<i>Leptolobium dasycarpum</i>	12.0	0.52	10.00	1.05	0.02	0.34	1.92
<i>Bowdichia virgilioides</i>	7.0	0.30	6.00	0.63	0.05	0.92	1.86
<i>Andira humilis</i>	6.0	0.26	3.00	0.32	0.07	1.17	1.75
<i>Mimosa radula</i> cf. var. <i>imbricata</i>	17.0	0.74	9.00	0.95	0.00	0.05	1.74
<i>Myrcia splendens</i>	11.0	0.48	9.00	0.95	0.01	0.17	1.59
<i>Qualea parviflora</i>	5.0	0.22	5.00	0.53	0.05	0.80	1.55
<i>Vochysia rufa</i>	8.0	0.35	8.00	0.84	0.02	0.33	1.52
<i>Chamaecrista orbiculata</i>	10.0	0.44	6.00	0.63	0.00	0.07	1.14

Tabela 4.10 - Espécies vivas do Campo Sujo Seco (A1V; A1T; A2V; A2T; A3V; A3T; A4V; A4T; A5V; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI) (conclusão)

Espécies	AbsDe (ind/ha)	RelDe (%)	AbsFr (%)	RelFr (%)	AbsDo (m ² /ha)	RelDo (%)	IVI (%)
<i>Manihot acuminatissima</i>	8.0	0.35	7.00	0.74	0.00	0.01	1.09
<i>Dipteryx alata</i>	5.0	0.22	3.00	0.32	0.03	0.51	1.05
<i>Calliandra dysantha</i>	9.0	0.39	6.00	0.63	0.00	0.02	1.04
<i>Vochysia cf. divergens</i>	11.0	0.48	2.00	0.21	0.02	0.28	0.97
<i>Curatella americana</i>	4.0	0.17	3.00	0.32	0.03	0.45	0.94
<i>Tabebuia aurea</i>	5.0	0.22	5.00	0.53	0.01	0.14	0.88
<i>Annona coriacea</i>	4.0	0.17	4.00	0.42	0.02	0.27	0.87
<i>Mimosa albolanata</i> cf. var. <i>brasiliana</i>	7.0	0.30	2.00	0.21	0.01	0.25	0.77
<i>Senna velutina</i>	4.0	0.17	4.00	0.42	0.00	0.01	0.60
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	4.0	0.17	3.00	0.32	0.00	0.08	0.57
<i>Pterodon emarginatus</i>	5.0	0.22	3.00	0.32	0.00	0.03	0.56
<i>Rourea induta</i>	4.0	0.17	3.00	0.32	0.00	0.06	0.55
<i>Ouratea hexasperma</i>	2.0	0.09	2.00	0.21	0.01	0.23	0.53
<i>Zeyhera tuberculosa</i>	2.0	0.09	2.00	0.21	0.01	0.21	0.51
<i>Kielmeyera rosea</i>	3.0	0.13	3.00	0.32	0.00	0.06	0.51
<i>Vochysia tucanorum</i>	3.0	0.13	3.00	0.32	0.00	0.05	0.49
<i>Erythroxylum cf. citrifolium</i>	5.0	0.22	2.00	0.21	0.00	0.02	0.45
<i>Tocoyena formosa</i>	2.0	0.09	2.00	0.21	0.01	0.14	0.44
<i>Hancornia speciosa</i>	3.0	0.13	2.00	0.21	0.00	0.08	0.42
<i>Miconia ferruginata</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.01	0.21	0.36
<i>Eriotheca pubescens</i>	2.0	0.09	2.00	0.21	0.00	0.03	0.33
<i>Tibouchina aegopogon</i>	2.0	0.09	2.00	0.21	0.00	0.00	0.30
<i>Agonandra brasiliensis</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.08	0.23
<i>Erythroxylum tortuosum</i>	2.0	0.09	1.00	0.11	0.00	0.03	0.22
<i>Tabebuia roseoalba</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.07	0.22
<i>Palicourea rigida</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.05	0.20
<i>Ananas ananassoides</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.04	0.18
<i>Psidium</i> sp.	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.01	0.16
<i>Solanum lycocarpum</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.01	0.16
<i>Vochysia elliptica</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.01	0.16
<i>Platypodium elegans</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.01	0.16
<i>Caryocar brasiliense</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.01	0.16
<i>Kielmeyera lanthrophyton</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.01	0.16
<i>Deianira cf. chiquitana</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.00	0.15
<i>Miconia albicans</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.00	0.15
<i>Platonia insignis</i>	1.0	0.04	1.00	0.11	0.00	0.00	0.15

Tabela 4.11 - Parâmetros fitossociológicos da comunidade subarbustiva-arbustivo-arbórea do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com informações de densidade, dominância, diâmetro (média) e altura (média) relacionados às parcelas de amostragem de topo e de Vertente, com respectivos percentuais totais de plantas vivas e mortas

Tipo de relevo	Densidade (indivíduos.ha ⁻¹)					Dominância (m ² .ha ⁻¹)					Diâmetro Média (cm)			Altura Média
	Vivas	(%)	Mortas	(%)	Total	Viva	(%)	Morta	(%)	Total	Vivas	Mortas	Total	(m)
Topo	2.242,0	91,8	200,22	8,2	2.442,22	5,78	77,4	1,69	22,6	7,47	4,56	5,24	4,9	1,23
Vertente	2.354,0	90,0	263,25	10,0	2.617,25	5,50	74,7	1,86	25,3	7,36	4,66	5,18	4,92	1,09
Total	2.298,0	83,2	463,47	16,8	2.761,47	5,64	76	1,78	24,0	7,41	4,61	5,21	4,91	1,12

Para as plantas vivas, a densidade foi 2.298,0 indivíduos.ha⁻¹, a dominância 5,64 m².ha⁻¹ e o diâmetro (média) de 4,61 cm; para as plantas mortas, a densidade foi 463,47 indivíduos.ha⁻¹, a dominância 1,78 m².ha⁻¹ e o diâmetro (média) de 5,21 cm. Os percentuais relativos a esses parâmetros sempre foram altos para as plantas vivas, porém o diâmetro (média) foi mais elevado nas mortas devido a mais baixa densidade e mais alta área basal destas plantas em relação às vivas (Tabela 4.11). Nos valores de dominância relativos à plantas mortas estão incluídas biomassa de tronco (indivíduos mortos) e de galhos mortos das plantas vivas, estes últimos representam 38,1% da dominância de biomassa morta. Em termos de desenvolvimento estrutural a vegetação de topo e Vertente é semelhante por apresentarem valores muito próximos de diâmetro (média) e altura (Tabela 4.11).

As espécies vivas que tiveram maiores biomassas mortas de galhos foram *Vellozia seubertiana* e *Connarus suberosus* (0,05 m².ha⁻¹), *Dimorphandra mollis* (0,04 m².ha⁻¹), *Anacardium humile*, *Manihot sparsifolia*, *Piptocarpha rotundifolia* e *Erythroxylum suberosum* (0,02 m².ha⁻¹), *Davilla elliptica*, *Stryphnodendron adstringens*, *Byrsonima coccobolifolia*, *Kielmeyera coriacea*, *Leptolobium dasycarpum*, *Vochysia rufa* e *Tachigali rugosa* (0,01 m².ha⁻¹).

Em relação às plantas mortas, constatou atividades de corte seletivo de *Vellozia seubertiana* em duas áreas de amostragem e se associou essa atividade ao uso desta planta como lenha pela sua característica potencial de combustível. Em geral foram observadas evidências de queimadas e, em algumas vezes, a presença de cupim, o que levou a associar a causa da mortalidade também a esses fatores.

As espécies vivas com maior índice de valor de importância (IVI) foram *Vellozia seubertiana*, *Syagrus comosa*, *Erythroxylum suberosum*, *Piptocarpha rotundifolia*, *Connarus suberosus*, *Byrsonima coccobolifolia*, *Dimorphandra mollis*, *Ouratea spectabilis*, *Byrsonima pachyphylla*, *Davilla elliptica*, *Byrsonima subterranea* e *Vochysia cinnamomea* (Tabela 4.10), em que a espécie *Vellozia seubertiana* se destacou das demais, seguida por *Syagrus comosa*, refletindo suas maiores densidades, frequências e dominâncias (Figura 4.40).

Tratando-se das plantas mortas, os maiores valores de IVI também foram para as plantas de *V. seubertiana* (232,43%), enquanto para as outras espécies mortas não identificáveis foi 67,57%. *V. seubertiana* teve densidade de 397,5 indivíduos.ha⁻¹ mortos e as outras mortas 80 indivíduos.ha⁻¹. Em relação a dominância, esta foi também maior para *V. seubertiana* (1,31 m².ha⁻¹) que para as outras plantas mortas (0,22 m².ha⁻¹).

Figura 4.40 – Distribuição das espécies com índice de valor de importância (IVI) acima de 7%, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (A1V; A1T; A2V; A2T; A3V; A3T; 4E; A4T; A5V; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Estudos fitossociológicos em Campo Sujo são escassos em se tratando dos parâmetros de densidade, área basal e altura, podendo-se citar: Moreno et al. (2008), com estudos na Estação Ecológica do Panga (MG); Araújo et al. (2012), na Floresta Nacional de Silvânia (GO); e, Giácomo (2013) na Estação Ecológica de Pirapitinga (MG).

Observou-se que os dados relacionados a estes parâmetros são variados entre os Campos Sujos. Em termos comparativos, o Campo Sujo estudado da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, apresentou densidade mais elevada, área basal mediana e menor altura em relação aos demais (Tabela 4.12). Estas variações podem estar ligadas aos gradientes ambientais de cada localidade, como também a diferenças metodológicas. No presente trabalho o sistema de inclusão dos indivíduos foi de circunferência ≥ 3 cm à altura do solo, enquanto os outros estudos incluíram apenas indivíduos com caules mais grossos: Moreno et al. (2008) adotou sistema de inclusão ≥ 10 cm de circunferência à altura do solo, Araújo et al. (2012), ≥ 5 cm de diâmetro (15,7 cm de circunferência) à altura do solo e Giácomo et al. (2013) ≥ 16 cm de circunferência à altura do solo.

Tabela 4.12 – Parâmetros fitossociológicos (densidade, área basal e altura média) para Campo Sujo de diversas localidades do Cerrado brasileiro e da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Localidade	Densidade (ind.ha ⁻¹)	Área Basal (m ² .ha ⁻¹)	Altura média (m)	Fonte
Bacia do Taquaruçu Grande, Palmas (TO)	2.298,0	5,64	1,12	Este trabalho
E. E. Panga, Uberlândia (MG)	1.850,0	8,7	3,5	Moreno et al.(2008)
FLONA de Silvânia (GO)	730,0	1,96	2,47	Araújo et al. (2012)
E. E. Pirapitinga (MG)	926,0	6,72	2,7	Giácomo et al. (2013)

4.2.2.3.1.1 Estrato subarbusitivo-arbusitivo-arbórea do Campo Sujo Seco: topo

Analisando o estrato subarbusitivo-arbusitivo-arbóreo sob a perspectiva do relevo, na situação de relevo do tipo topo, a vegetação subarbusitivo-arbusitivo-arbórea do Campo Sujo Seco do ribeirão Taquaruçu Grande, amostrada nas parcelas A1T; A2T; A3T; A4T; A5T, foi composta por 28 famílias, 49 gêneros e 66 espécies. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae e Vochysiaceae, representando 24,2% e 12,1%, respectivamente, do total de espécies nesse tipo de relevo, enquanto alto percentual de famílias (63,7%) teve número de espécies inferior a cinco (Figura 4.41).

Figura 4.41 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato subarbusitivo-arbusitivo-arbóreo, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (topo), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

As espécies com maior número de plantas (Figura 4.42) foram *Vellozia seubertiana* (259), *Syagrus comosa* (151) e *Byrsonima subterranea* (81). Alto percentual de espécies (60,6%) teve menos que 10 plantas (espécies que apresentaram densidade absoluta ≤ 18 indivíduos.ha⁻¹) (Tabela 4.13). Os dados totais foram: densidade de 2.242,0 indivíduos.ha⁻¹ (91,8% de plantas vivas e 8,2% de plantas mortas); dominância foi 5,782 m². ha⁻¹ (77,4% de plantas vivas e 22,6% de plantas mortas); o diâmetro (média) 4,5 cm, sendo 4,56 m para as plantas vivas e 5,24 cm para as mortas e a altura (média) foi 1,15 m (Tabela 4.11).

Figura 4.42 – Distribuição do número de plantas, por espécie com ≥ 10 indivíduos, no Campo Sujo Seco (topo), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Tabela 4.13 - Espécies do Campo Sujo Seco (topo), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com área de ocorrência, densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI) (continua)

Espécies	AbsDe (ind./ha)	RelDe (%)	AbsFr (%)	RelFr (%)	AbsDo (m ² /ha)	RelDo (%)	IVI (%)
<i>Vellozia seubertiana</i>	518.0	23.10	66.00	6.68	1.72	29.82	59.60
<i>Syagrus comosa</i>	308.0	13.74	70.00	7.09	0.44	7.61	28.43
<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	84.0	3.75	48.00	4.86	0.37	6.40	15.00
<i>Dimorphandra mollis</i>	84.0	3.75	48.00	4.86	0.29	4.93	13.54
<i>Byrsonima subterranea</i>	162.0	7.23	34.00	3.44	0.13	2.23	12.90
<i>Connarus suberosus</i>	76.0	3.39	38.00	3.85	0.22	3.84	11.08
<i>Ouratea spectabilis</i>	66.0	2.94	40.00	4.05	0.10	1.73	8.72
<i>Byrsonima coccobolifolia</i>	60.0	2.68	34.00	3.44	0.14	2.44	8.56
<i>Erythroxylum suberosum</i>	52.0	2.32	30.00	3.04	0.13	2.31	7.67
<i>Davilla elliptica</i>	52.0	2.32	40.00	4.05	0.07	1.16	7.52
<i>Psidium firmum</i>	42.0	1.87	26.00	2.63	0.13	2.28	6.78
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	32.0	1.43	30.00	3.04	0.13	2.30	6.77
<i>Byrsonima pachyphylla</i>	40.0	1.78	26.00	2.63	0.11	1.96	6.37
<i>Bauhinia curvula</i>	54.0	2.41	38.00	3.85	0.01	0.11	6.37
<i>Salvertia convallariodora</i>	6.0	0.27	6.00	0.61	0.30	5.23	6.11
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	28.0	1.25	22.00	2.23	0.11	1.93	5.41
<i>Schefflera macrocarpa</i>	24.0	1.07	12.00	1.21	0.16	2.69	4.98
<i>Anacardium nanum</i>	30.0	1.34	20.00	2.02	0.09	1.55	4.92
<i>Kielmeyera coriacea</i>	30.0	1.34	26.00	2.63	0.04	0.72	4.69
<i>Anacardium occidentale</i>	18.0	0.80	16.00	1.62	0.12	2.16	4.58
<i>Qualea grandiflora</i>	22.0	0.98	12.00	1.21	0.12	2.15	4.35
<i>Manihot sparsifolia</i>	36.0	1.61	22.00	2.23	0.01	0.21	4.04
<i>Anacardium humile</i>	22.0	0.98	20.00	2.02	0.04	0.70	3.71
<i>Himatanthus obovatus</i>	34.0	1.52	14.00	1.42	0.03	0.58	3.51
<i>Salacia crassifolia</i>	38.0	1.69	14.00	1.42	0.02	0.33	3.44
<i>Vochysia cinnamomea</i>	32.0	1.43	12.00	1.21	0.05	0.79	3.43
<i>Vochysia cf. thyrsoidea</i>	28.0	1.25	16.00	1.62	0.03	0.54	3.41
<i>Andira humilis</i>	10.0	0.45	4.00	0.40	0.13	2.17	3.03
<i>Bauhinia rufa</i>	20.0	0.89	18.00	1.82	0.00	0.03	2.74
<i>Annona crassiflora</i>	14.0	0.62	12.00	1.21	0.04	0.73	2.57
<i>Casearia sylvestris</i>	16.0	0.71	16.00	1.62	0.01	0.18	2.51
<i>Tachigali rugosa</i>	10.0	0.45	10.00	1.01	0.04	0.72	2.18
<i>Mimosa radula</i> cf. var. <i>imbricata</i>	16.0	0.71	12.00	1.21	0.00	0.07	1.99
<i>Myrcia splendens</i>	14.0	0.62	10.00	1.01	0.02	0.32	1.95
<i>Chamaecrista orbiculata</i>	18.0	0.80	10.00	1.01	0.01	0.13	1.95
<i>Diospyros hispida</i>	10.0	0.45	10.00	1.01	0.03	0.48	1.93
<i>Bowdichia virgilioides</i>	10.0	0.45	8.00	0.81	0.03	0.45	1.70
<i>Vochysia rufa</i>	8.0	0.36	8.00	0.81	0.03	0.49	1.66
<i>Qualea parviflora</i>	4.0	0.18	4.00	0.40	0.06	1.06	1.64
<i>Dipteryx alata</i>	8.0	0.36	4.00	0.40	0.05	0.88	1.64
<i>Curatella americana</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.05	0.83	1.12
<i>Pterodon emarginatus</i>	10.0	0.45	6.00	0.61	0.00	0.06	1.11
<i>Brosimum gaudichaudii</i>	8.0	0.36	6.00	0.61	0.01	0.10	1.06
<i>Annona coriacea</i>	4.0	0.18	4.00	0.40	0.03	0.44	1.02
<i>Kielmeyera rosea</i>	6.0	0.27	6.00	0.61	0.01	0.12	1.00

Tabela 4.13 - Espécies do Campo Sujo Seco (topo), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI) (conclusão)

Espécies	AbsDe (ind./ha)	RelDe (%)	AbsFr (%)	RelFr (%)	AbsDo (m ² /ha)	RelDo (%)	IVI (%)
<i>Leptolobium dasycarpum</i>	6.0	0.27	6.00	0.61	0.01	0.12	1.00
<i>Erythroxylum</i> cf. <i>citrifolium</i>	10.0	0.45	4.00	0.40	0.00	0.04	0.89
<i>Calliandra dysanta</i>	10.0	0.45	4.00	0.40	0.00	0.02	0.87
<i>Tocoyena formosa</i>	4.0	0.18	4.00	0.40	0.02	0.28	0.86
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	6.0	0.27	4.00	0.40	0.01	0.15	0.83
<i>Miconia ferruginata</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.02	0.42	0.71
<i>Zeyhera tuberculosa</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.02	0.36	0.65
<i>Eriotheca pubescens</i>	4.0	0.18	4.00	0.40	0.00	0.06	0.65
<i>Vochysia tucanorum</i>	4.0	0.18	4.00	0.40	0.00	0.06	0.64
<i>Hancornia speciosa</i>	4.0	0.18	2.00	0.20	0.01	0.15	0.54
<i>Mimosa albolanata</i> cf. <i>var. brasiliiana</i>	4.0	0.18	2.00	0.20	0.01	0.11	0.49
<i>Tabebuia roseoalba</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.01	0.14	0.43
<i>Rourea induta</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.02	0.31
<i>Psidium</i> sp	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.02	0.31
<i>Solanum lycocarpum</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.02	0.31
<i>Vochysia elliptica</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.02	0.31
<i>Platypodium elegans</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.02	0.31
<i>Caryocar brasiliense</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.02	0.31
<i>Tibouchina aegopogon</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.00	0.30
<i>Deianira</i> cf. <i>chiquitana</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.00	0.29
<i>Ouratea hexasperma</i>	2.0	0.09	2.00	0.20	0.00	0.00	0.29

As espécies de plantas vivas com maior Índice de Valor de Importância (IVI) foram *Vellozia seubertiana*, *Syagrus comosa*, *Piptocarpha rotundifolia*, *Dimorphandra mollis*, *Byrsonima subterranea*, *Connarus suberosus*, *Ouratea spectabilis*, *Byrsonima coccobolifolia*, *Erythroxylum suberosum*, *Davilla elliptica*, (Tabela 4.13), com maiores densidade, frequência e dominância relativas (Figura 4.43).

Vellozia seubertiana também teve maior densidade dentre a população de plantas mortas com (347,6 indivíduos.ha⁻¹), maior dominância (1,15 m².ha⁻¹) e IVI (228,03%). Já as outras mortas tiveram 76,2 plantas.ha⁻¹; 0,25 m².ha⁻¹; 71,97% para densidade, dominância e IVI, respectivamente. Os galhos mortos das plantas vivas representam 23,3% do total de dominância morta. As espécies vivas que tiveram maiores biomassas de galhos mortos foram *Connarus suberosus* (0.08 m².ha⁻¹), *Dimorphandra mollis* (0,06 m².ha⁻¹), *Vellozia seubertiana* (0.04 m².ha⁻¹), *Manihot sparsifolia* (0.03 m².ha⁻¹), *Anacardium humile*, *Piptocarpha rotundifolia* (0.02 m².ha⁻¹), *Davilla elliptica*, *Kielmeyera coriacea* e *Hymenaea stigonocarpa* (0.01 m².ha⁻¹).

Figura 4.43 – Distribuição das espécies com índice de valor de importância (IVI) acima de 7%, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Em termos de áreas geográficas, a comunidade de plantas da área 1 teve mais famílias, gêneros e espécies, enquanto que a área 5 apresentou os menores números (Tabela 4.14). A área 1 também apresentou maiores densidade e dominância, porém, o menor diâmetro (média) devido à grande densidade de plantas, principalmente de *Vellozia seubertiana* (1.180,0 indivíduos.ha⁻¹) e *Syagrus comosa* (1.080,0 indivíduos.ha⁻¹). Os campos com vegetação mais desenvolvida foram os das áreas 2; 3 e 4, que também apresentaram maiores alturas (Tabela 4.15).

Tabela 4.14 – Número de famílias, gêneros e espécies, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Área	Famílias	Gêneros	Espécies
A1T	22	32	41
A2T	19	29	31
A3T	20	29	34
A4T	18	29	32
A5T	16	22	26

Tabela 4.15– Densidade absoluta (AbsDe), dominância absoluta (AbsDo), diâmetro (média) e altura (média) da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas	AbsDe (ind./ha)	AbsDo (m ² /ha)	Diâmetro (cm)	Altura (m)
A1T	4.390,0	7,595	3,848	0,89
A2T	1.340,0	4,695	5,708	1,62
A3T	1.460,0	5,29	5,173	1,18
A4T	2.230,0	6,996	5,396	1,54
A5T	1.790,0	4,329	3,939	0,93

4.2.2.3.1.2 Estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo do Campo Sujo Seco: Vertente

A vegetação do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo do Campo Sujo Seco do ribeirão Taquaruçu Grande foi composta por 26 famílias, 44 gêneros e 64 espécies. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (15) e Vochysiaceae (8), sendo que 92,3% das famílias possuem menos que cinco espécies (Figura 4.44).

Figura 4.44 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

As espécies com maior número de plantas (Figura 4.45) foram, principalmente, *Vellozia sebertiana* (412) e *Syagrus comosa* (135) e 65,6% tiveram número menor que 10 plantas (espécies que apresentaram densidade $\leq 18,0$ indivíduos.ha⁻¹, Tabela 4.16). A

densidade foi 2.354,0 indivíduos.ha⁻¹ (90% de plantas vivas e 10% de plantas mortas), a dominância 5,497 m²/ha⁻¹ (74,7% de plantas vivas e 25,3% de plantas mortas), o diâmetro (média) 4,659 cm (4,66 cm para plantas vivas e 5,18 cm para plantas mortas) e a altura (média) de 1,09 m (Tabela 4.11).

Figura 4.45 – Distribuição do número de plantas, por espécie com ≥ 10 indivíduos, no Campo Sujo Seco (vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

As espécies com maior índice de valor de importância (IVI) foram *Vellozia seubertiana*, *Syagrus comosa*, *Erythroxylum suberosum*, *Vochysia cinnamomea*, *Byrsonima coccobolifolia*, *Connarus suberosus*, *Byrsonima pachyphylla*, *Davilla elliptica*, *Ouratea spectabilis*, *Piptocarpha rotundifolia*, *Salvertia convallariodora*, (Tabela 4.16), mas, principalmente *V. seubertiana*, devido às mais altas densidade, dominância e frequência relativas (Figura 4.46).

A espécie *Vellozia seubertiana* teve maior IVI (233,3%) em relação às plantas mortas (66,7%) pelas suas maiores densidade (452,6 indivíduos.ha⁻¹) e dominância (1,48 m².ha⁻¹). As outras espécies mortas tiveram 84,2 plantas.ha⁻¹; 0,19 m².ha⁻¹ de densidade e dominância, respectivamente. No que se refere à biomassa morta de galhos, esta corresponde a 14,8% da dominância mortas e as espécies vivas com maior biomassa morta de galhos foram *V. seubertiana* (0.06 m².ha⁻¹), *Erythroxylum suberosum* (0.04 m².ha⁻¹), *Vochysia rufa* (0.03

m².ha⁻¹), *Byrsonima coccobolifolia*, *Tachigali rugosa*, *Leptolobium dasycarpum* e *Stryphnodendron adstringens* (0,02 m².ha⁻¹), *Anacardium nanum*, *Dimorphandra mollis*, *Connarus suberosus* e *Kielmeyera coriacea* (0,01 m².ha⁻¹).

Tabela 4.16 - Espécies do Campo Sujo Seco (vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI) (continua)

Espécies	AbsDe (ind./ha)	RelDe (%)	AbsFr (%)	RelFr (%)	AbsDo (m ² /ha)	RelDo (%)	IVI (%)
<i>Vellozia seubertiana</i>	824.0	35.00	90.00	9.85	2.22	40.41	85.26
<i>Syagrus comosa</i>	270.0	11.47	72.00	7.88	0.55	10.02	29.36
<i>Erythroxylum suberosum</i>	114.0	4.84	58.00	6.35	0.30	5.53	16.72
<i>Vochysia cinnamomea</i>	128.0	5.44	20.00	2.19	0.25	4.49	12.11
<i>Byrsonima coccobolifolia</i>	100.0	4.25	34.00	3.72	0.18	3.31	11.28
<i>Connarus suberosus</i>	60.0	2.55	38.00	4.16	0.19	3.38	10.08
<i>Byrsonima pachyphylla</i>	70.0	2.97	40.00	4.38	0.15	2.67	10.02
<i>Davilla elliptica</i>	52.0	2.21	34.00	3.72	0.14	2.48	8.41
<i>Ouratea spectabilis</i>	54.0	2.29	32.00	3.50	0.12	2.20	7.99
<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	44.0	1.87	32.00	3.50	0.14	2.50	7.87
<i>Salvertia convallariodora</i>	26.0	1.10	22.00	2.41	0.20	3.68	7.19
<i>Bauhinia curvula</i>	60.0	2.55	38.00	4.16	0.01	0.12	6.82
<i>Dimorphandra mollis</i>	28.0	1.19	18.00	1.97	0.08	1.42	4.58
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	22.0	0.93	20.00	2.19	0.07	1.34	4.47
<i>Anacardium humile</i>	38.0	1.61	18.00	1.97	0.04	0.74	4.33
<i>Himatanthus obovatus</i>	24.0	1.02	20.00	2.19	0.03	0.60	3.81
<i>Anacardium occidentale</i>	18.0	0.76	10.00	1.09	0.10	1.86	3.72
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	20.0	0.85	16.00	1.75	0.05	1.00	3.60
<i>Tachigali rugosa</i>	20.0	0.85	14.00	1.53	0.04	0.75	3.13
<i>Brosimum gaudichaudii</i>	14.0	0.59	12.00	1.31	0.07	1.20	3.11
<i>Byrsonima subterranea</i>	28.0	1.19	14.00	1.53	0.02	0.31	3.03
<i>Bauhinia rufa</i>	26.0	1.10	16.00	1.75	0.00	0.09	2.94
<i>Leptolobium dasycarpum</i>	18.0	0.76	14.00	1.53	0.03	0.58	2.87
<i>Annona crassiflora</i>	10.0	0.42	10.00	1.09	0.05	0.85	2.37
<i>Anacardium nanum</i>	20.0	0.85	12.00	1.31	0.01	0.20	2.37
<i>Salacia crassifolia</i>	12.0	0.51	12.00	1.31	0.03	0.52	2.34
<i>Diospyros hispida</i>	6.0	0.25	6.00	0.66	0.08	1.41	2.32
<i>Kielmeyera coriacea</i>	14.0	0.59	14.00	1.53	0.01	0.17	2.29
<i>Manihot acuminatissima</i>	16.0	0.68	14.00	1.53	0.00	0.02	2.23
<i>Bowdichia virgilioides</i>	4.0	0.17	4.00	0.44	0.08	1.42	2.03
<i>Psidium firmum</i>	10.0	0.42	10.00	1.09	0.03	0.47	1.99
<i>Vochysia cf. divergens</i>	22.0	0.93	4.00	0.44	0.03	0.57	1.95
<i>Vochysia cf. thyrsoidea</i>	12.0	0.51	10.00	1.09	0.02	0.29	1.90
<i>Tabebuia aurea</i>	10.0	0.42	10.00	1.09	0.02	0.28	1.80
<i>Qualea grandiflora</i>	10.0	0.42	10.00	1.09	0.01	0.20	1.72
<i>Casearia sylvestris</i>	12.0	0.51	10.00	1.09	0.00	0.03	1.64
<i>Manihot sparsifolia</i>	14.0	0.59	8.00	0.88	0.01	0.09	1.56
<i>Mimosa radula</i> cf. var. <i>imbricata</i>	18.0	0.76	6.00	0.66	0.00	0.04	1.46
<i>Qualea parviflora</i>	6.0	0.25	6.00	0.66	0.03	0.53	1.44
<i>Vochysia rufa</i>	8.0	0.34	8.00	0.88	0.01	0.15	1.37
<i>Schefflera macrocarpa</i>	8.0	0.34	8.00	0.88	0.01	0.14	1.36
<i>Caliandra dysantha</i>	8.0	0.34	8.00	0.88	0.00	0.01	1.23

Tabela 4.16 - Espécies do Campo Sujo Seco (vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com densidade absoluta (AbsDe); densidade relativa (RelDe); frequência absoluta (AbsFr); frequência relativa (RelFr); dominância absoluta (AbsDo); dominância relativa (RelDo); em ordem decrescente de índice de valor de importância (IVI) (conclusão)

Espécies	AbsDe (ind./ha)	RelDe (%)	AbsFr (%)	RelFr (%)	AbsDo (m ² /ha)	RelDo (%)	IVI (%)
<i>Senna velutina</i>	8.0	0.34	8.00	0.88	0.00	0.01	1.23
<i>Myrcia splendens</i>	8.0	0.34	8.00	0.88	0.00	0.01	1.23
<i>Mimosa albolanata</i> cf. <i>var. brasiliana</i>	10.0	0.42	2.00	0.22	0.02	0.40	1.05
<i>Rourea induta</i>	6.0	0.25	4.00	0.44	0.01	0.10	0.79
<i>Ouratea hexasperma</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.03	0.47	0.78
<i>Curatella americana</i>	6.0	0.25	4.00	0.44	0.00	0.05	0.74
<i>Annona coriacea</i>	4.0	0.17	4.00	0.44	0.01	0.10	0.70
<i>Agonandra brasiliensis</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.01	0.17	0.47
<i>Erythroxylum tortuosum</i>	4.0	0.17	2.00	0.22	0.00	0.06	0.45
<i>Dipteryx alata</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.01	0.13	0.44
<i>Andira humilis</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.01	0.12	0.42
<i>Palicourea rigida</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.01	0.10	0.41
<i>Ananas ananassoides</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.07	0.38
<i>Zeyhera tuberculosa</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.07	0.37
<i>Vochysia tucanorum</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.04	0.34
<i>Kielmeyera lanthrophyton</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.01	0.32
<i>Chamaecrista orbiculata</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.01	0.31
<i>Tibouchina aegopogon</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.00	0.31
<i>Miconia albicans</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.00	0.31
<i>Platonia insignis</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.00	0.31
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.00	0.31
<i>Hancornia speciosa</i>	2.0	0.08	2.00	0.22	0.00	0.00	0.31

Figura 4.46 – Distribuição das espécies com índice de valor de importância (IVI) acima de 7, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco (A1V; A2V; A3V; A4V; A5V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Comparando-se as áreas de amostragem (A1V; A2V; A3V; A4V; A5V), houve uma variação em número de famílias, gêneros e espécies entre as áreas. A comunidade de plantas da área 2 teve mais famílias e espécies, enquanto que a área 3 teve mais gêneros e a área 1 teve menos famílias (Tabela 4.17). A área 1 também apresentou maiores densidades, já a maior dominância ficou com a área 2. Houve menor amplitude de variação dos diâmetros (média) entre as áreas na vertente que no topo, porém, as áreas 2 e 4 apresentaram-se com vegetação mais desenvolvida em diâmetro de caule e altura. O menor diâmetro (média) ficou com a área 1 (Tabela 4.18), devido à grande densidade de *Vellozia seubertianan* (2.350,0 indivíduos.ha⁻¹).

Tabela 4.17 – Número de famílias, gêneros e espécies, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Área	Famílias	Gêneros	Espécies
A1V	16	24	28
A2V	22	28	34
A3V	19	29	34
A4V	19	21	25
A5V	17	22	29

Tabela 4.18 – Densidade absoluta (AbsDe), dominância absoluta (AbsDo), diâmetro (média) e altura (média) da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, por área, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Área	AbsDe	AbsDo	Diâmetro (média)	Altura (média)
A1V	4.140,0	6,51	4,07	0,98
A2V	2.080,0	7,05	5,53	1,40
A3V	2.400,0	4,67	4,43	0,88
A4V	1.800,0	5,76	5,71	1,25
A5V	1.350,0	3,27	4,12	1,05

4.2.2.3.2 Estrato herbáceo-subarbustivo do Campo Sujo Seco

Uma característica dos Campos Sujos Secos é a expressiva presença do estrato herbáceo-subarbustivo. Na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, 36,4% do total de 121 de espécies das comunidades de plantas ocorrentes no Campo Sujo Seco são deste estrato.

As famílias com maior número de espécies foram Poaceae, Fabaceae e Cyperaceae (Figura 4.47). As espécies que tiveram maiores coberturas de solo foram Indeterminada 5, *Rhynchospora brasiliensis*, *Axonopus brasiliensis*, *Bulbostylis pradoxa*, Indeterminada 2, Indeterminada 4 e Indeterminada 6 (Tabela 4.19). Tanto no topo quanto na vertente, ocorreram altos índices de solo exposto com dados semelhantes entre os dois tipos de relevo (22,6% na vertente e 21,1% no topo).

Figura 4.47 – Distribuição do número de espécies, por famílias do estrato herbáceo-subarborescente, da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Tabela 4.19 - Espécies do Campo Sujo Seco (topo e vertente), do estrato herbáceo-subarbusivo, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), em ordem alfabética, com respectivos índices de cobertura do solo

Espécies	Topo (%)	Vertente (%)
<i>Amasonia campestris</i>	0,5	0
<i>Aspilia foliacea</i>	0,4	0
<i>Aspilia leucoglossa</i>	0,3	0
<i>Axonopus brasiliensis</i>	13,64	13,67
<i>Borreria eryngioides</i>	0	0,1
<i>Bulbostylis pradoxa</i>	5,5	11,16
Indeterminada 5	28,32	22,64
Indeterminada 2	3,36	3,2
Indeterminada 3	0,6	1,7
Indeterminada 6	1,5	3,4
Indeterminada 7	0	0,18
Indeterminada 8	1,4	1,8
Indeterminada 10	0,2	0,06
Indeterminada 1	1,22	2,3
Indeterminada 4	0,4	6,14
Indeterminada 9	0,2	0,12
<i>Capsema scarlatium</i>	0,42	0,46
<i>Casselia</i> sp.	0,1	0
<i>Centrosema virginianum</i>	0,24	0
<i>Chamaecrista diphylla</i>	0,04	0
<i>Chamaecrista serpens</i>	0,3	0,22
<i>Clitoria guianensis</i>	0,2	0,08
<i>Crotalaria unifoliolata</i>	0,34	0,3
<i>Diplusodon microphyllus</i>	0,18	0
<i>Diplusodon sessiliflorus</i>	0,22	0
<i>Eleocharis</i> sp.	0,92	0,38
<i>Croton goyazensis</i>	1,02	1,4
<i>Fimbristylis</i> sp.	0,06	0,18
<i>Hyptis peduncularis</i>	0,08	0
<i>Ipomoea procumbens</i>	0,9	0,14
<i>Lippia florida</i>	0	0,06
<i>Merremia flagellaris</i>	0,06	0,27
<i>Merremia tomentosa</i>	0	0,22
<i>Mitracarpus frigidus</i>	0,16	0,32
<i>Oxalis densifolia</i>	0,38	0,04
<i>Panicum maximum</i>	0	0,8
<i>Peltaea edouardii</i>	0,02	0,1
<i>Peltodon tomentosus</i>	0	0,06
<i>Rhynchospora brasiliensis</i>	14,34	5,16
<i>Rhynchospora consanguinea</i>	0,26	0,1
<i>Trimezia juncifolia</i>	0,04	0,1
<i>Lessigianthus obtusatus</i>	0,24	0
<i>Vigna firmula</i>	0,3	0,22
<i>Vigna speciosa</i>	0,32	0,26

Em se tratando da cobertura do solo por área geográfica, considerando o relevo de topo, *Rhynchospora brasiliensis* teve ampla ocorrência na área 3 (A3T), Indeterminada 5 nas áreas 2 e 5 (A2T; A5T) e *Axonopus brasiliensis* na área 4 (A4T) (Figura 4.48).

Figura 4.48 – Índice de cobertura do solo das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo do Campo Sujo Seco, por áreas do topo (A1T; A2T; A3T; A4T; A5T), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

No relevo de vertente, também *Rhynchospora brasiliensis* teve ocorrência na área 3 (A3V), menos expressiva que no topo, Indeterminada 5 manteve ampla ocorrência nas áreas 2 e 5 (A2V; A5V) assim com *Axonopus brasiliensis* na área 4 (A4T) e *Bulbostylis paradoxa* teve mais expressiva ocorrência em todas as áreas que no topo (Figura 4.49).

Figura 4.49 – Índice de cobertura do solo das espécies do estrato herbáceo-subarbusivo do Campo Sujo Seco, por áreas da vertente (A1V; A2V; A3V; A4V; A5V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

4.2.2.3.3 Diversidade e similaridade florística do Campo Sujo Seco

4.2.2.3.3.1 Índice de Diversidade de Shannon-Wiener

A diversidade da comunidade do Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, pelo índice de diversidade de Shannon-Wiener foi $H' = 3,065$ nats.indivíduo⁻¹ e o índice de uniformidade de equitabilidade ou uniformidade de Pielou foi $J' = 0,706$, calculados para todo o bosque sem vegetação herbáceo-subarbastiva. Com a vegetação herbáceo-subarbastiva, o índice de Shannon-Wiener foi $H' = 3,533$ nats.indivíduo⁻¹ e a equitabilidade de Pielou, $J' = 0,737$. Em se tratando de áreas de amostragem, as maiores diversidades de espécies, foram da área 3 (topo) e da área 5 (vertente), ambas apresentaram as maiores equitabilidades em relação às demais áreas (Tabela 4.20).

Tabela 4.20 – Diversidade de espécies pelo índice de Shannon-Wiener (H') e equitabilidade de Pielou (J'), em relevo de topo (A1T; A2T; A3T; A4T; A5T), e Vertente (A1V; A2V; A3V; A4V; A5V), da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Áreas	Topo H'	J'	Áreas	Vertente H'	J'
A1T	2,66	0,72	A1V	1,84	0,55
A2T	2,94	0,86	A2V	2,75	0,78
A3T	3,05	0,87	A3V	2,64	0,75
A4T	2,57	0,74	A4V	1,95	0,61
A5T	2,39	0,73	A5V	2,95	0,88

O valor de $H' = 3,533$ nats.indivíduo⁻¹ para o Campo Sujo estudado é um valor considerado alto, geralmente acima dos valores registrados para Campos Sujos, estando mais semelhante ao Campo Sujo da Estação Ecológica Pirapitinga (MG) e na faixa de cerrado *stricto sensu* (Tabela 4.21). Felfili et al. (1992) consideram altos os valores do índice de Shannon-Wiener acima de 3,0 nats.indivíduo⁻¹, indicando cerrados bem preservados. Segundo Felfili e Felfili (2001), no Cerrado *Stricto Sensu*, a diversidade alfa, está na faixa de 3,0 a 3,5 nats/indivíduo, sendo portanto, elevada.

Quanto à equitabilidade, que mede a uniformidade de distribuição dos indivíduos nas espécies, o valor de $J' = 0,737$, indica certa desigualdade na distribuição do número de indivíduos nas espécies. Como se pôde constatar, as espécies *Vellozia seubertiana*, principalmente, *Syagrus comosa*, *Erythroxylum suberosum*, *Byrsonima subterranea* e *Vochysia cinnamomea* ocorreram em grandes densidades (Tabela 4.10), enquanto que 18,2%

das espécies lenhosas foram representadas por apenas um indivíduo. Segundo Felfili e Felfli (2001), em ambientes tropicais, o número de espécies é elevado e a distribuição desigual, ou seja, com poucas espécies contendo muitos indivíduos e um grande número de espécies com um número reduzido de indivíduos. Neste último caso podem ser consideradas raras localmente.

Tabela 4.21 - Índices de diversidade de Shannon (H') nats.indivíduo⁻¹ e equitabilidade de Pielou (J') em diversas fitofisionomias no Campo Sujo e no Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Localidade	H'	J'	Fitofisionomia	Fonte
Bacia do Taquaruçu Grande, Palmas (TO)	3,50	0,74	Campo Sujo	Este trabalho
Fazenda Água Limpa (DF)	3,20	-	Campo Sujo	Munhoz e Felfili (2006)
E. E. Panga (MG)	3,00	0,80	Campo Sujo	Moreno et al. (2008)
Silvânia (GO)	2,92	0,87	Campo Sujo	Araújo et al. (2012)
E. E. Pirapitinga (MG)	3,43	0,85	Campo Sujo	Giácomo et al. (2013)
E. E. Águas Emendadas (DF)	3,62	-	Cerrado SS*	Felfili et al. (1992)
A.P.A. Gama Cabeça de Veado (DF)	3,56	-	Cerrado SS	Felfili et al. (1992)
Parque Nacional de Brasília (DF)	3,34	-	Cerrado SS	Felfili et al. (1992)
Fazenda Água Limpa (DF)	3,42	-	Cerrado SS	Felfili e Silva-Júnior (1992)
PEN	3,24	-	Cerrado SS	Rossi et al. (1998)
Abaeté (MG)	3,59	0,80	Cerrado SS	Saporetti et al. (2003)
Pé-de-Gigante (SP)	3,62	0,84	Cerrado SS	Fidelis e Godoy (2003)
Silvânia (GO)	3,48	-	Cerrado SS	Araújo. Et al. (2012)
Patrocínio (MG)	3,53	-	Cerradão	Felfili et al. (1992)
APA (DF)	3,17	-	Cerradão	Felfili et al. (1994)
Silvânia (GO)	3,31	-	Cerrado SS/Cerradão	Felfili et al. (1992)
AÇUD	4,25	-	Mata de Galeria	Sampaio et al. (1997)
Paracatu (MG)	3,11	-	-	Felfili et al. (1992)

*Cerrado SS = Cerrado *Stricto Sensu*

4.2.2.3.3.2 Análise de Agrupamento

A análise de agrupamento da comunidade de plantas do Campo Sujo Seco utilizando o método UPGMA (*Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Averages*), pelo coeficiente de semelhança de Jaccard, teve Correlação Cofenética significativa, com valor de 0.876. Esta análise indicou a existência de grupos florísticos individualizados, onde as comunidades da área 1 (topo) com área 1 (vertente) apresentaram maior similaridade florística entre si, seguidas pela área 5 (vertente) com área 5 (topo) e área 3 (vertente) com área 3 (topo). A Área 2 (vertente) apresentou-se mais similar ao grupo da área 3, enquanto que as áreas 2 (topo) e área 4 (topo e vertente) foram as mais diferentes. Portanto, a um corte de 46% (metade entre a menor e a maior similaridade), tem-se a composição de seis grupos florísticos individualizados (Figura 4.50).

Figura 4.50 - Dendrograma de similaridade de Jaccard das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, em cinco áreas de relevo de topo (T) e vertente (V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO), com ligação dos grupos pela média não ponderada (UPGMA)

O Grupo 1 (Figura 4.50) foi formado pelas comunidades de plantas do Campo Sujo Seco da área 3 (topo e vertente) com a área 2 (vertente). Na área 3, as espécies com maior número de ocorrência foram *Vochysia cinnamomea*, *Byrsonima coccobolifolia* e *Vellozia seubertiana* (Figura 4.51). A área 2 (vertente) apresentou maior similaridade florística com a área 3 que, com nível de corte de 46%, formaram um único grupo.

As espécies que contribuíram para essa similaridade foram *Vellozia seubertiana*, *Connarus suberosus*, *Piptocarpha rotundifolia*, *Dimorphanthra mollis*, *Bauhinia rufa*, *Myrcia*

splendens, *Davilla elliptica*, *Byrsonima verbascifolia*, *Qualea grandiflora*, *Erythroxylum suberosum*, *Ouratea spectabilis*, *Anacardium occidentale*, *Byrsonima pachyphylla*, *Syagrus comosa*, *Himatanthus obovatus*, *Bulbostylis paradoxa*, *Rhynchosphora brasiliensis*, Indeterminada 2, Indeterminada 4, Indeterminada 5 e Indeterminada 6; pela expressiva presença de *V. cinnamomea* na área 3, sobretudo na Vertente, esses são Campos Sujos Secos de *V. cinnamomea* (Figuar 4.52).

Figura 4.51 – Grupo 1 (área 3 - topo e vertente), por número de indivíduos das espécies, das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.52 – Grupo 1 (área 3 - vertente), com *Vochysia cinnamomea*, em Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T.C.C. Medeiros (2012)

O Grupo 2 (Figura 4.50), formado pelas comunidades de plantas dos Campos Sujos Secos da área 1 (topo e vertente), foi o que apresentou maior similaridade florística entre as comunidades de topo e vertente, 56% e as espécies que tiveram maior número de plantas nesta similaridade florística foram *Vellozia seubertiana* e *Syagrus comosa* (Figura 4.53), podendo ser caracterizado como Campos Sujos Secos de *Vellozia* pela sua expressiva ocorrência (Figura 4.54).

Figura 4.53 – Grupo 2 (área 1 - topo e Vertente), por número de espécies, das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.54 – Grupo 2 (área 1- topo), com *Vellozia seubertiana*, em Campo Sujo, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T.C.C. Medeiros (2012)

O Grupo 3 (Figura 4.50), composto pelas comunidades de plantas dos Campos Sujos Secos da área 5, apresentou uma similaridade de 58% entre as comunidades de topo e Vertente, sendo o segundo em maior similaridade. As principais espécies comuns entre topo e Vertente, em número de plantas, foram *Byrsonima subterranea*, *Vellozia seubertiana*, *Vochysia thyrsoidea*, *Davila elliptica* e *Erythroxylum suberosum* (Figura 4.55). Pela expressiva ocorrência de *Byrsonima subterranea*, foram denominados de Campos Sujos Secos de *Byrsonima subterranea* (Figura 4.56).

Figura 4.55 – Grupo 3 (área 5 - topo e Vertente), por número de espécies, das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.56 – Grupo 3 (área 5 - topo), com *Byrsonima subterranea*, em Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T.C.C. Medeiros (2012)

O Grupo 4 (Figura 4.50), formado pelas comunidades de plantas do Campo Sujo Seco da área 2 (topo), diferenciou-se dos demais, principalmente, pelas espécies *Vochysia* cf. *thyrsoidea*, *Aspilia foliacea*, *A. leucoglossa* e *Eleocharis* sp., sendo as três últimas do estrato herbáceo, que ocorreram apenas nessa área. Visualmente, apresenta-se como Campo Sujo Seco misto por não haver uma única espécie arbustiva de maior destaque em número de plantas, mas *Syagrus comosa*, *Vellozia seubertiana*, *Erythroxylum suberosum*, *Ouratea spectabilis*, *Piptocarpha rotundifolia* e *Dimorphandra mollis*, dentre outras espécies, ocorreram com elevado e variado número de plantas (Figuras 4.57 e 4.58).

Figura 4.57 – Grupo 4 (área 2 - topo), por número de plantas das comunidades do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.58 – Grupo 4 (área 2 - topo), com *V. seubertiana*, *S. comosa* e outras espécies, em Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T.C.C. Medeiros (2012)

Os Grupos 5 e 6 (Figura 4.50) foram formados pelas comunidades de plantas da área 4. Esta área apresentou baixa similaridade florística entre as comunidades de topo e vertente. As espécies que compuseram essa similaridade foram, sobretudo, *Vellozia seubertiana* e *Suyagrus comosa* com maior número de plantas. Ao nível de corte de 46%, a área 4 (topo) diferenciou-se da área 4 (vertente), formando cada uma delas um grupo florístico diferente (Figuras 4.59 e 4.60).

Figura 4.59 – Grupos 5 (área 4 - topo) por número de plantas da comunidade do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.60 – Grupos 6 (área 5 - vertente), por número de plantas da comunidades do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

As espécies que levaram a essa diferenciação florística entre topo e vertente na área 4 foram: *Annona crassiflora*, *Andira humilis*, *Byrsonima coccobolifolia*, *Dimorphandra mollis*, *Eriotheca pubescens*, *Hancornia speciosa*, *Himatanthus obovatus*, *Hymenaea stigonocarpa*, *Leptolobium dasycarpum*, *Mimosa radula* cf. var. *imbricata*, *Qualea grandiflora*, *Rourea induta*, *Stryphnodendron adstringens*, *Vochysia tucanorum* e *Zeyera tuberculosa*, *Amasonia campestris*, *Oxalis densifolia*, *Chamaecrista serpens*, *Crotalaria unifoliata*, *Diphusodon microphyllus*, *D. sessiliflorus* e *Rhynchospora consanguinea*, ocorreram só no topo. Ao passo *Bauhinia rufa*, *Brosimum gaudichaudii*, *Dipteryx alata*, *Salvertia convallariodora* e *Schefflera macrocarpa* ocorreram só na vertente. Estes também são Campos Sujos Secos de *Vellozia seubertiana* pela abundância dessa espécie (Figura 4.61).

Figura 4.61 – Grupos 5 (A - topo) e Grupo 6 (B - vertente) representados pela área 4, com *Vellozia seubertiana*, em Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO). Fotografia: T.C.C. Medeiros (2012)

Os Campos Sujos Secos de *Vellozia* têm distribuição espacial ampla na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande e os campos estudados, com predominância de *Vellozia seubertiana*, situam-se na área central da serra do Lageado. Os Campos Sujos Secos de *Vochysia cinnamomea* situam-se na área sul da mesma serra e os Campos Sujos Secos de *Byrsonima subterranea* localizam-se no extremo norte. Espacialmente, os Campos Sujos Secos, ocupam os topos dos morros, como se constituíssem ilhas isoladas pelos sistemas de matas de galeria e matas secas. A espécie *B. subterranea* parece ter ocorrência exclusiva nos Campos Sujos Secos do extremo norte da bacia.

4.2.2.3.3.2.1 Método Twinspan

A análise florística pelo método Twinspan (*Two-Way Indicator Species Analysis*) também mostrou a existência de diferenças florísticas das comunidades de plantas, no Campo Sujo estudado, pela individualização de vários grupos, cujos resultados apresentaram semelhanças com a análise do índice de Jaccard pelo método UPGMA, muito embora nesta análise não tenham sido incluídas as espécies do estrato herbáceo-subarbustivo, nem as do estrato arbustivo-arbóreo com altura inferior a 0,4 m e diâmetro menor que 3,0 cm, uma vez que o método Twinspan é muito sensível às características estruturais. Ao final da análise, foi formado um total de 12 grupos florísticos (Figura 4.62).

Por ser o Twinspan um método divisivo, a primeira divisão foi feita com todo o conjunto de parcelas ($N = 100$). Foram individualizados dois subgrupos, onde parcelas da área 3 (topo e vertente) formaram um subgrupo separado das demais parcelas que compuseram um subgrupo maior com espécies preferenciais e não preferenciais (Quadro 4.5); a espécie *Vochylia cinnamomea* foi a espécie indicadora na divisão desses dois subgrupos (Figura 4.62).

Figura 4.62 - Dendrograma da classificação Twinspan (até o 4º nível de divisão) das comunidades de plantas do campo sujo seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Quadro 4.5 – Espécies preferenciais e não preferenciais das divisões estabelecidas pelo método Twinspan, das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

	Divisão 1	Divisão 2	Divisão 3	Divisão 4
	<i>S. comosa</i> <i>D. mollis</i> <i>P. rotundifolia</i> <i>S. adstringens</i> <i>D. elliptica</i> <i>L. dasycarpum</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>S. convallariodora</i> <i>V. cinnamomea</i> <i>T. rugosa</i>	<i>P. firmum</i> <i>A. occidentale</i> <i>S. convallariodora</i> <i>B. subterranea</i> <i>V. cf. thyrsioidea</i> <i>V. seubertiana</i> <i>O. spectabilis</i> <i>S. adstringens</i> <i>D. elliptica</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>B. verbascifolia</i>	<i>V. seubertiana</i> <i>O. spectabilis</i> <i>C. suberosus</i> <i>E. suberosum</i> <i>B. verbascifolia</i> <i>T. rugosa</i> <i>V. rufa</i> <i>P. firmum</i> <i>M. splendens</i> <i>S. convallariodora</i> <i>K. coriacea</i> <i>M. albolanata</i>	<i>O. spectabilis</i> <i>P. rotundifolia</i> <i>D. elliptica</i> <i>Q. grandiflora</i> <i>S. convallariodora</i> <i>D. alata</i> <i>V. seubertiana</i> <i>A. humile</i> <i>A. occidentale</i> <i>C. suberosus</i>
Não preferenciais	<i>V. seubertiana</i> <i>O. spectabilis</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>C. suberosus</i> <i>E. suberosus</i> <i>B. verbascifolia</i>	<i>S. comosa</i> <i>A. humile</i> <i>D. mollis</i> <i>P. rotundifolia</i> <i>C. suberosus</i> <i>E. suberosus</i>	<i>B. pachyphylla</i> <i>L. dasycarpum</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>V. cinnamomea</i>	<i>D. mollis</i> <i>P. firmum</i> <i>E. suberosum</i> <i>V. cf. thyrsioidea</i>
	Divisão 5	Divisão 6	Divisão 9	Divisão 10
	<i>A. humile</i> <i>B. gaudichaudii</i> <i>S. macrocarpa</i> <i>S. comosa</i> <i>O. spectabilis</i> <i>P. rotundifolia</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>E. suberosum</i> <i>B. verbascifolia</i>	<i>E. suberosus</i> <i>S. convallariodora</i> <i>T. rugosa</i> <i>V. rufa</i> <i>R. induta</i> <i>V. cf. divergens</i> <i>D. elliptica</i> <i>C. suberosum</i> <i>B. verbascifolia</i>	<i>A. humile</i> <i>D. mollis</i> <i>A. nanum</i> <i>P. firmum</i> <i>A. crassiflora</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>C. suberosum</i> <i>E. suberosum</i> <i>V. rufa</i> <i>C. suberosum</i>	<i>D. mollis</i> <i>A. nanum</i> <i>S. adstringens</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>S. comosa</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>H. obovatus</i> <i>B. gaudichaudii</i> <i>V. cf. thyrsioidea</i>
Não preferenciais	<i>V. seubertiana</i> <i>D. mollis</i> <i>S. adstringens</i> <i>D. elliptica</i> <i>C. suberosus</i> <i>B. coccobolifolia</i>	<i>V. seubertiana</i> <i>O. spectabilis</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>L. dasycarpum</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>V. cinnamomea</i>	<i>V. seubertiana</i> <i>S. comosa</i> <i>A. occidentale</i> <i>B. subterranea</i> <i>V. cf. thyrsioidea</i>	<i>V. seubertiana</i> <i>A. humile</i> <i>D. elliptica</i> <i>C. suberosum</i> <i>S. macrocarpa</i>
	Divisão 11	Divisão 12	Divisão 13	
	<i>S. adstringens</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>B. verbascifolia</i> <i>O. spectabilis</i> <i>D. elliptica</i> <i>B. coccobolifolia</i>	<i>S. comosa</i> <i>P. firmum</i> <i>A. occidentale</i> <i>O. spectabilis</i> <i>P. rotundifolia</i> <i>V. rufa</i> <i>R. induta</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>L. dasycarpum</i> <i>S. convallariodora</i> <i>T. rugosa</i> <i>V. cf. divergens</i>	<i>O. spectabilis</i> <i>D. elliptica</i> <i>B. pachyphylla</i> <i>B. verbascifolia</i> <i>L. dasycarpum</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>M. splendens</i> <i>T. rugosa</i>	
Não preferenciais	<i>V. seubertiana</i> <i>S. comosa</i> <i>D. mollis</i> <i>P. rotundifolia</i> <i>C. suberosum</i> <i>E. suberosus</i>	<i>V. seubertiana</i> <i>E. suberosus</i> <i>B. coccobolifolia</i> <i>V. cinnamomea</i>	<i>V. seubertiana</i> <i>C. suberosum</i> <i>V. cinnamomea</i>	

A divisão 2 (N = 84), parcelas da área 5 (topo e vertente) foram individualizadas das demais, formando um subgrupo. As espécies indicadoras foram *Byrsonima subterranea*, *Vochysia cf. thyrsoidea*, *Psidium firmum*, *Salvertia convallariodora*, *Anacardium occidentale* e *Vellozia seubertiana* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

Na divisão 3 (N = 16), parcelas da área 3 (Vertente e topo) foram separadas, mostrando que dentro dessa área há padrões florísticos também distintos. A espécie indicadora foi *Vellozia seubertiana* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

Na divisão 4 (N = 9), parcelas da área 5 formaram subgrupos diferentes e a espécie indicadora foi *Salvertia convallariodora*, significando diferenças entre topo e Vertente (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

A divisão 5 (N = 75) apresentou autovalor abaixo ($\lambda = 0,235$). As espécies indicadoras foram *Schefflera macrocarpa*, *Syagrus comosa*, *Erythroxylum suberosum* e *Byrsonima verbascifolia* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

A divisão 6 (N = 14) novamente mostrou diferenças florísticas dentro da área 3 (topo e vertente). As espécies indicadoras foram *Erythroxylum suberosum*, *Tachigali rugosa* e *Connarus suberosus* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

As divisões 7 e 8 falharam.

A divisão 9 (N = 5) também foi referente à área 5, na qual a espécie *Connarus suberosus* foi a espécie indicadora (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

A divisão 10 (N = 16) foi mais ampla que as demais pelo fato dos subgrupos formados serem compostos por parcelas da área 1 (topo e vertente), área 2 (topo e vertente), área 4 (topo e vertente) e algumas parcelas da área 5 (topo). As espécies indicadoras foram *Brosimum gaudichaudii*, *Stryphnodendron adstringens*, *Byrsonima pachyphylla* e *Vochysia thyrsoidea* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

A divisão 11 (N = 59) também apresentou autovalor baixo ($\lambda = 0,230$) e as espécies indicadoras foram *Davilla elliptica*, *Stryphnodendron adstringens*, *Byrsonima verbascifolia*, *Byrsonima pachyphylla*, *Ouratea spectabilis* e *Dimorphandra mollis* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62). Assim como a divisão 10, foi bem ampla por agrupar parcelas de todas as áreas (área 1, topo e Vertente; área 2, topo e Vertente; área 3, topo; área 4, topo e Vertente; e área 5, topo e Vertente).

A divisão 12 (N = 7) foi representada pelas parcelas da área 3 (topo e vertente), onde a

espécie indicadora foi *Ouratea spectabilis* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

A divisão 13 (N = 7) consta de parcelas da área 3 (topo e vertente) com área 4 (topo), cuja espécie indicadora foi *Myrcia splendens* (espécies preferenciais e não preferenciais no Quadro 4.5; Figura 4.62).

Dos 12 grupos formados (Figura 4.62), os grupos 1; 2 e 3 tiveram como indicadora principal a espécie *Byrsonima subterranea*, representando as parcelas da área 5 (topo e vertente). Assim, os campos sujo secos da área 5 são campos de *B. subterranea*. Esta espécie caracteriza-se por ocorrer nos cerrados e campos rupestres (MAMEDE, 1993) e também tem ocorrência em campos com murundus (MARION et al., 2012). Apresenta estômatos em ambas as faces das folhas (GIULIETTI, 1971), característica que parece ser mais comum em plantas de regiões secas e bastante frequente em espécies típicas do Cerrado (MAMEDE, 1993).

Na área de estudo, *B. subterranea* foi indicadora de solos com mais altos teores de areia, embora os solos estudados sejam de textura média; os solos da área 5 apresentaram maiores percentuais de areia em relação aos demais e estiveram entre os mais secos. Outras características destes solos foram os baixos teores de matéria orgânica, mais baixa saturação de bases (V%) e capacidade de troca catiônica (C.T.C.), alta saturação de alumínio e a espécie foi preferencial de topo. Parece ser uma espécie de ocorrência restrita no Cerrado e foi considerada presumivelmente extinta no estado de São Paulo (SMA-SP, 1998).

As outras espécies que, juntamente com *Byrsonima subterranea* formaram os grupos florísticos 1; 2 e 3 (Figura 4.62) foram:

- *Vochysia* cf. *thyrsoidea*, planta perenifólia, heliófita, seletiva xerófito, característica exclusiva dos cerrados e campos cerrados de altitude. Ocorre preferencialmente em terrenos secos e pedregosos de Vertente (LORENZI, 2002); é uma espécie tombada pelo Decreto nº 14.783/93, do Distrito Federal;
- *Psidium firmum*, arbusto de ocorrência no Cerrado Sentido Restrito e em Campo Sujo (FRAZON, et al., 2009);
- *Salvertia convallariodora*, planta decídua, heliófila, seletiva xerófito, característica dos cerrados. Ocorre preferencialmente em terrenos altos de solos bem drenados, tanto nas formações primárias como secundárias (LORENZI, 2008);
- *Anacardium occidentale*, planta de porte arbóreo (SILVA et al., 2001), apresenta uma distribuição restrita, com maior presença no cerrado e menor no cerradão, ocorrendo

principalmente em Neossolos Litólicos, e ou em solos com concreções ou cascalho (SOUZA et al., 2010);

- *Connarus suberosus*, planta decídua, heliófila, seletiva xerófita, secundária, característica exclusiva dos cerrados e campos cerrados secos do Brasil Central. Ocorre preferencialmente em formações pioneiras e secundárias abertas de locais acima de 700 m de altitude, em terrenos arenosos de baixa fertilidade e bem drenados (LORENZI, 2002).

Os grupos 4; 5; 6 e 7 (Figura 4.62), cuja indicadora principal foi a espécie *Vellozia seubertiana*, são representados pelas parcelas da área 1 (topo e vertente), área 2 (topo e vertente) e área 4 (topo e vertente), principalmente; constituem os campos de *Vellozia seubertiana* (Figura 4.62). É importante destacar que as áreas 2 e 4 apresentaram uma flora herbácea-subarbusciva bem peculiar, somente registrada nessas localidades, que não fez parte da análise pelo Twinspan por suas características estruturais, o que fez esta análise agrupá-las com a área 1, pois excluindo essas espécies não lenhosas e pouco desenvolvidas, essas áreas têm em comum a ampla ocorrência de *V. seubertiana*.

A espécie *V. seubertiana* ocorre em Neossolos Litólicos e Neossolos Quartzarênicos, sendo que a maioria das espécies de Velloziaceae é rupícula e cresce em ambientes xéricos, em solos argilosos ou em fendas de rochas (AYENSU, 1973). É uma família muito citada como de ocorrência nos campos ferruginosos de Minas Gerais e na serra do Espinhaço (MELLO-SILVA, 1995; MELLO-SILVA; MENEZES, 1998; RODELA, 1998; VIANA; LOMBARDI, 2007; ATAIDE, et al., 2011). Parece ser uma espécie de ocorrência restrita no Cerrado brasileiro, sendo citada apenas para a Chapada Diamantina - BA (NEVES, 2009), Mato Grosso (Parque Estadual do Cristalino, SEMA/MT, 2009), Mato Grosso e Goiás (SMITH; AYENSU, 1976). Sobretudo na área de estudo, *V. seubertiana* foi indicadora dos solos mais ricos em ferro; também se fez mais presente nas áreas de maior altitude, e nas Vertentes com maior grau de inclinação.

As outras espécies indicadoras que ocorreram com *V. seubertiana* nos grupos 4; 5; 6 e 7 foram:

- *Schefflera macrocarpa* que é uma planta perenifólia, cuja ocorrência é citada para o Cerradão, e Cerrado Sentido Restrito (ALMEIDA et al., 1998);
- *Stryphnodendron adstringens*, planta decídua, heliófila, pioneira, seletiva xerófita, característica de formações abertas como cerrados e campos cerrados. Apresenta nítida preferência por solos arenosos e de drenagem rápida como os situados em Vertentes suaves e topos de morros. Ocorre tanto em formações primárias como secundárias (LORENZI, 2008);

- *Byrsonima coccobolifolia*, planta decídua, heliófila, seletiva xerófita secundária, característica e exclusiva dos cerrados e campos cerrados, onde tem ampla dispersão em todo o país (do Amazonas ao Paraná e Mato Grosso do Sul). Ocorre preferencialmente em terrenos elevados com solos bem drenados. É capaz de resistir ao fogo por possuir casca muito grossa e suberosa (LORENZI, 2002);
- *Byrsonima pachyphylla*, arbusto com ocorrência em borda de mata e em Campo Sujo (MEDEIROS, 2011);
- *Byrsonima verbascifolia*, planta decídua, heliófila, seletiva xerófita, característica e exclusiva dos cerrados e campos cerrados. Ocorre preferencialmente em terrenos secos e elevados de solos arenosos e pobres (LORENZI, 2002);
- *Brosimum gaudichaudii*, planta decídua, heliófila, seletiva xerófita, característica e exclusiva dos cerrados e campos cerrados, onde apresenta frequência esparsa a elevada com dispersão descontínua. É particularmente frequente nos terrenos arenosos e bem drenados (LORENZI, 2002);
- *Erythroxylum suberosum*, arvoreta de ocorrência no cerrado (*stricto sensu*), vereda, Campo Sujo, campo rupestre (*lato sensu*), savanas amazônicas, carrasco (MEDEIROS, 2011);
- *Ouratea spectabilis*, árvore ou arbusto endêmico do Cerrado, facilmente reconhecida por apresentar caule e ramos com epiderme com textura escamosa e esfoliante (SALVADOR et al., 2010);
- *Syagrus comosa*: arbusto com ocorrência em borda de Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado (ralo rupestre) e Campo Sujo (MEDEIROS, 2011); ocorre em áreas abertas do Cerrado, principalmente sobre terrenos pedregosos de até 1.200 m de altitude (LORENZI, 2004);
- *Vochysia thyrsoidea*: árvore típica do cerrado do Brasil Central, que pode chegar a 12 m de altura e é muito comum no cerrado do Distrito Federal (PAVIANI; JERONYMO, 1992).

Os grupos 8; 9; 10; 11 e 12 (Figura 4.62) representam as parcelas da área 3 (topo Vertente), onde a principal indicadora das divisões dos grupos formados foi a espécie *Vochysia cinnamomea*, caracterizando estes campos como de *V. cinnamomea* (Figura 4.62). Esta espécie é uma planta decídua, heliófila, seletiva xerófita, pioneira, característica exclusiva dos cerrados e campos cerrados. Ocorre preferencialmente em terrenos bem drenados e acima de 800 m de altitude, onde chega a formar populações puras. Em regiões muito elevadas de campos, pode se apresentar como simples arbusto de menos de 1,5 m (LORENZI, 2002). Na área de estudo, esta espécie foi indicadora de solos de textura média que tenderam a maiores percentuais de areia e altas saturações de alumínio e ocuparam áreas

principalmente de Vertente com mais baixas altitudes.

As espécies que ocorreram com *Vochysia cinnamomea* na formação dos grupos 8; 9; 10, 11 e 12 foram: *Vellozia seubertiana*; *Erythroxylum suberosum*; *Connarus suberosus*; *Myrcia splendens* e *Thachigali rugosa*. A espécie *Myrcia splendens*, perenifólia e no Brasil Central ocorre associada à matas de galeria e cerradão (SILVA-JÚNIOR; PEREIRA, 2009) e *Thachigali rugosa* é semidecídua, heliófila, seletiva xerófita, secundária, característica e exclusiva das matas semidecíduas de altitude, que corre preferencialmente em formações secundárias localizadas em altitudes superiores a 1.000 m sobre terrenos argilosos e bem drenados (LORENZI, 2002). Tendo em vista os Campos Sujos ocorrerem muitas vezes próximos a matas secas e matas de galeria, sua flora é influenciada pela flora desses ambientes com algumas plantas, apesar de poucas, ocorrendo na área campestre.

A flora das comunidades de plantas dos Campos Sujos estudados representa bem as condições edáficas neles presentes: bem drenados, ácidos, distróficos e álicos. Segundo Goodland (1971), o planalto central brasileiro, onde ocorre o cerrado, é uma região edafologicamente antiga. Os solos do planalto, entre os mais velhos do mundo, estão sendo intemperizados desde o Cretáceo, há 100 milhões de anos; são solos senis e por isso enriquecidos de alumínio.

Para Goodland (1971), como os solos do Cerrado contém muito Alumínio trocável, as plantas devem ser tolerantes a altos teores de Alumínio e várias espécies, ocorrentes no Campos Sujos de Taquaruçu, são citadas por ele como tolerantes ou acumuladoras de alumínio: *Piptocarpha rotundifolia* (Asteraceae); *Qualea grandiflora*, *Qualea parviflora*, *Vochysia rufa*, *V. thyrsoidea* (Vochysiaceae); *Palicourea rigida* (Rubiaceae); e, *Vellozia glauca* (= *Vellozia seubertiana*), Velloziaceae.

Haridasan (1982) citou como acumuladoras de alumínio, além das espécies já citadas para a família Vochysiaceae, a espécie *Vochysia elliptica* e fez referência a espécies de Melastomataceae (*Miconia ferruginata*) e a *Palicourea rigida* (Rubiaceae). As espécies acumuladoras de alumínio apresentam altos valores de IVI nas comunidades nativas em solos distróficos talvez devido a uma vantagem competitiva. Algumas acumuladoras são restritas a solos distróficos, outras são indiferentes como *Qualea grandiflora*, já as espécies *V. thyrsoidea* e *Miconia albicans* não crescem em solos calcários na ausência de alumínio (HARIDASAN, 2000).

4.2.2.3.3 Análise de Ordenação

A Análise em Coordenadas Principais (ACP) indicou a formação de dois grupos, sendo um formado pelas áreas de topo A3, A4 e A5, que teve uma forte correlação florística ($r^2 = 0,9187$), e outro grupo formado por áreas de topo e vertente, A1T, A1V, A2T, A2V, A3V, A4V E A5V, cuja correlação entre tais áreas foi baixa ($r^2 = 0,1533$), indicando haver diferenças florísticas entre elas (Figura 4.63).

Figura 4.63 – Análise em Componentes Principais (PCO) das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

As espécies comuns no grupo com alta correlação florística (A3T, A4T e A5T) foram, principalmente, *V. seubertiana*, *S. comosa* e *B. coccobolifolia*. Além da abundância dessas espécies, essas áreas tiveram afinidades florísticas específicas. Na A3T e A4T também ocorreu *B. pachyphylla*; na A3T e A5T, *V. cinnamomea*; e na A4T e A5T houve abundância de *B. subterrânea*.

A análise florística pelo método ACP teve certa concordância com a análise feita pelo método UPGMA em relação à A4, separando A4T da A4V, assim como também teve concordância com a análise pelo método Twinspan, que separou a A3T da A3V e a A5T da A5V, evidenciando a existência de grupos florísticos diferenciados entre topo e vertente em algumas áreas.

4.2.2.3.3.4 Análise de variações estruturais

O Campo Sujo Seco estudado não apresentou apenas variações florísticas, mas também variações estruturais. Quanto à distribuição espacial da densidade das plantas, observou-se que variações, podendo-se visualizar três tipos ou padrões de Campo Sujo Seco: Campo Sujo Seco denso, Campo Sujo Seco típico e Campo Sujo Seco ralo, seguindo-se a nomenclatura de Ribeiro e Walter (1998; 2008), que adotaram os termos denso, ralo e típico para demonstrar variações de cobertura arbórea das fitofisionomias do Cerrado Sentido Restrito. Quanto ao Campo Sujo, estes autores, ao estabelecerem o sistema de classificação de fitofisionomias para o Cerrado, considerando variações ambientais, distinguiram três subtipos: Campo Sujo Seco, Campo Sujo Úmido e Campo Sujo com Murundus.

Os Campos Sujos da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, são Campos Sujos Secos que, por sua vez apresentaram padrões diferenciados de densidade podendo-se classificá-los como Campos Sujos Secos Densos, Campos Sujos Secos Típicos e Campos Sujos Secos Ralos. Ressalta-se, assim, que os termos denso, ralo e típico estão sendo utilizados para demonstrar variações de densidade de plantas e não cobertura arbórea.

Os Campos Sujos Secos Ralos (Figura 4.64), foram campos com densidade ≤ 1.500 indivíduos.ha⁻¹ (parcelas 10 m x 10 m com número de plantas ≤ 15), ocorreram nos topos das áreas 2 e 3 e na área 5 (vertente); os Campos Sujos Secos Típicos foram campos com densidade ≥ 1.500 indivíduos.ha⁻¹ a ≤ 3.000 indivíduos.ha⁻¹ (parcelas 10 m x 10 m com número de plantas ≥ 15 e ≤ 30), foram os das áreas 2 e 3 (vertente), área 4 (topo e vertente) e área 5 (topo); e os Campos Sujos Secos Densos foram os campos com densidade ≥ 3.000 indivíduos.ha⁻¹ (parcelas com número de plantas ≥ 30) e foram característicos da área 1 (topo e vertente).

Tem-se, portanto, quanto à densidade, Campos Sujos Secos densos de *Vellozia seubertiana* no topo e na Vertente da área 1; Campos Sujos Secos Típicos de *V. seubertiana* e *Syagrus comosa* na Vertente da área 2; Campos Sujos Secos Típicos de *Vochysia cinnamomea* na Vertente da área 3; Campos Sujos Secos Típicos de *V. seubertiana* no topo e na vertente da área 4; Campos Sujos Secos típicos de *Byrsonima subterranea* no topo da área 5; Campos Sujos Secos Ralos de *S. comosa* com *V. seubertiana*, *Erythroxylum suberosum*, *Ouratea spectabilis* e *Piptocarpha rotundifolia* no topo da área 2; Campos Sujos Secos Ralos de *V. seubertiana* e *V. cinnamomea* no topo da área 3; e Campos Sujos Secos ralos de *E. suberosum*, *S. comosa*, *Davilla elliptica* e *B. subterranea* na vertente da área 5.

Figura 4.64 – Densidade de plantas registrada no Campo Sujo Seco, por área de topo (T) e de vertente (V), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Isto deixa evidente que o Campo Sujo tem uma diversidade fitofisionômica não apenas em relação às variações das condições ambientais já demonstrada por Ribeiro e Walter (1998; 2008), mas também em relação à florística e densidade de plantas lenhosas, formando padrões diferenciados florísticos e estruturais.

4.2.2.3.3.5 Similaridade florística com outros Campos Sujos

A similaridade florística das comunidades de plantas dos Campos Sujos Secos da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande com a de outros Campos Sujos, de acordo com o índice de Sørensen, foi baixa (Quadro 4.6).

Quadro 4.6 – Similaridade florística entre Campos Sujos de várias localidades do Cerrado e o Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Localidade	Índice de Sørensen	Fonte
Itirapina (SP)	0,18	Tannus e Assis (2004)
Fazenda Água Limpa (DF)	0,09	Munhoz e Felfili (2006)
Fazenda Água Limpa (DF)	0,12	Amaral (2008)
Estação Ecológica do Panga (MG)	0,27	Moreno et al. (2008)
Floresta Nacional de Silvania (GO)	0,15	Araújo et al. (2012)
Estação Ecológica do Pirapitinga (MG)	0,34	Giácomo et al. (2013)

O Cerrado ocupa uma grande área no Brasil Central e apresenta gradiente ambiental muito diversificado; o clima, por exemplo, exerce grande influência sobre a vegetação. Os Campos Sujos de Itirapina (SP) estão sob regime climático do tipo Cwa (clima mesotérmico), de acordo com a classificação de Köppen, com temperaturas mínimas de 17°C e máximas de

23,5°C e a uma altitude de aproximadamente 700 m (TANNUS; ASSIS, 2004).

Os Campos Sujos da Fazenda Água Limpa (DF) estão sob o regime climático Aw Megatérmico, que apresenta temperatura média anual máxima de 28,5°C e mínima de 12°C; o solo é fortemente ácido - pH 4,02, com níveis de alumínio elevados - 0,35 cmol_c/dm³ - e baixos teores de cálcio - 0,35 cmol_c/dm³, magnésio - 0,12 cmol_c/dm³ - e fósforo - 1,14 cmol_c/dm³ (MUNHOZ; FELFILI, 2006; AMARAL, 2008).

Os campos estudados por Moreno et al. (2008), em clima também Aw Megatérmico, estão em altitudes variando de 740 a 830 m e os solos onde se encontram apresentaram acidez média (pH de 5,5), Al trocável médio (0,72 cmol(+).kg⁻¹), e baixa C.T.C. Efetiva (0,13 cmol(+).kg⁻¹).

Os Campos Sujos estudados por Araújo et al. (2012), na Floresta Nacional de Silvânia (GO), são campos de clima Aw Megatérmico em altitudes médias de 900 m.

Os Campos Sujos da Estação Ecológica de Pirapitinga (MG), em clima Aw Megatérmico, estão a 570-630 m de altitude (GIÁCOMO et al., 2013).

Os Campos Sujos Secos da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande estão sob regime climático Aw Megatérmico com temperatura anual máxima foi de 33°C e a mínima de 21,1°C e a uma altitude entre 600 a 700 m e ocorrem em solos ácidos, distróficos e álicos.

Como se pôde observar, o clima e a altitude semelhantes foram fatores que contribuíram para maior afinidade entre os campos estudados e os de Pirapitinga (MG) e, em relação aos demais, em similaridade florística, muito embora outros parâmetros físico-bióticos devam ser levados em conta. A proximidade geográfica com os campos do Distrito Federal não foi um fator, por si só, que resultasse em maior similaridade florística. O Campo Sujo apresenta características peculiares de cada área, como Felfili et al. (2008) afirmaram, a resposta das espécies aos diversos fatores físicos e bióticos, assim como aos resultantes da interação entre esses fatores, evidencia que cada local tem características próprias e outras que são comuns a outros locais possíveis de serem identificadas.

4.2.2.4 Relevo e vegetação

A respeito da relação entre o relevo e a vegetação, constatou-se que, em geral, há diferenças entre topo e vertente para alguns parâmetros e índices fitossociológicos, porém não são muito expressivas (Tabela 4.22).

Tabela 4.22 –Parâmetros fitossociológicos e de diversidade florística para o Campo Sujo Seco (topo e vertente), na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Categorias	Topo	(%)	Vertente	(%)
Nº de famílias	28	51,9	26	48,1
Nº de gêneros	76	52,8	68	47,2
Nº de espécies	104	52	96	48
Densidade (ind./ha)	2.242,0	48,8	2.354,0	51,2
Dominância (m ² /ha)	5,78	51,3	5,5	48,7
% de indivíduos mortos	8,2	45	10	55
DAP - média	4,5	-	4,6	-
Índice de Shannon-Wiener	3,16	-	2,8	-
Equabilidade	0,75	-	0,68	-

Quanto ao número de famílias, a diferença entre topo e vertente foi de 3,8%, de 5,6% para gêneros, 4% para espécies, 2,4% para densidade, de 2,6% para dominância (Tabela 4.22). Do ponto de vista da diversidade florística, considerando-se que o índice de Shannon-Wiener é de 0 a 5, a diversidade foi relativamente alta, principalmente no topo, e a equitabilidade (índice de uniformidade de Pielou) foi também maior no topo, indicando haver uma pequena diferença em relação à uniformidade na distribuição dos indivíduos nas espécies no topo que na vertente. A densidade foi mais baixa no topo, enquanto que a dominância foi mais alta. Verificou-se o inverso na vertente e devido, a essa inversão de valores de densidade e dominância entre topo e vertente, o diâmetro (média) foi praticamente igual. O índice de mortalidade de plantas foi mais baixo no topo, com 10% de diferença entre topo e vertente, sendo mais alto na vertente (Tabela 4.22).

O índice de Sørensen entre as duas situações de relevo foi alto (0,79), o que sugere que há alta similaridade florística entre topo e vertente que, apesar de alta, indica que 21% são diferentes, ou seja, nem todas as vertentes possuem alta similaridade com os topos.

Considerando-se a disposição no relevo, 80 espécies (66,1%) ocorreram em ambas as situações de relevo, topo e vertente, ao passo que poucas espécies ocorreram só na vertente ou só no topo. Embora exista ampla plasticidade das espécies em ocorrerem em ambos os tipos de relevo, o maior número de indivíduos em uma situação ou em outra indicou preferência de ocorrência em um desses ambientes. Houve preferência mais alta das espécies pelo relevo tipo topo (20,7%), que pelo relevo tipo vertente (13,2%) (Quadros 4.7 e 4.8).

Quadro 4.7 - Distribuição de espécies no topo em grupos de predominância baixa, média, alta, e exclusivas, de acordo com a sua respectiva densidade em relevo de topo ou vertente no Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Grupos	Espécies do topo	Topo	(%)	Vertente	(%)
Exclusivas de topo	<i>Pterodon emarginatus</i>	10.0	100	0	0
	<i>Erythroxilum cf. citrifolium</i>	10.0	100	0	0
	<i>Kielmeyera rosea</i>	6.0	100	0	0
	<i>Tocoyena formosa</i>	4.0	100	0	0
	<i>Eriotheca pubescens</i>	4.0	100	0	0
Predominância alta	<i>Vochysia cf. thyrsoidea</i>	28.0	93	12.0	7
	<i>Chamaecrista orbiculata</i>	18.0	90	2.0	10
	<i>Byrsonima subterranea</i>	162.0	85	28.0	15
	<i>Andira humilis</i>	10.0	83	2.0	17
Predominância média	<i>Psidium firmum</i>	42.0	81	10.0	19
	<i>Dipteryx alata</i>	8.0	80	2.0	20
	<i>Salacia crassifolia</i>	38.0	76	12.0	24
	<i>Dimorphandra mollis</i>	84.0	75	28.0	15
	<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	6.0	75	2.0	25
	<i>Schefflera macrocarpa</i>	24.0	75	8.0	25
	<i>Manihot sparsifolia</i>	36.0	72	14.0	28
	<i>Bowdichia virgilioides</i>	10.0	71	4.0	29
	<i>Qualea grandiflora</i>	22.0	69	10.0	31
	<i>Kielmeyera coriacea</i>	30.0	68	14.0	32
Predominância baixa	<i>Hancornia speciosa</i>	4.0	67	2.0	33
	<i>Vochysia tucanorum</i>	4.0	67	2.0	33
	<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	84.0	66	44.0	34
	<i>Myrcia splendens</i>	14.0	64	8.0	36
	<i>Diospyros hispida</i>	10.0	62	6.0	38
	<i>Stryphnodendron adstringens</i>	32.0	61	20.0	39
	<i>Anacardium nanum</i>	30.0	60	20.0	40
	<i>Himatanthus obovatus</i>	34.0	59	24.0	41
	<i>Annona crassiflora</i>	14.0	58	10.0	42
	<i>Casearia sylvestris</i>	16.0	57	12.0	43
	<i>Calliandra dysanta</i>	10.0	56	8.0	44
	<i>Connarus suberosus</i>	76.0	56	60.0	44
	<i>Byrsonima verbascifolia</i>	28.0	56	22.0	44
	<i>Ouratea spectabilis</i>	66.0	55	54.0	45
	<i>Syagrus comosa</i>	308.0	53	270.0	47

Quadro 4.8 - Distribuição de espécies na vertente em grupos de predominância baixa, média, alta, e exclusivas, de acordo com a sua respectiva densidade em relevo de topo ou vertente no Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Grupos	Espécies da Vertente	Topo	(%)	Vertente	(%)
Exclusivas de Vertente	<i>Manihot acuminatissima</i>	0	0	16.0	100
	<i>Tabebuia aurea</i>	0	0	10.0	100
	<i>Senna velutina</i>	0	0	8.0	100
	<i>Erythroxylum tortuosum</i>	0	0	4.0	100
Predominância média	<i>Salvertia convallariodora</i>	6.0	19	26.0	81
	<i>Vochysia cinnamomea</i>	32.0	20	128.0	80
	<i>Curatella americana</i>	2.0	25	6.0	75
	<i>Leptolobium dasycarpum</i>	6.0	25	18.0	75
	<i>Mimosa albolanata</i> cf. var. <i>brasiliana</i>	4.0	29	10.0	71
	<i>Erythroxylum suberosum</i>	52.0	31	114.0	69
Predominância baixa	<i>Tachigali rugosa</i>	10.0	33	20.0	67
	<i>Byrsonima pachyphylla</i>	40.0	36	70.0	64
	<i>Brosimum gaudichaudii</i>	8.0	36	14.0	64
	<i>Anacardium humile</i>	22.0	37	38.0	63
	<i>Byrsonima coccobolifolia</i>	60.0	38	100.0	62
	<i>Vellozia seubertiana</i>	518.0	39	824.0	61
	<i>Qualea parviflora</i>	4.0	40	6.0	60
	<i>Bauhinia rufa</i>	20.0	44	26.0	56
	<i>Bauhinia curvula</i>	54.0	47	60.0	53
	<i>Mimosa radula</i> cf. var. <i>imbricata</i>	16.0	47	18.0	53

Das espécies de distribuição exclusiva, algumas foram de ocorrência rara por ocorrer apenas um indivíduo. No topo, as espécies *Miconia ferruginata*, *Deianira* cf. *chiquitana*, *Psidium* sp, *Solanum lycocarpum*, *Vochysia elliptica*, *Platypodium elegans*, *Caryocar brasiliense*, *Tabebuia roseoalba* apresentaram distribuição rara. Na vertente foram *Agonandra brasiliensis*, *Palicourea rigida*, *Ananas ananassoides*, *Kielmeyera lanthrophyton*, *Miconia albican*, *Platonia insignis*. Porém, as espécies *Davilla elliptica*, *Anacardium occidentale*, *Vochysia rufa*, *Annona coriacea*, *Zeyhera tuberculosa*, *Rourea induta*, *Tibouchina aegopogon* e *Ouratea hexasperma* por ter os mesmos percentuais (50%) de ocorrência tanto no topo quanto na vertente, foram consideradas de distribuição não preferencial.

As espécies de mais ampla ocorrência, isto é, que ocorreram em todas as áreas de amostragem, tanto no topo quanto na Vertente foram: *Vellozia seubertiana*, *Syagrus comosa*, *Connarus suberosus*, *Davilla elliptica*, *Erythroxylum suberosum*, *Ouratea spectabilis* e *Piptocarpha rotundifolia*. No estrato herbáceo, foi a espécie *Bulbostylis paradoxa*.

No que se refere à influência do grau de inclinação do relevo em relação ao número de espécies, existe uma correlação negativa, ou seja, quanto mais alto o grau de inclinação, menor o número de espécies. O coeficiente de correlação $R^2 = 0.6475$ indicou haver correlação negativa moderada entre o grau de inclinação e o número de espécies (Figura

4.65).

Figura 4.65 - Relação entre grau de inclinação da Vertente e número de espécie (número de espécies/ha), das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Em relação ao número de indivíduos, a correlação foi baixa com Coeficiente de Determinação (R^2) = 0.0046 (Figura 4.66), devido a grande variação do número de espécies em relação à inclinação do relevo. Da mesma forma, também não houve correlação entre inclinação do relevo com a dominância absoluta, cujo Coeficiente de Determinação (R^2) = 0.0032 (Figura 4.67).

Figura 4.66 - Relação entre grau de inclinação da Vertente e número de indivíduos (número de ind./ha), das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Figura 4.67 - Relação entre grau de inclinação da Vertente e dominância absoluta das espécies (m^2/ha), das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

No estrato herbáceo-subarbustivo, 10 espécies foram exclusivas do topo, como *Amasonia campestris*, *Aspilia foliacea* e *Aspilia leucoglossa*, entre outras (Tabela 4.18); sete foram exclusivas da vertente (*Centrosema virginianum*, *Chamaecrista diphylla*, *Diplusodon microphyllus* e *Diplusodon sessiliflorus*, entre outras), embora com poucos percentuais de cobertura; 27 espécies ocorreram em ambos os tipos de relevo.

As espécies de ampla ocorrência, em geral, apresentaram baixos percentuais de diferenças entre a ocorrência no relevo de topo ou de vertente (Tabela 4.19). Outras espécies, em número reduzido, apresentaram índices preferenciais mais definidos por um tipo ou outro de relevo, como o *Bulbostylis pradoxa* e Indeterminada 4 com ocorrência preferencial na Vertente e *Rhynchospora brasiliensis* e indeterminada 5 no topo (Tabela 4.19).

A similaridade florística pelo índice de Sørensen, entre as duas situações de relevo, foi baixa (0,27), significando que há uma baixa semelhança florística entre topo e vertente das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo, diferentemente das espécies subarbustivas-arbustivo-arbóreas, que registraram índice de similaridade alto entre topo e vertente. Isso significa que o relevo de topo e vertente teve influência maior na distribuição de espécies do estrato herbáceo-subarbustivo do que no estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo.

O Coeficiente de Determinação (R^2) = 0.5140 entre grau de inclinação da vertente e número de espécies foi médio no estrato herbáceo-subarbustivo, ou seja, a mudança por si só

do tipo de relevo (se de topo ou de vertente) tem certa influência na distribuição das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo, indicando que as espécies desse estrato são sensíveis a essa mudança, uma vez que seu sistema radicular é pouco profundo e as vertentes são ambientes mais instáveis (Figura 4.68).

Figura 4.68 - Correlação entre grau de inclinação da vertente e número de espécies herbáceas-subarbustivas, das comunidades de plantas do Campo Sujo Seco, na bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas (TO)

Apesar da alta similaridade florística entre topo e vertente, diferenças foram mostradas na formação de grupos florísticos resultante das análises de agrupamento (UPGMA e Twinspan) e de ordenação (PCA), quando alguns grupos foram constituídos pela vegetação de topo e vertente, evidenciando essa similaridade. Porém, outros grupos foram formados com a separação de uma mesma área, como é o caso da área 2, em que o topo constituiu um grupo separado do da vertente e da área 4; esta última, quando feito o corte ao nível de similaridade de 46% no agrupamento UPGMA, a vertente foi separada do topo. Assim como também a análise pelo Twinspan e PCA indicaram a separação entre topo e vertente das áreas 3; 4 e 5.

As diferenças entre os parâmetros fitossociológicos e a variedade de padrões florísticos existentes são reflexo das condições físico-ambientais. Os parâmetros analisados (inclinação de vertentes, altitude, fertilidade e umidade dos solos) também evidenciaram diferenças entre relevo de topo e de vertente e também entre áreas geográficas distintas de Campo Sujo, dentro da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande.

O solo, embora distrófico, apresentou maior fertilidade (maior saturação de bases) no topo que na vertente, favorecendo maior diversidade de espécies vegetais neste tipo de relevo. Em termos de áreas geográficas distintas, área 2 foi a de solo com maior fertilidade e

no topo; embora álico, o solo apresentou menores teores de saturação de Alumínio e, embora ácido, o maior pH e maior umidade, que proporcionou maior equitabilidade da flora lá existente e também uma flora do estrato herbáceo-subarbustiva bem específica, o que a fez diferente de outras áreas, mostrando a influência do relevo e das condições edáficas locais na diversidade de espécies e na formação de padrões florísticos diferentes.

5. CONCLUSÕES

A bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande é uma bacia de 5ª ordem que atualmente tem uma área de 46.177,47 ha e, com base na análise da paisagem, é composta pelos geofácies: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrados Sentido Restrito, Babaçual, Veredas, Campo Sujo Seco, Campo Limpo, Campo Rupestre, Lago reservatório, ribeirões, córregos e brejos, Área Urbana, confirmando a primeira hipótese deste trabalho, que afirma que esta bacia hidrográfica tem uma diversidade de fitofisionomias do Cerrado.

A unidade Floresta ocupou a maior área da bacia hidrográfica (28.614,24 ha), sendo que a Mata Ciliar, Mata de Galeria, Vereda e Campo Limpo e Mata Seca representaram juntas 15.763,32 ha (34,1% da bacia) e o Cerradão 12.850,92 ha (27,8%), seguidos pelos Campos Sujos Secos (7.478,82 ha ou 16,2%), pelas formas savânicas do Cerrado Sentido Restrito (4.964,31 ha ou 10,7%), Área Urbana (2.844,09 ha ou 6,2 %), Agropecuária/Silvicultura (1.872,81 ha ou 4,0%) e pela área do Lago reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães dentro da bacia (403,20 ha ou 1,0%).

Os Campos Sujos Secos localizam-se, predominantemente, nos planaltos e chapadas da serra do Lageado, cujos topos, por vezes, são suavemente ondulados, mas também ocorrem nas planícies secas da depressão do Tocantins de forma pouco expressiva, confirmando em parte a hipótese 2 que afirma que os Campos Sujos ocorrem nos planaltos e chapadas.

Os solos dos Campos Sujos Secos são do tipo Plintossolos Pétricos e se caracterizam como de baixo teor de água, ácidos, distróficos, álicos com altos teores de ferro, e de textura média.

As condições de relevo de topo e vertente influenciaram nos teores de pH, Al, Saturação de Al, Saturação com H+Al e Saturação por Bases, havendo diferença significativa entre topo e vertente. Mas, não influenciaram nos teores de M.O., Umidade dos solos, nem dos nutrientes Ca, Mg, P, K, e Fe, quando analisados isoladamente, não havendo diferença significativa entre os teores de topo e vertente. Porém, a saturação por bases mostrou haver diferença significativa na fertilidade dos solos entre topo e vertente, sendo que os solos dos topos indicaram ser menos distróficos que os da vertente. Também entre as áreas de estudo, houve diferença significativa para os teores de Ca, Mg, Acidez Potencial (H+Al), Saturação Por Bases e Umidade. A área 2 indicou ter solos menos distróficos que as demais áreas e maior umidade em meados da estação

seca.

A textura dos solos não apresentou diferença significativa para os teores de argila e de areia entre topo e vertente, nem entre as áreas. Apenas para o silte houve diferença significativa entre topo e vertente.

A flora do Campo Sujo Seco da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande tem as seguintes características:

- apresentou 39 famílias, 82 gêneros e 121 espécies, sendo 77 espécies componentes do estrato subarbustivo-arbustivo-arbóreo e 44 do estrato herbáceo-subarbustivo. A família Fabaceae destacou-se entre as demais, com 25 espécies, seguida por Poaceae, com 12, e Vochysiaceae, com nove espécies.
- nem todas as espécies foram exclusivas do território brasileiro. Das 111 espécies identificadas, 37 espécies (33,3%) também ocorrem no Cerrado da Bolívia oriental.
- poucas espécies têm uma área de distribuição geográfica de ampla distribuição Neotropical, como *Tocoyena formosa*, *Casearia sylvestris* e *Bowdichia virgilioides*.
- das 121 espécies, 58% são fanerófitas, 23% hemicriptófitas, 14% caméfitas, 3% geófitas e 2% terófitas.
- os Campos Sujos da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande apresentaram densidade mais elevada, área basal mediana e menor altura em relação a outros Campos Sujos já estudados no Domínio do Cerrado.
- o número de famílias, de gêneros e de espécies foi mais alto no topo, levando à maior diversidade ($H' = 3,16 \text{ nats.indivíduo}^{-1}$) que na vertente ($H' = 2,8 \text{ nats.indivíduo}^{-1}$).
- a densidade de plantas vivas e mortas foi mais alta na vertente.
- existe alta similaridade florística, pelo índice de Sørensen, entre topo e vertente (0,79) e isso ficou evidente na formação de grupos florísticos, em que alguns foram formados por topos e vertentes nas mesmas áreas de amostragem. Mas, em relação a outros Campos Sujos já estudados, a similaridade florística foi baixa.
- a diversidade alfa pelo índice de Shannon-Wiener ($H' = 3,533 \text{ nats.indivíduo}^{-1}$), foi alta, geralmente acima da diversidade para Campos Sujos, e na faixa de Cerrado Sentido Restrito, indicando boa preservação.
- os Campos Sujos Secos da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, de acordo com a densidade de plantas têm padrões de Campos Sujos Secos Densos, Campos Sujos Secos Típicos e Campos Sujos Secos Ralos, tanto em relevos de topo e de vertente, confirmando a hipótese 4 que afirma que existe mais de um tipo de Campo Sujo.

Existem padrões estruturais e florísticos diversos de Campo Sujo Seco na bacia

hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande e as condições ambientais de relevo e edáficas tiveram influência na formação de tais padrões, confirmando a hipótese 3 de que o solo e o relevo são fatores ambientais que influenciam a diversidade dos tipos de Campo Sujo; também confirma a hipótese 5, porém a hipótese 5 que afirma que a diversidade florística é o fator de diferenciação entre tipos de Campos Sujos foi parcialmente confirmada, uma vez que além dos padrões florísticos há padrões estruturais:

- *Vellozia seubertiana* forma Campos Sujos Secos Densos e Típicos no topo e na vertente, mais concentrados no centro-norte da bacia;
- *Byrsonima subterranea* forma Campos Sujos Secos Típicos no topo, mais concentrados no norte da bacia;
- *Vochysia cinnamomea* forma Campos Sujos Secos Típicos na vertente, mais concentrados no sul da bacia.

Os padrões florísticos constituíram os geótopos do geofácio Campo Sujo Seco:

1. Campo Sujo Seco com *Vochysia cinnamomea*, *Byrsonima coccobolifolia* e *Vellozia seubertiana* em topo e vertente de morro na área 3
2. Campo Sujo Seco com *Vellozia seubertiana* e *Syagrus comosa* em topo e vertente de morro na área 1 e em vertente na área 2
3. Campo Sujo Seco com *Byrsonima subterranea* em topo e vertente de morro na área 5
4. Campo Sujo Seco Misto com *Syagrus comosa*, *Vellozia seubertiana*, *Erythroxylum suberosum*, *Ouratea spectabilis*, *Piptocarpha rotundifolia*, *Dimorphandra mollis* em topo de morro da área 2
5. Campo Sujo Seco com *Vellozia seubertiana* em topo de morro na área 4

Do ponto de vista da importância da biodiversidade vegetal, os Campos Sujos Secos da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande abrigam espécies que parecem ter distribuição geográfica restrita, como *Vellozia seubertiana* e *Byrsonima subterranea*, *Mimosa albolanata* cf. var. *brasiliensis* e *Mimosa radula* cf. var. *imbricata*.

6. SUGESTÕES DE USOS

As sugestões de uso baseiam-se em usos que visem o desenvolvimento da pesquisa científica, de manejo ecológico e de uso sustentável do geossistema da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, de modo a compreender melhor a sua funcionalidade, por tratar-se de um ambiente com grandes responsabilidades sócio-econômicas (agropecuária/silvicultura, turismo e abastecimento de água da capital

Palmas), mas também ambientais (conservação da biodiversidade), por apresentar alta biodiversidade vegetal, mas está em acelerado ritmo de ocupação. Assim, sugere-se:

- Estudos da dinâmica de populações de espécies herbáceas, subarbustivas, arbustivas e arbóreas no Campo Sujo para compreender a paisagem campestre do Cerrado.
- Estudos biológicos das espécies para compreender sua maior preferência pelo relevo de topo ou de vertente.
- Estudos sobre a ocorrência e dinâmica das térmitas na área de Campo Sujo e de que forma elas podem estar contribuindo na manutenção da paisagem campestre no Cerrado.
- Estudos biológicos associados à prática de queimadas para entender a resposta das espécies a esses eventos e de que forma eles têm contribuído para a manutenção da paisagem campestre no Cerrado.
- Estudos paleontológicos de modo a documentar a grande ocorrência de fósseis, muitos deles expostos, e cuja informação, em parte, está se perdendo devido a ação do intemperismo.
- Estudos climáticos mais localizados, havendo a necessidade da existência de uma estação meteorológica na bacia do ribeirão Taquaruçu Grande de modo a ter dados mais condizentes com a realidade e que favorecerão a compreensão não apenas de dados biológicos, mas também da dinâmica físico-ambiental.
- Estudos geomorfológicos mais específicos como, por exemplo, da dinâmica do relevo
- Estudos hidrológicos mais específicos de forma a caracterizar todos os tributários da rede hidrográfica, tendo em vista a importância desta bacia no abastecimento de água do município de Palmas e na manutenção da biodiversidade.
- Estudos geográficos de dinâmica populacional, anseios e tendências de uso do espaço, de impactos e riscos ambientais.
- Estudos biogeográficos da Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerrado Sentido Restrito, Palmeiral, Veredas, Campo Limpo e Campos Rupestres.
- Estudos sócio-econômicos e turísticos no sentido de compreender a importância da manutenção paisagística do Campo Sujo Seco em favorecimento da renda da população local, como por exemplo, a larga ocorrência de *Vellozia* nos Campos Sujos de Taquaruçu poderia ser aproveitada pelo turismo local, principalmente na época de floração que ocorre de forma sincronizada e os campos tornam-se floridos.
- Zoneamento ambiental para o estabelecimento de diretrizes no sentido de estabelecer políticas de manejo ecológico que visem a recuperação, conservação e o uso sustentável.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB' SABER, A. N. Cerrados e Mandacarus. **Scientific American Brasil**. São Paulo, ano 1, n. 4, p. 98, 2002.

_____, Contribuição a geomorfologia da área do Cerrado. **Simpósio sobre o Cerrado**. São Paulo, USP, 1982, p. 117-124.

_____, O Pantanal Matogrossense e a teoria dos refúgios. **Revista Brasileira de Geografia**. Rio de Janeiro: IBGE-CNG. 1988, p. 9-57.

_____, Os domínios morfoclimáticos da América do Sul. Primeira aproximação. **Geomorfologia**. São Paulo, USP-IGEOG, n. 52, p. 1-22, 1977.

_____, A. N. Contribuição à geomorfologia dos cerrados. In: SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO, 3, 1963, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Edusp, 1963. p. 15-50.

_____, A. N. A organização natural das paisagens inter e subtropicais brasileiras. In: SIMPÓSIO SOBRE CERRADO, 3., 1971, São Paulo, **Anais...** São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA/Editora Universidade de São Paulo, 1971, p. 1-14.

_____, Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas no Brasil. **Orientação**. São Paulo, USP-IGEOG, n. 3, p. 45-48, 1967.

_____, O relevo brasileiro e seus problemas. In: AZEVEDO, A. (Org.). **Brasil as fases físicas**. São Paulo: Nacional, v;1, p. 135-250, 1964.

_____, **Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

AGOSTINHO, S.; VIANA, M. S. S.; FERNANDES, A. C. S. Duas novas icnoesoécies de Bifungites Desio, 1940 na Formação Pimenteiras, Devoniano da Bacia do Parnaíba, Brasil. **Arquivos do Museu Nacional**, Rio de Janeiro, v.62, n.4, p.519-530, 2004.

ALHO, C. J. R.; MARTINS, E. S. (Orgs.). **De grão em grão o Cerrado perde espaço**. Brasília: WWF, 1995.

ALMEIDA, R. S. A Geografia física no IBGE 1938-1998. **Revista de Ciências Humanas**, v. 9, n. 1, p. 55-66, 2009.

ALMEIDA, S. P.; PROENÇA, C. E.B.; SANO, S. M.; RIBEIRO, J. F. **Cerrado: espécies vegetais úteis**. Planaltina: Embrapa-CPAC. 1998. 464 p.

ALMEIDA, G. C. P. **Caracterização física e classificação dos solos**. Universidade federal de Juiz de Fora/ Faculdade de Engenharia/ Departamento de Transportes. 2005. 145 p.

AMARAL, A. G. **Mudanças estruturais e florísticas do estrato herbáceo-arbustivo em campo sujo limpo úmido na Fazenda Água Limpa – DF após um período de sete anos.** 2008. 180 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Biologia, Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, 2008.

ANDRADE, L. A. Z.; FELFILI, J. M.; Violatti, L. Fitossociologia de uma área de cerrado na RECOR-IBGE, Brasília-DF. **Acta Botanica Brasilica**, 16(2): 225-240, 2002.

APG III. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG. **Botanical Journal of the Linnean Society**, p 105–121. 2009.

ARAÚJO, W. S.; PORFÍRIO JÚNIOR, E. D.; FRANCENER, A.; HALL, C. F. Composição florística e estrutura fitossociológica de áreas de campo sujo e cerrado sentido restrito na Floresta Nacional de Silvânia, Goiás, Brasil. **INSULA Revista de Botânica Florianópolis**, n. 41, p.42-58, 2012.

ARGENTO, M. S. F.; CRUZ, C. B. M. Mapemaneto Geomorfológico. In CUNHA, S.B.; GUERRA, A. J. T. (Orgs.) **Geomorfologia - Exercícios, Técnicas e Aplicações**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil SA, 1996, p. 239-249.

ARRUDA, M. B. et al. Ecorregiões, unidades de conservação e representatividade ecológica do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO, J. F. (Eds.). **Cerrado: Ecologia e Flora**. Embrapa Cerrados. Brasília: DF: Embrapa Informações Tecnológicas, v. 1, p. 229-272. 2008.

ASSUNÇÃO, S. L.; FELFILI, J. M. Fitossociologia de um fragmento de cerrado sensu stricto na APA do Paranoá, DF, Brasil. **Acta Botânica Brasilica**. v. 18, n. 4, p.903-909, 2004.

ATAIDE, E. S.; CASTRO, P. T. A.; FERNANDES, G. W. Florística e caracterização de uma área de campo ferruginoso no complexo minerário Alegria, serra de Antônio Pereira, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 35, n. 6, p. 1265-1275, 2011.

AYOADE, J.O. **Introdução à Climatologia para os trópicos**. 4a ed. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1996.

AYRES, M., AYRES JÚNIOR, M., AYRES, D.L. & SANTOS, A.A. 2007. BIOESTAT – Aplicações estatísticas nas áreas das ciências bio-médicas. Ong Mamiraua. Belém, PA.

BARBOSA, A. S.; RIBEIRO, M. B.; SCHMITZ, P. I. Cultura e ambiente em áreas de cerrado do sudoeste de Goiás. In: PINTO, M. N. (Org.). **Cerrado: caracterização, ocupação e perspectiva**. Brasília: Ed. UNB; SEMATEC, p. 75-107, 1993.

BERNALDEZ, F. G. **Ecology y Paisage**. Madrid. H. Blume, 1981.

BERTALANFFY, L. VON. **Teoria general de los sistemas: Fundamentos, Desarrollo, aplicaciones**. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2003.

BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global. Esboço Metodológico. **R. RA' E GA**, Curitiba, n. 8, p. 141-152, 2004. Editora UFPR.

BÓLOS I CAPDEVILA, M. **Manual de ciência del paisaje**. Barcelona: Masson, 1992.

BOSCH, H.; CAROL, H. Princípios do conceito da paisagem. **Boletim Geográfico**, v. 27, n. 202, p. 26-29, 1968.

BRADY, N. C. **Natureza e propriedade dos solos**. Tradução Antônio B. Neiva Figueiredo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989. 878 p.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. EDIOURO, 1988.128 p.

BRASIL. Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Disponível em: www.mma.gov.br/port/sbf/dap/doc/snuc.pdf. Acesso em 04/11/2009.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Secretaria Geral. **Projeto RADAMBRASIL Folha SC. 22 Tocantins**: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, Levantamento de recursos naturais, v. 22, 524 p. 1981.

BROWN, E. H. Geografia Física, seu conteúdo e suas relações. **Bol. Geogr.** Rio de Janeiro, 35 (254): 14-21, 1977.

CABRERA, A. L.; WILLINK, A. **Biogeografia de América Latina**. Monografia n. 13. Washington: Secretaría General de La Organizción de Estado Americanos, 1973. 120 p.

CAILLEUX, A. **Biogéographie mondiale**. Paris: Presses Universitaires de France. 1953. 126.

CAMARGO, M. C. R. **Aplicações de indicadores perceptivos para análise das paisagens cênicas do trajeto entre o distrito de Taquaruçu e Palmas/TO**. 2005, 196 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente). Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2005.

CAMARGO, O.; MONIZ, A.C.; JORGE, J.A.; VALADARES, J.M. **Métodos de análise química, mineralógica e física do solo do Instituto Agrônomo de Campinas**. Campinas. Instituto Agrônomo, 90p. 1996, (Boletim Técnico 106).

CAMPOS, G. **Mapa florestal**. Ministério da agricultura, Indústria e Comercio/Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Rio de Janeiro: Typ. Da Diretoria do Serviço de Estatística, 1912. 116 p.

CARAÍBA, M. O. S. B.; MEDEIROS, T. C. C. Caracterização fitofisionômica e levantamento florístico de uma sequência de solo na “propriedade 1”, na Serra de Monte do Carmo – Tocantins. V SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFT 2009. **Anais...** PDF. 118.

CAVALCANTE, M. E. S. **O discurso autonomista do Tocantins**. Goiânia: Editora UCG, 2003.240 p.

CHRISTOFOLETTI, A. Considerações a propósito da geografia física dos cerrados. **Notícia Geomorfológica**, n. 11, p. 5-32, 1966.

CHRISTOFOLETTI, A. **Geomorfologia**. São Paulo: Edgard Blucher. 1980.

CHRISTOFOLETTI, A. Geografia Física. **Bol. Geog. Teorética**, 11(21 e 22): 5-8, 1981.

CONCEIÇÃO, A. A.; PIRANI, J. R. Diversidade em quatro áreas de campo rupestres na Chapada Diamantina, Brasil: espécies distintas, mas riquezas similares. **Rodriguésia**, v. 58, n.1, p. 193-206. 2007.

CONTI, J. B. Geografia, zonalidade e paisagem. In: **Anais do III Encontro Interdisciplinar sobre o estudo da paisagem**. UNESP, Rio Claro, 1998.

CONTI, J. B.. Os Geógrafos e a Paisagem: algumas considerações. **Revista Território Geográfico**, v. 06, p. 01-05, 2011.

COUTINHO, L. M. O conceito de Cerrado. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 1, p. 17-23, 1978.

COUTINHO, L. M. O bioma do Cerrado. In: Klein, a. l. (Org.). **Eugene Warming e o cerrado brasileiro: um século depois**. São Paulo: Editora UNESP; Imprensa Oficial do Estado, p. 77-91, 2002.

COUTINHO, L. M. O conceito de bioma. **Acta Botanica Brasilica**, v. 20, n. 1, p. 13-23. 2006.

COX, C. B.; MOORE, PD. **Biogeografia: uma abordagem ecológica e evolucionária**. Tradução de Luís Felipe Coutinho Ferreira da Silva-Rio de Janeiro: LTC, 2009. 398 p.

CRUZ, O. A Geografia Física, o geossistema, a paisagem e os estudos dos processos geomórficos. **Boletim de Geografia Teorética**, 15 (29-30): p. 53-62, 1985.

CURTIS, J. T.; McINTOSH, R. P. **An upland forest continuum in the prairie-forest borde region of Wisconsin**. *Ecology*, 32, p. 476-496, 1951.

CURTIS, J. T.; McINTOSH, R. P. **The interrelations of certain analytic and syntetic phytosociological characters**. *Ecology*, 31, p. 434-455, 1950.

DAJOZ, R. Ecologia de Paisagem e metapopulações. In: DAJOZ, R. **Princípios de ecologia**. Tradução Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 344-369, 2005.

DASMANN, R. E. A system for defining and classifying natural regions for purposes of conservation. Morges (Switzerland): International Union of Conservation of Nature Resource, IUCN Occasional Paper no.7, 1973.

DE CANDOLLE, A. Essai élémentaire de géographie botanique. In: LOMOLINO, M. V.; SAX, D. F. BROW, J. H. **Foundations of Biogeography: classic paper with commentaries**. Chicago: The University Of Chicago Press, p.28-48. 2004.

DELPOUX, M. Ecossistema e Paisagem. **Métodos em Questão**, São Paulo: USP – Instituto de Geografia, 1974.

DINERSTEIN, E. et al, Una evaluación del estado de conservación de las ecoregiones terrestres de América Latina y El Caribe. Washington, DC: WWF, 1995. 135 p.

DSG. Diretoria do Serviço Geográfico - Brasil. Ministério do Exército. Folha Vila Canela SC.22-Z-B-III/MI-1544. Escala1:100.000. 1979.

DURIGAN, G. Métodos para análise de vegetação arbórea. In: CULLEN JÚNIOR, L.; RUDRAN, R.; VALADARES-PADUA, C. (Orgs.). **Métodos de estudo em Biología da Conservação & Manejo da Vida Silvestre**. Editora UFPR, v. 88, p. 455-479, 2

DUTRA, V. F. **Diversidade de Mimosa L. (Leguminosae) nos campos rupestres de Minas Gerais**: taxonomia, distribuição geográfica e filogeografia. 2009, 294 f. Tese (doutorado). Universidade Federal de Viçosa. 2009.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de solos. **Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes**. Brasília, 1999. 370p.

EITEN, G. The Cerrado vegetation of Brazil. **Botânica Review**, v. 38, n. 2, p. 201-341, 1972.

EITEN, G. Vegetação do Cerrado. In: PINTO, M. N. (Org.). **Cerrado**: caracterização, ocupação e perspectiva. Brasília: Ed. UNB; SEMATEC, p. 17-73, 1993.

FELFILI, J. M. et al. Fitossociologia da vegetação arbórea.. In: FELFILI, J.M.; RESENDE, A. V.; SILVA JÚNIOR, M. C. (Orgs.). **Biogeografia do Bioma Cerrado**: vegetação e solos da Chapada dos Veadeiros. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2007. cap. 3.

FELFILI, J. M. Floristic composition and phytosociology of the gallery forest alongside the Gama stream in Brasília, DF, Brazil. **Revista Brasileira de Botânica**. 17(1):1-11. 1994.

FELFILI, J. M.; CARVALHO, F. A.; RICARDO, F. H. **Manual para o monitoramento de parcelas permanentes nos biomas Cerrado e Pantanal**. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Florestal. 2005..

FELFILI, J. M.; FAGG1, C. W. Floristic composition, diversity and structure of the “cerrado” *sensu stricto* on rocky soils in northern Goiás and southern Tocantins, Brazil. **Revista Brasileira de Botânica**, v.30, n.3, p.375-385, 2007.

FELFILI, J. M.; FILGUEIRAS, T. S.; HARIDASAN, M.; SILVA JÚNIOR, M. C.; MENDONÇA, R. C.; REZENDE, A. V. Projeto biogeografia do bioma cerrado: vegetação e solos. **Cadernos de Geociências**, v. 12, n. 4, p. 75-166, 1994.

FELFILI, J. M.; SILVA JÚNIOR, M. C. **A comparative study of cerrado (*sensu stricto*) vegetation in central Brazil**. Journal of Tropical Ecology, v.9, n.3, p.277-289, 1993.

FELFILI, J. M.; SILVA JÚNIOR, M. C.; RESENDE, A. V.; MACHADO, J. W.; WALTER, B.M. T.; SILVA, P. E.; HAY, J. D. Análise comparativa da florística e fitossociologia da vegetação arbórea do cerrado *sensu stricto* na Chapada Pratinha, DF Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, 6(2): 1992.

FELFILI, M. C.; FELFILI, J. M. Biodiversidade alfa e beta no cerrado *sensu stricto* da Chapada da Pratinha, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 15, n. 2, p. 243-254. 2001.

FELFILI, J. M. et al. Diversidade florística das áreas nucleares da Reserva da Biosfera do Cerrado - Fase I. In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA/BRASIL/Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. **Vegetação no Distrito Federal: - tempo e espaço:** uma avaliação multitemporal da perda da cobertura vegetal no DF e da diversidade florística das áreas nucleares da Reserva da Biosfera do Cerrado – Fase I. Brasília: UNESCO, 2000. p.29-74.

FERREIRA, M. N. **Planejamento sistemático das unidades de conservação do Estado do Tocantins**. 2011,168 f. Tese (Doutorado). Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo. 2011.

FERRI, M. G. Ecologia dos Cerrados. In: SIMPÓSIO SOBRE CERRADO, 4., 1977, São Paulo, **Anais...** São Paulo: Editora Universidade de São Paulo/ Editora Itatiaia, 1977, p. 15-33.

FIDELIS, A. T.; GODOY, S. A. P. Estrutura de um cerrado stricto sensu at the Glebe Cerrado Pé-de-Gigante, Snta Rita do Passa Quatro, SP. **Acta Botânica Brasilica**. v. 17, n. 4, p. 531-539, 2003.

FIEDLER, N. C.; AZEVEDO, I. N. C.; RESENDE, A. V.; MEDEIROS, M. B.; VENTUROILI, F. Efeitos de incêndios florestais na estrutura e composição florística de uma área de cerrado *sensu estrito* na Fazenda Água Limpa-DF. **Revista Árvore**. V. 28, p. 129-138. 2004.

FLORENZANO, G. T. **Iniciação em sensoriamento remoto**. São Paulo: Oficina de Texto, 2007.

FONSECA, M. S.; SILVA JÚNIOR, M. C. Fitossociologia e similaridade florística entre trechos de Cerrado Sentido Restrito em interflúvio e em vale no Jardim Botânico de Brasília, DF. **Acta Botanica Brasilica**. v.18, n. 1. 2004.

FORZZA, R. C. et al. (Org.). **Catálogo de plantas e fungos do Brasil**, volume 1, Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson Estúdio : Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 875 p.

FORZZA, R. C. et al. (Org.). **Catálogo de plantas e fungos do Brasil**, volume 2, Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson Estúdio : Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 873 p.

FRAZON, R. C.; CAMPOS, L. Z. O.; PROENÇA, C. E. B.; SOUZA-SILVA, J. C. **Araças do gênero Psidium:** principais espécies, ocorrências, descrição e usos. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2009.

FRÓVOLA. M. A paisagem dos geógrafos russos: a evolução do olhar geográfico entre o século XI e o XX. The landscape of the russian geographers: the evolution of the

geographical perspective between the nineteenth and the twentieth centuries. **R. RAˆE GA**, Curitiba, n. 13, p. 159-170, 2007.

GAMA JˆUNIOR, J. M. **Braquiˆopodes da Formaˆ˜o Pimenteiras(Devoniano mˆedio/superior), na regiˆ˜o sudoeste da bacia do Parnaˆba, municˆpio de Palmas, Estado do Tocantins, Brasil**. Dissertaˆ˜o (Mestrado), 2008, 74 f. Instituto de Geociˆncias, Universidade d Brasˆlia. 2008.

GENTRY, A.H. Tropical forest biodiversity: distributional patterns and their conservational significance. **Oikos**, n. 63, p. 19-82, 1992.

GIˆACOMO, R. G.; CARVALHO, D. C.; PEREIRA, M. G.; SOUZA, A. B.; GAUL, T. D. Florˆstica e fitossociologia em ˆreas de campo sujo e cerrado *sensu stricto* na Estaˆ˜o Ecolˆgica de Pirapitinga – MG. **Ciˆncia Florestal**, Santa Maria, v. 23, n. 1, p. 29-43, 2013.

GIULIE'TTI, A.M. *Byrsonima* do Distrito Federal. In (FERRI, M. G., coord.). **III SIMPˆSIO DO CERRADO**. Sˆo Paulo: Edgar Blˆcher. p. 113-49. 1917.

GODROM, M.; FORMAN, R. T. T. Landscape modification and changing ecological characteristics. In: MOONEY, H. A.; GODRON, M. (Eds.), **Disturbance and ecosystems**, p. 13-28. Ecological studies nˆ44, 1983.

GOMES, B. Z.; MARTINS, F. R.; TAMASHIRO, J. Y. Estrutura do cerradˆo e da transiˆ˜o entre cerrado e floresta paludˆcola num fragmento da International Paper do Brasil Ltda., em Brotas, Sˆo Paulo. **Revista Brasileira de Botˆnica**. v. 27, n. 2, p. 249-262. 2004.

GOODLAND, R. Oligotrofismo e alumˆnio no Cerrado. In: SIMPˆSIO SOBRE CERRADO, 3., 1971, Sˆo Paulo, **Anais...** Sˆo Paulo: Editora Edgard Blˆcher LTDA/Editora Universidade de Sˆo Paulo, 1971, p. 44-59.

GOOGLE EARTH. Imagem Geoeye. Disponˆvel em:< <http://earth.google.com/> >. Acesso em: 2010/2011.

GRESSLER,E.; PIZO, M. A.; MORELLATO, L. P. C. **Polinizaˆ˜o e dispersˆo de sementes em Myrtaceae do Brasil**. Revista Brasil. Bot., v.29, n.4, p.509-530, out.-dez. 2006.

GUARDA, S. D. M. **Expansˆo Urbana do Entorno do Lago do Municˆpio de Palmas – TO (1990, 1993, 1999, 2002, 2005): acompanhamento por dados de sensoriamento remoto**. 2006, 129 f. Dissertaˆ˜o (Mestrado em Ciˆncias do Ambiente). Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2006.

GUERRA, A. T. **Dicionˆrio geolˆgico-geomorfolˆgico**. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.

HAIDAR, R. F.; DIAS, R. R.; PEREIRA, E. Q.; SANTANA, I. T.; REIS, J. S. Mapeamento e reconstituˆ˜o dos ambientes fitoecolˆgicos para o sul do estado do Tocantins por meio de imagens Landsat MSS e TM, e dados geoambientais. XV Simpˆsio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR. **Anais...** Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE, p.2059-2066.

HARIDASAN, M. Aluminium accumulation by some cerrado native species of central Brazil. **Plant and Soil**, n. 65, p.265-273, 1982.

HARIDASAN, M. Performance of *Miconia albicans* (Sw.) Triana, an aluminium accumulating species in acidic and calcareous soils. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, n. 19, p.1091-1103, 1988.

HARIDASAN, M. Solos. In: FELFILI, J. M.; RESENDE, A. V.; SILVS JÚNIOR, M. C. **Biogeografia do bioma cerrado: vegetação e solos da Chapada dos Veadeiros**. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2007. 256 p.

HARIDASAN, M. Nutrição mineral de plantas nativas do cerrado. **Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal**, v. 12, n. 1, p. 54-64, 2000.

HENRIQUES, R. P. B. A viagem que revelou a biodiversidade do Brasil ao Mundo. **Ciência Hoje**, V. 42, N. 252, p. 24-29, 2008.

HILL, M. O. **TWINSpan**: a FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two way table by classification of individual and attributes. Ithaca: Cornell University, 1979. 60 p.

HUBBELL, S.P.; FOSTER, R.B. Commonness and rarity in a neotropical forest: implications for tropical tree conservation. In **Conservation Biology: the science of scarcity and diversity** (M. Soulé, ed.). Sunderland, Massachusetts, p. 205-231. 1986.

HUMBOLDT, A. Essay on the geography of plants. In: LOMOLINO, M. V.; SAX, D. F. BROW, J. H. **Foundations of Biogeography**: classic paper with commentaries. Chicago: The University Of Chicago Press, p. 49-57. 2004.

IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE. 1992.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dados de satélites. Catálogo de imagens LANDSAT (Land Remote Sensing Satellite). Disponível em: <<http://www.dpi.inpe.br/spring/>>. Acesso em: 30 de Jul; 15 de Set.; 10 de Dez. 2010a.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Softwares livres. SPRING (Sistema de Processamento de Informações Geográficas). Disponível em: <<http://www.dpi.inpe.br/spring/>>. Acesso em: 30 de Jul. 2010b.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Biomas. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <<http://siscom.ibama.gov.br/>> Acesso em 26/07/2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Dados Históricos. Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Disponível em: <www.inmet.gov.br> Acesso em 20/12/2012.

INVESTCO. INVESTMENT & CONSTRUCTION DEVELOPMENT CORPORATION. Histórico, ano 2001. Disponível em: <http://www.investco.com.br/dados_usina/caracteristicas_tecnicas/caracteristicas_tecnicas.asp>. Acesso em 23 de Ago. 2011.

JANSEN, S.; SMETS, E.; HARIDASAN, M. Aluminum accumulation in flowering plants. In: BLUMEL, D. D.; RAPPAPORT, A. (Ed). **Mc-Graw Hill Yearbook of Science and Technology**. New York: McGraw-Hill, 2003. p. 11-13.

KENT, M.; COKER, P. **Vegetation description analyses**. London: Behaven Press, 1992. 363 p.

KLEIN, A. L. (Org.). **Eugene Warming e o cerrado brasileiro: um século depois**. São Paulo: Editora UNESP; Imprensa Oficial do Estado, p. 77-91, 2002.

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). **Enciclopédia e dicionário digital 98**. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998.

LEPSCH, I. F. **Formação e conservação dos solos**. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. 178 p.

LEMONS, H. L. **Vegetação arbustivo-arbórea em áreas de Cerrado Típico e Cerrado Rupestre no Estado do Tocantins**. 2013, 82 f. Dissertação (Mestrado), Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal. 2013.

LÍBANO, A. M.; FELFILI, J. M. Mudanças temporais na composição florística e na diversidade de um cerrado *sensu stricto* do Brasil Central em um período de 18 anos (1985-2003). **Acta Botanica Brasilica**. v. 20, n. 4. p. 927-936. 2006.

LIBAULT, A. Os quatro níveis da pesquisa geográfica. **Métodos em Questão**. São Paulo: IGEOG-USP, p. 1-13, 1971.

LIMA, D. A. **Atlas geográfico do Brasil**. IBGE, Rio de Janeiro, 1966.

LIRA, D. C.; MEDEIROS, T. C. C. Caracterização fitofisionômica e levantamento florístico de uma sequência de solos na “propriedade 2”, na serra do Monte do Carmo - Tocantins. V SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFT 2009. **Anais...** PDF. 120.

LIZARDTECH. *GeoExpress View by ILS*. Disponível em: <http://www.lizardtech.com/solutions/geo>. Acesso em: 31 de Jul. 2010.

LOPES, A. S. **Solos sob “Cerrado”**: características, propriedades e manejo. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e da Fosfato. 2ª Ed. 1984. 162 p.

LOPES, A. S.; GUILHERME, L. R. G. **Interpretação da análise de solo: conceitos e aplicações**. São Paulo, ANDA 2004. 22 p. (Boletim Técnico, 2).

LOPES, A. S.; GUILHERME, L. R. G. **Solos sob cerrado: manejo da fertilidade para a produção agropecuária**. São Paulo, ANDA, 1994 (2ª edição). 62p. (boletim técnico, 5).

LOPES, A. S.; SILVA, M. C.; GUILHERME, L. R. G. **Acidez do solo e calagem**. 3ª ed. Ver. / São Paulo, ANDA 1990. 22 p. (Boletim Técnico, 1).

LORENZI, H. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil, vol. 2. 2ª Ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002. 384 p.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil, vol. 1. 2ª Ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008. 384 p.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil, vol. 3. 1ª. Ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008. 384 p.

MACHADO, R. B.; AGUIAR, L. M. S.; CASTRO, A. A. J. F.; NOGUEIRA, C. C.; NETO, M. B. R. Caracterização da fauna e flora do Cerrado. In: IX SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS. IX SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2008, Brasília DF. **Anais...** Brasília, 2008. Capítulo 9.

MACHADO, R. B.; RAMOS NETO, P. PEREIRA, E., CALDAS, E., GONÇALVES, N.; SANTOS, K.; TABOR, K. STEININGER, M. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. **Conservação Internacional do Brasil**, Brasília, 2004.

MAGALHÃES, G. M. Sobre os cerrados de Minas Gerais. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v.38, (Supl.) p.59-70, 1966.

MAMEDE, M. C. H. Anatomia dos órgãos vegetativos de *Camarea* (Malpichiaceae). **Acta Botânica Brasilica**, v. 7, n. 1, p. 3-19, 1993.

MARION, B. S.; MARIMON-JUNIOR, B. H.; MEWS, H. A.; JANCOSKI, H. S.; FRANCAZAK, D. D.; LIMA, H. S.; LENZA, E.; ROSSETTE, A. N.; MORESCO, M. C. Florística dos campos de murundus do Pantanal do Araguaia, Mato Grosso, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 26, n. 1, p. 181-196, 2012.

MARQUES, A. K. **Avaliação da qualidade da água da bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande e da área de sua influência no reservatório da Usina Hidroelétrica Luis Eduardo Magalhães, TO**. 2011, 229 f. Tese (Doutorado em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear-Materiais. Instituto de Pesquisas Energéticas. SÃO PAULO, 2011.

MARTINEZ, F. R. Em torno al valor atual Del paisaje em geografia. **Cadernos Geográficos**, Granada, n. 9, p. 23-42. 1079.

MARTINS, A. K. E.; MONTEIRO, C. B. Uso de geotecnologia para análise de fragmentação do cerrado na paisagem da bacia do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR/INPE. **Anais...** Foz do Iguaçu, PR, Brasil, p. 3763-3770, 2013.

MARTINS, D. D. S.; MARTINS, I. C. M. Quantificação e qualificação dos problemas ambientais por atores sociais do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas – TO. **Revista de Ciências Ambientais**, Canoas, v.2, n.2, p. 25-42, 2008.

MARTINS, F. R. Fitossociologia de florestas no Brasil: um histórico bibliográfico. **Pesquisa série Botânica**, São Leopoldo, n. 40, 1989.

MEDEIROS, J. D. **Guia de campo**: vegetação do Cerrado 500 espécies. Brasília: MMA/SBF, 2011. 534 p.

MEDEIROS, M. B.; MIRANDA, H. S. Mortalidade pós-fogo em espécies lenhosas de campo sujo submetido a três queimadas prescritas anuais. **Acta Botanica Brasilica**. 19(3): 493-500. 2005.

MEDEIROS, M. B.; WALTER, B. M. T.; SILVA, G. P.; GOMES, B. M.; LIMA, I. L. P.; SILVA, S. R.; MOSER, P.; OLIVEIRA, W. L.; CAVALCANTI, T. B. Vascular Flora of the Tocantins River Middle Basin, Brazil. **Check List**, v. 8, n.5, p. 852–885, 2012. Disponível em: <www.checklist.org.br>. Acesso em 10/01/2013.

MEIRA-NETO, J. A. A.; MARTINS, F. R. Composição florística do estrato herbáceo-arbustivo de uma floresta estacional semidecidual em Viçosa - MG. **Revista Árvore**, v. 24, n. 4, p. 407-416. 2000.

MELLO-SILVA, R. Aspectos taxonômicos, biogeográficos, morfológicos e biológicos das Velloziaceae de Grão-Mogol, Minas Gerais, Brasil. **Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo**, n. 14, p. 49-79, 1995.

MELLO-SILVA, R.; MENEZES, N. L. Duas espécies novas de Velloziaceae de Minas Gerais. **Acta Botanica Brasilica**, v.1, n.2, p.195-207, 1988.

MENDONÇA, F. Geografia Física: ciência humana? São Paulo: Contexto, 1991. 72 p.

METZGER, J. P. O que é ecologia de paisagens? *Biota Neotrop.* 1(1/2): 2001. <http://www.biotaneotropica.org.br/v1n12>. Acesso em 20 out.2013.

MORENO, M. I. C.; SCHIAVINI, I.; HARIDASAN, M. Fatores edáficos influenciando na estrutura de fitofisionomias do Cerrado. **Caminhos de Geografia**, v. 9, n. 25, p. 173-194. 2008.

MILAGRES, V. R. **Percepção das paisagens do distrito Taquaruçu**: ouvindo a comunidade local sobre a representatividade, agradabilidade e desagradabilidade de suas paisagens. *Ateliê Geográfico*, v. 3, n. 8, p.130-151, 2009.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA); INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Monitoramento do bioma Cerrado 2009-2010. Brasília, DF, 2011. Disponível em: <http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/cerrado/APRESENTACAO_cerrado_2010.pdf> Acesso em 26/07/2013.

MIRANDA, J. C. Agricultura familiar e desenvolvimento rural: **um olhar sobre a experiência do Assentamento Coqueirinho – Palmas/TO**. 2007. 128f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 2007.

MOREIRA, R. **O que é geografia**. São Pulo: Editora Brasiliense S.A. 1981. 113 p.

MORRONE, J. J. **Biogeografía de América Latina y el Caribe**. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza (España). 2001. 148 p.

MULLER-DOMBOIS, D.; ELLEMBERG, H. **Aims and methods of vegetation ecology**. New york: Willey and Sons, 1974.

MUNHOZ, C. B. R.; FELFILI, J. M. Fenologia do estrato herbáceo-subarbutivo de uma comunidade de campo sujo na Fazenda Água Limpa no Distrito Federal, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 19, n. 4, p. 979-988. 2005.

MUNHOZ, C.B.R. **Padrões de distribuição sazonal e espacial das espécies do estrato herbáceo-subarbutivo em comunidades de campo limpo úmido e de campo sujo**. 2003. 290 f. Tese (Doutorado). Instituto de Ciências Biológicas. Universidade de Brasília. 2003.

MUNHOZ, C.B.R.; FELFILI, J. M. Fitosociologia do estrato herbáceo-subarbutivo de uma área de campo sujo no Distrito Federal, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 20, n. 3, p. 671-685. 2006.

MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; DA FONSECA, G. A. B., KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, n. 403, p. 853-858, 2002.

NASA. National Aeronautics and Space Administration. GeoCover. 2000. Earth Science Applications Directorate-MrSid Image Server. Disponível em: <<https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid>>. Acesso em: 31 de Jul. 2010.

NETO, M. B. R. Caracterização da fauna e flora do Cerrado. In: IX SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS. IX SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2008, Brasília DF. **Anais...** Brasília, 2008. Capítulo 9.

NEVES, S. P. S. **Fenologia, biologia floral e polinização de espécies de Velloziaceae Endl.** em área de campo rupestre na chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 2009. 67 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Feira de Santana. 2009.

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. **Fundamentos de ecologia**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

OLIVEIRA, P. S.; R. J. MARQUIS (Eds.). **The Cerrados of Brazil. Ecology and natural history of a neotropical savanna**. Columbia University Press, New York. 2002.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; FLUMINHAN-FILHO, M. Vegetation ecology of the Parque Florestal Quedas Rio Bonito, Brazil. **CERNE**, v.5, n.2, p.051-064, 1999.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; RATTER, J. A.; SHEPHERD, G. J. F. Floristic composition and community structure of a Central Brazilian gallery forest. *Flora*, n. 184, p. 103-117, 1990.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; MARTINS, F. R. A comparative study of five cerrado areas in southern Mato Grosso, Brazil. **Edinburgh Journal of Botany**, v. 48, n. 3, p. 307-332, 1991.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; RATTER, J. A. A study of the origin of Central Brazilian forests by the analysis of plant species distribution patterns. **Edinburgh Journal of Botany**, v.52, n. 2, p.141-194, 1995.

OLSON, D. M. et al. Terrestrial ecoregions of the World: a new map of life on Earth. **BioScience**, v. 1, n. 11, p. 933-938. 2001.

OSAKI, F. **Calagem e adubação**. Campinas: Instituto Brasileiro de Ensino Agrícola, 1991. 503 p.

PADILHA, D. R. C.; SALIS, S. M.; CRISPIM, S. M. A. Fitossociologia das Espécies Lenhosas em Campo Cerrado no Pantanal de Poconé e Paiaguás. **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento** / Embrapa Pantanal. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2008. Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/download.php?arq_pdf=BP81>. Acesso em 27 de fev 2009.

PAVIANI, T. I.; JERONYMO, A. S. Canais secretores em *Vochysia thyrsoidea* Pohl (Vochysiaceae). **Acta Botanica Brasilica**, Feira de Santana, v. 6, n. 1, p. 88-105, 1992.

PINTO, J. R. R.; OLIVEIRA-FILHO, A. T.; HAY, J. D.V. Influences of soil and topography on the composition of a tree community in a Central Brazilian gallery forests. **Edinburgh Journal of Botany**, v. 62, n. 1&2, p.69-90, 2005.

PIELOU, E. C. **The interpretation of ecological data: a primer on classification and ordination**. New York: John Wiley & Sons, 1987.163p.

PINHEIRO, L. C. S. J.; CASTRO, A. S.; MARTINS, E. S. Levantamento das classes de solo existentes nas Ecorregiões inseridas no limite do Cerrado contínuo. In: IX SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE O CERRADO E II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE SAVANAS TROPICAIS, 2008, Brasília. Simpósio Nacional sobre o Cerrado. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2008. v. 1. p. 1-5.

PONCIANO, L. C. M. O.; FONSECA, V. M. M.; FERNANDES, A. C. S.; MACHADO, D. M. C.; SOUZA, A. R. Afloramento Fossilífero de Oiti, Bacia do Parnaíba, PI - Registro de um mar devoniano no Nordeste do Brasil. In: SCHOBENHAUS, W. M.; C.; SOUZA, C. R. G.; FERNANDES, A. C. S.; BERBERT-BORN, M.; SALLUN FILHO, W.; QUEIROZ, E. T.; (Eds.) **Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil**. Disponível em: <<http://www.unb.br/ig/sigep/sitio051/sitio051.pdf>>. Acesso em: 10 Jul.2011.

Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros/Monitoramento do Cerrado. Disponível em:<<http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/cerrado/>>. Acesso em: 22/07/2013.

RAUNKIAER, C. **Life forms of plants and statistical plant Geography**, Clarendon Press, Oxford. 1934. 632 p.

RATTER, J. A.; ASKEW, G. P.; MONTGOMERY, R. F. GIFFORD, D.R. Observações adicionais sobre o cerradão de solos mesotróficos no Brasil Central. In: SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO, 4., 1977, São Paulo, **Anais...** São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA/Editora Universidade de São Paulo, 1977, p. 303-316.

REATTO, A.; COREIA, J.R.; SPERA, S.T.; MARTINS, E.S. Solos do bioma cerrado: aspectos. In: SANO, S.M. (ORG.). **Cerrado: ecologia e flora**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológicas, 2008, p. 107-149.

RIBEIRO, J. F.; SANO, S. M.; MACÊDO, J.; SILVA, J. A. **Os principais tipos fitofisionômicos da região dos Cerrados**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1983. 28p. (EMBRAPA-CPAC. Boletim de Pesquis, 21).

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. (Org.). **Cerrado: ambiente e flora**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1998, p. 89-166.

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do bioma Cerrado. In: SANO, S. M.;

ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO, J. F. (Eds.). **Cerrado: Ecologia e Flora**. Embrapa Cerrados. Brasília: DF: Embrapa Informações Tecnológicas, v. 1, p. 151-212, 2008.

RIBEIRO, J.F.; WALTER, B.M.T. Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. **Cerrado: ambiente e flora**. Planaltina. EMBRAPA-CPAC, p.89-166, 1998.

RICKLEFS, R. E. **A economia da natureza**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

RIZZINI, C. T. 1997. **Tratado de Fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos**. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Edições LTDA, 1997.

RIZZINI, C. T. Nota prévia sobre a divisão fitogeográfica do Brasil. **Revista Brasileira de Geografia**, Ano XXV, n. 1, p. 3-64, 1963.

RIZZINI, C. T. **Tratado de fitogeografia do Brasil**. São Paulo: Hucitec; EDUSP, v. 2, 1979. 794 p.

RODEL, L. G. Cerrados de altitude e campos rupestres do Parque Estadual do Ibitipoca, sudeste de Minas Gerais: distribuição florística por subfisionomias da vegetação. **Revista do Departamento de Geografia**, n. 12, p. 163-189, 1998.

RODRIGUES, E.; CAINZOS, R. L. P.; QUEIROGA, J.; HERRMANN, B. C. Conservação em paisagens fragmentadas. In: CULLEN JR. L.; RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, C. (Orgs.). **Métodos de estudos em Biologia da Conservação & Manejo da Vida Silvestre**. Curitiba: Ed. UFPR; Fundação O Boticário, p. 481-511, 2004.

ROMARIZ, D.A. **Aspectos da vegetação do Brasil**. 2 ed. São Paulo: Edição da Autora, 1996. 60 p.

ROSSI, C. V.; SILVA JÚNIOR, M. C.; SANTOS, C. E. N. Fitossociologia do estrato arbóreo do Cerrado (*sensu stricto*) no Parque Ecológico Norte, Brasília-DF. **Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer**, n. 2, p.49-56. 1998.

ROUGERIE, G. **Geografia das paisagens**. Tradução de Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Difusão Européia do Livro. 1969. 133 p.

SALVADOR, G. S.; CERVI, A. C.; BROTTTO, M. L.; SANTOS, E. P. A família Ochnaceae DC. no estado do Paraná, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 24, n. 2, p. 423-434. 2010.

SAMPAIO, A. B.; NUNES, R. V.; WALTER, B. M. T. Fitossociologia de uma mata de galeria na Fazenda Sucupira do CENARGEN, Brasília-DF. In: L. L. Leite, C. H. Saito (Eds.). **Contribuição ao Conhecimento Ecológico do Cerrado**. Dept. Ecologia-Universidade de Brasília. Brasília, p. 29-37. 1997.

SAMPAIO, A. J. **Phytogeographia Pedagógica Brasileira**. Biblioteca Pedagógica Brasileira. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional. 2ª Ed. Série 5ª Brasileira, v. 35. 1938. 334 p.

SANO, E. E. (Coord.) **Mapeamento de cobertura vegetal do bioma Cerrado** (Relatório Final). Brasília, DF, 2007. 93p. Disponível em:<http://mapas.mma.gov.br/geodados/brasil/vegetacao/vegetacao2002//cerrado/documentos/relatorio_final>. Acesso em 10 set. 2011.

SANO, E. E. **Treinamento e seleção em sensoriamento remoto**. Belém: SUDAM/OEA, 1987.

SANTOS, H. G.; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. ; OLIVEIRA, V. A. OLIVEIRA, J. B. ; COELHO, M. R. ; LUMBRERAS, J. F.; CUNHA, T J F ; GOMES, J. B. V. ; et al. . **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, v. 1, 2006.

SANTOS, L. B. Aspecto geral da vegetação do Brasil. **Boletim Geográfico**, Rio de Janeiro, ano 1, n. 5, p. 68-73, 1943.

SANTOS, M. E. C. M.; CARVALHO, M. S. S. **Paleontologia das Bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís**. Rio de Janeiro, Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB. CPRM-Serviço Geológico do Brasil/DIEDIG/DEPAT, 2004. livro eletrônico em formato pdf.

SANTOS, R. D.; LEMOS, R. C.; SANTOS, H. G.; KER, J. C.; ANJOS, L. H. C. **Manual de descrição e coleta de solo no campo**. Viçosa, Sociedade Brasileira de Ciência de Solo, 2005. 100 p.

SANTOS, T. R. R. **Fitogeografia da vegetação arbustivo-arbórea em áreas de cerrado rupestre no Estado de Goiás**. 2011. 110 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Tecnologia do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. 2011.

SAPORETTI JÚNIOR, A. W.; MEIRA NETO, J. A. A.; ALMADO, R. P. Fitossociologia de cerrado *sensu stricto* no município de Abaeté-MG. **Revista Árvore**, v.27, n.3, p.413-419, 2003.

SCHOBENHAUS, C.; NEVES, B. B. B. In: BIZZI, L. A. SCHOBENHAUS, C.; VIDOTTI, R. M.; GONÇALVES, J. H. (Eds.). **Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil**. Brasília: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2003. cap. 1, p. 5-25.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SEDUH). **Microbacias do município de Palmas**. Secretária do Desenvolvimento Urbano e Habitação/Gerência de Informações urbanísticas e Georreferenciamento. Prefeitura Municipal de Palmas. Palmas: SEDUH. Disponível em:

<http://201.90.134.51/portalprefeitura/servicos/seduh/dados/mapastematicos/m013a2007_microbacias_municipio_palmas_a3_arcgis92.pdf>. Acesso em: 06 de Jun. 2011.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN). **Atlas do Tocantins:** Subsídios ao planejamento da gestão territorial. Secretária do planejamento e Meio Ambiente, Superintendência de Pesquisa e Zoneamento Ecológico Econômico, Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico. 3ª ed. Palmas: SEPLAN, 2008.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN). **Atlas do Tocantins:** Subsídios ao planejamento da gestão territorial. Secretária do planejamento e Meio Ambiente, Superintendência de Pesquisa e Zoneamento Ecológico Econômico, Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico. 6ª ed. Palmas: SEPLAN, 2012.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT. Plano de manejo do Parque Estadual do Cristalino. Vol. I: Diagnóstico Ambiental e Sócioeconômico. Cuiabá, 2009.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SMA). RESOLUÇÃO SMA 20, DE 09-03-98. **D.O.E** /DATA PUB. 10/03/1998. SEÇÃO I /VOLUME 109. PÁGINA 20 /FASC. 08. 12 p. Acesso em 15/07/2013 www.ambiente.sp.gov.br

SEGARRA, V. D. **Aportes ao conhecimento da flora e diversidade do bioma Cerrado do Brasil e da Bolívia.** 2011. 98 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Ciências Biológicas. Universidade de Brasília. 2011.

SHEPHERD, G. J. **Fitopac 2. Manual do usuário.** Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1995.

SILVA, D. B. ; SILVA, J. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.; ANDRADE, L. R. M. **Frutas do cerrado.** Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 2001. 178 p.

SILVA, A. J. P.; LOPES, R. C.; VASCONCELOS, A. M.; BAHIA, R. B. C. In: BIZZI, L. A. SCHOBENHAUS, C.; VIDOTTI, R. M.; GONÇALVES, J. H. (Eds.). **Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil.** Brasília: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2003. cap. 2, p. 55-85.

SILVA, J. M. C.; BATES, J. M. Biogeographic patterns and conservation in the South American Cerrado: a tropical savanna hotspot. **BioScience**, n. 52, p. 225-233, 2002.

SILVA, W. M.; ALVES, Y. M. CANDEIRO, R. A. Coleção de icnofósseis da Bacia do Parnaíba depositada no Laboratório de Paleobiologia da Universidade Federal do Tocantins. **Revista de Biologia e Ciências da Terra**, v. 10, n. 1, p.67-77, 2010.

SILVA-JÚNIOR, M. C.; PEREIRA, B. A. S. + **100 árvores do cerrado – Matas de Galeria:** guia de campo. Brasília, Ed. Rede de Sementes do Cerrado, 2009. 288 p.

SIQUEIRA NETO, M.; PICCOLO, M. C.; SCOPEL, ERIC.; COSTA JUNIOR, C.; CERRI, C. C.; BERNOUX, M. Carbono total e atributos químicos com diferentes usos do solo no Cerrado. **Acta Scientiarum. Agronomy Maringá**, v. 31, n. 4, p. 709-717, 2009.

SMITH, L. B.; AYENSU, E. S. A Revision of American Velloziaceae. **Smithsonian Contributions to Botany** 30: i-viii + 1-172. 1976.

SOARES JÚNIOR, F. J.; SILVEIRA, C. L. Diagnóstico da composição, estrutura e conservação da vegetação da região de Liberdade, sul de Minas Gerais, Brasil. **SaBios: Revista Saúde e Biologia**, v.5, n.2, p.43-59, jan./abr, 2011.

SOARES, J. J.; SOUZA, M. H. A.; LIMA, M. I. S. Twenty yars of post-fire plant succession in a “Cerrado”, São Carlos, SP, Brazil. **Brazil Journal Biology**, v. 66, n. 2B, p. 587-602, 2006.

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. **Cerrado: correção do solo e adubação**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p.

SOUZA, F. N. S.; CREMON, C.; MAPELI, N. C.; SENA, C. G.; CARVALHO, J. M. Atributos físicos do solo em fitofisionomias do cerrado mato-grossense e em pastagem degradada. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 3., 2010, Cáceres/MT. **Anais...** Cáceres/MT: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG. Vol. 6. Cód. 1561. CDROM 2178-7492.

SOUZA, M. A. V. **Dinâmica da paisagem na bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande no município de Palmas-TO**. 2006. 90 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Tocantins. Palmas. 2006.

STANNARD, B. L.; HARLEY, R. M.; HARVEY, Y. B. Flona of the Pico das Almas, Chapada Diamantina – Bahia, Brasil. Surrey, Great Britain; Royal Botanic Gardens, Kew; Ed. Whitstable Litho Ttd. 1995.

TAKHTAJAN, A. **Floristic Regions of the World**. University of California Press, Berkeley, 1986.

TANNUS, J. L. S.; ASSIS, M. A. Composição de espécies vasculares de campo sujo e campo úmido em área de cerrado, Itirapina – SP, Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, v.27, n.3, p.489-506, 2004.

TANNUS, J.L.S.; ASSIS, M.A.; MORELLATO, L.P.C. Fenologia reprodutiva em campo sujo e campo úmido numa área de Cerrado no sudeste do Brasil, Itirapina - SP. **Biota Neotropica**. Sep/Dec 2006 vol. 6, no. 3 Disponível em:<<http://www.biotaneotropica.org.br/>> Acesso em 20 de abr 2010.

THE NATURE CONSERVANCY. Conservation Action Planning: Developing Strategies, Taking Action, and Measuring Success at Any Scale. Overview of Basic Practices Version: February 2007.

TOME JÚNIOR, B. **Manual para interpretação de análise de solo**. Guaíba: Agropecuária, 1997. 247p.

THOEH, F. R.; THOMPSON, L. M. *Solos e fertilidades do solo*. São Paulo: Organização Andrec. 2007.

TURNER, M. G. Ecologia da paisagem: o efeito dos padrões nos processos. **Annual Review of Ecology and Systematics**, n. 20, p. 171-197, 1989.

UDVARDY, M. D. F. **A classification of the biogeographical provinces of the world**. Morges (Switzerland): International Union of Conservation of Nature Resource, IUCN Occasional Paper no.18, 1975. 48 p.

Universidade do Tocantins (UNITINS); Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). **Plano de Manejo da Sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu Grande – (S.O.S TAQUARUÇU)**. Palmas, 1999.

VALE, C.C. Teoria geral do sistema: histórico e correlações com a geografia e com o estudo da paisagem. **Entre-Lugar**, n. 6, p. 58-108, 2012.

VASCONCELOS, M. F. O que são campos rupestres e campos de altitude nos topos de montanha do Leste do Brasil? **Revista Brasil. Bot.**, V.34, n.2, p.241-246, 2011.

VELOSO, H. P. **Atlas florestal do Brasil**, Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura, Serviço de Informação, 82 p. 1966.

VELOSO, H. P.; GÓES FILHO, L. Fitogeografia Brasileira - classificação fisionômica ecológica da vegetação neotropical. Boletim Técnico. Projeto RADAMBRASIL, Série vegetação, Salvador, n. 1, P. 1-80. 1982.

VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 1991. 124 p.

VIANA, P. L.; LOMBARDI, J. A. Florística e caracterização dos campos rupestres sobre cangana Serra da Calçada, Minas Gerais, Brasil. **Rodriguesia**, v. 58, n.1, p. 159-177, 2007.

VICENTE, L.E.; PEREZ FILHO, A. Abordagem Sistêmica e Geografia. Rio Claro: **Revista Geografia**, v. 28, n.3, p. 323-344, 2003.

VILLARROEL, S. D. **Aportes ao conhecimento da flora e diversidade do bioma Cerrado do Brasil e da Bolívia**. 2011. 98 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de ciências Biológicas, Departamento de Botânica, Programa de Pós-Graduação em Botânica. 2011.

WALTER, B. M. T. **Fitofisionomias do bioma Cerrado: síntese terminológica e relações florísticas**. 2006. 389 f. Tese (Doutorado). Instituto de Ciências Biológicas da Universidade e Brasília. 2006.

WALTER, H. **Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global**. Tradutoras Anna Terzi Giova, Hildegard T. Buchup; revisão técnica e notas Antônio Lambert. São Paulo: EPU, 1986.

WALTER, H.; HARNICKELL, E.; MULLER-DOMBOIS, D. **Climate diagram maps of the individual continents and the ecological climatic regions of the earth**. Supplement to: The Vegetation Monographs. Springer-Verlag. New York. 1975.

WALTER, H.; LIETH, H. **Klimadiagramm-Weltatlas**. Jena: Pustl. Gustav Fischer, 1967.

WARMING, E. **Lagoa Santa**. São Paulo: EDUSP/Belo Horizonte: Itatiaia, 1973. 284p. Original de 1892. Inclui “A vegetação de cerrados brasileiros” por M.G.Ferri.

WOOD, J. R. I (Ed.). **Guia Darwing de las plantas de lós cerrados de La Chiquitania**. Santa Cruz, Bolivia, 2011. 214 p.

ZUNINO, M.; ZULLINI, A. **Biogeografía**: la dimensión espacial de la evolución. Ciudad de México: FCE, 2003.