THIAGO OLITTA BASSO

MELHORAMENTO DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA EM

Saccharomyces cerevisiae

POR ENGENHARIA EVOLUTIVA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia USP / Instituto Butantan / IPT, para obtenção do Título de Doutor em Biotecnologia.

São Paulo
2011

THIAGO OLITTA BASSO

MELHORAMENTO DA FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA EM

Saccharomyces cerevisiae

POR ENGENHARIA EVOLUTIVA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia USP / Instituto Butantan / IPT, para obtenção do Título de Doutor em Biotecnologia.

Área de concentração: Biotecnologia

Orientador:
Andreas Karoly Gombert

Co-orientador:
Aldo Tonso

São Paulo
2011

DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

© reprodução total

Basso, Thiago Olitta.

Melhoramento da fermentação alcoólica em *Saccharomyces cerevisiae* por engenharia evolutiva / Thiago Olitta Basso. -- São Paulo, 2011.

Orientador: Andreas Karoly Gombert.

Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia USP/IPT/Instituto Butantan. Área de concentração: Biotecnologia. Linha de pesquisa: Fisiologia e engenharia metabólica de leveduras.

Versão do título para o inglês: Improvement of alcoholic fermentation in *Saccharomyces cerevisiae* by evolutionary engineering.

Descritores: 1. Sacarose 2. *Saccharomyces cerevisiae* 3. Invertase 4. Engenharia evolutiva 5. Etanol 6. *AGT1* I. Gombert, Andreas Karoly II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia USP/IPT/Instituto Butantan III. Título.

ICB/SBIB62/2011

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia
Universidade de São Paulo, Instituto Butantan, Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Candidato(a): Thiago Olitta Basso.

Título da Tese: Melhoria da fermentação alcoólica em *Saccharomyces cerevisiae* por engenharia evolutiva.

Orientador(a): Andreas Karoly Gombert.

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão pública realizada a/...../....., considerou

() Aprovado(a)

() Reprovado(a)

Examinador(a): Assinatura:
 Nome:
 Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
 Nome:
 Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
 Nome:
 Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
 Nome:
 Instituição:

Presidente: Assinatura:
 Nome:
 Instituição:

Ao meu amor Luisa, por ser quem é...

te amo!

Aos meus pais e irmãos pelo carinho, exemplo e apoio

durante toda a minha vida!

Sem vocês simplesmente não seria!

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Prof. Andreas Karoly Gombert pela sábia orientação e oportunidades concedidas. Espero muito por transmitir todos os ensinamentos que aprendi com ele durante estes quatro anos;

Ao meu co-orientador Prof. Aldo Tonso pela dedicação constante em desenvolver e aprimorar o sistema de cultivos contínuos do LEB (parte fundamental deste doutoramento), pela amizade e também pelos passeios inusitados no comércio da Santa Ifigênia e arredores;

Ao Prof. Boris Stambuk por compartilhar uma das suas linhas de pesquisa, pelas sugestões ao longo do trabalho e por dividir comigo sua vasta experiência sobre o metabolismo de leveduras;

Ao amigo Marcelo Dário, companheiro de labuta nos “itermináveis” cultivos contínuos, pelo apoio e dedicação em inúmeras etapas experimentais deste projeto de doutoramento;

Aos Prof. Jack Pronk, Prof. Ton van Maris, Prof. Jean-Marc Daran e ao doutorando Ir. Stefan de Kok pela profunda dedicação ao projeto e excelente clima de trabalho proporcionado durante o ano passado em Delft no Industrial Microbiology Group (Delft University of Technology);

Às pessoas que participaram desta trajetória, seja no Brasil ou na Holanda, ensinando-me muito sobre ciência e convivência ao longo de todo o caminho! Os nomes de cada um de vocês sempre passam pela minha mente e acredito que ao colocá-los neste texto em ordem alfabética, como é de costume, deixaria nossa relação deveras “protocolar”. Esta nunca foi nem nunca será a minha intenção e gostaria de registrar os meus sinceros agradecimentos à cada um de vocês! MUITÍSSIMO OBRIGADO!

Ao Laboratório de Engenharia Bioquímica do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo;

Ao Laboratório de Tecnologia de Leveduras do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura de Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo;

À CAPES pela concessão da bolsa de doutoramento e da bolsa de estágio-sanduíche, modalidade PDEE, processo 2388-0/09;

Ao CNPq pelo auxílio concedido na modalidade Edital Universal, projeto “Engenharia Evolutiva de Leveduras”, Edital MCT/CNPq/02/2006, processo 484785/2006-0;

À FAPESP pelo auxílio concedido na modalidade “Auxílios Regulares”, dentro do Programa BIOEN, projeto “Engenharia Evolutiva de Leveduras”, processo 2007/59776-7.

“To alcohol: the cause of... and solution to... all of life's problems.”

Homer J. Simpson

RESUMO

Basso TO. Melhoramento da fermentação alcoólica em *Saccharomyces cerevisiae* por engenharia evolutiva. [Tese (Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

Durante o crescimento da levedura *Saccharomyces cerevisiae* em meios contendo sacarose, a enzima invertase hidrolisa a sacarose no ambiente extracelular em glicose e frutose, as quais são posteriormente captadas pelas células por difusão facilitada. Num trabalho prévio, a localização da enzima invertase foi modificada nesta levedura, eliminando-se a forma extracelular e superexpressando-se a forma intracelular da enzima (Stambuk et al., 2009). Como resultado, a captação de sacarose por esta linhagem modificada (*iSUC2*) é realizada pelo co-transporte ativo com íons H^+ , implicando no gasto de 1 mol de ATP para cada mol de H^+ extrudado pelas células para manutenção do pH intracelular. Como forma de compensar este gasto energético, espera-se que a linhagem *iSUC2* desvie uma maior parte do fluxo de carbono para a geração de energia e, conseqüentemente, para a formação de etanol, em relação a uma linhagem selvagem. No presente trabalho, uma avaliação fisiológica quantitativa de uma linhagem com esta modificação genética foi realizada tanto em quimiostatos limitados por sacarose, como em cultivos descontínuos com sacarose como única fonte de carbono. Os dados obtidos em quimiostatos anaeróbios demonstram que na linhagem *iSUC2* a enzima invertase ficou retida no ambiente intracelular e apresentou atividade absoluta total cerca de duas vezes maior que na linhagem-referência (*SUC2*). Além disto, verificou-se um aumento de 4% no fator de conversão de sacarose a etanol ($Y_{ETH/S}$), em relação à linhagem *SUC2*. No entanto, como foi observado que cerca de 8 % da sacarose não foi consumida pelas células da linhagem *iSUC2* durante o estado-estacionário dos quimiostatos anaeróbios, decidiu-se melhorar a capacidade do transporte ativo deste dissacarídeo nesta linhagem através de uma estratégia de engenharia evolutiva caracterizada pelo cultivo destas células em quimiostatos longos limitados por sacarose, em anaerobiose. Obteve-se assim, após cerca de 60 gerações, uma linhagem mutante (*iSUC2* evoluída) com atividade de transporte de sacarose 20 vezes superior à linhagem *iSUC2*, sendo capaz de consumir toda a sacarose do meio de cultivo. Esta linhagem apresentou um aumento de 11% no $Y_{ETH/S}$ e uma diminuição de 27% no fator de conversão de sacarose a células ($Y_{X/S}$), quando comparada à linhagem-referência. A análise do transcriptoma revelou

o aumento da expressão de vários genes codificadores de transportadores de hexoses, bem como genes relacionados ao metabolismo de maltose, incluindo o gene do transportador de alta-afinidade para alfa-glicosídeos *AGT1*, quando a linhagem *iSUC2* evoluída foi comparada à linhagem *iSUC2*. Detectou-se que a evolução em quimiostato resultou na duplicação do gene *AGT1*, sem que houvesse mutação neste gene. Através da superexpressão do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2*, conseguiu-se gerar uma linhagem que apresentou $Y_{\text{ETH/S}}$ muito próximo ao da linhagem *iSUC2* evoluída. No entanto, outros parâmetros fisiológicos, foram diferentes nestas duas linhagens, indicando que a duplicação do gene *AGT1* não foi a única mutação que ocorreu durante o processo de evolução em quimiostato. Este trabalho ilustra o potencial da combinação entre engenharia metabólica e engenharia evolutiva para a obtenção de linhagens de levedura melhoradas, para aplicação na produção industrial de etanol combustível a partir de meios contendo sacarose.

Palavras-chave: Sacarose. *Saccharomyces cerevisiae*. Invertase. Engenharia evolutiva. Etanol. *AGT1*.

ABSTRACT

Basso TO. Improvement of alcoholic fermentation in *Saccharomyces cerevisiae* by evolutionary engineering. [Ph.D. Thesis (Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

When growing on sucrose-containing substrates, *Saccharomyces cerevisiae* secretes invertase that hydrolyses sucrose into glucose and fructose, which are subsequently assimilated by facilitated diffusion. In a previous work, the cellular location of invertase in yeast was modified, by eliminating the extracellular form of the enzyme and over-expressing the intracellular one (Stambuk et al., 2009). As a result, sucrose uptake by this modified strain (*iSUC2*) occurs by an active H⁺-sucrose symport system, in which 1 ATP needs to be used by the cells to extrude the proton co-transported. In order to compensate for this, it is expected that these cells will deviate a higher proportion of the carbon flow towards energy generation, and consequently to ethanol formation, in comparison with the wild-type phenotype (*SUC2*). In the present work, a quantitative physiological evaluation of the *iSUC2* strain was performed in both batch and chemostat cultures. Cells from the *iSUC2* strain harvested from steady-state anaerobic sucrose-limited chemostats retained all invertase intracellularly and showed a 2-fold higher total invertase activity, when compared to the *SUC2* strain grown under identical conditions. Besides this, the ethanol yield on sucrose in the former cells was 4% higher than in the latter case. However, due to the high levels of residual sucrose during these cultivations with the *iSUC2* strain, we attempted to improve the transport capacity in the *iSUC2* strain by evolutionary engineering. After 60 generations of cultivation in an anaerobic sucrose-limited chemostat, an evolved strain was selected, which presented a 20-fold increase in the sucrose transport capacity, when compared with the parental strain (*iSUC2*), leading to almost no residual sucrose. During growth of this evolved strain in anaerobic sucrose-limited chemostats, the ethanol yield on sucrose was 11% higher and the biomass yield on sucrose was 27% lower, when compared with the *SUC2* strain. Transcriptome analysis revealed an increase in the expression level of several hexose transporters, as well as many *MAL*-related genes, including the gene for the high-affinity permease *AGT1*. Indeed, it was verified that this gene was duplicated during the evolution experiment, but no point mutation was detected. By over-expressing the *AGT1* gene in the *iSUC2* strain, it was possible to attain a similar ethanol yield on sucrose, when compared to

the evolved *iSUC2* strain. However, several other physiological parameters were different in both strains, indicating that the *AGT1* gene duplication was not the only mutation that occurred during evolution in the chemostat. To conclude, this work illustrates that the combination of metabolic and evolutionary engineering is a powerful strategy to obtain improved sucrose-fermenting yeast strains.

Keywords: Sucrose. *Saccharomyces cerevisiae*. Invertase. Evolutionary engineering. Ethanol. *AGT1*.

LISTA DE SÍMBOLOS

Abs_{600}	absorbância a 600 nm
D	vazão específica de alimentação (h^{-1})
DW	massa seca de células (" <i>dry weight</i> ")
ETH	etanol
FC	capacidade fermentativa [$mmol\ ETH.(g\ DW.h)^{-1}$]
g GLC eq	gramas de glicose (hexose) equivalentes; onde 1 g de sacarose é igual a 1,053 g de glicose (hexose) equivalente
GLC	glicose
GLYC	glicerol
K_m	constante de Michaelis-Menten ou constante de saturação pelo substrato
mmol GLC eq	mmol de glicose (hexose) equivalentes; onde 1 mmol de sacarose é igual a 2 mmol de glicose (hexose) equivalentes
LAC	lactato
PYR	piruvato
q_{ACE}	velocidade específica de produção de acetato [$mmol\ ETH.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{CO_2}	velocidade específica de produção de CO_2 [$mmol\ ETH.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{ETH}	velocidade específica de produção de etanol [$mmol\ ETH.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{GLYC}	velocidade específica de produção de glicerol [$mmol\ GLYC.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{LAC}	velocidade específica de produção de lactato [$mmol\ LAC.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{O_2}	velocidade específica de consumo de oxigênio [$mmol\ O_2.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{PYR}	velocidade específica de produção de piruvato [$mmol\ PYR.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_S	velocidade específica de consumo de substrato [$mmol.(g\ DW.h)^{-1}$]
q_{SUCC}	velocidade específica de produção de succinato [$mmol\ SUCC.(g\ DW.h)^{-1}$]
SUC	sacarose
SUCC	succinato
V_{max}	velocidade específica máxima de transporte de sacarose [$nmol.(mg\ DW.min)^{-1}$]
$V_{transporte}$	velocidade específica de transporte de sacarose [$nmol.(mg\ DW.min)^{-1}$]
$Y_{ETH/S}$	fator de conversão de substrato em etanol ($g\ ETH.g\ substrato^{-1}$)
$Y_{X/S}$	fator de conversão de substrato a biomassa ($g\ DW.g\ substrato^{-1}$)

$\mu_{\max}$

velocidade específica máxima de crescimento (h^{-1})

LISTA DE ABREVIATURAS

cAMP	Adenosina monofostato cíclico
LEB/USP	Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade de São Paulo
LMI/TU Delft	Laboratório de Microbiologia Industrial da Delft University of Technology
SGD	<i>Saccharomyces</i> Genome Database
P_{ADH1}	Promotor do gene <i>ADH1</i> (Álcool desidrogenase)
pb	pares de bases
P_{TDH3}	Promotor do gene <i>TDH3</i> (Triose Fosfato Desidrogenase)
P_{TPI1}	Promotor do gene <i>TPI1</i> (Triose Fosfato Isomerase)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - Esquema resumido das duas vias (extra- e intracelular, mediadas pelas enzimas invertase extracelular e invertase intracelular, respectivamente) para o metabolismo da sacarose em <i>S. cerevisiae</i> .	23
Figura 2.1 - Esquema da estrutura genética do gene <i>SUC2</i> em <i>S. cerevisiae</i> .	31
Figura 2.2 - Esquema geral da estrutura genética dos loci <i>MAL</i> em <i>S. cerevisiae</i> .	33
Figura 4.1 - Configuração geral do sistema de biorreatores para cultivos contínuos, em regime de aerobiose e anaerobiose, empregado no presente estudo.	48
Figura 4.2 - Plasmídeo pRS406 utilizado para se obter o fragmento de 523 pb empregado para reconstrução do gene <i>URA3</i> nas linhagens auxotróficas para a uracila.	57
Figura 4.3 - Plasmídeo pUGhphN utilizado para se obter o cassete de transformação com 1949 pb para deleção da cópia extra do gene <i>AGT1</i> na linhagem IMM-008 (<i>iSUC2</i> evoluída $\Delta agt1$).	61
Figura 4.4 - Plasmídeo pUG6-TPI1prom utilizado para se obter o cassete de transformação com 2301 pb para obtenção da linhagem que superexpressa o gene <i>MAL13</i> por ação do promotor forte P_{TPI1} (IMI-066; <i>iSUC2</i> P_{TPI1} - <i>MAL13</i>).	63
Figura 4.5 - Plasmídeo pAG306GPD- <i>MAL11</i> utilizado para se obter o cassete de transformação com 7725 pb para obtenção da linhagem que superexpressa uma cópia extra do gene <i>AGT1</i> por ação do promotor forte P_{TDH3} (IMI-067; <i>iSUC2</i> P_{TDH3} - <i>AGT1</i>).	64
Figura 5.1 - Atividade de invertase nas linhagens <i>SUC2 ura-</i> e <i>iSUC2 ura-</i> .	78
Figura 5.2 - Atividade de transporte de [U- ¹⁴ C]sacarose nas linhagens <i>SUC2 ura-</i> e <i>iSUC2 ura-</i> .	85
Figura 5.3 - Cultivos descontínuos (em frasco agitado) com as linhagens <i>SUC2 ura-</i> (A, C) e <i>iSUC2 ura-</i> (B, D).	87
Figura 5.4 - Perfil de CO ₂ no gás de saída em cultivos descontínuos com as linhagens <i>SUC2</i> (linhas pretas tracejadas); <i>iSUC2</i> (linhas pretas sólidas); e <i>iSUC2</i> $\Delta agt1$ (linhas cinzas).	90
Figura 5.5 - Cultivos descontínuos em anaerobiose plena com as linhagens <i>SUC2</i> (A,C) e <i>iSUC2</i> (B,D).	92
Figura 5.6 - Atividade de invertase nas linhagens <i>SUC2</i> , <i>iSUC2</i> e <i>iSUC2</i> evoluída.	96
Figura 5.7 - Atividade de co-transporte de sacarose com H ⁺ nas linhagens <i>SUC2</i> , <i>iSUC2</i> , <i>iSUC2</i> evoluída, <i>iSUC2</i> evoluída $\Delta agt1$, <i>iSUC2</i> evoluída $\Delta/\Delta agt1$, <i>iSUC2</i> P_{TDH3} - <i>AGT1</i> , <i>iSUC2</i> P_{TPI1} -	

<i>MAL13</i> . A atividade de transporte foi determinada em células coletadas durante o estado-estacionário de quimiostatos limitados por sacarose em anaerobiose.....	100
Figura 5.8 - Conteúdo de carboidratos de reserva em células de levedura, coletadas durante o estado estacionário de quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose.....	101
Figura 5.9 - Experimento de evolução com a linhagem <i>iSUC2</i>	103
Figura 5.10 - Verificação da presença, bem como confirmação da deleção do gene <i>AGT1</i> nas linhagens <i>iSUC2</i> (A), <i>iSUC2</i> $\Delta agt1$ (B), <i>iSUC2</i> evoluída (C), <i>iSUC2</i> evoluída $\Delta agt1$ (D) e <i>iSUC2</i> evoluída $\Delta/\Delta agt1$ (E).	105
Figura 5.11 - Cultivos descontínuos em anaerobiose plena com a linhagem <i>iSUC2</i> evoluída.	110
Figura 5.12 - Cinéticas de transporte de sacarose para as linhagens <i>iSUC2</i> (O) e <i>iSUC2</i> evoluída (●).	113

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Principais parâmetros fisiológicos de <i>S. cerevisiae</i> (linhagem 248 UNSW 703100) durante o crescimento em sacarose ou em misturas de glicose e frutose, sob regime de aerobiose.....	39
Tabela 4.1 - Linhagens utilizadas neste projeto.	45
Tabela 4.2 - Primers utilizados.....	60
Tabela 5.1 - Parâmetros fisiológicos da linhagem <i>SUC2 ura-</i> (CEN.PK113-5D) durante o estado estacionário em quimiostatos aeróbios limitados por diferentes nutrientes.	71
Tabela 5.2 - Parâmetros fisiológicos teóricos, para o crescimento de <i>S. cerevisiae</i> em quimiostatos limitados por sacarose em plena anaerobiose ($D = 0,10 \text{ h}^{-1}$).....	77
Tabela 5.3 - Parâmetros fisiológicos das linhagens <i>SUC2 ura-</i> (referência) e <i>iSUC2 ura-</i> (ausência de invertase extracelular e super-expressão da invertase intracelular) durante o estado estacionário em quimiostatos limitados por sacarose ou glicose em aero- ou anaerobiose.....	81
Tabela 5.4 - Parâmetros fisiológicos das linhagens <i>SUC2</i> (CEN.PK113-7D, linhagem-referência), <i>iSUC2</i> (ausência de invertase extracelular e super-expressão da invertase intracelular; IMI-056), <i>iSUC2</i> evoluída (linhagem evoluída obtida em quimiostatos anaeróbios longos limitados por sacarose, a partir da linhagem <i>iSUC2</i> ; IMM-007), <i>iSUC2</i> evoluída $\Delta agt1$ (IMM-008), <i>iSUC2</i> evoluída $\Delta/\Delta agt1$ (IMM-009), <i>iSUC2</i> $P_{TPII} MAL13$ (IMI-066) e <i>iSUC2</i> $P_{TDH3} AGT1$ (IMI-067) durante o estado estacionário em quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose.....	98
Tabela 5.5 - Lista de alguns genes (envolvidos no metabolismo de sacarose) com expressão aumentada na linhagem <i>iSUC2</i> evoluída em relação à <i>iSUC2</i> , durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose.....	116
Tabela 5.6 - Lista dos 9 genes com expressão diminuída na linhagem <i>iSUC2</i> em relação à <i>SUC2</i> (linhagem-referência), durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose.....	117

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	21
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	25
2.1	Engenharia Metabólica de <i>S. cerevisiae</i> para o melhoramento da produção de etanol combustível.....	25
2.2	A Engenharia Evolutiva como ferramenta complementar à Engenharia Metabólica	27
2.3	Metabolismo de sacarose em <i>S. cerevisiae</i>	30
2.3.1	<i>Via extracelular e via intracelular</i>	30
2.3.2	<i>Transporte ativo de sacarose através da membrana plasmática de leveduras</i>	31
2.3.3	<i>Regulação gênica dos loci MAL</i>	35
2.3.4	<i>Regulação gênica dos loci SUC</i>	37
2.4	Fisiologia quantitativa de <i>S. cerevisiae</i> durante o crescimento em sacarose ou em misturas de glicose e frutose.....	38
3	OBJETIVOS.....	42
4	MATERIAIS E MÉTODOS	44
4.1	Linhagens de levedura e preservação	44
4.2	Meios de cultivo.....	45
4.3	Condições de cultivo	46
4.3.1	<i>Cultivo em frasco agitado</i>	46
4.3.2	<i>Cultivos em quimiostato</i>	47
4.3.3	<i>Cultivos em bateladas repetidas (SBR)</i>	49
4.4	Determinação da fração molar de O ₂ e CO ₂ no gás de saída do biorreator.....	50
4.5	Quantificação da concentração de metabólitos extracelulares e intracelulares	50
4.6	Quantificação da concentração celular	51
4.7	Inspeção da pureza da cultura.....	52
4.8	Medida da capacidade fermentativa	52
4.9	Determinação da atividade de invertase extracelular e total.....	52
4.10	Determinação da atividade do transporte de sacarose.....	53
4.11	Manipulações genéticas.....	55
4.11.1	<i>Eletroforese em gel de agarose</i>	55

4.11.2	<i>Reação em cadeia da polimerase (PCR)</i>	55
4.11.3	<i>Transformação de leveduras pelo método do acetato de lítio</i>	55
4.11.4	<i>Reconstituição do gene URA3</i>	56
4.11.5	<i>Deleção do gene AGT1</i>	57
4.11.6	<i>Deleção do gene MAL13</i>	61
4.11.7	<i>Substituição do promotor do gene MAL13</i>	62
4.11.8	<i>Super-expressão do gene AGT1</i>	63
4.12	<i>Análise da expressão gênica em escala genômica (transcriptoma)</i>	64
4.13	<i>Sequenciamento do gene AGT1</i>	65
4.14	<i>Cálculo dos parâmetros fisiológicos</i>	65
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	67
5.1	<i>Efeitos da limitação por uracila em cultivos contínuos de <i>S. cerevisiae</i></i>	69
5.2	<i>Estudo da realocização do metabolismo da sacarose em cultivos contínuos</i>	74
5.2.1	<i>Modelo teórico do metabolismo de sacarose em anaerobiose</i>	74
5.2.2	<i>Fisiologia das linhagens <i>iSUC2 ura-</i> e <i>SUC2 ura-</i> em quimiostatos limitados por sacarose ou glicose em aero- ou anaerobiose</i>	77
5.3	<i>Comparação das linhagens <i>SUC2</i> e <i>iSUC2</i> em cultivos descontínuos</i>	86
5.3.1	<i>Cultivos descontínuos em frasco agitado</i>	86
5.3.2	<i>Cultivos descontínuos em anaerobiose plena</i>	89
5.4	<i>Engenharia evolutiva para o melhoramento do transporte de sacarose em <i>S. cerevisiae</i></i>	95
5.4.1	<i>Fisiologia de <i>S. cerevisiae SUC2</i> e <i>iSUC2</i> prototróficas em quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose</i>	95
5.4.2	<i>Engenharia evolutiva aplicada à linhagem <i>iSUC2</i></i>	102
5.4.3	<i>Análise do transportador <i>Agt1p</i> na linhagem <i>iSUC2</i> evoluída</i>	105
5.4.4	<i>Cultivos descontínuos com a linhagem <i>iSUC2</i> evoluída</i>	109
5.4.5	<i>Análise do transcriptoma</i>	111
6	CONCLUSÕES	118
6.1	<i>Efeito da limitação por uracila em cultivos contínuos</i>	118
6.2	<i>Impactos fisiológicos oriundos da realocização da enzima invertase</i>	118
6.3	<i>Aplicação da engenharia evolutiva como estratégia para o melhoramento do transporte ativo de sacarose</i>	119

6.4	Sugestões para continuidade do trabalho.....	120
REFERÊNCIAS.....		122
ANEXO A - Lista dos genes com expressão aumentada na linhagem <i>iSUC2</i> evoluída em relação à <i>iSUC2</i> parental.....		134

1 INTRODUÇÃO

A produção mundial de etanol combustível está em torno de 75 bilhões de litros por ano, e a maior parte deste total (cerca de 95%) é produzida pela fermentação de determinados açúcares pela levedura *Saccharomyces cerevisiae* (Renewable Fuels Association, 2011). O Brasil é hoje o segundo maior produtor e o primeiro maior exportador mundial de etanol, com uma produção de 26 bilhões de litros na safra de 2009/2010. O setor sucro-alcooleiro movimenta cerca de 2% do PIB brasileiro, assegurando milhões de empregos diretos e indiretos, permitindo ao Brasil ser o único país a implantar em larga escala um programa de combustível alternativo ao petróleo, com muitas vantagens ambientais, econômicas e sociais (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2011). Apesar de os EUA serem os maiores produtores mundiais de etanol, naquele país este combustível é produzido a partir de amido de milho, principalmente, que resulta na obtenção de 1,3 equivalentes de energia para cada 1 equivalente de energia gasto no processo (balanço de energia líquida) (Tilman et al., 2008). Por outro lado, a produção de etanol a partir dos açúcares da cana-de-açúcar no Brasil resulta em 9,2 equivalentes de energia por cada equivalente gasto no processo (Macedo, 1996). Assim, esta forma de produção é muito mais sustentável que a anterior. Desta maneira, pode-se afirmar que o etanol é um dos produtos biotecnológicos mais importantes no cenário brasileiro e até mesmo mundial, quando se leva em conta os quesitos valor, quantidade e sustentabilidade. No entanto, para que o etanol produzido no país continue a ser o mais competitivo, é fundamental que se continue a investir no aprimoramento do processo de produção.

Substratos à base de sacarose, como o caldo de cana, o melaço ou uma mistura dos dois, constituem uma das principais matérias-primas para a obtenção de etanol no cenário mundial, especialmente no Brasil. Atualmente, os rendimentos da etapa fermentativa do processo de produção de etanol a partir de cana-de-açúcar são elevados, da ordem de 90 % da conversão estequiométrica de $0,511 \text{ g etanol. (g hexose)}^{-1}$. Além disto, o processo encontra-se em estágio tecnológico bastante avançado. No entanto, mesmo pequenos aumentos no rendimento podem significar grandes aumentos em termos de lucratividade do processo e utilização eficiente da fonte de carbono, já que os volumes de produção são

grandes e cerca de 60% do custo de produção do etanol deve-se ao custo da matéria-prima (Wyman e Hinman, 1990).

Como o etanol é um produto derivado diretamente do metabolismo central do carbono, sendo um metabólito primário, cuja formação está atrelada ao crescimento celular, muitas estratégias para se aumentar o fator de conversão de açúcares em etanol [$Y_{ETH/S}$; g etanol produzido. (g açúcar consumido⁻¹)], baseiam-se na alteração do metabolismo energético das leveduras. Uma das possíveis maneiras de se atingir tal objetivo é a introdução de modificações genéticas (no escopo da engenharia metabólica) que resultem em gasto adicional de ATP para a formação de uma mesma quantidade de biomassa (células), em comparação à linhagem selvagem. Desta forma, para compensar o maior custo energético da formação de biomassa, mais etanol é produzido para a mesma quantidade de açúcar consumido, já que no metabolismo fermentativo a geração de energia, na forma de ATP, é alcançada pela produção de etanol. Recentemente, o grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Dr. Boris U. Stambuk, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizou alterações no metabolismo da sacarose em *S. cerevisiae*, no intuito de aumentar o fator de conversão deste dissacarídeo em etanol. Esta estratégia explora a forma como as leveduras metabolizam a sacarose.

Na levedura *S. cerevisiae*, são conhecidas duas formas pela qual a sacarose é metabolizada (Figura 1.1). Numa delas, a mais utilizada e bem descrita até o momento, a sacarose é hidrolisada no ambiente extracelular pela enzima invertase, produzindo glicose e frutose, as quais são posteriormente transportadas para o interior das células por difusão facilitada (sem gasto energético) pelos transportadores Hxtp, e posteriormente consumidas na via glicolítica. Na outra rota, menos caracterizada, a sacarose pode ser diretamente transportada através do co-transporte com íons H⁺, pelos transportadores Malx1p e Agt1p, e subsequentemente hidrolisada no ambiente intracelular por ação da enzima invertase intracelular ou por maltases (Carlson e Botstein, 1982; Santos et al., 1982; Stambuk et al., 2000).

Figura 1.1 - Esquema resumido das duas vias (extra- e intracelular, mediadas pelas enzimas invertase extracelular e invertase intracelular, respectivamente) para o metabolismo da sacarose em *S. cerevisiae*. SUC: sacarose; GLC: glicose; FRU: frutose; ETH: etanol; 1: transportadores Hxtp; 2: transportadores Agt1p ou Malx1p; 3: H^+ -ATPase de membrana.

A estratégia concebida pelo grupo do Prof. Dr. Boris Stambuk baseia-se na seguinte hipótese: É de se esperar que uma levedura expressando apenas a forma intracelular da enzima invertase, quando cultivada em sacarose, seja obrigada a transportar este açúcar para o ambiente intracelular. Ao transportar uma molécula de sacarose para o ambiente intracelular, ocorre o co-transporte de um H^+ , o que faz com que as células, para manterem o pH intracelular constante, tenham que bombear este próton para o ambiente extracelular. Isto ocorre via H^+ -ATPases de membrana, que gastam uma molécula de ATP por H^+ extrudado (Figura 1.1). Como balanço final, para cada mol de sacarose consumido pelas células em anaerobiose (ou durante metabolismo fermentativo), em vez de serem gerados 4 moles de ATP via fermentação (o que ocorreria no caso de hidrólise extracelular da sacarose e transporte de glicose e frutose por difusão facilitada), são gerados apenas 3 moles de ATP (já que um mol é gasto para extrudar o H^+ co-transportado). Nesta situação, o que se espera é que as células, quando em anaerobiose, procurem repor estes 25% de ATP (ou ao menos parte disto) que deixam de ser gerados, através de um aumento no fluxo de carbono para as vias fermentativas, ou seja, para a formação de etanol. Portanto, o que se imagina é que este cenário leve à formação de mais etanol por mol de sacarose consumido em anaerobiose

do que numa situação de hidrólise extracelular. Para verificar esta hipótese, o gene *SUC2* de uma levedura da espécie *S. cerevisiae* foi alterado de forma que a linhagem resultante, denominada *iSUC2 ura-* (BSY021-34B), expressasse, por ação do promotor forte P_{ADH1} , apenas a forma intracelular da enzima invertase (Stambul et al., 2009).

O presente trabalho de doutoramento, como uma continuidade deste trabalho de engenharia metabólica inicial, buscou avaliar de forma quantitativa a eficácia desta estratégia. Para isto, foi amplamente explorada a técnica de cultivo em quimiostato. Além de uma avaliação fisiológica inicial de linhagens que superexpressam a invertase intracelular, buscou-se verificar se era possível aumentar a afinidade/capacidade dos transportadores de sacarose nesta linhagem pelo uso de uma estratégia de melhoramento genético denominada engenharia evolutiva, a qual se baseia na obtenção de mutantes através da imposição de uma ou mais pressões seletivas sobre uma determinada população de microrganismos, no intuito de selecionar mutantes com fenótipo melhorado. Além disto, através do uso da transcriptômica, procurou-se elucidar as causas para o fenótipo melhorado obtido e, posteriormente, usando-se a tecnologia do DNA recombinante, introduzir as modificações genéticas mais apropriadas (engenharia reversa), de forma a mimetizar o processo evolutivo que resultou numa linhagem melhorada em termos do fator de conversão de sacarose a etanol.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Engenharia Metabólica de *S. cerevisiae* para o melhoramento da produção de etanol combustível

Existe atualmente um esforço global no campo do etanol combustível no sentido de expandir o espectro de substratos utilizados pela levedura *S. cerevisiae* (Galazka et al., 2010; Kuyper et al., 2003, 2004, 2005a, 2005b; Wisselink et al., 2007, 2009), bem como de aumentar o rendimento da fermentação alcoólica (Bro et al., 2006; Guo et al., 2011; Medina et al., 2010; Nissen et al., 2000). Apesar de os rendimentos deste processo industrial já serem elevados [acima de 90% do valor estequiométrico de 0,511 g de etanol. (g de glicose)⁻¹] e o processo estar em estágio tecnológico bastante avançado, sabe-se que mesmo pequenos aumentos no rendimento podem significar grandes aumentos em termos de lucratividade do processo e utilização eficiente da fonte de carbono, já que cerca de 60 % do custo de produção do etanol é dado pela matéria-prima (Wyman e Hinman, 1990) e a produção anual mundial é da ordem de dezenas de bilhões de litros atualmente, com perspectivas de expansão nos próximos anos (Renewable Fuels Association, 2011).

Como o etanol é um produto derivado diretamente do metabolismo central do carbono (metabólito primário), muitas estratégias para se aumentar o rendimento e/ou a produtividade da fermentação alcoólica baseiam-se em aumentar a proporção de carbono convertido em etanol, e/ou aumentar a velocidade desta conversão, respectivamente, através do uso da engenharia metabólica (Stephanopoulos et al., 1998).

Num dos trabalhos nesta área, Nissen et al. (2000) mostraram que, reduzindo-se a formação do excesso de NADH (resultante das vias biossintéticas e normalmente reoxidado pela formação de glicerol) e aumentando-se o consumo de ATP na biossíntese, foi possível aumentar em 10 % o rendimento em etanol, bem como reduzir em 14% o rendimento em biomassa sobre a fonte de carbono. Para tanto, foi necessária a substituição da via normal da síntese de glutamato a partir de amônia (que consome NADPH), por uma via alternativa na qual ATP e NADH são consumidos. A estratégia utilizada foi alcançada pela deleção do gene *GDH1* (que codifica a enzima glutamato desidrogenase, envolvida na via normal de

síntese de glutamato) e concomitante superexpressão dos genes *GLN1* e *GLT1* (que codificam as enzimas glutamato sintetase e glutamato sintase, respectivamente, envolvidas na via alternativa da síntese de glutamato). No entanto, uma possível desvantagem desta estratégia é que normalmente os meios industriais contém aminoácidos como fonte de nitrogênio e tal estratégia depende da assimilação da amônia para se atingir os rendimentos apresentados.

Em outro trabalho em que houve alteração do balanço de redox em *S. cerevisiae*, Bro et al. (2006) demonstraram que a expressão da enzima heteróloga não fosforilante gliceraldeído-3P-desidrogenase dependente de NADP^+ (NADP^+ -GAPN) foi suficiente para reduzir em 40 % o rendimento em glicerol, o que acarretou num aumento de 3 % no rendimento em etanol. Em teoria, nesta estratégia, a conversão de gliceraldeído-3P para glicerato-3P pela enzima NADP^+ -GAPN, substitui a formação de glicerol, pois, como nesta via alternativa não há geração de NADH, o NADH formado nas vias biossintéticas, é reoxidado através da formação de etanol. Por sua vez, o NADPH gerado durante a conversão de gliceraldeído-3P para glicerato-3P é consumido pelas vias biossintéticas. Cabe destacar que a conversão de gliceraldeído-3P para glicerato-3P, pelas enzimas NAD^+ -gliceraldeído-3P-desidrogenase (GAPDH) e fosfo-glicerato-quinase (PGK), continua operante nas células, uma vez que na via alternativa o rendimento em ATP é nulo. Assim a via normal é a responsável por garantir o suprimento de energia às células crescendo em anaerobiose.

Uma estratégia elegante para o aumento do rendimento em etanol foi proposta recentemente por Medina et al. (2010), na qual o acetato foi utilizado como aceptor de elétrons na reoxidação de NADH em uma linhagem incapaz de produzir glicerol (deletada nos genes *GPD1* e *GPD2*) e que expressa a enzima heteróloga acetaldeído desidrogenase dependente de NAD^+ . Com isto, um composto resultante da hidrólise de resíduos lignocelulósicos, que é um conhecido inibidor da atividade de leveduras (o acetato), pode ser convertido em etanol e ainda permitir a eliminação completa da formação de glicerol em cultivos anaeróbios com glicose.

Além de modificar o rendimento de um determinado produto de interesse industrial, a engenharia metabólica pode ser empregada com o objetivo de se aumentar a velocidade de uma determinada via metabólica. Neste caso, os alvos das alterações genéticas são normalmente genes regulatórios, ou seja, genes envolvidos no controle da expressão gênica dentro da via em estudo. Um exemplo de tal conceito é o trabalho desenvolvido por

Ostergaard et al. (2000), cujo objetivo foi aumentar a velocidade de consumo de galactose pela alteração da rede de regulação dos genes *GAL*. Com a remoção dos genes *GAL80*, *GAL6* e *MIG1* (envolvidos na repressão dos genes estruturais do metabolismo de galactose; *GAL1*, *GAL2*, *GAL4*, *GAL10*) atingiu-se um aumento de 41% na velocidade específica de consumo de galactose em relação à linhagem-referência.

Através dos exemplos acima, pode-se notar que existem diversas estratégias para se aumentar o $Y_{ETH/S}$ (fator de conversão da fonte de carbono em etanol) através da manipulação dos genes envolvidos no metabolismo central do carbono e/ou de outros genes. Estas alterações genéticas podem envolver tanto genes estruturais, como genes regulatórios. No entanto, não pudemos encontrar nenhum trabalho na literatura, no qual a energética do transporte da fonte de carbono foi empregada como forma de se aumentar o rendimento em etanol.

2.2 A Engenharia Evolutiva como ferramenta complementar à Engenharia Metabólica

O termo “*Evolutionary Engineering*” (neste texto, traduzido como Engenharia Evolutiva) tem sido empregado com frequência nos últimos anos, para designar uma estratégia de melhoramento de microrganismos que é baseada no princípio da variação e seleção natural, conforme proposto originalmente por Charles Darwin em sua Teoria da Origem das Espécies (Sauer, 2001). Assim, desde que seja possível impor a pressão seletiva adequada em laboratório, torna-se viável “forçar” um fenótipo desejado ao microrganismo em estudo. Esta estratégia representa uma alternativa ou uma complementação à Engenharia Metabólica (Stephanopoulos et al., 1998), que se baseia em modificações genéticas dirigidas na busca de um fenótipo desejado, ao contrário da Engenharia Evolutiva, que busca o fenótipo desejado através da imposição de uma ou mais pressões seletivas, contando com a ocorrência de mutações e de seleção natural.

Com frequência, Engenharia Evolutiva e Engenharia Metabólica são combinadas, com o objetivo de se obter microrganismos melhorados. A abordagem clássica consiste em primeiramente introduzir um ou mais genes heterólogos no microrganismo em estudo, conferindo ao mesmo uma determinada capacidade que ele originalmente não possuía, dentro do escopo da Engenharia Metabólica. Em seguida, procede-se com a Engenharia Evolutiva, através de experimentos longos com uma população do microrganismo em

estudo, em que várias gerações transcorrem, aumentando-se a probabilidade de ocorrerem mutações. O fenótipo desejado, neste caso, pode ser, por exemplo, uma maior tolerância a fatores como oxigênio ou altas concentrações de glicose. Assim, a pressão seletiva é imposta através do aumento gradativo da concentração de oxigênio ou de glicose, respectivamente, no caso destes exemplos.

A obtenção de linhagens de levedura evoluídas em laboratório é uma estratégia comprovadamente eficiente para diversas finalidades. Como exemplos, podemos citar a otimização do transporte de maltose em cultivos aeróbios longos em quimiostato (Jansen et al., 2004); a metabolização de xilose e arabinose em anaerobiose plena utilizando-se tanto bateladas repetidas como quimiostatos (Kuyper et al., 2004, 2005a, 2005b; Sonderegger e Sauer, 2003; Wisselink et al., 2007, 2009), o aumento da tolerância ao etanol (Brown e Oliver, 1982). As ferramentas podem ser tanto cultivos descontínuos em série (bateladas repetidas), como quimiostatos, dependendo dos objetivos do estudo. O fato é que uma população de microrganismos, que frequentemente contém milhões de indivíduos num mililitro, os quais se duplicam num intervalo de poucas horas, após várias gerações, acaba sofrendo mutações e, dentro de um ambiente que confere pressão seletiva, passará também por seleção para os indivíduos com melhores condições de desenvolvimento neste ambiente. Desta maneira, as células menos adaptadas serão eliminadas destes sistemas de cultivo; nas bateladas repetidas, a cada vez que se renova o meio, e nos quimiostatos, continuamente pelo sistema de retirada de meio. Alguns exemplos ilustrativos são apresentados a seguir.

A produção de etanol a partir de fontes ligno-celulósicas requer a fermentação da fração hemi-celulósica, a qual é rica em pentoses, tais como xilose e arabinose. Entretanto, o crescimento de linhagens de *S. cerevisiae* modificadas geneticamente para a metabolização de xilose geralmente é comprometido por problemas no balanço redox dos cofatores NAD^+ e NADP^+ das enzimas xilose redutase e xilose desidrogenase, ou pela baixa atividade de xilose isomerase. Neste contexto, Sonderegger e Sauer (2003) demonstraram a aplicação da engenharia evolutiva para a seleção de uma linhagem de *S. cerevisiae* capaz de crescer em xilose sob condições de anaerobiose. Primeiramente, uma linhagem recombinante (expressando as enzimas xilose redutase e xilose desidrogenase), capaz de crescer eficientemente em xilose sob condições de aerobiose foi lentamente adaptada, em regime de quimiostato, para crescer em condições de microaerobiose, para depois ser submetida à

situação de anaerobiose plena. Tal procedimento, que totalizou 260 gerações de seleção, é um forte indicativo de que múltiplas mutações foram necessárias para obtenção deste novo fenótipo.

Kuyper et al. (2004) demonstraram a possibilidade do uso de estratégias de engenharia metabólica aliadas à engenharia evolutiva para obtenção de uma linhagem de *S. cerevisiae* capaz de converter eficientemente xilose em etanol. Para tanto, uma linhagem expressando a enzima xilose isomerase foi submetida a transferências seriadas, em meio contendo xilose como única fonte de carbono. Desta forma, um mutante com velocidade específica máxima de crescimento notavelmente maior ($\mu_{\max} = 0,18 \text{ h}^{-1}$) do que a linhagem inicial ($\mu_{\max} = 0,005 \text{ h}^{-1}$) foi obtido. Como este mutante não foi capaz de crescer sob condições de plena anaerobiose, uma nova seleção em regime de bateladas repetidas foi iniciada, sob condições crescentes de limitação de oxigênio até o ponto de plena anaerobiose. Ao final dessa seleção, obteve-se um mutante capaz de crescer em xilose ($\mu_{\max} = 0,03 \text{ h}^{-1}$), sob condições estritas de anaerobiose. Mesmo após a superexpressão de determinados genes da via das pentoses-fosfato nesta linhagem evoluída, a linhagem resultante apresentou baixa velocidade específica de consumo de xilose quando cultivada em meio contendo uma mistura de xilose e glicose (Kuyper et al., 2005a). Para melhorar este fenótipo, a linhagem foi inicialmente submetida a um cultivo anaeróbico em quimiostato em meio limitado por xilose, seguido de uma série de cultivos em regime de bateladas repetidas, em meio contendo glicose e xilose. Com isto, uma nova linhagem evoluída foi obtida, a qual mostrou-se capaz de crescer eficientemente sob anaerobiose em meio formado pela mistura destes dois açúcares. Cabe destacar que a cinética de assimilação da xilose pela linhagem evoluída [$V_{\max} = 32 \text{ mmol. (g DW.h)}^{-1}$ e $K_m = 99 \text{ mM}$] foi notavelmente maior do que para a linhagem inicial [$V_{\max} = 16 \text{ mmol. (g.h)}^{-1}$ e $K_m = 132 \text{ mM}$] (Kuyper et al., 2005b).

Com a finalidade de permitir a conversão de arabinose em etanol sob condições de plena anaerobiose, Wisselink et al. (2007) utilizaram uma combinação de engenharia metabólica com engenharia evolutiva. Num primeiro momento, dentro do escopo da engenharia metabólica, introduziram os genes bacterianos (*araA*, *araB* e *araD*) que permitem a conversão de L-arabinose em D-xilulose-5-P na levedura *S. cerevisiae* (Becker e Boles, 2003). No entanto, esta estratégia não resultou em crescimento em meio sintético contendo arabinose como única fonte de carbono. Para contornar este problema, fizeram uso da

engenharia evolutiva, inicialmente por meio de transferências seriadas em meio sintético contendo uma mistura de galactose (indutor da expressão do gene *GAL2*, que codifica um transportador de galactose e arabinose) e arabinose, e depois, em meio contendo somente arabinose. Nesta primeira etapa, conseguiram obter um isolado com $\mu_{\max}$ de $0,15 \text{ h}^{-1}$, porém incapaz de produzir etanol. Num segundo estágio de seleção, empregando-se cultivos descontínuos em série (com diminuição gradual do suprimento de oxigênio), obtiveram um isolado capaz de converter arabinose em etanol sob plena anaerobiose com um $Y_{\text{ETH/S}}$ de $0,43 \text{ g.g}^{-1}$ e uma produtividade específica de etanol de $1,9 \text{ mmol.(g DW.h)}^{-1}$.

2.3 Metabolismo de sacarose em *S. cerevisiae*

2.3.1 Via extracelular e via intracelular

Sabe-se atualmente que na levedura *S. cerevisiae* existem duas vias metabólicas para a utilização da sacarose (Figura 1.1). Numa delas, conhecida como a via extracelular, a sacarose é hidrolisada no ambiente extracelular (mais precisamente, no espaço periplasmático) pela enzima invertase (codificada pelos genes *SUC*), gerando glicose e frutose, que são subsequentemente transportadas para o interior das células através das permeases Hxt_p (Lagunas, 1993) e metabolizadas pela via glicolítica. Na segunda via, a via intracelular, a sacarose é primeiramente transportada através da membrana plasmática e em seguida hidrolisada no interior das células. Este transporte ocorre via co-transporte de íons H^+ , e implica portanto num gasto de energia para a manutenção do pH intracelular através do bombeamento de prótons para o ambiente extracelular pelas H^+ -ATPases da membrana plasmática (Carlson e Botstein, 1982; Santos et al., 1982; Stambuk et al., 2000).

As H^+ -ATPases (codificadas pelos genes *PMA1* e *PMA2* na levedura *S. cerevisiae*) é uma proteína de 100 kDa, ancorada na camada bi-lipídica da membrana plasmática, que bombeia H^+ para fora da célula através da clivagem de ATP, com estequiometria 1:1. Acredita-se que normalmente este mecanismo consuma cerca de 25 % de todo ATP produzido pelas células, para bombear H^+ e assim gerar o gradiente eletroquímico que governa a captação H^+ -dependente de nutrientes (Ambesi et al., 2000; Serrano et al., 1986).

Leveduras que contenham qualquer um dos genes *SUC* (*SUC1-SUC5* e *SUC7*) são capazes de produzir a enzima invertase (Carlson e Botstein, 1983a). Na verdade, o gene *SUC* é responsável pela síntese de dois fragmentos de RNA. Um transcrito maior (1,9 kb), contendo a seqüência sinal, que codifica a enzima glicosilada extracelular, e outro menor (1,8 kb), que codifica a enzima não-glicosilada intracelular (Carlson e Botstein, 1982; Carlson e Botstein, 1983b; Grossmann e Zimmermann, 1979). Os dois RNAs são transcritos na mesma direção, e diferem apenas na região do início da transcrição (porção 5'), a qual codifica o peptídeo sinal para a secreção e glicosilação da enzima extracelular (Figura 2.1). Os níveis da versão extracelular da enzima são controlados pela repressão por glicose, enquanto a versão intracelular é praticamente insensível ao controle pela glicose e expressada constitutivamente. Todavia, na ausência de repressão por glicose, a fração extracelular é a fração majoritária da atividade total de invertase (> 90%), e desta forma, postula-se que a via de utilização da sacarose pela invertase extracelular seja a rota principal no metabolismo deste dissacarídeo por *S. cerevisiae* (Carlson e Botstein, 1982; Gascón e Lampen, 1968).

Figura 2.1 - Esquema da estrutura genética do gene *SUC2* em *S. cerevisiae*. As setas indicam os mRNAs, relativos às duas invertases, extracelular (cuja expressão gênica é induzível) e intracelular (cuja expressão é constitutiva).

Fonte: Adaptado de Carlson e Botstein, 1982.

2.3.2 Transporte ativo de sacarose através da membrana plasmática de leveduras

O primeiro trabalho a demonstrar a possibilidade de transporte ativo da sacarose por células de levedura foi o de Santos, et al. (1982). Neste trabalho pioneiro, foi demonstrado

que o transporte de sacarose pelas células é mediado pelo co-transporte com íons H^+ , sendo assim dependente do gradiente eletroquímico de H^+ através da membrana plasmática. No entanto, não se soube precisar exatamente a identidade do(s) transportadore(s) envolvido(s). Todavia, de acordo com o perfil cinético do transporte, pode-se afirmar que mais de um sistema de transporte estaria em ação. Outros trabalhos, anteriores ou posteriores ao estudo de Santos et al. (1982), também corroboram parte das constatações observadas por estes autores (Avigad, 1960; Klaassen e Raamsdonk, 1998; Mwesigye e Barford, 1996). Contudo, foi apenas mais tarde que Stambuk et al. (2000) demonstraram que o transporte de sacarose é realizado pelas permeases codificadas nos loci *MAL*. Mais precisamente, foi verificado que o transportador Agt1p compunha o sistema de alta afinidade para o transporte de sacarose ($K_m \sim 8$ mM), enquanto que as permeases Malx1p (mais precisamente Mal21p) eram responsáveis pelo sistema de baixa afinidade ($K_m \sim 120$ mM). A propósito, a permease Agt1p já havia sido sugerida como sendo a principal transportadora de sacarose na levedura *S. cerevisiae* num trabalho anterior do mesmo grupo de pesquisa (Stambuk et al., 1999). Em vista dessas constatações, e utilizando uma linhagem incapaz de assimilar glicose e frutose (devido à deleção dos genes *HXT*), Batista et al. (2004) demonstraram que a sacarose pode ser eficientemente transportada e hidrolisada intracelularmente por *S. cerevisiae*, e que o seu transporte fica severamente comprometido quando o gene *AGT1* é removido desta linhagem, enfatizando a importância do transportador Agt1p durante a captação da sacarose. Estratégia semelhante havia sido previamente utilizada por Klaassen e Raamsdonk (1998).

Como se pode notar, os trabalhos relatados acima demonstraram que a via de utilização da sacarose por transporte ativo encontra-se intimamente relacionada ao metabolismo da maltose, bem como a de outros alfa-glicosídeos (maltotriose, trealose, alfa-metil-glicosídeo, etc), compartilhando assim o mesmo sistema de transporte e algumas vezes, o de hidrólise (ver abaixo). Apesar de sabermos hoje que o transporte de sacarose em *S. cerevisiae* é mediado pelos transportadores codificados pelos loci *MAL*, que constitui uma família de genes poliméricos (muitos genes para as mesmas funções), a grande maioria dos estudos sobre a caracterização genética e bioquímica destes genes foi feita empregando-se a maltose como substrato de estudo (Cheng e Michels, 1991; Han et al., 1995; Needleman, 1991; Stambuk e Araújo, 2001; Vanoni et al., 1989).

Já foram descritos até o presente cinco diferentes loci *MAL*, todos localizados nas regiões teloméricas dos cromossomos VII (*MAL1*), III (*MAL2*), II (*MAL3*), XI (*MAL4*) e VIII (*MAL6*). Cada locus contém ao menos uma cópia de três genes distintos, codificando uma permease (*MALx1*, onde x representa o locus), uma alfa-glicosidase, ou também denominada “maltase” (*MALx2*) e uma proteína de regulação positiva (*MALx3*), necessária para a transcrição induzida pela maltose dos dois genes anteriores (Figura 2.2). Este último gene codifica uma proteína de regulação positiva que se liga à região inter-gênica entre os genes *MALx1* e *MALx2*, induzindo as suas transcrições (em sentidos opostos). Adicionalmente, esta proteína também se liga à região promotora do seu próprio gene, induzindo sua transcrição (Needleman, 1991).

Figura 2.2 - Esquema geral da estrutura genética dos loci *MAL* em *S. cerevisiae*. O gene *MALx3* codifica a proteína de regulação positiva; o gene *MALx1* codifica a permease (transportador); o gene *MALx2* codifica a alfa-glicosidase (maltase). A proteína de regulação positiva (Malx3p), na presença de maltose, liga-se aos sítios 1 e 2 (UAS_{MAL}), como também ao sítio 3. A glicose, por outro lado, reprime a atividade da Malx3p e a transcrição dos genes *MAL* pela via de repressão catabólica, na qual a proteína Mig1p tem papel fundamental.

Fonte: Adaptado de Needleman, 1991.

Além dos loci *MAL* descritos acima, nos quais todos os três genes são funcionais, já foram descritos outros alelos naturais (*malg*, *malp*, *mal^f*), contendo genes não funcionais, impossibilitando assim, por exemplo, a fermentação da maltose, em linhagens que somente possuem estes alelos (Naumov, 1994). Particularmente interessante para o transporte da sacarose, destaca-se um dos alelos do locus *MAL1*, denominado *MAL1g*. Este locus parece não conter atividade para o alelo regulador (*MALx3*), porém estão presentes os outros dois

genes estruturais (*MALx1* e *MALx2*). No entanto, um fato surpreendente deste distinto locus é que o gene que codifica a permease possui pouca similaridade com o gene homólogo no locus *MAL1* dominante (Charron e Michels, 1988). Segundo estes autores, o alelo *MAL1g* deve ter sido originado através de um evento de rearranjo cromossômico. Neste evento, acredita-se que tenha ocorrido a remoção dos genes *MAL11* e *MAL13*, presentes no locus ancestral *MAL1*. Além da remoção, postula-se que tenha ocorrido a integração de uma outra região do genoma contendo um gene transportador (*AGT1*). Assim, o locus resultante (*MAL1g*), contém os genes estruturais *AGT1* e *MAL12*, mas não contém o gene regulador *MAL13*.

Mais tarde, o gene que codifica a proteína transportadora no locus *MAL1g*, bem como o seu produto, ou seja, a proteína em si, foram investigados em detalhes por Han et al. (1995). Descrito inicialmente como um transportador de maltose, verificou-se que este gene codifica uma permease com capacidade de transporte para diversos alfa-glicosídeos, e assim, atribuiu-se a ele o nome *AGT1* (“*alpha-glucoside transporter*”). Por apresentar cerca de 25 % de identidade aos demais membros da superfamília de transportadores de açúcares (Nelissen et al., 1997; Silverman 1991), a proteína Agt1p foi incluída nesta categoria de transportadores (família TDM, “*twelve transmembrane domain*”). Dentre os demais membros, a maior identidade e similaridade é encontrada com a proteína Mal61p, o transportador de maltose codificado pelo gene *MAL61*, sendo tais parâmetros de 57 e 75 %, respectivamente (Han et al., 1995). Conforme descrito por Stambuk et al. (2000) e Stambuk e Araújo (2001), a permease Agt1p é um transportador de alta afinidade para a sacarose ($K_m \sim 8$ mM) e para a trealose ($K_m \sim 7$ mM), e de menor afinidade para a maltose ($K_m \sim 18$ mM), maltotriose ($K_m \sim 18$ mM) e alfa-metil-glicosídeo ($K_m \sim 34$ mM). Por outro lado, os transportadores Malx1p (mais especificamente Mal11p, Mal21p e Mal61p) possuem alta afinidade para a maltose [ambos com $K_m \sim 5$ mM; Cheng e Michels (1991); Stambuk e Araújo (2001)], enquanto que Mal21p transporta a sacarose com baixa afinidade ($K_m \sim 120$ mM), segundo Stambuk et al. (2000).

Recentemente, duas novas permeases, capazes de transportar alfa-glicosídeos com alta afinidade, foram caracterizadas (Day et al., 2002). A seus genes, atribuiu-se o nome de *MPH2* e *MPH3* (“*maltose permease homologue*”), sendo que estão localizadas nos cromossomos IV e X (na linhagem *S. cerevisiae* S288C), respectivamente. As duas permeases são idênticas entre si, e compartilham 76% de identidade com as permeases Mal31p e

Mal61p, e 53% com a permease Agt1p (comparações realizadas com a sequência de aminoácidos das permeases). Adicionalmente, têm a sua atividade mediada pela proteína reguladora Malx3p, como nas demais permeases desta família, porém apresentando apenas um sítio de ligação para a maltose, ao invés dos três sítios característicos das demais permeases (Ni e Needleman, 1990). Segundo os autores, em termos de especificidade pelo substrato, as duas permeases situam-se num nível intermediário em relação às permeases Mal31p e Mal61p, mais específicas para maltose, e a Agt1p, com um amplo espectro para alfa-glicosídeos. No entanto, não foi reportado no referido trabalho se tais permeases são capazes de transportar a sacarose, como no caso da permease Agt1p (Stambuk et al., 2000).

O outro gene estrutural deste locus, *MALx2*, codifica uma alfa-glicosidase (maltase). Trata-se de uma enzima citoplasmática, que possui pH ótimo em torno de 7 e é capaz de hidrolisar a ligação alfa-glicosídica, presente na maltose, na maltotriose, e na turanose, bem como na sacarose (Needleman, 1991; Zastrow et al., 2001). No entanto vale ressaltar que, como a sacarose é um dissacarídeo formado por uma molécula de glicose ligada a uma de frutose, através de uma ligação glicosídica de conformação glicose- α 1- β 2-frutose, esta pode sofrer a ação tanto de hidrolases capazes de clivar a ligação alfa-glicosídica, quanto de hidrolases capazes de clivar a ligação beta-glicosídica, sendo este último o caso da enzima invertase.

2.3.3 Regulação gênica dos loci MAL

A regulação gênica dos loci MAL é mediada pela proteína Malx3p. No entanto, o mecanismo de regulação/ação da Malx3p é complexo e ainda não inteiramente compreendido. Os 3 sítios de ligação da proteína reguladora (sítios 1, 2 e 3) são distintos entre si tanto na estrutura como em suas seqüências (Figura 2.2). Os dois sítios (1 e 2) localizados entre os genes *MALx1* e *MALx2*, bem como a região compreendida entre os mesmos, constituem a região denominada de UAS_{MAL} (“*maltose-dependent upstream activating sequence*”), a qual é o sítio de ligação da proteína reguladora na presença de maltose (Figura 2.2). Apesar desta região promotora ser bi-direcional, é possível que ela regule independentemente os genes *MALx1* e *MALx2* (Needleman, 1991). Adicionalmente, muitos outros genes parecem interferir na indução por maltose (*SSN6*, *CYC9*, *HEX1*, *HEX2*,

MALX, *MALY*, *SNF1*) (Needleman, 1991). No caso específico da permease Agt1p, para o transporte de sacarose, esta permease parece ser induzida mais fortemente por alfa-metil-glicosídeo e por maltose, ao passo que é insensível à indução pela trealose (Stambuk et al., 1999). Este mesmo trabalho aponta que o dissacarídeo transportado preferencialmente por esta permease é a trealose seguido da sacarose.

Por outro lado, a presença de glicose exerce um efeito repressor na expressão dos genes *MAL*. Tal efeito é mediado pelas proteínas Mig1p, Hxk2p, e Grr1p, sendo que o complexo envolvendo a proteína Mig1p bloqueia a região promotora UAS_{MAL} , impedindo a indução pela proteína reguladora (Hu et al., 1995; Needleman, 1991). Adicionalmente, sabe-se que a glicose, bem como análogos não-metabolizáveis, como por exemplo a 2-deoxi-D-glicose, podem desencadear a inativação dos transportadores, por um mecanismo de fosforilação, endocitose e degradação/proteólise vacuolar dos mesmos, conhecido como inativação catabólica ou inativação induzida por glicose (Brondijk et al., 1998; Medintz et al., 1996; Riballo et al., 1995), a qual depende fortemente das condições de cultivo, e parece estar associada a um mecanismo de ubiquitinação (Lucero e Lagunas, 1997).

De uma forma geral, o mecanismo de repressão dos genes *MAL* pela glicose pode ocorrer por duas maneiras: pela via de repressão catabólica (ou também conhecida por via de repressão por glicose), e pela via Ras/cAMP/proteína-quinase A (PKA). A primeira leva à repressão da transcrição dos genes *MAL*, enquanto a segunda parece resultar na inativação catabólica das permeases *MAL* (Brondijk et al., 1998; Verstrepen et al., 2004). No contexto industrial, a ativação de tais vias pode trazer prejuízos na produtividade e na velocidade da fermentação, pois a presença de glicose em mostos industriais provoca repressão na assimilação (transporte) e no metabolismo de açúcares como a maltose e a maltotriose, e possivelmente sacarose. De fato, a expressão de muitos genes responsáveis pela síntese de transportadores de maltose, bem como de maltases, parece ser reprimida permanentemente após o cultivo prolongado (adaptação) em meio contendo glicose como fonte de carbono (Kuthan et al., 2003).

2.3.4 Regulação gênica dos loci *SUC*

Estudos mostram que a regulação do gene *SUC2* é mediada por mecanismos transcricionais e pós-transcricionais. O primeiro mecanismo é decorrente da repressão da transcrição pela glicose (repressão por glicose). O segundo mecanismo envolve a degradação do mRNA ("*turnover*"), a qual também é induzida por glicose (Cereghino e Scheffler, 1996). Postula-se que a região promotora do transcrito menor (invertase intracelular) não responde à repressão por glicose, ao passo que a região promotora do outro transcrito maior (invertase extracelular) é regulada pela glicose e determinadas proteínas (Carlson e Botstein, 1982). Sabe-se que várias proteínas, como Grr1p, Reg1p, Hxt2p, Glc7p, Mig1p, Ssn6p e Tup1p estão envolvidas nesta via de regulação (Carlson e Botstein, 1982; Gancedo, 1992). Outras proteínas, como Snf1p e Snf4p, são requeridas para que ocorra a desrepressão do gene *SUC2*, e mutantes *snf1* não são capazes de sintetizar o transcrito referente à invertase extracelular, mesmo na ausência da repressão por glicose (Carlson e Botstein, 1982). Um dos componentes principais deste mecanismo regulatório é a proteína Mig1p (gene *MIG1* - "*Multicopy Inhibitor of GAL gene expression*"; Nehlin e Ronne, 1990), que se liga à região promotora do gene *SUC2*, reprimindo sua transcrição sob altos níveis de glicose.

Se, por um lado, altos teores de glicose reprimem a expressão do gene *SUC2* (invertase extracelular), foi demonstrado por Ozcan et al. (1997) que este mesmo gene tem a sua máxima expressão quando na presença de baixos níveis de glicose ou frutose [0,1 - 0,005 % (p/v)], produtos resultantes da clivagem da sacarose. Adicionalmente, a indução a baixos níveis de glicose parece ocorrer pelo relaxamento de um mecanismo de repressão, do qual uma região à montante do gene *SUC2* (URS_{SUC}), bem como o gene *SNF3*, são componentes essenciais. Estes autores observaram que a atividade de invertase extracelular é de 5 a 10 vezes maior em células crescendo na presença de baixos teores de glicose [0,1% (p/v)], quando comparada à atividade em células crescendo em glicerol. Desta forma, se existir excesso de glicose num meio de cultura contendo sacarose, células de *S. cerevisiae* terão a expressão do gene *SUC2* reprimida, consumindo preferencialmente a glicose e poupando a sacarose para instantes futuros. É sugerido por Ozcan et al. (1997) que estes mecanismos de repressão e indução por glicose, aparentemente antagônicos, servem para ajustar os níveis de invertase no meio de crescimento, garantindo uma utilização eficiente das fontes de carbono disponíveis.

Finalmente, a regulação do gene *SUC2* é, de certa forma, semelhante à regulação dos genes dos transportadores de glicose *HXT2* e *HXT4*. Os três são reprimidos por altos níveis de glicose e induzidos por baixos níveis deste açúcar. No entanto, diferentemente dos dois últimos, a proteína repressora Rgt1p parece não exercer influência sobre a expressão do gene *SUC2*, enquanto que a proteína Snf3p promove a indução a baixos níveis de glicose, de forma similar aos genes *HXT2* e *HXT4* (Ozcan et al., 1997).

2.4 Fisiologia quantitativa de *S. cerevisiae* durante o crescimento em sacarose ou em misturas de glicose e frutose

São poucos os trabalhos publicados na literatura sobre cultivos de *S. cerevisiae* em meio sintético contendo sacarose como fonte de carbono. Ainda mais marcante é a ausência completa de dados experimentais quantitativos, obtidos durante o crescimento de *S. cerevisiae* limitado por sacarose, em anaerobiose. Além disto, os poucos trabalhos existentes muitas vezes utilizaram células de *S. cerevisiae* adaptadas em sacarose por cerca de 250 gerações (Barford et al., 1995; Orłowsky e Barford, 1991), o que pode comprometer a interpretação dos resultados, uma vez que o fenótipo original pode ter sido alterado por mecanismos adaptativos e/ou evolutivos (Ferea et al., 1999). Abaixo apresentamos uma compilação de dados obtidos da literatura sobre cultivos de *S. cerevisiae* em sacarose, ou numa mistura de glicose e frutose, em meio sintético totalmente definido (Tabela 2.1).

Tabela 2.1 - Principais parâmetros fisiológicos de *S. cerevisiae* (linhagem 248 UNSW 703100) durante o crescimento em sacarose ou em misturas de glicose e frutose, sob regime de aerobiose.

Modo de cultivo	μ ou D (h^{-1})	q_s [mmol GLC eq.(g dw.h) $^{-1}$]	$Y_{x/s}$ (g dw.g $^{-1}$)	$Y_{eth/s}$ (g ETH.g $^{-1}$)	q_{CO_2} [mmol.(g dw.h) $^{-1}$]	q_{O_2} [mmol.(g dw.h) $^{-1}$]	Fonte de Carbono	Referências
Batelada ^a	0,45	17	0,15	nd ^b	nd	nd	Glicose (5 g/L) + Frutose (5 g/L)	Orlowsky and Barford, 1991
Batelada ^a	0,55	19	0,16	nd	nd	nd	Sacarose (10 g/L)	Orlowsky and Barford, 1991
Contínuo ^{a,c}	0,55	22	0,14	0,38	nd	nd	Glicose (5 g/L) + Frutose (5 g/L)	Orlowsky and Barford, 1991
Contínuo ^{a,c}	0,55	23	0,17	0,36	nd	nd	Sacarose (10 g/L)	Orlowsky and Barford, 1991
Contínuo ^c	0,09	1,5	0,55	0	2,2	2,0	Glicose (10 g/L) + Frutose (10 g/L)	Johnston and Barford, 1991
Contínuo ^c	0,23	2,5	0,55	0	4,9	4,7	Glicose (10 g/L) + Frutose (10 g/L)	Johnston and Barford, 1991
Contínuo ^c	0,31	9	0,20	0,35	22,3	4,0	Glicose (10 g/L) + Frutose (10 g/L)	Johnston and Barford, 1991
Contínuo	0,41	17	0,13	0,41	32,4	4,5	Glicose (10 g/L) + Frutose (10 g/L)	Johnston and Barford, 1991
Contínuo	0,41	14	0,16	0,31	nd	nd	Glicose (5 g/L) + Frutose (5 g/L)	Johnston and Barford, 1991
Contínuo ^c	0,09	nd	nd	0	2	2	Sacarose (10 g/L)	Barford et al., 1995
Contínuo ^c	0,17	nd	nd	0	4	4	Sacarose (10 g/L)	Barford et al., 1995
Contínuo	0,10	1,2	0,54	0	2,2	2,5	Sacarose (10 g/L)	Basso et al., 2010

^(a) As células foram previamente adaptadas em sacarose por cerca de 250 gerações antes do experimento.

^(b) Não determinado.

^(c) Parâmetros estimados a partir dos gráficos publicados.

Já foi demonstrado diversas vezes que as velocidades específicas máximas de crescimento e de consumo de açúcares sofrem aumento, quando células de levedura são previamente adaptadas ao substrato em estudo. Orlowsky e Barford (1991) foram os primeiros a chamar a atenção para este fenômeno em cultivos com sacarose. Em seu estudo pioneiro sobre a fisiologia de *S. cerevisiae*, utilizando meio de cultivo totalmente definido, estes autores reportam os primeiros dados da fisiologia quantitativa de leveduras na utilização da sacarose. Em cultivos em modo batelada, sob regime de aerobiose e com células adaptadas à sacarose por 250 gerações (em transferências seriadas), eles reportaram dados de $\mu_{\max}$, $Y_{X/S}$ e q_S : $0,55 \text{ h}^{-1}$; $0,16 \text{ g DW.g}^{-1}$ e $19 \text{ mmol.(g DW.h)}^{-1}$, respectivamente. Além disto, constataram que os mesmos parâmetros foram todos menores (de 5 a 10 % em relação aos valores obtidos em sacarose) em cultivos com células adaptadas à respectiva fonte de carbono, quando a mesma foi glicose, frutose, ou uma mistura equimolar de glicose e frutose (Tabela 2.1). Segundo os autores, os resultados indicam, de forma indireta, que o transporte da sacarose ocorrendo simultaneamente à captação dos monossacarídeos foi a causa do aumento no $\mu_{\max}$ de $0,45 \text{ h}^{-1}$ em glicose + frutose, para $0,55 \text{ h}^{-1}$ em sacarose. Corroborando esta hipótese, Barford et al. (1995), em cultivos contínuos e utilizando células adaptadas por mais de 200 gerações, verificaram que a taxa de diluição máxima em sacarose ($D = 0,56 \text{ h}^{-1}$) foi significativamente maior do que a obtida em frutose ($D = 0,49 \text{ h}^{-1}$) (Tabela 2.1).

Em cultivos contínuos aeróbicos e limitados simultaneamente por glicose e frutose, foi observado que a transição do metabolismo respiratório para o respiro-fermentativo (evidenciado pela presença de etanol no meio de cultivo) ocorreu em algum valor de vazão específica (D) entre $0,23$ e $0,31 \text{ h}^{-1}$ (Johnston e Barford, 1991) (Tabela 2.1). No caso de cultivos aeróbicos limitados por sacarose, a mesma transição ocorreu para D entre $0,27$ e $0,33 \text{ h}^{-1}$ (Barford et al., 1995). Um fato intrigante foi observado nos cultivos contínuos limitados por misturas equimolares de glicose e frutose. Johnston e Barford (1991), observaram que ambos os açúcares foram consumidos na mesma velocidade e por completo à vazões específicas menores do que $0,40 \text{ h}^{-1}$. No entanto, acima deste valor, o consumo de ambas as fontes de carbono foi incompleto. Este consumo incompleto parece ter sido relacionado à concentração de açúcares na alimentação, sendo que foi observado a 20 g/L e não a 10 g/L .

Apesar de descrito há algum tempo (Santos et al., 1982), acreditava-se que o transporte direto de sacarose contribuía muito pouco para a utilização deste açúcar por *S. cerevisiae*. No entanto, em vista dos trabalhos apresentados acima, parece que este mecanismo pode ter contribuição significativa ao metabolismo de sacarose, caso as células sejam previamente adaptadas a ela por várias gerações (~ 200-250) (Mwesigye e Barford, 1996).

3 OBJETIVOS

O objetivo geral do presente trabalho foi estudar as alterações fisiológicas na levedura *Saccharomyces cerevisiae*, decorrentes de modificações na topologia e na energética do metabolismo da sacarose nesta levedura. Estas modificações foram introduzidas tanto por engenharia metabólica (eliminação da atividade de invertase extracelular e superexpressão da atividade intracelular da enzima), como por engenharia evolutiva subsequente (melhoria do transporte ativo da sacarose).

Os objetivos específicos foram os seguintes:

3.1 Estudar os efeitos da limitação por uracila na fisiologia quantitativa de linhagens de *S. cerevisiae* auxotróficas para este nutriente, durante cultivos em quimiostato;

3.2 Comparar os parâmetros fisiológicos e o transcriptoma de uma linhagem da levedura *S. cerevisiae* que não apresenta atividade de invertase extracelular e que superexpressa atividade de invertase intracelular (denominada *iSUC2*), com os parâmetros correspondentes de uma linhagem referência (*SUC2*), durante o estado-estacionário de cultivos contínuos limitados por sacarose;

3.3 Comparar os parâmetros fisiológicos das linhagens *iSUC2* e *SUC2* (descritas acima), durante o crescimento exponencial em cultivos descontínuos;

3.4 Investigar os efeitos da deleção do gene *AGT1*, que codifica a principal proteína transportadora de sacarose, nas linhagens *iSUC2* e *SUC2*, durante o crescimento exponencial em cultivos descontínuos;

3.5 Alterar as características do transporte da sacarose na linhagem *iSUC2* pelo uso da engenharia evolutiva;

3.6 Avaliar a fisiologia e o transcriptoma da linhagem *iSUC2* evoluída, durante cultivos contínuos e descontínuos em sacarose;

3.7. Tentar verificar quais alterações genéticas ocorreram durante o processo de evolução em quimiostato e que foram responsáveis pelo fenótipo melhorado da linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à linhagem *iSUC2*.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Linhagens de levedura e preservação

As linhagens utilizadas para o desenvolvimento deste projeto são apresentadas na Tabela 4.1. A família de leveduras “CEN.PK” foi escolhida para o desenvolvimento deste projeto pois tratam-se de linhagens laboratoriais referência para estudos fisiológicos e de genômica funcional (Van Dijken et al., 2000). Duas destas linhagens (CEN.PK113-5D e CEN.PK113-7D) foram gentilmente cedidas pelo Dr. Peter Kötter (Institut für Mikrobiologie der Johan Wolfgang Goethe-Universität, Alemanha). A linhagem BSY021-34B (*iSUC2 ura-*), incapaz de hidrolisar sacarose no ambiente extracelular e que superexpressa a invertase no ambiente intracelular, foi construída pelo grupo do Prof. Dr. Boris U. Stambuk (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil) e gentilmente cedida por ele, que é um colaborador neste projeto, juntamente com seu aluno de doutoramento, Marcelo Goulart Dário.

As linhagens foram estocadas no Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade de São Paulo (LEB/USP) e no Laboratório de Microbiologia Industrial da TU Delft (LMI/TU Delft), sob a forma de cultura-estoque em meio YPD (extrato de levedura, 10 g.L⁻¹, peptona, 20 g.L⁻¹, glicose, 20 g.L⁻¹), contendo 20% (p/v) de glicerol, a -80 °C. Para a obtenção dos estoques, primeiramente cultivou-se cada linhagem descrita na Tabela 4.1 em frascos Erlenmeyer de 500 mL contendo 100 mL de meio YPD em incubador rotativo (marca New Brunswick, modelo C24, Edison, New Jersey, USA) a 30 °C e 200 rpm. Após cerca de 24 h de crescimento, adicionou-se à suspensão volume suficiente de glicerol estéril para resultar numa concentração final de 20% (p/v). Em seguida, alíquotas de 1 mL foram distribuídas em criotubos estéreis, os quais foram congelados à temperatura de -80 °C. Estes estoques congelados foram empregados para se gerar o inóculo para os cultivos em quimiostato, bem como para os cultivos em frasco agitado e para as bateladas repetidas (cultivos descontínuos).

Tabela 4.1 - Linhagens utilizadas neste projeto.

Linhagem	Nomenclatura*	Genótipo relevante	Fonte
CEN.PK113-7D	<i>SUC2</i>	MATa <i>mal13 AGT1 MAL12 MAL2-8c URA3 SUC2</i>	Peter Kötter
CEN.PK113-5D	<i>SUC2 ura-</i>	MATa <i>mal13 AGT1 MAL12 MAL2-8c ura3-52 SUC2</i>	Peter Kötter
BSY021-34B	<i>iSUC2 ura-</i>	MATa <i>mal13 AGT1 MAL12 MAL2-8c ura3-52 trip1-289 TRP1-pADH1::iSUC2</i>	Boris Stambuk
IMI-056	<i>iSUC2</i>	Isogênica à BSY021-34B, mas <i>ura3-52::URA3</i>	Este trabalho
IMK-305	<i>iSUC2 Δagt1</i>	Isogênica à IMI-056, mas <i>agt1Δ::KanMX</i>	Este trabalho
IMK-308	<i>SUC2 Δagt1</i>	Isogênica à CEN.PK113-7D, mas <i>agt1Δ::KanMX</i>	Este trabalho
IMM-007	<i>iSUC2</i> evoluída	Evoluída a partir da linhagem IMI-056	Este trabalho
IMM-008	<i>iSUC2</i> evoluída <i>Δagt1</i>	Isogênica à IMM-007, mas <i>agt1Δ::kanMX</i>	Este trabalho
IMM-009	<i>iSUC2</i> evoluída <i>Δ/Δagt1</i>	Isogênica à IMM-008, mas <i>agt1Δ::loxP-hphN-loxP</i>	Este trabalho
IMI-066	<i>iSUC2 P_{TPI1} MAL13</i>	Isogênica à IMI-056, mas <i>P_{MAL13}::loxP-KanMX-loxP-P_{TPI1}</i>	Este trabalho
IMI-067	<i>iSUC2 P_{TDH3} AGT1</i>	Isogênica à IMI-056, mas <i>URA3-P_{TDH3} AGT1-T_{CYC1}::ura3-52</i>	Este trabalho
IMM-010	<i>iSUC2</i> evoluída <i>Δmal13</i>	Isogênica à IMM-007, mas <i>mal13Δ::loxP-hphN-loxP</i>	Este trabalho

*Esta nomenclatura será empregada ao longo do texto para identificar as linhagens.

4.2 Meios de cultivo

Neste trabalho foram utilizados 3 meios de cultivo. 1) Meio YP, contendo 10 g.L⁻¹ de extrato de levedura, 20 g.L⁻¹ de bacto-peptona. 2) Meio sintético definido cuja composição é a descrita por Verduyn et al. (1992). Este meio contém, por litro: (NH₄)₂SO₄, 5 g; KH₂PO₄, 3 g; MgSO₄.7H₂O, 0,5 g. Além desses nutrientes, o meio é suplementando com os seguintes elementos traço para conter, por litro: EDTA, 15 mg; ZnSO₄.7H₂O, 4,5 mg; CoCl₂.6H₂O, 0,3 mg; MnCl₂.4H₂O, 0,84 mg; CuSO₄.5H₂O, 0,3 mg; CaCl₂.2H₂O, 4,5 mg; FeSO₄.7H₂O, 3 mg; NaMoO₄.2H₂O, 0,4 mg; H₃BO₃, 1mg; KI, 0,1 mg. Adicionou-se também ao meio as seguintes vitaminas para conter, por litro: biotina, 0,05 mg; pantotenato de cálcio, 1 mg; ácido nicotínico, 1 mg; inositol, 25 mg; tiamina-HCl, 1 mg; piridoxina-HCl, 1 mg; e ácido para-aminobenzóico, 0,2 mg. 3) Meio sintético definido com uréia (Luttik et al., 2000), onde a única diferença deste meio com o anterior é que este contém, por litro, uréia (2,3 g) ao invés de (NH₄)₂SO₄, além de ser acrescido de K₂SO₄ (6,6 g). Cabe ressaltar que as quantidades de nitrogênio e enxofre são as mesmas nos dois meios. Por fim, todos os 3 meios foram acrescidos da fonte de carbono em estudo (glicose ou sacarose).

Para o preparo dos meios 2 e 3, as soluções de elementos traço, de vitaminas e de uréia foram preparadas separadamente e esterilizadas por filtração com membrana de 0,22 μm (marca Millipore, Billerica, MA, USA). Os demais componentes foram esterilizados por autoclavagem a 120 °C durante 15 min. Em relação às fontes de carbono, estas foram adicionadas após a esterilização dos outros componentes, sendo que a solução de sacarose foi esterilizada por filtração com membrana de 0,22 μm (Millipore) para se evitar hidrólise do dissacarídeo, enquanto a solução de glicose foi esterilizada por autoclavagem a 110 °C durante 20 min. Todas as soluções foram misturadas sob condições assépticas.

No caso dos quimiostatos e nas bateladas repetidas (SBR) em anaerobiose total, o meio foi suplementado com ergosterol e Tween 80 (10 e 420 mg.L^{-1} , respectivamente). Nos experimentos com as linhagens auxotróficas para a uracila, o meio foi suplementado com esta substância para uma concentração final de 20 (limitação por uracila) ou 80 mg.L^{-1} (não-limitação por uracila), conforme indicado.

Para a confecção de meios seletivos adicionou-se 200 mg.L^{-1} de Geneticina-G418 (Sigma, St. Louis, MO, USA) ou 100 mg.L^{-1} de Higromicina (Sigma). Para a preparação de meios solidificados, acrescentou-se 20 g.L^{-1} de bacto-ágar.

O cultivo de *Escherichia coli*, destinado à multiplicação e ao isolamento de plasmídeos, foi realizado a 30 °C em meio Luria-Bertani. Quando necessário, 100 mg.L^{-1} de Ampicilina (Sigma) foram adicionados.

4.3 Condições de cultivo

4.3.1 Cultivo em frasco agitado

Nestes ensaios foram utilizados dois tipos de meios: 1) YP acrescido da fonte de carbono; e 2) meio sintético definido com uréia, empregado para se evitar uma elevada acidificação do meio. Quando necessário, foram adicionados 80 mg.L^{-1} de uracila ao meio sintético.

O inóculo para o cultivo em frasco agitado foi obtido da seguinte maneira: parte do conteúdo de um tubo da cultura-estoque da linhagem a ser estudada foi transferida para uma placa de Petri contendo meio YPD-ágar 2% (p/v), com auxílio de uma alça de platina,

usando a técnica da semeadura por esgotamento. A placa foi então incubada em estufa a 30 °C. Após cerca de 24 h, células de uma colônia isolada foram transferidas para um frasco Erlenmeyer de 500 mL contendo 100 mL de meio sintético definido com uréia (Luttik et al., 2000) ou meio rico (conforme o experimento) e colocado em incubador rotativo a 30 °C e 200 rpm. Após um cultivo “*overnight*”, a absorbância foi medida a 600 nm (Abs_{600}) e o volume de inóculo para o cultivo em frasco agitado foi calculado de forma a se iniciar o cultivo com Abs_{600} de 0,1. No momento da transferência do inóculo para os frascos agitados, as células encontravam-se na fase exponencial de crescimento.

Os cultivos em frasco agitado foram conduzidos em Erlenmeyer chicanados de 500 mL contendo 100 mL de meio sintético definido com uréia, acrescido da fonte de carbono. Os frascos foram incubados a 30 °C e 200 rpm. O crescimento celular foi acompanhado pela medida da Abs_{600} , após retirada de amostras da cultura em tempos pré-determinados (normalmente de hora em hora). Parte dessas amostras foi filtrada por pressão positiva usando filtros descartáveis e utilizada para a quantificação dos açúcares e outros metabólitos (etanol, glicerol e ácidos orgânicos).

4.3.2 Cultivos em quimiostato

O inóculo para os cultivos em quimiostato foi obtido conforme descrito acima (item 4.3.1), porém empregando-se meio mineral definido conforme Verduyn et al. (1992), com sulfato de amônio, em vez de uréia, como fonte de nitrogênio. Após um cultivo “*overnight*”, a absorbância foi medida a 600 nm e o volume de inóculo para o fermentador foi calculado de forma a se iniciar o cultivo com Abs_{600} de 0,1.

As linhagens de *S. cerevisiae* estudadas foram cultivadas em regime de quimiostato a uma vazão específica de $0,10\text{ h}^{-1}$ empregando-se biorreatores de bancada (marca New Brunswick, modelo BIOFLO III, Edison, New Jersey, USA), nos experimentos realizados no Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade de São Paulo (LEB/USP), e biorreatores de bancada (marca Applikon, Schiedam, Holanda), nos cultivos realizados no Laboratório de Microbiologia Industrial da Delft University of Technology (LMI/TU Delft). Um esquema geral dos sistemas utilizados é apresentado na Figura 4.1.

O meio de cultura utilizado foi o meio sintético definido (Verduyn et al. 1992), contendo glicose ou sacarose como única fonte de carbono (item 4.2). O pH dos cultivos foi mantido constante em 5,0 através da adição controlada de uma solução de KOH 2 M. A temperatura foi de 30 °C e a agitação mantida em 800 rpm. O condensador do gás de saída do fermentador foi mantido a 2 °C, de forma a se minimizar a perda de etanol e outros metabólitos. Para o regime em quimiostato, que foi iniciado como um cultivo descontínuo, a adição e a retirada contínuas de meio passaram a ocorrer no momento de exaustão da fonte de carbono da etapa em batelada, o que correspondeu ao início na queda do sinal de % de CO₂ no gás de saída do reator. A adição de meio de cultura estéril ao fermentador foi realizada por meio de uma bomba peristáltica de precisão. A remoção de meio deu-se por uma bomba continuamente ligada e conectada a um dreno localizado à altura adequada no fermentador, no caso dos cultivos no LEB/USP, ou utilizando-se um sensor de nível eletrônico, no caso dos cultivos no LMI/TU Delft, de forma a sempre se manter um volume de trabalho de 1 L em ambos os casos.

Figura 4.1 - Configuração geral do sistema de biorreatores para cultivos contínuos, em regime de aerobiose e anaerobiose, empregado no presente estudo. 1) Frasco contendo meio de alimentação; 2) Biorreator de bancada; 3) Frasco para coleta do efluente. 4) Bomba peristáltica de alimentação de meio; 5) Bomba peristáltica de retirada de efluente (meio + células); 6) Sistema de agitação; 7) Sistema para medida da vazão de alimentação.

Nos cultivos em aerobiose, ar comprimido foi introduzido no reator a uma vazão de 0,5 L.min⁻¹ por meio de um controlador de fluxo mássico (marca Brooks, modelo 5876, Hatfield, PA, USA). A concentração de oxigênio dissolvido foi monitorada de forma contínua por um eletrodo de oxigênio dissolvido (marca Mettler-Toledo, Columbus, OH, USA) e

permaneceu acima de 60% da saturação com ar por todo o experimento, de modo a se garantir condições de plena aerobiose.

Para os cultivos em anaerobiose, os fermentadores foram equipados com mangueiras de Norprene (Cole-Parmer, Vernon Hills, Illinois, USA), para se evitar a entrada de oxigênio no sistema, e foram borbulhados com gás nitrogênio (pureza de 99,95% no LEB/USP e de 99,995% no LMI/TU Delft) a uma vazão 0,5 L.min⁻¹. Nestes cultivos, o frasco de alimentação também foi borbulhado com o mesmo gás durante todo o experimento, a uma vazão de ~ 50 mL.min⁻¹, e também foi protegido da luz para se evitar degradação do ergosterol.

O estado estacionário foi definido como a situação em que ao menos 5 tempos de residência tivessem passado depois da última mudança nas condições de cultivo e em que tanto a concentração de biomassa como a velocidade específica de produção de CO₂ no gás de saída do biorreator, tivessem permanecido constantes (variação menor do que 2%) durante os dois últimos tempos de residência.

Nos experimentos de evolução, a linhagem *iSUC2* foi cultivada de forma análoga aos quimiostatos em anaerobiose limitados por sacarose, porém estes cultivos foram prolongados até o momento em que se constatou redução do substrato residual (item 4.6) e aumento da capacidade de co-transporte de H⁺ (item 4.10). Para tanto, amostras foram coletadas diariamente, sendo que ao final do cultivo (após cerca de 100 gerações) a suspensão de células amostrada do biorreator foi plaqueada em meio sólido YPD, e algumas colônias isoladas foram estocadas conforme o item 4.1.

4.3.3 Cultivos em bateladas repetidas (SBR)

Os cultivos em bateladas repetidas foram realizados no LMI/TU Delft, com reatores de bancada Applikon. O inóculo para tais cultivos foi obtido conforme descrito no item 4.3.1, porém empregando-se meio mineral definido conforme Verduyn et al. (1992), com sulfato de amônio. Após um cultivo "*overnight*", a absorbância foi medida a 600 nm e o volume de inóculo para o fermentador foi calculado de forma a se iniciar o cultivo com Abs₆₀₀ de 0,1.

As linhagens de *S. cerevisiae* estudadas foram cultivadas em regime de bateladas repetidas e o terceiro ciclo foi amostrado. O meio de cultura utilizado foi o meio sintético

definido (Verduyn et al. 1992), contendo sacarose como única fonte de carbono (item 4.2). O pH dos cultivos foi mantido constante em 5,0 através da adição controlada de uma solução de KOH 2 M. A temperatura foi de 30 °C e a agitação mantida em 800 rpm. O condensador do gás de saída do fermentador foi mantido a 2 °C, de forma a se minimizar a perda de etanol e outros metabólitos. Para o regime em bateladas repetidas, a retirada (cerca de 95 % do volume do meio) e a adição de meio estéril passaram a ocorrer no momento da exaustão da fonte de carbono na etapa anterior, o que correspondeu ao início na queda do sinal de % de CO₂ no gás de saída do reator. Os reatores foram equipados com mangueiras de Norprene para se evitar a entrada de oxigênio (presente na atmosfera) no sistema, e foram borbulhados com gás nitrogênio (pureza de 99,995%) a uma vazão de 0,5 L.min⁻¹.

4.4 Determinação da fração molar de O₂ e CO₂ no gás de saída do biorreator

Nos cultivos realizados no LEB/USP, os gases de saída do biorreator foram previamente secos pela passagem em recipiente com sílica, e analisados quanto às frações molares de CO₂ e O₂ por um analisador de gases. A determinação da fração molar de O₂ no gás de saída foi realizada por um detector paramagnético (marca Beckman, modelo 755, Brea, CA, USA), enquanto que a fração molar de CO₂ foi determinada com um detector na faixa do infravermelho (marca Fuji electric, modelo 3300, Burlington, NJ, USA).

Nos cultivos realizados no LMI/TU Delft, os gases de saída do fermentador foram previamente secos através de um secador Perma Pure (PD-625-12P) e analisados quanto às frações molares de CO₂ e O₂ por um analisador de gases (marca Rosemount, modelo NGA 2000, Knoxville, TN, USA).

4.5 Quantificação da concentração de metabólitos extracelulares e intracelulares

Um determinado volume de amostra, após retirada do cultivo, foi imediatamente filtrado por pressão positiva em filtros de porosidade 0,22 µm (Millipore) e o filtrado utilizado nas determinações. Glicose, etanol, glicerol, acetato, succinato e piruvato foram separados numa coluna de exclusão iônica (marca Biorad, modelo Aminex HPX-87H, Hercules, CA, USA) a 60 °C, utilizando-se H₂SO₄ 8 mM como fase móvel a uma vazão de 0,6 mL.min⁻¹. Estes compostos foram detectados num refratômetro diferencial (marca Waters,

modelo 2414, Milford, MA, USA). A amostragem para quantificação da concentração residual do substrato limitante no meio de cultura para cultivos em quimiostato foi realizada conforme metodologia descrita por Mashego et al. (2003). Para tal, amostras foram coletadas com seringa, contendo em seu interior esferas de aço inoxidável (62 g, 4 mm de diâmetro) previamente resfriadas a -18 °C. A amostra foi imediatamente filtrada por pressão positiva em filtros de porosidade 0,22 µm. Esse método, conhecido como “*Cold Steel Beads*”, permite que a temperatura final da amostra atinja o valor de 1 °C muito rapidamente. Com isso, evita-se que a pequena quantidade de substrato existente na amostra seja consumida pelo microrganismo, o que ocorre durante procedimentos usuais de amostragem. Os açúcares em amostras contendo sacarose, glicose e frutose, foram quantificados por kit enzimático, conforme orientações do fabricante (Boehringer Mannheim, Cat. Nr. 10 716 260 035) ou mediante cromatografia líquida de troca aniônica (marca Dionex, modelo DX-300, Sunnyvale, CA, USA), coluna Carbpak PA-1 e detector de amperometria de pulso, tendo NaOH 100 mM como fase móvel a um fluxo de 0,9 mL.min⁻¹. Esta última análise foi realizada no laboratório do Prof. Dr. Luiz Carlos Basso (ESALQ, USP).

A determinação de trealose e glicogênio nas células foi realizada segundo Hazelwood et al. (2009).

4.6 Quantificação da concentração celular

Nos cultivos em frasco agitado, a concentração celular foi determinada indiretamente pela medida da Abs₆₀₀ em espectrofotômetro (marca Thermo Scientific, modelo Genesys 20, West Palm Beach, FL, USA). No caso das amostras dos quimiostatos, a concentração celular foi também determinada em termos de massa seca de células. Para tanto, parte da amostra foi filtrada a vácuo em membrana de porosidade 0,45 µm (Millipore). Antes de se interromper a filtração, o “*pellet*” celular foi lavado duas vezes com água destilada e então a amostra foi levada ao forno de microondas numa potência de 180 W por 15 min. A diferença entre a massa da membrana contendo o “*pellet*” seco de células e a massa da membrana seca, sem células, foi então dividida pelo volume de amostra utilizado na filtração. Determinações em duplicata variaram menos que 3%. Para que esta determinação fosse precisa, utilizou-se um volume de amostra tal que a massa seca de células retidas na membrana estivesse entre 25 e 50 mg Olsson e Nielsen (1997).

4.7 Inspeção da pureza da cultura

A partir de algumas amostras, foram preparadas lâminas a fresco para a inspeção da pureza dos cultivos por microscopia luminosa, com aumento de 400 vezes.

4.8 Medida da capacidade fermentativa

Para a avaliação da capacidade fermentativa das células, amostras do cultivo foram coletadas em tubos de 50 mL, em quantidade suficiente para se obter 100 mg (massa seca) de “*pellet*” após centrifugação (4 min a 4000 *g* a 4°C). O “*pellet*” de células foi ressuspensão em 10 mL de meio sintético definido 5 X concentrado, e sem a fonte de carbono (Verduyn et al., 1992) e o conteúdo vertido em recipiente para avaliação da capacidade fermentativa. O tubo de 50 mL foi então lavado com 30 mL de água e o conteúdo da lavagem também adicionado ao recipiente. Em seguida, o “*headspace*” do recipiente foi saturado com gás CO₂ (30 mL.min⁻¹) para se obter ambiente de plena anaerobiose à temperatura de 30 °C. O ensaio foi iniciado com a adição de 10 mL de solução de glicose ou sacarose 10% (p/v) ao recipiente. Após isto, acompanhou-se (amostragens a cada 5 min num período de 30 min) a formação de etanol, o qual é produzido pelas células em quantidade equimolar ao CO₂ (assumindo-se metabolismo puramente fermentativo). A capacidade fermentativa é expressa em mmol ETH.(g DW.h)⁻¹.

4.9 Determinação da atividade de invertase extracelular e total

A atividade de invertase extracelular foi determinada conforme metodologia adaptada de Silveira et al. (1996). Para tanto, um volume de amostra do cultivo foi submetido a centrifugação e a massa de células obtida foi utilizada para preparar uma suspensão de células a 20 g.L⁻¹ em água destilada. Em seguida, as células íntegras foram tratadas com tampão Tris-succinato pH 5,0 contendo Fluoreto de Sódio, que atua como inibidor da enolase (uma das enzimas da via glicolítica). Uma solução de sacarose foi adicionada às células e a glicose formada por hidrólise do dissacarídeo, presente no

sobrenadante, foi determinada com auxílio de kit enzimático, conforme orientações do fabricante (Boehringer Mannheim, Cat. Nr. 10 716 260 035, Ingelheim am Rhein, Germany).

Para a determinação da atividade da invertase total, utilizaram-se células permeabilizadas, conforme adaptado de Stambuk et al. (1999). Um volume de amostra do cultivo foi submetido à centrifugação, e a massa de células obtida foi utilizada para preparar uma suspensão de células a 20 g.L^{-1} em água destilada. Em seguida, as células foram tratadas com tampão Tris-succinato pH 5,0 e com uma solução de permeabilização (Etanol:Triton X100:Tolueno, 1:4:1). Uma solução de sacarose foi adicionada às células e a glicose formada por hidrólise do dissacarídeo foi determinada com auxílio de kit enzimático, conforme orientações do fabricante (Boehringer Mannheim, Cat. Nr. 10 716 260 035).

4.10 Determinação da atividade do transporte de sacarose

A atividade do transporte de sacarose foi determinada por duas metodologias diferentes. Nos experimentos realizados na USP, mediu-se o transporte de $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ sacarose (Amersham Biosciences, Pittsburgh, PA, USA), utilizando-se células íntegras através da técnica adaptada de Stambuk et al. (1998). Para isto, $36 \mu\text{L}$ de uma suspensão celular a 30 g.L^{-1} foram misturados a $36 \mu\text{L}$ de Tampão 50 mM Tris-succinato pH 5,0 e incubados em banho por 3 min, a 30°C . Após esse período, adicionou-se $18 \mu\text{L}$ de uma solução 100 mM de $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ sacarose (perfazendo uma concentração final de sacarose de 20 mM), 50 mM de glicose e 50 mM de frutose, mantendo-se as amostras incubadas em banho a 30°C . A adição de glicose e frutose não marcadas é utilizada para diluir o efeito da possível assimilação de $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ glicose e $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ frutose, as quais podem ser oriundas da hidrólise extracelular da $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ sacarose (Santos et al., 1982). Após intervalos de tempo pré-estabelecidos, alíquotas foram coletadas e rapidamente filtradas em membranas com porosidade de $0,45 \mu\text{m}$ (Millipore). A seguir, as membranas foram lavadas com 5 mL de água deionizada gelada e colocadas em frascos contendo 10 mL de líquido de cintilação. A radioatividade foi medida após 10 h em temperatura ambiente. Tais medidas foram realizadas no laboratório do Dr. Pedro de Araújo, no IQ/USP, pelo doutorando Marcelo G. Dário.

Nos experimentos realizados no LMI/TU Delft, o transporte de sacarose foi estimado indiretamente pelo co-transporte de íons H^+ . Para isto, utilizou-se uma concentração de sacarose de 70 mM, com células coletadas durante o estado estacionário de quimiostatos

em anaerobiose limitados por sacarose (Stambuk et al., 2000). As células foram coletadas em gelo (4 °C), centrifugadas (4000 *g*, 5 min, 4 °C) e lavadas duas vezes com água destilada (4 °C). O “*pellet*” (25 mg DW) foi ressuspensão em 3 mL de tampão ftalato de potássio 25 mM e pH 5 e incubadas em recipiente apropriado, a 30 °C, por 5 minutos. Após este período, adicionou-se uma solução de sacarose 1 M (para resultar numa concentração final de 70 mM) e a alcalinização inicial da suspensão celular foi acompanhada por cerca de 30-60 s com um pH-metro de alta sensibilidade. Esta alcalinização reflete o transporte de H⁺ que ocorre juntamente com o transporte da sacarose pelas células de levedura. Para calcular a velocidade de assimilação de H⁺, uma curva de calibração foi obtida pela adição de 100-500 nmol de NaOH à suspensão celular. As velocidades iniciais de assimilação de H⁺ foram calculadas a partir da inclinação dos primeiros 10-20 s da curva, registrados após a adição de sacarose, descontando-se a absorção basal de íons H⁺. Todas as determinações foram feitas ao menos em duplicata.

A determinação dos parâmetros cinéticos do transporte de sacarose ($V_{\max}$ e K_m) pelas linhagens *iSUC2* e *iSUC2* evoluída foram realizadas pelo doutorando Marcelo Goulart Dário, no Laboratório de Biologia Molecular e Biotecnologia de Leveduras da UFSC, coordenado pelo Prof. Dr. Boris U. Stambuk, de acordo com Stambuk et al. (2000). Para tanto, as células foram cultivadas em meio YP com sacarose a 2% (p/v), e coletadas durante a fase exponencial de crescimento. As células foram lavadas duas vezes com água destilada (4 °C) e resuspendidas em água destilada a ~ 15 mg DW.mL⁻¹. A suspensão celular foi incubada em recipiente apropriado termostatizado (30 °C) e o pH da suspensão celular foi ajustado a 5. Em seguida, pulsos de sacarose (1-150 mM) foram aplicados à suspensão celular, e a alcalinização inicial da mesma foi acompanhada por cerca de 30-60 s com um pH-metro de alta sensibilidade acoplado a um registrador gráfico TT1 Servograph (Radiometer, Copenhagen). Para calcular a velocidade de assimilação de H⁺, uma curva de calibração foi obtida pela adição de 10-200 nmol de HCl à suspensão celular. As velocidades iniciais de assimilação de H⁺ foram calculadas a partir da inclinação dos primeiros 10-20 s da curva, registrados após a adição de cada pulso de sacarose, descontando-se a absorção basal de íons H⁺.

Para o cálculo dos parâmetros cinéticos ($V_{\max}$ e k_m) foi utilizado o método de Lineweaver e Burk (ou duplo-recíproco).

4.11 Manipulações genéticas

4.11.1 Eletroforese em gel de agarose

O isolamento de fragmentos de DNA e a verificação dos produtos de PCR e dos produtos de digestão com enzimas de restrição foram realizados por meio da eletroforese do material genético em gel de agarose. Para isto, o gel de agarose (Sigma, St. Louis, USA) a 1% (p/v) foi preparado em tampão TAE (Tris-Acetato-EDTA) com corante SYBR® Safe Gel Stain (Invitrogen, Paisley, Scotland). As amostras de DNA foram adicionadas aos poços do gel juntamente com uma mistura contendo azul de bromo-fenol 0,25% (p/v), xileno cianol 0,25% (p/v) e glicerol 30% (p/v) em água a pH 8,0-8,6. A corrida eletroforética foi realizada em tampão TAE, a 90 V, durante 40-60 min.

4.11.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR)

As amplificações foram realizadas utilizando-se um termociclador (marca Biômetra, modelo TGardient Thermocycler, Gottingen, Alemanha). Os reagentes utilizados foram provenientes de kits específicos. A quantidade empregada de primers, do DNA-molde (plasmidial ou genômico) e dos demais reagentes presentes na mistura reacional, foi de acordo com as instruções dos fabricantes (mencionados ao longo do texto). Similarmente, as condições para as reações de desnaturação, anelamento e extensão, em cada ciclo do PCR, foram estabelecidas de acordo com as instruções dos fabricantes dos kits.

4.11.3 Transformação de leveduras pelo método do acetato de lítio

As transformações genéticas descritas abaixo foram realizadas de acordo com Gietz e Schiestl (1995). O conteúdo de um tubo de cultura estoque da linhagem a ser manipulada geneticamente foi transferido para 20 mL de meio YPD líquido e incubado a 30 °C em incubador rotativo por 12 h. Após este período, uma alíquota foi transferida para 100 mL de meio YPD líquido, de modo que a Abs₆₀₀ da cultura ficasse em torno de 0,3. O frasco foi

então incubado sob agitação a 30 °C por 4 h. Em seguida, ~ 50 mL da suspensão celular foram centrifugados a 4000 *g* por 5 minutos a 20 °C, as células foram ressuspensas em 25 mL de água destilada e centrifugadas novamente nas mesmas condições. As células foram ressuspensas em 1 mL de solução 100 mM LiAc (acetato de lítio) e transferidas para um tubo eppendorf estéril. Esta suspensão foi centrifugada a 11600 *g* por 1 min à temperatura ambiente e as células ressuspensas em 400 µL de solução 100 mM de LiAc.

Para cada reação de transformação, 50 µL da suspensão celular foram transferidos para um novo tubo eppendorf e centrifugados por 1 min à temperatura ambiente para retirada do meio. Ao “*pellet*” celular foi adicionado, na seguinte ordem: 240 µL de PEG 40 % (p/v), 36 µL de 1M LiAc, 25 µL de suspensão de DNA de esperma de salmão desnaturado (2 mg.mL⁻¹), 49 µL de água destilada, e 1 µL de suspensão do DNA transformante. A mistura foi então incubada por 30 min a 30 °C. Em seguida, novamente incubada por 30 min a 42 °C. Terminada a incubação, a mistura foi centrifugada por 1 min a 11600 *g* a temperatura ambiente e as células ressuspensas em água destilada. Por fim, as células foram semeadas em placas com meio seletivo solidificado, conforme o tipo de marcador de seleção empregado.

4.11.4 Reconstituição do gene *URA3*

O gene *URA3* foi inserido no genoma da linhagem BSY021-34B (*iSUC2 ura-*) por recombinação homóloga e metodologias baseadas em enzimas de restrição (Gietz e Schiestl, 1995). O plasmídeo pRS406 (Sikorski e Hieter, 1989) (Figura 4.2), extraído de uma cultura de *E. coli* conforme orientações do fabricante (Gene EluteTM Plasmid Miniprep Kit, Sigma), foi clivado com as enzimas de restrição NdeI e StuI, e assim dois fragmentos foram obtidos (523 e 3861 pb). O fragmento menor, contendo regiões de homologia ao gene *URA3*, foi purificado seguindo orientações do fabricante (Zymoclean Gel DNA Recovery Kit, Zymo Research). Este cassete foi empregado para transformar a linhagem *iSUC2 ura-* (BSY021-34B) pela técnica de transformação de leveduras por acetato de lítio, substituindo-se, por recombinação homóloga, parte do alelo *ura3-52* pelo novo cassete. Desta maneira, a reconstituição do gene *URA3* nas células transformadas permitiu às mesmas crescerem em

meio sintético definido sem uracila (ver item 4.2). Uma colônia foi resgatada e denominada IMI-056 (*iSUC2*).

Figura 4.2 - Plasmídeo pRS406 utilizado para se obter o fragmento de 523 pb empregado para reconstrução do gene *URA3* nas linhagens auxotróficas para a uracila.

4.11.5 Deleção do gene *AGT1*

O gene *AGT1* foi deletado do genoma das linhagens CEN.PK113-7D (*SUC2*), IMI-056 (*iSUC2*) e IMM-007 (*iSUC2* evoluída) por recombinação homóloga e metodologias baseadas em PCR (Gietz e Schiestl, 1995), gerando os transformantes IMK-308 (*SUC2* Δ *agt1*), IMK-305 (*iSUC2* Δ *agt1*), e IMM-008 (*iSUC2* evoluída Δ *agt1*), respectivamente. Através de PCR, os primers códigos 1470 e 1471 (Tabela 4.2) e o DNA genômico de uma linhagem Δ *agt1* derivada da linhagem S288C (BY4741), da coleção *Saccharomyces* Genome Deletion Project (YKO *MATa* Strain Collection-Glycerol Stocks, Open Biosystems, Thermo Scientific), extraído conforme orientações do fabricante (YeaStar Genomic DNA Kit, Zymo Research), produziram um fragmento linear de DNA com ~ 2,7 kb, portando em suas extremidades regiões homólogas às regiões imediatamente a montante (compreendendo 381 pb) e a jusante (compreendendo 644 pb) do gene *AGT1* e, entre essas extremidades, o cassete KanMX (uptag-P_{TEF} *kan*^r-T_{TEF}owntag, com ~ 1,7 kb), contendo o gene *kan*^r. Este novo cassete

(*AGT1*-KO-KanMX) foi purificado (Genelute PCR Clean up Kit, Sigma), e em seguida empregado para transformar as linhagens pela técnica do acetato de lítio, substituindo-se, por recombinação homóloga, o gene *AGT1* pelo cassete, o qual conferiu às células transformadas resistência à geneticina (G418) em meio YPD sólido com 200 mg.L⁻¹ de G418.

Em seguida, os transformantes foram analisados por PCR diagnóstico através do isolamento do DNA genômico utilizando-se kit e seguindo as instruções do fabricante (YeaStar Genomic DNA Kit, Zymo Research) e empregando-se uma combinação de dois pares de primers (1472 e 9; 1473 e 10) (Tabela 2.2). A combinação de primers foi desenhada de maneira que um deles fosse anelado na região do cassete e a outra na região adjacente ao gene deletado. A inserção correta do cassete *AGT1*-KO-KanMX no genoma das leveduras permitiu uma amplificação de dois fragmentos (1010 e 1067 pb). Caso a inserção não tivesse ocorrido no sítio correto, não haveria produtos de amplificação com estes dois pares de primers.

Para verificar se o gene *AGT1* ainda estava presente nestes transformantes deletados no gene *AGT1*, bem como para confirmar a presença do mesmo nas linhagens parentais, uma outra combinação de três pares de primers foi utilizada sobre o DNA genômico destas linhagens. A combinação dos primers 1563 e 1564 gerou um fragmento com 75 pb, que foi amplificado a partir de uma região interna ao gene *AGT1*. A combinação dos primers 1472 e 1564 gerou um fragmento com 1076 pb, que foi amplificado de uma região compreendida entre nucleotídeos a montante e nucleotídeos internos ao gene *AGT1*. Por fim, a combinação dos primers 1687 e 1688 gerou um fragmento com 1507 pb, novamente amplificado de outra região interna ao gene *AGT1*.

Para a deleção do gene *AGT1* na linhagem IMM-008 (*iSUC2* evoluída $\Delta agt1$), que já continha em seu genoma o cassete *AGT1*-KO-KanMX, foi empregada outra estratégia de deleção. Através de PCR, os primers 1651 e 1652 (Tabela 2.2) e o plasmídeo pUG-hphN (Zelle et al., 2011) (Figura 4.3), extraído conforme orientações do fabricante (Qiagen midprep kit, Qiagen), produziram um fragmento linear de DNA com 1949 pb, portando em suas extremidades regiões homólogas às regiões a montante e a jusante do gene *AGT1* e, entre essas extremidades, o gene *hphN*. Este novo cassete (*AGT1*-KO-hphN) foi purificado (DNA Clean and Concentrator Kit, Zymo Research), e em seguida empregado para transformar a linhagem IMM-008 (*iSUC2* evoluída $\Delta agt1$) pela técnica do acetato de lítio, substituindo-se, por recombinação homóloga, a outra cópia do gene *AGT1* pelo cassete, o qual conferiu às

células transformadas resistência à higromicina, permitindo o seu isolamento em meio YPD com 100 mg.L⁻¹ desta substância. A linhagem obtida, IMM-009 (*iSUC2* evoluída Δ/Δ *agt1*), foi analisada por PCR diagnóstico. Para verificar a inserção no local correto do cassete *AGT1*-KO-hphN, foram empregados uma combinação de dois pares de primers (1007 e 1472; 1008 e 1473) (Tabela 2.2), os quais permitiram a amplificação de dois produtos (1405 e 1744 pb). Adicionalmente, utilizou-se uma outra combinação de dois pares de primers (1472 e 9; 1473 e 10) (Tabela 2.2), para verificar a presença do cassete *AGT1*-KO-KanMX, os quais permitiriam a amplificação de dois fragmentos (1010 e 1067 pb) caso as células tivessem em seu genoma a inserção do cassete. Por fim, empregou-se uma terceira combinação de primers (1687 e 1688; 1564 e 1472), que geraria os fragmentos de 1507 e 1226 pb, respectivamente, caso o transformante tivesse uma terceira cópia do gene *AGT1*.

Tabela 4.2 - Primers utilizados.

Primer	Código ^(a)	Seqüências (5' → 3')
Kan A	9	CGCACGTCAAGACTGTCAAG
Kan B	10	TCGTATGTGAATGCTGGTCG
MAL32 Probe RV	942	AGCAGCAAACAGCGTCTTGTC
hphNT Ctrl Rv	1007	AGACGTCGCGGTGAGTTTCAG
hphNT Ctrl Fw	1008	ACGCGGATTTTCGGCTCCAAC
TPI1prom.CTRL-FW	1067	CTTTGGCTCGGCTGCTGTAAC
MAL1 locus-CTRL-FW	1084	AGGCACAAGTACCAGGTGCTAAAG
MAL11 Fw	1145	CACCCATATGGTATAATATGAAAAATATCATTTTCATTGGTAAGCAAGA AG
AGT1-KO upstream	1470	GCGAGTTGCAAGAATCTCTACG
AGT1-KO downstream	1471	GATGACGACCACATGGGTTTG
AGT1 Ctrl Fw	1472	GCCTCTTTCCACCACTTTG
AGT1 Ctrl Rv	1473	ACGAGGACTGTCAGACCATTTG
Fw MAL11 qPCR	1563	CAGCCCTGTGGTCCATATTAGTG
Rv MAL11 qPCR	1564	ACAGTGCCTCAGTAGTGC
AGT1 KO Fw B	1651	<u>TCATTTTCATTGGTAAGCAAGAAGAAGGCTGCCTCAAAAAATGAGGATA</u> <u>AAAACAT</u> CAGCTGAAGCTTCGTACGC
AGT1 KO Rv B	1652	<u>CATTTATCAGCTGCATTTAATTCTCGCTGTTTTATGCTTGAGGACTGACT</u> <u>GATACGCATAGGCCACTAGTGGATCTG</u>
MAL13 Prom Repl Fw	1653	<u>AAGTAAATGAAAAGTAGAAAATTTAGCCAGAACTCTTTTTTGCTTCGAG</u> <u>TCAGCTGAAGCTTCGTACGC</u>
MAL13 Prom Repl Rv	1654	<u>CGACAGCAGTCGCATGCTTGGCGCATGTTTGCTTAGTTAAAGTCA</u> <u>TGCGGAGTTTATGTATGTGTTTTTG</u>
MAL13 Prom Repl Ctrl Fw	1655	TAAAGTCCGGGTGACCTGG
MAL13 Prom Repl Ctrl Rv	1656	CCCTCTGCACTTCTGCTATTCT
MAL13 KO Fw A	1668	<u>CTCGATATATATTAAAGTAAATGAAAAGTAGAAAATTTAGCCAGAACTC</u> <u>TCAGCTGAAGCTTCGTACGC</u>
MAL13 KO Rv A	1669	<u>CACAGTTTCTACAATGGAAAGCTATCACTTACCAGGAAGTTGAGATGCA</u> CGCATAGGCCACTAGTGGATC TG
MAL13 Ctrl Fw	1672	ATAAAGTCCGGGTGACCTGGG
MAL13 Ctrl Rv	1673	CCAATCTGGCTCTTAGCACTC
MAL13 inside Fw	1674	CGGTCCTAACACCATTTGCAACTG
MAL13 inside Rv	1675	CAAGTTGCGGTGGTGCTATTGTG
AGT1 inside Fw	1687	CCACCAATTGAGCCAGTTAG
AGT1 inside Rv	1688	AAGGTTCTACCAGTTGTCTCAGGCAGATCG
MAL11 Seq Fw 1	sc	CAGCCCTGTGGTCCATATTAG
MAL11 Seq Fw 2	sc	TGGCCTGCTCCTTTAATGATCG
MAL11 Seq Fw 3	sc	CTGGTATCGGTGCAGTTG
MAL11 Seq Rv 1	sc	TGTCCCACAGCAATCATAGC
MAL11 Seq Rv 2	sc	GCAGCCTTCTTCTTGCTTACC

^(a) Código referente ao banco de dados do Laboratório de Microbiologia Industrial da Delft University of Technology, Holanda. Os nucleotídeos em negrito e sublinhados nos primers de deleção referem-se às regiões de homologia ao genoma de *S. cerevisiae*, obtidos da base de dados "*Saccharomyces Genome Database*" (SGD).

sc – sem código, pois não foram estocados, mas apenas utilizados no sequenciamento (item 4.13).

Figura 4.3 - Plasmídeo pUGhphN utilizado para se obter o cassete de transformação com 1949 pb para deleção da cópia extra do gene *AGT1* na linhagem IMM-008 (*iSUC2* evoluída $\Delta agt1$).

4.11.6 Deleção do gene *MAL13*

Esta etapa do trabalho foi realizada pelo aluno de doutoramento, Stefan de Kok, do LMI/TU Delft, que é um colaborador deste trabalho.

O gene *MAL13* foi deletado do genoma da linhagem IMM-007 (*iSUC2* evoluída) por recombinação homóloga e metodologias baseadas em PCR (Gietz e Schiestl, 1995), gerando o transformante IMM-010 (*iSUC2* evoluída $\Delta mal13$). Através de PCR, os primers 1668 e 1669 (Tabela 4.2) e o plasmídeo pUG-hphN (Zelle et al., 2011) (Figura 4.3), extraído conforme orientações do fabricante (Qiagen midprep kit, Qiagen), produziram um fragmento linear de DNA com 1939 pb portando em suas extremidades regiões homólogas à região a montante e a jusante do gene *MAL13* e, entre essas extremidades, o gene hphN. Este novo cassete (*MAL13*-KO-hphN) foi purificado (DNA Clean and Concentrator Kit, Zymo Research), e em seguida empregado para transformar a linhagem IMM-007 (*iSUC2*) pela técnica do acetato de lítio, substituindo-se, por recombinação homóloga, o gene *MAL13* pelo cassete, o qual conferiu às células transformadas resistência à higromicina, permitindo o seu isolamento em

meio YPD com 100 mg.L^{-1} desta substância. A linhagem obtida, IMM-010 (*iSUC2* evoluída $\Delta mal13$), foi analisada por PCR diagnóstico, empregando-se uma combinação de dois pares de primers (1008 e 1672; 1007 e 1673) (Tabela 4.2), os quais permitiram a amplificação de dois fragmentos (695 e 1078 pb) caso as células tivessem em seu genoma a inserção correta do cassete *MAL13*-KO-hphN. Adicionalmente, empregou-se outra combinação de primers internos ao gene *MAL13* (1674 e 1675), que geraria um fragmento de 587 pb, caso o transformante tivesse uma outra cópia do gene *MAL13*.

4.11.7 Substituição do promotor do gene *MAL13*

Para a substituição do promotor nativo do gene *MAL13*, pelo promotor forte P_{TP11} , foi utilizado outro cassete de DNA. Através de PCR (Expand High Fidelity PCR System, Roche), os primers 1653 e 1654 (Tabela 4.2) e o plasmídeo pUG6- P_{TP11} (Abbott et al., 2009) (Figura 4.4), extraído conforme orientações do fabricante (Qiagen miniprep kit, Qiagen), produziram um fragmento linear de DNA com 2301 pb portando em suas extremidades regiões homólogas às regiões a montante e a jusante da região promotora do gene *MAL13* e, entre essas extremidades, o cassete loxP-KanMX-loxP- P_{TP11} . Este novo cassete foi purificado (DNA Clean and Concentrator Kit, Zymo Research), e em seguida empregado para transformar a linhagem IMI-056 (*iSUC2*) pela técnica do acetato de lítio, substituindo-se, por recombinação homóloga, o promotor original pelo novo promotor (P_{TP11}) e gerando assim a linhagem IMI-066 (*iSUC2* P_{TP11} -*MAL13*). Os transformantes foram selecionados em meio YPD contendo Geneticina. Por fim, os transformantes foram analisados por PCR (FastStart PCR Master, Roche) diagnóstico através de técnica conhecida como “*colony PCR*”, empregando-se uma combinação de dois pares de primers (9 e 1655; 1067 e 1656) (Tabela 2.2), os quais permitiriam uma amplificação de dois fragmentos (375 e 396 pb) caso as células tivessem em seu genoma a inserção no sítio correto do cassete loxP-KanMX-loxP- P_{TP11} .

Figura 4.5 - Plasmídeo pAG306GPD-MAL11 utilizado para se obter o cassete de transformação com 7725 pb para obtenção da linhagem que superexpressa uma cópia extra do gene *AGT1* por ação do promotor forte P_{TDH3} (IMI-067; iSUC2 P_{TDH3} *AGT1*).

4.12 Análise da expressão gênica em escala genômica (transcriptoma)

Esta etapa do trabalho foi realizada em parceria com o grupo coordenado pelo Dr. Jack Pronk, colaborador deste projeto, nas dependências do LMI/TU Delft. A análise dos micro-arranjos de DNA foi conduzida com arranjos S98 Yeast GeneChip da Affymetrix (Santa Clara, CA) conforme descrito anteriormente (Piper et al., 2002) e coordenada pelo Dr. Jean-Marc Daran. As células foram transferidas diretamente dos quimiostatos em anaerobiose para um frasco com nitrogênio líquido e processadas de acordo com as instruções do fabricante (Manual técnico da Affymetrix), com as seguintes modificações. A síntese de cDNA de fita-dupla foi conduzida empregando-se 15 µg de RNA total e os componentes do “One Cycle cDNA Synthesis Kit” (Affymetrix). O cDNA de fita-dupla foi purificado (GeneChip Sample Cleanup Module, Qiagen) antes das etapas de transcrição *in vitro* e marcação (GeneChip IVT Labelling Kit, Affymetrix). Por fim, o cRNA marcado foi purificado (GeneChip Sample Cleanup Module) antes das etapas de fragmentação e hibridização empregando-se 15 µg de cRNA-biotina. Os resultados de expressão gênica para cada linhagem foram obtidos a partir de 2 replicatas biológicas (dois cultivos independentes) (De Nicola et al., 2007).

A aquisição e a quantificação das imagens dos arranjos, bem como a filtragem dos dados, foram conduzidas usando o programa de operação Affymetrix Genechip, versão 1.2.

O “*add-in*” “*Significance Analysis of Microarrays*” (SAM), versão 1.12 (Tusher et al., 2001) do Microsoft Excel foi utilizado para análise estatística dos resultados de expressão gênica obtidos para cada linhagem (i*SUC2*, i*SUC2* evoluída e *SUC2*). As comparações realizadas (“*pairwise comparison*”) foram: entre a linhagem i*SUC2* e a linhagem i*SUC2* evoluída, bem como entre a linhagem i*SUC2* e a linhagem-referência *SUC2*, todas elas cultivadas em condições idênticas (quimiostatos limitados por sacarose em anaerobiose).

Grupos de genes que respondem igualmente a uma dada condição experimental foram avaliados quanto a sua super-representação em categorias funcionais (MIPS e KEGG) usando testes hipergeométricos, conforme descrito por Knijnenburg et al. (2007) e Kresnowati et al. (2006).

4.13 Sequenciamento do gene *AGT1*

Para o sequenciamento do gene *AGT1* presente nas linhagens i*SUC2*, i*SUC2* evoluída e i*SUC2* evoluída $\Delta agt1$, foi necessário, primeiramente, extrair o DNA genômico das mesmas segundo protocolo padrão (YeaStar Genomic DNA Kit, Zymo Research). Em seguida, o alelo presente em cada linhagem foi amplificado (Phusion Hot Start, High-Fidelity DNA polymerase, Finnzymes) com os primers 1084 e 942, gerando o produto com 4476 pb, no caso das duas primeiras linhagens, e com as combinações de primers 1084 e 1145, e 1472 e 1564, gerando os produtos com 2097 e 1226 pb, respectivamente, no caso da linhagem i*SUC2* evoluída $\Delta agt1$ (Tabela 2.2). Tais produtos de PCR foram então purificados (DNA Clean and Concentrator Kit, Zymo Research) e encaminhados, juntamente com os primers MAL11 seq-Fw1, -Fw2, -Fw3, -Rv1 e -Rv2 (Tabela 2.2) à empresa Baseclear (Leiden, Holanda), para serem seqüenciados.

4.14 Cálculo dos parâmetros fisiológicos

Os parâmetros fisiológicos (fator de conversão de substrato a células, fator de conversão de substrato a etanol, velocidade específica de produção de produto e velocidade

específica de consumo de substrato) dos cultivos realizados foram calculados segundo Schmidell et al., 2001.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 5.1 é apresentada uma visão geral de todos os experimentos realizados em biorreator ou em frasco agitado, durante este trabalho de tese de doutoramento.

Quadro 5.1: Quadro-resumo dos experimentos realizados

Linhagem ^(a)	Sigla (LMI/TU Delft)	Modo de cultivo	Fonte de Carbono	Limitação nutricional	Condição	Local
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Aerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LEB/USP
i <i>SUC2</i> ura-	BSY021-34B	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Aerobiose	LEB/USP
i <i>SUC2</i> ura-	BSY021-34B	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Quimiostato*	Glicose	Glicose	Aerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Quimiostato*	Glicose	Glicose	Anaerobiose	LEB/USP
i <i>SUC2</i> ura-	BSY021-34B	Quimiostato*	Glicose	Glicose	Aerobiose	LEB/USP
i <i>SUC2</i> ura-	BSY021-34B	Quimiostato*	Glicose	Glicose	Anaerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i>	CEN.PK113-7D	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i>	IMI-056	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> evoluída	IMM-007	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> evoluída $\Delta agt1$	IMM-008	Quimiostato*	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> evoluída $\Delta agt1/\Delta agt1$	IMM-009	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> P _{TPII} -MAL13	IMI-066	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> P _{TDH3} -AGT1	IMI-067	Quimiostato	Sacarose	Sacarose	Anaerobiose	LMI/TU Delft
<i>SUC2</i>	CEN.PK113-7D	Batelada repetida (SBR) ^(b)	Sacarose		Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i>	IMI-056	Batelada repetida (SBR)	Sacarose		Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> evoluída	IMM-007	Batelada repetida (SBR)	Sacarose		Anaerobiose	LMI/TU Delft
<i>SUC2</i> $\Delta agt1$	IMK-305	Batelada repetida (SBR)	Sacarose		Anaerobiose	LMI/TU Delft
i <i>SUC2</i> $\Delta agt1$	IMK-308	Batelada repetida (SBR)	Sacarose		Anaerobiose	LMI/TU Delft
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Shake-flask	Sacarose		Aerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Shake-flask	Glicose		Aerobiose	LEB/USP
i <i>SUC2</i> ura-	BSY021-34B	Shake-flask	Sacarose		Aerobiose	LEB/USP
i <i>SUC2</i> ura-	BSY021-34B	Shake-flask	Glicose		Aerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Quimiostato	Glicose	Uracila/Glicose	Aerobiose	LEB/USP
<i>SUC2</i> ura-	CEN.PK113-5D	Quimiostato	Sacarose	Uracila/Sacarose	Aerobiose	LEB/USP

^(a) Todas as linhagens empregadas são da espécie *Saccharomyces cerevisiae*

^(b) Nas bateladas repetidas (sequential batch reactors - SBR), o terceiro ciclo foi amostrado

NOTA: Todos os cultivos foram realizados em duplicata (exceto quando indicados, feitos em monoplicata*), a 30 °C, pH controlado em 5,0 (no caso de cultivos em biorreator) e em meio de cultura definido (Verduyn et al., 1992). Todos os quimiostatos foram realizados a uma vazão específica de 0,10 h⁻¹. Para mais detalhes experimentais, favor consultar a seção de Materiais e Métodos.

5.1 Efeitos da limitação por uracila em cultivos contínuos de *S. cerevisiae*

Linhagens auxotróficas de leveduras constituem importantes plataformas utilizadas tanto para a pesquisa aplicada como para a pesquisa fundamental. O uso destas linhagens como estratégia para a detecção e a seleção de transformantes é uma ferramenta importante e eficaz no escopo da biologia molecular, principalmente quando o objetivo é utilizar a marcação auxotrófica para impedir a perda do(s) gene(s) introduzido(s) (Pronk, 2002). Um exemplo muito utilizado com linhagens de *S. cerevisiae* é a auxotrofia para a uracila. O gene *URA3* codifica a enzima orotidina-5-fosfato descarboxilase (ODC), envolvida na síntese “de novo” de pirimidinas. Esta enzima cataliza a descarboxilação de orotidina-5-fosfato (OMP) para uridina-5-fosfato (UMP), essencial na biossíntese de uracila na levedura *S. cerevisiae*. O alelo *ura3-52* (*ura-*) é causado por uma inserção tipo *Ty* na região codificadora do gene funcional *URA3*, que por sua vez elimina a síntese da enzima ODC, deixando as células incapazes de sintetizar UMP pela via “de novo” (Rose e Winston, 1984).

Se não transformada com um alelo funcional do gene *URA3*, as células auxotróficas para a uracila só podem ser propagadas em meios que contenham esta substância em sua composição. Nesta situação, a uracila é captada pelas células por meio de um sistema de co-transporte com H^+ (Pantazopoulou e Diallinas, 2007), suprimindo assim o requerimento de UMP pela via “salvage” de pirimidinas. A facilidade com que as linhagens auxotróficas e suas correspondentes complementadas podem ser manipuladas e os baixos custos dos reagentes envolvidos têm contribuído em muito para a construção de inúmeras linhagens laboratoriais com várias combinações de auxotrofia.

Como algumas linhagens (*SUC2 ura-* e *iSUC2 ura-*) utilizadas neste projeto são auxotróficas para a uracila, foi necessário definir uma concentração adequada desta substância no meio de cultivo. Existem divergências entre os trabalhos publicados na literatura, sobre os requerimentos nutricionais para linhagens auxotróficas, e, em especial, para a uracila. Numa referência importante sobre o tema (Sherman, 1991), sugere-se uma suplementação de uracila de 20 mg.L⁻¹ para meios sintéticos. Por outro lado, Pronk (2002) sugere uma suplementação de acordo com a concentração celular esperada, considerando-se um teor de uracila na massa seca celular de 0,011 g.g DW⁻¹ (Oura, 1972¹ apud Pronk,

¹ Oura E. The effect of aeration on the growth energetics and biochemical composition of baker's yeast [PhD Thesis]. Helsinki: University of Helsinki, 1972.

2002) e um fator de acréscimo/segurança de 1,25. Por exemplo, num quimiostato em aerobiose com *S. cerevisiae*, com uma concentração de glicose de 10 g.L^{-1} no meio de alimentação, espera-se uma concentração de biomassa seca de cerca de 5 g DW.L^{-1} (assumindo-se um $Y_{x/s}$ de $0,5 \text{ g DW. g}^{-1}$). Logo, é possível calcular uma suplementação de uracila ao redor de 70 mg.L^{-1} ($0,011 \times 10 \times 0,5 \times 1,25$). Como pode ser observado, existe uma grande variação entre o valor sugerido por Sherman (1991) e o sugerido por Pronk (2002). Assim, decidiu-se avaliar os efeitos das duas concentrações de uracila sobre a fisiologia da linhagem auxotrófica para este nutriente.

Durante o estado-estacionário de quimiostatos aeróbios limitados por glicose (e suplementados com $75 \text{ mg de uracila.L}^{-1}$) conduzidos com a linhagem auxotrófica para a uracila (*SUC2 ura-*), os principais parâmetros fisiológicos foram essencialmente iguais àqueles apresentados pela linhagem isogênica prototrófica (*SUC2*, CEN.PK113-7D) (Tabela 5.1). Assim, a uma D de $0,10 \text{ h}^{-1}$, o crescimento foi completamente respiratório, e nenhum metabólito foi detectado no meio de crescimento. Apesar desta observação parecer óbvia, foi decidido conduzir tal experimento, uma vez que a μ_{max} é afetada pela suplementação nutricional. Ao crescerem, as células precisam transportar ativamente os nutrientes auxotróficos, e no caso da uracila, a ativação da via de utilização de pirimidina também é requerida (Pronk, 2002), o que implica em gasto adicional de energia.

No caso dos cultivos limitados por sacarose, como era esperado, o crescimento foi puramente respiratório. No entanto, o rendimento em biomassa foi 8 % maior e a concentração de açúcares residuais 3 vezes maior, quando comparados aos mesmos parâmetros obtidos nos quimiostatos limitados por glicose. Vale destacar que dados obtidos durante quimiostatos limitados por sacarose são extremamente raros na literatura. Similarmente aos dados obtidos neste estudo, num dos raros trabalhos que relatam resultados nestas condições experimentais, reporta-se um rendimento em biomassa maior em sacarose do que em glicose (Barford et al., 1995).

Para o estudo da limitação por uracila, foi utilizada uma concentração de uracila de 20 mg.L^{-1} no meio de alimentação. Esta concentração é a sugerida por um dos principais manuais sobre o cultivo de linhagens auxotróficas (Sherman, 1991). Considerando-se um conteúdo de uracila na biomassa de $0,011 \text{ g uracila.g DW}^{-1}$ (Pronk, 2002), é possível calcular que a concentração celular máxima esperada para estes cultivos seria em torno de $1,8 \text{ g DW.L}^{-1}$, o que indicaria que em tais condições a uracila e não a glicose ou a sacarose seriam o

nutriente limitante. Como observado na Tabela 5.1, as concentrações de biomassa alcançadas em cultivos com limitação de uracila foram próximas deste valor (considerando-se uma concentração de açúcar de 10 g.L^{-1} no meio de alimentação, um rendimento em biomassa de $0,22 \text{ g DW.g}^{-1}$, e uma concentração de açúcares residuais menores do que $0,6 \text{ mM}$, é possível calcular uma concentração de biomassa de $2,1 \text{ g DW.L}^{-1}$). Assim, nas condições de limitação de uracila, era esperado que as células não fossem consumir uma parte considerável do açúcar proveniente do meio de alimentação (uma vez que a D de $0,10 \text{ h}^{-1}$ sob regime de aerobiose, o rendimento em biomassa gira normalmente em torno de $0,5 \text{ g DW.g}^{-1}$). No entanto, isto não foi o observado, uma vez que 99% e 94% da fonte de carbono foi consumida nos quimiostatos conduzidos com glicose e com sacarose, respectivamente.

Tabela 5.1 - Parâmetros fisiológicos da linhagem SUC2 ura- (CEN.PK113-5D) durante o estado estacionário em quimiostatos aeróbios limitados por diferentes nutrientes. Os dados estão apresentados como a média e o desvio da média de dois experimentos independentes.

Parâmetros fisiológicos ^(a)	Sem limitação de uracila		Com limitação de uracila		
	Fonte de carbono				
	Glicose ^(a)	Glicose ^(b)	Sacarose	Glicose	Sacarose
Y _{X/S} [g DW.(g GLC eq) ⁻¹]	0,50 ± 0,01	0,50	0,54 ± 0	0,22 ± 0,00	0,23 ± 0,02
Y _{ETH/S} [g.(g GLC eq) ⁻¹]	0	0	0	0,19 ± 0,00	0,13 ± 0,01
q _{ETH} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0	1,96 ± 0,17	1,2 ± 0,09
q _{GLYC} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0	0,04 ± 0,01	0,02 ± 0,00
q _{ACE} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0	0,49 ± 0,09	0,29 ± 0,08
q _S [mmol GLC eq.(g DW.h) ⁻¹]	1,1 ± 0,1	1,1	1,2 ± 0,03	2,67 ± 0,26	2,4 ± 0,03
S _{RESIDUAL} (mM) ^(d)	0,17 ± 0,01	0,17	0,54 ± 0,11	0,63 ± 0,03	1,75 ± 0,39
q _{O2} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	2,6 ± 0,1	2,2	2,2 ± 0,2	4,1 ± 0,4	4,1 ± 0,6
q _{CO2} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	2,8 ± 0,0	2,6	2,5 ± 0,5	6,1 ± 0,2	5,6 ± 0,1
RQ (q _{CO2} /q _{O2})	1,1 ± 0,1	1,2	1,1 ± 0,1	1,5 ± 0,1	1,4 ± 0,2
Balanco de C (%) ^(d)		95,5	95,0 ± 5,1	93,5 ± 1,9	89,5 ± 3,2

^(a) Os dados se referem ao trabalho de Diderich et al., (1999). A linhagem utilizada foi *S. cerevisiae* CEN.PK113-7D, prototrófica para uracila.

^(b) Para este cultivo em particular, não foi realizado uma duplicata.

^(c) Concentração de açúcar residual no estado-estacionário. Nos cultivos em glicose o valor refere-se à concentração desta substância. Nos cultivos em sacarose, o valor refere-se à soma da concentração dos 3 açúcares (glicose, frutose e sacarose).

^(d) Balanco de carbono foi estimado usando-se uma composição de biomassa de $25,34 \text{ g/C-mol}$ para cultivos aeróbios e um conteúdo de cinzas de 7% (Nielsen et al., 2003).

Observa-se ainda, pelos dados apresentados na Tabela 5.1, que a limitação por uracila resulta num metabolismo respiro-fermentativo, mesmo em condições nas quais as células, quando limitadas pela fonte de carbono, normalmente apresentariam um metabolismo puramente respiratório. Este comportamento é, em parte, semelhante aos

cultivos limitados por outros nutrientes, tais como nitrogênio (N), fósforo (P), e enxofre (S) (Diderich et al., 1999; Bôer et al., 2003). O aumento nas q_{GLC} e q_{SUC} , o qual é resultado da menor eficiência energética da fermentação alcoólica (quando comparada ao metabolismo respiratório), foi acompanhado de um menor $Y_{X/S}$ (Tabela 5.1). Adicionalmente, não apenas a q_{CO_2} , mas também a q_{O_2} aumentaram mais de 2 vezes no cultivos limitados pela uracila, em relação aos cultivos com excesso deste nutriente.

As semelhanças entre os cultivos limitados por uracila e os cultivos limitados por N, P, e S são restritas às observações descritas acima. No primeiro caso, a concentração residual de glicose foi muito menor (na faixa de 1-2 mM) do que no segundo caso, onde uma concentração 10 vezes maior foi observada (Diderich et al., 1999; Bôer et al., 2003). Com isto, foi concluído que existe uma dupla limitação nutricional nos experimentos realizados com limitação de uracila: por carbono (glicose ou sacarose) e pela própria uracila, o que caracteriza uma situação fisiológica diferente da limitação nutricional por N, P ou S. Este fato foi também reportado por outros autores (Brauer et al., 2008; Boer et al., 2008).

Em alguns casos, a restauração da prototrofia em células auxotróficas, através da complementação com plasmídeos contendo os genes em questão, também resultaram em alterações na fisiologia destas células. Foi reportado que, no caso da auxotrofia pela leucina, as concentrações celulares na fase estacionária de cultivos descontínuos foram diferentes entre leveduras prototróficas e suas correspondentes auxotróficas nas quais os requerimentos nutricionais foram atendidos pela complementação genética (inserção de plasmídeo) ou pela suplementação do meio com o nutriente auxotrófico (Çakar et al., 1999).

Um fato curioso observado nos experimentos limitados por uracila foi que houve um aumento significativo na formação de acetato nos cultivos aeróbicos, tanto quando a fonte de carbono empregada foi glicose como sacarose (Tabela 5.1). As q_{ACE} foram maiores do que as comumente observadas em quimiostatos anaeróbios com *S. cerevisiae* [0,02 mmol.(g DW.h)⁻¹, conforme reportado por Abbott et al., 2007] e semelhantes aos valores encontrados em quimiostatos aeróbios conduzidos acima da vazão específica crítica de alimentação (D_{crit}). Segundo Postma et al. (1989), a q_{ACE} foi igual a 0,6 mmol.(g DW.h)⁻¹, a uma D de 0,35 h⁻¹, em cultivos com a linhagem *S. cerevisiae* CBS 8066. Similarmente, em quimiostatos aeróbios limitados por glicose, conduzidos com uma linhagem de *Bacillus subtilis* auxotrófica para a metionina, níveis elevados de formação de acetato foram encontrados, quando a suplementação de metionina foi insuficiente (Çakar et al., 1999).

É provável que este aumento na q_{ACE} em condições aeróbias pode ter sido resultado da atividade de uma rota metabólica conhecida como “desvio da piruvato desidrogenase”, que normalmente opera sob condições respiro-fermentativas (Frick e Wittmann, 2005). Nesta via, que é uma alternativa à reação catalizada pela enzima piruvato desidrogenase, o piruvato é convertido a acetil-CoA pela ação seqüencial das enzimas piruvato descarboxilase, acetaldeído desidrogenase, e acetil-CoA sintetase. Isto, combinado a uma menor demanda biossintética por acetil-CoA (menor biomassa celular), sob condições de limitação de uracila, poderia levar ao acúmulo e subsequente excreção de acetato ao meio de cultivo. Adicionalmente, como o acúmulo de acetato (um ácido orgânico fraco) no meio causa um efeito desacoplador na membrana celular (Verduyn et al., 1992), levando ao gasto de ATP (devido ao influxo de prótons) para a manutenção do pH intracelular, isto poderia explicar o aumento da q_{O_2} sob limitação de uracila (Tabela 5.1). Nesta situação, as células iriam consumir oxigênio na cadeia transportadora de elétrons como forma de gerar ATP para propiciar a retirada de prótons, em vez de ser utilizado na síntese de biomassa.

Em resumo, a limitação por uracila, em quimiostato conduzido em aerobiose plena, resultou em metabolismo respiro-fermentativo e açúcar residual abaixo de 2 mM, indicando uma situação de dupla limitação nutricional (pela fonte de carbono e pela uracila, simultaneamente). Com isto, ocorre diminuição no $Y_{X/S}$ e aumento nas q_{O_2} , q_{CO_2} e q_{ACE} , em comparação a uma situação de excesso deste nutriente auxotrófico. Desta maneira, é possível afirmar que a suplementação insuficiente de uracila (seguindo indicações de alguns manuais para o cultivo de leveduras) resulta numa situação fisiológica claramente distinta de um quimiostato “clássico”, limitado pela fonte de carbono, podendo levar a interpretações equivocadas em estudos quantitativos.

5.2 Estudo da realocização do metabolismo da sacarose em cultivos contínuos

Como apresentado na introdução desta tese (ver item 1), é de se esperar que uma levedura expressando apenas a forma intracelular da enzima invertase, quando cultivada em sacarose, seja obrigada a transportar este açúcar para o ambiente intracelular. Ao transportar uma molécula de sacarose para o ambiente intracelular, ocorre o co-transporte de um H^+ , o que faz com que as células, para manterem o pH intracelular constante, tenham que bombear este próton para o ambiente extracelular. Isto ocorre via H^+ -ATPases de membrana, que gastam uma molécula de ATP por H^+ extrudado (Figura 1.1). Como balanço final, para cada mol de sacarose consumido pelas células em anaerobiose, em vez de serem gerados 4 moles de ATP via fermentação, são gerados apenas 3 moles de ATP (já que um mol é gasto para extrudar o H^+ co-transportado). Nesta situação, o que se espera é que as células, quando em anaerobiose, procurem repor estes 25% de ATP que deixam de ser gerados (ou ao menos parte disto) através de um incremento do fluxo de carbono para as vias fermentativas, ou seja, para a formação de etanol. Portanto, o que se imagina é que este cenário leve à formação de mais etanol por mol de sacarose consumido em anaerobiose do que numa situação de hidrólise extracelular da sacarose. Para verificar esta hipótese, o gene *SUC2* de uma levedura da espécie *S. cerevisiae* foi alterado, de forma que a linhagem resultante superexpressasse, por ação do promotor forte P_{ADH1} , apenas a forma intracelular da enzima invertase (Stambuk et al., 2009).

5.2.1 Modelo teórico do metabolismo de sacarose em anaerobiose

A única diferença, em termos energéticos, entre células de *S. cerevisiae* que transportam sacarose ativamente e células que hidrolisam este dissacarídeo extracelularmente reside na etapa do transporte deste dissacarídeo. Normalmente, em *S. cerevisiae*, após a hidrólise extracelular da sacarose, a glicose e a frutose liberadas são transportadas através da membrana plasmática da levedura *S. cerevisiae* por difusão facilitada (transporte passivo), sem gasto de ATP (Heredia et al., 1968² apud Serrano, 1977;

² Heredia CF, Sols A, DelaFuente G. Specificity of the constitutive hexose transport in yeast. Eur J Biochem. 1968;5:321-9.

Lagunas, 1993). Por outro lado, o transporte de sacarose é ativo (Santos et al., 1982; Stambuk et al., 2000), e portanto implica no gasto de ATP durante a remoção dos H^+ co-transportados com a sacarose, pela H^+ -ATPase de membrana (Serrano, 1977; Lagunas, 1993).

No caso das células que hidrolisam a sacarose no ambiente extracelular, os parâmetros fisiológicos teóricos, em cultivos contínuos limitados por sacarose, podem ser obtidos a partir de modelos energéticos estabelecidos para cultivos contínuos limitados por glicose (Verduyn et al., 1990). De forma análoga, para células que hidrolisam sacarose no ambiente intracelular, modelos estabelecidos para cultivos contínuos limitados por maltose (Weusthuis et al., 1993) podem ser utilizados como referência.

A equação (1) apresenta a estequiometria para a formação de 100 g de biomassa celular (massa seca, DW) da levedura *S. cerevisiae*, em plena anaerobiose, a partir de glicose (Verduyn et al., 1990).

A partir da equação (1), é possível calcular os valores para a formação da mesma quantidade de biomassa (100 g DW) durante o crescimento em sacarose, quando a hidrólise ocorre exclusivamente pela via extracelular.

Para calcular os parâmetros fisiológicos teóricos em cultivos limitados por sacarose com células que transportam este dissacarídeo, primeiramente deve-se fazer algumas considerações, de forma análoga ao que já foi realizado em cultivos com maltose (Weusthuis et al., 1993). Como a estequiometria no co-transporte de sacarose- H^+ é de 1:1 (Serrano, 1977), e as H^+ -ATPases de membrana consomem 1 mol de ATP para remover 1 mol de H^+ (Serrano et al., 1986), o requerimento em ATP para o transporte de sacarose é de 1 mol de

ATP para cada 1 mol de dissacarídeo co-transportado. Assim, a produção líquida nesta situação é de 3 mol de ATP para cada 1 mol de sacarose metabolizado a etanol e CO₂ (via fermentativa). Portanto, existe um déficit de 2697 mmol de ATP para a formação de 100 g de biomassa (devido ao co-transporte de 2697 mmol de sacarose) em relação ao crescimento em sacarose pela via extracelular. Tal déficit pode ser repostado pelo consumo adicional de 899 (2697/3) mmol de sacarose, os quais geram exatamente 2697 mmol de ATP, segundo a equação (3):

Por meio das equações (2) e (3), é possível elaborar a equação para a formação de 100 g de biomassa através do metabolismo da sacarose exclusivamente pela via intracelular, ou seja, precedido pelo co-transporte com íons H⁺:

Finalmente, através das equações (2) e (4), torna-se viável estimar os parâmetros fisiológicos teóricos durante cultivos em quimiostato a $D = 0,10 \text{ h}^{-1}$ em plena anaerobiose com sacarose como única fonte de carbono e energia, tanto para células que hidrolisam a sacarose extracelularmente, como para aquelas que a hidrolisam no ambiente intracelular (Tabela 5.2). Como se nota pelos dados apresentados na Tabela 5.2, devido à energética do transporte ativo de dissacarídeos (Weusthuis et al., 1993; Stambuk et al., 2000), é esperado que as células que transportam a sacarose (linhagem *iSUC2*) apresentem um maior fator de conversão de sacarose a etanol ($Y_{X/S}$), em relação às células que a hidrolizam o dissacarídeo no ambiente extracelular (*SUC2*).

Tabela 5.2 - Parâmetros fisiológicos teóricos, para o crescimento de *S. cerevisiae* em quimiostatos limitados por sacarose em plena anaerobiose ($D = 0,10 \text{ h}^{-1}$). Os cálculos foram realizados tanto para uma situação de consumo de sacarose exclusivamente pela hidrólise extracelular, como para seu consumo exclusivamente pela hidrólise intracelular, precedida pelo co-transporte da sacarose com H^+ . Os cálculos foram baseados no modelo metabólico proposto por Verduyn et al., (1990) para, a linhagem *S. cerevisiae* CBS 8066.,

Parâmetro fisiológico	Modo de consumo da sacarose		Relação INTRA/EXTRA (%)
	Invertase extracelular	Invertase intracelular	
$Y_{X/S}$ [g DW.(g GLC eq) $^{-1}$]	0,103	0,077	- 25
$Y_{\text{ETH}/S}$ [g ETH.(g GLC eq) $^{-1}$]	0,39	0,42	8
q_{ETH} [mmol.(g DW.h) $^{-1}$]	8,24	11,8	43
q_{CO_2} [mmol.(g DW.h) $^{-1}$]	8,83	12,4	40
q_{GLYC} [mmol.(g DW.h) $^{-1}$]	1,10	1,10	0
q_S [mmol GLC eq.(g DW.h) $^{-1}$]	5,29	7,20	33

5.2.2 Fisiologia das linhagens *iSUC2 ura-* e *SUC2 ura-* em quimiostatos limitados por sacarose ou glicose em aero- ou anaerobiose

Para verificar experimentalmente e de forma quantitativa se os parâmetros fisiológicos da levedura *S. cerevisiae* seriam alterados conforme as previsões teóricas apresentadas no item acima, a linhagem *iSUC2 ura-*, uma linhagem haplóide derivada da família CEN.PK (van Dijken et al., 2000), que tem o gene *SUC2* modificado de forma que as células expressam apenas a forma intracelular da invertase sob controle do promotor forte P_{ADH1} (Stambuk et al., 2009), foi avaliada. Como linhagem referência, utilizou-se a linhagem isogênica *S. cerevisiae SUC2 ura-* (CEN.PK113-5D), a qual, igualmente à linhagem *iSUC2 ura-*, é auxotrófica para a uracila. No entanto, esta última não tem o metabolismo de sacarose modificado, ou seja, tem o gene *SUC2* selvagem, apresentando a invertase extracelular como via principal de hidrólise da sacarose (ver item 1). Ambas as linhagens foram cultivadas em quimiostatos limitados por sacarose ou glicose, sob aero- ou anaerobiose, e operados a uma vazão específica (D) de $0,10 \text{ h}^{-1}$. Tais cultivos foram conduzidos empregando-se meio sintético totalmente definido, contendo glicose ou sacarose como única fonte de carbono. Todos os resultados apresentados e discutidos a seguir referem-se a amostras coletadas durante o estado estacionário destes cultivos.

Figura 5.1 - Atividade de invertase nas linhagens *SUC2 ura-* e *iSUC2 ura-*. A atividade de invertase extracelular foi estimada com células intactas (barras brancas) e a atividade total (barras pretas) com células permeabilizadas, ambas coletadas durante o estado-estacionário de quimiostatos limitados por sacarose (A) ou glicose (B) em regime de aerobiose e anaerobiose. Os valores apresentados são as médias e os desvios-padrão de análises realizadas em triplicata, para cada duplicata biológica

Nos cultivos limitados por sacarose com a linhagem *iSUC2 ura-*, a atividade de invertase foi representada quase que exclusivamente pela atividade intracelular, a qual pode ser calculada pela diferença entre a atividade total e extracelular. A atividade intracelular representou 96% da atividade total em anaerobiose e 98% em aerobiose (Figura 5.1 A). Com isto, verificou-se que a estratégia de engenharia metabólica empregada por Stambuk, et al. (2009) resultou na retenção da atividade da invertase no ambiente intracelular na linhagem *iSUC2 ura-*. Além disto, nota-se que o valor absoluto da atividade de invertase é maior na linhagem *iSUC2 ura-*, do que na linhagem *SUC2 ura-*. Por outro lado, na linhagem-referência (*SUC2 ura-*) foram detectadas atividades para as duas formas desta enzima, sendo a forma extracelular responsável pela maior parte da atividade total nos cultivos anaeróbios (91%), e por cerca da metade nos cultivos aeróbios (48%). Este último dado sugere que durante o metabolismo respiratório possa existir repressão na expressão da invertase extracelular.

Foi observado que a linhagem *iSUC2 ura-* apresentou alguma atividade de invertase extracelular, o que não era esperado. No entanto, como o método de quantificação de invertase extracelular baseia-se na dosagem de glicose presente no meio extracelular (ver Materiais e Métodos), não se pode descartar a hipótese de que os produtos de hidrólise da sacarose (glicose e frutose), mesmo sendo hidrolisada intracelularmente, sejam excretados pelas células através dos transportadores Hxtp (Boles e Hollemberg, 1997) e detectados no sobrenadante. Assim, esta atividade “residual” extracelular pode ser uma falha da metodologia de dosagem de invertase, a qual pode ainda ser acentuada pela super-expressão da invertase intracelular nesta linhagem e pelo uso de NaF, substância utilizada para bloquear a via glicolítica e impedir que os produtos da hidrólise da sacarose sejam consumidos nesta via metabólica.

Nos quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose (Tabela 5.3), o $Y_{ETH/S}$ da linhagem *iSUC2 ura-* foi 5% maior do que o mesmo parâmetro na linhagem *SUC2 ura-*. Em relação à q_{ETH} , observou-se um aumento de 22% em relação à linhagem-referência (*SUC2 ura-*). Adicionalmente, o $Y_{X/S}$ foi cerca de 13% menor na linhagem expressando apenas a forma intracelular da invertase. Estes resultados indicam que a estratégia de engenharia metabólica, que teve o intuito de realocar o metabolismo da sacarose, resultou num aumento do $Y_{ETH/S}$, fruto da menor eficiência energética das células que não expressam a invertase extracelular e se vêem obrigadas a transportar a sacarose por transporte ativo.

Observa-se também, pelos dados apresentados na Tabela 5.3, que as concentrações de sacarose, glicose e frutose residuais foram diferentes para as duas linhagens, sendo a soma dos açúcares residuais 10 vezes superior na linhagem *iSUC2 ura-*, em relação à linhagem-referência (*SUC2 ura-*). Mesmo tendo uma atividade de invertase total muito superior à da linhagem controle (Figura 5.1), a linhagem *iSUC2 ura-* não foi capaz de consumir parte da fonte de carbono disponível (cerca de 8% p/p). O fato de uma parte substancial da fonte de carbono não ter sido consumida pela linhagem *iSUC2 ura-* indica uma possível limitação no transporte deste dissacarídeo.

Nos quimiostatos limitados por sacarose em aerobiose (Tabela 5.3), foi observado que o metabolismo das duas linhagens foi completamente respiratório. O $Y_{x/s}$ foi cerca de 13 % menor na linhagem *iSUC2 ura-* em relação à linhagem-referência (*SUC2 ura-*), analogamente ao que ocorreu nos experimentos em anaerobiose. Os valores de q_{CO_2} e q_{O_2} foram maiores na linhagem *iSUC2 ura-* em relação à linhagem-referência, indicando uma intensificação do metabolismo nesta linhagem, provavelmente fruto da sua menor eficiência energética (geração de ATP por mol de sacarose consumida). No entanto, não era esperada uma diminuição tão acentuada (de 13%) no $Y_{x/s}$ para os cultivos em aerobiose, pois no metabolismo puramente respiratório são gerados 76 mol de ATP por mol de sacarose metabolizada, e apenas 1 mol de ATP por mol de proton é gasto no bombeamento de protons para fora das células, no caso da linhagem *iSUC2 ura-*. Assim, a diferença na produção de ATP entre a linhagem *iSUC2 ura-* e a linhagem *SUC2 ura-*, deveria ser de apenas 1,2%. Talvez a diferença no $Y_{x/s}$ seja resultado de outros processos metabólicos que foram afetados pela estratégia da engenharia metabólica empregada, mas experimentos/determinações adicionais seriam necessários para elucidar esta questão.

Tabela 5.3 - Parâmetros fisiológicos das linhagens *SUC2 ura-* (referência) e *iSUC2 ura-* (ausência de invertase extracelular e super-expressão da invertase intracelular) durante o estado estacionário em quimiostatos limitados por sacarose ou glicose em aero- ou anaerobiose. Os dados estão apresentados como a média e $\pm$ o desvio da média de dois experimentos independentes.

Parâmetros Fisiológicos	Sacarose				iSUC2/ SUC2 (%) ^(a)	Glicose					
	Aerobiose		Anaerobiose			Aerobiose			Anaerobiose		
	<i>SUC2 ura-</i>	<i>iSUC2 ura-</i>	<i>SUC2 ura-</i>	<i>iSUC2 ura-</i>		CEN.PK11 3-7D ^(b)	<i>SUC2 ura-</i>	<i>iSUC2 ura-</i>	CEN.PK11 3-7D ^(c)	<i>SUC2 ura-</i>	<i>iSUC2 ura-</i>
<i>D</i> (h ⁻¹)	0,103 ± 0,005	0,093 ± 0,001	0,102 ± 0,003	0,103 ± 0,005		0,10	0,100	0,097	0,10	0,106	0,107
Glicose (g.L ⁻¹)	0,036 ± 0,005	0,010 ± 0,002	0,047 ± 0,006	0,090 ± 0,028		0,03	0,030	0,027	0,08	0,069	0,06
Frutose (g.L ⁻¹)	0,062 ± 0,014	0,017± 0,003	0,103 ± 0,016	0,053 ± 0,033							
Sacarose (g GLC eq.L ⁻¹) ^(d)	0	0,031 ± 0,001	0	2,81 ± 0,07							
<i>Y</i> _{X/S} (g DW.g GLC eq ⁻¹)	0,539 ± 0,003	0,47 ± 0,007	0,109 ± 0,001	0,095 ± 0,003	-13/(-25)	0,5	0,504	0,494	0,10	0,103	0,104
<i>q</i> _S [mmol GLG eq.(g DW.h) ⁻¹]	1,06 ± 0,055	1,103 ± 0,013	5,178 ± 0,199	6,003 ± 0,121	16/(33)		1,103	1,092		5,708	5,742
<i>q</i> _{CO2} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	2,47 ± 0,47	3,38 ± 0,04	8,67 ± 0,13	10,7 ± 0	23/(40)	2,8	2,65	2,59	8,7	8,93	8,88
<i>q</i> _{O2} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	2,22 ± 0,21	3,11 ± 0,04	0	0		2,6	2,25	2,22	0	0	0
RQ	1,11 ± 0,11	1,09 ± 0				1,08	1,18	1,17			
<i>Y</i> _{ETH/S} (g ETH.g GLC eq ⁻¹)	0	0	0,363 ± 0,005	0,382 ± 0,004	5/(8)		0	0		0,379	0,389
<i>q</i> _{ETH} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	7,34 ± 0,19	8,97 ± 0,27	22/(43)	0	0	0	0	8,45	8,72
<i>q</i> _{ACE} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0	0			0	0		0	0
<i>q</i> _{LAC} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0,065 ± 0,008	0,075 ± 0,015			0	0		0,085	0,093
<i>q</i> _{PYR} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0,011 ± 0,001	0,014 ± 0,003			0	0		0,013	0,013
<i>q</i> _{SUCC} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0,001 ± 0	0,001 ± 0			0	0		0,002	0,002
<i>q</i> _{GLYC} [mmol.(g DW.h) ⁻¹]	0	0	0,607 ± 0,067	0,709 ± 0,062	17/(0)		0	0		0,810	0,786
Balanco de Carbono (%) ^(e)	98 ± 5	103 ± 2	94 ± 1	97 ± 1			95,5	93,9		95,1	96
FC [mmol ETH.(g DW.h) ⁻¹]	8,6 ± 0,6	6,0 ± 1,8	10,6 ± 2,1	11,9 ± 4,4		7,6	nd	nd	14,8	6,1	7,6

^(a) Variação porcentual observada e variação teórica (obtida pelo modelo, Tabela 5.2) entre parâmetros da linhagem *iSUC2 ura-* e da linhagem-referência *SUC2 ura-*, dos cultivos em anaerobiose limitados por sacarose.

^{(b);(c)} Dados obtidos do trabalho de Diderich et al. (1999).

^(d) g GLC eq = g de glicose equivalentes.

^(e) Balanço de carbono foi estimado usando-se uma composição de biomassa de 25,34 g/C-mol para cultivos aeróbios (Nielsen et al., 2003) e 25,1 g/C-mol para cultivos anaeróbios (Verduyn et al., 1990). Utilizou-se um conteúdo de cinzas de 7% (Nielsen et al., 2003).

Diferentemente do cultivo limitado por sacarose em anaerobiose, as concentrações de sacarose, glicose e frutose residuais foram bem mais baixas no cultivo aeróbico com a linhagem *iSUC2 ura-*. Adicionalmente, foi constatado que a concentração de sacarose residual nos cultivos em aerobiose com a linhagem *iSUC2 ura-* ($0,031 \text{ g GLC eq.L}^{-1}$) foi bastante próxima da concentração de maltose residual ($0,025 \text{ g GLC eq.L}^{-1}$) durante o estado-estacionário de cultivos aeróbicos limitados por este dissacarídeo (Jansen et al., 2004). Cabe destacar que a maltose também é transportada pelo co-transporte com H^+ . Assim, parece que a afinidade por sacarose dos transportadores na linhagem *iSUC2 ura-* é alta, uma vez que a concentração do substrato residual no quimiostato é inversamente proporcional à afinidade do transportador pelo substrato limitante (Jansen et al., 2004).

Estas observações parecem descartar a hipótese de que a alta concentração de sacarose residual ($2,8 \text{ g GLC eq.L}^{-1}$), observada no cultivo em anaerobiose com a linhagem *iSUC2 ura-*, seja resultado de uma baixa afinidade do(s) transportadore(s) pela sacarose, devido a uma constante de saturação pelo substrato (K_m) elevada. Como a afinidade específica dos transportadores pelo substrato limitante pode ser definida com $q_s \cdot K_m^{-1}$, onde q_s se iguala à $V_{\text{transporte}}$ [velocidade específica de transporte; $\text{mmol} \cdot (\text{g DW} \cdot \text{h})^{-1}$] em quimiostatos (Button, 1991; Jansen et al., 2004), torna-se plausível sugerir que a baixa afinidade específica observada no cultivo em anaerobiose limitado por sacarose seja uma limitação na $V_{\text{transporte}}$ da linhagem *iSUC2 ura-*, ou seja, na capacidade de transporte de sacarose (V_{max}).

De uma maneira geral, os parâmetros fisiológicos observados nos cultivos com a linhagem-referência (*SUC2 ura-*) foram semelhantes aos obtidos por Barford et al. (1995), ao analisarem a linhagem de panificação de *S. cerevisiae* 248 UNSW 703100. De fato, estes são, para o nosso conhecimento, os únicos dados publicados na literatura científica para cultivos contínuos limitados por sacarose em meio de cultura definido.

Com o intuito de verificar se as diferenças obtidas entre as duas linhagens seriam exclusivas aos cultivos limitados por sacarose, foi realizada uma série de experimentos idênticos, porém sob limitação de glicose. Os dados obtidos demonstram que praticamente não houve diferenças entre as linhagens nestas condições (Tabela 5.3), o que é muito interessante, pois o objetivo da estratégia de engenharia metabólica empregada era o de modificar somente o metabolismo do dissacarídeo sacarose, no sentido de aumentar a

formação de etanol quando as células são cultivadas nesta fonte de carbono, que é a situação relevante na atual produção industrial de etanol brasileira. Portanto, aparentemente, as modificações genéticas realizadas não afetaram outros aspectos da fisiologia destas células, o que é desejável.

Em relação às atividades de invertase nos cultivos com glicose com as duas linhagens (Figura 5.1 B), os resultados observados foram muito semelhantes aos cultivos em sacarose. No caso da linhagem *SUC2 ura-*, a atividade extracelular foi responsável pela maior parte da atividade total (76%) nos cultivos anaeróbios, mas em contrapartida, por apenas 24% nos cultivos aeróbios. No caso dos cultivos com a linhagem *iSUC2 ura-*, a atividade de invertase foi representada quase que exclusivamente pela atividade intracelular (96% em anaerobiose, e 98% em aerobiose). É sabido que a atividade de invertase extracelular é reprimida pela presença de glicose (Carlson e Botstein, 1982; Mwesigye e Barford, 1996). No entanto, nos cultivos em glicose, a atividade de invertase extracelular na linhagem referência foi semelhante aos valores obtidos em sacarose. Provavelmente, a concentração de glicose é baixa o suficiente (Tabela 5.3) para não reprimir a expressão do gene *SUC2*, sendo até mesmo capaz de induzir sua expressão nestas concentrações, como reportado por Ozcan et al., 1997.

Os dados de transporte, utilizando $[U-^{14}C]$ sacarose a 20 mM, são apresentados na Figura 5.2. Primeiramente, é preciso ressaltar que a concentração de sacarose utilizada nesta medida não foi muito maior do que o valor de K_m reportado para o transporte de sacarose pelo Agt1p (8 mM). Além disto, a concentração utilizada foi bem menor do que o K_m para os transportadores Malx1p (120 mM) (Stambuk et al., 2000). Portanto, os dados de transporte não devem ser interpretados como sendo referentes à capacidade máxima de transporte (V_{max}) de sacarose nas linhagens estudadas. É possível observar, por exemplo, que o q_s da linhagem *iSUC2 ura-* em cultivos anaeróbicos limitados por sacarose, que foi de 6,0 mmol GLC eq.(g DW.h)⁻¹ (Tabela 5.3), equivalente a 52,5 nmol SUC.(mg DW.min)⁻¹. Se esta linhagem metaboliza toda a sacarose através do seu transporte ativo, o $V_{transporte}$ deveria ser no mínimo igual ou superior ao valor de q_s . No entanto, o $V_{transporte}$ encontrado foi de apenas 5 nmol SUC.(mg DW.min)⁻¹ (Figura 5.2).

De uma forma geral, os valores de transporte obtidos com as células crescendo em sacarose foram muito próximos aos obtidos com as células crescendo em glicose. A única exceção foi com a linhagem *iSUC2 ura-*, para a qual a atividade de transporte foi maior no

cultivo aeróbico limitado por sacarose do que no cultivo limitado por glicose. Estes dados reforçam a hipótese de que a sacarose não funciona como molécula indutora dos transportadores Malx1p e Agt1p, diferentemente do que ocorre com a maltose (Batista et al., 2004).

Nos cultivos limitados por sacarose em anaerobiose, foi observado que o transporte de sacarose marcada foi menor na linhagem *iSUC2 ura-* do que na linhagem *SUC2 ura-*. Por outro lado, nos cultivos limitados por sacarose em aerobiose, o transporte de sacarose marcada foi maior na linhagem *iSUC2 ura-* do que na linhagem *SUC2 ura-*. É provável que estes resultados sejam decorrentes das diferentes concentrações de glicose no estado-estacionário destes cultivos, uma vez que a glicose reprime a expressão dos transportadores e promove inativação catabólica dos mesmos (Medintz et al., 1996). A concentração de glicose foi maior nos cultivos em anaerobiose com a linhagem *iSUC2 ura-* em relação a linhagem *SUC2 ura-*, e menor nos cultivos em aerobiose com a linhagem *iSUC2 ura-* em relação a linhagem *SUC2 ura-* (Tabela 5.3). No entanto, as diferenças nos teores de glicose dos cultivos limitados por glicose não explicam os dados de transporte, os quais foram distintos entre as duas linhagens. Contudo, é intrigante observar que nos cultivos anaeróbios limitados por sacarose, o transporte foi menor na linhagem *iSUC2 ura-* do que na linhagem-referência (*SUC2 ura-*). Mwesigye e Barford (1994) reportaram $V_{\max}$ ao redor de 20 nmol.(mg DW.min)⁻¹, utilizando [U-¹⁴C]sacarose a uma concentração de 13 mM.

Para concluir, cabe ressaltar que a estratégia de engenharia metabólica desenvolvida por Stambuk et al. (2009), avaliada aqui de forma quantitativa, apesar de algumas limitações encontradas (concentração de açúcares residuais elevada e parâmetros fisiológicos diferentes dos previstos pelo modelo), pode ser considerada bastante promissora, pois trabalhos que buscaram aumentar o rendimento em etanol pelo incremento no consumo de ATP na biossíntese celular resultaram num aumento de apenas 3 % (bastante questionável do ponto de vista estatístico, conforme os próprios autores indicam) no parâmetro $Y_{\text{ETH/S}}$ em relação à levedura referência (Bro et al., 2006). Outra estratégia, obtida pela modificação do metabolismo de glutamato, resultou em cerca de 10 % de aumento no $Y_{\text{ETH/S}}$ (Nissen et al., 2000). No entanto, para o sucesso desta última estratégia, as células necessitam assimilar nitrogênio na forma de NH_4^+ , o que não é uma realidade em substratos industriais, nos quais as fontes de N são normalmente aminoácidos.

Figura 5.2 - Atividade de transporte de $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ sacarose nas linhagens *SUC2 ura-* e *iSUC2 ura-*. A atividade de transporte foi estimada nas células coletadas durante o estado-estacionário de quimiostatos limitados por sacarose (A) ou por glicose (B) em aerobiose e anaerobiose, conforme descrito na parte de Materiais e Métodos. Os valores apresentados são as médias e os desvios-padrão de análises realizadas em triplicata, para cada duplicata biológica.

5.3 Comparação das linhagens *SUC2* e *iSUC2* em cultivos descontínuos

5.3.1 Cultivos descontínuos em frasco agitado

No presente estudo, foram levantados diversos dados fisiológicos em cultivos contínuos (item 5.2). Estes dados mostraram diferenças significativas em muitos parâmetros fisiológicos entre as linhagens *iSUC2 ura-* e *SUC2 ura-*, e assim, permitiram quantificar algumas das implicações fisiológicas provenientes da realocização do metabolismo da sacarose na levedura *S. cerevisiae*. Apesar de altamente quantitativos, nos quimiostatos os dados são obtidos com as linhagens crescendo na mesma velocidade específica de crescimento (a qual foi relativamente baixa, μ de $0,10 \text{ h}^{-1}$) e em condições na qual a concentração de açúcar é geralmente baixa. Desta maneira, decidiu-se investigar o efeito da modificação do gene *SUC2* sobre o $\mu_{\max}$ e sobre outros parâmetros fisiológicos, durante o crescimento em cultivos descontínuos, nos quais a fonte de carbono encontra-se em excesso. Mais especificamente, as linhagens *SUC2 ura-* e *iSUC2 ura-* foram cultivadas em modo descontínuo (frasco agitado) com meio sintético.

Nos cultivos realizados com sacarose como fonte de carbono (Figura 5.3), houve uma diferença significativa nos valores de $\mu_{\max}$ entre as duas linhagens. O referido parâmetro foi de $0,40 \pm 0,01 \text{ h}^{-1}$ na linhagem-referência (*SUC2 ura-*), sendo assim próximo ao publicado na literatura com a linhagem diplóide CEN.PK122 nas mesmas condições ($0,38 \text{ h}^{-1}$; van Dijken et al., 2000). No caso da linhagem *iSUC2 ura-*, o $\mu_{\max}$ foi consideravelmente menor ($0,25 \pm 0,01 \text{ h}^{-1}$). Uma constatação surpreendente nos cultivos com a linhagem modificada foi a ausência de etanol e glicerol no meio de cultivo durante o crescimento desta linhagem, o que indica um metabolismo puramente respiratório. Provavelmente, o crescimento lento desta linhagem, abaixo do valor da vazão específica crítica em *S. cerevisiae* linhagem CEN.PK113-7D ($0,30 \text{ h}^{-1}$; van Hoek et al., 1998), tenha permitido a utilização da sacarose exclusivamente pela via respiratória. Em concordância com tal observação, constatou-se um maior rendimento de biomassa sobre substrato (maior Abs_{600} ao atingir-se a exaustão da fonte de carbono) da linhagem *iSUC2 ura-* em relação à linhagem-referência. Uma possível causa para este fenótipo diferente da linhagem *iSUC2 ura-* seria uma baixa capacidade de transporte de sacarose, o que restringiria o fluxo de carbono pela via glicolítica, permitindo que o mesmo

fosse totalmente direcionado para as vias respiratórias. No entanto, como não foram levantados dados sobre a capacidade de transporte de sacarose durante estes cultivos, não se pode precisar se o crescimento lento é resultado de um transporte de sacarose limitante na linhagem *iSUC2 ura*-.

Figura 5.3 - Cultivos descontínuos (em frasco agitado) com as linhagens *SUC2 ura*- (A, C) e *iSUC2 ura*- (B, D). Concentração celular (●), concentração de sacarose (■), glicose (△) e frutose (▲), e concentração de etanol (□) e glicerol (○) durante o cultivo em meio sintético com uréia, suplementados com uracila, e contendo sacarose (A, B) ou glicose (C, D) a 15 g.L^{-1} iniciais como fonte exclusiva de carbono e energia. Os dados são apresentados como a média $\pm$ desvio das médias de experimentos independentes realizados em duplicata.

Diferentemente dos cultivos com a linhagem *iSUC2 ura*-, nos cultivos em sacarose com a linhagem-referência (*SUC2 ura*-), houve formação de etanol (Figura 5.3 A), e assim o $Y_{x/s}$ foi semelhante (dados não apresentados) aos cultivos contínuos anaeróbicos limitados por sacarose (Tabela 5.3). Como a glicose é apontada como causadora de repressão nas enzimas respiratórias (Fiechter et al., 1981), torna-se plausível especular que uma outra razão para um metabolismo puramente respiratório nos cultivos com a linhagem *iSUC2 ura*- em sacarose, seja a ausência de glicose durante tais cultivos. Por outro lado, nos cultivos em

sacarose com a linhagem-referência, observou-se acúmulo de glicose no meio (3 g L^{-1}), o que pode ter contribuído para um metabolismo respiro-fermentativo nesta situação.

Cabe ressaltar que nestes cultivos em frasco agitado tipo erlenmeyer, existe transferência de oxigênio do ar para o meio de cultura, de maneira que os cultivos ocorreram em situação de aerobiose plena, eventualmente com instantes de limitação por oxigênio (não é possível garantir que houve aerobiose plena durante todo o tempo de cultivo, pois não se mediu a concentração de oxigênio dissolvido). Isto é diferente da situação de anaerobiose total em que os quimiostatos foram realizados (item 5.2), não havendo, naqueles experimentos, possibilidade de ocorrência de respiração.

Ao estudarem o crescimento em sacarose de uma linhagem incapaz de transportar hexoses (e assim obrigada a transportar o dissacarídeo), Batista et al. (2004) reportaram que, somente com a expressão constitutiva do gene *MAL63*, que codifica a proteína de regulação positiva dos genes *MAL*, foi possível que a levedura crescesse em meio sintético com sacarose (sendo que o $\mu_{\max}$ foi de $0,12 \pm 0,01 \text{ h}^{-1}$). Este mesmo grupo de pesquisa reportou que o $\mu_{\max}$ em meio rico com sacarose numa linhagem obrigada a transportar sacarose por uma outra estratégia ($\Delta\textit{suc2}$), foi de $0,24 \pm 0,01 \text{ h}^{-1}$ (Badotti et al., 2008). No entanto, diferentemente dos resultados observados no presente estudo, em que não houve formação de etanol, os dois estudos citados relataram a presença de etanol no meio de cultivo, mesmo com valores de $\mu_{\max}$ menores do que o valor crítico ($0,30 \text{ h}^{-1}$).

Cabe aqui ressaltar que não foram observadas diferenças significativas nos valores de $\mu_{\max}$ entre as duas linhagens quando cultivadas em meio sintético com glicose, tendo sido obtidos valores de $0,37 \pm 0,01 \text{ h}^{-1}$ e $0,38 \pm 0,00 \text{ h}^{-1}$ para as linhagens *SUC2 ura-* e *iSUC2 ura-*, respectivamente. Na verdade, estes cultivos foram praticamente idênticos entre si. Não foram observadas diferenças significativas entre os $Y_{X/S}$ das duas linhagens ($0,16 \pm 0,01$, para *SUC2 ura-*; e $0,16 \pm 0,01 \text{ g DW.g}^{-1}$ para *iSUC2 ura-*), bem como do $Y_{\text{ETH/S}}$ ($0,45 \pm 0,01$, para *SUC2 ura-*; e $0,44 \pm 0,01 \text{ g.g}^{-1}$ para *iSUC2 ura-*). Com isto, pode-se inferir que a modificação no gene *SUC2* na linhagem *iSUC2 ura-* não interferiu no metabolismo da glicose, corroborando os dados obtidos nos cultivos contínuos (ver item 5.2).

Outra observação interessante é que quando a linhagem prototrófica CEN.PK113-7D foi cultivada nas mesmas condições, tendo glicose como fonte de carbono, o $\mu_{\max}$ ($0,37 \pm 0,00 \text{ h}^{-1}$) desta linhagem não diferiu da linhagem controle *SUC2 ura-*, auxotrófica para a uracila (dados não apresentados). Isto é um forte indicativo de que, apesar das linhagens

empregadas neste estudo (até este momento) serem auxotróficas para a uracila, este fato não representa um fator limitante para a interpretação dos resultados. Apesar dos cultivos conduzidos em meio sintético suplementado com uracila não apresentarem diferenças entre as linhagens auxotróficas e prototróficas, o mesmo não ocorreu nos cultivos em meio rico complexo (YPD). Nestes cultivos, foram observadas diferenças no perfil de crescimento e no tempo para exaustão da fonte de carbono, entre cultivos suplementados com uracila e cultivos não suplementados (dados não apresentados), o que indica que, apesar do meio YPD ser bastante rico e complexo, não há uracila em quantidade suficiente para suplementar a necessidade auxotrófica da linhagem *SUC2 ura-*, conforme recentemente apontado por Corbacho et al., 2010.

5.3.2 Cultivos descontínuos em anaerobiose plena

Neste ponto dos trabalhos, decidiu-se eliminar a auxotrofia por uracila na linhagem *iSUC2 ura-* (BSY021-34B). Para esta finalidade, o alelo não funcional *ura3-52* foi substituído pelo gene funcional *URA3* (ver Materiais e Métodos). A nova linhagem prototrófica obtida, designada *iSUC2 (MATa URA3 trp1-289 TRP1 - pADH1::iSUC2 MAL2-8^c AGT1)*, foi então investigada em comparação à linhagem-referência CEN.PK113-7D (*MATa URA3 SUC2 MAL2-8^c AGT1*), a qual, igualmente à linhagem *iSUC2*, é prototrófica para a uracila, mas no entanto tem o gene *SUC2* selvagem.

Em virtude da ausência de etanol nos cultivos descontínuos em frasco agitado (item 5.3.1), decidiu-se investigar a importância do transportador de sacarose na levedura modificada. Mais precisamente, optou-se por investigar o transportador de alta afinidade para a sacarose, Agt1p, (Stambuk et al., 1999, 2000) tanto na linhagem expressando apenas a invertase intracelular, *iSUC2*, como na linhagem controle, *SUC2*. Para tal, o gene *AGT1* foi deletado nestas linhagens, conforme descrito no item Materiais e Métodos. As duas novas linhagens obtidas, *iSUC2 Δagt1* e *SUC2 Δagt1*, bem como as suas parentais (*iSUC2* e *SUC2*), foram cultivadas em regime de bateladas repetidas sob anaerobiose em meio sintético contendo sacarose como fonte exclusiva de carbono e energia. Vale destacar que optou-se por utilizar bateladas repetidas e amostrar o terceiro ciclo (ver Materiais e Métodos). A razão para tal foi anular possíveis diferenças oriundas da transferência do inóculo, cultivado

em regime de aerobiose (em frasco agitado), para uma condição de plena anaerobiose (nos fermentadores), bem como para eliminar variações oriundas da fase de crescimento do inóculo, como já apontado por Abbott et al. (2009).

Através dos perfis de CO_2 oriundos destes cultivos (Figura 5.4), nota-se que o tempo de cultivo é praticamente dobrado (de 10 h para 20 h) ao compararmos a linhagem *SUC2* (referência) com a linhagem *iSUC2*. No caso da linhagem *iSUC2 $\Delta agt1$* , a ausência do transportador Agt1p aumenta ainda mais o tempo de fermentação (35 h) e parece reduzir a afinidade de captação da sacarose, principalmente ao final do cultivo (observado, de maneira indireta, pelo declínio menos acentuado no perfil de CO_2 no gás de saída quando comparado às demais linhagens). Estes dados estão de acordo com a constatação de que o gene *AGT1* é um transportador de alta afinidade para a sacarose (Stambuk et al., 2000; Batista et al., 2004). No entanto, tais dados não eliminam a possibilidade de que outros transportadores, possivelmente Malx1p, possam também transportar a sacarose, embora com baixa afinidade (Stambuk et al., 2000; Badotti et al., 2008). Adicionalmente, é possível especular que a ocorrência de um vazamento de invertase para fora das células e/ou a presença de alguma hidrolase extracelular estejam permitindo a hidrólise (lenta) da sacarose e o consumo dos monossacarídeos resultantes.

Figura 5.4 - Perfil de CO_2 no gás de saída em cultivos descontínuos com as linhagens *SUC2* (linhas pretas tracejadas); *iSUC2* (linhas pretas sólidas); e *iSUC2 $\Delta agt1$* (linhas cinzas). Os cultivos foram conduzidos em anaerobiose plena, de forma descontínua, em meio sintético definido, contendo 20 g.L^{-1} de sacarose iniciais como única fonte de carbono. Dois cultivos independentes para cada linhagem estão representados no gráfico

Por outro lado, a remoção do gene *AGT1* na linhagem referência *SUC2* não resultou em alteração no perfil de CO_2 , não interferindo no tempo de fermentação, quando comparado à linhagem *SUC2* (dados não apresentados). Como o perfil da linhagem *SUC2* Δagt1 é idêntico ao da linhagem *SUC2* (que possui o gene *AGT1*), pode-se afirmar que o transporte de sacarose numa linhagem com o gene *SUC2* selvagem, ou seja, que expressa majoritariamente a invertase extracelular, não parece exercer papel essencial na metabolização deste dissacarídeo. Em outras palavras, a via extracelular de consumo de sacarose é mesmo a principal via, como afirma a literatura (Carlson e Botstein, 1982; Santos et al., 1982; Stambuk et al., 2000), apesar de alguns trabalhos sugerirem que a via intracelular pode contribuir significativamente para o metabolismo de sacarose em células selvagens de *S. cerevisiae* (Orlowski e Barford, 1991; Mwesigye e Barford, 1994; 1996). No entanto, nestes três trabalhos em particular, as células foram adaptadas por mais de 200 gerações em sacarose, antes do experimento e, além disto, o meio continha glicose em quantidade suficiente para reprimir a atividade de invertase extracelular.

Nos cultivos descontínuos em anaerobiose plena, ao contrário da linhagem *SUC2*, praticamente não houve acúmulo de glicose e frutose no meio de cultivo da linhagem *iSUC2* (Figura 5.5), provavelmente devido ao transporte da sacarose e hidrólise intracelular. Enquanto a concentração de glicose e frutose nos cultivos com a linhagem *SUC2* chegaram aos valores máximos de 5 e 8 g.L^{-1} , respectivamente, as concentrações destes açúcares não passaram de 1 g.L^{-1} nos cultivos com a linhagem *iSUC2*. Similarmente aos cultivos com a linhagem-referência (*SUC2*), Mwesigye e Barford (1996) observaram acúmulo de frutose (4 g.L^{-1}) durante cultivos descontínuos aeróbicos com sacarose (concentração inicial de 10 g.L^{-1}) utilizando a linhagem de *S. cerevisiae* 248 UNSW 703100.

Como verificado pelo perfil de CO_2 , o tempo necessário para a exaustão da sacarose foi significativamente maior na linhagem *iSUC2* do que na linhagem *SUC2* (20 e 10 h, respectivamente). Isto é refletido numa velocidade específica de consumo de sacarose menor na linhagem *iSUC2* [$11,1 \pm 0,2 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$] em comparação à linhagem-referência [$19,4 \pm 0,2 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$]. Este último valor foi muito próximo aos dados publicados [$19 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$] por Orlowski e Barford (1991) e Mwesigye e Barford (1996), durante cultivos descontínuos aeróbicos com a linhagem *S. cerevisiae* 248 UNSW 703100. No entanto, em ambos os trabalhos citados, foram empregadas células previamente adaptadas em sacarose por cerca de 250 gerações, através de transferências

seriadas durante 14 dias em frascos agitados com meio sintético contendo sacarose como fonte de carbono. Ainda nestes trabalhos, cultivos descontínuos com células não-adaptadas resultaram em velocidades específicas de consumo de sacarose ligeiramente menores [$14 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$] do que nos cultivos com células adaptadas.

Figura 5.5 - Cultivos descontínuos em anaerobiose plena com as linhagens *SUC2* (A,C) e *iSUC2* (B,D). Concentração de sacarose (■), glicose (▲) e frutose (△), (A,C); concentração de etanol (□), glicerol (○) e biomassa celular (●) (C,D), durante cultivos em meio sintético contendo sacarose a 20 g/L iniciais como única fonte de carbono. Os dados apresentados correspondem ao terceiro ciclo de bateladas repetidas e referem-se a média $\pm$ desvio do media de experimentos independentes realizados em duplicata (ver Materiais e Métodos).

Paralelamente a estes dados, observou-se uma menor velocidade específica de produção de etanol (q_{ETH}) na linhagem *iSUC2* [$16,9 \pm 2,5 \text{ mmol ETH. (g DW.h)}^{-1}$] em relação à selvagem [$26,6 \pm 0,2 \text{ mmol ETH. (g DW.h)}^{-1}$]. As velocidades menores na linhagem *iSUC2* podem ser explicadas pelo menor μ_{max} desta linhagem ($0,17 \pm 0,01 \text{ h}^{-1}$) em comparação à linhagem-referência ($0,35 \pm 0 \text{ h}^{-1}$). Apesar das velocidades específicas terem sido menores na linhagem *iSUC2*, o $Y_{\text{ETH/S}}$ (global) foi 7% maior nesta linhagem em comparação à linhagem *SUC2*, passando de $0,350 \pm 0,004$ para $0,374 \pm 0,014 \text{ g ETH.g GLC eq}^{-1}$. O aumento do $Y_{\text{ETH/S}}$

foi acompanhado de um menor fator de conversão de substrato a células, parâmetro que foi de $0,100 \pm 0,001$ g DW.g GLC eq⁻¹ na linhagem-referência e de $0,083 \pm 0,005$ g DW.g GLC eq⁻¹ na linhagem *iSUC2*, bem como de uma menor produção de glicerol (Figura 5.5).

Muitos trabalhos descritos na literatura têm buscado aumentar o $Y_{ETH/S}$ através da diminuição da formação do glicerol, um dos principais subprodutos da fermentação. Uma estratégia é a substituição da especificidade de algumas enzimas-chave pelos seus respectivos co-fatores (normalmente a troca de NADPH por NADH ou vice-versa, dependendo de qual forma da coenzima, reduzida ou oxidada, é usada nas reações). Nissen et al. (2000) verificaram que esta estratégia somente permitiu alcançar um aumento expressivo do $Y_{ETH/S}$ (10% em relação a linhagem-referência), quando tal estratégia foi combinada a um aumento do custo em ATP para a formação de biomassa (gasto extra incorporado durante a assimilação de amônio). No trabalho de Bro et al. (2006), que igualmente visava a redução da formação de glicerol através da re-oxidação de NADH pela expressão da enzima heteróloga não-fosforilante, NADP⁺-Gliceraldeído 3-Fosfato Desidrogenase (que converte gliceraldeído-3P em glicerato-3P), reporta-se um aumento modesto de 3% no $Y_{ETH/S}$. Assim, pode-se concluir que estratégias baseadas no aumento do custo energético para a formação de biomassa, como foi o caso do presente estudo, são promissoras para se obter aumentos mais expressivos no $Y_{ETH/S}$ em relação à troca de co-fatores. Neste texto, o custo energético para a formação de biomassa engloba, além das reações de biossíntese celular, os gastos envolvidos no transporte dos nutrientes.

No presente estudo, a estratégia de se aumentar o rendimento em etanol, pela realocação do metabolismo de sacarose, parece estar limitada por uma baixa capacidade de transporte da sacarose (passo inicial, essencial para a posterior hidrólise intracelular e metabolização dos monossacarídeos resultantes). De um lado, foi observada uma quantidade elevada de substrato residual nos cultivos em quimiostato (Tabela 5.3). Por outro lado, observou-se uma baixa velocidade específica de crescimento e ausência de etanol nos cultivos descontínuos em frasco agitado. Somando-se a isto, constatou-se um aumento no tempo da fermentação (de 20 para 35 h) na linhagem *iSUC2* sem o gene *AGT1*, em relação a sua isogênica (*iSUC2*). Com estes resultados, concluímos que era necessário aumentar a afinidade/capacidade do sistema de transporte de sacarose, para que a estratégia de engenharia metabólica empregada, que envolve a realocação do metabolismo da sacarose, gerasse um melhoramento ainda maior da formação de etanol.

Deste modo, como continuidade do trabalho, empregou-se a estratégia conhecida como engenharia evolutiva (Sauer, 2001), aplicada à linhagem *iSUC2*, com o objetivo de se obter um mutante com maior afinidade/capacidade de captação de sacarose e com isto obter linhagens com $Y_{ETH/S}$ ainda maiores.

5.4 Engenharia evolutiva para o melhoramento do transporte de sacarose em *S. cerevisiae*

5.4.1 Fisiologia de *S. cerevisiae* *SUC2* e *iSUC2* prototróficas em quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose

Relatos científicos recentes apontam diferenças fisiológicas entre linhagens auxotróficas e suas respectivas prototróficas, mesmo quando o meio é suplementado com os respectivos nutrientes auxotróficos, tais como uracila, leucina, metionina, entre outros (Çakar et al., 1999; Pronk, 2002; Corbacho et al., 2010). Assim, antes de serem iniciados os experimentos de evolução com a linhagem que expressa apenas a forma intracelular da invertase (por meio de um promotor forte, P_{ADH1}), decidiu-se verificar se os parâmetros fisiológicos observados com as linhagens auxotróficas para uracila (*SUC2 ura-* e *iSUC2 ura-*), durante os experimentos em quimiostato (ver item 5.2), seriam os mesmos obtidos cultivando-se as respectivas linhagens prototróficas (*URA3*). Para esta finalidade a linhagem prototrófica *iSUC2* (*MATa URA3 trp1-289 TRP1 -P_{ADH1}::iSUC2 MAL2-8⁺ AGT1*), foi comparada à linhagem-referência CEN.PK113-7D (*MATa URA3 SUC2 MAL2-8⁺ AGT1*), a qual, igualmente à linhagem *iSUC2*, é prototrófica para a uracila, mas no entanto tem o gene *SUC2* selvagem.

As duas linhagens foram cultivadas em quimiostatos limitados por sacarose, sob plena anaerobiose, operados a uma vazão específica (*D*) de 0,10 h⁻¹. Tais cultivos foram conduzidos empregando-se meio sintético totalmente definido, contendo sacarose como única fonte de carbono e energia. Todos os resultados apresentados e discutidos a seguir referem-se às amostras coletadas durante o estado-estacionário destes cultivos.

Em relação às atividades de invertase nos cultivos com sacarose, foi possível observar que a estratégia de engenharia metabólica resultou na retenção da atividade da invertase no ambiente intracelular na linhagem *iSUC2* (Figura 5.6), além de um aumento no valor absoluto da atividade total nesta linhagem, em relação à linhagem *SUC2*, analogamente ao que havia sido observado anteriormente nos experimentos com as linhagens auxotróficas (ver item 5.2). Por outro lado, na linhagem-referência (*SUC2*) foram detectadas atividades para as duas formas desta enzima, sendo a forma extracelular responsável pela maior parte da atividade total (91%). Na linhagem *iSUC2*, a atividade de invertase foi representada quase que exclusivamente pela forma intracelular (96%). Ainda assim, foi possível notar, como

anteriormente na linhagem *iSUC2 ura-*, que a linhagem *iSUC2* também apresentou alguma atividade de invertase extracelular. No entanto, como o método de quantificação de invertase extracelular baseia-se na dosagem de glicose no meio extracelular (ver Materiais e Métodos), não se pode descartar a hipótese de que os produtos de hidrólise da sacarose, mesmo sendo hidrolisada intracelularmente, sejam excretados das células pelos transportadores Hxt_p (Boles e Hollemberg, 1997) e detectados no sobrenadante, tratando-se assim de uma possível falha da metodologia de dosagem de invertase, conforme discutido anteriormente (ver item 5.2).

Figura 5.6 - Atividade de invertase nas linhagens *SUC2*, *iSUC2* e *iSUC2* evoluída. A atividade de invertase extracelular (barras brancas) foi estimada com células intactas e a atividade total (barras pretas) com células permeabilizadas, ambas coletadas durante o estado-estacionário de quimiostatos limitados por sacarose em anaerobiose. Os valores apresentados são as médias e os desvios-padrão de análises realizadas em triplicata, para cada duplicata biológica.

De uma maneira geral, ao se comparar a linhagem *iSUC2* com a linhagem-referência (*SUC2*), nos cultivos limitados por sacarose (Tabela 5.4), foi observado que os parâmetros fisiológicos de interesse foram alterados de forma semelhante aos dados obtidos anteriormente com as linhagens auxotróficas para a uracila (Tabela 5.3). O $Y_{ETH/S}$ foi 4% maior na linhagem *iSUC2* em relação à linhagem *SUC2*. A q_{ETH} apresentado pela linhagem *iSUC2* foi 5% superior em relação ao mesmo parâmetro na linhagem *SUC2*, enquanto o $Y_{X/S}$ foi cerca de 4,5% menor na linhagem *iSUC2* em relação a *SUC2*. Estes resultados indicam que a estratégia de engenharia metabólica, que teve o intuito de alterar a topologia da hidrólise

e a energética do transporte da sacarose em *S. cerevisiae*, resultou num aumento do $Y_{ETH/S}$, provavelmente fruto da menor eficiência energética das células que não expressam a invertase extracelular e se vêem obrigadas a transportar a sacarose por transporte ativo. No entanto, de maneira análoga ao observado nos experimentos com as linhagens auxotróficas para a uracila (ver item 5.2), as variações observadas foram menores do que as previstas pelo modelo metabólico (Tabela 5.4). De acordo com o modelo, seria esperada uma diminuição de 25 % no $Y_{X/S}$, ao se comparar a linhagem *iSUC2* com a linhagem *SUC2*. Porém, como pode ser observado, a redução foi de apenas 4,5%. O mesmo ocorreu com os demais parâmetros ($Y_{ETH/S}$, q_{ETH} , q_{CO_2} , q_S , etc), todos apresentando variações menores do que as esperadas (Tabela 5.4).

Uma observação importante refere-se às concentrações de sacarose, glicose e frutose residuais (no estado-estacionário), as quais foram muito diferentes entre as linhagens *iSUC2* e *SUC2*. De uma forma geral, a soma dos açúcares residuais foi cerca de 12 vezes superiores na linhagem *iSUC2* em comparação à linhagem-referência. Fato interessante é observar que mesmo tendo uma atividade de invertase total superior à da linhagem controle (Figura 5.6), a linhagem *iSUC2* não foi capaz de consumir parte da fonte de carbono disponível [8% (p/p)]. O fato de uma parte substancial da fonte de carbono não ter sido consumida pela linhagem *iSUC2* indica uma possível limitação no transporte deste dissacarídeo nesta linhagem.

Tabela 5.4 - Parâmetros fisiológicos das linhagens *SUC2* (CEN.PK113-7D, linhagem-referência), *iSUC2* (ausência de invertase extracelular e super-expressão da invertase intracelular; IMI-056), *iSUC2* evoluída (linhagem evoluída obtida em quimiostatos anaeróbios longos limitados por sacarose, a partir da linhagem *iSUC2*; IMM-007), *iSUC2* evoluída $\Delta agt1$ (IMM-008), *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$ (IMM-009), *iSUC2* P_{TPH} *MAL13* (IMI-066) e *iSUC2* P_{TDH3} *AGT1* (IMI-067) durante o estado estacionário em quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose. Os dados estão apresentados como a média $\pm$ o desvio da média de dois experimentos independentes.

Parâmetros fisiológicos	<i>SUC2</i>	<i>iSUC2</i>	<i>iSUC2</i> evoluída	<i>iSUC2</i> evoluída $\Delta agt1$	<i>iSUC2</i> evoluída $\Delta/\Delta agt1$	<i>iSUC2</i> P_{TDH3} <i>AGT1</i>	<i>iSUC2</i> P_{TPH} <i>MAL13</i>	<i>iSUC2</i> e <i>SUC2</i> (%) ^(a)	<i>iSUC2</i> evoluída e <i>SUC2</i> (%) ^(b)
Glicose (g.L ⁻¹)	0,05 $\pm$ 0	0,09 $\pm$ 0,04	0,01 $\pm$ 0	0,01	0,37 $\pm$ 0,03	0,30 $\pm$ 0,03	0,41 $\pm$ 0,14		
Frutose (g..L ⁻¹)	0,11 $\pm$ 0,03	0,16 $\pm$ 0,03	0,03 $\pm$ 0	0,01	0,32 $\pm$ 0,03	0,30 $\pm$ 0,03	0,40 $\pm$ 0,13		
Sacarose (g GLC eq.L ⁻¹)	0,00 $\pm$ 0	1,79 $\pm$ 0,23	0,08 $\pm$ 0	0,09	1,51 $\pm$ 0,07	1,05 $\pm$ 0,09	1,6 $\pm$ 0,24		
Y _{X/S} (g DW.g GLC eq ⁻¹)	0,092 $\pm$ 0,001	0,088 $\pm$ 0,001	0,067 $\pm$ 0,001	0,066	0,097 $\pm$ 0,001	0,09 $\pm$ 0	0,101 $\pm$ 0,003	-4,5/(-25)	-27/(-25)
q _S [mmol GLC eq.(g DW.h ⁻¹)]	6,22 $\pm$ 0,05	6,31 $\pm$ 0,04	8,50 $\pm$ 0,09	8,82	5,84 $\pm$ 0,03	6,25 $\pm$ 0,08	5,46 $\pm$ 0,31	1,5/(33)	37/(33)
qCO ₂ [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	10,35 $\pm$ 0,04	10,64 $\pm$ 0,22	15,55 $\pm$ 0,18	14,96	9,86 $\pm$ 0,57	12,27 $\pm$ 0,04	10,66 $\pm$ 0,13	3/(40)	50/(40)
q _{ETH} [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	9,34 $\pm$ 0,18	9,84 $\pm$ 0,02	14,16 $\pm$ 0,41	13,92	8,84 $\pm$ 0,03	10,18 $\pm$ 0,14	9,1 $\pm$ 0,06	5/(43)	52/(43)
Y _{ETH/S} (g ETH.g GLC eq ⁻¹)	0,384 $\pm$ 0,005	0,399 $\pm$ 0,002	0,427 $\pm$ 0,009	0,403	0,387 $\pm$ 0,001	0,416 $\pm$ 0,011	0,422 $\pm$ 0,16	4/(8)	11/(8)
q _{ACE} [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	0,01 $\pm$ 0	0 $\pm$ 0	0,03 $\pm$ 0,01	0,03	0,02 $\pm$ 0,01	0,01 $\pm$ 0	0		
q _{LAC} [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	0,08 $\pm$ 0	0,07 $\pm$ 0	0,10 $\pm$ 0	0,10	0,07 $\pm$ 0	0,07 $\pm$ 0	0,06 $\pm$ 0,01		
q _{PYR} [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	0,01 $\pm$ 0	0,01 $\pm$ 0	0,01 $\pm$ 0	0,01	0,01 $\pm$ 0	0,01 $\pm$ 0	0,01 $\pm$ 0		
q _{SUCC} [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	0,03 $\pm$ 0	0,03 $\pm$ 0	0,02 $\pm$ 0	0,02	0,02 $\pm$ 0,01	0,03 $\pm$ 0	0,03 $\pm$ 0		
q _{GLYC} [mmol.(g DW.h ⁻¹)]	0,77 $\pm$ 0,01	0,69 $\pm$ 0	0,85 $\pm$ 0,03	0,90	0,70 $\pm$ 0,01	0,68 $\pm$ 0,01	0,66 $\pm$ 0,01	-10/(0)	10/(0)
Balanço de carbono (%) ^(c)	96,2 $\pm$ 0,2	97,4 $\pm$ 0,8	100,1 $\pm$ 0,8	95	97,4 $\pm$ 1,4	103,7 $\pm$ 1,7	106,2 $\pm$ 4,4		

^(a) Variação observada e (variação teórica, obtida pelo modelo, Tabela 5.2), ambas em %, entre a linhagem *iSUC2* e a linhagem-referência *SUC2* dos cultivos em anaerobiose limitados por sacarose.

^(b) Variação observada e (variação teórica, obtida pelo modelo, Tabela 5.2), ambas em %, entre a linhagem *iSUC2* evoluída e a linhagem-referência *SUC2* dos cultivos em anaerobiose limitados por sacarose.

^(c) Balanço de carbono foi estimado usando-se uma composição de biomassa de 25,1 g/C-mol para cultivos anaeróbios (Verduyn et al., 1990) e um conteúdo de cinzas de 7% (Nielsen et al., 2003).

Até esta etapa do trabalho, a análise do transporte de sacarose havia sido realizada empregando-se sacarose marcada com ^{14}C (^{14}C -sacarose), o que é prática comum no estudo da cinética do transporte de dissacarídeos. No entanto, alguns estudos (Serrano, 1977; Benito e Lagunas, 1992; Stambuk e Araújo, 2001) apontam que, quando altas concentrações de substrato marcado são utilizadas para tais medidas, existe o risco de ocorrerem ligações não-específicas desses substratos às células de levedura (ou até mesmo aos filtros empregados), levando a erros nestas medidas (gerando superestimativas). Adicionalmente, outro problema encontrado com o uso de substratos radioativos é o fato de que quando os mesmos são metabolizados pelas células, ocorre liberação de $^{14}\text{CO}_2$ que igualmente leva a erros nas medidas (gerando subestimativas). Um outro fator agravante, específico para o caso da sacarose radioativa, é que esta pode ser hidrolisada extracelularmente durante o período de incubação, e os monossacarídeos radioativos liberados (^{14}C -glicose e ^{14}C -frutose) podem ser assimilados pelas células (por difusão facilitada), contribuindo assim para uma falsa medida de transporte. Em vista do exposto, decidiu-se utilizar, a partir deste ponto do trabalho, outra técnica para estimar o transporte. Esta técnica é conhecida como medida do transporte de dissacarídeos pelo co-transporte com íons H^+ ou simplesmente co-transporte de sacarose/ H^+ (Stambuk et al., 1999; Stambuk e Araújo, 2001). Nesta determinação, faz-se uso da medida da alcalinização do meio de cultura, que ocorre após exposição das células à presença do dissacarídeo. Esta alcalinização é resultante do co-transporte do dissacarídeo com íons H^+ , que apresenta uma estequiometria de um H^+ co-transportado por molécula de sacarose (ou outro dissacarídeo) assimilada pelas células (Serrano, 1977; Stambuk et al., 1999; ver Matérias e Métodos).

Os dados de co-transporte de sacarose/ H^+ , utilizando sacarose a 70 mM, são apresentados na Figura 5.7. Primeiramente, é preciso ressaltar que, como a concentração de sacarose utilizada nesta medida é cerca de 10 vezes superior aos valores de k_m já reportados para o co-transporte de sacarose/ H^+ em *S. cerevisiae* (Stambuk et al., 2000; Badotti et al., 2008), os dados podem ser interpretados como sendo referentes à capacidade máxima de transporte ($V_{\max}$) deste dissacarídeo. Durante o estado estacionário, a linhagem *iSUC2* apresentou transporte de sacarose maior do que a linhagem *SUC2*. Na literatura, não foi possível encontrar valores de transporte de sacarose durante o estado estacionário em cultivos anaeróbicos limitados por sacarose.

O transporte de sacarose ($V_{\text{transporte}}$) medido com a linhagem *iSUC2* foi em torno de $1,5 \text{ mmol SUC. (g DW.h)}^{-1}$ [$25 \text{ nmol SUC. (mg DW.min)}^{-1}$] (Figura 5.4.2), enquanto a q_{SUC} foi de $3,15 \text{ mmol SUC. (g DW.h)}^{-1}$ [$6,3 \text{ mmol de GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$] (Tabela 5.4), ou seja, maior que o transporte. Numa linhagem que depende do transporte para metabolizar a sacarose, era esperado que o $V_{\text{transporte}}$ fosse igual ou superior à q_{SUC} . Assim, é possível especular que parte da sacarose foi utilizada de uma maneira diferente da esperada, ou seja, através do transporte e subsequente hidrólise intracelular. Ou seja, parte da sacarose pode ter sido hidrolisada extracelularmente e os monossacarídeos captados por difusão facilitada. Isto, em parte, explicaria o fato de que os parâmetros fisiológicos observados na linhagem *iSUC2* ($Y_{X/S}$ e $Y_{\text{ETH/S}}$) foram diferentes dos previstos pelo modelo metabólico (Tabela 5.4).

Figura 5.7 - Atividade de co-transporte de sacarose com H^+ nas linhagens *SUC2*, *iSUC2*, *iSUC2* evoluída, *iSUC2* evoluída $\Delta agt1$, *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$, *iSUC2* P_{TDH3} -AGT1, *iSUC2* P_{TPI1} -MAL13. A atividade de transporte foi determinada em células coletadas durante o estado-estacionário de quimiostatos limitados por sacarose em anaerobiose, conforme descrito na parte de Materiais e Métodos. Os valores apresentados são as médias e os desvios-padrão de análises realizadas em triplicata, para cada duplicata biológica.

Uma possibilidade para explicar a incoerência entre os dados de $Y_{X/S}$ observado e teórico (previsto pelo modelo) é que o conteúdo intracelular de carboidratos de reserva da linhagem *iSUC2* seja diferente daquele da linhagem *SUC2*, conforme previamente reportado

por Wisselink et al., (2009). No entanto, os valores de trealose e glicogênio na biomassa foram muito próximos entre as duas linhagens (Figura 5.8), descartando parcialmente esta hipótese.

Figura 5.8 - Conteúdo de carboidratos de reserva em células de levedura, coletadas durante o estado estacionário de quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose. Teores de trealose (barras brancas) e glicogênio (barras pretas) nas linhagens *SUC2*, *iSUC2*, *iSUC2* evoluída. Os valores apresentados são as médias e os desvios-padrão de análises realizadas em triplicata, para cada duplicata biológica.

De uma maneira geral, os resultados obtidos com as linhagens prototróficas durante os quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose foram semelhantes aos resultados obtidos com as linhagens auxotróficas para a uracila (*SUC2 ura⁻* e *iSUC2 ura⁻*). As diferenças observadas em alguns parâmetros fisiológicos (q_{ETH} , $Y_{X/S}$, q_{CO_2} , etc) entre as linhagens auxotróficas e suas correspondentes prototróficas podem ser atribuídas aos diferentes equipamentos e métodos de quantificação empregados nos dois laboratórios onde foram realizados os estudos (LEB/USP e LMI/TU Delft). Pelos dados apresentados até este ponto do trabalho, tanto obtidos com as linhagens auxotróficas, como com as linhagens prototróficas, observa-se que a estratégia de engenharia metabólica empregada por Stambuk, et al. (2009), que modificou a topologia e a energética do metabolismo de sacarose em *S. cerevisiae*, apesar das limitações encontradas (parâmetros fisiológicos diferentes dos esperados e concentrações de açúcares residuais elevadas), pode ser considerada promissora, no sentido de aumentar a conversão de sacarose em etanol ($Y_{ETH/S}$). Vale

destacar que a realocização do metabolismo de sacarose, de extracelular para intracelular, teria ainda a seguinte vantagem no ambiente industrial: a diminuição da competição pela fonte de carbono com microrganismos contaminantes do processo, que freqüentemente não metabolizam dissacarídeos tão bem quanto monossacarídeos.

5.4.2 Engenharia evolutiva aplicada à linhagem iSUC2

Em vista dos dados obtidos, buscou-se melhorar ainda mais o fenótipo da linhagem iSUC2, no sentido de aumentar a afinidade/capacidade do co-transporte de sacarose/ H^+ nesta linhagem, como forma de se aumentar ainda mais o $Y_{ETH/S}$, com a concomitante diminuição do $Y_{X/S}$, procurando-se chegar mais próximo aos valores calculados pelo modelo metabólico (Tabela 5.2). Para alcançar tal objetivo, estratégias de engenharia evolutiva, que se baseiam no princípio da variação e seleção natural (Sauer, 2001), foram empregadas. Devido ao fato de existir, em cultivos contínuos do tipo quimiostato, uma forte pressão seletiva no sentido de selecionar células com maior afinidade/capacidade de transporte pelo substrato limitante, que se encontra em baixas concentrações dentro do reator (Wick et al., 2002; Jansen et al., 2004), é esperado que durante cultivos longos limitados por sacarose, seja possível a seleção de mutantes com maior afinidade/capacidade para o co-transporte de sacarose/ H^+ . O surgimento de um mutante deste tipo dentro do reator causa uma diminuição na concentração residual de sacarose, o que diminui a velocidade específica de crescimento com que as células originais são capazes de crescer nesta nova condição (isto pode facilmente ser explicado pelo modelo de Monod para o crescimento microbiano). Sendo assim, as células originais tendem a ser lavadas do sistema e uma nova população derivada do mutante com maior afinidade/capacidade por sacarose tenderá a dominar o reator, já que, ao contrário das células originais, esta nova população consegue crescer com velocidade específica (μ) igual à vazão específica do quimiostato (D) na nova concentração residual do substrato limitante.

Desta maneira, a linhagem iSUC2 foi submetida a um cultivo contínuo sob limitação de sacarose ao longo de várias gerações. Uma forma de se avaliar a eficiência desta estratégia de melhoramento do co-transporte de sacarose/ H^+ é acompanhar a concentração do substrato limitante ao longo do cultivo (Brown et al., 1998; Ferea et al., 1999). Além

disto, acompanhou-se também a capacidade do transporte de sacarose ao longo do cultivo. Para tanto, o transporte de sacarose foi medido indiretamente pelo co-transporte de H^+ , que se baseia na estequiometria de 1:1 no co-transporte de sacarose: H^+ em células de *S. cerevisiae* (Stambuk et al., 2000). Durante este cultivo prolongado, a concentração residual de sacarose passou de cerca de 2 g.L⁻¹ para menos de 0,1 g.L⁻¹ após cerca de 50-60 gerações (Figura 5.9). Paralelamente, a capacidade do co-transporte de sacarose/ H^+ , que indica de maneira indireta a capacidade de transportar sacarose, aumentou de 10 para cerca de 200 nmol.(mg DW.min)⁻¹, perfazendo um aumento de 20 vezes.

Figura 5.9 - Experimento de evolução com a linhagem *iSUC2*. Concentração dos açúcares residuais (sacarose) (□) e a atividade do co-transporte de sacarose- H^+ (○) ao longo de cultivo contínuo limitado por sacarose em regime de anaerobiose. O experimento foi conduzido em duplicata, e no gráfico são representados apenas os dados de um dos cultivos, na forma da média e desvio-padrão das medidas feitas em triplicata de uma mesma amostra.

Após cerca de 90 gerações, em que tanto a concentração de açúcar residual como a atividade de co-transporte de sacarose- H^+ permaneceram praticamente constantes por mais de 30 gerações, uma amostra foi coletada e espalhada na superfície de uma placa de Petri contendo meio YPD solidificado, de forma a se isolar colônias e armazená-las conforme o protocolo utilizado para o estoque das linhagens (ver item 4.2, em Materiais e Métodos). Uma destas colônias, designada *iSUC2* evoluída (IMM-007), foi caracterizada em quimiostato limitado por sacarose em anaerobiose. Enquanto as atividades de invertase total e extracelular desta linhagem evoluída não foram alteradas em relação aos mesmos

parâmetros na linhagem *iSUC2* (Figura 5.6), a atividade de co-transporte de sacarose/ H^+ aumentou consideravelmente na linhagem evoluída, passando de 25 para cerca 346 $nmol.(mg\ DW.min)^{-1}$ (Figura 5.7). A diferença observada nos valores do transporte de sacarose/ H^+ entre os instantes finais do experimento de evolução (Figura 5.9) e o cultivo com a linhagem *iSUC2* evoluída é um forte indicativo de que havia distintos fenótipos “evoluídos” no reator ao longo do experimento de evolução. Este fenômeno já foi observado diversas vezes em experimentos semelhantes, sob outras limitações nutricionais (Brown et al., 1998; Gresham et al., 2008, 2011). No entanto, o fato de os parâmetros fisiológicos da linhagem *iSUC2* evoluída serem diferentes daqueles da linhagem *iSUC2*, quando ambas são comparadas durante quimiostatos limitados por sacarose em anaerobiose, é um forte indicativo de que realmente ocorreram mutações na linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à linhagem *iSUC2* e não simplesmente uma adaptação.

Ao se comparar os parâmetros fisiológicos da linhagem *iSUC2* evoluída com a linhagem referência (*SUC2*) nos cultivos limitados por sacarose, foi observado que os parâmetros relevantes para o objetivo deste estudo ($Y_{ETH/S}$, q_{ETH} , e $Y_{X/S}$), foram alterados em magnitudes semelhantes às variações estimadas pelo modelo metabólico (Tabela 5.2). O $Y_{ETH/S}$ foi 11% maior na linhagem *iSUC2* evoluída em relação à linhagem *SUC2*, enquanto a q_{ETH} observada na linhagem evoluída foi 52 % superior a q_{ETH} da linhagem-referência (*SUC2*), sendo que o modelo previa uma variação de 8 e 43% nos parâmetros $Y_{ETH/S}$ e q_{ETH} , respectivamente. Adicionalmente, o $Y_{X/S}$ foi 27% menor na linhagem evoluída em relação a *SUC2*, sendo a variação esperada de 25%. A concentração residual de sacarose foi muito menor na linhagem evoluída em relação à *iSUC2*, indicando um aumento expressivo na afinidade/capacidade do transporte de sacarose na linhagem evoluída, uma vez que a concentração do substrato residual no quimiostato está diretamente ligada à afinidade/capacidade do transporte para o substrato limitante (Jansen et al., 2004).

À primeira vista, o aumento da capacidade/afinidade do transporte de sacarose obtido após a evolução da linhagem *iSUC2* parece ser o fator responsável pela mudança nos parâmetros fisiológicos, aumentando a capacidade de formação de etanol pelas células, com a concomitante diminuição da conversão de sacarose em biomassa. Como continuação do trabalho, buscou-se identificar alterações genéticas que pudessem explicar o novo fenótipo obtido ao longo da evolução em quimiostato. Para tanto, o transcriptoma e a seqüência de determinados genes da linhagem melhorada foram investigados e comparados aos dados

correspondentes na linhagem original, procurando-se identificar possíveis mutações e/ou genes que tiveram sua expressão alterada, durante o processo de evolução.

5.4.3 Análise do transportador *Agt1p* na linhagem *iSUC2* evoluída

Com o intuito de investigar o envolvimento do gene *AGT1*, que codifica a proteína transportadora *Agt1p* (*“α-glucoside transporter”*), na utilização de sacarose pela linhagem evoluída, mutantes deletados no referido gene foram construídos.

Através do emprego de técnicas de PCR diagnóstico (Materiais e métodos, item 4.11.4) sobre o DNA genômico das linhagens *SUC2* e *iSUC2* e seus respectivos mutantes $\Delta agt1$, foi possível verificar que as linhagens *SUC2* e *iSUC2* apresentam apenas uma cópia do gene *AGT1* em seus genomas (Figura 5.10 A e B).

Figura 5.10 - Verificação da presença, bem como confirmação da deleção do gene *AGT1* nas linhagens *iSUC2* (A), *iSUC2* $\Delta agt1$ (B), *iSUC2* evoluída (C), *iSUC2* evoluída $\Delta agt1$ (D) e *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$ (E). Conforme descrito, os DNAs genômicos das linhagens foram extraídos e analisados, através de PCR, para a verificação da presença do gene *AGT1*, com os primers 1687/1688 (internos ao gene *AGT1*), com produto de amplificação de 1507 pb (linha 1); para a confirmação da deleção com o cassette *AGT1*-KO-KanMX, com os primers 1472/9 e 1473/10, o quais produziriam os fragmentos de 1010 e 1067 pb, respectivamente, caso a inserção do cassette ocorresse no sítio correto (linhas 2 e 3); e para a confirmação da deleção com o cassette *AGT1*-KO-hphN, com os primers 1007/1472 e 1008/1473, os quais produziriam os fragmentos de 1405 e 1744 pb, respectivamente, caso a inserção do cassette ocorresse no sítio correto (linhas 4 e 5); Marcador molecular (linha M, GeneRuler Ladder DNA Mix, Fermentas). Os produtos de PCR estão mostrados em gel de agarose 1 %. Os números ao lado do gel indicam o tamanho dos marcadores e os números sobre o gel o tamanho dos produtos amplificados (em pb).

Após a deleção do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2* evoluída, verificou-se por meio de PCR diagnóstico a presença de ao menos uma segunda cópia deste gene na linhagem resultante (*iSUC2* evoluída $\Delta agt1$) (Figura 5.10 D). Como se pode notar na Figura 5.10 D, foi observada nesta linhagem a presença dos produtos de amplificação de 1010 e 1067 pb, os quais confirmam a inserção do cassette *AGT1*-KO-KanMX na posição correta, confirmando a

deleção de uma cópia do gene *AGT1*. Porém, foi observado o fragmento de 1507 pb, que indica a presença de uma cópia extra do gene *AGT1* nesta linhagem. Apenas quando esta segunda cópia foi deletada, criando a linhagem *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$, constatou-se que não havia mais nenhuma cópia do gene, concluindo-se assim que durante a evolução ocorreu uma duplicação do gene *AGT1*.

Metodologia semelhante à descrita acima foi aplicada à linhagem *iSUC2* evoluída, verificando-se que o gene *MAL13* também foi duplicado durante a evolução (item 4.11.6; dados não apresentados).

Duplicações gênicas vêm sendo relatadas durante experimentos de evolução cuja pressão seletiva é a limitação nutricional. Brown et al. (1998) mostraram que o cultivo em regime de quimiostato limitado por glicose por cerca de 450 gerações com *S. cerevisiae* resultou numa linhagem evoluída apresentando maior afinidade pelo substrato limitante, do que a linhagem original. Foi verificado que a razão para este novo fenótipo foi a ocorrência de múltiplas duplicações nos transportadores de alta afinidade para glicose (Hxt6p e Hxt7p), as quais teriam ocorrido em decorrência de “*crossing-overs*” desemparelhados entre os genes *HXT6* e *HXT7* (que encontram-se dispostos de forma seqüencial no cromossomo IV), durante a troca das cromátides irmãs. Em cultivos contínuos limitados por glicose ou sulfato, Gresham et al. (2008) observaram amplificações no número de cópias de genes relativos aos respectivos sistemas de transporte para estes nutrientes.

Para avaliar o papel do gene *AGT1* na utilização de sacarose pela linhagem evoluída, os parâmetros fisiológicos de dois mutantes deletados no referido gene (linhagens *iSUC2* evoluída $\Delta agt1$ e *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$) foram obtidos em quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose. A deleção de apenas uma das cópias do gene *AGT1* praticamente não alterou a maior parte dos parâmetros avaliados, quando comparados aos parâmetros correspondentes da linhagem contendo as duas cópias do gene *AGT1* (*iSUC2* evoluída). As únicas diferenças observadas foram no co-transporte de sacarose/ H^+ , que passou de 346 para 215 nmol.(mg DW.min)⁻¹ com deleção de uma das cópias do gene (Figura 5.7), e o $Y_{ETH/S}$, que decaiu cerca de 5% na linhagem $\Delta agt1$ em relação à linhagem *iSUC2* evoluída (Tabela 5.4). No entanto, como o cultivo em quimiostato com a linhagem *iSUC2* evoluída $\Delta agt1$ não foi realizado em duplicata, a diminuição no $Y_{ETH/S}$ deve ser interpretada com cautela.

Por outro lado, o mutante deletado nas duas cópias do gene *AGT1* (*iSUC2* evoluído $\Delta/\Delta agt1$) apresentou diferenças marcantes em relação à linhagem *iSUC2* evoluída, bem como em relação à linhagem nocauteada em apenas uma das cópias (*iSUC2* evoluída $\Delta agt1$). O transporte ativo de sacarose por co-transporte com H^+ foi praticamente abolido [$< 5 \text{ nmol. (mg DW.min)}^{-1}$] (Figura 5.7). Como consequência, as concentrações de glicose, frutose e sacarose residuais, durante o cultivo com esta linhagem, foram elevadas (0,37; 0,32; 1,51 g GLC eq.L⁻¹, respectivamente), em relação aos cultivos realizados com a linhagem *iSUC2* evoluída (0,01; 0,03; 0,08 g GLC eq.L⁻¹, respectivamente). De um modo geral, a linhagem *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$ parece ter perdido o desempenho fermentativo favorável que havia sido adquirido após a evolução, apresentando valores de $Y_{X/S}$, $Y_{ETH/S}$, q_{ETH} , próximos à da linhagem-referência (*SUC2*), e a concentração dos açúcares residuais semelhantes a da linhagem *iSUC2* (Tabela 5.4). Todas estas observações indicam que o gene *AGT1* tem um papel determinante no metabolismo da sacarose pela linhagem *iSUC2* evoluída. Adicionalmente, os resultados apresentados sugerem que a regulação do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2* evoluída possa ser diferente daquela existente na linhagem *iSUC2* original, uma vez que a linhagem evoluída com apenas uma das cópias do gene (*iSUC2* evoluída $\Delta agt1$) apresentou desempenho consideravelmente diferente da linhagem *iSUC2* original (Tabela 5.4), que igualmente apresenta apenas uma cópia do gene *AGT1*. Estes resultados enfatizam a importância do gene *AGT1* no transporte ativo da sacarose, e são um forte indicativo de que a duplicação do gene *AGT1* pode ser a única mutação (ou pelo menos a mais importante) causadora do novo fenótipo, obtido ao longo da evolução.

Para averiguar esta hipótese, ou seja, para verificar se a adição de uma segunda cópia do gene *AGT1* (sob controle de um promotor forte) seria suficiente para provocar o fenótipo evoluído na linhagem *iSUC2*, uma segunda cópia do gene *AGT1*, sob controle do promotor forte P_{TDH3} , foi inserida no locus *ura3-52* da linhagem *iSUC2 ura-*. A linhagem resultante, *iSUC2 P_{TDH3}-AGT1* foi cultivada em quimiostato anaeróbico limitado por sacarose (Tabela 5.4). Como pode ser observado na Figura 5.7, a adição de uma cópia do gene *AGT1*, sob controle do promotor forte P_{TDH3} , não resultou em aumento da capacidade de co-transporte de sacarose/ H^+ , em comparação à linhagem *iSUC2*. No entanto, aumentou em 18 e 9% os parâmetros q_{CO_2} e q_{ETH} , respectivamente, em comparação à linhagem-referência (*SUC2*). Adicionalmente, houve uma diminuição de 2% no $Y_{X/S}$ e um aumento de 8% no $Y_{ETH/S}$ quando a linhagem *iSUC2 P_{TDH3}-AGT1* foi comparada à linhagem-referência (*SUC2*). Assim, os

aumentos e diminuições encontrados, foram todos menores do que os observados na linhagem *iSUC2* evoluída (Tabela 5.4), mas parecem indicar que a duplicação do gene *AGT1* durante a evolução, somada a uma regulação diferenciada do mesmo (no caso, a expressão por meio de um promotor forte) foram eventos importantes na aquisição no fenótipo evoluído. Vale destacar que a linhagem *iSUC2*, que possui o gene *AGT1* selvagem, apresentou aumentos de apenas 3, 5 e 4% nos parâmetros q_{CO_2} , q_{ETH} e $Y_{ETH/S}$ respectivamente, em comparação à linhagem-referência (*SUC2*). No entanto, como na linhagem *iSUC2*, os níveis dos açúcares residuais foram elevados ($\sim 1,6$ g GLC eq.L⁻¹) nos cultivos com a linhagem *iSUC2* P_{TDH3}-*AGT1*, o que é um indicativo de limitação no transporte de sacarose (Tabela 5.4).

Como forma alternativa para aumentar a atividade do transporte de sacarose na linhagem *iSUC2*, buscando-se simular a evolução obtida em quimiostato, o promotor forte P_{TPI1} foi inserido a montante do gene *MAL13*. Este gene, que teve expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à *iSUC2*, de acordo com os resultados da análise transcriptômica (Tabela 5.5) e foi duplicado na linhagem *iSUC2* evoluída (dados não apresentados), codifica uma proteína de regulação positiva, que aumenta a expressão do gene *AGT1* (Needleman 1991). O comportamento dos parâmetros fisiológicos da linhagem resultante, *iSUC2* P_{TPI1}-*MAL13*, quando cultivada em quimiostato anaeróbico limitado por sacarose, é de difícil interpretação. Alguns parâmetros, para os quais se esperava um aumento na linhagem *iSUC2* P_{TPI1}-*MAL13*, em relação à linhagem-referência (*SUC2*), diminuíram. Por exemplo, observou-se uma diminuição da q_{ETH} e da q_S (de 3 e 12%, respectivamente) (Tabela 5.4). Para o $Y_{X/S}$, ao invés de uma diminuição, observou-se um aumento do mesmo (10%). A medida de co-transporte de H⁺ com esta linhagem foi baixa (Figura 5.7) e a concentração de açúcares residuais elevada ($\sim 2,4$ g GLC eq.L⁻¹). Surpreendentemente, o $Y_{ETH/S}$ aumentou cerca de 10% em relação à linhagem-referência (*SUC2*). Por todas estas evidências e, mesmo sem saber a causa deste fenótipo, o que se conclui é que esta estratégia de modificação genética não resultou numa linhagem com fenótipo próximo ao fenótipo da linhagem *iSUC2* evoluída.

Cabe ressaltar que a presença do promotor nas linhagens modificadas foi apenas verificada por meio de PCR diagnóstico (Materiais e Métodos). Assim, os níveis de expressão dos dois genes (*AGT1* e *MAL13*) não foram avaliados. Portanto, não é possível concluir se os

fenótipos observados devem-se a uma falha na super-expressão dos referidos genes, ou se, mesmo quando super-expressos, tais genes não são capazes de conferir o fenótipo evoluído.

Para verificar se o fenótipo evoluído poderia ter sido resultado de mutações no gene *AGT1*, ou em sua região promotora, estas regiões foram seqüenciadas nas linhagens *iSUC2*, *iSUC2* evoluída, e *iSUC2* evoluída $\Delta agt1$ (item 4.13). A seqüência de nucleotídeos do gene *AGT1* da linhagem *iSUC2* evoluída foi comparada à seqüência correspondente na linhagem *iSUC2* original. Vale destacar que, a montante do gene *AGT1* e a jusante do gene *MAL12* encontra-se uma região inter-gênica (Han et al., 1995), na qual está localizada a seqüência denominada UAS_{MAL} (que compreende os nucleotídeos -413 até o -494 da região promotora do gene *AGT1*). Esta seqüência é o sítio de ligação da proteína de regulação positiva Malx3p, que controla a transcrição do gene *AGT1*. Quando a proteína Malx3p estiver ligada ao sítio UAS_{MAL} , a transcrição deste gene é fortemente induzida (Needleman, 1991). A comparação das seqüências de nucleotídeos do gene *AGT1* (1851 pb) e de toda a região inter-gênica (785 pb) da linhagem *iSUC2* evoluída com as correspondentes seqüências na linhagem *iSUC2* parental demonstrou que não há um só nucleotídeo de diferença entre as duas linhagens, nesta porção do genoma. Quando uma das cópias do gene *AGT1* foi deletada do genoma da linhagem *iSUC2* evoluída e a cópia restante do gene *AGT1* foi seqüenciada, igualmente não foi observada nenhuma diferença na seqüência de nucleotídeos entre as regiões amplificadas das duas linhagens (dados não apresentados). Em vista destes resultados de sequenciamento, pode-se concluir que mutações pontuais no gene *AGT1*, ou em sua região promotora, não ocorreram.

5.4.4 Cultivos descontínuos com a linhagem *iSUC2* evoluída

Para investigar o comportamento do fenótipo evoluído em bateladas com sacarose, uma condição fisiológica bastante diferente dos quimiostatos, e de certa forma mais próxima do processo industrial de produção de etanol, a linhagem *iSUC2* evoluída foi cultivada em cultivos descontínuos em anaerobiose plena. Nestes cultivos, ao contrário da linhagem *SUC2* (Figura 5.5), as concentrações de glicose e frutose nos cultivos com a linhagem *iSUC2* evoluída atingiram os valores máximos de 1,5 e 3 g.L⁻¹, respectivamente, os

quais foram ligeiramente superiores aos valores observados na linhagem parental (*iSUC2*), que não passaram de 1 g.L^{-1} (Figura 5.5).

Figura 5.11 - Cultivos descontínuos em anaerobiose plena com a linhagem *iSUC2* evoluída. Concentrações de sacarose (■), glicose (▲) e frutose (△), (A); e de etanol (□), glicerol (○) e biomassa celular (●) (B), durante cultivos descontínuos em meio sintético com sacarose a 20 g/L iniciais como única fonte de carbono. Os dados apresentados correspondem ao terceiro ciclo de bateladas repetidas conduzidas em duplicata (ver Materiais e Métodos). Os dados estão apresentados como a média $\pm$ o desvio da média de dois experimentos independentes.

O tempo necessário para a exaustão da fonte de carbono diminuiu da linhagem *iSUC2* para a *iSUC2* evoluída, passando de 20 para 15 h (Figuras 5.11 e 5.5). Isto é refletido num aumento da q_s na linhagem evoluída [$16,1 \pm 0,7 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$] em comparação à linhagem *iSUC2* [$11,1 \pm 0,2 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$]. Com o referido aumento, tal parâmetro na linhagem *iSUC2* evoluída se aproximou à q_s da linhagem *SUC2* [$19,4 \pm 0,2 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$]. Paralelamente a estes dados, observou-se um aumento na q_{ETH} da linhagem *iSUC2* evoluída [$26,5 \pm 1,2 \text{ mmol ETH. (g DW.h)}^{-1}$] em relação à *iSUC2* original [$16,9 \pm 2,5 \text{ mmol ETH. (g DW.h)}^{-1}$], e assim a q_{ETH} da linhagem *iSUC2* evoluída praticamente se igualou ao mesmo parâmetro da linhagem *SUC2* [$26,6 \pm 0,2 \text{ mmol ETH. (g DW.h)}^{-1}$].

Além de apresentar uma velocidade específica de produção de etanol semelhante à da linhagem *SUC2*, o $Y_{\text{ETH/S}}$ foi 18% superior na linhagem *iSUC2* evoluída em relação à *SUC2*, passando de $0,350 \pm 0,004$ para $0,413 \pm 0,009 \text{ g.g}^{-1}$. O aumento do $Y_{\text{ETH/S}}$ foi acompanhado de um menor rendimento em biomassa, parâmetro que foi de $0,100 \pm 0,001 \text{ g DW.g}^{-1}$ na linhagem *SUC2* e $0,081 \pm 0,004 \text{ g DW.g}^{-1}$ na linhagem *iSUC2* evoluída. No entanto, o tempo necessário para a exaustão da fonte de carbono na linhagem evoluída (15 h) ainda foi maior do que na linhagem selvagem, que consumiu toda a sacarose em cerca de 10 h.

Com todos estes dados, é possível concluir que os atributos favoráveis da linhagem *iSUC2* evoluída, observados em regime de quimiostato, foram igualmente observados em cultivos descontínuos. Além disto, o fenótipo obtido durante a evolução, que foi selecionado num ambiente limitado pela fonte de carbono, aparentemente não apresentou hipersensibilidade (queda de viabilidade) ao ser exposto ao excesso de açúcar, como já observado em seleções semelhantes realizadas em meios contendo glicose (Jansen et al., 2005) ou maltose (Jansen et al., 2004) como substrato limitante. Finalmente, este fenótipo em cultivo descontínuo é uma forte comprovação de que o que ocorreu ao longo do processo de evolução em quimiostato foi mutação e não adaptação.

5.4.5 *Análise do transcriptoma*

A análise do transcriptoma foi realizada por meio de micro-arranjos de oligonucleotídeos, utilizando-se plataforma de canal-único Affymetrix, a partir de amostras coletadas durante o estado-estacionário de cultivos independentes realizados em duplicata para cada uma das três linhagens avaliadas (*SUC2*, *iSUC2* e *iSUC2* evoluída).

Quando a linhagem *iSUC2* evoluída foi comparada à linhagem *iSUC2* em cultivos anaeróbicos limitados por sacarose, foram encontrados 122 genes apresentando um nível de transcrição no mínimo 2 vezes maior na linhagem evoluída, em relação à linhagem parental. Surpreendentemente, não foi identificado nenhum gene com expressão diminuída na linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à linhagem *iSUC2*. A análise estatística foi realizada usando o algoritmo SAM (*“Significance Analysis of Microarrays”*), conforme descrito no item Materiais e Métodos (item 4.12) e a lista completa dos 122 genes com expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída encontra-se apresentada no ANEXO A. Alguns genes selecionados, envolvidos no metabolismo da sacarose, são apresentados na Tabela 5.5.

Dentre os 122 genes com expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à linhagem *iSUC2*, foram identificados vários envolvidos no metabolismo da maltose/sacarose. Foram encontrados tanto genes estruturais, que codificam permeases (*AGT1*, *MAL31*, *MPH2*, *MPH3*) e maltases (*MAL32*, *FSP2*, *IMA5*, *YGR287C*) (Teste et al., 2010), como genes que codificam proteínas regulatórias (*MAL13*). Com isto, observa-se que os loci *MAL1* e *MAL3* tiveram quase todos os seus genes com expressão aumentada, ao

compararmos as linhagens *iSUC2* evoluída e *iSUC2*. As únicas exceções foram para os genes *MAL33* e *YFL052W*, os quais não apresentaram alterações significativas de acordo com o algoritmo SAM (Tabela 5.5).

É importante salientar que a linhagem CEN.PK113-7D (da qual origina-se a linhagem *iSUC2*, bem como a *iSUC2* evoluída) possui os loci *MAL1* (*AGT1 MAL12 mal13*), *MAL2* (*MAL21-22-23*) e *MAL3* (*MAL31-32-33*) (Vidgren et al., 2005). No entanto, a linhagem S288C, na qual a plataforma dos micro-arranjos Affymetrix é baseada, apresenta apenas os loci *MAL1* e *MAL3*. Assim sendo, para a interpretação destes dados, deve-se levar em conta que os transcritos relativos aos 3 genes do locus *MAL2* podem não ter hibridizado ou podem ter hibridizado com sondas relativas aos genes contidos nos loci *MAL1* e *MAL3*.

O aumento na transcrição dos genes referentes às permeases (Tabela 5.5) foi condizente com o aumento do transporte de sacarose/ H^+ (Figura 5.7). Como não foi observada nenhuma mutação (item 5.4.3) no gene do transportador de alta-afinidade Agt1p, considerado o principal transportador de sacarose (Stambuk et al., 2000), é provável que o aumento no transporte de sacarose/ H^+ na linhagem *iSUC2* evoluída tenha sido causado pelo aumento do número dos transportadores na membrana plasmática, decorrente da duplicação deste gene, o que significa um aumento na capacidade de transporte e não na afinidade. Adicionalmente, a regulação da expressão do gene e/ou a degradação deste transportador podem ter sido alteradas durante a evolução. Portanto, é pouco provável que o aumento do transporte de sacarose na linhagem evoluída seja fruto de alterações na constante de saturação do substrato (K_m) da proteína Agt1p. Esta hipótese é suportada pelo aumento de 4 vezes na expressão deste gene, passando de 861 para 3369 unidades arbitrárias, ao se comparar a linhagem *iSUC2* com a linhagem *iSUC2* evoluída (Tabela 5.5). Apesar de outros genes, que codificam transportadores de alfa-glicosídeos (*MAL31*, *MPH2* e *MPH3*) terem apresentado expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída, apenas o transportador Mal31p é apontado com sendo capaz de transportar sacarose. No entanto, este transporte é de baixa afinidade (120 mM) e baixa capacidade, segundo Badotti et al. (2008). Em relação às proteínas Mph2p e Mph3p, não existem estudos demonstrando se as mesmas são capazes de transportar sacarose (Day et al., 2002).

Para confirmar que a melhoria do transporte de sacarose na linhagem *iSUC2* evoluída realmente ocorreu pelo aumento da capacidade de transporte, e não pelo aumento da afinidade, alguns parâmetros cinéticos (V_{max} e K_m) do transporte de sacarose das linhagens

iSUC2 e *iSUC2* evoluída foram estimados por meio do co-transporte com H^+ . As células foram coletadas durante a fase exponencial de crescimento em meio YP com sacarose a 2 % (p/v) e avaliadas quanto às cinéticas de transporte de sacarose. Os dados da cinética de transporte da linhagem *iSUC2* foram condizentes com os dados publicados na literatura (Badotti et al., 2008; Stambuk et al., 2000), apresentando K_m ao redor de 6 mM e um V_{max} de $70,4 \text{ nmol. (g DW.min)}^{-1}$. Como havia sido previamente suspeitado, verificou-se que somente o V_{max} foi alterado na linhagem *iSUC2* evoluída, sendo este parâmetro de $227,3 \text{ nmol. (g DW.h)}^{-1}$, enquanto o k_m ($\sim 5,5 \text{ mM}$) manteve-se praticamente inalterado em relação à linhagem *iSUC2*. As diferenças observadas entre os dados de transporte obtidos nos cultivos em quimiostato (Figura 5.7) e os dados de V_{max} estimados em meio rico (Figura 5.12) podem ser explicadas pelas distintas condições fisiológicas das células no momento das análises.

Figura 5.12 - Cinéticas de transporte de sacarose para as linhagens *iSUC2* (O) e *iSUC2* evoluída (●). As células foram coletadas na fase exponencial de crescimento em frasco agitado em meio YP com sacarose a 2 % (p/v). Os dados referem-se a medidas únicas do co-transporte com H^+ , provenientes de um único cultivo. Os parâmetros V_{max} e K_m foram calculados pelo método de Lineweaver e Burk.

Assim, conclui-se que o elevado teor de sacarose residual durante os quimiostatos com a linhagem *iSUC2* é provavelmente fruto de uma capacidade saturada de transporte (ou seja, limitado pelo V_{max}) e não de uma baixa afinidade dos transportadores pela sacarose (resultante de um valor de K_m elevado). Assim, pode-se especular que, durante a evolução, o aumento no V_{max} ocorreu através do aumento do número de transportadores na membrana plasmática. Esta explicação é reforçada pelo fato de que nos cultivos aeróbicos limitados por sacarose com a linhagem *iSUC2 ura-*, a concentração de sacarose residual no

estado-estacionário foi de apenas $0,03 \text{ g.L}^{-1}$ (Tabela 5.3). Nesta condição, a q_s , que em teoria se iguala à $V_{\text{transporte}}$ (Jansen et al., 2004), foi de $1,1 \text{ mmol GLC eq. (g DW.h)}^{-1}$, enquanto que nos cultivos anaeróbicos em sacarose o mesmo parâmetro foi de $6,0 \text{ mmol GLG eq. (g DW.h)}^{-1}$. Portanto, um aumento no V_{max} do Agt1p justificaria uma diminuição na concentração de sacarose ($0,08 \text{ g.L}^{-1}$), observada nos cultivos anaeróbicos limitados por sacarose com a linhagem *iSUC2* evoluída.

Além do aumento da expressão das permeases para alfa-glicosídeos (*MAL11*, *MAL31*, *MPH3* e *MPH2*), também foram identificados genes relacionados ao transporte de hexoses (*HXT8*, *HXT9* e *HXT12*) (Ozcan e Johnston, 1999), os quais podem ter contribuído para os baixos níveis de glicose ($< 0,01 \text{ g.L}^{-1}$; Tabela 5.4) durante o estado-estacionário nos cultivos com a linhagem *iSUC2* evoluída. Uma constatação interessante foi o fato de que os genes *HXT8* e *HXT9* não foram expressos na linhagem *iSUC2* (nível de transcrição igual a 12), mas passaram a ser expressos na linhagem *iSUC2* evoluída (nível de transcrição de 297 para o gene *HXT8* e 92 para o gene *HXT9*).

Apesar do aumento na transcrição dos genes que codificam maltases (alfa-glicosidases), as quais são capazes de hidrolisar a sacarose (Needleman, 1991; Badotti et al., 2008), que é um α -D-Glucopiranosídeo, β -D-fructofuranosil, não foi observada diferença nos níveis de expressão do gene *SUC2*, que codifica a enzima invertase, entre as linhagens *iSUC2* evoluída e *iSUC2* (Tabela 5.5). A medida da atividade de invertase, durante os cultivos com estas duas linhagens, gerou resultados muito próximos entre si (Figura 5.4). Estes resultados indicam que a expressão e a atividade da invertase não foram afetadas pelo processo de evolução em biorreator.

Outro gene que poderia ter sido alterado na evolução seria o gene *PMA1*, o qual codifica a H^+ -ATPase de membrana, que bombeia H^+ para fora das células através da clivagem de ATP (Ambesi et al., 2000; Serrano et al., 1986). No entanto, apesar de altamente expresso nas duas linhagens (níveis de transcrição ao redor de 1700 unidades arbitrárias), não foram observadas diferenças de expressão entre as mesmas.

A ferramenta “*The hypergeometric distribution analyser*” (HGD) foi utilizada para avaliar possíveis categorias funcionais de genes que estivessem sobre-representadas no conjunto dos genes com expressão aumentada (Knijnenburg et al., 2007). Foram encontradas as seguintes categorias funcionais, de acordo com o modo de classificação “*Gene Ontology*”: disaccharide metabolic process, maltose metabolic process,

oligosaccharide metabolic process, carbohydrate metabolic process, cellular carbohydrate metabolic process, response to stress, carbohydrate transport. De todas estas categorias funcionais, a única que não é óbvia é a de resposta ao estresse. De fato, notam-se vários genes do tipo “*Heat-Shock Protein*” na Tabela 5.5. No entanto, não temos uma explicação para esta observação e também não se buscou, neste trabalho, entender as causas para a super-representação desta categoria funcional no grupo de genes que tiveram expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à linhagem *iSUC2*.

Quando os níveis dos transcritos na linhagem *iSUC2* foram comparados aos da linhagem-referência *SUC2* (CEN.PK113-7D), amostradas durante o estado estacionário de quimiostatos anaeróbicos limitados por sacarose, foram encontrados apenas 9 genes com um nível de transcrição no mínimo 2 vezes menor na linhagem *iSUC2*, em relação à linhagem CEN.PK113-7D (Tabela 5.6). Não foi identificado nenhum gene com expressão significativamente aumentada (no mínimo 2 vezes) na linhagem *iSUC2*, em relação à linhagem *SUC2*.

O gene *SUC2*, que codifica a enzima invertase, apresentou expressão de 1660 unidades arbitrárias na linhagem-referência (*SUC2*) e de 3141 unidades arbitrárias na linhagem *iSUC2*. Apesar de não estar significativamente com expressão aumentada (razão de aumento de expressão menor do que 2 vezes), estes resultados estão condizentes com o nível da atividade de invertase total nestas duas leveduras, que foram de 2133 e 4726 nmol.(mg DW.min)⁻¹ nas linhagens *SUC2* e *iSUC2*, respectivamente, indicando também que a regulação da expressão deste gene é fundamentalmente transcricional. Cabe ressaltar que a análise por microarranjo de DNA não é capaz de diferenciar entre os dois transcritos que codificam a invertase extracelular e intracelular.

Considerando-se este número muito baixo de genes que tiveram sua expressão alterada na linhagem *iSUC2*, em relação à linhagem *SUC2*, pode-se afirmar que a modificação genética realizada na linhagem-referência, nomeadamente a modificação do gene *SUC2* através da eliminação da sequência sinal de secreção e da introdução de um promotor forte (*P_{ADH1}*) para promover a expressão do gene (Stambuk et al, 2009), não resultou em outras alterações importantes no metabolismo da levedura, o que é desejável. Além disto, estes resultados também atestam a reprodutibilidade da análise de transcriptoma, já que a expressão de mais de 6000 genes é interrogada por esta metodologia.

Tabela 5.5 - Lista de alguns genes (envolvidos no metabolismo de sacarose) com expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída em relação à *iSUC2*, durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbicos limitados por sacarose.

Gene		Descrição funcional (Nome sistemático com breve descrição obtida da base de dados SGD)	Níveis dos transcritos (unidades arbitrárias)		Aumento da expressão (<i>iSUC2</i> evoluída vs <i>iSUC2</i>)	Enzima
(Nome padrão)	(Nome sistemático)		<i>iSUC2</i>	<i>iSUC2</i> evoluída		
<i>MAL11 (AGT1)</i>	YGR289C	YGR289C alpha-glucoside transporter	861	3369	3,9	permease
<i>MAL31</i>	YBR298C	YBR298C maltose permease	217	1444	6,6	
<i>MPH3</i>	YJR160C	YJR160C strong similarity to Mal31p	24	427	17,4	
<i>MPH2</i>	YDL247W	YDL247W strong similarity to sugar transport proteins	23	395	16,7	
<i>HXT2</i>		YMR011W high affinity hexose transporter-2	184	434	2,4	permease
<i>HXT8</i>	YJL214W	YJL214W High-affinity hexose transporter	12	297	24,8	
<i>HXT12</i>	YIL171W	YIL171W High-affinity hexose transporter	26	107		
<i>HXT9</i>	YJL219W	YJL219W High-affinity hexose transporter	12	82	6,8	
<i>MAL32</i>	YBR299W	YBR299W Maltase (EC 3.2.1.20)	1472	3806	2,6	maltase
<i>FSP2</i>	YJL221C	YJL221C homology to maltase(alpha-D-glucosidase)	275	1736	6,3	
	YGR287C	YGR287C strong similarity to maltase	153	477	3,1	
<i>IMA5</i>	YJL216C	YJL216C strong similarity to Mal62p	12	331	27,6	
<i>MAL13</i>	YGR288W	YGR288W maltose pathway regulatory protein	48	513	10,5	proteína de regulação positiva
	YFL052W	YFL052W strong similarity to Mal63p, YPR196w and Mal13p	49	87	1,7	
<i>MAL33</i>	YBR297W	YBR297W Maltose fermentation regulatory protein	433	355	-1,2	
<i>SUC2</i>	YIL162W	YIL162W invertase (sucrose hydrolyzing enzyme)	3141	3262	1,0	invertase

Tabela 5.6 - Lista dos 9 genes com expressão diminuída na linhagem *iSUC2* em relação à *SUC2* (linhagem-referência), durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbicos limitados por sacarose.

Gene		Descrição funcional	Níveis dos transcritos (unidades arbitrárias)		Aumento da expressão
(Nome padrão)	(Nome sistemático)	(Nome sistemático com breve descrição obtida da base de dados SGD)	<i>SUC2</i>	<i>iSUC2</i>	(<i>iSUC2</i> vs <i>SUC2</i>)
<i>INO1</i>	YJL153C	YJL153C L-myo-inositol-1-phosphate synthase	1923	74	-2,6
	YBR056W	YBR056W Homolog to glucan-1,3--glucosidase (EC 3.2.1.5\; S. cerevisiae)	62	24	-2,6
<i>TFS1</i>	YLR178C	YLR178C suppressor of cdc25	352	174	-2,0
<i>CYC7</i>	YEL039C	YEL039C iso-2-cytochrome c	118	58	-2,0
	YML083C	YML083C hypothetical protein	53	23	-2,2
<i>ECM4</i>	YKR076W	YKR076W ExtraCellular Mutant	94	43	-2,2
<i>THI21</i>	YPL258C	YPL258C similarity to B.subtilis transcriptional activator tenA, and strong similarity to hypothetical proteins YOL055c and YPR121w	51	21	-2,5
	YDL158C	YDL158C questionable ORF	127	28	-4,5
	YLR456W	YLR456W strong similarity to YPR172w	56	25	-2,2

6 CONCLUSÕES

Os resultados apresentados no presente trabalho permitem concluir que:

6.1 Efeito da limitação por uracila em cultivos contínuos

6.1.1. A limitação pela uracila, em cultivos contínuos aeróbicos com células de *S. cerevisiae* auxotróficas para este nutriente, resulta em uma drástica alteração do metabolismo celular, quando comparada à limitação exclusiva pela fonte de carbono. Nesta situação, i) ocorre diminuição do fator de conversão de substrato a células, ii) desvio do carbono para a formação de etanol e acetato, e iii) crescimento celular limitado simultaneamente pela fonte de carbono e pelo nutriente auxotrófico (Basso et al., 2010).

6.2 Impactos fisiológicos oriundos da realocização da enzima invertase

6.2.1. A estratégia de engenharia metabólica, cujo propósito foi o de aumentar o fator de conversão de sacarose em etanol [$Y_{ETH/S}$ (g etanol g sacarose⁻¹)] na levedura *S. cerevisiae*, através da eliminação da atividade de invertase extracelular e da superexpressão da forma intracelular desta enzima (linhagem *iSUC2*), desenvolvida por Stambuk et al. (2009), foi eficaz, resultando em 4% de aumento no $Y_{ETH/S}$, com uma concomitante diminuição de 4,5% no $Y_{X/S}$, o que foi determinado durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbicos limitados por sacarose. Adicionalmente, a atividade de invertase total na linhagem *iSUC2* foi cerca de 2 vezes maior do que na linhagem *SUC2*. Entretanto, na levedura *iSUC2* a invertase passou a ser predominantemente intracelular, ao contrário da levedura *SUC2*, que foi predominantemente extracelular. Apesar desta melhoria nos parâmetros fisiológicos, observou-se uma alta concentração residual de sacarose (1,8 g.L⁻¹) nestes experimentos e as variações observadas em $Y_{ETH/S}$ e $Y_{X/S}$ estiveram aquém das variações que se poderia obter (+ 8% e - 25%, respectivamente), segundo previsões de um modelo metabólico teórico para o crescimento de *S. cerevisiae* em anaerobiose;

6.2.2. Os resultados descritos em 6.2.1. podem ser explicados por uma limitada capacidade (e não afinidade) de transporte de sacarose na linhagem *iSUC2*, o que foi

comprovado por medidas de transporte de sacarose realizadas tanto com esta linhagem, como com a linhagem *iSUC2* evoluída, na qual esta limitação foi contornada. Os dados demonstram que o $V_{\max}$ aumentou na linhagem *iSUC2* evoluída, em relação à linhagem *iSUC2*, enquanto o parâmetro K_m permaneceu o mesmo. O fato de a velocidade específica máxima de crescimento em sacarose na linhagem *iSUC2* ter diminuído 40 e 50% (em frasco agitado e em cultivo descontínuo em anaerobiose, respectivamente), em relação ao fenótipo selvagem, corrobora esta constatação;

6.2.3. A interrupção do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2* aumentou em 30% e em 100% o tempo necessário para a exaustão da sacarose em cultivos descontínuos anaeróbicos, em relação às linhagens *iSUC2* e *SUC2*, respectivamente. Esta observação comprova o papel determinante do gene *AGT1* no metabolismo da sacarose, principalmente em linhagens que não expressam a invertase extracelular. Por outro lado, a remoção do mesmo gene na linhagem *SUC2* não causou alteração no metabolismo da sacarose, o que demonstra/comprova que em linhagens selvagens a via principal de hidrólise de sacarose é a extracelular;

6.2.4. A modificação genética introduzida por Stambuk et al. (2009) na linhagem CEN.PK113-7D (*SUC2*), no sentido de realocar o metabolismo da sacarose em *S. cerevisiae*, não gerou alterações importantes no transcriptoma desta levedura (somente 9 genes tiveram sua expressão significativamente diminuída na linhagem *iSUC2*, em relação à linhagem *SUC2*), determinado durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbicos limitados por sacarose.

6.3 Aplicação da engenharia evolutiva como estratégia para o melhoramento do transporte ativo de sacarose

6.3.1. A estratégia de engenharia evolutiva empregada - quimiostatos longos limitados por sacarose, em anaerobiose - mostrou-se adequada para a obtenção de um mutante (a partir da linhagem *iSUC2*) que apresentou um aumento de 20 vezes na capacidade de transporte de sacarose, resultando na diminuição drástica da concentração residual de sacarose no biorreator, em relação à linhagem *iSUC2*;

6.3.2. A linhagem obtida (*iSUC2* evoluída) apresentou todos os parâmetros fisiológicos de interesse (fatores de conversão de substrato a etanol, e de substrato a

células, bem como as velocidades específicas de consumo de sacarose e de formação de etanol) muito próximos aos valores calculados pelo modelo metabólico. Comparando-se a linhagem *iSUC2* evoluída com a linhagem-referência (*SUC2*), em quimiostatos conduzidos em anaerobiose, limitados por sacarose, foi observado um aumento de 11% no $Y_{ETH/S}$ e uma diminuição de 27% no $Y_{X/S}$ (as variações previstas pelo modelo metabólico são de + 8% e - 25%, respectivamente);

6.3.3. A duplicação do gene *AGT1*, juntamente com o aumento da expressão dos genes relacionados ao transporte de dissacarídeos (*MPH2*, *MPH3*, *MAL11*, *MAL31*) e hexoses (*HXT8*, *HXT9*, *HXT12*), parece ter sido os fatores responsáveis pelo novo fenótipo obtido, através da estratégia de evolução utilizada no presente estudo. Não houve mutações na sequência do gene *AGT1*;

6.3.4. Eliminando-se as duas cópias do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2* evoluída, foi possível restaurar um fenótipo que corresponde a uma combinação dos fenótipos da linhagem-referência CEN.PK113-7D (*SUC2*) e da linhagem *iSUC2*, já que parâmetros como $Y_{ETH/S}$, $Y_{X/S}$ e q_{ETH} na linhagem *iSUC2* evoluída $\Delta/\Delta agt1$ ficaram mais próximos dos parâmetros observados para a linhagem *SUC2*, mas a concentração residual de sacarose nos quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose ficaram mais próximos dos valores observados para a linhagem *iSUC2*. Deletando-se apenas uma cópia do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2* evoluída, isto não foi observado;

6.3.5. Superexpressando-se o gene *AGT1* na linhagem *iSUC2*, conseguiu-se gerar uma linhagem que apresentou $Y_{ETH/S}$ muito próximo ao da linhagem *iSUC2* evoluída. No entanto, outros parâmetros fisiológicos, calculados para células crescendo em quimiostatos anaeróbios limitados por sacarose, foram diferentes nestas duas linhagens, indicando que a duplicação do gene *AGT1* não foi a única mutação que ocorreu durante o processo de evolução em quimiostato.

6.4 Sugestões para continuidade do trabalho

- O presente trabalho conseguiu gerar uma linhagem de *S. cerevisiae* com fator de conversão de sacarose a etanol 11% maior que a linhagem-referência. Para que se possa pensar na aplicação industrial desta estratégia, alguns passos adicionais são necessários, dos quais se destaca: estudo da fisiologia da linhagem melhorada em cultivos que simulam as

condições industriais (com meios de cultura industriais, em processo descontínuo-alimentado com reciclo de células e tratamento ácido entre as bateladas alimentadas); introdução da mesma estratégia de engenharia metabólica combinada com engenharia evolutiva em linhagens industriais consagradas, como PE-2, CAT-1 e BG-1 (Basso et al., 2008).

- Para entender porque a introdução de cópias adicionais do gene *AGT1* na linhagem *iSUC2* não gerou exatamente o mesmo fenótipo obtido durante a evolução em quimiostato, seria interessante sequenciar todo o genoma da linhagem *iSUC2* evoluída, de forma a se verificar quais outras alterações genéticas ocorreram nesta linhagem, durante a evolução. Cabe lembrar que a sequência do genoma da linhagem-referência CEN.PK113-7D (Van Dijken et al., 2000), apesar de ainda não estar publicamente disponível, deverá ser disponibilizada em breve para a comunidade científica.

REFERÊNCIAS³

Abbott DA, Knijnenburg TA, de Poorter LMI, Reinders MJT, Pronk JT, van Maris AJA. Generic and specific transcriptional responses to different weak organic acids in anaerobic chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae*. FEMS Yeast Res. 2007;7:819-33.

Abbott DA, Sui E, Duong GH, de Hulster E, Pronk JT, van Maris AJA. Catalase Overexpression Reduces Lactic Acid-Induced Oxidative Stress in *Saccharomyces cerevisiae*. Appl Environ Microbiol. 2009;75:2320-5.

Ambesi A, Miranda M, Petrov VV, Slayman CW. Biogenesis and function of the yeast plasma-membrane H⁺-ATPase. J Exp Biol. 2000;203:155-60.

Araya CL, Payen C, Dunham MJ, Fields S. Whole-genome sequencing of a laboratory-evolved yeast strain. BMC Genomics. 2010;11:88-97.

Avigad G. Accumulation of trehalose and sucrose in relation to the metabolism of alpha-glucosides in yeasts of defined genotype. Biochim Biophys Acta. 1960;40:124-34.

Badotti F, Batista AS, Stambuk BU. Sucrose active transport and fermentation by *Saccharomyces cerevisiae*. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2006;49:115-23.

Badotti F, Dario MG, Alves SL, Cordoli MLA, Miletto LC, de Araujo PS, et al. Switching the mode of sucrose utilization by *Saccharomyces cerevisiae*. Microbial Cell Factories. 2008;7:4-14.

Barford JP, Johnston JH, Mwesigye PK. Continuous-culture study of transient-behavior of *saccharomyces-cerevisiae* growing on sucrose and fructose. J Ferment Bioeng. 1995;79:158-62.

Basso LC, de Amorim HV, de Oliveira AJ, Lopes ML. Yeast selection for fuel ethanol production in Brazil. FEMS Yeast Res. 2008;8:1155-63.

³ De acordo com: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to Biomedical Journal: sample references. Available from: <http://www.icmje.org> [2007 May 22].

Basso TO, Dario MG, Tonso A, Stambuk BU, Gombert AK. Insufficient uracil supply in fully aerobic chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae* leads to respiro-fermentative metabolism and double nutrient-limitation. *Biotechnol Lett*. 2010;32:973-7.

Batista AS, Miletto LC, Stambuk BU. Sucrose fermentation by *Saccharomyces cerevisiae* lacking hexose transport. *J Mol Microbiol Biotechnol*. 2004;8:26-33.

Becker J, Boles E. A modified *Saccharomyces cerevisiae* strain that consumes L-arabinose and produces ethanol. *Appl Environ Microbiol*. 2003;69:4144-50.

Benito B, Lagunas R. The low-affinity component of *saccharomyces-cerevisiae* maltose transport is an artifact. *J Bacteriol*. 1992;174:3065-9.

Boer V, de Winder J, Pronk J, Piper M. Transcriptional responses of *Saccharomyces cerevisiae* to limitations of carbon, nitrogen, phosphorus or sulfur. *Yeast*. 2003;20:S333-S.

Boer VM, Amini S, Botstein D. Influence of genotype and nutrition on survival and metabolism of starving yeast. *PROC NATL ACAD SCI U S A*. 2008;105:6930-5.

Boles E, Hollenberg CP. The molecular genetics of hexose transport in yeasts. *FEMS Microbiol Rev*. 1997;21:85-111.

Brauer MJ, Huttenhower C, Airolidi EM, Rosenstein R, Matese JC, Gresham D, et al. Coordination of growth rate, cell cycle, stress response, and metabolic activity in yeast. *Molecular Biology of the Cell*. 2008;19:352-67.

Bro C, Regenbarg B, Forster J, Nielsen J. In silico aided metabolic engineering of *Saccharomyces cerevisiae* for improved bioethanol production. *Metab Eng*. 2006;8:102-11.

Brondijk THC, van der Rest ME, Pluim D, de Vries Y, Stingl K, Poolman B, et al. Catabolite inactivation of wild-type and mutant maltose transport proteins in *Saccharomyces cerevisiae*. *J Biol Chem*. 1998;273:15352-7.

Brown CJ, Todd KM, Rosenzweig RF. Multiple duplications of yeast hexose transport genes in response to selection in a glucose-limited environment. *Mol Biol Evol*. 1998;15:931-42.

Brown SW, Oliver SG. Isolation of ethanol-tolerant mutants of yeast by continuous selection. *European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology*. 1982;16:119-22.

Button DK. Biochemical Basis for whole-cell uptake kinetics - specific affinity, oligotrophic capacity, and the meaning of the Michaelis constant. *Appl Environ Microbiol*. 1991;57:2033-8.

Cakar ZP, Sauer U, Bailey JE. Metabolic engineering of yeast: the perils of auxotrophic hosts. *Biotechnol Lett*. 1999;21:611-6.

Carlson M, Botstein D. Two differentially regulated mRNAs with different 5' ends encode secreted with intracellular forms of yeast invertase. *Cell*. 1982;28:145-54.

Carlson M, Botstein D. Organization of the *SUC* gene family in *Saccharomyces*. *Mol Cell Biol*. 1983;3:351-9.

Carlson M, Taussig R, Kustu S, Botstein D. The secreted form of invertase in *Saccharomyces cerevisiae* is synthesized from mRNA encoding a signal sequence. *Mol Cell Biol*. 1983;3:439-47.

Cereghino GP, Scheffler IE. Genetic analysis of glucose regulation in *Saccharomyces cerevisiae*: control of transcription versus mRNA turnover. *EMBO J*. 1996;15:363-74.

Charron MJ, Michels CA. The naturally-occurring alleles of *MAL1* in *saccharomyces* species evolved by various mutagenic processes including chromosomal rearrangement. *Genetics*. 1988;120:83-93.

Cheng Q, Michels CA. *MAL11* and *MAL61* encode the inducible high-affinity maltose transporter of *Saccharomyces cerevisiae*. *J Bacteriol*. 1991;173:1817-20.

Chow THC, Sollitti P, Marmur J. Structure of the multigene family of *MAL* loci in *Saccharomyces*. *Mol Gen Genetics*. 1989;217:60-9.

Corbacho I, Teixido F, Velazquez R, Hernandez LM, Olivero I. Standard YPD, even supplemented with extra nutrients, does not always compensate growth defects of *Saccharomyces cerevisiae* auxotrophic strains. *Antonie Van Leeuwenhoek*. 2011;99:591-600.

Day RE, Higgins VJ, Rogers PJ, Dawes IW. Characterization of the putative maltose transporters encoded by YDL247w and YJR160c. *Yeast*. 2002;19:1015-27.

De Nicola R, Hazelwood LA, De Hulster EAF, Walsh MC, Knijnenburg TA, Reinders MJT, et al. Physiological and transcriptional responses of *Saccharomyces cerevisiae* to zinc limitation in chemostat cultures. *Appl Environ Microbiol*. 2007;73:7680-92.

Diderich JA, Schepper M, van Hoek P, Luttik MAH, van Dijken JP, Pronk JT, et al. Glucose uptake kinetics and transcription of HXT genes chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae*. *J Biol Chem*. 1999;274:15350-9.

Ferea TL, Botstein D, Brown PO, Rosenzweig RF. Systematic changes in gene expression patterns following adaptive evolution in yeast. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1999;96:9721-6.

Frick O, Wittmann C. Characterization of the metabolic shift between oxidative and fermentative growth in *Saccharomyces cerevisiae* by comparative C-13 flux analysis. *Microbial Cell Factories*. 2005;4:16.

Galazka JM, Tian CG, Beeson WT, Martinez B, Glass NL, Cate JHD. Cellodextrin transport in yeast for improved biofuel production. *Science*. 2010;330:84-6.

Gancedo JM. Carbon Catabolite Repression in Yeast. *Eur J Biochem*. 1992;206:297-313.

Gascon S, Lampen JO. Purification of the internal invertase of yeast. *J Biol Chem*. 1968;243:1567-72.

Gietz RD, Schiestl RH. Transforming yeast with DNA. *Methods Mol Cell Biol*. 1995;5:255-69.

Gresham D, Desai MM, Tucker CM, Jenq HT, Pai DA, Ward A, et al. The repertoire and dynamics of evolutionary adaptations to controlled nutrient-limited environments in yeast. *PLoS Genet*. 2008;4:e1000303.

Gresham D, Usaite R, Germann SM, Lisby M, Botstein D, Regenberg B. Adaptation to diverse nitrogen-limited environments by deletion or extrachromosomal element formation of the *GAP1* locus. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2010; 107:18551-6.

Grossmann MK, Zimmermann FK. Structural genes of internal invertases in *Saccharomyces cerevisiae*. Mol Gen Genetics. 1979;175:223-9.

Guadalupe Medina V, Almering MJ, van Maris AJ, Pronk JT. Elimination of glycerol production in anaerobic cultures of a *Saccharomyces cerevisiae* strain engineered to use acetic acid as an electron acceptor. Appl Environ Microbiol. 2010;76:190-5.

Guo ZP, Zhang LA, Ding ZY, Shi GY. Minimization of glycerol synthesis in industrial ethanol yeast without influencing its fermentation performance. Metab Eng. 2011;13:49-59.

Han EK, Cotty F, Sottas C, Jiang H, Michels CA. Characterization of *AGT1* encoding a general alpha-glucoside transporter from *Saccharomyces*. Mol Microbiol. 1995;17:1093-107.

Hazelwood LA, Walsh MC, Luttik MAH, Daran-Lapujade P, Pronk JT, Daran JM. Identity of the growth-limiting nutrient strongly affects storage carbohydrate accumulation in anaerobic chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae*. Appl Environ Microbiol. 2009;75:6876-85.

Hu Z, Nehlin JO, Ronne H, Michels CA. *MIG1*-dependent and *MIG1*-independent glucose regulation of mal gene-expression in *Saccharomyces cerevisiae*. Curr Genet. 1995;28:258-66.

Jansen ML, Daran-Lapujade P, de Winde JH, Piper MD, Pronk JT. Prolonged maltose-limited cultivation of *Saccharomyces cerevisiae* selects for cells with improved maltose affinity and hypersensitivity. Appl Environ Microbiol. 2004;70:1956-63.

Jansen ML, Diderich JA, Mashego M, Hassane A, de Winde JH, Daran-Lapujade P, et al. Prolonged selection in aerobic, glucose-limited chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae* causes a partial loss of glycolytic capacity. Microbiology. 2005;151:1657-69.

Jespersen L, Cesar LB, Meaden PG, Jakobsen M. Multiple alpha-glucoside transporter genes in brewer's yeast. Appl Environ Microbiol. 1999;65:450-6.

Johnston JH, Barford JP. Continuous growth of *Saccharomyces cerevisiae* on a mixture of glucose and fructose. J Gen Appl Microbiol. 1991;37:133-40.

Klaassen P, Raamsdonk L. Contribution of the individual *HXT* gene products to CO₂ production. *Folia Microbiol.* 1998;43:197-200.

Knijnenburg TA, de Winde JH, Daran JM, Daran-Lapujade P, Pronk JT, Reinders MJT, et al. Exploiting combinatorial cultivation conditions to infer transcriptional regulation. *BMC Genomics.* 2007;8:25-39.

Kresnowati MTAP, van Winden WA, Almering MJH, ten Pierick A, Ras C, Knijnenburg TA, et al. When transcriptome meets metabolome: fast cellular responses of yeast to sudden relief of glucose limitation. *Mol Syst Biol.* 2006; 2:49-65.

Kuthan M, Devaux F, Janderova B, Slaninova I, Jacq C, Palkova Z. Domestication of wild *Saccharomyces cerevisiae* is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. *Mol Microbiol.* 2003;47:745-54.

Kuyper M, Harhangi HR, Stave AK, Winkler AA, Jetten MSM, de Laat WTAM, et al. High-level functional expression of a fungal xylose isomerase: the key to efficient ethanolic fermentation of xylose by *Saccharomyces cerevisiae*? *FEMS Yeast Res.* 2003;4:69-78.

Kuyper M, Hartog MMP, Toirkens MJ, Almering MJH, Winkler AA, van Dijken JP, et al. Metabolic engineering of a xylose-isomerase-expressing *Saccharomyces cerevisiae* strain for rapid anaerobic xylose fermentation. *FEMS Yeast Res.* 2005a;5:399-409.

Kuyper M, Toirkens MJ, Diderich JA, Winkler AA, van Dijken JP, Pronk JT. Evolutionary engineering of mixed-sugar utilization by a xylose-fermenting *Saccharomyces cerevisiae* strain. *FEMS Yeast Res.* 2005b;5:925-34.

Kuyper M, Winkler AA, van Dijken JP, Pronk JT. Minimal metabolic engineering of *Saccharomyces cerevisiae* for efficient anaerobic xylose fermentation: a proof of principle. *FEMS Yeast Res.* 2004;4:655-64.

Lagunas R. Sugar transport in *Saccharomyces cerevisiae*. *FEMS Microbiol Rev.* 1993;104:229-42.

Lucero P, Lagunas R. Catabolite inactivation of the yeast maltose transporter requires ubiquitin-ligase *NPI1/RSP5* and ubiquitin-hydrolase *NPI2/DOA4*. *FEMS Microbiol Lett.* 1997;147:273-7.

Lutfiyya LL, Johnston M. Two zinc-finger-containing repressors are responsible for glucose repression of *SUC2* expression. *Mol Cell Biol*. 1996;16:4790-7.

Luttik MAH, Kotter P, Salomons FA, van der Klei IJ, van Dijken JP, Pronk JT. The *Saccharomyces cerevisiae* *ICL2* gene encodes a mitochondrial 2-methylisocitrate lyase involved in propionyl-coenzyme A metabolism. *J Bacteriol*. 2000;182:7007-13.

Macedo ID. Greenhouse gas emissions and energy balances in bio-ethanol production and utilization in Brazil (1996). *Biomass & Bioenergy*. 1998;14:77-81.

Medintz I, Jiang H, Han EK, Cui W, Michels CA. Characterization of the glucose-induced inactivation of maltose permease in *Saccharomyces cerevisiae*. *J Bacteriol*. 1996;178:2245-54.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Anuário estatístico da agroenergia 2010. Available from: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Agroenergia/anuario_agroenergia/index.html [2011 Apr 19].

Mwesigye PK, Barford JP. Transport of sucrose by *Saccharomyces cerevisiae*. *J Ferment Bioeng*. 1994;77:687-90.

Mwesigye PK, Barford JP. Mechanism of sucrose utilisation by *Saccharomyces cerevisiae*. *J Gen Appl Microbiol*. 1996;42:297-306.

Naumov GI, Naumova ES, Michels CA. Genetic variation of the repeated *MAL* loci in natural populations of *Saccharomyces cerevisiae* and *Saccharomyces paradoxus*. *Genetics*. 1994;136:803-12.

Needleman R. Control of maltase synthesis in yeast. *Mol Microbiol*. 1991;5:2079-84.

Nehlin JO, Ronne H. Yeast Mig1 Repressor is related to the mammalian early growth-response and wilms-tumor finger proteins. *EMBO J*. 1990;9:2891-8.

Nelissen B, DeWachter R, Goffeau A. Classification of all putative permeases and other membrane plurispanners of the major facilitator superfamily encoded by the complete genome of *Saccharomyces cerevisiae*. FEMS Microbiol Rev. 1997;21:113-34.

Nelissen B, Mordant P, Jonniaux JL, DeWachter R, Goffeau A. Phylogenetic classification of the major superfamily of membrane transport facilitators, as deduced from yeast genome sequencing. FEBS Lett. 1995;377:232-6.

Ni B, Needleman RB. Identification of the upstream activating sequence of *MAL* and the binding-sites for the *MAL63* activator of *Saccharomyces cerevisiae*. Mol Cell Biol. 1990;10:3797-800.

Nissen TL, Kielland-Brandt MC, Nielsen J, Villadsen J. Optimization of ethanol production in *Saccharomyces cerevisiae* by metabolic engineering of the ammonium assimilation. Metab Eng. 2000;2:69-77.

Olsson L, Nielsen J. On-line and *in situ* monitoring of biomass in submerged cultivations. Trends Biotechnol. 1997;15:517-22.

Orlowski JH, Barford JP. Direct uptake of sucrose by *Saccharomyces cerevisiae* in batch and continuous culture. J Gen Appl Microbiol. 1991;37:215-8.

Ostergaard S, Olsson L, Johnston M, Nielsen J. Increasing galactose consumption by *Saccharomyces cerevisiae* through metabolic engineering of the *GAL* gene regulatory network. Nat Biotechnol. 2000;18:1283-6.

Ozcan S, Johnston M. Function and regulation of yeast hexose transporters. Microbiol Mol Biol Rev. 1999;63:554-69.

Ozcan S, Vallier LG, Flick JS, Carlson M, Johnston M. Expression of the *SUC2* gene of *Saccharomyces cerevisiae* is induced by low levels of glucose. Yeast. 1997;13:127-37.

Pantazopoulou A, Dhalluin G. Fungal nucleobase transporters. FEMS Microbiol Rev. 2007;31:657-75.

Piper MDW, Daran-Lapujade P, Bro C, Regenberg B, Knudsen S, Nielsen J, et al. Reproducibility of oligonucleotide microarray transcriptome analyses - An interlaboratory

comparison using chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae*. J Biol Chem. 2002;277:37001-8.

Postma E, Verduyn C, Scheffers WA, Vandijken JP. Enzymic analysis of the crabtree effect in glucose-limited chemostat cultures of *Saccharomyces cerevisiae*. Appl Environ Microbiol. 1989;55:468-77.

Pronk JT. Auxotrophic yeast strains in fundamental and applied research. Appl Environ Microbiol. 2002;68:2095-100.

Renewable Fuels Association. Ethanol industry statistics 2010. Available from: <http://www.ethanolrfa.org/pages/statistics>. [2011 Apr 04].

Riballo E, Herweijer M, Wolf DH, Lagunas R. Catabolite inactivation of the yeast maltose transporter occurs in the vacuole after internalization by endocytosis. J Bacteriol. 1995;177:5622-7.

Roberts IN, Oliver SG. The yin and yang of yeast: biodiversity research and systems biology as complementary forces driving innovation in biotechnology. Biotechnol Lett. 2011;33:477-87.

Rose M, Winston F. identification of a ty insertion within the coding sequence of the *s-cerevisiae URA3* gene. Molec Gen Genet. 1984;193:557-60.

Santos E, Rodriguez L, Elorza MV, Sentandreu R. Uptake of sucrose by *Saccharomyces cerevisiae*. Arch Biochem Biophys. 1982;216:652-60.

Sauer U. Evolutionary engineering of industrially important microbial phenotypes. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2001;73:129-69.

Schimidell W, Lima UA, Aquarone E, Borzani W. Biotecnologia Industrial: Engenharia Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher; 2001. v. 2. 541 p.

Serrano R. Energy-requirements for maltose transport in yeast. Eur J Biochem. 1977;80:97-102.

Serrano R, Kiellandbrandt MC, Fink GR. Yeast plasma-membrane ATPase is essential for growth and has homology with (Na⁺ and K⁺), K⁺- and Ca²⁺-Atpases. *Nature*. 1986;319:689-93.

Sherman F. Getting started with yeast. *Methods Enzymol*. 1991;194:3-21.

Sikorski RS, Hieter P. A system of shuttle vectors and yeast host strains designed for efficient manipulation of dna in *Saccharomyces cerevisiae*. *Genetics*. 1989;122:19-27.

Silveira MCF, Carvajal E, Bon EPS. Assay for in vivo yeast invertase activity using NaF. *Anal Biochem*. 1996;238:26-8.

Silverman M. Structure and function of hexose transporters. *Annu Rev Biochem*. 1991;60:757-94.

Sjodin A, Svensson K, Lindgren M, Forsman M, Larsson P. Whole-genome sequencing reveals distinct mutational patterns in closely related laboratory and naturally propagated *Francisella tularensis* strains. *PLoS One*. 2010; 5:e11556.

Sonderegger M, Sauer U. Evolutionary engineering of *Saccharomyces cerevisiae* for anaerobic growth on xylose. *Appl Environ Microbiol*. 2003;69:1990-8.

Stambuk BU. A simple experiment illustrating metabolic regulation: induction versus repression of yeast alpha-glucosidase. *Biochemical Education*. 1999;27:177-80.

Stambuk BU, Araújo PS, Basso LC, Amorim HV, Trichez D, Alves-Jr SL, Klinkowstrom AM, Miletto LC, Machado LO, Badotti F, Espirito-Santo JCA, Schlogl PS, Dário MG. Processo para modificar geneticamente leveduras *Saccharomyces*, e seu uso em processos fermentativos de produção de metabólitos. INPI PI 0901254-0. 2009.

Stambuk BU, Batista AS, De Araujo PS. Kinetics of active sucrose transport in *Saccharomyces cerevisiae*. *J Biosci Bioeng*. 2000;89:212-4.

Stambuk BU, de Araujo PS. Kinetics of active alpha-glucoside transport in *Saccharomyces cerevisiae*. *FEMS Yeast Res*. 2001;1:73-8.

Stambuk BU, Panek AD, Crowe JH, Crowe LM, de Araujo PS. Expression of high-affinity trehalose- H^+ symport in *Saccharomyces cerevisiae*. Biochimica Et Biophysica Acta-General Subjects. 1998;1379:118-28.

Stephanopoulos G. Metabolic engineering. Biotechnol Bioeng. 1998;58:119-20.

Teste MA, Francois JM, Parrou JL. Characterization of a new multigene family encoding isomaltases in the yeast *Saccharomyces cerevisiae*, the *IMA* family. J Biol Chem. 285:26815-24.

Tilman D, Hill J, Nelson E, Polasky S, Tiffany D. Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103:11206-10.

van Dijken JP, Bauer J, Brambilla L, Duboc P, Francois JM, Gancedo C, et al. An interlaboratory comparison of physiological and genetic properties of four *Saccharomyces cerevisiae* strains. Enzyme Microb Technol. 2000;26:706-14.

Vanoni M, Sollitti P, Goldenthal M, Marmur J. Structure and regulation of the multigene family controlling maltose fermentation in budding yeast. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol. 1989;37:281-322.

Verduyn C, Postma E, Scheffers WA, Vandijken JP. Energetics of *Saccharomyces cerevisiae* in anaerobic glucose-limited chemostat cultures. Journal of General Microbiology. 1990;136:405-12.

Verduyn C, Postma E, Scheffers WA, Vandijken JP. Physiology of *Saccharomyces cerevisiae* in anaerobic glucose-limited chemostat cultures. Journal of General Microbiology. 1990;136:395-403.

Verduyn C, Postma E, Scheffers WA, Vandijken JP. Effect of benzoic-acid on metabolic fluxes in yeasts - a continuous-culture study on the regulation of respiration and alcoholic fermentation. Yeast. 1992;8:501-17.

Verstrepen KJ, Iserentant D, Malcorps P, Derdelinckx G, Van Dijck P, Winderickx J, et al. Glucose and sucrose: hazardous fast-food for industrial yeast? Trends Biotechnol. 2004;22:531-7.

Weusthuis RA, Adams H, Scheffers WA, Vandijken JP. Energetics and kinetics of maltose transport in *Saccharomyces cerevisiae* - a continuous-culture study. *Appl Environ Microbiol.* 1993;59:3102-9.

Wick LM, Weilenmann H, Egli T. The apparent clock-like evolution of *Escherichia coli* in glucose-limited chemostats is reproducible at large but not at small population sizes and can be explained with Monod kinetics. *Microbiology.* 2002;148:2889-902.

Wisselink HW, Toirkens MJ, Berriel MDF, Winkler AA, van Dijken JP, Pronk JT, et al. Engineering of *Saccharomyces cerevisiae* for efficient anaerobic alcoholic fermentation of L-arabinose. *Appl Environ Microbiol.* 2007;73:4881-91.

Wisselink HW, Toirkens MJ, Wu Q, Pronk JT, van Maris AJA. Novel evolutionary engineering approach for accelerated utilization of glucose, xylose, and arabinose mixtures by engineered *Saccharomyces cerevisiae* strains. *Appl Environ Microbiol.* 2009;75:907-14.

Wyman CE, Hinman ND. Ethanol - fundamentals of production from renewable feedstocks and use as a transportation fuel. *Appl Biochem Biotechnol.* 1990;24-5:735-53.

Zastrow CR, Hollatz C, de Araujo PS, Stambuk BU. Maltotriose fermentation by *Saccharomyces cerevisiae*. *J Ind Microbiol Biotechnol.* 2001;27:34-8.

Zelle RM, Harrison JC, Pronk JT, van Maris AJA. Anaplerotic role for cytosolic malic enzyme in engineered *Saccharomyces cerevisiae* strains. *Appl Environ Microbiol.* 2011;77:732-8.

ANEXO A - Lista dos genes com expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída em relação à *iSUC2* parental

Quadro 1: Lista dos 122 genes com expressão aumentada na linhagem *iSUC2* evoluída em relação à *iSUC2* parental, durante o estado-estacionário de quimiostatos anaeróbicos limitados por sacarose

(continua).

<i>Gene</i>	Descrição do gene	<i>iSUC2</i>	<i>iSUC2</i> evoluída	Aumento da expressão (<i>iSUC2</i> evoluída vs. <i>iSUC2</i>)	q-value
(Nome padrão)	(Nome sistemático com breve descrição obtida da base de dados SGD)	Unidades arbitrárias	Unidades arbitrárias		(%)
<i>HSP12</i>	YFL014W 12 kDa heat shock protein	317	1977	6,2	0,00
<i>MCD4</i>	YKL165C Morphogenesis Checkpoint Dependent	247	923	3,7	0,00
<i>TSA2</i>	YDR453C strong similarity to thiol-specific antioxidant proteins	86	352	4,1	0,00
	YHR210C UDP-glucose-4-epimerase (GAL10, galE)	226	3340	14,8	0,00
	YDR133C questionable ORF	534	1429	2,7	0,00
	YNL194C strong similarity to YDL222c and similarity to Sur7p	12	119	9,9	0,00
<i>STF2</i>	YGR008C ATPase stabilizing factor	511	1074	2,1	0,00
<i>CAR2</i>	YLR438W ornithine aminotransferase	195	566	2,9	0,00
	YPR015C similarity to transcription factors	38	100	2,6	0,00
<i>TSL1</i>	YML100W 123 kD regulatory subunit of trehalose-6-phosphate synthase\phosphatase complex\; homologous to TPS3 gene product	82	335	4,1	0,00
	YGL121C hypothetical protein	138	368	2,7	0,00
<i>SPI1</i>	YER150W strong similarity to putative cell surface glycoprotein Sed1p	162	906	5,6	0,00
	YDL247W strong similarity to sugar transport proteins	24	395	16,7	0,00
	YMR090W strong similarity to B. subtilis conserved hypothetical protein yhfK	28	108	3,9	0,00
<i>MAL11</i>	YGR289C alpha-glucoside transporter	861	3369	3,9	0,00
<i>ADR1</i>	YDR216W positive transcriptional regulator of ADH2 and peroxisomal protein genes	34	89	2,6	3,72
	YJR124C weak similarity to Staphylococcus multidrug resistance protein	70	215	3,1	3,72
<i>DSE1</i>	YER124C weak similarity to Dictyostelium WD40 repeat protein 2	61	134	2,2	3,72
	YIL059C hypothetical protein	23	739	32,8	3,72
<i>MSC1</i>	YML128C C-terminal part starting with aa 262 cause growth inhibition when overexpressed	65	274	4,2	4,64
	YKL151C similarity to C.elegans hypothetical protein R107.2	108	259	2,4	4,64
<i>HSP26</i>	YBR072W heat shock protein 26	107	563	5,3	4,64
	YMR107W hypothetical protein	19	176	9,1	4,64
<i>CLB1</i>	YGR108W G(sub)2-specific B-type cyclin	12	119	9,9	4,64
	YNL115C weak similarity to S.pombe hypothetical protein SPAC23C11	28	75	2,7	4,64
<i>GRE3</i>	YHR104W Aldo-keto reductase	134	364	2,7	4,64
<i>CYB2</i>	YML054C Cytochrome b2 [L--lactate cytochrome-c oxidoreductase]	48	151	3,2	4,64
	YOL053C-A DNA Damage Responsive	280	847	3,0	4,64
<i>DDR48</i>	YMR173W flocculent specific protein\; contains >35 repeats of the amino acid sequence NNDSYGS	264	789	3,0	4,64
<i>GIT1</i>	YCR098C permease involved in the uptake of glycerophosphoinositol (GroPIns)	18	114	6,4	4,64
<i>HSP30</i>	YCR021C Protein induced by heat shock, ethanol treatment, and entry into stationary phase\; located in plasma membrane	53	536	10,1	4,64
<i>FSP2</i>	YJL221C homology to maltase(alpha-D-glucosidase)	276	1736	6,3	4,64
<i>HBT1</i>	YDL223C weak similarity to mucin	44	95	2,2	4,64
<i>GRE2</i>	YOL151W induced by osmotic stress\; similar to	12	64	5,3	4,64

(continuação)

	dihydroflavonol 4-reductase from plants				
<i>TPS1</i>	YBR126C 56 kD synthase subunit of trehalose-6-phosphate synthase/phosphatase complex	339	725	2,1	4,64
<i>REG2</i>	YBR050C Possible regulatory subunit for the PP1 family protein phosphatase Glc7p	172	682	4,0	4,64
<i>RPS22B</i>	YLR367W Ribosomal protein S22B (S24B) (rp50) (YS22)	182	640	2,1	4,64
<i>FOX2</i>	YKR009C peroxisomal multifunctional beta-oxidation protein	39	139	3,6	4,64
<i>NCE102</i>	YPR149W involved in secretion of proteins that lack classical secretory signal sequences	474	1147	2,4	4,64
	YOR173W strong similarity to YLR270w	63	326	5,2	4,64
<i>ALD3</i>	YMR169C Aldehyde Dehydrogenase (NAD(P)+)	57	146	2,6	4,64
<i>PTK1</i>	YKL198C probable serine/threonine-specific protein kinase (EC 2.7.1.-)	16	219	13,9	4,64
<i>MBR1</i>	YKL093W MBR1 protein precursor	12	74	6,2	4,64
	YCL026C-A Protein involved in the integration of lipid signaling pathways with cellular homeostasis	41	180	4,4	4,64
<i>DOG2</i>	YHR043C 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase	294	689	2,3	4,64
<i>TOS8</i>	YGL096W similarity to copper homeostasis protein Cup9p	36	126	3,5	4,64
<i>PHO84</i>	YML123C inorganic phosphate transporter, transmembrane protein	26	228	8,8	4,64
<i>UGA2</i>	YBR006W Probable aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.-)	35	195	5,6	4,64
<i>SOL1</i>	YNR034w-a hypothetical protein	345	1013	2,9	4,64
<i>SPO73</i>	YER046W hypothetical protein	48	99	2,0	4,64
	YJL218W strong similarity to E.coli galactoside O-acetyltransferase	65	1380	21,1	4,64
<i>SSE2</i>	YBR169C HSP70 family member, highly homologous to Sse1p	124	322	2,6	4,64
	YDL193W similarity to N.crassa hypothetical 32 kDa protein	40	87	2,2	4,64
<i>TFS1</i>	YLR178C suppressor of cdc25	174	638	3,7	4,64
<i>ECM30</i>	YLR436C ExtraCellular Mutant	40	107	2,7	4,64
<i>MAL32</i>	YBR299W Maltase (EC 3.2.1.20)	1472	3806	2,6	4,64
<i>MIG2</i>	YGL209W Protein containing zinc fingers very similar to zinc fingers in Mig1p	12	69	5,7	4,64
<i>SOL4</i>	YGR248W similar to SOL3	26	163	6,2	4,64
<i>BUD9</i>	YGR041W Among a group of genes whose products are necessary for bud-site selection; likely involvement in positioning the proximal pole signal	74	151	2,0	4,64
	YER158C weak similarity to Afr1p	67	169	2,5	4,64
	YPR013C similarity to transcription factors	65	189	2,9	4,64
<i>MNN4</i>	YKL201C regulates the mannosylphosphorylation	44	129	3,0	4,64
<i>SIP18</i>	YMR175W protein of unknown function	12	36	3,0	4,64
	YJR160C strong similarity to Mal31p	25	428	17,4	4,64
<i>PDE1</i>	YGL248W 3,5 -Cyclic-nucleotide phosphodiesterase, low affinity	71	174	2,5	4,64
<i>YPS5</i>	YGL259W GPI-anchored aspartic protease	36	73	2,0	4,64
	YIL056W similarity to YER064c	75	229	3,1	4,64
<i>HSP104</i>	YLL026W heat shock protein 104	199	511	2,6	4,64
<i>PEX21</i>	YGR239C weak similarity to hypothetical protein YHR160c	45	139	3,1	4,64
	YLL023C similarity to hypothetical protein YLR064w	107	232	2,2	4,64
<i>MAL31</i>	YBR298C maltose permease	218	1445	6,6	4,64
	YJL217W hypothetical protein	534	2865	5,4	4,64
<i>CMK2</i>	YOL016C Calmodulin-dependent protein kinase	63	189	3,0	4,64
<i>YRO2</i>	YBR054W Homolog to HSP30 heat shock protein YRO1 (S. cerevisiae) 7	25	1058	42,2	4,64
	YJR115W similarity to hypothetical protein YBL043w	26	133	5,2	4,64
	YAL061W similarity to alcohol/sorbitol dehydrogenase	12	38	3,2	4,64
<i>RSE1</i>	YML049C RNA splicing and ER to Golgi transport	59	122	2,1	4,64
<i>ARO3</i>	YDR035W DAHP synthase; a.k.a. phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase, phenylalanine-inhibited; phospho-2-keto-3-deoxyheptonate aldolase; 2-dehydro-3-deoxyphosphoheptonate aldolase; 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthase	88	194	2,2	4,64
<i>INO1</i>	YJL153C L-myo-inositol-1-phosphate synthase	74	535	7,2	4,64
<i>YAT1</i>	YAR035W Outer carnitine acetyltransferase,	74	296	4,0	4,64

(conclusão)

	mitochondrial				
<i>RPS22B</i>	YLR367W Ribosomal protein S22B (S24B) (rp50) (YS22)	182	640	3,5	4,64
	YJL021C weak similarity to S.pombe hypothetical protein SPAC23A1.16	51	123	2,4	4,64
<i>DSE3</i>	YOR264W hypothetical protein	62	131	2,1	4,64
<i>HST2</i>	YPL015C Homolog of SIR2	58	124	2,1	4,64
	YER079W hypothetical protein	43	101	2,3	4,64
	YPL047W hypothetical protein	83	187	2,2	4,64
<i>DDR48</i>	YMR173W-A questionable ORF	1058	2221	2,1	4,64
	YNL253W hypothetical protein	19	42	2,2	4,64
<i>HXT2</i>	YMR011W high affinity hexose transporter-2	184	434	2,4	4,64
	YLL055W similarity to Dal5p	41	98	2,4	4,64
<i>DSE2</i>	YHR143W Ser-Thr rich protein	894	1936	2,2	4,64
	YJL216C strong similarity to Mal62p	12	331	27,5	4,64
	YMR291W similarity to ser/thr protein kinase	88	186	2,1	4,64
	YOR062C strong similarity to YKR075c	24	249	10,3	4,64
<i>RPS22B</i>	YLR367W Ribosomal protein S22B (S24B) (rp50) (YS22)	182	640	2,3	4,64
<i>EPT1</i>	YHR123W sn-1,2-diacylglycerol ethanolamine- and cholinephosphotranferase	134	346	2,6	4,64
<i>CTA1</i>	YDR256C catalase A	12	38	3,2	4,64
<i>ECI1</i>	YLR284C Peroxisomal enoyl-CoA hydratase	28	63	2,2	4,64
	YHR033W Pro1p (Gamma-glutamyl kinase)	68	410	6,0	4,64
<i>GLC3</i>	YEL011W 1,4-glucan-6-(1,4-glucano)-transferase	314	867	2,8	4,64
<i>HXT12</i>	YIL171W High-affinity hexose transporter	27	107	4,1	4,64
<i>NPL3</i>	YDR432W nuclear shuttling protein with an RNA recognition motif	21	81	3,9	4,64
<i>NCA3</i>	YJL116C With NCA2, regulates proper expression of subunits 6 (Atp6p) and 8 (Atp8p) of the Fo-F1 ATP synthase	40	106	2,7	4,64
	YLR364W hypothetical protein	48	104	2,2	4,64
	YNL195C hypothetical protein	17	69	4,1	4,64
<i>AHP1</i>	YLR109W similarity to C.boidinii peroxisomal membrane protein 20K A	381	1018	2,7	4,64
<i>GIP2</i>	YER054C Glc7-interacting protein\; shares homology with PIG2\; contains conserved 25 residue motif, called the GVNK motif, also found in GAC1, PIG1, PIG2, and RGI, the mammalian type 1 phosphatase targeting subunit.	17	58	3,5	4,64
<i>GGA1</i>	YDR358W strong similarity to hypothetical protein YHR108w and weak similarity to signal transducing adaptor from mouse and man	91	203	2,2	4,64
	YBL029W hypothetical protein	93	249	2,7	4,64
<i>STD1</i>	YOR047C homologous to MTH1\; interacts with the SNF1 protein kinase and TBP in two-hybrid and in vitro binding studies	27	133	4,9	4,64
<i>GDB1</i>	YPR184W similarity to human 4-alpha-glucanotransferase (EC 2.4.1.25)/amylo-1,6-glucosidase (EC 3.2.1.33)	229	623	2,7	4,64
<i>BTN2</i>	YGR142W similarity to hypothetical protein YPR158w	99	219	2,2	4,64
<i>MAL13</i>	YGR288W maltose pathway regulatory protein	49	513	10,5	4,64
	YNR009W hypothetical protein	41	96	2,3	4,64
<i>SSA3</i>	YBL075C heat-inducible cytosolic member of the 70 kDa heat shock protein family	36	92	2,5	4,64
<i>CBF2</i>	YGR140W 110 kDa subunit of the centromere binding factor CBF3	45	93	2,1	4,64
<i>VRP1</i>	YLR337C Proline-rich protein verprolin	103	217	2,1	4,64
	YLR046C strong similarity to Rta1p and Rtm1p protein	12	33	2,7	4,64
<i>YGP1</i>	YNL160W YGP1 encodes gp37, a glycoprotein synthesized in response to nutrient limitation which is homologous to the sporulation-specific SPS100 gene	74	612	8,3	4,64
	YDR034W-B identified by SAGE expression analysis	77	180	2,3	4,64
<i>GPH1</i>	YPR160W Glycogen phosphorylase	196	492	2,5	4,64
	YDR070C hypothetical protein	21	132	6,2	4,64