✦ Informações sobre o Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL

» HISTORIA

- Data da Fundação: 05 de fevereiro de 1955;
- Fundador: Prof. Onofre Lopes da Silva
- Denominação inicial: Hospital Miguel Couto; Hospital das Clínicas
- Denominação atual: Hospital Universitário Onofre Lopes.

O Hospital Universitário Onofre Lopes mostra uma trajetória que guarda uma relação muito forte com a própria organização do sistema de saúde público, no que se refere a assistência hospitalar, cujas marcas referenciais são apresentadas a seguir:

- Ano de 1855, através da Lei nº 335, de 10 de setembro, é criado o "Hospital da Caridade". Primeiro Hospital do Estado. Mantendo-se de forma precária com recursos do Estado e auxílio da sociedade.

- Ano de 1906, o "Hospital da Caridade" é extinto, restando em funcionamento, apenas uma enfermaria para atendimento dos doentes "miseráveis".

Ano de 1909, através do Decreto do Governador Alberto Maranhão há uma determinação na reorganização do serviço de saúde, sendo adaptada uma residência de veraneio em Petrópolis para funcionamento de um Hospital. Este Hospital, começou a funcionar em 12 de setembro de 1909, sendo denominado "Hospital da Caridade Juvino Barreto", com características de Hospital Geral. Dispunha de 18 leitos, sendo diretor o médico Januário Cicco. O Hospital subordinava-se a Inspetoria de Higiene e Saúde.

Esta Instituição tinha como fim prestar assistência médica à população pobre, contando com a ajuda do Estado.

Em 25 de maio de 1927, foi criada a "Sociedade de Assistência Hospitalar". Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, cuja finalidade era subvenções pelo período de 01/06/27 a 1947.

No ano de 1935 o Hospital, passa a denominar-se "Miguel Couto".

No ano de 1946, amplia suas dependências com capacidade para 379 (trezentos e setenta e nove) leitos.

No ano de 1952, por intercedência do Dr. Januário Cicco, o Hospital "Miguel Couto" e os seus anexos são doados à Sociedade de Assistência Hospitalar. Neste momento histórico, ressalta-se que as bases alicerçadas pela Sociedade geram condições próprias para a futura criação da Faculdade de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte.

» BASES DE ENSINO

Em 05 de fevereiro de 1955, é criada a Faculdade de Medicina, sendo o Hospital o campo das práticas, não apenas para os alunos de Medicina, mas também abrindo espaços para outros cursos da área de saúde. A Sociedade de Assistência Hospitalar, portanto, passa a incorporar o Hospital, assim como a Maternidade Escola Januário Cicco.

» DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE DO HOSPITAL

Em 1960, o Hospital, passa a denominar-se "Hospital das Clínicas", mediante Decreto assinado pelo então Presidente da República Juscelino Kubitschek. Assume a personalidade de Hospital Escola, integrando-se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo subordinado ao Reitor. Como campo de aprendizagem, dos estudantes de medicina e áreas afins vai construindo a sua história formando gerações que vão assumindo o papel de transformador de realidade, sendo um componente importante na Sociedade e na Missão que lhe é própria.

A sua federalização, assegura a manutenção através do Ministério da Educação, das funções de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Em 1984, o Hospital, através da RESOLUÇÃO Nº 68/68 DO Conselho Superior da UFRN passa a denominar-se "Hospital Universitário Onofre Lopes".

» INSERÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Em 1988, integra-se ao Sistema Único de Saúde, através da Lei Orgânica nº 8.080, como referência, terciária, estando localizado no Distrito Sanitário Leste. Além das funções típicas de um Hospital Escola, passa a assumir um compromisso com o SUS, através de convênio específico.

» COMENTÁRIOS GERAIS

Como podemos observar, o Hospital tem historicamente uma aderência a realidade sócio-sanitária do Estado. Sem a atual finalidade, atendia aos segmentos excluídos da sociedade que dadas as suas condições sócio-econômicas não podiam recorrer aos médicos particulares que, formados em outros Estados retornavam à cidade e atendiam as pessoas de posse.

A criação da Sociedade de Assistência Hospitalar desenha um novo cenário ao sincronizar objetivos macros, entre os quais a criação da Faculdade de Medicina. Desta forma o Hospital Público Geral, bem como nomes de grande extensão que poderiam, aliados a professores convidados estruturar a Faculdade de Medicina apresentam uma história que singularmente se confundem.

A federalização e a definição da Missão Institucional como Órgão voltado para o Ensino e à Pesquisa e a Extensão ligado a Universidade Federal, acena para o papel que tem o Hospital para Sociedade.

Finalmente a inclusão ao SUS, numa parceria que obedece ao preceituado na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, onde se faz preciso uma maior clareza do papel no Sistema.

✚ Medicamentos que podem interferir nas análises de magnésio

SUBSTÂNCIA ATIVA	MEDICAMENTO(S)		INTERFERÊNCIA(S) RELATADA(S)
Ácido etocrínico ⁴	-		Pode causar eliminação do Mg mais rápido do que o normal.
Ácido paraminossalicílico ⁴	-		Pode interferir na absorção, níveis ou atividade do Mg.
Albuterol ¹	-		Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Aluminium magnesía ¹	-		Pode aumentar o risco de retenção de Mg.
Aminoglicosídeo ^{1, 2, 3, 4} - amicacina	Amicalin	Novamin	Pode resultar em depleção do Mg tecidual e/ou sérico.
	Amicilon	Sulfato de amicacina	
	Klebicil		
- gentamicina	Cauterex	Permut	
	Cremerderme	Poliderms	
	Dermatisan	Quadervin	
	Dexamitrex	Quadribeta	
	Dexamitrex ophtiole	Quadriderm	
	Dip betametasona + sul	Quadrihexal	
	gentamicina	Quadrikin	
	Diprogenta	Quadrilon	
	Duotrat	Quadrinax	
	Emisgenta	Quadrineo	
	Garacin	Quadriplus	
	Garamicina	Qualiderm	
	Garasone	Septopal	
	Gentacort	Sulfato de gentamicina	
	Gentagran	Tetraderm	
	Gentamicil	Val betametasona + gentamicina + clioquinol	
	Gentamicina	Val betametasona + gentamicina + tolnaftato + clioquinol	
	Gentamil	Vitamicin	
	Gentaron		
	Gentax		
	Gino cauterex		
	Neo gentamicin		
- tobramicina	Tobracin	Tobramicina	
	Tobracin-d	Tobramicina + dexametasona	
	Tobracort	Tobramina	
	Tobradex	Tobranom	
	Tobragan	Tobrex	
Anascrine ²	-		Pode desencadear hipomagnesemia.
Anfotericina B ^{1, 2, 3}	Albelcet	Fungizon	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
	Ambisome	Gino teracin	
	Amphocil	Novasutin	
	Anfoterin	Talsutin	
	Cloridrato de tetraciclina + anfotericina B	Tericin at	
	Fungitrin	Tricocilin b	
Carboplatina ²	b-platin	Kemocarb	Pode desencadear hipomagnesemia.
	Biocarbo	Paraplatin	
	Carboplatina	Platamine	
	Citoplatina	Tecnocarb	
	Evocarb		
Ciclosporina ¹	Restasis	Sandimmun neoral	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
	Sandimmun		
Cisplatina ^{1, 3, 4}	Astaplatin	Platiran	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
	C-platin	Platistine	
	Cisplatex	Tecnoplatin	
	Cisplatyl	Unistin	
Costicosteróide ¹	-		Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.

SUBSTÂNCIA ATIVA	MEDICAMENTO(S)		INTERFERÊNCIA(S) RELATADA(S)
Digoxina ^{1,4}	Cardcor Cardionil Cardixin Cimecard Digitax Digobal Digox	Digoxan Digoxil Digoxina Digoxina (glaxosmithkline) Lanitop Lanoxin Neo digoxin	Pode aumentar a eliminação do Mg, podendo resultar em deficiência tecidual e/ou sérica.
Capreomicina ²		-	Pode desencadear hipomagnesemia.
Eritromicina ⁴	Biotrex Eribiotic Eriflogin Erimicina Eripan Eritrax Eritrex Eritrex a Eritroben	Eritromed Eritrovit Erycen Ilosone Isotrexin Lisotrex Rubromicin Siftrex Stiemydin	Pode interferir na absorção normal, metabolismo ou atividade do Mg.
Estrôgenos ¹	Estrogenon	-	Pode aumentar o risco de retenção de Mg.
Etolol ^{1,4}	Cerumin Ethamolin	Paraqueimol Queimalive	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Felodipina ¹		-	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Fenobarbital ⁴	Barbitron Carbital Edhanol Fenobarbital	Garbital Gardenal Unifenobarb	Pode diminuir as concentrações e atividade do Mg.
Foscarnet ^{1,2,3}		-	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Furosemida ⁴	Biosemid Closenid Diuremida Diurisa Diurit Furolasil Furomida Furosan Furosecord Furosem Furosemida Furosemide	Furosemil Furosemin Furosen Furosetron Furosix Furozix Hidrion Lasilactona Lasix Lasix long Neosemid Urasix	Pode aumentar a excreção de Mg e desencadear distúrbios nos fluídos e eletrólitos.
Isoniazida ^{1,4}		-	Pode reduzir a absorção do Mg, podendo levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Medroxiprogesterona associado a anfetamina ¹	Acemedrox Acetoflux Contracep Cyclofemina Depo provera Dilena	Farlital Medroxon Premelle Provera Repogen Selecta	Pode aumentar o risco de retenção de Mg.
Metformina ¹	Avandamet Cloridrato de metformina Diaformin Dimefor Formet Galvus met Gliceform Glicomet Glifage Glietage xr Glucoformin Glucoformin 850	Glucovance Meguanin Metfordin Metform Metformed Metformina Metformina HCl Metformix Neo metformin Starform Teutoformin	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.

SUBSTÂNCIA ATIVA	MEDICAMENTO(S)		INTERFERÊNCIA(S) RELATADA(S)
Neomicina ⁴	Aftine Aftjet Anaseptil Bacidermina Bacigen Bacina Bacinantrat Bacineo Bactoderm Betacortazol Betaderm n Betazol cort Betnovate n Betricort Bismu-jet Bracimicin Celocort Cetobeta Cicatrene Cicatrizan Cimecort Cinaderm Clostemin Colutoide Decadron Denason Dermase Dermomicin Dermoxin Dermos Dexavison Drenison n Elotin Emscort Epicitrin Esperson n Ferid Fluo-vaso oculum Folderm Ginec Gingilone Gynax n Hidrocin Hipodex Katrizan Kindcetin Locorten Lomicina Londerm-n Maxinom	Maxitrol Micoplex Mud Naderm Nebacetin Nebaciderme Nebactrina Nebalon Nemicina Neobacina Neobacipan Neocetrin Neocina Neocinolon Neocortin Neodermicina Neodex Neolon d Neom Neomed Neomicin Neomicon Neomicina Neotop Neotricin Nepodex Novacort Novaderm Omcilon-a m Oncileg Oto-xilodase Otodol Otolone Otomixyn Ostoporin Otosynalar Panotil Poliginax Polipred Pomicina Rhinosept Teutomicina Thiabena Thiasib-n Tricortid Trivagel n Trofodermin Trok n Vagitrin n Xilodase	Pode aumentar a excreção ou interferir na absorção do Mg, podendo resultar em déficit.
Nitrofurantoína ¹	Hantina Macrofantina	Nitrofen Uropac	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Pamidronato ²	Aredia Pamidrom	Pamidronato dissódico	Pode desencadear hipomagnesemia.
Penicilina ⁴	Aracilina Benapen Benzatron Benzetacil Benzilpen Benzilpenicilina potássica Cristalpen Despasilina	Fenoximetilpenicilina Longacilin Meracilina Pen ve Penicilin v Penkaron Wycillin	Pode inativar, reduzir a absorção ou atividade do Mg.

SUBSTÂNCIA ATIVA	MEDICAMENTO(S)		INTERFERÊNCIA(S) RELATADA(S)
Pentamidina ^{1,3}	Pentacarinat		Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Polimixin ⁴	Dermicin Elotin Ginec Lidosporin Maxinom Maxitrol Nepodex Otolone Otomixyn	Otosporin Otosynalar Panotil Poliginax Polipred Polysporin Predmicin Sulfato de polimixina b Terramicina com polimixina	Pode interferir na absorção normal, concentrações sanguíneas ou atividade do Mg.
Poupadores de K ¹ - amilorida	Amiretic Anclopic Cloridrato de amilorida + hidroclorotiazida	Diupress Diurezin a Diurisa Moduretic	Pode aumentar o risco de retenção de Mg.
- espironolactona	Aldactone Aldazida Aldosterin Diacqua	Espironolona Espironolactona Lasilactona Spiroctan	
- triantereno	Iguassina		
Quinidina ¹	Quinicardine		Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Rinitrol ²	-		Pode desencadear hipomagnesemia.
Ritodrine ²	-		Pode desencadear hipomagnesemia.
Sais Epsom (sulfato de Mg) ¹	-		Pode aumentar o risco de retenção de Mg.
Salbutamol ²	Acobelin Aerocort s Aerodini Aeroflux Aerofrin Aerogold Aerogreen Aerojet Aerolin Aeromed Aerotamol Aerotide Aerotrat Asmaflux Asmakil Asmaliv Broncomix Bronconal	Bronquil Butovent pulvinal Clenil composit Combivent Dilamol Neutoss Oxiterol Pulmoflux Salburin Salbutam Salbutamox Salrolin Sulfato de salbutamol Sulfato de salbutamol + guaifenesina Teoden Tussiliv	Pode desencadear hipomagnesemia.
Sotalol ¹	Cloridrato de sotalol Sotacor	Sotahexal	Pode levar a depleção de Mg tecidual e/ou sérico.
Sulfonamida ^{1,4}			Pode reduzir a absorção do Mg.
Teofilina ²	Bronquiasma Bronquitos Demattive 10 Franol	Marax Talofilina Teo-bras Teolong	Pode desencadear hipomagnesemia.
Tiazídicos ^{1,3,4}	Adelfan esidrex Alfazida Amilorid Amiretic Anclopic Aprozide Aradois h Atacand hct Aténs h	Hidromed Hidrosan Eupressin h Fluxopress Gliotenzide Hidrobio Hidroclorana Hidroclorotiazida Hidrotiazida	Pode aumentar a excreção do Mg levando a perdas significativas, com conseqüente depleção tecidual e/ou sérica do Mg.

SUBSTÂNCIA ATIVA	MEDICAMENTO(S)		INTERFERÊNCIA(S) RELATADA(S)
Tiazídicos ^{1, 3, 4} (continuação)	Benicar hct Biconcor Captopril - hidroclorotiazida Capotec hct Cardionato h Cardvita h Clorana Cloridrato de amilorida + hidroclorotiazida Clorizin Co-enalil Co-enaprotec Co-labopril Co-presseless Co-pressotec Co-renitec Coenaplex Corus h Diovan hct Diserim Diureclor Diuretic Diuretil Diurezin Diurezin a Diurezin c Diurezin e Diurix Drenol Ecaton h Enatec f Hidroclorozil Hidroflux Hidrolan	Hidroclorotiazina Hyzaar Iguassina Lisinopril + hidroclorotiazida Lisinoretic Lisoclor Lisonotec Lopril d Lorsar hct Losartana potassica + hidroclorotiazida Lotensin h Maleato de enalapril + hidroclorotiazida Malena hct Micardis hct Micrin Moduretic Monoplus Naprix d Neo hidroclor Neopress Olmotec hct Polol h Prinzide Ramipril + hidroclorotiazida Seloress Tenadren Torlos h Triatec Vascase plus Vasopril plus Zestoretic	Pode aumentar a excreção do Mg levando a perdas significativas, com conseqüente depleção tecidual e/ou sérica do Mg.
Tobramicina ⁴	Tobramicin Tobramicin d Tobracort Tobradex Tobragan	Tobramicina Tobramina Tobranom Tobrex	Pode desencadear perda do Mg.
Viomicina ²	-		Pode desencadear hipomagnesemia.

¹ SHAPES, S.A.; SCHULSEL, Y.R.; CIFUENTES M. Drug-nutrient interactions that impact mineral status. In: BOULLATA, J.J.; ARMENTI, V.T. **Handbook of drug-nutrient interactions**. Totowa: Humana Press Inc, 2004.

² SWAMINATHAN, R. Magnesium metabolism and its disorders. **Clin Biochem Rev.** v. 24, p. 47-66, 2003.

³ TOPF, J.M.; MURRAY, P.T. Hypomagnesemia and hypermagnesemia. **Rev End Metab Disord.** v. 4, p. 195-206, 2003.

⁴ HOLT, G.A. **Food & drug interactions**. Chicago: Precept Press, 1998.

✚ **Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA -HUOL

Título do projeto:	AVALIAÇÃO DO MAGNÉSIO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2				
Pesquisador responsável:	Cristiane Hermes Sales				
Data da Versão	18/10/06	Cadastro CEP	021/06	Grupo e área temática	III
Cadastro CONEP	FR – 106726				
Data do Parecer	21/12/06	Relator			

Objetivos do Projeto: O objetivo principal do projeto é analisar se há relação entre o estado nutricional de magnésio e a gravidade do quadro clínico de pacientes com DM tipo 2.

Itens metodológicos e éticos	Situação
Título	Adequado
Pesquisadores	Adequados, curriculum vitae anexo.
Local de realização	Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN)
Outras instituições envolvidas	Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Condições para realização	Adequadas
Delineamento	Adequado
Tamanho da amostra	80 adultos
Cálculo do tamanho da amostra	Especificado e adequado
Participantes pertencentes a grupos especiais	Sujeitos portadores de DM tipo 2
Seleção equitativa dos indivíduos participantes	Especificada e adequada
Critérios de inclusão e exclusão	Adequados
Relação risco-benefício	Risco insignificante
Uso de placebo	Não utiliza
Período de suspensão e uso de drogas (wash out)	Não se aplica
Monitoramento de segurança e dados	Adequado
Avaliação dos dados	Adequada – quantitativa
Privacidade e confidencialidade	Adequada
Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)	Adequado
Adequação às normas e diretrizes	O projeto está de acordo com a Resolução 196/96 do CNS.

Comentários sobre os itens de identificação:

O projeto está bem identificado, folha de rosto preenchida de maneira correta.

Introdução	
Há introdução bem elaborada, com citações bibliográficas atualizadas, com embasamento teórico resumido sobre a proposta.	

Cronograma	Adequado
Orçamento	Adequado.
Fonte de financiamento	Não se aplica

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes-UFRN (CEP-HUOL) – Av. Nilo Peçanha 620, Petrópolis, 59012-300, Natal-RN. Fone: 84-32023719, ramal 242.

Comentários sobre o cronograma e orçamento: - O cronograma especifica datas em semestres, determinando em que período terá início e fim.

Referências bibliográficas

Referências adequadas e atualizadas

Comentários gerais sobre o projeto

Projeto apresentado com metodologia adequada, O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido está bem estruturado e de acordo com a Resolução 196/96.. Os riscos a que serão submetidos os pacientes são mínimos, não foram detectados problemas éticos, podendo o projeto de pesquisa ser considerado APROVADO para realização.

Situação: APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HUOL

Natal-RN, 21 de dezembro de 2006.

Prof. Dr. Aldo da Cunha Medeiros
Coordenador do CEP-HUOL

PROF. ALDO DA CUNHA MEDEIROS
COORDENADOR DO CEP/HUOL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (CEP-HUOL)

CERTIFICADO

O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), devidamente reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), analisou o projeto:

Título: AVALIAÇÃO DO MAGNÉSIO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

Pesquisador Responsável: Cristiane Hermes Sales

Este projeto foi aprovado em seus aspectos éticos e metodológicos, incluindo o termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 e complementares, do Conselho Nacional de Saúde, em reunião plenária do CEP-HUOL realizada no dia 21 de dezembro de 2006. Toda e qualquer alteração no projeto/protocolo de pesquisa, assim como eventos adversos que venham a ocorrer deverão ser comunicados imediatamente ao CEP-HUOL. O relatório final do projeto ou a cópia de sua publicação deverá ser encaminhado ao CEP/HUOL após o término do estudo, conforme cronograma, com a respectiva cópia da folha de rosto.

Natal, 21 de dezembro de 2006.

Dr. Aldo da Cunha Medeiros
Coordenador do CEP-HUOL
PROF. ALDO DA CUNHA MEDEIROS
COORDENADOR DO CEP/HUOL

✦ **Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

Ofício CEP nº 03/2007

São Paulo, 6 de fevereiro de 2007.

Ilmo(a). Sr(a).
Cristiane Hermes Sales
Orientador Profa. Célia Colli
FBA

Prezado(a) Senhor(a),

O Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP, em reunião realizada em 27 de novembro de 2006, **APROVOU** o projeto "Avaliação de magnésio em pacientes com diabetes mellitus tipo 2" (Protocolo CEP nº 399) apresentado por Vossa Senhoria.

Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto, deverá ser apresentado um relatório parcial, de acordo com o Artigo 18 – item C, da Portaria FCF-111/97.

Atenciosamente,

Prof. Dra. Valentina Porta
Coordenadora do Comitê de Ética Pesquisa
FCF/USP

✦ Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

Universidade de São Paulo
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Hospital Universitário Onofre Lopes

Nº do paciente: _____

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROJETO: Avaliação de magnésio em pacientes com *diabetes mellitus* tipo 2

Convidamos você a participar de um estudo em que vamos relacionar a sua dieta com o estado do seu diabetes. Para isso será necessário que você anote, em formulários que serão fornecidos, todas as refeições que fizer durante três dias na semana. Pedimos que volte a fazer essa anotação depois de 1 mês. Quando for entregar os formulários, serão feitas algumas perguntas sobre os alimentos que você normalmente come. Vamos medir sua altura, peso e cintura e coletar sangue. Uma coleta vai ser feita antes do café da manhã e outra depois. Queremos saber como estão funcionando seus rins, como está o açúcar, a gordura e o magnésio do seu sangue. O magnésio é um mineral que está presente nos alimentos, e nós queremos saber se ele ajuda a melhorar o seu diabetes. Para entender melhor os resultados do exame de sangue, precisamos ainda que você traga em uma garrafa que lhe será dada todo o xixi que fizer no dia anterior à coleta de sangue e o primeiro xixi que fizer antes de ir fazer o exame de sangue.

A sua participação neste estudo será muito importante para que possamos entender melhor o diabetes, e assim ajudar no seu tratamento e no de outras pessoas. Os desconfortos e riscos da pesquisa são mínimos. Você poderá sentir tonturas por estar em jejum para fazer o exame e/ou poderá ficar, por um tempo, com uma mancha um pouco arroxada no local da coleta de sangue. O exame será feito com material descartável, por uma pessoa experiente e depois da coleta você receberá um lanche.

Você não terá nenhuma despesa com a pesquisa, e receberá os seus resultados por escrito, o mais rápido possível, e, se preciso, você será encaminhado para um serviço de saúde.

Sempre que tiver alguma dúvida sobre o estudo, e quiser falar com alguém do grupo, é só se comunicar pelos telefones, e-mails ou através dos endereços fornecidos atrás dessa folha. Se em algum momento, por algum motivo não quiser mais participar, você poderá desistir, sem que isso o prejudique.

Os resultados serão utilizados apenas para fins de pesquisa, sem que ninguém, além de você e do grupo, saiba que você está participando dela.

Não será paga nenhuma quantia pela sua participação nesta pesquisa. Só se houver algum custo relativo à passagem ou alimentação, será avaliada a possibilidade de pagamento.

Se concordar em participar da pesquisa, pedimos que preencha os dados abaixo e assine.

Após ter entendido tudo o que está escrito neste documento e o que o pesquisador me explicou, eu, _____, identidade nº _____, aceito participar como voluntário desta pesquisa, e por isso preencho os dados solicitados.

Sexo: () M () F Data de Nascimento: ____/____/____
Endereço: _____ nº: ____ Apto: ____
Bairro: _____ Cidade: _____
CEP: _____ - _____ Telefone: _____

Natal, ____ de _____ de 2008.

Assinatura do voluntário na pesquisa

Cristiane Hermes Sales
Nutricionista CRN-6: 4428

DADOS PARA CONTATO EM CASO DE NECESSIDADE:**Responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa:****Nut. Cristiane Hermes Sales (mestranda)**

☎ Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental
Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bl.14, Cidade Universitária
CEP 05508-900 - São Paulo/SP
✉ chsales@usp.br
☎ (0xx84) 9451 3866 / (0xx11) 9321 3813

Profa. Dra. Célia Colli (orientadora)

☎ Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental
Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bl.14, Cidade Universitária
CEP 05508-900 - São Paulo/SP
✉ cecolli@usp.br
☎ (0xx11) 3091 3651

Profa. Dra. Lucia de Fátima Campos Pedrosa (colaboradora)

☎ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Nutrição
Av. Gal. Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis
CEP 59010-190 - Natal/RN
✉ lpedrosa@ufrnet.br
☎ (0xx84) 3215 4322

Prof. Dr. Josivan Gomes de Lima (colaborador)

☎ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Medicina Clínica
Av. Gal. Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis
CEP 59010-190 - Natal/RN
✉ josivan@usa.net
☎ (0xx84) 3222 6328

Profa. Dra. Telma Maria A. Moura Lemos (colaboradora)

☎ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas
Av. Gal. Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis
CEP 59010-190 - Natal/RN
✉ telmaml@yahoo.com.br
☎ (0xx84) 3215 4232

Comitês de Ética que a pesquisa foi submetida:**Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL**

☎ Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL
Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis
CEP 59012-300 - Natal/RN
✉ cep_huol@yahoo.com.br
☎ (0xx84) 3202 3719 Ramal: 242

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP

☎ Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo
Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bl. 13A, Cidade Universitária
CEP 05508-900 – São Paulo/SP
✉ cepfcf@usp.br
☎ (0xx11) 3091 3677

✦ Questionário com Informações Gerais dos Pacientes

Projeto: Avaliação de magnésio em pacientes com *diabetes mellitus* tipo 2

Nº: _____

DADOS PESSOAIS	Data de realização: ____/____/____
1. Nome: _____	
2. Sexo: (0) masculino (1) feminino	3. Data de nascimento: ____/____/____
Endereço para contato: _____	
Complemento: _____ Bairro: _____	
Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____ - _____	
Telefone (s) para contato: _____	
E-mail: _____	
4. Escolaridade: ____ série ____ grau Outro: _____	
Se for analfabeto ou tiver curso superior completo/incompleto, pós-graduação utilizar os códigos abaixo. → Caso tenha uma outra opção especificar em outro. <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> </div>	
(00) analfabeto (55) superior incompleto (66) superior completo (77) pós-graduação _____	
5. Profissão: _____ Quantas horas fica no trabalho? _____	
6. Há quanto tempo é diabético? _____	
Diagnóstico: (0) médico/laboratorial (1) auto-referido	
7. É hipertenso? (0) sim (1) não Se <u>sim</u> , há quanto tempo é hipertenso? _____	
8. Alguém na família apresenta alguma doença crônica como: diabetes, hipertensão, câncer, problemas no coração, colesterol alto? (0) sim (1) não	
Se <u>sim</u> , qual(is)? Anotar quem é(são) a(s) pessoa(s)! _____	

9. Faz uso de medicamentos? (0) sim (1) não	
Se sim, qual(is)?	
MEDICAMENTO	HORÁRIO DE CONSUMO
TEMPO DE CONSUMO	

Projeto: Avaliação de magnésio em pacientes com diabetes mellitus tipo 2

10. O senhor(a) costuma tomar alguma vitamina ou mineral?

(0) não (1) sim, mas dificilmente (2) sim, frequentemente

Se sim, complete a tabela abaixo com as informações dos suplementos.

VITAMINA / MINERAL	QUANTIDADE E FREQUÊNCIA
	(1) 1 por dia (2) 2 por dia (3) 3 por dia (4) 4 ou + por dia (5) 1-3 por semana (6) 4-6 por semana
	(1) 1 por dia (2) 2 por dia (3) 3 por dia (4) 4 ou + por dia (5) 1-3 por semana (6) 4-6 por semana
	(1) 1 por dia (2) 2 por dia (3) 3 por dia (4) 4 ou + por dia (5) 1-3 por semana (6) 4-6 por semana
	(1) 1 por dia (2) 2 por dia (3) 3 por dia (4) 4 ou + por dia (5) 1-3 por semana (6) 4-6 por semana

11. Faz uso de insulina? (0) sim (1) não

Se sim, qual e qual(is) o horário que toma? _____

12. O senhor(a) faz uso de cigarro ou tabaco?

(0) sim (1) não (2) parei a _____ (tempo)

Se sim, em média, quantos cigarros por dia fuma?

(0) 1-5 (1) 6-14 (2) 15-24 (3) 25-34 (4) 35 ou mais

13. O(a) senhor(a) pratica alguma atividade física? (0) sim (1) não

Se sim, qual(is) atividade(s), quantos dias na semana e por quanto tempo? _____

14. Em média, quantas horas o senhor(a) gasta com:

atividades de lazer: _____ atividade doméstica: _____ sono: _____

15. O senhor(a) sente algum desses sintomas?

(0) câimbra	(6) falta de vontade de comer (anorexia)
(1) formigamento nas mãos, pés e/ou rosto (parestesias)	(7) irritação, mudanças de humor
(2) tremores	(8) diminuição da atenção, memória ruim
(3) sensação de fraqueza ou cansaço	(9) ansiedade, nervosismo
(4) taquicardia (coração acelerado)	(10) agitação
(5) náuseas e vômitos	(11) insônia

16. **PARA MULHERES** - Data da última menstruação: ____/____/____

PESO: _____ ALTURA: _____ CA: _____

DATA DA COLETA DE SANGUE: ____/____/____ RETORNO: ____/____/____

✦ Orientações Nutricionais – “Padrão”

DICAS PARA TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A dieta de uma pessoa com *diabetes* tipo 2 é a mesma recomendada para quem quer ter uma vida saudável e evitar doenças.

Um estilo saudável de alimentação tem cinco características:

ADEQUAÇÃO, EQUILÍBRIO, CONTROLE CALÓRICO, MODERAÇÃO E VARIEDADE

Então, o que você pode fazer?

- ★ Faça de 4 a 6 refeições por dia, em horários determinados e com moderação! Inclua pequenos lanches, reduzindo a quantidade de alimentos nas principais refeições (café da manhã, almoço e jantar)
- ★ Mastigue bem os alimentos saboreando-os.
- ★ Evite frituras! Elas são muito calóricas e fazem mal para o coração. Sempre que possível asse, grelhe ou cozinhe seus alimentos.
- ★ Coma sempre que puder alimentos integrais, como arroz integral ou da terra, massas integrais, pães e biscoitos integrais, aveia, pois eles possuem mais fibras e minerais como o magnésio.

- ★ Prefira comer a fruta ao invés de tomar o suco. Elas também contêm fibras que dão saciedade, além de vitaminas e minerais.
- ★ Varie hortaliças! Coma mais hortaliças verde-escuras como couve folha, espinafre, brócolis, hortaliças alaranjadas.
- ★ Prefira leite, iogurtes ou queijos que tenham menos gordura, semi-desnatados ou desnatados.

- ★ Escolha carnes e aves magras e prepare-as com pouca gordura e sem a pele, no caso das aves. Cozinhe, grelhe ou asse. Lembre-se dos peixes!
- ★ Não esqueça do feijão na sua alimentação. Você pode trocá-lo também por soja, grão de bico, lentilha seca e ervilha seca.
- ★ Reduza progressivamente o consumo de alimentos industrializados, substituindo-os por alimentos naturais e preparações caseiras.

- ★ Cuidado com o sal! Evite deixar o saleiro na mesa. A porção individual não deve ultrapassar 1 colher de chá por dia (6 g).
- ★ Diminua o consumo de gorduras sólidas como manteiga, margarina dura e banha de porco, bem como os alimentos que as contêm. Faça com que as suas maiores fontes de gordura provenham de peixes, oleaginosas e óleos vegetais.
- ★ Evite o açúcar e alimentos que contenham açúcar!! Substitua o açúcar pelo adoçante de sua preferência.
- ★ Não esqueça de beber bastante água: no mínimo 2 litros por dia.
- ★ Faça alguma atividade física. Ela pode ser sua aliada!

Planeje suas refeições!!

Quando for comer, lembre-se da pirâmide, coma alimentos de todos os grupos. A variedade, o equilíbrio, a moderação e a adequação são fundamentais!

Para melhorar a alimentação e o estilo de vida, inicie com pequenos passos a cada dia.

Faça do seu alimento o seu remédio e assim viva com mais qualidade de vida!

✦ Registro Fotográfico de Adoçantes

Projeto: Avaliação de magnésio em pacientes com *diabetes mellitus* tipo 2

1

Lista de adoçantes

Projeto: Avaliação de magnésio em pacientes com diabetes mellitus tipo 2

2

Lista de adoçantes

✦ Orientações ao Paciente de como Proceder para Coletar as Amostras Biológicas

Projeto: Avaliação de magnésio em pacientes com *diabetes mellitus* tipo 2

FEVEREIRO						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
					1	2
3	4	5 Carnaval	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

MARÇO						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21 Paixão de Cristo	22
23 Páscoa	24	25	26	27	28	29
30	31					

ABRIL						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
		1	2	3 <i>consulta com o médico</i>	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15 <i>coleta de urina</i>	16 <i>coleta de sangue</i>	17	18	19
20	21 Tiradentes	22	23	24	25	26
27	28	29 <i>retorno - receber exames</i>	30			

MAIO						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
				1 Dia do trabalho	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 Corpus Christi	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Se tiver alguma dúvida, procure ajuda de alguém em que confie ou ligue para Cristiane, telefone 84 9451 3866, ou envie e-mail para chsales@usp.br para tentarmos resolver.

Projeto: Avaliação de magnésio em pacientes com *diabetes mellitus* tipo 2

Siga essas orientações para que o seu exame seja fiel ao seu quadro clínico:

- **COMO COLETAR A URINA DE 24 h** (dia anterior à coleta de sangue): ____/____/____

- Depois de acordar, marque a hora que o senhor(a) vai fazer xixi e despreze toda a primeira urina deste dia
- As próximas vezes que fizer xixi, faça no frasco grande da tampa azul, até a hora de dormir
- Se acordar durante a noite para fazer xixi, faça no frasco grande da tampa azul
- Todo o xixi que fizer até o outro dia, na hora que o senhor(a) marcou, deve ser guardado
- No dia da coleta, o primeiro jato da primeira urina deste dia deve ser feito no frasco grande da tampa azul, e todo o resto da primeira urina nos frascos pequenos.

ATENÇÃO: O frasco com a urina deve ser guardado na geladeira, com cuidado para não contaminá-la, até o momento que o senhor(a) for para o laboratório.

- **ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE SANGUE:** ____/____/____

- Fazer jejum no mínimo de 12 h e no máximo de 14 h para podermos coletar o seu sangue
- Neste intervalo das 12 horas só é permitido beber água, ou seja, se for fazer o exame às 7 h da manhã, a partir das 19 h do outro dia só pode beber água.
- Recomenda-se que no dia anterior a coleta de sangue e no dia da coleta de sangue, evite fazer atividades físicas intensas, não mude a sua alimentação e não beba bebidas alcoólicas 72 horas antes da coleta de sangue, porque isso pode alterar os resultados do seu exame.

Como chegar à Faculdade de Farmácia, no Laboratório de Análises Clínicas (LIAC):

Lembrar!

- ir sem comer nada de manhã (em jejum) para fazer o exame de sangue
- levar o frasco com a urina do dia anterior e os potinhos com a primeira urina do dia da coleta de sangue

Se tiver alguma dúvida, procure ajuda de alguém em que confie ou ligue para Cristiane, telefone 84 9451 3866, ou envie e-mail para chsales@usp.br para tentarmos resolver.

✚ Informações da Validação da Metodologia de Magnésio Plasmático

Linearidade

Figura 1M: Média dos pontos da curva padrão elaborados cada um em dez replicatas*

Sensibilidade

Limite de detecção = $3 \times 0,005 \div 1,1704 = 0,013 \text{ mL}/\mu\text{g Mg}$

Limite de quantificação = $10 \times 0,005 \div 1,1704 = 0,043 \text{ mL}/\mu\text{g Mg}$

Precisão

Quadro 1M: Concentração de Mg em *pools* de amostras de plasma

Variáveis	Pool de plasma* ($\mu\text{g Mg/mL}$)		
	1º dia 10 repetições	2º dia 4 repetições	3º dia 4 repetições
μ (repetibilidade intra e inter-ensaio)	0,23	0,23	0,24
σ (repetibilidade intra e inter-ensaio)	0,01	0,01	0,01
Coef. Variação (intra e inter-ensaio)	4,22 %	4,67 %	4,59 %
μ (reprodutibilidade)	0,23		
σ (reprodutibilidade)	0,01		
Coef. Variação (reprodutibilidade)	4,50 %		

* Resultados da leitura direta, sem considerar a diluição das amostras.

Com base nos dados apresentados no Quadro 1M, pode-se inferir que a metodologia em questão gera resultados com variações dentro de limites aceitáveis, com um nível de precisão para a avaliação do Mg plasmático variando de 95 – 96 %.

Exatidão

Figura 2M: Preparo dos padrões adicionados

QUADRO 2M: Recuperação do método de análise de Mg em amostras de plasma

Padrão adicionado	Concentração do pool* ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	Concentração adicionada ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	Concentração obtida* ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	Concentração recuperada ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	% de recuperação
1	0,037	0,000	0,033	-0,004	-
2	0,037	0,118	0,144	0,111	94,20 %
3	0,037	0,255	0,259	0,226	88,19 %
4	0,037	0,381	0,365	0,332	87,00 %
μ					89,83 %
σ					3,84
Coef. variação					4,28 %

* Os valores apresentados correspondem à média obtida de 10 repetições de cada diluição.

- Concentração (pool de plasma) = $0,186 \pm 0,010 \mu\text{g Mg/tubo}$

FIGURA 3M: Comparação entre as curvas do padrão e a do padrão adicionado

A partir dos ensaios de recuperação feitos no *pool* de plasma (Quadro 2M), verificou-se uma exatidão de 90 % para a metodologia de Mg plasmático. Com base na massa obtida (*m*) (Figura 3M), pode-se inferir que as leituras do plasma têm um grau de exatidão de 94 %.

✚ Informações da Validação da Metodologia de Magnésio Urinário

Linearidade

FIGURA 1N: Média dos pontos da curva padrão elaborados cada um em dez replicatas*

Sensibilidade

Limite de detecção = $3 \times 0,005 \div 1,1704 = 0,013 \text{ mL}/\mu\text{g Mg}$

Limite de quantificação = $10 \times 0,005 \div 1,1704 = 0,043 \text{ mL}/\mu\text{g Mg}$

Precisão

Quadro 1N: Concentração de Mg em *pools* de amostras de urina

Variáveis	Pool de urina* ($\mu\text{g Mg/mL}$)		
	1º dia 10 repetições	2º dia 4 repetições	3º dia 4 repetições
μ (repetibilidade intra e inter-ensaio)	0,33	0,30	0,31
σ (repetibilidade intra e inter-ensaio)	0,03	0,01	0,00
Coef. Variação (intra e inter-ensaio)	7,83 %	2,30 %	0,96 %
μ (reprodutibilidade)	0,32		
σ (reprodutibilidade)	0,02		
Coef. Variação (reprodutibilidade)	7,03 %		

* Resultados da leitura direta, sem considerar a diluição das amostras.

Com base nos dados apresentados no Quadro 1N, pode-se inferir que a metodologia em questão gera resultados com variações dentro de limites aceitáveis, com um nível de precisão para a avaliação do Mg urinário variando de 90 – 99 %.

Exatidão

Figura 2N: Preparo dos padrões adicionados

QUADRO 2N: Recuperação do método de análise de Mg em amostras de urina

Padrão adicionado	Concentração do pool* ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	Concentração adicionada ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	Concentração obtida* ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	Concentração recuperada ($\mu\text{g Mg/tubo}$)	% de recuperação
1	0,054	0,000	0,061	0,007	-
2	0,054	0,118	0,171	0,117	93,48 %
3	0,054	0,255	0,272	0,218	82,61 %
4	0,054	0,381	0,379	0,325	83,41 %
μ					86,50 %
σ					6,06
Coef. variação					7,00 %

* Os valores apresentados correspondem à média obtida de 10 repetições de cada diluição.

- Concentração (pool de urina) = $0,270 \pm 0,021 \mu\text{g Mg/tubo}$

FIGURA 3N: Comparação entre as curvas do padrão e a do padrão adicionado

A partir dos ensaios de recuperação feitos no *pool* de urina (Quadro 2N), verificou-se uma exatidão de 87 % para a metodologia de Mg urinário. Com base na massa obtida (*m*) (Figura 3N), pode-se inferir que as leituras de urina têm um grau de exatidão de 70 %.

✚ Informações da Validação da Metodologia de Magnésio Eritrocitário

Linearidade

FIGURA 10: Média dos pontos da curva padrão elaborados cada um em dez replicatas*

Sensibilidade

Limite de detecção = $3 \times 0,001 \div 0,9632 = 0,002 \text{ mL}/\mu\text{g Mg}$

Limite de quantificação = $10 \times 0,001 \div 0,9632 = 0,007 \text{ mL}/\mu\text{g Mg}$

Precisão

Quadro 10: Concentração de Mg em *pools* de amostras de eritrócito

Variáveis	Pool de eritrócitos* ($\mu\text{g Mg/mL}$)		
	1º dia 5 repetições	2º dia 10 repetições	3º dia 10 repetições
μ (repetibilidade intra e inter-ensaio)	0,38	0,36	0,37
σ (repetibilidade intra e inter-ensaio)	0,02	0,02	0,01
Coef. Variação (intra e inter-ensaio)	4,50 %	4,48 %	3,18 %
μ (reprodutibilidade)	0,37		
σ (reprodutibilidade)	0,01		
Coef. Variação (reprodutibilidade)	3,22 %		

* Resultados da leitura direta, sem considerar a diluição das amostras.

Com base nos dados apresentados no Quadro 10, pode-se inferir que a metodologia em questão gera resultados com variações dentro de limites aceitáveis, com um nível de precisão para a avaliação do Mg eritrocitário variando de 96 – 97 %.

Não foi possível verificar a exatidão por meio da adição de padrões, uma vez que para construir a curva são necessários valores que excedem a concentração máxima para o

comprimento de onda utilizado, e o uso de um comprimento de onda maior não é tão sensível para a detecção de concentrações baixas.

Tabela 1 - Frequência (Fr) de adesão de pacientes diabéticos ao estudo

PACIENTES	Fr ESPERADO	Fr OBTIDO	Fr (%)
aptos de acordo com o prontuário do hospital	-	84	100,0
ausentes na consulta com o médico	-	9	10,7
assinaram TCLE	75	60	80,0
compareceram no dia da coleta de sangue	60	51	85,0
compareceram no retorno	51	48	94,1

Dos indivíduos aptos, alguns não aderiram por questões de desencontros na comunicação durante a saída da consulta com os endocrinologistas e o atendimento para convite oficial com o pesquisador responsável. Desta forma, apesar de identificados, considerou-se o fato como recusa do paciente.

✚ **Informações para os membros de bancas julgadoras de Mestrado/Doutorado**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Secretaria de Pós-Graduação

**Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de
Mestrado/Doutorado**

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração máxima de trinta minutos.

2. Os membros da banca farão a arguição oral. Cada examinador disporá, no máximo, de trinta minutos para arguir o candidato, exclusivamente sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua resposta.

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é facultada a arguição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador.

3. A sessão de defesa será aberta ao público.

4. Terminada a arguição por todos os membros da banca, a mesma se reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na arguição.

4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado na ata.

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por unanimidade ou pela maioria da banca.

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621.

São Paulo, 18 de março de 2005.

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco
Presidente da CPG/FCF/USP