UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Programa de Pós-Graduação em Farmácia
Área de Análises Clínicas

Transcriptoma e proteoma em sangue periférico na busca de novos
marcadores de doenças cardiovasculares

Vivian Nogueira Silbiger

Tese para obtenção do grau de
DOUTOR

Orientador:
Prof. Tit. Mario Hiroyuki Hirata

São Paulo
2010

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Programa de Pós-Graduação em Farmácia
Área de Análises Clínicas

Transcriptoma e proteoma em sangue periférico na busca de novos
marcadores de doenças cardiovasculares

Vivian Nogueira Silbiger

Tese para obtenção do grau de
DOUTOR

Orientador:
Prof. Tit. Mario Hiroyuki Hirata

São Paulo
2010

Vivian Nogueira Silbiger

Transcriptoma e proteoma em sangue periférico na busca de novos
marcadores de doenças cardiovasculares. Estudo em infarto agudo
do miocárdio

Comissão Julgadora
da
Tese para obtenção do grau de Doutor

Prof. Tit. Mario Hiroyuki Hirata
orientador/presidente

1º. examinador

2º. examinador

3º. examinador

4º. examinador

São Paulo, _____ de _____.

*Aos meus pais, pelo apoio incondicional em todos os momentos de minha vida.
Ao meu esposo, André Ducati Luchessi, pelo amor, respeito e compreensão, que foram
fundamentais para a realização deste trabalho e que me incentivam, a cada dia, na
busca por nossos sonhos e realizações.*

AGRADECIMENTOS

*A Deus, por sempre colocar pessoas especiais
na minha vida e guiar meu caminho.*

Ao meu orientador e amigo, Prof. Tit. Mario Hiroyuki Hirata, pela oportunidade de desenvolver este projeto e por sua orientação, que foi muito além dos estudos científicos da minha tese. Certamente aprendemos muito um com outro e, hoje, agradeço pela paciência que teve comigo. Como um pai, realmente me ensinou a crescer enquanto pesquisadora e pessoa. Muito obrigada.

À Profa. Assoc. Rosário Dominguez Crespo Hirata, pelo apoio durante a vida acadêmica e pelas críticas e sugestões no desenvolvimento deste projeto. Agradeço também pelo carinho e pela amizade aqui construída.

Aos amigos e colaboradores Lídio G. L. Neto e Carla Pastorelli, pelas horas de plantão em busca de amostras, e Débora Cavichioli, pelas infindáveis “reações em tempo real” para finalizar a tese.

À Cristina Moreno Fajardo, técnica do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico da FCF/USP, que, além do excelente apoio técnico, sempre nos relembra do amor de Deus para com seus filhos.

À Profa. Elvira Guerra, que compartilhou a amizade, o carinho e os sábios conselhos durante minha trajetória. Os momentos vividos em *Oxford* estão guardados para sempre no meu coração.

Aos demais amigos e colegas do Laboratório de Biologia Molecular aplicada ao Diagnóstico do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (USP).

À Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em nome do seu diretor, Prof. Tit. Jorge Mancini Filho, pela oportunidade de realização do curso de doutorado.

Ao Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas dessa mesma instituição, em nome do seu chefe, Prof^a. Dulcinéia Saes Parra Abdalla,.

À Profa. Primavera Borelli, coordenadora do programa de Pós-Graduação em Farmácia – Área de Análises Clínicas do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

Al Prof. Catedrático Ángel María Carracedo Álvarez, que, además de abrir las puertas de su laboratorio desde mi iniciación científica, siempre me ha incentivado y ha creído en mi carrera profesional. Gracias también por la estancia de movilidad en el extranjero en la Universidad de Santiago de Compostela y la estancia en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, oportunidades éstas que contribuyeron mucho al desarrollo de mi proyecto y a mi crecimiento científico y personal.

Al Prof. Dr. Joaquín Dopazo, por la estancia en su laboratorio de bioinformática del Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, España, una oportunidad que aportó mucho a mi tesis doctoral.

A los investigadores y amigos del Centro de Investigación Príncipe Felipe, por toda la amable hospitalidad con la que me recibieron, en especial a mis amigos matemáticos Francisco García y David Monteiro, que tanto me ayudaron con mi aprendizaje en el área de procesamiento de los datos de array.

A los investigadores del Centro Nacional de Genotipado (CeGen) España, Dra. María Brión e Inés Quintela, que, además de toda la ayuda técnica y científica para el desarrollo de la tesis, fueron siempre muy amables y amigas.

Al Prof. Dr. Anxo Vidal, de la Universidad de Santiago de Compostela, España, que puso a disposición sus ordenadores y el programa de bioinformática Partek.

Ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo, em nome da sua diretora, Dra. Amanda G. M. R. Sousa, pelo acesso à instituição e pela confiança.

Aos médicos Dr. Marcelo Sampaio, Dra. Elizabete dos Santos, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rui Ramos, Dr. Álvaro Avezum e Dr. Dikran Armaganijan, colaboradores do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo, pela dedicação na seleção de pacientes a serem por mim analisados e pelo cuidados a eles prestados.

Aos pacientes que contribuíram anonimamente para este estudo, sem os quais este trabalho não teria sido construído, meus sinceros agradecimentos.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pela bolsa concedida (Proc. 142857/2006-8) entre novembro de 2006 e maio de 2007.

À Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, pela bolsa e reserva técnica concedidas (Proc. 2006/03513-5) entre julho de 2007 e maio de 2010, tornando possíveis a realização deste trabalho e a participação em importantes reuniões científicas.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela bolsa concedida (Proc. BEX5180/06-6) entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009, possibilitando a realização do estágio na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha.

Aos meus pais, Helcy Lylian Nogueira Silbiger e Reynado Silbiger, à minha irmã, Lara Silbiger, e ao meu cunhado, Óscar Curros, por sempre estarem presentes em todos os momentos, me apoiando e incentivando, independente de onde eu esteja. Vocês foram muito mais que família, foram pequenos orientadores super profissionais!

A minha pequena sobrina, Sophie, pelos momentos de alegria e descontração no corre-corre do dia-a-dia.

Ao amor, meu amigo, meu companheiro de trabalho, meu pesquisador favorito, meu esposo, André Ducati Luchessi. Não há palavras que possam expressar minha gratidão a ele, que prestou o apoio fundamental para a execução deste projeto e é a peça essencial da minha vida.

RESUMO

Silbiger VN. *Transcriptoma e proteoma em sangue periférico para pesquisa de novos marcadores de doenças cardiovasculares* [tese].

INTRODUÇÃO: A principal manifestação clínica da doença aterosclerótica é o infarto agudo do miocárdio, caracterizada como emergência médica, que necessita de diagnóstico correto, rápido, preciso e terapia eficaz. Os estudos de transcriptoma e proteoma possibilitam obter informações que nos permite compreender de forma mais abrangente a evolução fisiopatológica das doenças, sendo as cardiovasculares particularmente favorecidas por terem etiologia multifatorial e sem dúvida multigênica, portanto a utilização destas ferramentas num modelo de doença aguda pode auxiliar, de forma singular, na obtenção de novas informações, tais como novos marcadores precoces de injúria. **OBJETIVO:** Identificar novos biomarcadores de doenças cardiovasculares através da análise do perfil de expressão de RNAm de células do sangue periférico e proteínas plasmáticas de pacientes com SCA. **CASUÍSTICA E MÉTODOS:** É um estudo caso-controle de pacientes com SCA recrutados no Pronto-Socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Foram recrutados 84 indivíduos com Síndrome Coronariana Aguda (SCA), 47 indivíduos sem doença cardiovascular (grupo controle), de ambos os sexos com idade entre 30 a 65 anos, atendidos no Instituto Dante Pazzanese do Estado de São Paulo - Brasil. A avaliação de expressão gênica global de 10 pacientes e 6 controles (pareados) durante as primeiras 48 h após o IAM foi realizada através dos microarranjos de DNA (sistema *Affymetrix*) e a análise de plasma por separação em sistema de microarranjos (*ProteinChip*®), seguida da identificação e quantificação por espectrometria de massa, em sistema *SELDI-TOF/MS*. Os resultados de microarranjo de DNA foram validados tecnicamente (a partir das mesmas amostras processadas por microarranjo de DNA) e, posteriormente validados biologicamente (a partir das outras amostras não processadas por microarranjo de DNA) através da PCR em tempo real. **RESULTADOS:** Foram observados ao total 599 genes diferentemente expressos nas primeiras 48 h após IAM. Trinta e três genes foram selecionados e submetidos à validação técnica, sendo que destes, 20 genes foram submetidos à validação biológica através da PCR em tempo real. Os validados foram: ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECDHC3, KCNE1, IL18R1, IRS2, MYL4, MMP9 e TREML4. Na análise, foram identificados 479 espectros de

proteínas plasmáticas diferentemente expressos em relação ao controle, destes destacam-se 16 possíveis proteínas correspondentes ao peso molecular entre 6386,5 Da e 17807,7 Da. **CONCLUSÃO:** Os resultados desses estudos sugerem novos marcadores para avaliação da síndrome coronariana aguda e provavelmente com valor prognóstico importante.

Palavras-chave: Síndrome coronária aguda. Biomarcadores, SELDI-TOF/M. Microarranjo de DNA. PCR em tempo real.

ABSTRACT

Silbiger VN. Transcriptomic and proteomic of peripheral blood as approaches to biomarkers cardiovascular discovers.

BACKGROUND: The main clinical manifestation of atherosclerosis is the acute myocardial infarction (AMI), which is a medical emergency that requires prompt diagnosis and efficient therapy. The transcriptomic and proteomic approaches are both powerful tools for the study of AMI and may be instrumental to identify new biomarkers involved in the inflammatory and apoptotic process of cardiovascular diseases. **OBJECTIVE:** The aim of this study is to determine the gene expression of RNA and protein in blood cells following an AMI to identify new biomarkers. **PATIENTS AND METHODS:** For this study eighty four patients with acute coronary syndrome (ACS) and forty seven control individuals were selected among patients of the Instituto Dante Pazzanese, São Paulo state, Brazil. A global gene expression profile by *GeneChip® Exon 1.0 ST Array (Affymetrix)* and proteomic plasma profile by *ProteinChip® Biomarker System* and *SELDI-TOF/MS* were evaluated for ten patients from the ACS group and six from the control group. These patients were followed up for the first 48 h following the AMI. The genes differently expressed by microarray analysis were submitted to technical (same casuistic) and biologic (new casuistic) validation by PCR real time. **RESULTS:** 599 genes were differentially expressed at the first 48 h after AMI. Thirty-three genes were selected and submitted to the technical validation, and 20 were subjected to biological validation by real time PCR afterwards. The validated ones were: ALOX15, Areg, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECDHC3, KCNE1, IL18R1, IRS2, MYL4, MMP9 and TREML4. At proteomic analysis, 479 peaks of plasma proteins differentially expressed were identified. 16 peaks were considered as high potentially biomarkers. Their molecular weight was between 6386.5 Da and 17807.7 Da. **CONCLUSION:** Results from this study were able to identify changes in gene and protein profiles in the plasma, and suggest new markers for evaluation of acute coronary syndrome and probably with important prognostic value.

Descriptors: Acute myocardial infarction. Transcriptomic. Proteomic

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

	página
Figura 1. Representação esquematizada do protocolo de colheita de sangue periférico para o grupo IAM com SST e controle.....	46
Figura 2. Perfil eletroforético obtido através do <i>Bioanalyzer</i> de amostra de RNA total concentrado.....	49
Figura 3. Fluxo de atividade para análise em microarranjo de DNA.....	50
Figura 4. Perfil eletroforético obtido através do <i>Bioanalyzer</i> , após depleção de RNAr.....	52
Figura 5. Perfis eletroforéticos obtidos através do <i>Bioanalyzer</i> da reação de fragmentação da ss-DNA.....	55
Figura 6. Estrutura molecular da <i>Biotin Allonamide Triphosphate – DNA Labeling Reagent</i>	55
Figura 7. Perfil eletroforético da ss-DNA fragmentada e marcada com biotina e tratada com avidina.....	56
Figura 8. Imagens obtidas de um microarranjo <i>GeneChip® Exon 1.0 ST</i> , após leitura no <i>GeneChip® Scanner 3000 7G</i>	58
Figura 9. Esquema do fluxo de processamento do plasma para análise proteômica através do SELDI-TOF/MS.....	67
Figura 10. Distribuição em gráfico <i>BoxPlot</i> das intensidades das sondas em escala logarítmica (eixo Y) por amostras (eixo X).....	76
Figura 11. Distribuição gráfica das intensidades das sondas em escala logarítmica (eixo Y) dos <i>Bac spikes Controls</i> por amostras (eixo X).....	77
Figura 12. Distribuição gráfica das intensidades das sondas em escala logarítmica (eixo Y) dos <i>Poly spikes Controls</i> por amostras (eixo X).	77
Figura 13. Análise de componente principal representado em tridimensão dos dados normalizados pelo método RMA.....	78
Figura 14. Histograma das intensidades dos sinais antes (A) e após a aplicação da sequência de filtros: <i>Setting to 0 log2 intensity below, Filtering by IQR e Filtering on DABG p-value</i>	79
Figura 15. Diagrama de Venn dos genes diferentemente expressos em 1º IAM com SST e os demais tempos de colheita.....	82
Figura 16. Diagrama de <i>Venn</i> dos genes diferentemente expressos em 1º IAM	

com SST e 2º IAM com SST.....	85
Figura 17. Perfis de expressão dos genes ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECHDC3, IL18R1, IRS2, KCNE1, MMP9, MYL4 e TREML4 do GC e durante os tempos de segmento investigados nos subgrupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.....	95-99
Figura 18. Representação gráfica na forma de caixa dos valores de expressão dos genes ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECHDC3, IL18R1, IRS2, KCNE1, MMP9, MYL4 e TREML4 divididos em GC, Angina instável, IAM sem SST e IAM com SS.....	100-101
Figura 19. Agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana das proteínas diferentemente expressas em 1º IAM com SST T ₀	104
Figura 20. Agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana das proteínas diferentemente expressas em 2º IAM com SST T ₀	106
Figura 21. Diagrama de <i>Venn</i> entre os resultados de expressão proteica de 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.....	108
Figura 22. Análise de componente principal em terceira dimensão das 16 possíveis proteínas em IAM com SST.....	109
Figura 23. Perfil por <i>Fold Change</i> em relação ao tempo das proteínas diferentemente expressas comuns entre a primeira colheita para 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.....	110
Figura 24. Figura esquemática das relações diretas e indiretas dos genes diferentemente expressos em pacientes com SCA.....	121

ÍNDICE DE TABELAS

página

Tabela 1. Código identificador do conjunto de iniciadores e sondas fornecidos pelo serviço “ <i>Assay by design</i> ” (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).....	65
Tabela 2. Características clínicas, variáveis antropométricas, perfil lipídico, bioquímicos e hematológicos dos grupos 1º IAM com SST, 2º IAM com SST e controle.....	72
Tabela 3. Características clínicas, variáveis antropométricas, perfil lipídico, bioquímicos e hematológicos dos grupos 1º SCA, 2º SCA e controle para validação biológica.....	73
Tabela 4. Concentrações dos marcadores cardíacos cTnI, CK e CK-MB e PC-R observados nos pacientes com IAM com SST com e sem infarto prévio.....	74
Tabela 5. Número absoluto da distribuição de amostras processadas e selecionadas, após avaliação dos controles de qualidade para os grupos 1º IAM com SST, 2º IAM com SST e controle.....	79
Tabela 6. Genes diferencialmente expressos no grupo 1º IAM com SST T ₀	81
Tabela 7. Representação dos 29 genes diferencialmente expressos em 1º IAM com SST T ₀ em relação às demais 48 h avaliadas após IAM.....	83
Tabela 8. Genes diferencialmente expressos em relação ao grupo 2º IAM com SST T ₀	84
Tabela 9. Representação dos 8 genes diferencialmente expressos em 2º IAM com SST T ₀ em relação às demais 48 h avaliadas após IAM.....	85
Tabela 10. Lista dos 25 genes diferencialmente expressos comuns entre os pacientes dos grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.....	86
Tabela 11. Representação dos 25 genes diferencialmente expressos em 1º IAM com SST e 2º IAM com SST em relação às demais 48 h avaliadas após IAM.....	87
Tabela 12. Seleção dos genes de referência para validação técnica pela PCR em tempo, ordenados pela intensidade de expressão logarítmica da população estudada.....	89

Tabela 13. Correlação de <i>Spearman</i> para os resultados de expressão gênica obtida pela técnica de microarranjo de DNA e PCR em tempo real.....	90
Tabela 14. Resultados da expressão gênica diferencial, pela PCR em tempo real, dos genes selecionados pela validação biológica a partir dos grupos 1º SCA, 2º SCA e controle.....	92
Tabela 15. Espectros de proteínas diferentemente expressas comuns entre a primeira colheita para 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.....	109

ANEXO D

Tabela 1. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T2 versus GC.....	158
Tabela 2. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T12 versus GC.....	174
Tabela 3. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T24 versus GC.....	179
Tabela 4. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T36 versus GC.....	179
Tabela 5. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T48 versus GC.....	181
Tabela 6. Genes diferencialmente expressos entre 2º IAM versus GC.....	183
Tabela 7. Genes validados listados de acordo com Localização cromossômica, celular, tipo e funções e doenças associadas.....	187

ANEXO E

Tabela 1. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T ₀ vs GC.....	193
Tabela 2. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T ₂ vs GC.....	194
Tabela 3. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T ₁₂ vs GC....	196
Tabela 4. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T ₂₄ vs GC....	202
Tabela 5. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T ₃₆ vs GC....	204
Tabela 6. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T ₄₈ vs GC....	205
Tabela 7. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 2º IAM versus GC....	208

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

%	Porcentagem
<	Menor
=	Igual
>	Maior
±	Mais ou menos
Δ	Delta
∩	Intersecção
≥	Maior ou igual
μg	Micrograma
13-HODE	13 - ácido hidroxiocetadecadienoico
1º IAM	Primeiro infarto agudo do miocárdio
2º IAM	Segundo infarto agudo do miocárdio
3'	Três linha
5'	Cinco linha
ABCA1	<i>ATP-binding cassette transporter A1</i>
ACC	Número de acesso do gene no banco de dados públicos do NCBI
HETE	Ácido hidroxi-eicosatetranoico
ADORA3	<i>Adenosine A3 receptor</i>
AffyID	Número identificador da Affymetrix
ALOX15	Arachidonate 15-lipoxygenase
ALT	Alanina aminotransferase
APE1	AP-endonuclease
AREG	<i>Amphiregulin</i>
AST	Aspartato aminotransferase
Bcl-2	<i>B-cell CLL/lymphoma 2</i>
BCL2A1	<i>BCL2-related protein A1</i>
BCL2L1	<i>BCL2-like 1</i>
Bcl-xl	<i>BCL2-like 1</i>
Bfl.1(A1)	<i>BCL2-related protein A1</i>
pb	Pares de base
CA1	<i>carbonic anhydrase I</i>
cDNA	Ácido desoxiribonucleico complementar

CeGen	Centro Nacional de Genotipado
CK	Creatinoquinase
CK-MB	Creatinoquinase fração MB
COX7B	Cytochrome c oxidase subunit VIIb
CREM	cAMP responsive element modulator
cRNA	Ácido ribonucleico complementar
CSF1	colony stimulating factor 1
C _T	Ciclo da linha de conte
cTnI	Troponina I
CytoBand	Banda citogenética
Da	Dalton
DABG	<i>Detection above background</i>
DC	Doença Cardiovascular
DHA	Ácido docosa-hexaenóico
DNA	Ácido desoxirribonucleico
dNTPs	Desoxirribonucleotídeo fosfato
dTTP	desoxiTimidina Trifosfatada
dUTP	desoxiUracila Trifosfatada
ECG	Eletrcardiograma
<i>ECHDC3</i>	<i>enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3</i>
<i>EDTA</i>	ácido etilenodiamino tetra-acético
FAM	Fluoróforo 6-carboxifluoresceína
FC	<i>Fold change</i>
FDR	<i>False discover rate</i>
FOLR3	folate receptor 3 (gamma)
g	Gramos
g	Gravidade
GAPDHS	<i>Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase</i>
GC	Grupo controle
GPX3	glutathione peroxidase 3 (plasma)
GSTM1	glutathione S-transferase mu 1
H	Horas
HCl	Ácido clorídrico
HDL	Lipoproteína de alta densidade

HUGO	<i>Human Genome Organization</i>
HUPO PPP	<i>Human Genome Organization – plasm protein project</i>
IAM	Infarto agudo do miocárdio
IAM com SST	Infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST
IAM sem SST	Infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST
IDPC	Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
IECA	Inibidor da enzima conversora de angiotensina
IL18R1	<i>Interleukin 18 receptor 1</i>
IL1R1	<i>Interleukin 1 receptor, type 1</i>
IL1RL1	<i>Interleukin 1 receptor-like 1</i>
IL-1 β	<i>Interleukin 1 beta</i>
IL5RA	<i>Interleukin 5 receptor, alpha</i>
IL-6	<i>Interleukin 6</i>
IL-8	<i>Interleukin 8</i>
ILK	<i>Integrin liked kinase</i>
ILR18	<i>Interleukin 18 receptor</i>
IMC	Índice de massa corporal
IPA	<i>Ingenuity path analisys</i>
IRS2	<i>Insulin receptor substrate 2</i>
iterPLIER	<i>Iterative Probe Logarithmic Intensity Error</i>
KCNE1	<i>Voltage-gated channel, Isk-related family, member 1</i>
Kg/m ²	Quilograma por metro quadrado
LDL	Lipoproteína de baixa densidade
LIMMA	Modelo linear para dados de microarranjos de DNA
log2	Logaritmo na base 2
LOX	<i>Lysyl oxidase</i>
LOX12	<i>Lipoxygenase</i>
LPS	Lipopolissacarídeos
M	Molar
M	Metros
MALDI-TOF/MS	Matrix-assisted laser desorption/ionization acoplado ao espectrometro de massa
MCP-1	Chemokine (C-C motif) ligand 2
mg/L	Miligramas por litro

mg/dL	Miligramas por decilitro
mg/ml	Miligramas por mililitro
MgCl ₂	Cloreto de magnésio
Min	Minuto
mL	Mililitro
mm	Milímetro
mM	Milimolar
mM/L	Milimolar por litro
mmHg	Milímetro de mercúrio
mmol/L	Milimol por litro
MMP9	<i>Matrix metalloproteinase 9</i>
MYL4	<i>Myosin, light polypeptide 4</i>
MYO5C	<i>Myosin VC</i>
NCBI	<i>National Center of Biotechnology Information</i>
n°	Número
ng	Nanogramas
nm	Nanômetros
°	Grau
°C	Graus Celsius
p	p-valor
PBMC	Células mononucleares do sangue periférico
PBS	Tampão salino fosfato
PCA-3D	Análise de componentes principais em três dimensões
PCR	Reação em cadeia da polimerase
PCRu	Proteína C reativa ultra sensível
PER1	<i>Period homolog 1 (Drosophila)</i>
pH	Logaritmo negativo na base 10 da concentração de hidrogênio
PM	Massa molecular
POLE2	<i>Polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)</i>
<i>r</i>	coeficiente de regressão
RIN	Número de integridade de RNA
RMA	<i>Robust Multi-Array Analysis</i>
RNA	Ácido ribonucleico
RNA _m	Ácido ribonucleico mensageiro

RNAr	Ácido ribonucleico transportador
rpm	Rotação por minuto
SAMSN1	<i>SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals, 1</i>
SELDI-TOF/MS	<i>Surface-enhanced laser desorption/ionization</i> acoplado ao espectrometro de massa
SLC29A1	<i>Solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1</i>
SLITRK4	<i>SLIT and NTRK-like family, member 4</i>
SMPD3	<i>Sphingomyelin phosphodiesterase 3, neutral membrane (neutral sphingomyelinase II)</i>
SRD5A3	<i>Steroid 5 alpha-reductase 3</i>
ss-DNA	Ácido desorribonucleico de fita única
sTWEAK	<i>Soluble tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis</i>
T ₀	Tempo de colheita 0
T12	Tempo de colheita 2
T2	Tempo de colheita 3
T24	Tempo de colheita 4
T36	Tempo de colheita 5
T4 livre	Tiroxina livre
T48	Tempo de colheita 6
TBE	Tampão borato EDTA
THBS1	<i>Thrombospondin 1</i>
TLR4	<i>Toll-like receptor 4</i>
TNF α	<i>Tumor necrosis factor</i>
TREML4	<i>Triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4</i>
TSH	Hormônio estimulante da tireóide
U/L	Unidade por litro
UDG	Uracil DNA glicosilase
UNG	Uracil N- glicosilase
UV	Ultra violeta
V	Volts
VEGF	<i>Vascular endothelial growth factor A</i>
VLDL	Lipoproteína de muito baixa densidade
μ l	Microlitros
χ^2	Teste estatístico de Chi-quadrado

SUMÁRIO

	página
1 INTRODUÇÃO	31
2 OBJETIVO	40
2.1 Objetivos específicos	40
3 MATERIAL E MÉTODOS	41
3.1 CASUÍSTICA	41
3.1.1 Características do grupo IAM com SST	41
3.1.2 Características do grupo controle	42
3.1.3 Características do grupo SCA para validação biológica	42
3.1.4 Características do grupo controle para validação biológica	43
3.1.5 Critérios de exclusão	43
3.1.6 Variáveis analisadas	43
3.2 OBTENÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS	45
3.3 DETERMINAÇÕES LABORATORIAIS	46
3.4 ANÁLISE DESCRITIVA	46
3.5 ANÁLISE INFERENCIAL	47
3.6 ANÁLISE TRANSCRIPTÔMICA	47
3.6.1 Extração do RNA total das células presentes no sangue periférico	47
3.6.2 Processamento das amostras para hibridização em microarranjo e DNA	49
3.6.2.1 Adição de controles exógenos e depleção de RNAr	51
3.6.2.2 Primeira etapa, síntese do cDNA	52
3.6.2.3 Síntese e quantificação do cRNA	53
3.6.2.4 Segunda etapa, síntese da ss-DNA	53
3.6.2.5 Hidrólise do cRNA, purificação e quantificação da ss-DNA	54
3.6.2.6 Fragmentação da ss-DNA	54
3.6.2.7 Marcação da ss-DNA fragmentadas	55
3.6.2.8 Hibridização	56
3.6.2.9 Lavagem e coloração	57
3.6.2.10 Leitura - GeneChip® Scanner 3000 7G	57
3.6.3 Processamento dos dados de microarranjo de DNA	58
3.6.3.1 Normalização e sumarização dos dados	59
3.6.3.2 Controle de Qualidade	59
3.6.3.3 Filtros	59

3.6.3.4 <i>Análise estatística dos dados de microarranjo de DNA</i>	59
3.6.4 Validação Técnica pela PCR em tempo real	60
3.6.4.1 <i>Seleção de genes-candidatos para validação técnica</i>	60
3.6.4.2 <i>Síntese de cDNA para validação técnica</i>	61
3.6.4.3 <i>Pré-amplificação para validação técnica</i>	61
3.6.4.4 <i>PCR em tempo real e análise estatística para validação técnica</i>	62
3.6.5 Validação Biológica pela PCR em tempo real.....	63
3.7 ANÁLISE PROTEÔMICA	66
3.7.1 Obtenção do plasma.....	66
3.7.2 Purificação do plasma	66
3.7.3. SELDI-TOF/MS processamento e análise estatística.....	67
4 RESULTADOS	69
4.1 CASUÍSTICA	69
4.1.1 Grupo IAM com SST.....	69
4.1.2 Grupo controle.....	69
4.1.3 Grupo SCA para validação biológica.....	69
4.1.4 Grupo controle para validação biológica.....	70
4.1.5 Dados demográficos.....	70
4.1.6 Marcadores cardíacos e PCRu	73
4.2 ANÁLISE TRANSCRIPTÔMICA	75
4.2.1 Preparação dos dados de expressão gênica diferencial por microarranjo de DNA.....	75
4.2.2 Expressão gênica diferencial por microarranjo de DNA.....	80
4.2.2.1 <i>Genes diferentemente expressos em 1º IAM com SST</i>	80
4.2.2.2 <i>Genes diferentemente expressos em 2º IAM com SST</i>	83
4.2.2.3 <i>Intersecção entre os resultados de expressão gênica de 1º IAM com SST e 2º IAM com SST</i>	85
4.2.3 Validação técnica pela PCR em tempo real.....	88
4.2.3.1 <i>Seleção de genes-candidatos para validação técnica</i>	88
4.2.3.2 <i>Resultados da validação técnica pela PCR em tempo real</i>	89
4.2.4 Validação biológica pela PCR em tempo real.....	91
4.3 ANÁLISE PROTEÔMICA	102
4.3.1 Proteínas diferentemente expressas em 1º IAM com SST	102
4.3.2 Proteínas diferentemente expressas em 2º IAM com SST	105

4.3.3 Intersecção entre os resultados protéticos de 1º IAM com SST e	
2º IAM com SST.....	107
5 DISCUSSÃO.....	111
6 CONCLUSÕES	127
REFERÊNCIAS.....	128
APÊNDICES.....	140
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	141
APÊNDICE B – Ficha para colheita de dados individuais do paciente.....	143
ANEXOS.....	144
ANEXO A – Cópia do aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.....	145
ANEXO B– Ficha do Aluno	147
ANEXO C – Currículo Lattes	149
ANEXO D – Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.....	158
ANEXO E – Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.....	193
ANEXO F - Resumo 1.....	211
ANEXO G – Resumo 2.....	212
ANEXO H – Resumo 3.....	213
ANEXO I – Resumo 4.....	214
ANEXO J – Resumo 5.....	215

1 INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares constituem atualmente a principal causa de morte e incapacitação humana no mundo, corresponde a 12,2% do total de obtidos (WHO, 2008). Em 2008, somente no Estado de São Paulo, a mortalidade por doenças do aparelho circulatório foi de 76.469 indivíduos, sendo 24,5% (18.736) decorrentes do infarto agudo do miocárdio (IAM) (DATASUS, 2010).

O IAM reflete a morte celular secundária à isquemia decorrente do desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio, geralmente secundária à redução do fluxo sanguíneo coronário de um segmento do miocárdio, em consequência a ruptura de uma placa de ateroma, rica em gordura e atividade inflamatória (Charakida et al. 2006; Tousoulis et al. 2006). Essa evolução fisiopatológica é caracterizada como emergência médica, que necessita de diagnóstico correto, tratamento rápido e preciso. A maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40%-65% dos casos na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas (Piegas et al. 2009).

Os fatores de risco para a doença arterial coronariana estão bem estabelecidos, como idade avançada, sexo masculino, predisposição familiar, dislipidemia, Diabetes *Mellitus*, hipertensão, síndrome metabólica, estresse, tabagismo, vida sedentária, entre outros (Opie et al. 2006).

As evidências clínicas e experimentais sugerem que a inflamação está presente, desde as fases iniciais da aterosclerose, contribuindo para a formação das placas de ateroma, para sua evolução e complicações, com a Síndrome Coronária Aguda (SCA) (Sampaio et al. 2007). A SCA que inclui angina instável e IAM (com ou sem supradesnivelamento do ST [SST] constitui uma das maiores preocupações da cardiologia clínica.

O modelo vigente que melhor explica a aterosclerose está baseado na hipótese da “resposta a injúria”. A disfunção endotelial é a etapa inicial que facilita a entrada de lípidos e células inflamatórias (monócitos e linfócitos T) na parede arterial. Posteriormente, a secreção de citocinas e fatores de crescimento induzem a migração e proliferação das células musculares lisas, na íntima, que participam decisivamente na formação da placa aterosclerótica. Proteínas do sistema de coagulação e fibrinólise também estão envolvidas na inflamação e trombose, que podem ocasionar na ruptura da placa e oclusão do vaso (Mehta et al. 1998; Sampaio et al. 2007).

A definição clínica de IAM passou por importantes modificações desde a recomendação da Organização Mundial da Saúde (Anonymous 1979; Gillum et al. 1984). Em 2007, uma revisão universal dessa definição foi sugerida, na qual se estabelece o diagnóstico de IAM quando houver aumento característico e diminuição gradual da troponina ou aumento e diminuição mais rápidos de creatinoquinase CK fração MB (CK-MB), com pelo menos um dos seguintes critérios: a) sintomas isquêmicos; b) alterações eletrocardiográficas indicativas de isquemia (elevação, depressão do segmento ST ou BCRE novo); c) desenvolvimento de ondas Q patológicas no eletrocardiograma; ou d) evidência, em exames de imagem, de perda de viabilidade miocárdica ou contratilidade segmentar anormal (Thygesen et al. 2007).

No caso de pacientes admitidos com dor precordial prolongada e apresentando supradesnível do segmento ST ao eletrocardiograma, não são essenciais a dosagem dos marcadores bioquímicos de lesão miocárdica para o seu diagnóstico de IAM com SST. Estudo epidemiológico realizado no Pronto-Socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia relata um total de 36.000 pacientes atendidos em 2003 (média de 3.050 ao mês), com taxa anual de internação hospitalar de 6,2% (2.287 pacientes), desta taxa, 860 (37,6%) pacientes tinham o diagnóstico de SCA, sendo o diagnóstico da alta hospitalar de 78 pacientes com IAM com SST (somente 9%) e 754 com SCA sem SST (87,6%) (dos Santos et al. 2006).

Cerca de 15%-25% dos pacientes não apresentam dor torácica como sintoma predominante sugestivo de isquemia miocárdica aguda (Piegas et al. 2009). Em pacientes com sintomas sugestivos, a elevação do segmento ST tem especificidade de 91% e sensibilidade de 46% para diagnóstico de IAM (Piegas et al. 2009). Contudo, o eletrocardiograma pode ser inespecífico nas primeiras horas, sendo importante avaliar traçados seriados em curto período de tempo (5-10 min), se o paciente permanecer sintomático.

A necrose miocárdica é acompanhada pela liberação de macromoléculas intracelulares e proteínas estruturais no interstício cardíaco, passíveis de detecção na corrente sanguínea periférica, após o infarto. Os mais utilizados, na ordem com que se elevam na circulação são: mioglobina (1 a 4 h), troponinas (2 às 12h) e isoforma MB da creatinoquinase (CK-MB) (3 às 12h) (Kou & Nassisi 2006).

A mioglobina é o primeiro parâmetro a se elevar na circulação, contudo, a confirmação diagnóstica de IAM, com base apenas nesse marcador, só é possível após avaliações em intervalos de tempos distintos após o infarto (Maisel et al. 2006).

Recomenda-se utilizá-la juntamente com outros marcadores cardíacos como a CK-MB e as troponinas (Maisel et al. 2006).

As troponinas estão presentes nos filamentos finos dos músculos estriados, formando um complexo com três polipeptídeos: a troponina C, a troponina I (cTnI) e a troponina T, envolvidas com os mecanismos que regulam o cálcio celular (contração muscular), e são utilizadas como indicadores de necrose celular no IAM (Dolci & Panteghini, 2006). Elas apresentam baixa sensibilidade nas primeiras 10 h (35% dos casos), e aumentam para 89% ao atingir o pico máximo (10 a 28 h) (Achar et al. 2005). Suas concentrações plasmáticas permanecem alteradas na circulação por até duas semanas. Este é um parâmetro importante para o diagnóstico de indivíduos que sofreram pequenas lesões cardíacas e que procuram auxílio médico tardiamente, como é o caso de pacientes diabéticos (Gondim et al. 2003). Entretanto, esses marcadores não são úteis para evidenciar episódios de re-infarto (Rajappa & Sharma 2005).

O CK-MB, presente nos músculos esqueléticos, está envolvido na fosforização reversível da creatina (Rajappa & Sharma 2005). Apresenta baixa sensibilidade nas primeiras 6 h (35% dos casos) e permanece inalterado quando ocorrem pequenas lesões (Achar et al. 2005). A atividade do CK-MB permanece elevada por até 36 h e, diferente das troponinas, permite detectar os casos de re-infarto (Rajappa & Sharma 2005).

Cabe ressaltar que os marcadores de IAM se alteram também em indivíduos com atividade física intensa, com traumas musculares, em pós-operatórios cardíacos e não cardíacos, e em outras condições patológicas (Panteghini 2004; Rajappa & Sharma 2005). As troponinas também se elevam em indivíduos com insuficiência renal, embolia pulmonar, hipotireoidismo, hipertensão e outras doenças (Maisel et al. 2006; Panteghini 2004).

Os peptídeos natriuréticos tipo B e N-terminal-pró-peptídeo natriurético tipo B são proteínas cardíacas que regulam a vasodilatação ventricular. Os aumentos destes peptídeos no plasma têm sido indicados como fatores de risco de mortalidade em pacientes com IAM (Jernberg et al. 2004). Pacientes com angina instável, sem evidência de necrose e com peptídeos natriuréticos tipo B plasmático aumentados, têm maior risco de evoluir para óbito (de Lemos et al. 2001). Entretanto, esses marcadores de prognóstico de IAM, também podem alterar-se em indivíduos com insuficiência renal, doenças tireoideanas, hipertensão, hipercortisolismo e outras condições patológicas que comumente estão envolvidas com IAM (Panteghini 2004).

A proteína C-reativa (PCRu) é um marcador de resposta inflamatória e tem sido indicado como marcador de diagnóstico de IAM (Ridker et al. 2000). Valores elevados de PCRu no plasma foram associados com o risco de ocorrência de episódios agudos de ruptura da placa aterosclerótica e IAM (Jefferson & Topol 2005). Entretanto, a PCRu tem baixa especificidade no diagnóstico, pois está alterada em inúmeros outros tipos de processos inflamatórios (Ridker et al. 2000).

Sendo assim, devido à baixa sensibilidade e especificidade metodológica dos marcadores supracitados, disponíveis até o momento, os investimentos em buscas de novos marcadores, que possam identificar de forma mais específicas e sensíveis o diagnóstico precoce e prognóstico de IAM, devem ser realizados.

As pesquisas genéticas estão direcionadas ao estudo de alterações no ácido desoxirribonucléico (DNA) que, isoladamente ou em conjunto, podem levar às modificações fenotípicas associadas à progressão ou instabilidade da aterosclerose (Wang 2005). Em nosso laboratório realizou-se uma série de estudos, nos quais foram demonstradas associações entre alterações genéticas e hipercolesterolêmicas, hipertensão, doença arterial coronariana e IAM (Forti et al. 2003).

Nestes estudos, observaram-se as relações entre mutações e polimorfismos em genes envolvidos no metabolismo lipídico e outras proteínas, com aumento de risco para DC e alterações de valores de proteínas, lipídios, apolipoproteínas, e lipoproteínas, tais como: apolipoproteína AI (Sorkin et al. 2005); apolipoproteína B (Cavalli et al. 2000; Machado et al. 2001); apolipoproteína E e receptor LDL (Salazar et al. 2002); receptor LDL (Salazar et al. 1999); PPAR γ (Tavares et al. 2005); enzima conversora de angiotensina (Sakuma et al. 2004) e óxido nítrico sintase (eNOS) (Hirata et al. 2002). Estudaram-se também as alterações em genes relacionados com a resposta terapêutica às vastatinas (Guzman et al. 2000; Rodrigues et al. 2005; Sorkin et al. 2005). Revisando a literatura, verificou-se que a natureza e o número de genes envolvidos no desenvolvimento de doença arterial coronariana, não se encontram totalmente elucidados. De acordo com o banco de dados *Cardiovascular Gene Ontology*, atualmente já foram descritos 4.179 genes implicados no processo aterosclerótico, sendo que 245 genes com maior número de citações em trabalhos científicos, envolvidos com função endotelial, coagulação, inflamação e metabolismo lipídico, glicídico e outros processos.

Embora os processos fisiopatológicos de algumas doenças, que envolvem risco cardiovascular, indiquem a participação de poucos genes, como a hipercolesterolêmica

familiar, a maioria das doenças cardiovasculares se manifesta pela interação de múltiplos genes e fatores ambientais que resultam em expressões gênicas (transcritos e proteínas) altamente diversas (Nabel 2003).

Além disso, em condições de estresse, podem ocorrer diferentes padrões de expressão, resultantes de distintas combinações de genes, a ativação e desativação de eventos envolvidos na transcrição e tradução, como processamento diferencial de ácido ribonucleico mensageiro (RNAm; *splicing* alternativo), modificações pós-transducionais e outros (Koizumi 2004). Stanton e colaboradores descreveram que mais de 200 transcritos de um total de 4.000 analisados, foram diferencialmente expressos, em experimentos com tecido muscular de ratos pós-infarto versus controles. A expressão foi monitorada durante 2 a 16 semanas, período em que se observou aumento gradual da expressão de genes ligados a remodelagem celular e metabolismo energético (Stanton et al. 2000).

A expressão diferencial de transcritos, também foi observada em tecido ventricular esquerdo de pacientes com cardiomiopatia idiopática dilatada (Friddle et al. 2000) e hipertrófica, pós-transplante cardíaco (Hwang et al. 2002).

No estudo proteômico com tecido cardíaco pós-infarto induzido em ratos, também foram observadas proteínas distintas em relação ao grupo controle e com diferentes funções, tais como, regulação de processos oxidativos, estrutura do citoesqueleto e sarcoma, metabolismo energético e resposta ao estresse (White et al. 2005). Sendo assim, o IAM é composto por uma alta variabilidade de transcritos e proteínas.

Entretanto, para a avaliação da dinâmica da expressão total do genoma em resposta a mudanças fisiológicas, ambientais, e na evolução da doença cardiovascular, há necessidade de utilizar sistemas de amplo espectros e de alto desempenho (Domon & Aebersold 2006a; Koizumi 2004).

A plataforma de análise de expressão de RNAm, em larga escala por microarranjos de DNA, fornece a “impressão digital” de genes previamente conhecidos e aqueles que estão envolvidos na progressão de doença arterial coronariana (Cook & Rosenzweig 2002; Napoli et al. 2003). Esta tecnologia está fundamentada no princípio da marcação de ácidos nucleicos (DNA, RNAm ou cDNA) e posterior hibridização de alta sensibilidade e especificidade com oligonucleotídeos fixados em superfície sólida (sondas de captura) (Hoheisel 2006). Isso possibilita a análise diferencial de transcritos entre diferentes células (normais e alteradas) e o acompanhamento de mudanças na expressão gênica durante a progressão de doenças, como a doença arterial coronariana.

As diferenças de expressão desses genes são confirmadas pela reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real que tem sido utilizada para validação de ensaios de microarranjos de DNA. A análise dos resultados obtidos possibilita a identificação de genes potencialmente úteis no diagnóstico precoce, no prognóstico e no monitoramento terapêutico após SCA.

A pesquisa vem sendo aplicada em estudos de diversas doenças, como os carcinomas de mama, ovário, próstata, assim como, em linfomas e mielomas (Chatterjee & Zetter 2005); doenças pulmonares, como fibrose pulmonar idiopática, edema pulmonar, asma e outras (Tzouveleakis et al. 2004); Síndrome de Alzheimer (Marcotte et al. 2003); e aterosclerose (Tuomisto & Yla-Herttuala 2005).

A análise, por sua vez, tem vários formatos, sendo a mais versátil, a que permite uma ampla avaliação de proteínas, e a pré-classificação cromatográfica em superfícies sólidas específico-seletivas, seguida de análise por SELDI-TOF/MS [*Surface Enhanced Laser Desorption Ionization (SELDI) Time-of-Flight (TOF) Mass Spectrometry*] (Domon and Aebersold 2006b). Esta metodologia possibilita detectar, espectros de proteínas e peptídeos de baixo peso molecular e em baixas concentrações, que não seriam detectadas através de eletroforese bidimensional, seguida de análise por MALDI-TOF/MS [*Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) Time-of-Flight (TOF) Mass Spectrometry*] (Domon and Aebersold 2006b; Mateos-Caceres et al. 2004). A plataforma de SELDI-TOF/MS permite comparar os perfis protéicos em diversas condições fisiopatológicas, através da indentificação de suas massas moleculares, possibilitando, então o seu isolamento e sequenciamento, a fim de caracterizar novos biomarcadores associados a doenças (Domon and Aebersold 2006b).

Em revisão realizada por Hortion (2006) sobre estudos que utilizaram amostras de soro (18) e plasma humanos (6), demonstrou que mais de 50 peptídeos e proteínas são biomarcadores potenciais em diferentes doenças como alcoolismo (Nomura et al. 2004), câncer de ovário (Kozak et al. 2005; Woong-Shick et al. 2005; Zhang et al. 2004), câncer renal (Tolson et al. 2004), câncer de próstata (Le et al. 2005; Malik et al. 2005), câncer de pâncreas (Koomen et al. 2005) e IAM (Marshall et al. 2003).

Os estudos transcriptômicos e proteômicos, a partir dos tecidos periféricos sanguíneos, especificamente as células mononucleares e o plasma respectivamente, demonstram ser potenciais ferramentas para se detectar marcadores de processo inflamatório vascular e outros indicadores de lesão tecidual, que refletem o dano celular em qualquer parte do organismo (Tang et al. 2003). O sangue periférico fornece

informações sobre o estado do paciente em resposta a estímulos de citocinas e outros fatores solúveis liberados pelo endotélio, fígado, rim, coração, e outros tecidos, durante o processo inflamatório que precede o IAM (Hortin 2006).

A análise de transcriptoma de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) é extremamente promissora na determinação de doenças e no acompanhamento terapêutico, como vem sendo demonstrada em estudos com: lúpus eritematoso sistêmico, leucemia mielóide crônica, carcinoma renal e resposta a algumas drogas (Debey et al. 2006). Também se verificou que padrões de expressão gênica de PBMC, podem ser utilizados para distinguir doenças cerebrais em modelos animais (Tang et al. 2003).

Além disso, sabe-se que células endoteliais progenitoras, exercem papéis importantes na homeostasia vascular (Hill et al. 2003), na neovascularização, na angiogênese (Rabelink et al. 2004) e na regeneração miocárdica, após IAM (Yoon et al. 2005), alterando possivelmente o perfil de transcritos no sangue periférico total. A progressão de lesões e disfunções endoteliais em doença cardiovascular está relacionada com a depleção dessas células e PBMC, que por sua vez, estão relacionadas com o estresse oxidativo, com a atividade do óxido nítrico e outros processos fisiológicos (Dandona et al. 2005).

A análise de PBMC na SCA pode fornecer informações através das alterações de expressão gênica em resposta à lesão do endotélio vascular, desde que estejam envolvidas na fase inicial do processo de reparo tecidual, e com provável diferenciação das células endoteliais progenitoras que podem ser recrutadas neste mecanismo (Wojakowski et al. 2004).

Já a alteração, fornece perfis de proteínas liberadas durante a lesão miocárdica ou que sejam expressas em resposta ao evento fisiopatológico. Em estudo piloto realizado pela *Human Proteome Organization Plasma Proteome Project (HUPO PPP)*, foram identificados cerca de 345 proteínas plasmáticas, possivelmente envolvidas com processos cardiovasculares (Berhane et al. 2005).

O sistema inflamatório consiste de um conjunto de marcadores protéicos, potenciais para o risco de doença arterial coronariana, como a lipoproteína associada à fosfolipase A2 (ativador plaquetário da acetilhidrolase), a interleucina-6 (IL-6), a proteína A plasmática associada à gravidez, os imunomoduladores derivados de plaquetas, as células endoteliais e linfócitos, promotores de síntese de adesão molecular ou quimiotaxia e os ativadores das metaloproteinases (Freedman 2003).

Além da produção de proteínas inflamatórias, outros mecanismos estão envolvidos na SCA, como: a mudança na regulação do ciclo celular, na fosforilação de proteínas, na sinalização célula-célula, no transporte de íon e de elétrons; inibição ou indução da apoptose, entre outros (Reeve et al. 2005).

Em estudo realizado em 2003, os autores relatam que os perfis protéicos de 6 pacientes infartados, obtidos em um único momento durante a internação, foram significativamente distintos aos apresentados por indivíduos saudáveis (Marshall et al. 2003). Os autores sugerem que os peptídeos do sistema complemento C3 e fibrinopeptídeos A, são potenciais indicadores de IAM. Outro trabalho realizado com 11 pacientes infartados e 8 com angina estável, também obtido em um único momento durante a internação, sugerem que as isoformas da cadeia gama do fibrinogênio, isoformas de alfa-antitripsina, isoformas de apolipoproteínas A-I e a cadeia pesada da γ -imunoglobulina, foram diferentemente expressas, quando comparadas com o grupo controle (Mateos-Caceres et al. 2004).

No entanto, estes estudos não mostraram o seguimento pós-conduta clínica e terapêutica. O monitoramento do curso do processo através do estudo transcriptômico e proteômico é de grande valia (Wang 2005), pois permite averiguar a cinética (meia-vida) e a potencialidade dos possíveis biomarcadores identificados; compreender melhor a resposta celular desencadeada pela SCA; avaliar a eficácia da intervenção coronariana percutânea e a resposta à terapia farmacológica dos pacientes.

A revisão realizada por Marcotte e colaboradores demonstrou que a correlação entre as análises de expressão de RNAm, de genes relacionados com a neuroinflamação e apoptose no tecido hipotalâmico e de outras regiões cerebrais, com as proteínas do líquido cefalorraquidiano, contribui de forma marcante para a compreensão do sistema neural, em condições normais e na presença da doença de Alzheimer (Marcotte et al. 2003). Relação similar foi observada em estudos de biomarcadores oncogênicos com diferentes tecidos neoplásicos (próstata, ovário e mama) e fluídos corpóreos (plasma, soro e urina) (Chatterjeed & Zetter 2005).

Além da busca de biomarcadores no diagnóstico e prognóstico mais precoce da SCA através dos estudos transcriptômicos e proteômicos, acredita-se que os resultados contribuam para o conhecimento dos mecanismos envolvidos na lesão e reparo tecidual.

Em trabalho de Tomic e colaboradores (2005), que teve como objetivo principal comparar pacientes submetidos à revascularização miocárdica, com ou sem circulação extracorpórea, investigou-se a expressão em leucócitos e o perfil de proteínas

plasmáticas mediadoras, exclusivamente do sistema inflamatório. As amostras foram colhidas em períodos distintos: antes da cirurgia, após 4 e 24 h, estabelecendo os mecanismos de respostas e relações entre concentrações protéicas e transcritos. Dessa forma, averigou-se que os leucócitos dos pacientes submetidos às cirurgias com circulação extracorpórea, expressam mais fatores de adesão e sinalização [molécula de adesão intercelular 2, interleucina 1, interleucina 8, receptor de interleucina 18 (ILR18) e receptores de *toll-like* 4 (TLR4), 5 e 6], em resposta às proteínas circulantes [fator de necrose tumoral α , IL-6, interleucina 10, interferon γ , fator de estimulação de colônias de granulócitos, proteína-1 de quimiotaxia a monócitos e proteína 1 β de macrófagos] do que os sem circulação extracorpórea, conseqüentemente, promovem maior resposta inflamatória, que é prejudicial ao indivíduo (Tomic et al. 2005). Por fim, concluiu que para a melhor compreensão do evento fisiopatológico, há necessidade se realizar outros estudos transcriptômicos e proteômicos concomitantemente (Tomic et al. 2005).

Além disso, outros estudos demonstram que a expressão gênica das células endoteliais progenitoras pode alterar o perfil de transcritos nas análises do sangue periférico, uma vez que também estão envolvidas no reparo e remodelagem da lesão cardíaca (Wojakowski et al. 2004; Yoon et al. 2005). Estas células são mobilizadas da medula óssea, por sua vez, frente a sinalizadores plasmáticos (proteínas) de inflamação e citocinas hematopoiéticas, como fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), IL-6 fator de crescimento do hepatócito e outros (Wojakowski et al. 2004).

Sendo assim, graças aos avanços tecnológicos e da bioinformática através das plataformas de grande alcance e alto desempenho, microarranjo de DNA e *SELDI-TOF/MS*, no presente estudo, foram avaliados os perfis de expressão de 22.011 genes das células do sangue periférico e de 3.844 espectros de proteínas plasmáticas, durante as 48 h após IAM com SST, colhidas em intervalos que possibilitaram avaliar, de forma detalhada, a dinâmica da resposta do organismo na SCA e a identificação de biomarcadores potencialmente úteis no diagnóstico e prognóstico das doenças cardiovasculares.

2 OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar novos biomarcadores de doenças cardiovasculares utilizando poderosas ferramentas para o estudo de alta performance de expressão de RNAm e de proteínas em sangue periférico, aproveitando-se do banco de dados e das tecnologias geradas em consequência da finalização do projeto genoma humano.

2.1 Objetivos específicos

1. Avaliar a expressão gênica de RNAm por microarranjo de DNA (22.011 genes e 287.327 exons) em sangue periféricos de pacientes com IAM com SST, nas primeiras 48 h após admissão hospitalar.
2. Validar tecnicamente através da PCR em tempo real os resultados de expressos de RNAm selecionados através de microarranjo de DNA.
3. Validar biologicamente através da PCR em tempo real os genes diferentemente expressos validados tecnicamente.
4. Analisar o perfil das proteínas plasmáticas através do *ProteinChip H50* seguido de SELDI-TOF/MS de paciente com IAM com SST durante as primeiras 48 h após admissão hospitalar.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CASUÍSTICA

O estudo foi desenvolvido no Pronto-Socorro, Hemodinâmica, Unidade Coronária e Reabilitação do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo (IDPC).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, conforme expresso pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Anexo A). Os indivíduos foram informados pelo investigador principal ou membro da equipe colaboradora designado por ele sobre os objetivos e importância da pesquisa desenvolvida neste trabalho. Somente participaram do estudo aqueles que consentiram em assinar o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice A), conforme determina a resolução número 196, de 13 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde.

3.1.1 Características do grupo IAM com SST

No período de 16 de junho de 2006 a 31 de outubro de 2007, foram recrutados 10 pacientes com IAM com supradesnivelamento do segmento ST [SST] que faziam parte da rotina do Pronto-Socorro. Todos pacientes foram submetidos à intervenção coronariana percutânea com menos de uma hora após suspeita de IAM com SST.

Foram selecionados pacientes do sexo masculino, idade entre 36 a 65 anos que apresentaram sintomas de isquemia coronariana aguda nas últimas 8 horas: dor precordial ou retroesternal descrita como desconforto, aperto ou queimação com duração maior que 20 minutos; dispnéia ou síncope de provável origem isquêmica e o reconhecimento de supradesnivelamento do segmento ST $> 1,0$ mm em derivações contíguas no plano frontal, o bloqueio de ramo esquerdo novo ou o supradesnivelamento do segmento ST $> 2,0$ mm em derivações precordiais que sugerem alta probabilidade de IAM. Em caso de supradesnivelamento do segmento ST em derivações da parede inferior (DII, DIII e AVF), recomenda-se a obtenção de derivações direitas e V7, V8) (Piegas et al. 2009).

O grupo IAM com SST foi subdividido em indivíduos com e sem infarto prévio, uma vez que estes apresentam antecedentes de medicação prévia ambulatorial comuns à

pacientes após IAM. Caracterizou-se 1º IAM com SST os pacientes sem infarto prévio e 2º IAM com SST os pacientes com infarto prévio.

3.1.2 Características do grupo controle

O grupo controle foi constituído por 6 indivíduos, pareados por idade, sexo e fatores de risco, que não apresentavam história ou evidência de doença clínica atual. A doença arterial coronária foi afastada por um teste ergométrico considerado totalmente dentro da normalidade, realizado na seção de Reabilitação do IDPC. Cumpre destacar que, este grupo foi composto por funcionários do hospital e por colegas de trabalho, que foram convidados a participar desta pesquisa e o fizeram de forma espontânea.

3.1.3 Características do grupo SCA para validação biológica

No período de 01 de junho de 2008 a 31 de novembro de 2009, foram recrutados pacientes com SCA que inclui angina instável e IAM (com ou sem SST) que faziam parte da rotina do Pronto-Socorro.

Foram selecionados pacientes de ambos os sexos e idade entre 30 a 65 anos que apresentaram sintomas de isquemia coronariana aguda nas últimas 48 horas: dor precordial ou retroesternal descrita como desconforto, aperto ou queimação com duração maior que 10 minutos; dispnéia ou síncope de provável origem isquêmica.

Estabelece-se o diagnóstico de IAM quando houver aumento característico e diminuição gradual da troponina ou aumento e diminuição mais rápida para creatinoquinase fração MB (CK-MB), com pelo menos um dos seguintes critérios: a) sintomas isquêmicos; b) alterações eletrocardiográficas indicativas de isquemia (elevação, depressão do segmento ST ou BCRE novo); c) desenvolvimento de ondas Q patológicas no eletrocardiograma; ou d) evidência, em exames de imagem, de perda de viabilidade miocárdica ou contratilidade segmentar anormal (Thygesen et al. 2007).

O grupo SCA para validação biológica inclui pacientes com angina instável, IAM com e sem SST. Foram subdivididos de acordo com relato de infarto prévio, uma vez que, estes apresentaram antecedentes de medicação prévia ambulatorial comuns à pacientes após IAM. Caracterizou-se 1º SCA pacientes sem infarto prévio e 2º SCA com infarto prévio.

3.1.4 Características do grupo controle para validação biológica

O grupo controle foi constituído por indivíduos de ambos os sexos e idade entre 30 a 65 anos que não apresentavam história ou evidencia de doença clínica atual. A doença arterial coronária foi afastada por um teste ergométrico considerado totalmente dentro da normalidade, realizado na seção de Reabilitação do IDPC. Cumpre destacar, que este grupo foi composto por doadores de sangue da "Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo" com sede no próprio IDPC. Os mesmos foram convidados a participar desta pesquisa e concordaram de forma espontânea em assinar o termo de consentimento esclarecido.

3.1.5 Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo os pacientes que apresentassem qualquer das seguintes condições: 1) insuficiência renal crônica; 2) insuficiência hepática, 3) distúrbio endócrino, com exceção de Diabetes *Mellitus* para validação biológica; 4) doenças inflamatórias; 5) neoplasia; 6) doença hematológica; 7) hipercolesterolemia familiar conhecida ou presente em membros da família. Excluíram-se também os pacientes que antes do IAM apresentassem as seguintes cardiopatias: 1) miocardiopatia, incluindo doença de Chagas; 2) valvopatia; 3) doença congênita; 4) pericardiopatia.

Para a avaliação dessas condições, aplicou-se questionário aos indivíduos, e foram realizados os seguintes testes de triagem: glicemia, colesterol total e frações, tetraiodotironina (T4), TSH (*Thyroid-stimulating hormone*), uréia, creatinina, ácido úrico, leucograma, alanina aminotransaminase (ALT) e aspartato aminotransaminase (AST).

3.1.6 Variáveis analisadas

Os seguintes fatores de risco clássicos para doença arterial coronária foram avaliados em todos os grupos: Diabetes *Mellitus*, hipertensão arterial, tabagismo, antecedentes familiares, dislipidemias, obesidade. Foi considerado portador de:

- 1) Hipertensão arterial sistêmica - o paciente que mencionasse este fator de risco emitido por médico, com medidas de pressão arterial igual ou maior que 140 /90 mmHg ou que estivesse em uso de medicação anti-hipertensiva (Mion et al. 2004);
- 2) Diabetes *Mellitus* - o paciente que mencionasse este fator de risco emitido por médico em qualquer fase da vida, ou que fazia tratamento com hipoglicemiantes orais ou insulina.

- 3) Dislipidemias - considerou-se dislipêmico o paciente portador de dislipidemia em algum momento de sua vida ou relatado por médico sobre o nível de colesterol ou triglicéride elevado e, que realizou tratamento dietético e/ou usou medicamentos hipolipemiantes.
- 4) História familiar para doença coronária precoce - pacientes com relato de doença coronária em pais ou irmãos, abaixo dos 55 anos em homens, ou de 65 anos em mulheres.
- 5) Tabagismo - o paciente que consumia regularmente, no mínimo, um cigarro por dia, pelo menos, por um ano e que havia fumado no ano anterior à inclusão na pesquisa (Silva et al. 1998). Não fumante, o que nunca fumou ou que deixou de fumar há mais de um ano.
- 6) Obesidade - o critério de obesidade foi adotado com base no índice de massa corpórea para todos os participantes do estudo. O índice de massa corpórea foi calculado dividindo o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Sobrepeso foi definido como índice de massa corpórea (IMC) $> 25,0 \text{ Kg/m}^2$ e obesidade como IMC $> 30,0 \text{ Kg/m}^2$, para homens e mulheres. O peso foi determinado com roupas leves, sem sapatos, utilizando balança mecânica Filizola modelo 31 e a altura mensurada com um antropômetro de 1,92 m.
- 7) Etilismo - os pacientes foram considerados etilistas se o consumo diário de etanol fosse maior que 80 g (i.e, 1 litro de vinho, 6 “latas” de cerveja, 3 doses de aguardente ou whisky).
- 8) Sedentarismo- os pacientes foram considerados sedentários quando não praticavam regularmente atividade física (no mínimo 2 vezes por semana com 1 h de duração).

Considerou-se portador de infarto prévio aquele que apresentasse este antecedente documentado em seu prontuário médico ou, a confirmação de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico.

Todos os medicamentos em uso diário, prévio à internação, foram considerados como medicação prévia ambulatorial. Deu-se especial atenção ao uso de medicamentos comuns a pacientes após IAM, como ácido acetil salicílico, betabloqueador, bloqueador dos canais de cálcio, nitrato, estatina, tienopiridínico, inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA), digitálicos e diurético.

Os pacientes que citaram “não saber” da presença de um determinado fator de risco, bem como infarto prévio e medicação prévia ambulatorial, foram considerados

não portadores do referido antecedente. Todos os dados clínicos foram coletados pelo autor da pesquisa ou membro da equipe colaborador designado por ele.

3.2 OBTENÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

As colheitas sanguíneas foram realizadas por punção da veia antecubital dos pacientes do grupo IAM com SST, na seguinte ordem temporal:

T₀ - a primeira colheita foi realizada no Pronto-Socorro antes do tratamento médico ser instituído.

T₂ - a segunda colheita foi realizada na Hemodinâmica após intervenção coronariana percutânea, que corresponde aproximadamente 2 h após T₀.

T₁₂ - a terceira colheita foi realizada na Unidade Coronária aproximadamente 12 h após T₂.

T₂₄ - a quarta colheita foi realizada na Unidade Coronária aproximadamente 24 h após T₂.

T₃₆ - a quinta colheita foi realizada na Unidade Coronária aproximadamente 36 h após T₂.

T₄₈ - a sexta colheita foi realizada na Unidade Coronária aproximadamente 48 h após T₂.

A representação gráfica do protocolo de colheitas nas primeiras 48 h de admissão hospitalar para o grupo IAM com SST e controle pode ser observada na Figura 1.

Além destas seis colheitas propostas, após um ano os pacientes do grupo IAM com SST foram reconvocados e novamente colhidas as amostras de sangue periférico. Também foram avaliados os marcadores de isquemia cardíaca, a fim de confirmar que neste segundo momento, os pacientes não estivessem em um novo processo isquêmico cardíaco (**IANO**). O objetivo desta última análise, foi avaliar se os genes diferentemente expressos observados nas primeiras 48 h após IAM, retornam às concentrações normais após um ano. Por questões logísticas, não foi possível processar estas amostras para o estudo proteômico.

Para os pacientes do grupo SCA para validação biológica foi realizada uma única punção de sangue periférico por veia antecubital, que ocorreu após anamnese no Pronto-Socorro.

As amostras de sangue periférico dos indivíduos dos grupos controles para validação biológica foi realizada uma única vez em jejum de 12 h.

Figura 1. Representação esquematizada do protocolo de coleta de sangue periférico para o grupo IAM com SST e controle.

Nota: IAM, infarto agudo do miocárdio; SST, supradesnívelamento do segmento ST; CK, creatinoquinase, CK-MB, creatino quinase fração MB; cTnI, troponina I; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após intervenção coronariana percutânea; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h.

3.3 DETERMINAÇÕES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais foram realizados em colaboração com o Laboratório de Análises Clínicas do IDPC.

Para análise do hemograma, foi colhido sangue total em tubo com anticoagulante (ácido etileno-diamino-tetracético [EDTA]). A contagem global da série vermelha, branca e de plaquetas foi executada por métodos de impedanciometria e citometria de fluxo, automatizados *ABX Pentra 80* (ABX, Kyoto, Japão).

Para análise de AST, ALT, CK e CK-MB (atividade) glicemia, ácido úrico, creatinina, uréia, triglicerídeos, colesterol total e colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL), foram usadas amostras de sangue em tubo sem anticoagulante, a partir dos métodos colorimétricos e enzimáticos automatizados *Dimension® RXL* (Dade Behring, Deerfield, EUA). O colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) foram calculados, segundo a fórmula de Friedewald e colaboradores (Friedewald et al. 1972).

Para análise da PCRu, TSH 3ª geração, T4 livre e cTnI, utilizou-se sangue em tubo sem anticoagulante, sendo dosadas pelo método de quimioluminescência automatizada IMMULITE® (Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, EUA).

3.4 ANÁLISE DESCRITIVA

Com objetivo de caracterizar a amostra estudada, os dados foram apresentados em forma de tabelas, com as frequências relativas (percentuais) e absolutas das classes de cada variável qualitativa. Para as variáveis quantitativas que apresentam uma

distribuição normal, os dados foram expressos em médias e desvio-padrão, para os dados que não apresentam uma distribuição normal foram expressos em medianas.

3.5 ANÁLISE INFERENCIAL

Para comparar as distribuições de frequência das variáveis qualitativas foi utilizado o teste do Qui-Quadrado (χ^2) ou teste exato de Fisher, quando os valores esperados foram inferiores a 5 (Rosner 2006).

Antes de se efetuar os testes de comparações das variáveis quantitativas, avaliou-se os dados que seguiam uma distribuição normal, pelo teste de *Kolmogorov-Smirnov* (Siegel & Castellan 1988).

Utilizou-se o teste não paramétrico de *Mann-Whitney* (Armitage & Berry 1994), quando o objetivo foi testar a hipótese de que as duas populações têm a mesma distribuição; para comparações entre mais de duas populações aplicou-se o teste não paramétrico de *Kruskal-Wallis*. Para as variáveis numéricas que apresentaram uma distribuição normal entre os grupos foi utilizado o teste *t* – de *Student*. Foram considerados estatisticamente significantes os resultados cujos níveis descritivos (valores de *p*) foram inferiores a 0,05.

Foram usados na elaboração do relatório técnico os softwares: *Microsoft Office Excel 2000* para o gerenciamento do banco de dados; *Statistical Package for the Social Science v. 15.0* (SPSS Inc., Illinois, EUA) para a execução dos cálculos estatísticos.

3.6 ANÁLISE TRANSCRIPTÔMICA

3.6.1 Extração do RNA total das células presentes no sangue periférico

O RNA intracelular das células presentes no sangue periférico foi mantido estável através da colheita em sistema comercial *PAXgene™ Blood RNA* (*PreAnalytiX GmbH*, Feldbachstrass, Suíça), que tem composição de reagentes exclusivos, que impedem que as moléculas de RNA se degradem por RNases e minimizam a indução da expressão gênica. As colheitas foram realizadas de acordo com o protocolo recomendado pelo fabricante, em que consiste em obter por punção venosa 2,5 mL de sangue periférico, mantê-lo em temperatura ambiente por aproximadamente 12 h e em seguida armazená-lo a -20°C até a sua análise.

O conjunto de reagentes, *PAXgene™ Blood RNA* (*PreAnalytiX GmbH*, Feldbachstrass, Suíça), foi utilizado para extração do RNA intracelular das células

presentes no sangue periférico total humano. A extração inicia-se com a centrifugação a $5.000 \times g$ para obter um precipitado de células presentes no sangue periférico, sendo majoritariamente de leucócito ($4,8 \times 10^6 - 1,1 \times 10^7$ leucócitos/ml). O precipitado é então lavado e incubado com tampões adequados em conjunto com a proteinase K para a digestão das proteínas. O lisado é submetido às etapas de lavagens através da coluna *PAXgene Shredder Spin Column* e a centrifugações para remover detritos celulares residuais, aplicado sob a coluna *PAXgene RNA Spin Column* que apresenta propriedades de ligação seletiva de RNA à membrana sílica gel. A seguir trata-se com DNase I e através do tampão de eluição, recupera-se o RNA.

As amostras de RNA total extraídas de um mesmo paciente e tempo de colheita foram concentradas através de centrifugações através membrana sílica gel do conjunto de reagentes *GeneChip® Blood RNA Concentration (PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrass, Suíça; Affymetrix, Santa Clara, EUA)*.

A integridade do RNA total extraído foi avaliada através do conjunto de reagentes *RNA 6000 Nano series II (Agilent Technologies Inc., Miami, EUA)* em sistema de eletroforese em *chip* do *Bioanalyzer modelo 2100 (Agilent Technologies Inc., Miami, EUA)*. Apenas as amostras com $RIN > 7$ (*Number of Integrated of RNA*) foram utilizadas. As concentrações foram determinadas utilizando o espectrofotômetro *UV-Vis NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, EUA)*. Na Figura 2, segue um exemplo de resultado obtido após extração de RNA total, e controlado a qualidade pelo sistema de eletroforese em *chip* do *Bioanalyzer modelo 2100 (Agilent Technologies Inc., Miami, EUA)*.

Figura 2. **Perfil eletroforético obtido através do Bioanalyzer de amostra de RNA total concentrado.** Os picos assinalados correspondem à porção 18 e 28S da subunidade do RNA ribossômico. A figura do lado direito ilustra o perfil de RNA simulando um gel de eletroforese.
Nota: Amostra DT3, RIN = 8,4.

3.6.2 Processamento das amostras para hibridização em microarranjo de DNA

No presente estudo, o processamento das amostras para hibridização em microarranjo de DNA foi realizado apenas com o RNA total dos pacientes do grupo IAM com SST e grupo controle.

Após isolamento do RNA total, realizaram-se as etapas seguintes de acordo com o manual do *GeneChip® Whole Transcript (WT) Sense Target Labeling Assay* – versão 4 (Affymetrix, Santa Clara, EUA) (Figura 3).

Figura 3. **Fluxo de atividade para análise em microarranjo de DNA.** O RNA total foi processado para obter em cDNA, cRNA, ss-DNA, fragmentado, marcado com biotina, hibridizado em microarranjo de DNA, lavado e escaneado.

Nota: RNA, ácido ribonucleico; cDNA, DNA complementar, dUTP, deoxiuridina-trifosfato; ss-DNA, fita simples de DNA; cRNA, RNA complementar ao cDNA; UDG, RNA complementar ao cDNA; APE1, purina/primidina endonuclease 1; TdT, *terminal deoxynucleotidyl transferase*; DNA, ácido desoxirribonucleico; SAPE, fluoróforo streptavidina-ficoeritrina.

FONTE: *GeneChip® Whole Transcript (WT) Sense Target Labeling Assay*– versão 4 (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

3.6.2.1 Adição de controles exógenos e depleção de RNAr

A partir de 1µg de RNA total, adicionaram-se a cada amostra, controles positivos exógenos, denominados *Poly-A spikes*, que são transcritos poliadenilados do gene da *B. subtilis* - *lys*, *phe*, *thr* e *dap*, para monitorar as etapas que se seguem de depleção de RNA ribossômico (RNA), amplificações, fragmentação e marcação. Os controles fazem parte do conjunto de reagentes *Control GeneChip Eukaryotic Poly-A RNA* (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

A Affymetrix recomenda a depleção das subunidades 18 e 28 do RNAr, para diminuir os ruídos gerados, que dificultam as análises, melhorar a sensibilidade da reação e diminuir os gastos desnecessários de reagentes, pois os mesmos representam aproximadamente 90% do RNA total de humanos. (*GeneChip® Human Exon 1.0 ST Array and GeneChip® WT Sense Target Labeling Assay for Genome-Wide, Exon-Level Expression Analysis* – nota técnica Affymetrix, Santa Clara, EUA).

A depleção de RNAr foi realizada através do conjunto de reagentes *Isolation RiboMinus Human/Mouse Transcriptome* (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e otimizada de acordo com as modificações propostas no *GeneChip® Whole Transcript (WT) Sense Target Labeling Assay Manual* – versão 4 (Affymetrix, Santa Clara, EUA). O processo ocorre através da hibridização, com sondas marcadas com biotina para regiões das subunidades 18 e 28 do RNAr, que por afinidade se liga à estreptavidina, que está covalentemente ligada a partículas magnéticas. Sendo assim, são isoladas, utilizando uma estante magnética, *6 Tube Magnetic Stand-Ambion* (Ambion, Austin, EUA). Para aumentar a estringência da hibridização, adicionou-se Betane a 5M (*Sigma*, Saint Luis, EUA). Ao término desta etapa, fez-se necessário a utilização do conjunto de reagentes *cRNA Cleanup GeneChip® IVC* (Affymetrix, Santa Clara, EUA), para remoção e concentração do material. Na Figura 4, segue um exemplo de resultado obtido após depleção de RNAr.

Figura 4. **Perfil eletroforético obtido através do Bioanalyzer, após depleção de RNAr.** Amostra em vermelho corresponde ao RNA total inicial concentrado (RIN = 6,8) e em Azul, após depleção de RNAr (RIN = 5,8).

Nota: Amostra ET2.

3.6.2.2 Primeira etapa, síntese do cDNA

A partir do RNA total concentrado, com depleção do RNAr, realizou-se a síntese da primeira fita de DNA complementar (cDNA), fita simples de RNA de acordo com o protocolo recomendado pelo fabricante (*Affymetrix*). Os reagentes fazem parte dos conjuntos *GeneChip® WT cDNA Synthesis and Amplification* (*Affymetrix*, Santa Clara, EUA). Primeiro hibridizou-se a amostra com 5 μL do iniciador *T7- (N)₆* a 500 ng/ μL a 70°C por 5 min e, a 4°C por 5 min – em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (*Applied Biosystems*, Foster City, EUA). Em seguida, adicionou-se à reação 2 μL de *5X 1st Stand Buffer*; 1 μL de ditioneitol (DTT) a 0,1 M; 0,5 μL de deoxidonucleotídeos (dNTPs) a 10 mM; 0,5 μL de inibidor de *RNase* e 1 μL de enzima transcriptase reversa *SuperScript II* (*Invitrogen*, Carlsbad, EUA). A programação utilizada no termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (*Applied Biosystems*, Foster City, EUA) foi: incubação inicial de 25°C por 10 min, 42°C por 60 min e 70°C por 10 min. Ao término do processo se obteve uma molécula híbrida, isto é, com uma fita de cDNA e uma fita de RNA.

Para sintetizar a 2ª fita de cDNA, adicionou-se à reação anterior 4,0 μL de MgCl_2 a 17,5 mM; 0,4 μL de dNTPs a 10 mM; 0,2 μL de *RNase H*; 0,6 μL de *DNA Polymerase I* e 4,8 μL de água livre de *RNase*, volume final da reação 20 μL . Incubou-se a seguir a 16°C por 120 min, sem aquecimento da tampa do termociclador *PTC 200 Thermal Cycler* (*MJ Research*, Waltham, EUA) e a 75°C por 10 min, com aquecimento da tampa

do termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA).

3.6.2.3 Síntese e quantificação do cRNA

A partir do cDNA sintetizado, realizou-se uma transcrição *in vitro*, para se obter RNA complementar ao cDNA (cRNA), que corresponde à fita *antisense* do nosso material inicial, isto é, o RNA concentrado com remoção do RNAr. Em seguida, adicionou-se à reação anterior (volume 20 µL) 5 µL de *10X IVT Buffer*, 20 µL de *IVT NTP Mix* e 5 µL de *IVT Enzyme Mix*, volume final 30 µL. A reação ficou incubada por 16 h a 37°C no termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA). Os reagentes fazem parte dos conjuntos de reagentes *GeneChip® WT cDNA Synthesis and Amplification* (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

Com o objetivo de concentrar o cRNA sintetizado e purificar o material dos reagentes adicionados para síntese de cDNA e cRNA, utilizou-se o conjunto de reagentes *GeneChip® IVT cRNA Cleanup* (Affymetrix, Santa Clara, EUA). A seguir, quantificou-se o material, através do espectrofotômetro *UV-Vis NanoDrop® ND-1000* (NanoDrop Technologies, Wilmington, EUA), para que ao final, a amostra tivesse obrigatoriamente massa entre 8 a 10 µg, e obtivéssemos 5 µg de fita simples de cDNA.

3.6.2.4 Segunda etapa, síntese da ss-DNA

As amostras que apresentaram entre 8 a 10 µg de cRNA hibridaram-se com iniciadores randômicos à concentração de 3 µg/µL, volume final de 8 µL; incubou-se a 70°C por 5 min e 25°C por 5 min – em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA). Em seguida, adicionou-se à reação 4 µL de *5X 1st Stand Buffer*, 2 µL de DTT a 0,1 M, 1,25 µL de dNTPs mais deoxiuridina-trifosfato (dUTP) a 10 mM e 4,75 µL de enzima transcriptase reversa *SuperScript II* (Invitrogen, Carlsbad, EUA). O programa do termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA) utilizado foi: 25°C por 10 min, 42°C por 90 min e 70°C por 10 min. Desta forma, ao término do processo, teremos sequências de cRNAs e fitas simples de DNA (*single-stranded DNA*, *ss-DNA*), com incorporação de dUTP em maior razão que deoxitimidina trifosfato (dTTP). Os reagentes, usados nesta etapa, fazem parte dos conjuntos de reagentes *GeneChip® WT cDNA Synthesis and Amplification* (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

3.6.2.5 Hidrólise do cRNA, purificação e quantificação da ss-DNA

Para eliminar as sequências de cRNA, submeteu-se as amostras obtidas do item anterior, a hidrólise, através de 1 µL da enzima *RNase H* do *GeneChip® WT cDNA Synthesis and Amplification Kit* (Affymetrix, Santa Clara, EUA) e incubou-se a 37°C por 45 min, 95°C por 5 min e 4°C por 2 min – em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA). Ao término desta etapa, se fez necessário a utilização do *GeneChip® Sample Cleanup Module* (Affymetrix, Santa Clara, EUA), para limpar e concentrar a matéria, fita simples de DNA (ss-DNA). A seguir quantificou-se o ss-DNA, através do espectrofotômetro *UV-Vis NanoDrop® ND-1000* (NanoDrop Technologies, Wilmington, EUA) e, ao final, a massa da amostra deveria estar obrigatoriamente com 5,5 µg, para a realização das reações de fragmentação, marcação e hibridização nos *GeneChip® Exon 1.0 ST Array* (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

3.6.2.6 Fragmentação da ss-DNA

A reação de fragmentação é uma combinação de 5,5 µg de ss-DNA, 10 U/µL de uracil DNA glicosilase (UDG), 1,000 U/µL de purina/pririmidina endonuclease 1 (APE1), 4,8 µL de *10X cDNA fragmentaion Buffer* e água livre de RNases, para obter volume final da 48 µL. A reação foi incubada a 37°C por 60 min, 93°C por 2 min (para inativar as enzimas) e 4°C por 2 min – em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA). Os reagentes fazem parte do conjunto de reagentes *GeneChip® WT (Whole Transcript) Terminal Labeling* (Affymetrix, Santa Clara, EUA). A enzima UDG remove especificamente as bases uracil, incorporadas artificialmente às sequências de ss-DNA, gerando um sítio de clivagem, para que, em seguida, a APE1 clive a ligação fosfodiéster do carbono, em que estava a base uracil, deixando assim, as extremidades 3' e 5' livres.

Para averiguar se a fragmentação ocorreu adequadamente, realizou-se o controle por eletroforese com 2 µL da amostra, valendo-se do conjunto de reagentes *RNA 6000 Nano series II* (Agilent Technologies Inc., Miami, EUA). Utilizou-se ainda, o sistema de eletroforese em chip com *Bioanalyzer modelo 2100* (Agilent Technologies Inc., Miami, EUA), em que deve apresentar pico entre 20 a 200 bases, sendo que o ponto mais alto deve estar entre 40 a 70 bases, Figura 5.

Figura 5. Perfis eletroforéticos obtidos através do *Bioanalyzer* da reação de fragmentação da ss-DNA.

Nota: Pico correspondente entre 20 a 200 bases. Amostra CTRL6.

3.6.2.7 Marcação da ss-DNA fragmentadas

O material fragmentado foi então marcado através da enzima *terminal deoxynucleotidyl transferase* (TdT), em que transfere para a extremidade 3', a biotina (*Biotin Allonamide Triphosphate* – Figura 6). Adicionou-se aos 45 μL da reação de fragmentação, 12 μL de *5x TdT Buffer*, 2 μL da enzima TdT e 5 mM de *DNA Labeling Reagent*, volume final de 60 μL ; incubou-se a 37°C por 60 min, 70°C por 10 min e 4°C por 2 min - em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (*Applied Biosystems*, Foster City, EUA). Posteriormente o material foi armazenado a -80°C.

Figura 6. Estrutura molecular da *Biotin Allonamide Triphosphate* – *DNA Labeling Reagent*.

FONTE: *GeneChip® Whole Transcript (WT) Sense Target Labeling Assay*– versão 4 (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

Para averiguar se a marcação ocorreu de forma eficaz, realizou-se uma reação de conjugação das amostras marcadas com biotina, com uma solução a 2 mg/mL de avidina - *ImmunoPure NeutrAvidin* (Pierce, Rockford, EUA), em tampão fosfato salino (PBS) pH 7.2 (*Invitrogen*, Carlsbad, EUA). O produto da reação foi submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida, em gradiente a 4 - 20% (*Invitrogen*, Carlsbad, EUA), utilizando tampão TBE 1X (Tampão borato-EDTA; pH 8,0) (*Invitrogen*,

Carlsbad, EUA), em cuba de eletroforese horizontal - *Novex XCell SureLock Mini-Cell* (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e fonte de eletroforese *EPS 1001* (Amersham Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, Engl.), a 150 V por 60 min. Os resultados foram visualizados sob luz UV, após coloração do gel com *SYBR Gold* (1X) (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e foto documentados em sistema de captura de imagem *Chemilmager* (Alpha Innotech Corporation, San Leandro, EUA). Como referência, utilizou-se dois marcadores de DNA – 10 bp e 100 bp *DNA ladder* (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e a própria amostra não submetida a esta reação.

A avidina ao ligar-se com a molécula de biotina, que está ligada à porção terminal da ss-DNA fragmentada, aumenta o seu peso molecular, impedindo que se desloque no TBE GEL a 4 - 20%, durante a eletroforese, de modo distinto às amostras não tratadas com avidina, Figura 7. Esta técnica é conhecida como *Gel-Shift*.

Figura 7. **Perfil eletroforético da ss-DNA fragmentada e marcada com biotina e tratada com avidina.**

Nota: 1- padrão de 10 pb; 2, 4, 6, 8 e 10 ss-DNA marcada com biotina e tratada com avidina; 3 - ss-DNA marcada com biotina; 12 - padrão de 100 pb.

Amostras: CTRL1; AT1; BT1; CT1; CTRL7.

3.6.2.8 Hibridização

As etapas a seguir foram realizadas em colaboração com o Centro Nacional de Genotipagem da Espanha (CeGen), da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o Departamento de Bioinformática do Instituto Príncipe Felipe – Valência, durante o estágio *sandwich* no exterior, pelo programa PDEE/CAPES processo nº 5180/06-6, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2008. As amostras foram enviadas em

gelo seco para a Espanha, pela transportadora OCASA Soluções Logísticas (São Paulo, Brasil) para a realização destes procedimentos.

Para a reação de hibridização utilizou-se o conjunto de reagentes *Control GeneChip® Expression 3'-Amplification Reagents Hybridization* (Affymetrix, Santa Clara, EUA) e seguiu-se o protocolo recomendado pelo fabricante. Nesta etapa, adicionaram-se às amostras, quatro controles de hibridização denominados controles *Bac spikes*, que são transcritos de: *E.coli*, *bioB*, *bioC* e *bioD* a 1,5 pM, 5 pM e 25 pM respectivamente, e de uma recombinação gênica do bacteriófago P1, *cre* a 100 pM; além destes, adicionou-se um controle para auxiliar no alinhamento da imagem digital, *Control Oligo B2* a 50 pM. Utilizou-se o tampão de hibridização 1X, dimetilsulfoxido a 7% e água livre de RNase para um volume final de 220 µL; incubou-se a 99°C por 5 min e 45°C por 5 min – em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA). As amostras, então pré-aquecida a 45°C, foram inseridas no microarranjo *GeneChip® Exon 1.0 ST Array* (Affymetrix, Santa Clara, EUA) e incubadas à temperatura de 45°C a 60 rpm por 17 horas no *GeneChip® Hybridization Oven 640* (Affymetrix, Santa Clara, EUA).

3.6.2.9 Lavagem e coloração

O processo de coloração e lavagem, para a remoção dos reagentes, realizou-se na estação de lavagem *GeneChip® Fluidics Station 450* (Affymetrix, Santa Clara, EUA), comandada pelo sistema operacional *GeneChip® Operating Software* (GCOS; Affymetrix, Santa Clara, EUA), protocolo FS450_0001. Utilizou-se os reagentes do *GeneChip® Hybridization, Wash, and Staint* (Affymetrix, Santa Clara, EUA) de acordo com o fabricante. O processo consiste na união covalente da biotina com o fluoróforo streptavidina-ficoeritrina (SAPE), seguido de um anticorpo anti-streptavidina-biotina, e novamente com SAPE a fim de conseguir uma amplificação do sinal de fluorescência.

3.6.2.10 Leitura - *GeneChip® Scanner 3000 7G*

Ao término das lavagens, inserem-se os *GeneChip® Exon 1.0 ST Array* (Affymetrix, Santa Clara, EUA) no carrossel de leitura - *GeneChip® Auto Loader with External Barcode Reader* (Affymetrix, Santa Clara, EUA), que está acoplado ao equipamento de leitura - *GeneChip® Scanner 3000 7G* (Affymetrix, Santa Clara, EUA), comandado pelo sistema operacional GCOS, que captura a intensidade dos sinais de fluorescência no comprimento de onda de 570 nm e transforma em valor numérico

quantitativo. A leitura de cada microarranjo demora aproximadamente 40 min. Esses sinais são armazenados como imagens de 16-bits, os valores das intensidades captados, de todas as sondas, são armazenados em formato. *CEL*. Segue um exemplo do conjunto de imagens obtidas nessa etapa, Figura 8.

Figura 8. Imagens obtidas de um microarranjo *GeneChip® Exon 1.0 ST*, após leitura no *GeneChip® Scanner 3000 7G*.

Nota: Amostras CTRL3.

3.6.3 Processamento dos dados de microarranjo de DNA

3.6.3.1 Normalização e sumarização dos dados

O processo de normalização denominado *Quantile Normalization* foi aplicado em conjunto com os seguintes algoritmos, necessários para a sumarização dos dados: RMA (*Robust Multi-Array Analysis*) (Irizarry et al. 2003) – para análise dos controles de qualidade, *iterPLIER* (*Iterative Probe Logarithmic Intensity Error*, *Affymetrix*, Santa Clara, EUA) – para expressão gênica diferencial. Gerando assim, para cada microarranjo um arquivo no formato. *CHP*, de acordo com o nível gênico avaliado (*core*, *extension* e *full*).

Ambas etapas foram realizadas, utilizando os programas *Affymetrix Expression Consult^{em} Software v.1.0* (EC, *Affymetrix*, Santa Clara, EUA) e *Affymetrix Power Tolos* (APT, *Affymetrix*, Santa Clara, EUA). O APT foi executado sob a interface gráfica do pacote de programas do projeto *Bioconductor* (<http://www.bioconductor.org>), denominado *oneChannelGUI* v.1.8.8., desenvolvido em ambiente de programação estatístico R – <http://r-project.org> (Sanges et al. 2007).

3.6.3.2 Controle de Qualidade

Os parametros de controle de qualidade denominados: *Poly spikes*, *Bac spikes*, *Pos_vs_neg_auc*, *All probe set mean*, *All probe set RLE mean*, *% P*, *PM_mean* e *Bgrd_mean*, foram avaliados de acordo com as recomendações sugeridas pelos fabricantes (Quality Assessment of Exon and Gene Arrays; Quick Reference Card - QC Metrics for Exon and Gene Design Expression Arrays – *Affymetrix*, Santa Clara, EUA) e através do programa *Affymetrix Expression Console™ Software v.1.0* (EC; *Affymetrix*, Santa Clara, EUA).

Após esta avaliação, os dados processados foram importados para o programa *Partek® GS for Exon Data* (*Partek*, St. Louis, EUA), para análise do componente principal, tridimensional (PCA-3D), a fim de eliminar as amostras que estivessem divergentes das demais réplicas biológicas (*Identifying and Validating Alternative Splicing Events – Technical Note*, *Affymetrix*, Santa Clara, EUA).

3.6.3.3 Filtros

Uma vez selecionados os microarranjos que continuaram na análise, após avaliação dos controles de qualidade, os arquivos *.CEL* destes microarranjos, foram novamente submetidos à normalização pelo método *Quantile Normalization* e sumarização para gene nível pelo algoritmo *iterPLIER*, e realizado o cálculo de DABG (*detection above background*), através do programa APT sob interface gráfica do programa *oneChannelGUI v.1.8.8*.

Os filtros aplicados foram: 1- Filtering by IQR - que exclui os genes que estivessem fora do intervalo inter-quartilis de 0,25 da distribuição de intensidades; 2- *Filtering on DABG p-value* - exclui genes com $p < 0,05$ para DABG e acima de 100% do ruído de fundo; 3- Setting to 0 log2 intensity below 1 – remoção dos genes cuja intensidade estivesse muito próxima ao zero.

3.6.3.4 Análise estatística dos dados de microarranjo de DNA

As análises estatísticas para expressão gênica diferencial entre os grupos IAM com SST e controle foram executadas utilizando o modelo linear e o método empírico de Bayes, implementados no pacote LIMMA (*Linear Models for Microarray Data*) (Gentleman et al. 2004), através da interface gráfica do programa *oneChannelGUI v.1.8.8* (Sanges et al. 2007). As listas de genes diferentemente expressos foram comparados entre si por Diagramas de Venn, através do programa *Partek® GS for Exon*

Data (Partek, St. Louis, EUA). Foram considerados estatisticamente significantes as diferenças de expressão de RNAm cujos níveis descritivos foram inferiores a 0,001 e *Fold Change* $\pm 1,0$.

3.6.4 Validação Técnica pela PCR em tempo real

Definiu-se validação técnica a investigação da correlação dos resultados obtidos de expressão de RNAm por análises de microarranjo de DNA com os resultados da expressão da PCR em tempo real, utilizando um mesmo grupo amostral, grupo IAM com SST e grupo controle.

3.6.4.1 Seleção de genes-candidatos para validação técnica

Ao término das análises estatística os genes diferentemente expressos, foram submetidos à avaliação biológica através no programa *Ingenuity Pathways Analysis* (IPA) (*Ingenuity® Systems*, Califórnia, EUA).

IPA disponibiliza um vasto banco de dados de genes e proteínas que, de forma dinâmica, auxilia na visualização de suas associações gênicas e protéicas, com medicamentos, vias metabólicas, funções metabólicas e doenças já descritas na literatura científica. Assim que o programa IPA auxiliou na seleção dos genes-candidatos a biomarcadores de doenças cardiovasculares a serem validados tecnicamente e, posteriormente, biologicamente pela PCR em tempo real.

Foram considerados os seguintes critérios de seleção, nesta ordem de relevância:

- 1) genes diferentemente expressos na primeira colheita para 1º IAM com SST que já foram associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA ($p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$);
- 2) genes diferentemente expressos comuns entre os grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST, independente da variável infarto prévio e tempo de colheita, que já foram associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA ($p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$);
- 3) genes diferentemente expressos na primeira colheita para 1º IAM com SST de acordo com o cálculo de p-valor ajustado por FDR $< 0,05$ (*false discovery rate*) (Benjamini & Hochberg 1995). Ainda que estes não estejam associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA;

4) genes diferentemente expressos em mais de um tempo de colheita para 1º IAM com SST e 2º IAM com SST que já foram associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA, sendo $p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$, exceto para o 1º IAM com SST T₂ que estabeleceu como critério $p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 2,0$.

5) genes diferentemente expressos na primeira colheita para 1º IAM com SST ou 2º IAM com SST que não estejam associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA e p-valor ajustado por FDR $> 0,05$.

6) genes diferentemente expressos na segunda e terceira colheita para 1º IAM com SST, que já foram associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA ($p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$) e ainda apresentem p-valor ajustado por FDR $< 0,05$.

Foram selecionados 33 genes-candidatos a biomarcadores de doenças cardiovasculares a serem validados tecnicamente pela PCR em tempo real.

3.6.4.2 Síntese de cDNA para validação técnica

A partir 1 μ g de RNA total extraído de sangue periférico dos pacientes IAM com SST e controle o cDNA foi gerado utilizando-se o *High Capacity RNA-to-cDNA Master Mix* (Applied Biosystems, Foster City, EUA) que contém iniciadores aleatórios (*random primers*), dNTPs, transcriptase reversa e tampão da enzima. O ensaio de transcriptase reversa (TR) foi realizado em termociclador Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster City, EUA), com as seguintes etapas: 25°C por 5 min, 42°C por 30 min e 85°C por 5 min. O cDNA obtido foi armazenado a -20°C até a etapa de pré-amplificação.

3.6.4.3 Pré-amplificação para validação técnica

Devido ao baixo rendimento obtido no processo de extração de RNA através do PAXgene™ Blood RNA Kit e, na necessidade de processá-lo para posterior hibridização em microarranjo de DNA, a concentração e volume restante para a etapa de validação, foi limitada. Desta forma, optamos em executar apenas uma reação de TR para cada amostra e, a partir do cDNA, realizar uma pré-amplificação múltipla através do TaqMan® PreAmp Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, EUA), com o conjunto de iniciadores dos genes selecionados para validação pela PCR em tempo real, de cada

gene individualmente. Para esta finalidade, utilizou-se 250 ng de cDNA, 2X do reagente *TaqMan® PreAmp Master Mix* e 0.2X de todos os iniciadores dos genes selecionados. O ensaio de pré-amplificação foi realizado em termociclador *Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler* (Applied Biosystems, Foster City, EUA), com as seguintes etapas: etapa inicial a 95°C por 10 min (desnaturação inicial), amplificação por 14 ciclos a 95°C por 15 e 60°C por 4 min (extensão). O cDNA pré-amplificado foi então diluído na razão 1:20 com tampão Tris-1 [Tris-HCL a 10 mM/L (pH 8,0)] e armazenado a -20°C até a PCR em tempo real.

3.6.4.4 PCR em tempo real e análise estatística para validação técnica

A medida quantitativa da expressão do RNAm de cada gene selecionado, foi realizada pela PCR em tempo real, utilizando o sistema de amplificação *TaqMan® PCR* (Applied Biosystems, Foster City, EUA). A análise da expressão gênica foi realizada por método de quantificação relativa, utilizando o gene *GAPDHS* (*glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase*) como referência endógena. As sequências dos iniciadores e das sondas marcadas com fluoróforo, foram fornecidas (em solução 20 vezes concentrada) pelo serviço “*Assay by design*” (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e o código identificador dos 33 genes-candidatos a biomarcadores de doenças cardiovasculares (*Assay ID*), foi fornecido pelo fabricante. Estes dados estão descritos na Tabela 1.

A escolha dos oligonucleotídeos iniciadores para a PCR em tempo real foram realizadas observando as intensidade logarítmica de cada exon do gene selecionado, a fim de minimizar a possibilidade de avaliar a expressão de diferentes transcritos, como por exemplo, produtos de *splicing* alternativo. Esta observação foi possível através da sumarização dos dados de microarranjo de DNA a “exon nível” com o algoritmo PLIER (*Iterative Probe Logarithmic Intensity Error*, Affymetrix, Santa Clara, EUA) através do programa APT sob interface gráfica do programa *oneChannelGUI v.1.8.8*. (<http://www.bioconductor.org>; CALOGERO, 2007).

Buscou-se selecionar o gene de referência que apresentasse intensidade de expressão logarítmica próxima à média de intensidades observadas nos genes-candidatos e com menor coeficiente de variação possível. O gene de referência selecionado foi *GAPDHS*.

Os cDNA dos genes selecionados e do *GAPDHS* foram amplificados pela PCR individual. Os ensaios foram realizados no termociclador ABI Prism 7500 (Applied

Biosystems, Foster City, EUA). Nos ensaios de amplificação, utilizaram-se iniciadores a 90 nM e sonda de detecção marcada com FAMTM (fluoróforo 6-carboxifluoresceína) a 250 nM. Os demais reagentes foram fornecidos em solução 2x concentrada, denominada *TaqMan® Gene Expression Master Mix*, contendo dNTPs com dUTP, AmpErase[®] UNG (Uracil N- glicosilase), enzima *AmpliTaq Gold® DNA Polymerase*, uma referência passiva e tampão de reação *Gold PCR Buffer* (*Applied Biosystems*, Foster City, EUA). Foi utilizado volume final de 25µL por reação.

O programa da PCR em tempo real utilizado, foi constituído de: (1) um ciclo de 2 min a 50°C, (ativação da UNG); (2) um ciclo de 10 min a 95°C, (inativação da UNG); 40 ciclos de 15 seg a 95°C (desnaturação) e 1 min a 60°C (hibridização e extensão). Os sinais de fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas *TaqMan®*, foram detectados pelo equipamento ABI Prism 7500 (*Applied Biosystems*, Foster City, EUA). Os dados foram analisados, utilizando-se o programa *Sequence Detection Software* v1.2.3 (*Applied Biosystems*, Foster City, CA, EUA) que gera curvas semi-logarítmicas dos sinais de amplificação. Para a quantificação relativa da expressão gênica, foi utilizado o método comparativo com ciclo de *threshold* (C_T) (Livak and Schmittgen 2001). A fórmula utilizada foi $2^{-\Delta C_T}$, onde $\Delta C_T = C_T \text{ gene de interesse} - C_T \text{ gene de referência}$. Os resultados obtidos da PCR em tempo real e, as intensidades de sinais de expressão dos dados processados de microarranjo de DNA, por fim, foram submetidos à análise de correlação não paramétrica por teste de *Rank* de *Spearman*, através do programa *Partek® GS for Exon Data* (Partek, St. Louis, EUA). O coeficiente de correlação (r) é apresentado em uma escala de -1 a +1, valor mais próximo de +1 significa correlação perfeita positiva e -1 correlação perfeita negativa. Classificou-se como baixa correlação, quando $r \leq 0,45$; moderada quando entre 0,46 a 0,69, alta correlação quando $r \geq 0,70$, para o nível de significância estabelecido de $p < 0,05$.

3.6.5 Validação Biológica pela PCR em tempo real

Genes-candidatos a biomarcadores de doenças cardiovasculares cujo coeficiente correlação por teste de *Rank* de *Spearman* foi superior a 45% (p -valor < 0.05) entre os dados de expressão por microarranjo de DNA e PCR em tempo real foram submetidos à validação biológica.

Validação biológica neste estudo consistiu em avaliar se os genes candidatos foram diferentemente expressos entre os pacientes com SCA e indivíduos saudáveis a partir de

uma nova casuística selecionada, isto é, pacientes do grupo SCA para validação biológica e grupo controle para validação biológica.

A extração de RNA, síntese de cDNA e condições da PCR em tempo real para a validação biológica foram realizados das mesmas forma que na etapa anterior de validação técnica, sendo desnecessária a pré-amplificação múltipla através do *TaqMan*[®] *PreAmp Master Mix* (Applied Biosystems, Foster City, EUA).

Tabela 1. Código identificador do conjunto de iniciadores e sondass fornecidos pelo serviço “Assay by design” (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).

Gene	Assay ID
ABCA1	Hs01059137_m1
ADORA3	Hs00252933_m1
ALOX15	Hs00609608_m1
AREG	Hs00155832_m1
BCL2A1	Hs00187845_m1
BCL2L1	Hs00169141_m1
CA1	Hs00266139_m1
COX7B	Hs00371307_m1
CREM	Hs01590456_m1
CSF1	Hs00174164_m1
ECHDC3	Hs00226727_m1
FOLR3	Hs00357145_g1
GAPDHS	Hs00266705_g1
GPX3	Hs00173566_m1
GSTM1	Hs01683722_gH
IL18R1	Hs00175381_m1
IL1R1	Hs00991010_m1
IL1RL1	Hs00545034_g1
IL5RA	Hs00602482_m1
IRS2	Hs00275843_s1
KCNE1	Hs00897540_s1
MMP9	Hs00957562_m1
MYL4	Hs00267321_m1
MYO5C	Hs00218921_m1
PER1	Hs00242988_m1
POLE2	Hs00160277_m1
RCN3	Hs00276633_m1
SAMSN1	Hs00223275_m1
SLC29A1	Hs01085706_m1
SLITRK4	Hs00331273_s1
SMPD3	Hs00218713_m1
THBS1	Hs00170236_m1
TLR4	Hs00152937_m1
TREML4	Hs01080584_g1

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); Assay ID, código identificador fornecido pelo fabricante.

3.7 ANÁLISE PROTEÔMICA

No presente estudo, a análise foi realizada com o plasma dos pacientes do grupo IAM com SST e grupo controle.

3.7.1 Obtenção do plasma

Para análise do perfil de proteínas plasmáticas, o sangue periférico foi colhido com o tubo de heparina *Vacutainer*TM (*Becton Dickinson Company*, Plymouth, Reino Unido). O plasma foi separado por centrifugação a 1500 x g por 30 min (em período de no máximo 2 h após a colheita), distribuídos em alíquotas de 0,5 mL e armazenados a -80°C, até o momento do processamento (*PROTEINCHIP SYSTEM USERS GUIDE*, 2006).

3.7.2 Purificação do plasma

O fluxo de processamento das amostras de plasma para análises encontra-se representado na Figura 9.

Com o propósito de eliminar quatorze proteínas mais abundantes (albumina, IgM, IgG, IgA, hepatoglobinas, transferrina, α 1-antitripsina, fibrinogenio, α 2- macroglobulina, α 1-ácido glicoproteína, apolipoproteína AI, apolipoproteína AII, complemento C3 e transferrina), que correspondem a 85% da massa total de proteínas plasmáticas e, facilitar a identificação de componentes menores e em menor abundância, procedeu-se o a remoção de acordo com fabricante *Multiple Affinity Removal Spin Cartridge System* (*Agilent Technologies Inc.*, Wilmington, USA). O processamento consistiu em: diluição em 16X com tampão A; filtração em coluna de 0.22 μ m, lavagens e concentração final com *Nanosep 3K Omega Centrifugal Device* (*Pall Life Sciences*, Port Washington, USA).

Figura 9. Esquema do fluxo de processamento do plasma para análise proteômica através do SELDI-TOF/MS. Iniciando uma etapa de purificação de proteínas abundantes, seleção em matriz hidrofóbica, cristalização através da adição da solução EAM, ionização das proteínas e seu voo (campo magnético/vácuo) até o detector de íons.

Nota: SELDI-TOF/MS, do inglês *Surface Enhanced Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry*; EAM, do inglês, *Energy Absorbing Matrix sinapinic acid*; m/z , relação massa molecular e a carga ionizada; +, carga positiva da molécula ionizada.

3.7.3. SELDI-TOF/MS processamento e análise estatística

As amostras de plasma purificado foram conservadas em gelo seco para o transporte e, enviadas pela transportadora OCASA Soluções Logística (São Paulo, Brasil), aos colaboradores *Sun Biomedic Technology* (*SunBMT*, Lomalinda, EUA), para dar continuidade ao processamento das amostras.

Dezenove microlitros de cada amostra, juntamente com o tampão de ligação (9 M de uréia e 30 mg/ml de *CHAPS*), foram inseridos em uma matriz de interação hidrofóbica previamente tratadas com solução de 50% de acetonitrilo, denominada *Hydrophobic H50 ProteinChip arrays* (*Bio-Rad Laboratories*, Hercules, CA). Em

seguida, após lavagem, aplicou-se sob o orifício da matriz 1 µl da solução EAM (*Energy Absorbing Matrix sinapinic acid*), que contém solução saturada de 50% de acetonitrilo e 0.5% de ácido trifluoroacético.

A interação com as proteínas retidas e a EAM, após secagem, formam cristais que possibilitam a análise individual das proteínas e peptídeos através do sistema SELDI-TOF/MS, utilizando-se o equipamento *Protein Reader System PBS-IIC* (CIPHERGEN Biosystems Inc., Ferment, EUA). Este espectômetro foi calibrado rigorosamente a cada leitura das amostras, com proteínas padrões, fornecidas pelo fabricante, *All-in-One Peptide Standard mass standard*, e foi capaz de detectar moléculas entre 2 a 20 kDa (PROTEINCHIP SYSTEM USERS GUIDE, 2006), sendo m/z a relação massa molecular e a carga ionizada da molécula.

Os dados foram normalizados com algoritmos desenvolvidos pela própria empresa colaboradora SunBMT, através do programa de bioinformática *Matlab 7.0* (Matlab Bioinformatics software) e, filtrados através do programa *BRB Array Tools* versão 3.7.2 (<http://linus.nci.nih.gov/BRB-ArrayTools.html>), para espectros de proteínas com intensidade logarítmica acima do ruído de fundo ($p < 0.01$).

Os testes estatísticos foram gerados a partir das comparações entre os tempos de colheita para 1º IAM com SST e 2º IAM com SST em relação ao grupo controle. Utilizou-se o teste estatístico t de *Student* através do programa *Partek® GS for Exon Data* (Partek, St. Louis, EUA). Classificou-se como pico de proteína diferentemente expresso quando $p < 0,05$ e *Fold Change* $\pm 1,5$. *Fold Change* definido como logaritmo na base 2, das diferenças entre as médias de expressão gênica de um dado gene ou proteína (Choe et al. 2005).

4 RESULTADOS

4.1 CASUÍSTICA

4.1.1 Grupo IAM com SST

Inicialmente foram selecionados 18 pacientes com IAM com SST, oito destes não preencheram os critérios clínicos de inclusão. Três apresentaram dor precordial por mais tempo que 8 h; um paciente foi considerado Diabético por fazer tratamento com hipoglicemiantes orais; dois pacientes embora apresentassem dor precordial do tipo isquêmica e ECG com SST, durante o processo de intervenção coronária percutânea constatou ausência de lesão das artérias coronárias; e por fim, dois pacientes desistiram de continuar no protocolo de pesquisa após 24 h.

O grupo IAM com SST foi subdividido em 5 pacientes sem infarto prévio (1º IAM com SST) e 5 com infarto prévio (2º IAM com SST), uma vez que este último fez uso diário de medicação prévia ambulatorial comum à pacientes após IAM (Tabela 1).

4.1.2 Grupo controle

Inicialmente foram selecionados 12 indivíduos controles. Seis não preencheram os critérios clínicos de inclusão. Um indivíduo apresentou resposta isquêmica durante o teste ergométrico; cinco foram excluídos por apresentarem alterações nos exames laboratoriais de triagem, ácido úrico elevado (1); CK-MB com valor duas vezes acima do valor de referência (1); ALT elevado (1); glicemia elevada (1); PCRU elevado (1).

Vale destacar que se buscou realizar um pareamento entre o grupo controle e IAM com SST, selecionando indivíduos que tivessem a mesma faixa-etária, os mesmos hábitos de vida e fatores de riscos semelhantes aos dos indivíduos com IAM com SST. Também se optou por indivíduos que não estivessem fazendo uso de medicações por pelo menos uma semana antes da realização da colheita de sangue periférico.

4.1.3 Grupo SCA para validação biológica

Foram recrutados 74 pacientes com SCA que faziam parte da rotina do Pronto-Socorro. Assim como proposto para o grupo IAM com SST, os pacientes foram subdivididos de acordo com antecedentes de infarto prévio, uma vez que estes apresentaram antecedentes de medicação prévias ambulatoriais comuns à pacientes após IAM.

O grupo 1º SCA, sem infarto prévio, selecionado para a etapa de validação biológica, foi composto por 11 pacientes com angina instável, 28 pacientes com IAM sem SST e 6 pacientes com IAM com SST, totalizando 45 pacientes.

Já o grupo 2º SCA, com infarto prévio, selecionado para a etapa de validação biológica foi composto por 15 pacientes com angina instável, 13 pacientes com IAM sem SST e 1 pacientes com IAM com SST, totalizando 39 pacientes.

4.1.4 Grupo controle para validação biológica

Foram recrutados 41 indivíduos do grupo controle para validação biológica, todos não apresentavam história ou evidencia de doença clínica atual, ou doença arterial coronária, de acordo com anamnese e teste ergométrico considerado totalmente dentro da normalidade, realizado na seção de Reabilitação do IDPC.

4.1.5 Dados demográficos

As características antropométricas, clínicas, concentrações séricas de lipídeos, bem como exames realizados na triagem para os pacientes com IAM com SST e grupo controle, estão descritas na Tabela 2. Os dados demográficos para o grupo IAM com SST são apresentados em pacientes com e sem infarto prévio.

Os grupos apresentaram distribuições similares quanto à idade, hábitos de fumar, consumo de álcool, sedentarismo, valores de índice de massa corpórea (IMC), proporções de indivíduos hipertensos, com história familiar para doença coronária precoce e concentrações séricas de lipídeos ($p > 0,05$).

Os pacientes com ou sem infarto prévio quando comparados com o grupo controle apresentaram valores médios de glicemia em jejum semelhantes e dentro dos padrões de normalidade, de acordo com a Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2008). Os demais exames de triagem como: uréia, creatinina, ácido úrico, T4 livre e TSH, não apresentaram diferença estatística entre os grupos ($p > 0,05$).

Como esperado, os pacientes dos grupos IAM com SST apresentaram valores significativamente mais elevados com relação às enzimas hepáticas AST, ALT, quando comparados com o grupo controle ($p < 0,05$). Para excluir a presença de doença hepática, avaliou-se a atividade da gama-glutamyltransferase no soro dos pacientes com ALT elevado, e todos apresentaram valores dentro dos padrões de referência normal.

As características antropométricas, clínicas, concentrações séricas de lipídeos, bem como exames realizados na triagem para os pacientes com síndrome coronária aguda e

do grupo controle para validação biológica, estão descritas na Tabela 3. Os dados são apresentados de acordo com infarto prévio, 1º SCA e 2º SCA.

A média de idade foi maior em pacientes com 1º SCA ou 2º SCA quando comparados ao grupo controle ($p < 0,01$). Característica própria em doenças cardiovasculares de ocorrerem com maior frequência em indivíduos com idade mais avançada.

Ao comparar os dados apresentados pelos indivíduos dos grupos 1º SCA ou 2º SCA, verificou-se que há uma distribuição similar quanto ao gênero, frequência de Diabetes *Mellitus*, hipertensão, tabagismo, valores elevados de colesterol LDL, IMC, frações do colesterol (HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos), glicose, creatinina, AST, ALT, leucócito, T4 livre, TSH, PCRu, angina instável ou IAM com SST ($p > 0,05$). No entanto, as concentrações de uréia e colesterol total e a frequência de pacientes com IAM sem SST foram significativamente diferentes entre os dois grupos ($p < 0,05$; dados em negrito na tabela 3).

Tabela 2. Características clínicas, variáveis antropométricas, perfil lipídico, bioquímicos e hematológicos dos grupos 1º IAM com SST, 2º IAM com SST e controle.

	GC (6)	1º IAM com SST (5)	2º IAM com SST (5)	p*
Idade (anos)	48 ± 8	53 ± 10	53 ± 11	0.42
IMC (kg/m ²)	26 ± 2	27 ± 5	26 ± 3	0.97
Hipertensão n° (%)	2 (33)	2 (40)	5 (100)	0.58
Tempo de dor (horas)	N.A.	3 ± 3	3 ± 1	0.59
Histórico Familiar para doença coronária	0	2 (40)	2 (40)	0.20
Fumante n° (%)	4 (67)	3 (60)	4 (80)	0.78
Sedentarismo n° (%)	5 (83)	2 (40)	3 (60)	0.33
Medicação prévia ambulatorial n° (%)	0	0	5 (100)	N.A.
Antiagregante n° (%)	0	0	5 (100)	N.A.
Estatinas n° (%)	0	0	4 (80)	N.A.
Betabloqueadores n° (%)	0	0	4 (80)	N.A.
Diuréticos n° (%)	0	0	1 (20)	N.A.
Nitratos n° (%)	0	0	1 (20)	N.A.
Colesterol Total (mmol/l)	5,7 ± 1,2	5,3 ± 1,2	4,8 ± 0,7	0.41
Colesterol HDL (mmol/l)	0,4 ± 0,1	0,3 ± 0,0	0,3 ± 0,0	0.16
Colesterol LDL (mmol/l)	3,7 ± 1,1	3,7 ± 1,1	3,1 ± 0,7	0.53
Colesterol VLDL (mmol/l)	0,5 ± 0,2	0,3 ± 0,3	0,4 ± 0,2	0.44
Triglicerídeos (mmol/l)	2,3 ± 0,8	1,7 ± 1,5	2,0 ± 0,8	0.48
Glicose (mmol/l)	5,4 ± 0,4	5,5 ± 0,6	5,4 ± 0,6	0.88
Uréia (mmol/l)	11,7 ± 2,0	9,7 ± 2,1	9,7 ± 1,3	0.21
Creatinina (µmol/l)	88,3 ± 17,7	79,5 ± 17,7	79,5 ± 8,8	0.35
Ácido Úrico (mmol/l)	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,0	0.10
T4 livre (pmol/L)	16,8 ± 1,3	10,3 ± 2,6	11,6 ± 1,3	0.05
TSH (mU/L)	1,9 ± 1,1	1,3 ± 0,7	0,9 ± 0,5	0.08
ALT	0,4 ± 0,0	3,5 ± 1,8	2,6 ± 2,5	0.01
AST	0,4 ± 0,1	1,2 ± 0,5	1,1 ± 0,3	<0,01

Nota: Número de indivíduos entre parênteses; As variáveis contínuas estão apresentadas como média ± DP, comparadas por testes não paramétricos de *Kruskal-Wallis**. Variáveis categóricas foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado (χ^2). As variáveis categóricas que apresentam valor zero para GC foram comparadas pelo teste exato de *Fisher* entre os grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST. Os indivíduos com pressão sistólica e diastólica igual ou superior a 140/90 mmHg ou submetidos à terapia anti-hipertensiva, foram considerados hipertensos (ARTERIAL HYPERTENSION WORK GROUPS, 2004). IMC, índice de massa corpórea; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; T4 livre, tiroxina livre; TSH, hormônio tireoestimulante; AST, aspartato-amino-transferase; ALT, alanina-amino-transferase; N.A., não se aplica; GC, grupo controle; 1º IAM com SST, grupo de pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, grupo de pacientes com IAM com SST com infarto prévio

Tabela 3. Características clínicas, variáveis antropométricas, perfil lipídico, bioquímicos e hematológicos dos grupos 1° SCA, 2° SCA e controle para validação biológica.

	GC (41)	1°SCA (45)	2° SCA (39)	<i>p</i> *
Idade (anos)	40,4 ± 6,9	59,2 ± 10,7	65,0 ± 11,2	<0,01
IMC (kg/m ²)	24,3 ± 3,4	27,9 ± 4,9	29,3 ± 4,4	<0,01
Homens n° (%)	33 (80)	35 (78)	22 (76)	0.89
Diabetes <i>Mellitus</i> n° (%)	0 (0)	9 (20)	14 (48)	0.23
Hipertensão n° (%)	0 (0)	27 (60)	24 (83)	1.00
LDL-c Alto n° (%)	22 (45)	23 (44)	14 (48)	0.23
Fumante n° (%)	3 (7)	17 (38)	8 (29)	<0,01
Sedentarismo n° (%)	1 (2)	30 (70)	25 (89)	<0,01
Colesterol Total (mmol/l)	4,8 ± 0,9	5,2 ± 1,5	4,3 ± 1,3	0.01
Colesterol HDL (mmol/l)	0,6 ± 0,2	0,5 ± 0,3	0,4 ± 0,1	<0,01
Colesterol LDL (mmol/l)	2,8 ± 0,8	3,2 ± 1,3	2,8 ± 1,3	0.30
Colesterol VLDL (mmol/l)	0,2 ± 0,2	0,4 ± 0,2	0,3 ± 0,1	<0,01
Triglicerídeos (mmol/l)	1,1 ± 0,6	2,4 ± 2,1	2,2 ± 2,5	<0,01
Glicose (mmol/l)	5,0 ± 0,6	5,9 ± 2,7	6,3 ± 1,8	<0,01
Uréia (mmol/l)	11,9 ± 2,8	14,9 ± 6,1	18,2 ± 7,0	<0,01
Creatinina (μmol/l)	79,6 ± 17,7	88,4 ± 17,7	88,4 ± 8,8	<0,01
AST (U/L)	31,2 13,8	60,9 ± 111,7	43,8 ± 29,4	0.43
ALT (U/L)	34,9 ± 34,4	35,1 34,0	28,9 ± 14,2	0.6
Leucócitos	6,2 ± 1,7	7,8 ± 2,1	8,1 ± 2,8	<0,01
T4 livre (pmol/L)	17,5 ± 3,1	16 ± 2,3	15,2 ± 3,1	0.05
TSH (mU/L)	2,0 ± 2,3	2,6 ± 2,7	2,3 ± 1,7	0.06
PCRu (mg/L)	1,09 ± 0,85	2,18 ± 3,96	4,07 ± 12,21	0.90
Angina instável n° (%)	0 (0)	11 (24)	15 (52)	0.40
IAM sem SST n° (%)	0 (0)	28 (62)	13 (45)	0.01
IAM com SST n° (%)	0 (0)	6 (13)	1 (3)	0.15

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. As variáveis contínuas estão apresentadas como média ± DP, comparadas entre os grupos GCb, 1° SCA e 2° SCA por testes não paramétricos de *Kruskal-Wallis**. Variáveis categóricas foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado (χ^2). As variáveis categóricas que apresentam valor zero para GC foram comparadas pelo teste exato de *Fisher* entre os grupos 1° IAM com SST e 2° IAM com SST, resultados com *p* < 0,05 em negrito. Os indivíduos com pressão sistólica e diastólica igual ou superior a 140/90 mmHg ou submetidos à terapia anti-hipertensiva, foram considerados hipertensos (ARTERIAL HYPERTENSION WORK GROUPS, 2004). IMC, índice de massa corpórea; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; T4 livre, tiroxina livre; TSH, hormônio tireoestimulante; AST, aspartato-amino-transferase; ALT, alanina-amino-transferase; N.A., não se aplica; GCb, grupo controle para validação biológica; 1° SCA, grupo de pacientes com Síndrome Coronária Aguda sem infarto prévio; 2° IAM com SST, grupo de pacientes com Síndrome Coronária Aguda com infarto prévio.

4.1.6 Marcadores cardíacos e PCRu

Foram mensurados a cada tempo de colheita as concentrações sorológicas dos marcadores de isquemia cardíaca CK, CK-MB e cTnI, bem como as concentrações da PCRu para os pacientes IAM com SST e controle. As concentrações máximas observadas para os pacientes com IAM com SST com e sem infarto prévio se deu aproximadamente 12 h após evento. Já a PCRu apresentou aumento progressivamente ao largo do tempo avaliado, Tabela 4. Não houve diferenças significativas entre os

tempos de colheita de 1º IAM com SST em relação aos tempos de colheita de 2º IAM com SST ($p > 0,05$), exceto para CK nos tempos T_{36} e T_{48} . Contudo, concentrações maiores podem ser observadas em 1º IAM com SST que em 2º IAM com SST.

As concentrações mensuradas de cTnI, CK, CK-MB e PCRu para os indivíduos do grupo controle estão abaixo dos valores de referência [valores de referência para cTnI até 1,0 ng/mL; CK, homens < 232 U/L; CK-MB (atividade), 0 a 6 U/L; PCRu, até 1,1 mg/dL] (Ferreira et al. 2005), excluindo possível resposta isquêmica cardíaca neste grupo, corroborando com o teste ergométrico dentro do padrão de normalidade.

Tabela 4. Concentrações dos marcadores cardíacos cTnI, CK e CK-MB e PC-R observados nos pacientes com IAM com SST com e sem infarto prévio.

		cTnI (ng/mL)	CK (U/L)	CK-MB (U/L)	PCRu (mg/dL)
1º IAM com SST	T_0	0 (0 - 0)	257 (137 - 324)	3 (3 - 9)	0,1 (0,0 - 0,8)
	T_2	1,5 (0,4 - 3,8)	195 (74 - 333)	9 (4 - 23)	0,1 (0,1 - 0,6)
	T_{12}	26,8 (26,3 - 34,0)	1.306 (1.201 - 1.771)	69 (68 - 86)	0,4 (0,3 - 1,0)
	T_{24}	21,2 (15,6 - 28,9)	940 (780 - 1.440)	44 (34 - 49)	1,2 (0,8 - 1,2)
	T_{36}	13,7 (13,5 - 19,8)	554 (550 - 746)	21 (18 - 25)	1,2 (0,7 - 1,2)
	T_{48}	9,7 (9,1 - 12,2)	449 (411 - 529)	9 (8 - 13)	1,1 (0,7 - 1,5)
2º IAM com SST	T_0	0,1 (0,1 - 0,2)	112 (94 - 117)	5 (3 - 6)	0,1 (0,1 - 0,3)
	T_2	0,8 (0,0 - 42,5)	136 (72 - 1.046)	4 (1 - 71)	0,0 (0,0 - 0,2)
	T_{12}	30,2 (4,6 - 72,1)	381 (288 - 1.912)	20 (17 - 126)	1,2 (0,4 - 2,0)
	T_{24}	7,1 (3,2 - 28,9)	269 (233 - 860)	12 (7 - 49)	1,7 (1,2 - 3,7)
	T_{36}	4,2 (3,0 - 24,3)	128 (128 - 518)*	6 (4 - 23)	2,2 (1,2 - 3,8)
	T_{48}	3,3 (2,8 - 16,5)	115 (72 - 304)**	7 (5 - 11)	1,3 (0,6 - 4,3)

Nota: Variáveis contínuas apresentadas como mediana e intervalo interquartis (25%-75%).

1º IAM com SST, IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, IAM com SST com infarto prévio; cTnI, troponina I em ng/mL; CK, creatinoquinase em U/L; CK-MB (atividade) - creatinoquinase fração MB em U/L; PCRu - proteína C reativa em mg/dL; T_0 , primeira colheita; T_2 , segunda colheita após 2 h; T_{12} , terceira colheita após 12 h; T_{24} , quarta colheita após 24 h; T_{36} , quinta colheita após 36 h; T_{48} , sexta colheita após 48 h;

Em negrito, concentrações acima dos valores de referência: cTnI, até 1,0 ng/mL; CK, homens < 232 U/L; CK-MB (atividade), 0 a 6 U/L; PCRu, até 1,1 mg/dL (Ferreira et al. 2005). *, $p = 0,03$ para teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre 1º IAM com SST T_{36} e 2º IAM com SST T_{36} ; **, $p=0,02$ para teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre os tempos de 1º IAM com SST T_{48} e 2º IAM com SST T_{48} .

As demais comparações entre os tempos de 1º IAM com SST e 2º IAM com SST, não foram diferentes significativamente para o teste não paramétrico de *Mann-Whitney* ($p > 0,05$).

4.2 ANÁLISE TRANSCRIPTÔMICA

4.2.1 Preparação dos dados de expressão gênica diferencial por microarranjo de DNA

Após extração de RNA total do sangue periférico de 76 amostras dos pacientes dos grupos 1º IAM com SST (cinco pacientes em sete tempos de colheita, totalizando trinta amostras), 2º IAM com SST (cinco pacientes em sete tempos de colheita, totalizando trinta amostras) e grupo controle (seis pacientes em um único tempo de colheita) foram preparadas e avaliadas suas concentrações e integridades para então serem inseridos nos microarranjos *GeneChip® Exon 1.0 ST Array* (Affymetrix, Santa Clara, EUA). Entretanto, somente 63 amostras estavam aptas para serem utilizadas para análises de expressão gênica em larga escala.

As distribuições das intensidades das sondas após leitura dos microarranjos de DNA através do equipamento - *GeneChip® Scanner 3000 7G* (Affymetrix, Santa Clara, EUA) foram normalizadas pelo método de RMA, através do programa EC. O resultado está apresentado na forma de gráfico de caixa de Box (*BoxPlot*), Figura 10. Nota-se que após a normalização, as intensidades são reduzidas a uma distribuição comum, permitindo uma comparação mais correta e não-tendenciosa. Nesta representação gráfica é possível observar que a amostra HT1 (indicada pela seta) apresenta uma distribuição de intensidade ligeiramente discrepante, em relação às demais amostras, após a normalização.

Figura 10. Distribuição em gráfico *BoxPlot* das intensidades das sondas em escala logarítmica (eixo Y) por amostras (eixo X). A, corresponde à distribuição antes da normalização pelo método RMA; B, após normalização. A linha vermelha representa a mediana das intensidades antes e após normalização.

Os controles exógenos inseridos antes da hibridização das amostras, controle *Bac spikes*, evidenciam que não houve problemas nas últimas etapas de processamento das amostras, pois mantiveram a concentração das mesmas e as intensidades nas seguintes proporções recomendadas: $\text{bioB} < \text{bioC} < \text{bioD} < \text{cre}$ (Figura 11). Já com relação aos controles *Poly spikes*, ainda que as proporcionalidades das intensidades destes, não se mantiveram constantes em todas as amostras: $\text{lys} \leq \text{phe} < \text{thr} < \text{dap}$, nota-se que há uma homogeneidade da distribuição das mesmas, com exceção da amostra HT1 (indicada pela seta, Figura 12), sugerindo que houve perda do material durante o processamento, resultando na diminuição das intensidades destes controles nesta amostra.

Figura 11. Distribuição gráfica das intensidades das sondas em escala logarítmica (eixo Y) dos *Bac spikes Controls* por amostras (eixo X).

Figura 12. Distribuição gráfica das intensidades das sondas em escala logarítmica (eixo Y) dos *Poly spikes Controls* por amostras (eixo X).

Por fim, os dados normalizados e sumarizados pelo método RMA, foram importados para o programa *Partek® GS for Exon Data* (Partek, St. Louis, EUA), para análise em PCA-3D, e novamente foi observado que a amostra HT1 (indicada com a seta, Figura 13) está fora da distribuição gráfica do seu grupo 2º IAM com SST. A mesma foi excluída das análises de expressão gênica, totalizando ao final 55 amostras, Tabela 5.

Figura 13. **Análise de componente principal, representado em tridimensão dos dados normalizados pelo método RMA.** Seta aponta a amostra HT1, que se encontra distanciada graficamente das demais amostras. Cada ponto representa uma amostra.

Nota: GC, grupo controle; 1º IAM com SST, grupo de pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, grupo de pacientes com IAM com SST com infarto prévio; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12 h; T₂₄, quarta colheita após 24 h; T₃₆, quinta colheita após 36 h; T₄₈, sexta colheita após 48 h.

Os dados brutos das 55 amostras restantes foram novamente submetidos à normalização pelo método *Quantile Normalization*, sumarizados pelo algoritmo iterPLIER e sucessivos filtros através do programa APT sob interface gráfica do programa *oneChannelGUI v.1.8.8*. Os filtros aplicados para gene nível foram: *Setting to 0 log2 intensity below 1*; *Filtering by IQR*; *Filtering on DABG p-value*, sucessivamente (Figura 14). Observa-se que após esta etapa, as intensidades das sondas tendem a uma

distribuição normal, importante para a execução dos testes estatísticos. O total de genes a serem avaliados antes dos filtros, era 22.011, após este processo houve uma redução de 25 %, totalizando 16.417 genes.

Tabela 5. Número absoluto da distribuição de amostras processadas e selecionadas, após avaliação dos controles de qualidade para os grupos 1º IAM com SST, 2º IAM com SST e controle.

	1º IAM com SST (5)	2º IAM com SST (4)	GC (6)
T ₀	5	3	6
T ₂	5	4	-
T ₁₂	4	3	-
T ₂₄	5	3	-
T ₃₆	5	4	-
T ₄₈	5	3	-
1ANO	5	2	-
Total	34	22	6

Nota: GC, grupo controle; 1º IAM com SST, grupo de pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, grupo de pacientes com IAM com SST com infarto prévio; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12 h; T₂₄, quarta colheita após 24 h; T₃₆, quinta colheita após 36 h; T₄₈, sexta colheita após 48 h.

Figura 14. Histograma das intensidades dos sinais antes (A) e após a aplicação da sequência de filtros: *Setting to 0 log2 intensity below*, *Filtering by IQR* e *Filtering on DABG p-value*.

Nota: Número de genes avaliados inicialmente era 22.011, após aplicação do conjunto de filtros reduziu para 16.417 genes.

4.2.2 Expressão gênica diferencial por microarranjo de DNA

4.2.2.1 Genes diferentemente expressos em 1º IAM com SST

Observou-se 29 genes com intensidades estatisticamente diferentes na primeira colheita para 1º IAM com SST em relação aos controles ($p < 0.001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$; Tabela 6). Dezesesseis genes apresentam expressão aumentada e 13 com expressão diminuída em relação ao controle.

Nos demais tempos de colheita realizados foram observados 410, 111, 6, 33 e 34 genes diferentemente expressos quando comparados com controle, correspondentes respectivamente aos tempos T_2 , T_{12} , T_{24} , T_{36} e T_{48} ($p < 0.001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$; Tabelas 1 a 5 no anexo D). Considerando todos os tempos de colheitas avaliados, podemos verificar que 513 genes estão diferentemente expressos em relação aos indivíduos não infartados nas primeiras 48 h após IAM nos indivíduos que sofreram o primeiro infarto.

Ao comparar os resultados obtidos entre os tempos de colheitas para 1º IAM com SST utilizando os Diagramas de *Venn* (Figura 15), verificou-se que 15 dos 29 genes presentes na primeira colheita para 1º IAM com SST mantiveram-se alterados significativamente em T_2 . Contudo, somente 2 genes, RNC3 e MYL4, mantiveram-se diferentemente expressos durante aproximadamente 36 h após IAM. A representação destes 29 genes diferentemente expressos, de acordo com as demais as primeiras 48 h avaliadas, pode ser observado na Tabela 8, setas apontadas para cima ($\uparrow$ em vermelho) indicam genes com expressão significativamente elevadas em relação ao controle e, setas apontadas para baixo ($\downarrow$ em verde) genes com expressão significativamente reduzidas em relação ao controle. Nota-se que após intervenção coronariana percutânea os genes apresentam maior diferença de intensidade logaritmica de expressão em relação ao controle para a segunda colheita (maior quantidade de setas representadas na coluna T_2 , Tabela 7).

Tabela 6. Genes diferencialmente expressos no grupo 1º IAM com SST T₀.

ACC	Gene	CytoBand	Descrição	FC	p*	FDR
NM_002164	INDO	8p12-p11	<i>indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase</i>	1,57	0,00095	0.273
NM_001078177	SLC29A1	6p21.2- p21.1	<i>solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1</i>	1,42	0,00001	0.047
NM_018667	SMPD3	16q22.1	<i>sphingomyelin phosphodiesterase 3, neutral membrane (neutral sphingomyelinase II)</i>	1,33	0,00027	0.194
NM_005582	CD180	5q12	<i>CD180 molecule</i>	1,28	0,00029	0.194
NM_024592	SRD5A3	4q12	<i>steroid 5 alpha-reductase 3</i>	1,28	0,00010	0.157
NM_003656	CAMK1	3p25.3	<i>calcium/calmodulin-dependent protein kinase I</i>	1,26	0,00005	0.096
NM_138983	OLIG1	21q22.11 13q14.12-	<i>oligodendrocyte transcription factor 1</i>	1,20	0,00047	0.228
NM_020377	CYSLTR2	q21.1	<i>cysteinyl leukotriene receptor 2</i>	1,17	0,00088	0.273
NM_001002841	MYL4	17q21- qter	<i>myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic</i>	1,12	0,00092	0.273
NM_000757	CSF1	1p21-p13	<i>colony stimulating factor 1 (macrophage)</i>	1,11	0,00002	0.047
NM_015178	RHOBTB2	8p21.3	<i>Rho-related BTB domain containing 2</i>	1,05	0,00019	0.194
NM_014042	C11orf51	11q13.4 11q12.2-	<i>chromosome 11 open reading frame 51</i>	1,04	0,00039	0.219
NM_013402	FADS1	q13.1	<i>fatty acid desaturase 1</i>	1,01	0,00095	0.273
NM_002084	GPX3	5q23	<i>glutathione peroxidase 3 (plasma)</i>	1,03	0,00062	0.255
NM_006186	NR4A2	2q22-q23	<i>nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2</i>	1,06	0,00067	0.263
NM_004444	EPHB4	7q22	<i>EPH receptor B4</i>	1,07	0,00046	0.228
NM_001081640	PRKDC	8q11	<i>protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide</i>	1,19	0,00095	0.273
NM_001432	EREG	4q13.3	<i>epiregulin</i>	1,23	0,00024	0.194
NM_020650	RCN3	19q13.33	<i>reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain</i>	1,30	0,00002	0.047
NM_003855	IL18R1	2q12	<i>interleukin 18 receptor 1</i>	1,36	0,00031	0.194
NM_022136	SAMSN1	21q11	<i>SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1</i>	1,36	0,00001	0.047
NM_183013	CREM	10p11.21 17p13.1-	<i>cAMP responsive element modulator</i>	1,41	0,00001	0.047
NM_002616	PER1	p12	<i>period homolog 1 (Drosophila)</i>	1,53	0,00026	0.194
NM_003749	IRS2	13q34	<i>insulin receptor substrate 2</i>	1,63	0,00030	0.194
NM_003246	THBS1	15q15	<i>thrombospondin 1</i>	1,76	0,00048	0.228
NM_018728	MYO5C	15q21	<i>myosin VC</i>	1,82	0,00056	0.236
NM_024693	ECHDC3	10p14	<i>enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3</i>	2,13	0,00003	0.063
NM_001657	AREG	4q13-q21	<i>amphiregulin (schwannoma-derived growth factor)</i>	2,22	0,00001	0.047
NM_198153	TREML4	6p21.1	<i>triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4</i>	3,57	0,00096	0.273

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Citogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); $p < 0,001$ e FC- *Fold Change* $\pm 1,0$ referente ao teste LIMMA para 1º IAM com STT T₀ e controle; FDR, p valor ajustado por *False Discover Rate*.

Figura 15. Diagrama de Venn dos genes diferentemente expressos em 1º IAM com SST e os demais tempos de colheita.

Nota: Número total de genes entre parênteses e representado sob o diagrama; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12 h; T₂₄, quarta colheita após 24 h; T₃₆, quinta colheita após 36 h.

Tabela 7. Representação dos 29 genes diferencialmente expressos em 1º IAM com SST T₀ em relação às demais 48 h avaliadas após IAM.

	T ₀	T ₂	T ₁₂	T ₂₄	T ₃₆	T ₄₈
RCN3	↑	↑ ↑	↑	↑	↑	.
MYL4	↓	↓ ↓	↓ ↓	.	↓	.
SLC29A1	↓	↓	↓	.	.	.
SMPD3	↓	↓ ↓	↓	.	.	.
GPX3	↑	↑ ↑	.	.	.	.
PRKDC	↑	↑ ↑ ↑	.	.	.	.
THBS1	↑	↑ ↑ ↑	.	.	.	.
IRS2	↑	↑ ↑ ↑	.	.	.	.
MYO5C	↑	↑ ↑ ↑	.	.	.	.
SAMSN1	↑	↑ ↑	.	.	.	.
CAMK1	↓	↓	.	.	.	.
CREM	↑ ↑	↑	.	.	.	.
IL18R1	↑	↑ ↑	.	.	.	.
ECHDC3	↑ ↑	↑ ↑ ↑	.	.	.	.
EPHB4	↑	↑	.	.	.	.
TREML4	↑ ↑ ↑	.	↑ ↑ ↑	.	.	.
AREG	↑	.	.	.	.	.
CSF1	↓	.	.	.	.	.
CYSLTR2	↓	.	.	.	.	.
RHOBTB2	↓	.	.	.	.	.
C11orf51	↓	.	.	.	.	.
SRD5A3	↓	.	.	.	.	.
CD180	↓	.	.	.	.	.
OLIG1	↓	.	.	.	.	.
NR4A2	↑	.	.	.	.	.
INDO	↓	.	.	.	.	.
EREG	↑	.	.	.	.	.
FADS1	↓	.	.	.	.	.
PER1	↑	.	.	.	.	.

Nota: Gene de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); “↑”, gene com diferença de expressão aumentada em relação ao controle; “↓”, gene com diferença de expressão diminuída em relação ao controle; Quantidade de setas representa maior diferença de intensidade logarítmica de expressão em relação ao controle; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h.

4.2.2.2 Genes diferencialmente expressos em 2º IAM com SST

Observou-se 8 genes com intensidades estatisticamente diferentes na primeira colheita para o 2º IAM com SST em relação aos controles ($p < 0.001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$; Tabela 8). Cinco genes apresentam expressão aumentada e 3 com expressão diminuída em relação ao controle.

Nos demais tempos de colheita realizados foram observados 13, 50, 17, 22 e 25 genes diferencialmente expressos, quando comparados com o controle, correspondentes

respectivamente aos tempos T_2 , T_{12} , T_{24} , T_{36} e T_{48} ($p < 0.001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$; Tabelas 7 no anexo D). Considerando todos os tempos de colheitas avaliados, pode-se observar que 111 genes estão diferentemente expressos nas primeiras 48 h após IAM, para os indivíduos com infarto prévio em relação aos controles.

Tabela 8. Genes diferencialmente expressos em relação ao grupo 2º IAM com SST T_0 .

ACC	Gene	CytoBand	Descrição	FC	p^*	FDR
NM_000561	GSTM1	1p13.3	glutathione S-transferase M1	-2,41	0,0000	0.4646
3809750	NA	NA	NA	-1,33	0,0002	0.6513
NM_004987	LIMS1	2q12.3-q13	LIM and senescent cell antigen-like domains 1	-1,13	0,0009	0.9951
NM_003284	TNP1	2q35-q36	transition protein 1 (during histone to protamine replacement)	-1,11	0,0007	0.9999
NM_001112724	STK32A	5q32	serine/threonine kinase 32A	-1,03	0,0001	0.9999
NM_000804	FOLR3	11q13	folate receptor 3 (gamma)	1,59	0,0003	0.9999
NM_001866	COX7B	Xq21.1	cytochrome c oxidase subunit VIIb	1,70	0,0006	0.9999
NM_002692	POLE2	14q21-q22	polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)	1,88	0,0004	0.9999

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Cytogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm 1,0$; $p < 0,001$ referente ao teste LIMMA para 2º IAM com STT T_0 e controle; FDR, p valor ajustado por *False Discover Rate*.

Ao comparar os resultados obtidos entre os tempos de colheitas para 2º IAM com SST utilizando os Diagramas de *Venn*, verificou-se que 5 dos 8 genes presentes na primeira colheita para 1º IAM com SST estiveram presentes nos demais tempos de colheita, sendo dois destes, os genes GSTM1 e FOLR3, que se mantiveram diferentemente expressos durante as 48 h após IAM, Tabela 10. Na Tabela 10, setas apontadas para cima ($\uparrow$ em vermelho) indicam genes com expressão significativamente elevadas em relação ao controle e, setas apontadas para baixo ($\downarrow$ em verde) genes com expressão significativamente reduzidas em relação ao controle. Nota-se que *GSTM1* atinge maior diferença de intensidade logarítmica de expressão em relação ao controle aproximadamente após 36 h (maior quantidade de setas representadas na coluna T_{36} , Tabela 9).

Tabela 9. Representação dos 8 genes diferencialmente expressos em 2º IAM com SST T₀ em relação às demais 48 h avaliadas após IAM.

Gene	T ₀	T ₂	T ₁₂	T ₂₄	T ₃₆	T ₄₈
GSTM1	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓↓	↓
FOLR3	↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑
POLE2	↑	↑	.	.	↑	.
COX7B	↑	.	↑	↑	.	.
TNP1	↓	.	.	.	.	↑
3809750	↓	.	.	.	.	.
STK32A	↓	.	.	.	.	.
LIMS1	↓	.	.	.	.	.

Nota: Gene de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); “↑”, gene com diferença de expressão aumentada em relação ao controle; “↓”, gene com diferença de expressão diminuída em relação ao controle; Quantidade de setas representam maior diferença de intensidade de expressão; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h.

4.2.2.3 Intersecção entre os resultados de expressão gênica de 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.

Ao comparar os pacientes com 1º IAM com SST com os pacientes com 2º IAM com SST não foram observadas diferenças de expressão de RNAm significativas ($p > 0,05$, dados não apresentados).

Entretanto ao comparar os resultados de cada grupo em relação ao controle (1º IAM com SST, total 513 genes; 2º IAM com SST, total 111 genes), verificou-se que 25 genes são comuns aos pacientes infartados em relação aos indivíduos controle, de acordo com os dados de expressão gênica obtidos através da análise de microarranjo de DNA (Figura 16). Na Tabela 10 são apresentados os 25 genes selecionados.

Figura 16. Diagrama de Venn dos genes diferencialmente expressos em 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.

Nota: Número total de genes entre parênteses e representados sob o diagrama. 1º IAM com SST, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, pacientes com IAM com SST com infarto prévio.

Tabela 10. Lista dos 25 genes diferencialmente expressos comuns entre os pacientes dos grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.

ACC/ AffyID	Gene	CytoBand	Descrição
NM_138340	ABHD3	18q11.2	<i>abhydrolase domain containing 3</i>
NM_138450	ARL11	13q14.3	<i>ADP-ribosylation factor-like 11</i>
NM_001114735	BCL2A1	15q24.3	<i>BCL2-related protein A1</i>
NM_001077350	C16orf35	16p13.3	<i>chromosome 16 open reading frame 35</i>
BC093004	C18orf32	18q21.1	<i>chromosome 18 open reading frame 32</i>
NM_152607	C1orf177	1p32.3	<i>chromosome 1 open reading frame 177</i>
NM_003885	CDK5R1	17q11.2	<i>cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35)</i>
NM_203497	COMMD6	NA	<i>COMM domain containing 6</i>
NM_052889	COP1	NA	<i>caspase-1 dominant-negative inhibitor pseudo-ICE</i>
NM_001866	COX7B	Xq21.1	<i>cytochrome c oxidase subunit VIIb</i>
NM_005213	CSTA	3q21	<i>cystatin A (stefin A)</i>
NM_024693	ECHDC3	10p14	<i>enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3</i>
NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>
NM_203391	GK	Xp21.3	<i>glycerol kinase</i>
NM_001024599	HIST2H2BF	1q21.2	<i>histone cluster 2, H2bf</i>
NM_000608	ORM2	9q32	<i>orosomucoid 2</i>
NM_020650	RCN3	19q13.33	<i>reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain</i>
NM_024945	RMI1	9q21.32	<i>RM1, RecQ mediated genome instability 1, homolog (S. cerevisiae)</i>
NM_001078177	SLC29A1	6p21.2-p21.1	<i>solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1</i>
NM_173078	SLITRK4	Xq27.3	<i>SLIT and NTRK-like family, member 4</i>
NM_024592	SRD5A3	4q12	<i>steroid 5 alpha-reductase 3</i>
NM_003414	ZNF267	16p11.2	<i>zinc finger protein 267</i>
3722318	NA	NA	NA
2599936	NA	NA	NA
3145955	NA	NA	NA

Nota: ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); AffyID, código do fabricante para genes ainda não descritos no banco de dados públicos; Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Citogenetic Band*).

A representação do perfil destes 25 genes diferentemente expressos pode ser observada na Tabela 11, setas apontadas para cima (↑ em vermelho) indicam genes com expressão significativamente elevadas em relação ao controle e, setas apontadas para baixo (↓ em verde) genes com expressão significativamente reduzidas em relação ao controle. Nota-se ausência dos genes selecionados na primeira colheita de 1º IAM com SST, que fazem parte destes 25 genes, *SRD5A3*, *SLC29A1*, *ECHDC3* e *RCN3* (4 dos 29 genes diferentemente expressos, Tabela 7), estiveram presentes no segundo grupo ao mesmo tempo, os três primeiros foram observados em 2º IAM com SST em T₂ e o último gene em 2º IAM com SST em T₄₈ (Tabela 11). O mesmo para os genes *FOLR3* e *COX7B* presentes na primeira colheita de 2º IAM com SST (2 dos 8 genes diferentemente expressos, Tabela 9), foram diferentemente expressos após intervenção coronária percutânea em 1º IAM com SST e após aproximadamente 36 h. Observa-se

que 76% (19 genes em **negrito**) são detectados como diferentemente expressos nas primeiras colheitas para 1º IAM com SST e em 2º IAM com SST. Em dezesseis por cento (4 genes em *itálico*) observaram-se o contrário, ou seja: primeiro nos pacientes com 2º IAM com SST e depois em 1º IAM com SST.

Tabela 11. Representação dos 25 genes diferencialmente expressos em 1º IAM com SST e 2º IAM com SST em relação às demais 48 h avaliadas após IAM.

Gene	1º IAM com SST						2º IAM com SST					
	T0	T2	T12	T24	T36	T48	T0	T2	T12	T24	T36	T48
SRD5A3	↓	.	.	.	.	.	.	↓	.	.	.	.
SLC29A1	↓	↓	↓	.	.	.	.	↓	.	.	.	.
ECHDC3	↑↑	↑↑↑	.	.	.	.	.	↑	.	.	.	.
RCN3	↑	↑	↑	.	↑	.	.	.	.	.	.	↑
ABHD3	.	↑	↑	.	.	.	.	.	↑	↑	.	.
C16orf35	.	↓	↓	.	↓	.	.	.	↓	.	.	.
BCL2A1	.	↑	↑	.	.	.	.	.	↑	↑	.	.
HIST2H2BF	.	↑	↑	.	.	.	.	.	↑	.	.	.
C1orf177	.	↓	.	.	.	.	.	.	↓	↓	.	.
GK	.	↑	↑	.	.	.	.	.	↑	.	.	.
ARL11	.	↑	↑	.	.	.	.	.	.	↑	.	.
RMI1	.	.	↑	.	↑	.	.	.	.	↑	↑	.
ZNF267	.	.	↑	.	↑	↑	.	.	.	.	↑	.
SLITRK4	.	.	↑	.	↑	.	.	.	.	.	↑	.
COP1	.	↑	↑	.	.	.	.	.	.	.	↑	.
C18orf32	.	↑	.	.	.	↑	.	.	.	.	↑	.
CSTA	.	↑	.	.	.	↑	.	.	.	↑	.	.
2599936*	.	↑	↑	.	↑	↑	.	.	.	.	↑	.
<i>FOLR3</i>	.	↑	↑	.	.	.	↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑
<i>3145955*</i>	.	.	.	↑	.	↑	.	.	↑	.	.	.
<i>COX7B</i>	.	.	.	.	↑	↑	↑	.	↑	↑	.	.
<i>COMMD6</i>	.	.	.	.	.	↑↑	.	.	.	↑↑	.	.
<i>3722318*</i>	.	.	.	.	.	↑↑	.	.	.	↑↑	.	.
ORM2	.	↑	.	.	.	.	.	↑	.	.	.	.
CDK5R1	.	↑	.	.	.	.	.	↑	.	.	.	.

Nota: Gene de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organisation*); “↑”, gene com diferença de expressão aumentada em relação ao controle; “↓”, gene com diferença de expressão diminuída em relação ao controle; Quantidade de setas representa maior diferença de intensidade de expressão; * código AffyID para genes ainda não descritos no banco de dados públicos; em **negrito**, genes detectados como diferentemente expressos primeiro em 1º IAM com SST que em 2º IAM com SST; em *itálico*, genes detectados como diferentemente expressos primeiro em 2º IAM com SST que em 1º IAM com SST; 1º IAM com SST, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, pacientes com IAM com SST com infarto prévio; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h.

4.2.3 Validação técnica pela PCR em tempo real

4.2.3.1 Seleção de genes-candidatos para validação técnica

De acordo com os critérios de seleção apresentados em materiais e métodos, no item “*Seleção de genes-candidatos para validação técnica*” foram selecionados 33 genes diferentemente expressos através das análises dos resultados obtidos por microarranjo de DNA a serem validados tecnicamente pela PCR em tempo real, a partir das mesmas amostras utilizadas anteriormente neste estudo. A lista de genes-candidatos foi previamente apresentada na Tabela 1.

A seguir são comentados os principais motivos pelos quais estes genes foram selecionados, de acordo com a ordem de prioridade esclarecida em materiais e métodos.

Os genes GPX3, CREM, IRS2, THBS1 e PER1 foram selecionados por preencherem as exigências do critério de seleção 1. Estes 5 genes foram diferentemente expressos na primeira colheita para 1º IAM com SST e já foram associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA ($p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$).

Os genes RCN3, SLITRK4, SLC29A1, COX7B, BCL2A1, ECHDC3 e FOLR3, foram selecionados por preencherem as exigências do critério de seleção 2. Estes 7 genes fazem parte da lista dos 25 genes diferentemente expressos comuns entre os grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST (Tabela 11), e já foram associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA ($p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$).

Os genes AREG, CSF1, SAMSN1 e TREML4 foram selecionados por preencherem as exigências do critério de seleção 3. Estes 4 genes foram diferentemente expressos na primeira colheita para 1º IAM com SST de acordo com o cálculo de p-valor ajustado por FDR $< 0,05$, embora não estejam associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA.

Os três genes ADORA3, IL5RA e GSTM1 foram diferentemente expressos em mais de um tempo de colheita para 1º IAM com SST ($p < 0,001$ e *Fold Change* $\pm 1,0$) e estão associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA e preenchem as exigências do critério de seleção 4.

Já os 4 genes: MYO5C, SMPD3, IL18R1, MYL4 e POLE2, são genes diferentemente expressos na primeira colheita para 1º IAM com SST ou 2º IAM com

SST que não estão associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA e p-valor ajustado por FDR > 0,05. Critério de seleção 5.

Finalmente os 9 genes: TLR4, IL1R1, ABCA1, IL1RL1, ALOX15, KCNE1, MMP9, CA1 e BCL2L1 foram selecionados por apresentarem-se diferentemente expressos na segunda ou na terceira colheita para 1º IAM com SST ($p < 0,001$, p-valor ajustado por FDR < 0,05), além de estarem associados com doença arterial coronariana e/ou com o desenvolvimento cardiovascular em estudos anteriores de acordo com IPA.

O gene GAPDHS foi eleito como gene de referência para a quantificação relativa pela PCR em tempo real por apresentar intensidade de expressão ($8,33 \pm 0,39$, média $\pm$ DP em escala logarítmica) próxima às intensidades de expressão dos genes-candidatos selecionados ($7,34 \pm 1,48$, média $\pm$ DP em escala logarítmica) e coeficiente de variação menor que os demais genes de referência nestas condições. Os resultados desta avaliação encontram-se na Tabela 12.

Tabela 12. Seleção dos genes de referência para validação técnica pela PCR em tempo, ordenados pela intensidade de expressão logarítmica da população estudada.

Gene	Descrição	Intensidades (Sanges et al.)	CV
ACTB	<i>actin, beta</i>	$12,33 \pm 0,20$	0,04
UBC	<i>ubiquitin C</i>	$10,4 \pm 0,34$	0,11
B2M	<i>beta-2-microglobulin</i>	$11,87 \pm 0,35$	0,12
GAPDHS	<i>glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase</i>	$8,33 \pm 0,39$	0,13
SDHB	<i>succinate dehydrogenase complex, subunit B</i>	$8,42 \pm 0,39$	0,13
SDHA	<i>succinate dehydrogenase complex, subunit A</i>	$9,37 \pm 0,39$	0,15
CDKN1B	<i>cyclin-dependent kinase inhibitor 1B</i>	$9,05 \pm 0,42$	0,18
YWHAZ	<i>tyrosine 3-monooxygenase</i>	$10,17 \pm 0,45$	0,20
TBP	<i>TATA box binding protein</i>	$7,19 \pm 0,51$	0,26
PPIA	<i>peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)</i>	$7,27 \pm 0,61$	0,37
HPRT1	<i>hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1</i>	$8,08 \pm 0,64$	0,41
HMBS	<i>hydroxymethylbilane synthase</i>	$6,89 \pm 0,70$	0,48
HMGB2	<i>high-mobility group box 2</i>	$8,18 \pm 0,80$	0,64

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); Intensidade em escala logarítmica apresentada como média $\pm$ DP; CV, coeficiente de variação.

4.2.3.2 Resultados da validação técnica pela PCR em tempo real

Os resultados da quantificação relativa dos 33 genes-candidatos pela PCR em tempo real, foram comparados com a média das intensidades logarítmicas dos mesmos, pelas análises de microarranjo de DNA. Os resultados de correlação de *Spearman* são apresentados na Tabela 13.

Dez genes apresentaram alta correlação entre os dados de microarranjo de DNA e PCR em tempo real, que são: CA1, THBS1, MYL4, BCL2L1, COX7B, GSTM1,

POLE2, MMP9, ALOX15 e FOLR3 ($r \geq 0,70$; $p < 0,05$). Treze genes apresentaram correlação moderada: IL1RL1, AREG, PER1, SMPD3, SLC29A1, BCL2A1, KCNE1, TREML4, IRS2, ECHDC3, IL5RA, IL18R1 e ABCA1 (r entre 0,46 – 0,69; $p < 0,05$). Seis genes apresentaram baixa correlação, SLITRK4, IL1R1, CSF1, SAMSN1, GPX3 e ADORA3 ($r \leq 0,45$; $p < 0,05$).

Não se observou correlação entre os dados de microarranjo de DNA e a PCR em tempo real para três genes: MYOC5, CREM, RCN3 e TLR4 ($p > 0,05$).

Tabela 13. Correlação de *Spearman* para os resultados de expressão gênica obtida pela técnica de microarranjo de DNA e PCR em tempo real.

Gene	<i>r</i>	<i>P</i>
CA1	0,90	7,67E-19
THBS1	0,87	2,02E-16
MYL4	0,84	2,12E-14
BCL2L1	0,81	6,55E-13
<i>COX7B</i>	0,79	1,05E-11
<i>GSTM1</i>	0,78	1,46E-11
POLE2	0,76	9,19E-11
MMP9	0,75	3,09E-10
<i>ALOX15</i>	0,75	3,06E-10
FOLR3	0,74	6,18E-10
<i>IL1RL1</i>	0,67	7,01E-8
AREG	0,64	5,17E-7
PER1	0,60	4,83E-6
<i>SMPD3</i>	0,58	1,00E-5
<i>SLC29A1</i>	0,58	1,05E-5
<i>BCL2A1</i>	0,57	1,77E-5
<i>KCNE1</i>	0,56	1,40E-4
<i>TREML4</i>	0,53	7,71E-5
<i>IRS2</i>	0,52	9,65E-5
<i>ECHDC3</i>	0,51	1,3E-4
<i>IL5RA</i>	0,51	1,40E-4
<i>IL18R1</i>	0,48	3,60E-4
ABCA1	0,47	4,60E-4
SLITRK4	0,42	2,30E-3
IL1R1	0,41	2,80E-3
CSF1	0,39	5,00E-3
SAMSN1	0,37	9,00E-3
<i>GPX3</i>	0,30	0,03
ADORA3	0,29	0,04
MYO5C	0,27	0,06
<i>CREM</i>	0,22	0,13
RCN3	0,18	0,19
TLR4	0,16	0,26

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); *r*, coeficiente de correlação; *p*, teste de correlação não paramétrica por *teste de Rank de Spearman*; em negrito, genes que apresentaram correlação forte entre os dados de expressão obtidos pela PCR em tempo real e microarranjo de DNA; em itálico, genes que apresentaram correlação moderada entre os dados de expressão obtidos pela PCR em tempo real e microarranjo de DNA.

4.2.4 Validação biológica pela PCR em tempo real

Foram selecionados 20 genes com correlação positiva moderada a forte ($r > 0,45$ e $p < 0,05$) para a etapa de validação biológica pela PCR em tempo real em uma nova casuística, isto é, pacientes do grupo SCA para validação biológica e grupo controle para validação biológica.

Oito genes, ALOX15, CA1, COX7B, ECHDC3, IL18R1, KCNE1, MMP9 e MYL4 selecionados previamente como genes candidatos a biomarcadores de doença cardiovascular por análise de expressão gênica a partir de microarranjo de DNA, apresentaram expressão gênica diferencial entre os pacientes com SCA e indivíduos do grupo controle, independente de infarto prévio ($p < 0,05$, Tabela 13). Ainda que somente dois destes, COX7B e ECHDC3, haviam sido eleitos por pertencerem à lista dos 25 genes comuns entre os grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST (Tabela 11). Possivelmente por ter apresentado maior sensibilidade à PCR em tempo real do que no microarranjo de DNA.

Nas etapas anteriores, o gene AREG foi selecionado por apresentar-se diferentemente expresso exclusivamente na primeira colheita para 1º IAM com SST (p -valor ajustado por FDR $< 0,05$). Nesta etapa de validação, curiosamente observou-se que através da PCR em tempo real, o mesmo foi diferentemente expresso, somente quando comparado com o grupo controle e 1º SCA ($p = 0,02$, Tabela 14). Resultado semelhante era esperado para o gene TREML4, contudo, foi diferentemente expresso somente quando comparado com o grupo controle e 2º SCA ($p = 0,01$, Tabela 14).

O gene BCL2A1 foi diferentemente expresso pela análise dos dados da PCR em tempo real, somente quando se exclui da análise de pacientes do sexo feminino e indivíduos com idade > 65 anos ($p = 0,03$ teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre 2º SCA e controle); o gene BCL2L1, ao excluir indivíduos com idade > 65 anos ($p = 0,01$ teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre 2º SCA e controle), e gene IRS2, ao excluir indivíduos > 65 anos, mulheres e diabéticos ($p = 0,04$, teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre SCA e controle).

Vale ressaltar que assim como nas análises de microarranjo de DNA não se observaram diferenças significativas quando comparados os resultados de expressão entre os grupos 1º SCA e 2º SCA ($p > 0,05$, dados não apresentados).

A possível justificativa para a não validação dos demais genes-candidatos, pode ser atribuída às características clínicas e antropométricas presentes na casuística selecionada para validação biológica estudada, uma vez que para a análise de expressão

de RNAm por microarranjo de DNA, recrutou-se pacientes com IAM com SST exclusivamente do sexo masculino, idade entre 36 a 65 anos e não diabético.

Tabela 14. Resultados da expressão gênica diferencial, pela PCR em tempo real, dos genes selecionados pela validação biológica a partir dos grupos 1º SCA, 2º SCA e controle.

Gene	Gcb	1º SCA	p+	2º SCA	P*
ALOX15	0,055 (0,026 - 0,074)	0,021 (0,008 - 0,062)	0.03	0,025 (0,003 - 0,063)	0.05
AREG	0,003 (0,001 - 0,016)	0,008 (0,004 - 0,015)	0.02*	0,004 (0,002 - 0,010)	0.49
BCL2A1†	1,481 (0,814 - 3,534)	1,032 (0,621 - 2,682)	0.28	1,006 (0,570 - 1,183)	0.03**
BLC2L1+	0,037 (0,028 - 0,065)	0,033 (0,018 - 0,061)	0.44	0,022 (0,016 - 0,031)	<0,01**
CA1	0,006 (0,002 - 0,012)	0,002 (0,001 - 0,007)	0.02	0,001 (0,001 - 0,003)	<0,01
COX7B	0,202 (0,150 - 0,268)	0,128 (0,113 - 0,161)	<0,01	0,139 (0,116 - 0,221)	<0,01
CREM	0,001 (0,001 - 0,002)	0,001 (0,000 - 0,002)	0.84	0,001 (0,001 - 0,001)	0.15
ECHDC3	0,005 (0,003 - 0,008)	0,010 (0,006 - 0,028)	<0,01	0,012 (0,007 - 0,020)	0.00
FOLR3	0,050 (0,031 - 0,210)	0,061 (0,032 - 0,259)	0.61	0,061 (0,032 - 0,117)	0.90
GPX3	0,002 (0,001 - 0,003)	0,002 (0,001 - 0,003)	0.16	0,002 (0,001 - 0,004)	0.46
GSTM1	0,008 (0,001 - 0,017)	0,007 (0,001 - 0,015)	0.40	0,009 (0,002 - 0,016)	0.93
IL18R1	0,008 (0,007 - 0,014)	0,018 (0,008 - 0,036)	<0,01	0,017 (0,008 - 0,028)	0.01
IL1R1	0,002 (0,001 - 0,004)	0,001 (0,001 - 0,003)	0.31	0,002 (0,000 - 0,003)	0.45
IRS2#	0,186 (0,111 - 0,259)	0,325 (0,132 - 0,911)	0.07	0,369 (0,213 - 0,747)	0.186
KCNE1	0,135 (0,105 - 0,395)	0,048 (0,017 - 0,253)	<0,01	0,061 (0,018 - 0,140)	<0,01
MMP9	0,276 (0,223 - 0,532)	0,505 (0,288 - 1,066)	0.01	0,569 (0,345 - 0,956)	0.02
MYL4	0,006 (0,002 - 0,013)	0,003 (0,002 - 0,005)	0.03	0,002 (0,001 - 0,006)	<0,01
PER1	0,031 (0,017 - 0,063)	0,043 (0,029 - 0,088)	0.11	0,034 (0,022 - 0,077)	0.40
POLE2	0,002 (0,002 - 0,004)	0,003 (0,002 - 0,004)	0.60	0,003 (0,002 - 0,004)	0.70
SMPD3	0,013 (0,007 - 0,020)	0,009 (0,004 - 0,026)	0.23	0,011 (0,005 - 0,018)	0.45
THBS1	0,075 (0,049 - 0,272)	0,062 (0,047 - 0,134)	0.21	0,080 (0,059 - 0,182)	0.71
TREML4	0,008 (0,002 - 0,017)	0,008 (0,001 - 0,019)	0.99	0,028 (0,016 - 0,039)	<0,01**

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); expressão relativa apresentada como mediana e intervalo interquartis (25%-75%); Gcb, grupo controle para validação biológica; 1º SCA, grupo de pacientes com Síndrome Coronária Aguda sem infarto prévio; 2º IAM com SST, grupo de pacientes com Síndrome Coronária Aguda com infarto prévio; em negrito genes com $p < 0,05$ para comparar os grupos Gcb, 1º SCA e 2º SCA por testes não paramétricos de *Kruskal-Wallis*; * teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre 1º SCA e Gcb; ** teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre 2º SCA e Gcb; † foram excluídos da análise os pacientes do sexo feminino e com idade > 65 anos; + foram excluídos da análise pacientes com idade > 65 anos; # valores referentes após exclusão de pacientes com idade > 65 anos, do sexo feminino e diagnosticados com angina instável.

Os perfis de expressão dos genes supracitados obtidos através das análises por microarranjo de DNA e PCR em tempo real, de acordo com o intervalo de tempo investigado, estão representados em formas gráficas na Figura 17. Vale ressaltar que os resultados numéricos de expressão de RNAm estão em escalas distintas, uma vez que o processamento dos dados são específicos para cada metodologia.

Além dos tempos de colheitas referentes às primeiras 48 h da admissão hospitalar, nesta análise foram incluídos os valores de intensidade de expressão quantificados no

tempo de colheita 1 ANO, isto é, momento posterior pelo qual os pacientes do grupo IAM com SST não apresentam evento agudo de isquemia (resultado averiguado através da dosagem sérica de cTnI e CK-MB, e anamnese. Não foram registrados eventos de reinfarto durante este período de um ano – dados não apresentados).

O objetivo principal foi avaliar se os genes diferentemente expressos observados nas primeiras 48 h após IAM, retornaram às concentrações normais após um ano, isto é, com intensidade de expressão semelhante ao grupo controle. Contudo devido ao número amostral reduzido (5 pacientes com 1º IAM com SST, 5 pacientes com 2º IAM com SST e 6 controles), os resultados devem ser observados com cautela.

Através das análises por microarranjo de DNA observa-se que os genes AREG (Figura 17C), BCL2A1 (Figura 17E) e TREML4 (Figura 17W), apresentam-se diferentemente expressos para os pacientes do grupo 1ºIAM com SST no tempo de colheita 1 ANO em relação aos controles ($p < 0,05$). Já na análise pela PCR em tempo real, com as mesmas amostras utilizadas nas análises de microarranjo (durante a validação técnica), observou-se diferenças significativas em 2º IAM com SST no tempo de colheita 1 ANO para os genes CA1 (Figura 17J), COX7B (Figura 17M) e MYL4 (Figura 17X). Estudos futuros devem ser propostos no intuito de esclarecer o real papel destes genes e sua relação com a SCA a longo prazo, bem como sua possível aplicação como marcador de doença cardiovascular.

Já para os demais genes: ALOX15 (Figura 17A e B), BCL2L1(Figura 17G e H), ECHDC3 (Figura 17M e N), IL18RL1 (Figura 17O e P), IRS2 (Figura 17Q e R), KCNE1 (Figura 17S e T) e MMP9 (Figura 17U e V), observa-se que em ambas as técnicas estudadas, as concentrações após um ano não foram diferentes significativamente em relação ao controle, o que sugere que estes genes sejam marcadores de SCA.

Curiosamente observa-se um padrão de expressão similar entre os genes: ECHDC3 (Figura 17M e N), IL18RL1 (Figura 17O e P), IRS2 (Figura 17Q e R), KCNE1 (Figura 17S e T) e MMP9 (Figura 17U e V), um perfil semelhante a uma curva de Gauss deslocada para a esquerda, com o valor de expressão máxima após intervenção coronariana percutânea em T₂. Outros perfis facilmente observados estão entre os genes: ALOX15 (Figura 17A e B), BCL2L1(Figura 17G e H), CA1 (Figura 17J e K), COX7B (Figura 17M e N) e MYL4 (Figura 17X e Y), semelhante à um parábola, com valor de expressão mínimo nas primeiras 12 h.

Por fim, o gene TREML4 se destaca de todos os demais, por apresentar valores para o grupo controle não detectáveis pela PCR em tempo real (83% pacientes com valores negativo), em contrapartida, este gene apresenta valores elevados para os pacientes com IAM com SST (14% pacientes com valores negativos) (Figura 17Y).

Para averiguar a especificidade diagnóstica dos potenciais biomarcadores validados biologicamente frente a SCA, isto é, no diagnóstico de angina instável, IAM sem SST e IAM com SST, realizou-se análises estatística da quantificação relativa de RNAm entre as entidades supracitadas versus o grupo controle, representadas na Figura 18. Contudo, os resultados devem ser observados com cautela, devido ao número amostral reduzido quando estratificados por critério de diagnóstico, principalmente para os pacientes com diagnóstico de IAM com SST (7 pacientes, conforme apresentado na Tabela 3).

Interessante comentar que para os genes ALOX15 e KCNE1 observa-se expressão de RNAm descrente de acordo com o critério de diagnóstico, valores de mediana para o grupo com angina instável maiores que no grupo IAM sem SST, que por sua vez, foram maiores que no IAM com SST; já para os genes AREG, ECHDC3, IRS2, IL18R1 e MMP9 nota-se valores de medianas de expressão menores para o grupo com angina instável que no grupo IAM sem SST, que por sua vez, foram menores que no IAM com SST, possivelmente indicando uma associação destes genes com a gravidade da síndrome.

Figura 17. Perfis de expressão dos genes ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECHDC3, IL18R1, IRS2, KCNE1, MMP9, MYL4 e TREML4 do GC e durante os tempos de segmento investigados, nos subgrupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST. Gráficos à esquerda, medianas, intervalos de máximo e mínimo das intensidades dos genes obtidos pelas análises por microarranjo de DNA. Gráficos a direita, medianas, intervalos de máximo e mínimo das quantificações relativas de expressão dos genes pela PCR em tempo real.

Nota: GC, grupo controle representado em cor azul; 1IAM, subgrupo correspondente a indivíduos sem história prévia de IAM com SST, representado em cor verde; 2IAM, subgrupo de indivíduos com história prévia de IAM com SST, representado em cor bege; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após intervenção coronária percutânea; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h; 1ANO, sétima colheita correspondente a aproximadamente um ano após IAM; * $p < 0,05$ para teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre GC e respectivos tempos de colheita de cada subgrupo, 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.

Figura 18. Representação gráfica na forma de caixa dos valores de expressão dos genes ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECHDC3, IL18R1, IRS2, KCNE1, MMP9, MYL4 e TREML4 divididos em GC, Angina instável, IAM sem SST e IAM com SST.

Nota: *, valores de expressão relativa fora do intervalo inter-quartil; °, valores extremos; GC, grupo controle; ANGINA, angina instável; p -valor, teste não paramétrico de *Mann-Whitney* entre GC e respectivos grupos de angina instável, IAM sem SST e IAM com SST.

4.3 ANÁLISE PROTEÔMICA

O estudo proteômico proposto neste estudo, consiste em avaliar o perfil das proteínas plasmáticas em pacientes com IAM com SST durante as 48 h após evento da dor precordial e em indivíduos controles pareados.

Inicialmente foram detectados através da metodologia de SELDI-TOF/MS 11.334 picos correspondentes à possíveis proteínas plasmáticas. Após seleção de proteínas com intensidade logarítmica significativamente acima do valor da intensidade do ruído de fundo ($p < 0,01$ e *Fold Change* $\pm 1,5$), resultando em 3.844 espectros de massa molecular entre 1.127,5 Da e 17.993,5 Da, os dados foram submetidos às análises comparativas entre os grupos IAM com SST e controle.

4.3.1 Proteínas diferentemente expressas em 1º IAM com SST

Observou-se 53 espectros de proteínas plasmáticas com intensidades estatisticamente diferentes na primeira colheita para 1º IAM com SST em relação aos controles ($p < 0,05$; Tabela 1, anexo E). Vinte e três destas têm massa molecular entre 2.128 a 6.109 Da, apresentam expressão aumentada e trinta espectros proteicos com massa molecular entre 6.362,5 a 17.807,5 Da, com expressão diminuída em relação ao controle.

Nos demais tempos de colheita realizados, foram observados 91, 329, 84, 88 e 123 espectros de proteínas plasmáticas diferentemente expressas quando comparados com controle, correspondentes respectivamente aos tempos T₂, T₁₂, T₂₄, T₃₆ e T₄₈ ($p < 0,05$; Tabelas 2 a 6, anexo E). Considerando todos os tempos de colheitas avaliados pode-se dizer que 479 possíveis proteínas estão diferentemente expressas em relação aos indivíduos não infartados nas primeiras 48 h após IAM para os indivíduos sem infarto prévio.

Os perfis de expressão das 53 proteínas observadas em 1ºIAM T₀ em relação aos demais tempos de colheita estão representados através do agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana, na Figura 19. Vinte das 23 proteínas com expressão aumentada se apresentaram elevadas após 48 h ($p < 0,05$); contudo somente 3 destas, com massa molecular de 2.128 Da, 2.150 Da e 2.195 Da (p -valor $< 0,05$), mantiveram-se elevadas durante todos os tempos de colheitas avaliados, para este subgrupo de IAM. Sete espectros de proteínas, com massa molecular de 2.135,5 Da, 2.158 Da, 2.180,5 Da, 2.182 Da, 2.183,5 Da, 4.267 Da e 6.109 Da, estiveram com expressão aumentada significativamente apenas na primeira colheita ($p < 0,05$). Dezoito das 30 proteínas com

expressão diminuída também foram observadas elevadas após 48 h ($p < 0.05$); sendo 11, com massa molecular de 9.217 Da, 14.494 Da e entre 17.888 a 17.807,5 Da; $p < 0.05$) mantiveram-se elevadas durante todos os tempos de colheitas avaliados, para este subgrupo de IAM. Dois espectros de proteínas, com massa molecular de 11.842 Da e 15.460 Da, estiveram com expressão reduzida significativamente apenas na primeira colheita ($p < 0.05$).

Figura 19. Agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana das proteínas diferentemente expressas em 1º IAM com SST T₀.

Nota: Escala de cores entre azul e vermelho e valores sobre as células correspondem a *Fold Change*. Proteína com maior diferença de expressão aumentada em relação ao controle, representa coloração vermelha mais intensa, maior diferença de expressão diminuída representa coloração azul mais intensa. *m/z*, relações massas moleculares e cargas das moléculas ionizadas; 1º IAM com SST, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12 h; T₂₄, quarta colheita após 24 h; T₃₆, quinta colheita após 36 h; T₄₈, sexta colheita após 48 h; símbolo negativo (-), proteínas com expressão diminuída; símbolo positivo (+), proteínas com expressão aumentada.

4.3.2 Proteínas diferentemente expressas em 2º IAM com SST

Selecionou-se 36 espectros de proteínas plasmáticas com intensidades estatisticamente diferentes na primeira colheita para o grupo 2º IAM com SST ($p < 0.05$; Tabela 7, anexo E). Somente dois espectros de proteínas menores, com massas moleculares de 3.755,5 Da e 5.432 Da, apresentam expressão aumentada em relação ao controle, os demais 24 espectros, com massa molecular entre 6.386,5 Da a 17.825,5 Da, apresentam expressão diminuída em relação ao controle.

Nos demais tempos de colheita avaliados nos pacientes 2º IAM com SST foram observados 27, 23, 4, 13 e 19 espectros de proteínas plasmáticas diferentemente expressas correspondendo aos tempos T_2 , T_{12} , T_{24} , T_{36} e T_{48} , respectivamente ($p < 0.05$; dados apresentados na Tabela 7, anexo E). Considerando todos os tempos de colheitas avaliados, podemos dizer que 76 possíveis proteínas estão diferentemente expressas nas primeiras 48 h após IAM nos indivíduos com histórico prévio de IAM.

Os perfis de expressão das 36 proteínas observadas em 2º IAM T_0 em relação aos demais tempos de colheita estão representados através do agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana, Figura 20. As duas possíveis proteínas com expressão aumentada, com massa molecular de 3.755,5 Da e 5.432 Da, não se apresentaram diferentemente expressas nos demais tempos estudados ($p > 0,05$). Sete das 34 proteínas com expressão diminuída também foram observadas elevadas após 48 h ($p < 0.05$). Contudo apenas a proteína de massa molecular de 6.482,5 Da manteve-se elevada durante todos os tempos de colheitas avaliados para os pacientes do grupo 2º IAM com SST ($p < 0.05$). Treze espectros de proteínas, com massa molecular de 8.653 Da, 12.686,5 Da, 12.689,5 Da, 14.566 Da, 14.570,5 Da, 15.443,5 Da, 15.446,5 Da, 17.797 Da, 17.803 Da, 17.804,5 Da, 17.806 Da, 17.807,5 Da e 17.825,5 Da, apresentaram expressão reduzida significativamente em relação ao controle, apenas na primeira colheita ($p < 0.05$).

Figura 20. Agrupamento hierárquico com base na distância Euclidiana das proteínas diferentemente expressas em 2º IAM com SST T₀.

Nota: Escala de cores entre azul e vermelho e valore sobre as células correspondem a *Fold Change*. Proteína com maior diferença de expressão aumentada em relação ao controle representa coloração vermelha mais intensa, maior diferença de expressão diminuída representa coloração azul mais intensa. *m/z*, relações massas moleculares e cargas das moléculas ionizadas; 2º IAM, pacientes com IAM com infarto prévio; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12 h; T₂₄, quarta colheita após 24 h; T₃₆, quinta colheita após 36 h; T₄₈, sexta colheita após 48 h; símbolo negativo (-), proteínas com expressão diminuída; símbolo positivo (+), proteínas com expressão aumentada.

4.3.3 Intersecção entre os resultados protéicos de 1º IAM com SST e 2º IAM com SST

Ao comparar as listas dos espectros correspondentes às possíveis proteínas diferentemente expressas, de acordo com suas massas moleculares, observa-se que 60 possíveis proteínas plasmáticas são comuns entre 1º IAM com SST e 2º IAM com SST nas primeiras 48 h após evento, Figura 21A.

Vinte e três espectros de proteínas não foram significativamente diferentes na primeira colheita para ambos subgrupos (porção superior do Diagrama de *Venn*, Figura 21B). Vinte espectros observados na primeira colheita para 2º IAM com SST estiveram presentes em outros tempos de colheitas, que não na primeira para 1º IAM com SST, o mesmo pode ser descrito para um único espectro observado na primeira colheita para 1º IAM com SST em relação a 2º IAM com SST (Figura 21B). Já, 36 espectros diferentemente expressos em 1º IAM com SST foram exclusivos à primeira colheita deste grupo (Figura 21B). Por fim, pode-se concluir que 16 espectros de proteínas, com massa molecular entre 6.386,5 Da a 17.807,7 Da, foram comuns entre os grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST para a primeira colheita realizada no Pronto-Socorro antes do tratamento médico ser instituído (intersecção do Diagrama de *Venn*, Figura 21B).

Ao comparar as listas dos espectros protéicos correspondentes a possíveis proteínas diferentemente expressas, de acordo com suas massas moleculares, observa-se que 60 possíveis proteínas plasmáticas são comuns entre 1º IAM com SST e 2º IAM com SST nas primeiras 48 h após evento, Figura 21A.

Vinte e três espectros de proteínas não foram significativamente diferentes na primeira colheita para ambos subgrupos (porção superior do Diagrama de *Venn*, Figura 19B). Vinte espectros observados na primeira colheita para 2º IAM com SST estiveram presentes em outros tempos de colheitas, que não na primeira para 1º IAM com SST, o mesmo pode ser descrito para um único espectro observado na primeira colheita para 1º IAM com SST em relação a 2º IAM com SST, Figura 18B. Já, os 36 espectros protéicos diferentemente expressos em 1º IAM com SST foram exclusivos à primeira colheita e a este grupo, Figura 18B. Por fim, pode-se concluir que 16 espectros de proteínas, massa molecular entre 6386,5 Da a 17807,7 Da, foram comuns entre os grupos 1º IAM com SST e 2º IAM com SST para a primeira colheita realizada no Pronto-Socorro antes do tratamento médico ser instituído, Figura 21B.

Figura 21. **Diagrama de Venn entre os resultados de expressão proteica de 1º IAM com SST e 2º IAM com SST.**

A. Resultado total obtido durante às 48 h após IAM para 1º IAM com SST (479 proteínas) e 2º IAM com SST (76 proteínas). B. Proteínas comuns entre os grupos durante as 48 h após IAM (Intersecção, 60 proteínas) frente as proteínas no primeiro tempo de colheita para 1º IAM com SST (53 proteínas) e 2º IAM com SST (36 proteínas).

Nota: Número total de espectros de proteínas em parênteses e representado sob o diagrama. 1º IAM com SST, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2º IAM com SST, pacientes com IAM com SST com infarto prévio; $\cap$, intersecção entre 1º IAM com SST e 2º IAM com SST; T_0 , primeira colheita.

Os 16 espectros de proteínas diferentemente expressos nos pacientes com IAM com SST permitem distinguir os indivíduos infartados dos controles através de uma análise gráfica de PCA-3D, Figura 22. A média das intensidades dos 16 espectros em relação a massa molecular e carga da molécula ionizada está expressa na Tabela 15.

Ainda que estas 16 possíveis proteínas estejam presentes em ambos os grupos IAM com SST nas amostras colhidas no primeiro momento após IAM, o perfil destas durante as 48 h evidencia diferenças entre os grupos (Figura 23). Treze das 16 proteínas selecionadas manifestaram-se com expressões significativamente reduzidas após 48 h para 1º IAM com SST ($p < 0.05$), já nos pacientes com 2º IAM com SST apenas três apresentaram perfil semelhante após 48 h, massa molecular de 8.437 Da, 9217 Da e 9.226 Da ($p < 0.05$).

Figura 22. Análise de componente principal em terceira dimensão das 16 possíveis proteínas em IAM com SST.

Nota: Cada esfera representa um paciente. GC, grupo controle; 1° IAM, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2° IAM, pacientes com IAM com SST com infarto prévio; T₀, primeira colheita.

Tabela 15. Espectros de proteínas diferentemente expressas comuns entre a primeira colheita para 1° IAM com SST e 2° IAM com SST.

<i>m/z</i>	GC		1° IAM com SST T ₀				2° IAM com SST T ₀				ASC
	Media	DP	Media	DP	<i>p</i> *	FC	Media	DP	<i>p</i> +	FC	
6386.5	1435.86	445.43	581.33	516.57	0.04	-2.47	615.8	249.42	0.01	-2.33	0.93
6394	2013.43	629.37	837.7	567.79	0.02	-2.4	785.2	297.64	0.01	-2.56	0.94
8437	1940.71	864.57	807.1	492.11	0.04	-2.4	687.4	547.86	0.04	-2.82	0.91
9217	1782.86	436.69	772.51	407.53	0.01	-2.31	805	284.37	0	-2.21	0.98
9226	1462.14	522.12	662.6	340.72	0.02	-2.21	616.96	390.66	0.03	-2.37	0.90
10547.5	932.79	251.4	451.5	274.21	0.03	-2.07	439.56	260.7	0.03	-2.12	0.94
10757.5	558.79	184.91	223.28	137.43	0.02	-2.5	261.19	133.5	0.03	-2.14	0.96
10760.5	530.07	163.2	199.94	133.22	0.01	-2.65	244.8	136.54	0.03	-2.17	0.95
15446.5	238.19	92.52	88.09	88.83	0.05	-2.7	66.07	80.28	0.02	-3.61	0.90
17788	547.07	179.58	254.22	154.14	0.03	-2.15	283.75	133.13	0.05	-1.93	0.90
17792.5	565.43	198.52	238.37	149.32	0.02	-2.37	280.4	134.46	0.04	-2.02	0.91
17797	572.93	217.82	245.81	127.66	0.02	-2.33	267.36	130.8	0.04	-2.14	0.91
17803	560.53	243.18	230.1	97.45	0.03	-2.44	238.38	124.05	0.04	-2.35	0.92
17804.5	566.34	242.63	220.07	94.76	0.02	-2.57	228.74	121.2	0.03	-2.48	0.93
17806	569.93	240.93	213.93	86.24	0.02	-2.66	226.94	114.26	0.03	-2.51	0.93
17807.5	561.89	236.84	215.09	77.18	0.02	-2.61	225.12	109.01	0.03	-2.5	0.93

Nota: Valores apresentados em média e DP. *m/z*, relações massas moleculares e cargas das moléculas ionizadas; 1° IAM com SST, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2° IAM, pacientes com IAM com SST com infarto prévio; T₀, primeira colheita; ASC, área sob a curva calculada para IAM com SST (considerando os dois grupos juntos) e controle; símbolo negativo (-), proteínas com expressão diminuída

*, *p* valor para 1° IAM T₀ com SST e controle;

+, *p* < 0.05 para 2° IAM T₀ com SST e controle.

Figura 23. Perfil por *Fold Change* em relação ao tempo das proteínas diferentemente expressas comuns entre a primeira colheita para 1° IAM com SST e 2° IAM com SST.

Nota: Proteínas ordenadas por m/z . Escala de cores entre azul e vermelho e valor sobre as células correspondentes a *Fold Change*. Proteína com maior diferença de expressão, aumentada em relação ao controle representa coloração vermelha mais intensa, maior diferença de expressão diminuída representa coloração azul mais intensa.

m/z , relações massas moleculares e cargas das moléculas ionizadas; 1° IAM com SST, pacientes com IAM com SST sem infarto prévio; 2° IAM, pacientes com IAM com SST com infarto prévio; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após 2 h; T₁₂, terceira colheita após 12 h; T₂₄, quarta colheita após 24 h; T₃₆, quinta colheita após 36 h; T₄₈, sexta colheita após 48 h; símbolo negativo (-), proteínas com expressão diminuída; símbolo positivo (+), proteínas com expressão aumentada.

*, $p < 0.05$ para 1° IAM com SST e controle;

+, $p < 0.05$ para 2° IAM com SST e controle.

5

DISCUSSÃO

A busca por biomarcadores de doenças cardiovasculares potencialmente úteis no diagnóstico precoce do SCA através do sangue periférico, bem como a compreensão dos mecanismos envolvidos na desestabilização da placa aterosclerótica e a resposta do organismo frente à lesão endotelial e do miocárdio são grandes desafios nas pesquisas em cardiologia. Dados do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia registram um total de 36.000 pacientes atendidos em 2003 (média de 3.050/mês), com taxa anual de internação hospitalar de 6,2% (2.287 pacientes/ano). Desta taxa, 860 (37,6%) pacientes tinham o diagnóstico de síndrome coronariana aguda (SCA), sendo o diagnóstico na alta hospitalar de 78 pacientes com IAM com SST e 754 com SCA sem SST (dos Santos et al. 2006).

Nas ultimas duas décadas, nenhum marcador bioquímico foi descrito para melhorar a sensibilidade e a qualidade de diagnóstico e prognóstico nas doenças cardiovasculares que pudessem contribuir de forma significativa. Isto significa que pouco se tem investido em melhoria no diagnóstico laboratorial destas afecções. Com as informações obtidas pelos projetos genoma, transcriptoma, HapMap realizadas nos grandes centros de pesquisa dos países desenvolvidos, vários marcadores em câncer, Diabetes *Mellitus*, síndrome de Alzheimer e outras doenças de importância epidemiológica foram descritos. Graças aos avanços tecnológicos e da bioinformática através das plataformas de grande alcance e alto desempenho, como as plataformas de microarranjo de DNA e *SELDI-TOF/MS*, contribuem sensivelmente para a melhor compreensão destes eventos e abriram portas a novos questionamentos a serem investigados.

Neste estudo, através da análise transcriptômica por microarranjo de DNA, observou-se 599 genes diferentemente expressos nas primeiras 48 h após IAM com SST em relação ao controle. A partir de uma seleção biológica através do programa *Ingenuity Pathways Analysis* (IPA) (*Ingenuity® Systems*, Califórnia, EUA), 33 genes foram eleitos para validação técnica pela PCR em tempo real, que corresponde a apenas 5% do total. O número limitado de genes eleitos se deve a limitação da quantidade de RNA total restante após utilizá-lo para análises em microarranjo de DNA.

Vinte e nove genes eleitos (88%) apresentaram correlação positiva entre as duas metodologias, sendo que 23 com correlação moderada a alta ($r > 0,46$), assim sendo, é

possível que mais genes não selecionados estejam de fato diferentemente expressos nos pacientes com IAM com SST. Entretanto ao investigar a expressão destes em uma nova casuística (74 pacientes com SCA e 41 controles) verificou-se que 13 genes (65% de 20 genes eleitos para validação biológica), realmente apresentam diferenças de expressão significativas entre os pacientes com SCA e controle.

Alguns autores observaram correlações variadas quando analisam amostras idênticas entre as técnicas de microarranjo de DNA e PCR em tempo real (Barros Filho, 2009). Folgueira e colaboradores (2009) avaliaram o perfil de expressão em amostras de câncer de mama através de microarranjo de DNA e, ao determinar pela PCR em tempo real a expressão de alguns genes selecionados, observaram correlação significativamente positiva em 6/8 genes (75%) entre os ensaios e de 4/6 genes (67%) em uma nova casuística. Dallas e colaboradores (2005) procurando observar a correlação entre as duas técnicas: microarranjo de DNA e PCR em tempo real, em estudo de 48 genes, verificaram que 33 genes (69%) apresentam correlação estatisticamente significativa. O mesmo autor enfatiza a importância em validar os resultados antes da interpretação dos dados de expressão gênica (Dallas et al. 2005).

Certamente o principal motivo de uma maior concordância de expressão quando avaliada por microarranjo de DNA e PCR em tempo real, observada neste estudo, foi a escolha dos oligonucleotídeos iniciadores para a PCR em regiões semelhantes das sondas do microarranjo de DNA, pois iniciadores em regiões distintas pode resultar na quantificação de diferentes transcritos, como por exemplo, produtos de *splicing* alternativo. Esta estratégia foi possível graças ao desenho dos *GeneChip® Human Exon 1.0 ST Array*, em que apresenta 4 sondas em cada exon, gerando uma maior cobertura da expressão de cada gene.

Contudo, o microarranjo de DNA é uma técnica de quantificação de RNAm distinta da PCR em tempo real. O microarranjo avalia a expressão global de milhares de transcritos em um único ensaio, principalmente com a finalidade de buscar genes candidatos e determinar o perfil de expressão; e a PCR em tempo real avalia a expressão de transcritos específicos em pequena escala, sendo usualmente utilizada em validação de microarranjos, laboratórios clínicos e de pesquisa (Barros Filho, 2009). Além disso, apresenta diferentes princípios em relação ao método de detecção. No caso do microarranjo de DNA, é realizada a hibridização direta dos transcritos com sequências complementares (sondas) na lâmina, quantificando a expressão pela leitura de fluorescência de streptavidina-ficoeritrina (SAPE) conjugadas com biotina na amostra

hibridizada. A técnica requer maior cuidado experimental, pois envolve uma série de procedimentos laboratoriais de alta complexidade, que podem introduzir variações adicionais aos resultados obtidos, e refinada análise estatística dos dados, pois milhares de sondas são avaliadas em um único ensaio.

Já a PCR em tempo real, a detecção é feita pela amplificação e aumento da emissão de fluorescência proveniente de um produto específico. Como uma variação de 1 Ct (*Cycle threshold*) ao final do ensaio representa o dobro ou metade de transcritos iniciais, erros operacionais podem ser amplificados (Barros Filho, 2009). Lembrando também os diferentes preceitos seguidos pela normalização dos dados e testes estatísticos aplicados em ambas as técnicas.

É importante destacar, que a segunda casuística recrutada, foi composta por uma maior variabilidade de características biológicas, quando comparada com a primeira casuística utilizada para análises por microarranjo de DNA. Controlar as variáveis biológicas em estudos transcriptômicos, foi de extrema relevância, a fim de obter resultado mais fidedigno e melhor poder estatístico, por outro lado, a expressão diferencial pode não representar o evento fisiopatológico a ser investigado.

No presente estudo, os genes BCL2A1, BCL2L1 e IRS2 foram apenas diferentemente expressos em relação aos grupos SCA e controle para validação biológica, quando se excluiu variáveis divergentes entre a primeira e segunda casuística ($p < 0,05$), como pacientes > 65 anos, mulheres e angina instável. Sendo assim, estudos adicionais são necessários com o intuito de avaliá-los como reais marcadores, ainda que estes estejam intimamente relacionados com os demais genes validados neste estudo, como MMP9, ALOX15 e MYL4.

A habilidade das células detectarem pequenas diferenças na combinação específica, concentração e componentes da matriz, sugere que perturbações na homeostase da matriz possibilitem a remodelagem da parede vascular, após lesão vascular (Coats & Faxon 1997; Uzuelli, 2008). As metaloproteinases são endopeptidases zinco-dependentes que regulam a integridade da matriz extracelular, degradam colágeno, elastina e proteínas proteoglicanas. Estão envolvidas em uma variedade de processos fisiológicos: desenvolvimento embrionário, morfogênese, reprodução, reabsorção e remodelagem tecidual, e patológicos: destruição de cartilagem em artrite, metástase tumoral e degeneração da parede arterial, diretamente implicadas na formação e expansão dos aneurismas, reestenose miocárdica, trombo embolia pulmonar e ruptura de placa aterosclerótica (Corbel et al. 2000; Senior et al. 1991).

As metaloproteinases são produzidas por células inflamatórias como neutrófilos e macrófagos, além de células mais indiferenciadas como células neoplásicas e fibroblastos transformados (Keeling et al. 2005) quando estimuladas por IL-1 β , IL-6 e TNF α (Shah 1997). A maioria é secretada livremente no espaço extracelular, mas algumas são estocadas dentro de células, como o MMP9, que se acumula em grânulos de neutrófilos (Hobeika et al. 2007; Nagase et al. 2006).

Também conhecida como gelatinase B, a MMP9 apresenta como substrato os principais colágenos tipo: I, IV, V, VII e X, fibrinogênio e elastina (Keeling et al. 2005). Foi encontrada em pequenas quantidades no tecido aórtico normal, estando associada à inflamação crônica e a grandes quantidades de macrófagos (Thompson et al. 1995; Roggerio, 2008). Estudos recentes demonstraram associação da MMP9 ao remodelamento cardíaco (Yan et al. 2006), instabilidade (Sluijter et al. 2006) e ruptura da placa aterosclerótica (Leclercq et al. 2007) e em diferentes estágios de desenvolvimento dos aneurismas (Wilson et al. 2006).

O gene IL18R1 (expressão aumentada nos SCA, validado biologicamente, $p < 0,05$) essencial para a transdução do sinal da citocina IL18, responsável pela proliferação e migração de células da musculatura lisa para a parede do vaso arterial, contribui para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose (Chandrasekar et al. 2006). A IL18 também foi associada a induzir a transcrição de RNAm do MMP9 via P13K e Akt dependente de AP-1 e NF κ B, promovendo ainda mais a migração e hiperplasia das células da musculatura lisa na neoíntima arterial (Chandrasekar et al. 2006).

Sabe-se que células endoteliais progenitoras, exercem papéis importantes na homeostasia vascular (Hill et al. 2003), na neovascularização, na angiogênese (Rabelink et al. 2004) e na regeneração miocárdica, após IAM (Yoon et al. 2005), alterando possivelmente o perfil de transcritos no sangue periférico total. A progressão de lesões e disfunções endoteliais em doença cardiovascular está relacionada com a depleção dessas células, que por sua vez, estão relacionadas com o estresse oxidativo, com a atividade do óxido nítrico e outros processos fisiológicos (Dandona et al. 2005).

Iwakura e colaboradores (2006) sugerem que MMP9 promova a migração de células progenitoras endoteliais para o local da lesão, uma vez que há acentuado aumento de RNAm de MMP9 em ratos após um dia de IAM induzidos com 17 β -estradiol, juntamente com o aumento de VEGF, mostrando seu papel benéfico após lesão (Iwakura et al. 2006). Fang e colaboradores (2009) observaram a presença de

MMP9 no plasma e aumento da expressão de RNAm em PBMC 3 dias após IAM (Fang 2009).

Neste estudo, em células do sangue periférico, se observou que o gene MMP9 está com expressão significativamente aumentada nos pacientes com SCA, desde o momento da admissão hospitalar em relação ao controle, que corresponde aproximadamente às primeiras horas do início da dor precordial ou retroestenal, sugestiva de isquemia cardíaca (validados biologicamente, $p < 0,05$); e de acordo com o estudo temporal por microarranjo de DNA, a expressão de RNAm do MMP9 apresenta-se como um perfil semelhante a uma curva de Gauss deslocada para a esquerda, com ápice em T₂ e valores próximos ao controle após 24 h e após um ano.

O gene AREG também com expressão de RNAm significativamente aumentada nos pacientes com 1º SCA em relação aos controles ($p < 0,05$), e após um ano para os pacientes com 1ºIAM com SST ($p < 0,05$) é um importante ligante do receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR), que regula o crescimento das células epiteliais (Charoenrat et al. 2000). Charoenrat e colaboradores (2000) observaram em modelo celular de câncer de cabeça e pescoço que o aumento de expressão do gene AREG eleva os níveis de RNAm de MMP9 e VEGF, estimulando o processo angiogênico e metastático tumoral.

Já os genes IRS2 e MYL4 (validados biologicamente, $p < 0,05$) fazem parte da sinalização da ILK (do inglês *integrin liked kinase*) juntamente com MMP9. ILK é uma proteína responsável por conectar integrinas com o citoesqueleto celular, fundamental para organização celular pós-lesão cardíaca, de acordo com IPA (2010).

O papel do gene ALOX15 na aterosclerose ainda não está claro, há estudos *in vitro* e em modelos animais que sugerem seu efeito pró-aterosclerótico, como também seu efeito antiaterosclerótico (Wittwer & Hersberger 2007). O ácido araquidônico é um ácido graxo livre que, quando liberado das membranas celulares, pode ser metabolizado por ciclo-oxigenase, citocromo P450 e lipoxigenase (LOX) gerando a forma biologicamente ativa, tais como prostaglandinas, leucotrienos e ácidos hidroxieicosatetraenóicos (HETEs) (Kudo & Murakami 2002). ALOX15 é membro da família LOX, responsável por metabolizar o ácido araquidônico em 15-HETE (Chen et al. 1994) juntamente com GPX3 (Loscalzo 2001). ALOX15 foi isolado em leucócitos, cérebro, rim e vasos sanguíneos (Wittwer & Hersberger 2007).

O gene ALOX15 aumenta a captação de LDL oxidada por macrófagos via aumento da expressão de receptor *scavenger* CD36 (Huang et al. 1999). O 15-HETE e

metabólito do ácido linoléico pela a enzima LOX12 (13-HODE) se ligam ao receptor do ativador proliferativo de peroxissoma isoforma gama (PPAR γ), que atuam como fator de transcrição do gene do receptor *scavenger* CD36, favorecendo a formação de células espumosas, caracterizando seu papel aterogênico. Por outro lado, também se observou que 13-HODE é ligante do receptor do ativador proliferativo de peroxissoma isoforma alfa (PPAR α) dos macrófagos, ativando a transcrição do gene ABCA1, favorece o efluxo do colesterol para o extracelular (Hersberger & von Eckardstein 2003).

Em um estudo caso-controle com 498 caucasianos verificou-se que a presença do genótipo -292TT do gene ALOX15 está em menor frequência em pacientes com doença arterial coronariana (Wittwer et al. 2007). Pesquisadores demonstraram que alterações na região promotora deste gene, como o polimorfismo descrito acima, aumenta cerca de 3 vezes mais a sua transcrição e atividade (Wittwer et al. 2007).

Em contraposição do efeito pró-aterosclerótico evidências mostram que o 15-HETE apresenta efeito antiinflamatório e inibe a produção de espécies reativas de oxigênio (Smith et al. 1993). Estudo com agonistas de PPAR γ em células da musculatura esquelética demonstrou aumento da expressão de GPX3, diminuindo os níveis de peróxidos de hidrogênio extracelular (ação antioxidante) (Chung et al. 2009). Alguns autores também observaram que a ativação dos PPARs pelos metabólitos dos genes ALOX15 e LOX12 reduz a expressão de IL-1 β , IL-6 e TNF α , reduzindo a expressão de MMP9 (Marx et al. 1998; Ricote et al. 1998; Shu et al. 2000).

No presente estudo, surpreendentemente observou-se que na fase aguda de isquemia cardíaca, os pacientes com SCA apresentam uma diminuição significativa de RNAm do gene ALOX15 juntamente com o aumento significativo de MMP9, quando comparado com indivíduos controles (validados biologicamente, $p < 0,05$); e de acordo com o estudo temporal por microarranjo de DNA, a expressão de RNAm do ALOX15 se apresenta como um perfil próximo a uma parábola (concentração menor em T₂₄). Além disso, os resultados sugerem uma possível associação destes genes com a gravidade da síndrome, isto é, nota-se uma maior diferença de expressão nos pacientes com IAM com SST que nos pacientes com IAM sem SST, que por sua vez, naqueles diagnosticados com angina instável. Desta forma, leva-se ao questionamento, se a expressão diminuída do gene ALOX15 nas células do sangue periférico favorece a instabilidade (Sluijter et al. 2006) e ruptura da placa aterosclerótica (Leclercq et al. 2007) via MMP9; ou a expressão aumentada de MMP9 é uma resposta à lesão,

promovendo a migração de células progenitoras endoteliais para o local da lesão (Iwakura et al. 2006) e remodelamento cardíaco (Yan et al. 2006).

Ariel e colaboradores (2005) mostraram que a atividade de ALOX15 também está envolvida no metabolismo do ácido decosaexanoico (DHA). DHA, pertencente à família do ácido graxo de cadeia longa Omega-3, está associado a benefícios na doença cardiovascular, incluindo diminuição da pressão arterial (Hartweg et al. 2007; Morris et al. 1993), reduzindo a agregação plaquetária (Harrison & Abhyankar 2005) e a concentração plasmática de triglicerídeos (Hersberger & von Eckardstein 2003), como também um efeito antiarrítmico (Harris 2007; von Schacky 2007) e inibindo a infiltração de macrófagos e neutrófilos para o local de lesão e inflamação (Singer et al. 2008).

O produto final do metabolismo de DHA via ALOX15 é o NDP1, que reprime a ativação do gene pró-inflamatório A β 42 e aumenta a expressão dos genes antiapoptóticos Bcl-2, Bcl-xl e Bfl.1(A1), regulando assim, a sinalização de morte celular via caspases em tecido neural de pacientes com Alzheimer (Lukiw et al. 2005). Portanto, a diminuição da expressão de RNAm de ALOX15 pode também estar contribuindo para a baixa expressão de BCL2A1 e BCL2L1 (validados biologicamente, $p < 0,05$).

Trabalho realizado com apêndice atrial direito de pacientes com fibrilação atrial revela que a baixa expressão de BCL2A1 contribua negativamente para preservação destas células (Kharlap et al. 2006). Acredita-se que a diminuição de BCL2A1 favoreça ao processo apoptótico, uma vez que deixa de exercer seu papel de protetor celular (Harb et al. 2008).

Estudo com microarranjo de DNA com células do sangue periférico de mulheres japonesas expostas ao metal pesado cádmio, mostra a expressão de RNAm significativamente reduzida dos genes BCL2A1 e COX7B (validados biologicamente, $p < 0,05$), com aumento de GPX3 ($p < 0,05$, para análise por microarranjo de DNA) e caspases 9 (Dakeshita et al. 2009). O autor sugere que a presença do metal pesado ative o processo apoptótico celular, envolvendo este grupo gênico mitocondrial; justificativa possível para o quadro gênico observado nos pacientes com SCA.

A diminuição de BCL2L1 aumenta a proliferação celular independente do processo apoptótico (Harb et al. 2008). Curiosamente nota-se que este o gene,

juntamente com MMP9 fazem parte da via de sinalização da IL-8, mediador citoesquelético responsável pela regulação da angiogênese (IPA, 2010).

Em contra partida, em modelo de ratos hipertróficos, verificaram que animais com deficiência de ALOX15 estão mais protegidos a desenvolverem insuficiência cardíaca, uma vez que o aumento de expressão de ALOX15 nos cardiomiócitos aumenta a expressão da proteína-1 quimioatrativa de monócitos (MCP-1), promovendo infiltração de macrófagos, fibrose e disfunção sistólica para o coração, causando a insuficiência cardíaca (Kayama et al. 2009). Assim como a sua deficiência atenua a resposta inflamatória frente às alergias das vias respiratórias de ratos (Andersson. C.K. et al. 2008) e no desenvolvimento de Diabetes *Mellitus* induzido por estreptozotocina (Bleich et al. 1999) e sistema auto-imune (McDuffie et al. 2008).

Alvarez e colaboradores (2007) descreveram a relação entre a anidrase carbônica (CA) e a hipertrofia de cardiomiócitos. Culturas de cardiomiócitos de roedores foram tratadas com PE (fenilefrina) – indutor de hipertrofia, com ou sem metazolamida - inibidor de CA; observaram que cardiomiócitos tratados com PE e inibidores de CA não desenvolvem hipertrofia (Alvarez et al. 2007). Sugerindo assim que os inibidores de CA representam uma aproximação terapêutica para diminuição do fenótipo de hipertrofia, e consequentemente, insuficiência cardíaca. No presente estudo, CA1 apresenta expressão significativamente diminuída no momento de admissão hospitalar dos pacientes com SCA em relação aos controles ($p < 0,05$).

Estudo com ratos submetidos a IAM por oclusão da artéria descendente anterior, mostrou a expressão de RNAm, por microarranjo de DNA, do tecido cardíaco após 1 e 7 dias de isquemia, com total de 135 genes diferentemente expressos; dentre eles, destaca-se os genes ALOX15 e KCNE1 com expressão bastante aumentada somente após 7 dias. O autor sugere que estes genes contribuam para a disfunção da contração muscular, arritmias e insuficiência cardíaca após IAM (Andersson, K.B. et al. 2006). Contudo no presente estudo, KCNE1 apresenta expressão significativamente diminuída no momento de admissão hospitalar dos pacientes com SCA em relação aos controles (validado biologicamente, $p < 0,05$).

Sendo assim, se questiona se a diminuição da expressão de RNAm dos genes ALOX15, CA1, KCNE1 e BCL2L1, em células do sangue periférico, possa ser uma possível resposta sistêmica protetora do organismo frente ao processo isquêmico na SCA.

Neste estudo, também se observou expressão significativamente aumentada do gene TREML4 em pacientes com SCA em relação ao controle (validação biológica, $p < 0,05$ para 2º SCA versus controle). O gene TREML4 faz parte da família TREM (*Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells*) descoberta em 2000, proteínas desta família foram encontradas em monócitos, macrófagos, células dendríticas mielóide, neutrófilos, osteoclastos e em plaquetas (Ford & McVicar 2009), porém seus papéis fisiopatológicos ainda não são completamente conhecidos, acredita-se que exerçam importante papel na regulação da resposta imune inata, frente a microorganismos intracelulares, juntamente com os receptores *toll-like* (TLR) via LPS (Ford & McVicar 2009). Recentemente, Hemmi e colaboradores (2009) observaram a presença da proteína e do RNAm do gene TREML4 em CD8 α (+), células do baço e em conjuntos de macrófagos residentes no baço, e viram que a proteína TREML4 é capaz de reconhecer células mortas por diferentes tipos de fagócitos do baço (Hemmi et al. 2009).

É intrigante observar que alguns estudos propõem a possibilidade de uma efetiva participação na aterogenese de algumas bactérias (Oshima et al. 2005; Maggi et al. 2006; Mussa et al. 2006). Sugere-se que a *Chlamydia pneumoniae* e *Mycoplasma pneumoniae* são os microrganismos que podem estar envolvidos mais diretamente neste processo inflamatório degenerativo de aterosclerose, seja na iniciação do evento ou no processo agudo que provoque a manifestação clínica do infarto (Eryol et al. 2005; Hoshida et al. 2005). Observou-se que TLRs e CD14 reconhecem os componentes celulares de microorganismos e sinalizam a resposta inflamatória e imune inata (Armant and Fenton 2002; Fernandez-Real et al. 2003). A presença destes agentes infecciosos em alguns pacientes com SCA, pode ser a justificativa pela variabilidade de expressão do gene TREML4 durante as primeiras 48 h e após um ano (14% pacientes com SCA com valores de expressão negativos), bem como, a observação de valores negativos para 83% dos indivíduos controles.

Por último, dentro dos genes diferentemente expressos, validados biologicamente pela PCR em tempo real, com pacientes com SCA e controles, também se observou expressão significativamente elevada do gene ECHDC3 (*enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3*; validação biológica, $p < 0,05$), descrito pela primeira vez na literatura em 1996, como um novo inibidor de oxidação de ácidos graxos na mitocôndria (Hashimoto et al. 1996). Porém, até o momento, este gene apresenta uma literatura escassa que auxilie na compreensão da sua associação com o processo

aterosclerótico. Sendo assim, pode-se supor a partir dos resultados transcriptômicos das células do sangue periférico dos pacientes com SCA que o gene recentemente descoberto TREML4, esteja sinalizando a cascata inflamatória do organismo frente à desestabilização da placa aterosclerótica, causada pela possível presença de agentes infecciosos. Frente à diminuição do fluxo sanguíneo nas coronárias, os genes BCL2A1, COX7B e GPX3 estão regulando o processo apoptótico das células cardíacas e endoteliais lesadas. Por outro lado, os genes ALOX15, CA1 e KCNE1 expressam uma resposta sistêmica protetora do desenvolvimento de insuficiência cardíaca frente à oclusão parcial ou total da artéria coronária. E os genes AREG, IL18R1, IRS2, MYL4, BCL2L1 e MMP9 estão sinalizando e/ou promovendo a remodelagem pós-lesão endotelial e cardíaca. Contudo, é possível considerar ainda que os genes ALOX15, IL18R1 e MMP9, tenham ações pró-aterogênicas, envolvidas na progressão e ruptura da placa aterosclerótica, que culmina em SCA. A representação gráfica das interações entre os genes supracitados e eventos biológicos obtidos pelo presente estudo, estabelece uma proposta de caráter mecânico que pode explicar a complexidade envolvida no evento agudo da síndrome coronariana (Figura 22).

Com relação a aproximação é importante destacar que o desenvolvimento da tecnologia baseada na nova geração do sistema de identificação e quantificação como SELDI-TOF/MS, aplicável para uma variedade de amostras clínicas e até mesmo linhas de células (Shiwa et al. 2003), é amplamente utilizado como uma ferramenta para identificar marcadores específicos de doenças e de determinadas condições fisiológicas (Achar et al. 2005). SELDI-TOF/MS também conhecido como *protein profile imprinting* desenvolvido por Hutchens e Yip (Hutchens & Yip 1993), é uma abordagem eficaz que combina cromatografia e espectrometria de massas, oferecendo maior sensibilidade que a separação por eletroforese em gel bidimensional e técnicas tradicionais de imunoenaios para identificação protéica (Xu et al. 2009). Uma grande variedade de proteínas podem ser rapidamente identificadas e quantificadas ao mesmo tempo, fazendo SELDI-TOF/MS um método ideal para a seleção de alto rendimento de biomarcadores, especialmente quando o alvo, a proteína, está presente em baixas concentrações, evitando as limitações da ligação com anticorpos e de analisar apenas proteínas pré-determinadas (de Seny et al. 2005).

Zhang e colaboradores (2009) aplicaram o SELDI-TOF/MS para avaliar o perfil de proteínas do soro de ratos com IAM, induzidos cirurgicamente por obstrução da artéria coronária descendente anterior, durante 5 a 360 minutos após obstrução. Observaram

Nota: Círculo em cor cinza, corresponde à resposta imune inata e sinalização do processo inflamatório; círculo de cor laranja, regulação da apoptose; círculo de cor rosa, remodelagem pós-lesão; círculo de cor azul, resposta protetora à insuficiência cardíaca; círculo de cor verde, ação pró-aterosclerótica. Os genes estão nomeados de acordo com HUGO (*Human Genome Organization*); em vermelho, representa os genes com expressão significativa aumentada nos pacientes em relação aos controles; em verde, genes com expressão significativa diminuída nos pacientes em relação aos controles; amarelo, genes que participam da rede porém a expressão não foi significativamente diferente; traços contínuos, relação com vias de sinalização; setas contínuas, relação direta entre os genes; setas tracejadas, relação indireta entre os genes.

Florian-Kujawski e colaboradores (2004) identificaram através do *ProteinChip* SAX (cromatografia de afinidade aniônica) seguida por SELDI-TOF/MS um conjunto de espectros de proteínas correspondentes à massa entre 10 e 12k Da, presentes no plasma de um terço do total de 100 pacientes com SCA, quando comparados com o perfil protéico plasmático de 25 indivíduos saudáveis pareados com a idade (Florian-Kujawski et al. 2004). Contudo, não informaram em que momento foi realizada a colheita, bem como se os pacientes com SCA apresentavam angina instável, IAM sem SST ou IAM com SST e histórico de medicações prévias ao evento.

No presente estudo, as amostras de plasma foram processadas utilizando o *ProteinChip* H50 seguido por SELDI-TOF/MS, a fim de avaliar o perfil de proteínas plasmáticas nas primeiras 48 h após IAM. Amostras seriadas foram obtidas de pacientes com menos de 8 horas de dor torácica sugestiva de isquemia cardíaca, diagnosticados exclusivamente com IAM com SST, sendo a primeira colheita realizada antes do início do tratamento para IAM. Observou-se diferenças significativas na quantidade de espectros de proteínas diferentemente expressos ao longo das 48 h avaliadas após IAM, para cada tempo de colheita e subgrupos estudados. Para 1º IAM com SST, pacientes sem infarto prévio, foram observados de 53 até 329 espectros de proteínas diferentemente expressos em relação ao controle, sendo a quantidade mínima detectada na primeira colheita e o máximo após aproximadamente 12 h de IAM, respectivamente. Já para 2º IAM com SST, pacientes com infarto prévio que faziam uso de medicações anteriores ao evento, a quantidade mínima de proteínas diferentemente expressas observada, aproximadamente 24 h após IAM, foi 4 espectros de proteínas e a quantidade máxima, logo após o diagnóstico, na primeira colheita, com 36 espectros. Portanto, definir o momento após desestabilização da placa aterosclerótica e as variabilidades biológicas presentes, auxiliam na busca de reais proteínas indicadoras de doenças cardiovasculares, assim como, a diferenciação entre proteínas expressas decorrente da lesão endotelial e resposta aos tratamentos farmacológicos.

Considerando que a primeira colheita de amostra para obtenção de plasma dos indivíduos do grupo 1º IAM com SST foi obtida na fase aguda de isquemia cardíaca e que não há interferência medicamentosa, a caracterização dos 53 espectros de proteínas plasmáticas diferentemente expressos em relação à população saudável, é extremamente relevante para compreender melhor a fisiopatologia das doenças cardiovasculares. Além disso, estas apresentaram alta sensibilidade e especificidade para 1º IAM com SST (cálculo de área sob a curva entre 87 a 99%). Curiosamente os espectros de proteínas

com expressão aumentada apresentam menores pesos moleculares (entre 2.128 a 6.109 Da) do que aqueles com expressão diminuída (entre 6.362,5 a 17.825,5 Da), possivelmente estas são as primeiras moléculas lançadas na circulação como resultado do processo isquêmico dos cardiomiócitos, uma vez que as proteínas e/ou peptídeos menores atravessam membranas celulares mais facilmente do que as proteínas maiores (Zhang, G. et al. 2009). Outra hipótese a ser considerada é que estas estejam no plasma via exossomos circulantes, isto é, partículas recentemente descobertas no plasma que podem conter RNAm, microRNA, proteínas e peptídeos que podem ser transferidos para outras células (Simpson et al. 2009); desempenhando importante papel na comunicação intercelular, em resposta à obstrução arterial, lesão miocárdica ou processo de remodelação cardíaca. No entanto, nenhuma das 23 proteínas com expressões aumentadas, observadas em 1º IAM com SST no tempo de colheita T₀ foram significativamente elevadas em 2º IAM com SST.

Ao avaliar separadamente os pacientes IAM com SST de acordo com infarto prévio, notou-se uma diferença de cerca de seis vezes menos quantidade de proteínas diferentemente expressos no 2º IAM com SST (76 proteínas) em relação ao 1º IAM com SST (476 proteínas). Corroborando com este resultado, a análise de expressão em larga escala de RNAm das células do sangue periférico por microarranjo de DNA, *GeneChip® Human Exon 1.0 ST Array*, revelou também menor quantidade de genes diferentemente expressos no 2º IAM com SST (111 genes) em relação ao 1º IAM com SST (488 genes). Além disso, dos 25 transcritos comuns entre as análises observadas separadamente (1º IAM com SST versus controle; e 2º IAM com SST versus o controle), 76% foram primeiramente detectados nos pacientes sem infarto prévio.

Assim, propõe-se que a utilização de medicamentos anteriores ao evento, como por exemplo, o uso de antiagregantes (presente em 100% dos indivíduos com infarto prévio), estatinas (80%) e betabloqueadores (80%) e diuréticos (20%), estejam inibindo e/ou retardando a expressão de RNAm e proteínas no grupo 2º IAM com SST, ou ainda, haja um processo adaptativo frente à remodelagem, após evento de isquemia cardíaca presente exclusivamente neste grupo.

Todavia, vale ressaltar que genes determinados como diferentemente expressos, exclusivamente para os pacientes do grupo 1º IAM com SST, nas análises por microarranjo de DNA, como por exemplo, os genes IL18R1 e CA1, quando avaliados em uma nova casuística pela PCR em tempo real (74 pacientes com SCA e 41

controles), esta singularidade deixa de existir. Fato este observado em 82% dos genes validados biologicamente.

Por outro lado, todos os 36 espectros de proteínas plasmáticas diferentemente expressos na primeira colheita de 2º IAM com SST, cuja sensibilidade e especificidade variaram entre 86 a 100%, também estiveram no 1º IAM com SST. Vinte destes (55%) foram identificados em outros tempos que não no primeiro momento em 1º IAM com SST, ou seja, após a intervenção farmacológica e coronária percutânea, sendo assim pode-se atribuir a sua expressão diferencial devido à inserção de tratamento e/ou início do processo de remodelagem no 1º IAM com SST.

Contudo na análise transcriptômica por microarranjo de DNA somente o gene: COX7B diferentemente expresso em 2º IAM com SST em T₀ esteve presente em outro tempo de colheita nos indivíduos sem infarto e medicações prévias à admissão hospitalar (Tabela 12). Isso pode ser explicado uma vez que, embora tenha se buscado marcadores de doenças cardiovasculares em pacientes com IAM com SST, através de proteínas plasmáticas e expressão de RNAm do sangue periférico, o resultado pode ser o reflexo de diferentes mecanismos frente a um mesmo processo fisiopatológico investigado. Deste modo, as proteínas plasmáticas, não necessariamente correspondem ao processo de tradução do conjunto de células do sangue periférico que transcrevem os genes diferentemente expressos no momento investigado do IAM, ainda que, em ambos os estudos proteômico e transcriptômico é possível observar a diminuição da expressão gênica diferencial nos pacientes com infarto e medicação prévia, e que haja uma regulação gênica entre eles.

Os demais 16 dos 36 espectros diferentemente expressos na primeira colheita de 2º IAM com SST, também foram identificados como diferentemente expressos para o mesmo tempo de colheita que 1º IAM com SST, com sensibilidade e especificidade calculada entre 90 a 98%, quando considerado um único grupo de IAM com SST em relação aos controles. Acredita-se que estes espectros de proteínas, cujo peso molecular estão entre 6.386,5 Da e 17.807,5 Da, são potenciais biomarcadores de diagnóstico precoce de IAM, independente da variabilidade inerente dos pacientes com relação a infarto e medicação prévia ao evento.

Estes 16 espectros de proteínas apresentaram expressão diminuída nos pacientes infartados, quando comparados à média de intensidade de expressão nos indivíduos controles. O mesmo foi observado em estudo a partir do sobrenadante da cultura de carótida, com placas de aterosclerose isoladas por endartectomia de 7 pacientes, em que

foi detectado um espectro correspondente à massa de 18,4 kDa, com expressão significativamente reduzida, quando comparado com cultura de 7 artérias mamárias através do *ProteinChip CM10* (cromatografia de afinidade catiônica), seguida de SELDI-TOF/MS. Posteriormente, pesquisadores através do sequenciamento, verificaram que este espectro correspondeu à proteína sTWEAK (*soluble tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis*) e sua expressão no plasma de 30 pacientes com estenose, 106 pacientes assintomáticos com aterosclerose e 28 indivíduos saudáveis, apresentam uma correlação negativa com a presença de aterosclerose (Blanco-Colio et al. 2007). Sugerindo que esta proteína, e possivelmente as 16 proteínas observadas neste estudo, sejam fatores protetores para o desenvolvimento e/ou desestabilização da placa aterosclerótica.

Não obstante, as demais 44 proteínas diferentemente expressas em ambos os grupos IAM com SST nos tempos de colheita (60 proteínas comuns entre os grupos: 16 na primeira colheita e 44 nos demais tempos) podem ser reflexo tardio da lesão do miocárdio, como ocorrem com os marcadores cardíacos cTnI e CK-MB (Dolci and Panteghini 2006); ou simplesmente a diferença de expressão logo após IAM, que não foi estatisticamente significante devido ao número amostral proposto inicialmente (10 pacientes com IAM com SST e 6 controles), como observado no estudo de microarranjo de DNA com os genes MMP9 e ALOX15.

Os genes MMP9 e ALOX15 atingiram níveis significativamente alterados após intervenção coronária percutânea (em T₂) e 12 h seguintes (em T₁₂), respectivamente ($p < 0,05$) quando comparados entre 10 pacientes com IAM com SST e 6 controles através das análises de microarranjo de DNA e PCR em tempo real (validação técnica). Contudo, ao trabalhar com uma casuística maior (74 pacientes com SCA e 41 controles) se observou diferença de expressão já no momento de admissão hospitalar (em T₀) pela PCR em tempo real (validação biológica).

Entretanto, como indicado por Blanco-Colio e colaboradores, é necessário em uma etapa seguinte aos estudos com *ProteinChip* seguido por SELDI-TOF/MS, isolar as proteínas diferentemente expressas e sequenciá-las por espectrometria de massa, a fim de verificar quais proteínas correspondem aos pesos moleculares obtidos neste estudo de acordo com o banco de dados de peptídeos, *National Center for Biotechnology Information* e *SwissProt databases* (Blanco-Colio et al. 2007). E, uma vez caracterizadas, estas devem ser validadas tecnicamente a partir de outras metodologias, como *Western blot* e ensaios de captura de antígenos-anticorpos (Blanco-Colio et al.

2007); e biologicamente em uma casuística maior e com maior variabilidade, incluindo pacientes com angina instável, IAM sem SST, diabéticos, mulheres e diferentes faixas etárias.

Desta forma, o atual estudo proteômico foi essencial para definir parâmetros de busca dos 16 potenciais biomarcadores protéicos, isto é, condições de isolamento (remoção das proteínas de alto peso molecular e mais abundantes através do *Multiple Affinity Removal Spin Cartridge System* e cromatografia através de matriz de interação hidrofóbica) e suas respectivas massas moleculares.

Já o estudo transcriptômico, apresenta os genes ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECDHC3, GPX3, KCNE1, IL18R1, IRS2, MYL4, MMP9 e TREML4 como potenciais biomarcadores de diagnóstico de SCA, por refletir através das células do sangue periférico a desestabilização da placa aterosclerótica, fatores protetores e de remodelagem cardíaca. Estes genes são capazes de distinguir pacientes com SCA dos controles nas primeiras horas após oclusão das artérias coronárias, desta forma, pode-se considerá-los como marcadores precoces de SCA. Futuros estudos devem ser realizados no intuito de avaliá-los como marcadores de doença arterial coronariana, bem como, na determinação de possíveis interferentes, na avaliação da sensibilidade e especificidade diagnóstica e aplicabilidade prognóstica.

6 CONCLUSÕES

No estudo transcriptômico por microarranjo de DNA de células do sangue periférico caracterizou-se 599 genes diferentemente expressos nas primeiras 48 h após IAM. Treze genes foram considerados como biomarcadores precoces de SCA: ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECDHC3, KCNE1, IL18R1, IRS2, MYL4, MMP9 e TREML4.

No estudo proteômico foi possível identificar 495 espectros de proteínas diferentemente expressos durante as primeiras 48 h após IAM. Dezesesseis destes espectros de proteínas com peso molecular entre 6.386,5 Da a 17.807,5 Da foram selecionados como potenciais marcadores precoce de diagnóstico de IAM com SST.

REFERÊNCIAS

- Achar, S. A., Kundu, S., and Norcross, W. A. (2005), 'Diagnosis of acute coronary syndrome', *Am Fam Physician*, 72 (1), 119-26.
- Alvarez, B. V., et al. (2007), 'Carbonic anhydrase inhibition prevents and reverts cardiomyocyte hypertrophy', *J Physiol*, 579 (Pt 1), 127-45.
- Andersson, C.K., et al. (2008), 'Mice lacking 12/15-lipoxygenase have attenuated airway allergic inflammation and remodeling', *Am J Respir Cell Mol Biol*, 39 (6), 648-56.
- Andersson, K. B., et al. (2006), 'Regulation of neuronal type genes in congestive heart failure rats', *Acta Physiol (Oxf)*, 186 (1), 17-27.
- Anonymous (1979), 'Nomenclature and criteria for diagnosis of ischemic heart disease. Report of the Joint International Society and Federation of Cardiology/World Health Organization task force on standardization of clinical nomenclature', *Circulation*, 59 (3), 607-9.
- Ariel, A., et al. (2005), 'The docosatriene protectin D1 is produced by TH2 skewing and promotes human T cell apoptosis via lipid raft clustering', *J Biol Chem*, 280 (52), 43079-86.
- Armant, M. A. and Fenton, M. J. (2002), 'Toll-like receptors: a family of pattern-recognition receptors in mammals', *Genome Biol*, 3 (8), REVIEWS3011.
- Armitage, P. and Berry, G. (1994), *Statistical methods in medical research* (3rd edn.; Oxford ; Boston: Blackwell Scientific Publications) xi, 620 p.
- Barros Filho, M.C., (2009), 'Expressão de grupos de genes como marcadores moleculares preditivos de resposta à quimioterapia neoadjuvante como doxorubicina e ciclosfosfamida em pacientes com câncer de mama', Dissertação (mestrado), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
- Benjamini, Y. and Hochberg, Y. (1995), 'Controlling the False Discovery Rate - a Practical and Powerful Approach to Multiple Testing', *Journal of the Royal Statistical Society Series B-Methodological*, 57 (1), 289-300.
- Berhane, B. T., et al. (2005), 'Cardiovascular-related proteins identified in human plasma by the HUPO Plasma Proteome Project pilot phase', *Proteomics*, 5 (13), 3520-30.

- Blanco-Colio, L. M., et al. (2007), 'Identification of soluble tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis (sTWEAK) as a possible biomarker of subclinical atherosclerosis', *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 27 (4), 916-22.
- Bleich, D., et al. (1999), 'Resistance to type 1 diabetes induction in 12-lipoxygenase knockout mice', *J Clin Invest*, 103 (10), 1431-6.
- Cardiovascular Gene Ontology. Disponível em <<http://www.cardiogenontology.com/>>. Acesso em: setembro de 2009.
- Cavalli, S. A., et al. (2000), 'Apolipoprotein B gene polymorphisms: prevalence and impact on serum lipid concentrations in hypercholesterolemic individuals from Brazil', *Clin Chim Acta*, 302 (1-2), 189-203.
- Chalmers, J., et al. (1999), '1999 World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. Guidelines sub-committee of the World Health Organization', *Clin Exp Hypertens*, 21 (5-6), 1009-60.
- Chandrasekar, B., et al. (2006), 'Interleukin-18-induced human coronary artery smooth muscle cell migration is dependent on NF-kappaB- and AP-1-mediated matrix metalloproteinase-9 expression and is inhibited by atorvastatin', *J Biol Chem*, 281 (22), 15099-109.
- Charakida, M., Tousoulis, D., and Stefanadis, C. (2006), 'Early atherosclerosis in childhood: diagnostic approaches and therapeutic strategies', *Int J Cardiol*, 109 (2), 152-9.
- Charoenrat, P.O., et al. (2000), 'Epidermal growth factor-like ligands differentially up-regulate matrix metalloproteinase 9 in head and neck squamous carcinoma cells', *Cancer Res*, 60 (4), 1121-8.
- Chatterjee, S. K. and Zetter, B. R. (2005), 'Cancer biomarkers: knowing the present and predicting the future', *Future Oncol*, 1 (1), 37-50.
- Chen, X. S., et al. (1994), 'cDNA cloning, expression, mutagenesis of C-terminal isoleucine, genomic structure, and chromosomal localizations of murine 12-lipoxygenases', *J Biol Chem*, 269 (19), 13979-87.
- Choe, S. E., et al. (2005), 'Preferred analysis methods for Affymetrix GeneChips revealed by a wholly defined control dataset', *Genome Biol*, 6 (2), R16.
- Chung, S. S., et al. (2009), 'Glutathione peroxidase 3 mediates the antioxidant effect of peroxisome proliferator-activated receptor gamma in human skeletal muscle cells', *Mol Cell Biol*, 29 (1), 20-30.

- Coats, W. D., Jr. and Faxon, D. P. (1997), 'The role of the extracellular matrix in arterial remodelling', *Semin Interv Cardiol*, 2 (3), 167-76.
- Cook, S. A. and Rosenzweig, A. (2002), 'DNA microarrays: implications for cardiovascular medicine', *Circ Res*, 91 (7), 559-64.
- Corbel, M., Boichot, E., and Lagente, V. (2000), 'Role of gelatinases MMP-2 and MMP-9 in tissue remodeling following acute lung injury', *Braz J Med Biol Res*, 33 (7), 749-54.
- Dakeshita, S., et al. (2009), 'Gene expression signatures in peripheral blood cells from Japanese women exposed to environmental cadmium', *Toxicology*, 257 (1-2), 25-32.
- Dallas, P. B., et al. (2005), 'Gene expression levels assessed by oligonucleotide microarray analysis and quantitative real-time RT-PCR -- how well do they correlate?', *BMC Genomics*, 6 (1), 59.
- Dandona, P., et al. (2005), 'Metabolic syndrome: a comprehensive perspective based on interactions between obesity, diabetes, and inflammation', *Circulation*, 111 (11), 1448-54.
- DATASUS - Departamento de Informática do SUS. Disponível em: <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>>. Acesso em 07 abril de 2010.
- de Lemos, J. A., et al. (2001), 'The prognostic value of B-type natriuretic peptide in patients with acute coronary syndromes', *N Engl J Med*, 345 (14), 1014-21.
- de Seny, D., et al. (2005), 'Discovery of new rheumatoid arthritis biomarkers using the surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry ProteinChip approach', *Arthritis Rheum*, 52 (12), 3801-12.
- Debey, S., et al. (2006), 'A highly standardized, robust, and cost-effective method for genome-wide transcriptome analysis of peripheral blood applicable to large-scale clinical trials', *Genomics*, 87 (5), 653-64.
- Dolci, A. and Panteghini, M. (2006), 'The exciting story of cardiac biomarkers: from retrospective detection to gold diagnostic standard for acute myocardial infarction and more', *Clin Chim Acta*, 369 (2), 179-87.
- Domon, B. and Aebersold, R. (2006a), 'Challenges and opportunities in proteomics data analysis', *Mol Cell Proteomics*, 5 (10), 1921-6.
- (2006b), 'Mass spectrometry and protein analysis', *Science*, 312 (5771), 212-7.

- dos Santos, E. S., et al. (2006), 'Acute coronary syndrome registry at a cardiology emergency center', *Arq Bras Cardiol*, 87 (5), 597-602.
- Eryol, N. K., et al. (2005), 'Are the high levels of cytomegalovirus antibodies a determinant in the development of coronary artery disease?', *Int Heart J*, 46 (2), 205-9.
- Fang, L., Du, X.J., Gao, X.M., Dart, A. (2009), 'Acute Myocardial Infarction Enhances Production of MMP-9 by Peripheral Blood Mononuclear Cells.', *Heart, Lung and Circulation*, 18 (3).
- Fernandez-Real, J. M., et al. (2003), 'CD14 monocyte receptor, involved in the inflammatory cascade, and insulin sensitivity', *J Clin Endocrinol Metab*, 88 (4), 1780-4.
- Florian-Kujawski, M., et al. (2004), 'Biomarker profiling of plasma from acute coronary syndrome patients. Application of ProteinChip Array analysis', *Int Angiol*, 23 (3), 246-54.
- Folgueira, M.A.A.K, el al. (2009), 'Gene expression profile of residual breast cancer after doxorubicin and cyclophosphamide neoadjuvant chemotherapy', *Oncology Reports*, 22, 805-813.
- Ford, J. W. and McVicar, D. W. (2009), 'TREM and TREM-like receptors in inflammation and disease', *Curr Opin Immunol*, 21 (1), 38-46.
- Forti, N., et al. (2003), '[Genetic changes and cholesterolemia: new Brazilian studies]', *Arq Bras Cardiol*, 80 (5), 565-71.
- Freedman, J. E. (2003), 'CD40 ligand--assessing risk instead of damage?', *N Engl J Med*, 348 (12), 1163-5.
- Friddle, C. J., et al. (2000), 'Expression profiling reveals distinct sets of genes altered during induction and regression of cardiac hypertrophy', *Proc Natl Acad Sci U S A*, 97 (12), 6745-50.
- Friedewald, W. T., Levy, R. I., and Fredrickson, D. S. (1972), 'Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge', *Clin Chem*, 18 (6), 499-502.
- Gentleman, R. C., et al. (2004), 'Bioconductor: open software development for computational biology and bioinformatics', *Genome Biol*, 5 (10), R80.
- Gillum, R. F., et al. (1984), 'International diagnostic criteria for acute myocardial infarction and acute stroke', *Am Heart J*, 108 (1), 150-8.

- Gondim Lde, G., de Oliveira, W. A., and Grossi, S. A. (2003), '[The difference in acute myocardial infarction pain between diabetic and non diabetic patients]', *Rev Lat Am Enfermagem*, 11 (6), 720-6.
- Guzman, E. C., et al. (2000), 'Association of the apolipoprotein B gene polymorphisms with cholesterol levels and response to fluvastatin in Brazilian individuals with high risk for coronary heart disease', *Clin Chem Lab Med*, 38 (8), 731-6.
- Harb, J. G., Chyla, B. I., and Huettner, C. S. (2008), 'Loss of Bcl-x in Ph+ B-ALL increases cellular proliferation and does not inhibit leukemogenesis', *Blood*, 111 (7), 3760-9.
- Harris, W. S. (2007), 'Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a case for omega-3 index as a new risk factor', *Pharmacol Res*, 55 (3), 217-23.
- Harrison, N. and Abhyankar, B. (2005), 'The mechanism of action of omega-3 fatty acids in secondary prevention post-myocardial infarction', *Curr Med Res Opin*, 21 (1), 95-100.
- Hartweg, J., et al. (2007), 'Meta-analysis of the effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on haematological and thrombogenic factors in type 2 diabetes', *Diabetologia*, 50 (2), 250-8.
- Hashimoto, T., et al. (1996), 'A new inhibitor of mitochondrial fatty acid oxidation', *J Biochem*, 119 (6), 1196-201.
- Hemmi, H., et al. (2009), 'A new triggering receptor expressed on myeloid cells (Trem) family member, Trem-like 4, binds to dead cells and is a DNAX activation protein 12-linked marker for subsets of mouse macrophages and dendritic cells', *J Immunol*, 182 (3), 1278-86.
- Hersberger, M. and von Eckardstein, A. (2003), 'Low high-density lipoprotein cholesterol: physiological background, clinical importance and drug treatment', *Drugs*, 63 (18), 1907-45.
- Hill, J. M., et al. (2003), 'Circulating endothelial progenitor cells, vascular function, and cardiovascular risk', *N Engl J Med*, 348 (7), 593-600.
- Hirata, R. D., et al. (2002), 'A method to detect the G894T polymorphism of the NOS3 gene. Clinical validation in familial hypercholesterolemia', *Clin Chem Lab Med*, 40 (5), 436-40.
- Hobeika, M. J., et al. (2007), 'Matrix metalloproteinases in peripheral vascular disease', *J Vasc Surg*, 45 (4), 849-57.

- Hoheisel, J. D. (2006), 'Microarray technology: beyond transcript profiling and genotype analysis', *Nat Rev Genet*, 7 (3), 200-10.
- Hortin, G. L. (2006), 'The MALDI-TOF mass spectrometric view of the plasma proteome and peptidome', *Clin Chem*, 52 (7), 1223-37.
- Hoshida, S., et al. (2005), 'Acute Chlamydia pneumoniae infection with heat-shock-protein-60-related response in patients with acute coronary syndrome', *Atherosclerosis*, 183 (1), 109-12.
- Huang, J. T., et al. (1999), 'Interleukin-4-dependent production of PPAR-gamma ligands in macrophages by 12/15-lipoxygenase', *Nature*, 400 (6742), 378-82.
- Hutchens, T. W. and Yip, T. T. (1993), 'New Desorption Strategies for the Mass-Spectrometric Analysis of Macromolecules', *Rapid Communications in Mass Spectrometry*, 7 (7), 576-80.
- Hwang, J. J., et al. (2002), 'Microarray gene expression profiles in dilated and hypertrophic cardiomyopathic end-stage heart failure', *Physiological Genomics*, 10 (1), 31-44.
- Irizarry, R. A., et al. (2003), 'Exploration, normalization, and summaries of high density oligonucleotide array probe level data', *Biostatistics*, 4 (2), 249-64.
- Iwakura, A., et al. (2006), 'Estradiol enhances recovery after myocardial infarction by augmenting incorporation of bone marrow-derived endothelial progenitor cells into sites of ischemia-induced neovascularization via endothelial nitric oxide synthase-mediated activation of matrix metalloproteinase-9', *Circulation*, 113 (12), 1605-14.
- Jefferson, B. K. and Topol, E. J. (2005), 'Molecular mechanisms of myocardial infarction', *Curr Probl Cardiol*, 30 (7), 333-74.
- Jernberg, T., et al. (2004), 'Natriuretic peptides in unstable coronary artery disease', *Eur Heart J*, 25 (17), 1486-93.
- Kayama, Y., et al. (2009), 'Cardiac 12/15 lipoxygenase-induced inflammation is involved in heart failure', *J Exp Med*, 206 (7), 1565-74.
- Keeling, W. B., et al. (2005), 'An overview of matrix metalloproteinases in the pathogenesis and treatment of abdominal aortic aneurysms', *Vasc Endovascular Surg*, 39 (6), 457-64.
- Kharlap, M. S., et al. (2006), 'Atrial appendage transcriptional profile in patients with atrial fibrillation with structural heart diseases', *Ann N Y Acad Sci*, 1091, 205-17.

- Koizumi, S. (2004), 'Application of DNA microarrays in occupational health research', *J Occup Health*, 46 (1), 20-5.
- Koomen, J. M., et al. (2005), 'Plasma protein profiling for diagnosis of pancreatic cancer reveals the presence of host response proteins', *Clin Cancer Res*, 11 (3), 1110-8.
- Kou, V. & Nassisi, D. (2006), 'Unstable angina and non-ST-segment myocardial infarction: an evidence-based approach to management', *Mt Sinai J Med*, 73 (1), 449-68.
- Kozak, K. R., et al. (2005), 'Characterization of serum biomarkers for detection of early stage ovarian cancer', *Proteomics*, 5 (17), 4589-96.
- Kudo, I. and Murakami, M. (2002), 'Phospholipase A2 enzymes', *Prostaglandins Other Lipid Mediat*, 68-69, 3-58.
- Le, L., et al. (2005), 'Identification of serum amyloid A as a biomarker to distinguish prostate cancer patients with bone lesions', *Clin Chem*, 51 (4), 695-707.
- Leclercq, A., et al. (2007), 'Involvement of intraplaque hemorrhage in atherothrombosis evolution via neutrophil protease enrichment', *J Leukoc Biol*, 82 (6), 1420-9.
- Livak, K. J. and Schmittgen, T. D. (2001), 'Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method', *Methods*, 25 (4), 402-8.
- Loscalzo, J. (2001), 'Nitric oxide insufficiency, platelet activation, and arterial thrombosis', *Circ Res*, 88 (8), 756-62.
- Lukiw, W. J., et al. (2005), 'A role for docosahexaenoic acid-derived neuroprotectin D1 in neural cell survival and Alzheimer disease', *J Clin Invest*, 115 (10), 2774-83.
- Machado, M. O., et al. (2001), 'Apo B gene haplotype is associated with lipid profile of higher risk for coronary heart disease in Caucasian Brazilian men', *J Clin Lab Anal*, 15 (1), 19-24.
- Maggi, P., et al. (2006), 'Role of chlamydia infection in the pathogenesis of atherosclerotic plaques in HIV-1-positive patients', *In Vivo*, 20 (3), 409-13.
- Maisel, A. S., Bhalla, V., and Braunwald, E. (2006), 'Cardiac biomarkers: a contemporary status report', *Nat Clin Pract Cardiovasc Med*, 3 (1), 24-34.
- Malik, G., et al. (2005), 'Serum levels of an isoform of apolipoprotein A-II as a potential marker for prostate cancer', *Clin Cancer Res*, 11 (3), 1073-85.

- Marcotte, E. R., Srivastava, L. K., and Quirion, R. (2003), 'cDNA microarray and proteomic approaches in the study of brain diseases: focus on schizophrenia and Alzheimer's disease', *Pharmacol Ther*, 100 (1), 63-74.
- Marshall, J., et al. (2003), 'Processing of serum proteins underlies the mass spectral fingerprinting of myocardial infarction', *J Proteome Res*, 2 (4), 361-72.
- Marx, N., et al. (1998), 'Macrophages in human atheroma contain PPARgamma: differentiation-dependent peroxisomal proliferator-activated receptor gamma(PPARgamma) expression and reduction of MMP-9 activity through PPARgamma activation in mononuclear phagocytes in vitro', *Am J Pathol*, 153 (1), 17-23.
- Mateos-Caceres, P. J., et al. (2004), 'Proteomic analysis of plasma from patients during an acute coronary syndrome', *J Am Coll Cardiol*, 44 (8), 1578-83.
- McDuffie, M., et al. (2008), 'Nonobese diabetic (NOD) mice congenic for a targeted deletion of 12/15-lipoxygenase are protected from autoimmune diabetes', *Diabetes*, 57 (1), 199-208.
- Mehta, J. L., Saldeen, T. G., and Rand, K. (1998), 'Interactive role of infection, inflammation and traditional risk factors in atherosclerosis and coronary artery disease', *J Am Coll Cardiol*, 31 (6), 1217-25.
- Mion, J.D., et al. (2004), 'IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial', *Arq Bras Cardiol*; 82 (Supl IV), 7-14.
- Morris, M. C., Sacks, F., and Rosner, B. (1993), 'Does fish oil lower blood pressure? A meta-analysis of controlled trials', *Circulation*, 88 (2), 523-33.
- Mussa, F. F., et al. (2006), 'Chlamydia pneumoniae and vascular disease: an update', *J Vasc Surg*, 43 (6), 1301-7.
- Nabel, E. G. (2003), 'Cardiovascular disease', *N Engl J Med*, 349 (1), 60-72.
- Nagase, H., Visse, R., and Murphy, G. (2006), 'Structure and function of matrix metalloproteinases and TIMPs', *Cardiovasc Res*, 69 (3), 562-73.
- Napoli, C., et al. (2003), 'Microarray analysis: a novel research tool for cardiovascular scientists and physicians', *Heart*, 89 (6), 597-604.
- Nomura, F., et al. (2004), 'Identification of novel and downregulated biomarkers for alcoholism by surface enhanced laser desorption/ionization-mass spectrometry', *Proteomics*, 4 (4), 1187-94.
- Opie, L. H., et al. (2006), 'Controversies in ventricular remodelling', *Lancet*, 367 (9507), 356-67.

- Oshima, T., et al. (2005), 'Association of Helicobacter pylori infection with systemic inflammation and endothelial dysfunction in healthy male subjects', *J Am Coll Cardiol*, 45 (8), 1219-22.
- Panteghini, M. (2004), 'Role and importance of biochemical markers in clinical cardiology', *Eur Heart J*, 25 (14), 1187-96.
- Piegas LS, Feitosa G, Mattos LA, Nicolau JC, Rossi Neto JM, et al. (2009), 'Sociedade Brasileira de Cardiologia. Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST'. *Arq Bras Cardiol*, 93(6 supl.2), e179-e264.
- Rabelink, T. J., et al. (2004), 'Endothelial progenitor cells: more than an inflammatory response?', *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 24 (5), 834-8.
- Rajappa, M. and Sharma, A. (2005), 'Biomarkers of cardiac injury: an update', *Angiology*, 56 (6), 677-91.
- Reeve, J. L., et al. (2005), 'Don't lose heart--therapeutic value of apoptosis prevention in the treatment of cardiovascular disease', *J Cell Mol Med*, 9 (3), 609-22.
- Ricote, M., et al. (1998), 'The peroxisome proliferator-activated receptor-gamma is a negative regulator of macrophage activation', *Nature*, 391 (6662), 79-82.
- Ridker, P. M., et al. (2000), 'C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women', *N Engl J Med*, 342 (12), 836-43.
- Rodrigues, A. C., et al. (2005), 'High baseline serum total and LDL cholesterol levels are associated with MDR1 haplotypes in Brazilian hypercholesterolemic individuals of European descent', *Braz J Med Biol Res*, 38 (9), 1389-97.
- Roggério, A., (2008), 'Expressão aumentada dos antígenos de MMP-9, PPAR α , *Chlamydophila pneumoniae* e *Mycoplasma pneumoniae* em fragmentos ateroscleróticos de aorta com aneurisma', Tese (doutorado), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
- Rosner, Bernard (2006), *Fundamentals of biostatistics* (6th edn.; Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole) xix, 868.
- Sakuma, T., Hirata, R. D., and Hirata, M. H. (2004), 'Five polymorphisms in gene candidates for cardiovascular disease in Afro-Brazilian individuals', *J Clin Lab Anal*, 18 (6), 309-16.
- Salazar, L. A., et al. (1999), 'Effects of Ava II and Hinc II polymorphisms at the LDL receptor gene on serum lipid levels of Brazilian individuals with high risk for coronary heart disease', *J Clin Lab Anal*, 13 (6), 251-8.

- (2002), 'Molecular basis of familial hypercholesterolemia in Brazil: Identification of seven novel LDLR gene mutations', *Hum Mutat*, 19 (4), 462-3.
- Sampaio, M. F., et al. (2007), 'AMI is associated with polymorphisms in the NOS3 and FGB but not in PAI-1 genes in young adults', *Clin Chim Acta*, 377 (1-2), 154-62.
- Sanges, R., Cordero, F., and Calogero, R. A. (2007), 'oneChannelGUI: a graphical interface to Bioconductor tools, designed for life scientists who are not familiar with R language', *Bioinformatics*, 23 (24), 3406-8.
- Senior, R. M., et al. (1991), 'Human 92- and 72-kilodalton type IV collagenases are elastases', *J Biol Chem*, 266 (12), 7870-5.
- Shah, P. K. (1997), 'Inflammation, metalloproteinases, and increased proteolysis: an emerging pathophysiological paradigm in aortic aneurysm', *Circulation*, 96 (7), 2115-7.
- Shiwa, M., et al. (2003), 'Rapid discovery and identification of a tissue-specific tumor biomarker from 39 human cancer cell lines using the SELDI ProteinChip platform', *Biochem Biophys Res Commun*, 309 (1), 18-25.
- Shu, H., et al. (2000), 'Activation of PPARalpha or gamma reduces secretion of matrix metalloproteinase 9 but not interleukin 8 from human monocytic THP-1 cells', *Biochem Biophys Res Commun*, 267 (1), 345-9.
- Siegel, Sidney and Castellan, N. John (1988), *Nonparametric statistics for the behavioral sciences* (2nd edn.; New York: McGraw-Hill) xxiii, 399 p.
- Silva, M.A.D., Sousa, A.G., Schargodsky, H. (1998), 'Fatores de risco para infarto do miocárdio no Brasil. Estudo FRICAS'. *Arq Bras Cardiol*, 71 (5), 667-75.
- Simpson, R. J., et al. (2009), 'Exosomes: proteomic insights and diagnostic potential', *Expert Review of Proteomics*, 6 (3), 267-83.
- Singer, P., et al. (2008), 'Anti-inflammatory properties of omega-3 fatty acids in critical illness: novel mechanisms and an integrative perspective', *Intensive Care Med*, 34 (9), 1580-92.
- Sluijter, J. P., et al. (2006), 'Matrix metalloproteinase 2 is associated with stable and matrix metalloproteinases 8 and 9 with vulnerable carotid atherosclerotic lesions: a study in human endarterectomy specimen pointing to a role for different extracellular matrix metalloproteinase inducer glycosylation forms', *Stroke*, 37 (1), 235-9.
- Smith, R. J., et al. (1993), 'Transmembrane signaling in human polymorphonuclear neutrophils: 15(S)-hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraenoic acid modulates

- receptor agonist-triggered cell activation', *Proc Natl Acad Sci U S A*, 90 (15), 7270-4.
- Sociedade Brasileira de Diabetes (2008). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.
- Sorkin, S. C., et al. (2005), 'APOA1 polymorphisms are associated with variations in serum triglyceride concentrations in hypercholesterolemic individuals', *Clin Chem Lab Med*, 43 (12), 1339-45.
- Stanton, L. W., et al. (2000), 'Altered patterns of gene expression in response to myocardial infarction', *Circ Res*, 86 (9), 939-45.
- Tang, Y., et al. (2003), 'Blood genomic expression profile for neuronal injury', *J Cereb Blood Flow Metab*, 23 (3), 310-9.
- Tavares, V., et al. (2005), 'Association between Pro12Ala polymorphism of the PPAR-gamma2 gene and insulin sensitivity in Brazilian patients with type-2 diabetes mellitus', *Diabetes Obes Metab*, 7 (5), 605-11.
- Thompson, R. W., et al. (1995), 'Production and localization of 92-kilodalton gelatinase in abdominal aortic aneurysms. An elastolytic metalloproteinase expressed by aneurysm-infiltrating macrophages', *J Clin Invest*, 96 (1), 318-26.
- Thygesen, K., et al. (2007), 'Universal definition of myocardial infarction', *Circulation*, 116 (22), 2634-53.
- Tolson, J., et al. (2004), 'Serum protein profiling by SELDI mass spectrometry: detection of multiple variants of serum amyloid alpha in renal cancer patients', *Lab Invest*, 84 (7), 845-56.
- Tomic, V., et al. (2005), 'Transcriptomic and proteomic patterns of systemic inflammation in on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting', *Circulation*, 112 (19), 2912-20.
- Tousoulis, D., Charakida, M., and Stefanadis, C. (2006), 'Endothelial function and inflammation in coronary artery disease', *Heart*, 92 (4), 441-4.
- Tuomisto, T. T. and Yla-Herttuala, S. (2005), 'What have we learnt about microarray analyses of atherogenesis?', *Curr Opin Lipidol*, 16 (2), 201-5.
- Tzouveleakis, A., Patlakas, G., and Bouros, D. (2004), 'Application of microarray technology in pulmonary diseases', *Respir Res*, 5, 26.
- Uzuelli, J.A., (2008), 'Alterações das concentrações plasmáticas de troponina I e de metaloproteínas 2 e 9 da matriz extracelular após embolia aguda em cães', tese (mestrado), Faculdade de Medicina de Riberão Preto da Universidade de São Paulo.

- von Schacky, C. (2007), 'Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease', *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*, 10 (2), 129-35.
- Wang, Q. (2005), 'Molecular genetics of coronary artery disease', *Curr Opin Cardiol*, 20 (3), 182-8.
- White, M. Y., et al. (2005), 'Proteomics of ischemia/reperfusion injury in rabbit myocardium reveals alterations to proteins of essential functional systems', *Proteomics*, 5 (5), 1395-410.
- Who - World Health organization. (2008). 'The global burden of disease: 2004 update, Suíça: WHO Press.
- Wilson, W. R., et al. (2006), 'Matrix metalloproteinase-8 and -9 are increased at the site of abdominal aortic aneurysm rupture', *Circulation*, 113 (3), 438-45.
- Wittwer, J. and Hersberger, M. (2007), 'The two faces of the 15-lipoxygenase in atherosclerosis', *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*, 77 (2), 67-77.
- Wittwer, J., et al. (2007), 'The c.-292C>T promoter polymorphism increases reticulocyte-type 15-lipoxygenase-1 activity and could be atheroprotective', *Clin Chem Lab Med*, 45 (4), 487-92.
- Wojakowski, W., et al. (2004), 'The pro- and anti-inflammatory markers in patients with acute myocardial infarction and chronic stable angina', *International Journal of Molecular Medicine*, 14 (2), 317-22.
- Woong-Shick, A., et al. (2005), 'Identification of hemoglobin-alpha and -beta subunits as potential serum biomarkers for the diagnosis and prognosis of ovarian cancer', *Cancer Sci*, 96 (3), 197-201.
- Xu, G., et al. (2009), 'Application of SELDI-TOF-MS to identify serum biomarkers for renal cell carcinoma', *Cancer Lett*, 282 (2), 205-13.
- Yan, A. T., et al. (2006), 'Plasma matrix metalloproteinase-9 level is correlated with left ventricular volumes and ejection fraction in patients with heart failure', *J Card Fail*, 12 (7), 514-9.
- Yoon, Y. S., Lee, N., and Scadova, H. (2005), 'Myocardial regeneration with bone-marrow-derived stem cells', *Biol Cell*, 97 (4), 253-63.
- Zhang, G., et al. (2009), 'Time course proteomic profile of rat acute myocardial infarction by SELDI-TOF MS analysis', *Int J Cardiol*, 131 (2), 225-33.
- Zhang, Z., et al. (2004), 'Three biomarkers identified from serum proteomic analysis for the detection of early stage ovarian cancer', *Cancer Res*, 64 (16), 5882-90.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Serviços de Saúde
Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Projeto de pesquisa: 'TRANSCRIPTOMA E PROTEOMA EM SANGUE PERIFÉRICO PARA PESQUISA DE NOVOS MARCADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ESTUDO EM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO'.

Dados de identificação do sujeito da pesquisa:

Nome do paciente: _____
Documento de Identidade nº _____
Sexo _____
Data de Nascimento ____/____/_____
Endereço _____ N° _____ Apto _____
Bairro _____ Cidade _____ CEP _____
Telefone _____

Prezado Paciente e/ou Responsável,

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima citado que estamos desenvolvendo com a equipe de médicos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Esse estudo é necessário para identificar novos exames para o diagnóstico e acompanhamento de doenças cardiovasculares.

Para participar desta pesquisa precisarei do seu consentimento e suas amostras de sangue. As coletadas serão realizadas em intervalos de tempos diferentes. O risco a saúde será mínimo, por causa da coleta de sangue que pode formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. Além de você outros quinze pacientes também participarão do estudo (6 do grupo controle e 10 pacientes com infarto agudo do miocárdio). Precisarei, ainda, que você responda a algumas perguntas sobre doenças existentes nas pessoas de sua família, hábitos alimentares e uso de medicamentos.

Inicialmente, serão coletadas seis amostras de sangue, onde vai ser medido como seu organismo responde após o infarto, para isso vamos estudar no seu sangue alguns componentes (produtos de sangue e produtos do DNA). E sua participação no estudo se encerra. A primeira coleta será na Seção do Pronto Socorro do Instituto Dante Pazzanese após sua autorização e confirmação da suspeita clínica de infarto agudo do miocárdio.

As demais coletas serão na Unidade de Terapia Intensiva. A segunda coleta será ao término do cateterismo, aproximadamente 2 horas depois da primeira coleta. E as outras serão em intervalos de tempo de 12 em 12 horas em relação à segunda coleta. Todas as coletas serão efetuadas sob supervisão dos médicos responsáveis de cada local.

Caso seja de seu interesse, entregarei todos os resultados dos exames laboratoriais necessários sem qualquer custo, que são: concentração de glicose, colesterol total, HDL, VLDL, LDL, triglicérides, apo A, apo B, uréia, creatinina, ácido úrico, T3, T4 livre, TSH, TGO, TGP, P-CR, troponina I, CK, CKMB, BNP e NT-pro-BNP. Você não receberá qualquer pagamento por sua participação. Também disponibilizarei os resultados da análise dos produtos de sangue e produtos de DNA no final da pesquisa.

Os dados e os resultados obtidos durante a investigação serão confidenciais e não serão revelados a terceiros, a menos que sua autorização prévia seja obtida. Sua identidade será mantida em segredo, quando os resultados desse estudo forem publicados em revistas, artigos e serem tema de debate e aulas.

Suas amostras de sangue serão armazenadas e ficarão sob responsabilidade única e exclusivamente do laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Ciências Farmacêutica – USP. Caso haja interesse de realizarmos futuras pesquisas entraremos em contato com você, e somente com sua autorização e aprovação dos novos projetos no Comitê de Ética em Pesquisa realizaremos os estudos.

Secretaria de Estado da Saúde
 Coordenadoria de Serviços de Saúde
Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia

Quero também destacar que as análises dos produtos de sangue e produtos de DNA serão realizadas em colaboração estrangeira, com os Estados Unidos e Espanha, pois ainda não disponibilizamos de alguns equipamentos necessários para este projeto.

Sendo assim, estaremos enviando estes produtos para fora do país, com volumes exatos para que não haja sobras (não terá armazenamento dos produtos de sangue e produtos de DNA no exterior). Além disso, elas já estarão processadas de forma que estarão inviáveis de serem utilizado para outras finalidades a não ser para a realização este projeto.

Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode retirar-se a qualquer momento do estudo e pegar suas amostras de volta, sem penalidades ou perda dos benefícios a que você tem direito e seu tratamento médico no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia não será afetado.

Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa, ou se ocorrer lesão relacionada à investigação você poderá entrar em contato com os pesquisadores: Lídio Gonçalves Lima Neto (telefone: 99978317), André Ducate Luchessi (telefone: 85917333) e Vivian Nogueira Silbiger (telefone: 85844073) a qualquer hora do dia.

Asseguro também que qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização, que são seus direitos legais.

Eu, _____, declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito, voluntariamente, em participar do presente Protocolo da Pesquisa.

São Paulo, _____ de _____ de 20_____

Assinatura do voluntário da pesquisa

Assinatura do pesquisador

Assinatura da Testemunha

APÊNDICE B – Ficha para colheita de dados individuais do paciente**DADOS DO PACIENTE****Registro.....**

Nome:.....Paciente nº

Data:...../...../...

Data de nascimento:...../...../.....

Sexo: M-1 () F-2 ()

Cor: Branca () Parda () Negra () Amarela ()

HABITOS DE VIDA

Hábito de fumar: Nunca fumou () Parou de fumar () há qto tempo?.....

Fuma () Nº de cigarros/dia.....

Consome bebida alcoólica? Sim () Não ()

Até 7 doses/sem () Mais de 7 doses/sem ()

Profissão:..... Há exigência de esforço físico? Sim ()

Não ()

Pratica exercício físico? Sim () Não ()

Com que frequência?.....

É obeso? Sim () Não ()

Peso (Kg)..... Altura (Chalmers et al.).....

IMC:.....

DOENÇAS

Possui algum tipo de doença? Não sabe () Sim () Não () Qual(is)?

Diabetes *Mellitus*? Sim () Não ()

É hipertenso? Sim () Não ()

Outras doenças:

Toma medicamento? Sim () Não ()

Qual(is)? Em que dosagem?.....

HISTÓRICO FAMILIAR - Possui algum parente com:Diabetes *Mellitus* () Obesidade () Hipertensão ()

DC () Hipercolesterolemia ()

() Outras patologias :

Quem?..... Não tem () Não sabe ()

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Já teve infarte antes? Não sabe () Sim () Não () Há qto

tempo?.....

Quais foram os sintomas que o fizeram procurar o

médico?.....

A que h aproximadamente vocês acha que infartou?.....

ANEXOS

ANEXO A – Cópia do aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Conselho Nacional de Saúde
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP

PARECER Nº 660/2006

Registro CONEP: 12677 (Este nº deve ser citado nas correspondências referentes a este projeto)

CAAE – 0012.0.131.018-06

Processo nº 25090.051450/2006-95

Projeto de Pesquisa: *“Transcriptoma e proteoma em sangue periférico para pesquisa de novos marcadores de doenças cardiovasculares: Estudo em infarto agudo do miocárdio”.*

Pesquisador Responsável: Dr. Mario Hiroyuki Hirata

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia /SP

Área Temática Especial: Cooperação estrangeira e Genética humana

Sumário

Estudar o perfil de expressão de 55 mil genes logo após o infarto do miocárdio e comparar com o perfil de indivíduos supostamente saudáveis na mesma faixa etária e origem étnica.

Serão estudadas cerca de 20 mil proteínas em arranjos em grupos de indivíduos logo após o infarto do miocárdio e em indivíduos supostamente saudáveis na mesma faixa etária e origem étnica. Através da tecnologia de *high-throughput DNA microarray chip* (sistema *code link*) será analisada a expressão de RNA de 40 mil a 50 mil genes no sangue de pacientes com DAC-doença aterosclerótica coronariana / IM-infarto do miocárdio e paciente controle.

Serão avaliados os principais genes mais expressos no PCR em tempo real para confirmar os dados do *array* nos dois grupos. Realizar estudo proteômico através de tecnologia de eletroforese bidirecional com plasma de pacientes com DAC.

Justifica-se o estudo ao estudar as doenças cardiovasculares, as quais constituem atualmente a principal causa de morte e incapacitação entre as doenças humanas e corresponde a aproximadamente 1/4 das mortes da população adulta. Os gastos com doenças isquêmicas levam a um gasto de 20% do total de gastos do SUS.

A identificação de mudanças nos perfis de expressão gênica que sejam preditivos para as doenças arteriais escleróticas coronarianas e os riscos relacionados ao desenvolvimento do infarto do miocárdio proposta por este estudo parece bastante relevante.

A hipótese dos pesquisadores é que “os resultados da expressão gênica dos leucócitos mononucleares do sangue periférico estejam relacionados com o processo inflamatório vascular endotelial nas doenças cardiovasculares que causam riscos para a população”.

Serão incluídos 100 indivíduos no centro em tela e serão utilizados RNAs provenientes de amostras de sangue total de pacientes envolvidos para se proceder a análise de 55 mil genes (transcriptoma) e alíquotas de proteínas provenientes de amostras de plasma para análise de 20 mil indivíduos saudáveis e com infarto do miocárdio. Deverão ser incluídos indivíduos de ambos os sexos entre 18 e 40 anos de idade e com graus variados de angina.

Cont. Parecer CONEP 660/2006.

Comentários/considerações

Em resposta às diligências do CEP sobre o envio de material para o exterior (para atendimento das exigências da resolução 347 CNS/MS), o pesquisador apresenta detalhada justificativa, na qual ressalta que serão enviadas aliquotas com quantidade exata para a realização dos testes.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – foi reformulado para atendimento à diligência do CEP e é de fácil compreensão para os sujeitos da pesquisa.

Trata-se de um projeto cooperativo internacional que tem o Brasil como país de origem. A cooperação com outros países é detalhada no protocolo e destaca a presença de pesquisadores brasileiros nos centros de colaboração estrangeiros. Os países envolvidos como coordenadores e colaboradores do estudo, além do Brasil, são Espanha e Estados Unidos. Foi apresentado um documento da Universidade de Santiago de Compostela-Espanha certificando que Vivian Silvíger foi aceita no doutorado daquela instituição. Nos Estados Unidos serão feitas as análises proteômicas com a participação do pesquisador brasileiro. Segundo o pesquisador, os procedimentos realizados nas instituições estrangeiras possibilitarão transferência de tecnologia para o Brasil.

Quanto à Folha de Rosto, solicita-se informar o cargo (carimbo institucional) do profissional que assinou no campo referente ao Termo de Compromisso da Instituição.

Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS 196/96, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto com a recomendação acima citada, devendo esta ser acompanhada pelo CEP, para posterior início da pesquisa.

Situação: Protocolo aprovado com recomendação.

Brasília, 16 de junho de 2006.

WILLIAM SAAD HOSSNE
Coordenador da CONEP/CNS/MS

ANEXO B– Ficha do Aluno

Janus - Sistema Administrativo da Pós-Graduação

Universidade de São Paulo
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Documento sem validade oficial
FICHA DO ALUNO

9136 - 5765097/1 - Vivian Nogueira Silbiger

Email: viviansilbiger@usp.br
Data de Nascimento: 12/10/1983
Cédula de Identidade: RG - 30.060.350-2 - SP
Local de Nascimento: Estado de São Paulo
Nacionalidade: Brasileira
Graduação: Bacharel em Ciências Biológicas - Modalidade: Médica - Universidade de Mogi das Cruzes - São Paulo - Brasil - 2006

Curso: Doutorado Direto
Programa: Farmácia (Análises Clínicas)
Área: Análises Clínicas
Data de Matrícula: 06/07/2006
Início da Contagem de Prazo: 06/07/2006
Data Limite: 06/07/2010
Orientador: Prof(a). Dr(a). Mario Hiroyuki Hirata - 06/07/2006 até o presente. E.Mail: mhihiata@usp.br
Proficiência em Línguas: Inglês, Aprovado em 06/07/2006
Data de Aprovação no Exame de Qualificação: Aprovado em 17/09/2009
Data do Depósito do Trabalho:
Título do Trabalho:
Data Máxima para Aprovação da Banca:
Data de Aprovação da Banca:
Data Máxima para Defesa:
Data da Defesa:
Resultado da Defesa:
Histórico de Ocorrências: Ingressou no Doutorado Direto em 06/07/2006
 Matrícula de Acompanhamento em 08/02/2010

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 08/02/2010

Impresso em: 11/04/10 16:15:09

Janus - Sistema Administrativo da Pós-Graduação

Universidade de São Paulo
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Documento sem validade oficial
FICHA DO ALUNO

9136 - 5765097/1 - Vivian Nogueira Silbiger

Sigla	Nome da Disciplina	Início	Término	Carga Horária	Cred.	Freq.	Conc.	Exc.	Situação
QBQ5710 6/1	Biologia Molecular do Gene (Instituto de Química - Universidade de São Paulo)	01/08/2006	01/11/2006	180	12	100	C	N	Concluída
FBC5757 1/1	Seminários em Análises Clínicas II	02/08/2006	14/11/2006	30	0	0	-	N	Matrícula cancelada
FBC5709 4/1	Biologia Molecular em Análises Clínicas	07/08/2006	10/09/2006	75	5	80	A	N	Concluída
FBC5749 1/2	Biossegurança em Laboratórios de Ensino e Pesquisa	31/08/2006	05/10/2006	30	2	75	A	N	Concluída
BTC5703 4/2	Biologia Molecular (Curso Interunidades: Biotecnologia - Universidade de São Paulo)	02/10/2006	14/01/2007	75	0	0	-	N	Matrícula cancelada
MCM5876 1/1	Biologia Molecular em Clínica Médica (Faculdade de Medicina - Universidade de São Paulo)	02/10/2006	22/10/2006	60	0	0	-	N	Matrícula cancelada
Atividade do Programa	Participou do XI Semana Farmacêutica de Ciência e Tecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, com apresentação do trabalho, intitulado: "Paraoxonase 1 e 2 como marcador genético de infarto agudo do miocárdio em adultos jovens", publicado em anais, v. 1, p. 186, 2006, São Paulo, Brasil (1)	16/10/2006	20/10/2006	-	1	0	-	-	-
FBC5757 1/2	Seminários em Análises Clínicas II	06/08/2007	18/11/2007	30	2	75	A	N	Concluída
HEP5732 9/8	Bioestatística I (Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo)	06/08/2007	10/09/2007	30	2	100	A	N	Concluída
HEP5732 9/7	Bioestatística I (Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo)	06/08/2007	10/09/2007	30	0	0	-	N	Pré-matrícula indeferida
FBC5793 9/1	Tópicos em Análises Clínicas I	23/03/2009	05/07/2009	30	2	80	A	N	Concluída
HEP5750 5/3	Bioestatística II (Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo)	14/04/2009	26/05/2009	45	3	90	B	N	Concluída

FBA5728	Aprimoramento Didático	21/09/2009 18/10/2009 60	4	100	A	N	Concluída
2º10							

	Créditos mínimos exigidos		Créditos obtidos
	Para exame de qualificação	Para depósito de tese	
Disciplinas:	25	25	33
Atividades Programadas:			
Seminários:			
Estágios:			
Total:	25	25	33

Créditos Atribuídos à Tese: 167

Observações:

1) Créditos atribuídos de acordo com o disposto no Artigo 66 do Regimento de Pós-Graduação e aprovados pela Comissão de Pós-Graduação, em Sessão de 27/11/2006.

Conceito a partir de 02/01/1997:

A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R - Reprovado; T - Transferência.
Um(1) crédito equivale a 15 horas de atividade programada.

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 08/02/2010

Impresso em: 11/04/10 16:15:09

ANEXO C – Currículo Lattes

Vivian Nogueira Silbiger

Curriculum Vitae

Dados Pessoais

Nome: Vivian Nogueira Silbiger

Filiação: Reynaldo Silbiger e Helcy Lylian Nogueira Silbiger

Nascimento: 12/10/1983 - São Paulo/SP - Brasil

Carteira de Identidade: 300603502 SSP - SP - 28/08/2001

CPF: 32160245801

Endereço residencial: R. Bazilio da Silva, 209 Ap. 143E

Jd. Monte Alegre - São Paulo

05545 - 010, SP - Brasil

Telefone: 011 34388243

Endereço profissional: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências

Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas

Av. Lineu Prestes, 580 . Lab. de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico - Bloco 17 superior

Cidade Universitária - Butantã - São Paulo

05508-000, SP - Brasil

Telefone: 011 30913660

Endereço eletrônico

e-mail para contato : viviansilbiger@usp.br

e-mail alternativo : viviansilbiger@hotmail.com

Formação Acadêmica/Titulação

2006 -2010 Doutorados em Análises Clínicas.

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil

Título: Transcriptoma e Proteoma em sangue periférico para pesquisa de novos marcadores de doenças cardiovasculares: Estudo em infarto agudo do miocárdio.

Orientador: Mario Hiroyuki Hirata

2002 – 2005 Graduações em Ciências Biológicas Modalidade Médica.

Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, Moji Das Cruzes, Brasil

Título: Trabalho de conclusão de curso: Prevalência de Mutações que Conferem Resistência aos Inibidores da Transcriptase Reversa e da Protease no Vírus HIV-1

Orientador: Adriana Cruvinel Carloni - CRIESP/SP.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Formação complementar

2008 - 2008 Curso de curta duração em Partek Genomics Suite. King College London, KCL, Inglaterra

2008 - 2008 Curso de curta duração em Deseño de investigación e análise de datos SPSS. Universidade de Santiago de Compostela, USC, Espanha

2008 - 2008 Curso de curta duração em Bioinformatica and Functional Genomics. Centro de Investigación del Cáncer, CIC, Espanha

2008 - 2008 Curso de curta duração em Data Exon 1.0 ST Arrays analysis course. Associazione per la Ricerca Biomedica e Biotecnologia, AIRBB, Itália

2006 - 2006 Curso de curta duração em I Curso Teórico de Atualização em Biologia Molécula. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil

2006 - 2006 Curso de curta duração em Bionumerics. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil

2006 - 2006 Curso de curta duração em I Curso de Atualização em Biologia Molecular Aplicada ao diagnóstico. Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil

2004 - 2004 Curso de curta duração em III Curso de Investigação Criminal. Biosciences Assessoria Científica Laboratorial, BIOSCIENCES, Brasil

2003 - 2003 Curso de curta duração em III Curso à Liga de Genética. Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, Brasil

2002 - 2002 Curso de curta duração em II Curso Introdutório à Liga de Neurologia. Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, Mogi Das Cruzes, Brasil

2002 - 2002 Curso de curta duração em II Curso Introdutório à Liga de Genética. Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, Mogi Das Cruzes, Brasil

2002 - 2002 Curso de curta duração em Curso de Coletas de Materiais Biológicos. NÚCLEO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL, NAP, Brasil

2002 - 2002 Curso de curta duração em I Curso de Investigação Criminal. Biosciences Assessoria Científica Laboratorial, BIOSCIENCES, Brasil

Atuação profissional

1. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo - FCF-USP

Vínculo institucional

2006 - Atual Vínculo: Aluno de Doutorado, Enquadramento funcional: Aluno de Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Integral

2009 - 2009 Vínculo: Estágio, Enquadramento funcional: Programa de Aperfeiçoamento de Ensino PAE,

2006 - 2006 Vínculo: Aluno de Aprimoramento, Enquadramento funcional: Aluno do programa de Aprimoramento, Carga horária: 40, Regime: Integral

Atividades

07/2006 – Atual Projetos de pesquisa, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas

Participação em projetos:

Título: Transcriptoma e Proteoma em sangue periférico para pesquisa de novos marcadores de doenças cardiovasculares: Estudo em Infarto agudo do miocárdio.

01/2006 - 07/2006 Pesquisa e Desenvolvimento, Dep. Análises Clínicas e Toxicológicas - Lab. Biol. Molecular e Toxicológicas

Linhas de Pesquisa:

Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico

2. CRIESP- Central de Radioimunoensaio de São Paulo Ltda. - CRIESP

Vínculo institucional

2005 - 2005 Vínculos: Estagiário, Enquadramento funcional: Estagiário, Carga horária: 30, Regime: Parcial.

2005 - 2006 Vínculos: Celetista, Enquadramento funcional: Laboratorista Júnior, Carga horária: 8, Regime: Dedicação Exclusiva

Atividades

12/2005 - 01/2006 Serviço Técnico Especializado, Laboratório de Análises Clínicas- Biologia Molecular

Especificação:

Sequenciamento do Vírus HIV

03/2005 - 12/2005 Estágio, Laboratório de Análises Clínicas- Biologia Molecular

Estágio:

Estágio em diagnóstico molecular do HIV.

3. University of Chicago - U.C.

Vínculo institucional

2009 - 2009 Vínculos: Pesquisador visitante, Enquadramento funcional: Pesquisador visitante, Carga horária: 8, Regime: Parcial

4. Centro de Investigación Príncipe Felipe - CIPF

Vínculo institucional

2008 - 2008 Vínculos: Colaborador, Enquadramento funcional: Aluno de doutoramento , Carga horária: 40, Regime: Integral

5. Universidade de Santiago de Compostela - USC

Vínculo institucional

2008 - 2009 Vínculos: Colaborador, Enquadramento funcional: Aluno de doutoramento, Carga horária: 40, Regime: Integral

2007 - 2007 Vínculos: Aluno de doutoramento, Enquadramento funcional: Aluno de doutoramento, Carga horária: 40, Regime: Integral

2004 - 2005 Vínculos: Estagiário, Enquadramento funcional: Estagiário, Carga horária: 40, Regime: Integral

6. Universidade de Mogi das Cruzes - UMC

Vínculo institucional

2003 - 2004 Vínculo: Estagiário , Enquadramento funcional: Bolsista PIBIC , Carga horária: 20, Regime: Parcial

Atividades

01/2003 - 12/2004 Estágio, Centro de Ciências Biomédicas

Estágio:

Estágio na área de Biofísica Molecular

7. FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - FMVZ

Vínculo institucional

2003 - 2003 Vínculo: Estagiário , Enquadramento funcional: Estagiário , Carga horária: 34, Regime: Parcial

2002 - 2002 Vínculo: Estagiário , Enquadramento funcional: Estagiário , Carga horária: 30, Regime: Parcial

Linhas de pesquisa

1. Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico

Objetivos: Desenvolver novos marcadores de diagnóstico utilizando métodos de biologia molecular de alto desempenho, como os microarranjos de DNA, MALDI-TOF e SELDI-TOF

Projetos

2006 - Atual Título: Transcriptoma e Proteoma em sangue periférico para pesquisa de novos marcadores de doenças cardiovasculares: Estudo em Infarto agudo do miocárdio.
 Descrição: Projeto que envolve métodos de análise de mRNA e Proteína em larga escala, para a busca de biomarcadores de infarto agudo do miocárdio.
 Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa
 Alunos envolvidos: Doutorado (2);
 Integrantes: Vivian Nogueira Silbiger (Responsável);
 Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES

Áreas de atuação

1. Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico
2. Genética Molecular e de Microorganismos
3. Bioinformática

Idiomas

Inglês	Compreende Bem, Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem
Espanhol	Compreende Bem, Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem
Português	Compreende Bem, Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem

Prêmios e títulos

2009	Melhor Trabalho de Pós-Graduação (Doutorado), Faculdade de Ciências Farmacêuticas
2004	Melhor Trabalho de Iniciação Científica - PIBIQ/CNPq 2004, Universidade de Mogi das Cruzes

Produção em C, T& A

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1. Santos, I.C., **SILBIGER, V.N.**, Higuchi, D., Gomes, M.A., Barcelos, L.S, Teixeira, M.M., Lopes, M.T.P., Cardoso V. N., Lima, M.P., Araujo, R.C., Pesquero, J.B., Pesquero, J.L. Angiostatic activity of human plasminogen fragments is highly dependent on glycosylation. Cancer Science. , v.v, p.1 - 7, 2009.

2. Neto, L.G.L., Hirata, R.D.C., Luchessi, A.D., **SILBIGER, V.N.**, Pastorelli, C.P., Sampaio, M. F., Armaganijan, D., Rezende, A. A., Doi, S. Q., Hirata, M.H.

Detection of the TLR4 1196C>T polymorphism by mismatched-PCR using plasmid DNA as internal control in RFLP assays. *Genetic Testing*. , v.13, p.343 - 347, 2009.

3. Souza, E.M., Hirata, R.D.C., Santos, F.C.P., Picciotti, R., Luchessi, A. D., **SILBINGER, V.N.**, Rodrigues, A. C., Sampaio, M. F., Armaganijan, D ., Salem, M.H., Doi, S. Q., Hirata, M. H. Paraxonase polymorphisms are associated with nitrate levels and vascular response in young adults with myocardial infarction. *The International Journal of Atherosclerosis (Online)*. , v.3, p.156 - 154, 2008.

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)

1. Hirata, M. H., Silva, F.A., Neto, L.G. L., Luchessi, A.D., **SILBINGER, V.N.**, Rodrigues, A.C., Bertolami, M.C., Tavares, V., Rezende, A. A., Doi, S.Q., Sampaio, M.F., Armaganijan, D ., Hirata, R.D.C.

IL-6 -174G>C gene polymorphism can be a marker of type 2 diabetes mellitus In: AACC Annual Meeting, 2009, Chicago.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2009. v.55. p.A223 - A223

2. **SILBINGER, V.N.**, Luchessi, A.D., Neto, L.G.L., Pastorelli, C.P., Sampaio, M.F., Pereira, M.P., Santos, E.S., Armaganijan, D ., Carracedo, A., Hirata, R.D. C., Hirata, M. H.

mRNA Splicing variants observed in peripheral blood from patient with acute myocardial infarction In: Simpósio Anual de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas, 2009, São Paulo.

Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2009. v.45. p.73 - 73

3. **SILBINGER, V.N.**, Luchessi, A.D., Hirata, R.D. C., Carracedo, A., Brión, M., Neto, L.G. L., Pastorelli, C.P., Dopazo, J., Montaner, D., Garcia, F., Sampaio, M.F., Pereira, M.P., Santos, E.S., Armaganijan, D ., Hirata, M. H.

Peripheral blood cells transcriptome to study new biomarkers for myocardial infarction follow up In: AACC Annual Meeting, 2009, Chicago.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2009. v.55. p.A71 - A71

4. Neto, L.G.L., Hirata, R.D.C., Luchessi, A.D., **SILBINGER, V.N.**, Pastorelli, C.P., Sampaio, M.F., Armaganijan, D., Doi, S.Q., Rezende, A.A., Souza, E.B., Sproviere, E.S., Santos, E.S., Pereira, M.P., Hirata, M.H.

TLR2 transcription levels in peripheral blood cells but not TLR4, IL-6 and TNF-alpha is associated with acute myocardial infarction In: AACC Annual Meeting, 2009, Chicago.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2009. v.55. p.A222 - A222

5. Neto, L.G.L., Hirata, R.D.C., Luchessi, A.D., **SILBINGER, V.N.**, Doi, S.Q., Rezende, A.A., Armaganijan, D., Sampaio, M.F., Stephano, M.A., Hirata, M.H.

CD14, TLR 2; TLR 4 and IL-6 Gene Polymorphisms may be associated with acute myocardial infarction in young adult patients In: AACC Annual Meeting, 2008

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2008. v.54. p.A166 - A166

6. **SILBINGER, V. N.**, Luchessi, A.D., Neto, L.G. L., Pastorelli, C.P., Hirata, R.D. C., Santos, E.S., Sampaio, M.F., Avezum, A., Piegas, L., Quitela, I., Brión, M., Carracedo, A., Montaner, D ., Garcia, F., Dopazo, J., Hirata, M. H.

Functional profiling of the peripheral blood cells transcriptome to study cardiovascular biomarkers In: International Meeting of the Microarray and Gene Expression DATA, 2008, Riva del Garda.

MEGED11. , 2008. p.84 - 84

7. Hirata, M.H., Luchessi, A.D., Nomiya, I. Y., **SILBINGER, V.N.**, Neto, L.G.L., Sampaio, M.F., Armaganijan, D., Hirata, R.D.C.

Detection by Real Time PCR of *Streptococcus mutans* in Peripheral blood of Young Myocardium Infarction Patients In: AACC Annual Meeting, 2007, San Diego.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2007. v.53. p.A55 - A55

8. Hirata, M.H., Seto, M.Y., Hirata, R.D.C., Nishikawa, A.M., Luchessi, A. D., **SILBIGER, V.N.**, Neto, L.G. L., Tubero, V.A., Marcelino, S.L., de Micheli, G.
Evaluation of red complex in Brazilian population carried out periodontal disease by Real time PCR In: AACC Annual Meeting, 2007, San Diego.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2007. v.53. p.A66 - A66

9. **SILBIGER, V.N.**, Carloni, A.C, Pradal, M.G.

Genotype diversity of HIV-1 infected patients from Brazil and its relationship to drug resistance In: AACC Annual Meeting, 2006, Chicago.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2006. v.52.

10. **SILBIGER, V.N.**, Carloni, A.C, Pradal, M.G.

Genotypic diversity of Hepatitis C virus in Brazilian patients In: AACC Annual Meeting, 2006, Chicago.

Clinical Chemistry. Washington: Clinical Chemistry, 2006. v.52.

11. **SILBIGER, V.N.**, Souza, E.M., Sampaio, M.F., Armaganijan, D., Santos, F.C.P., Luchessi, A.D., Rodrigues, A.C., Hirata, R.D.C., Hirata, M.H.

Paraxonase 1 e 2 como marcadores genético de infarto agudo do miocárdio em adultos jovens In: XI SEMANA FARMACÊUTICA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, 2006, São Paulo.

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2006. v.42.

12. Neto, L.G. L., Luchessi, A.D., **SILBIGER, V.N.**, Sampaio, M. F., Armaganijan, D., Hirata, R.D.C., Hirata, M.H.

Polimorfismo do gene TLR2 e sua associação com o infarto agudo do miocárdio em adultos jovens In: XI SEMANA FARMACÊUTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006, São Paulo.

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2006. v.42.

13. **SILBIGER, V.N.**, Pesquero, J.L., Araujo, R.C., Higuchi, D.

Estudo da atividade anti-angiogênica da proteína recombinante correspondente ao fragmento K (1-3) do plasminogênio humano In: Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, 2004, Mogi das Cruzes.

Anais do VII Congresso de Iniciação Científica. Mogi das Cruzes: UMC, 2004. p.51 - 51

Produção Técnica

Demais produções técnicas

1. **SILBIGER, V. N.**

Curso de Extensão "Planejamento de projetos Genômicos, Transcriptômicos e Proteômicos", 2009. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)

2. **SILBIGER, V. N.**

III Curso de Biologia Molecular, 2009. (Especialização, Curso de curta duração ministrado)

3. **SILBIGER, V. N.**

Programa de Graduação FCF-USP: Diagnóstico molecular: técnicas atual, 2009. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

4. **SILBIGER, V. N.**

Programa de Pós-Graduação USP-IDPC: Programa de buscas e estudos de comparação de sequências polimórficas, 2009. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

5. **SILBIGER, V. N.**

Programa de Pós-Graduação USP-IDPC: Bancos de Dados de genoma, transcriptoma e proteoma, 2009. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

6. **SILBIGER, V. N.**

I Curso de Biologia Molecular, 2007. (Especialização, Curso de curta duração ministrado)

7. SILBIGER, V. N.

I Curso de Atualização em Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico, 2006. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)

8. SILBIGER, V. N.

V Curso de Investigação Científica Criminal, 2006. (Especialização, Curso de curta duração ministrado)

Orientações e Supervisões

Orientações e Supervisões concluídas

Iniciação científica

1. Iara Nomiya. **Detection by Real Time PCR Streptococcus mutans in Peripheral blood of Yong Myocardium Infarction Patient**. 2007. Iniciação científica (Farmácia) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo

Orientação de outra natureza

1. Débora Cavichioli. **Programa de Aprimoramento Profissional em Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico**. 2009. Orientação de outra natureza (Farmácia) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

Eventos

Participação em eventos

1. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **17 Simpósio Internacional de Iniciação Científica**, 2009. (Simpósio)
Expressão da caspase 9 em células THP-1 diferenciadas e infectadas com isolados de *Mycobacterium tuberculosis*.

2. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **Simpósio Anual de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas**, 2009. (Simpósio)
mRNA Variants observed in peripheral blood cells from patient with acute myocardial infarction.

3. **AACC Annual Meeting 2009**, 2009. (Congresso)

4. **I Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Farmácia Área de Análises Clínicas**, 2009. (Simpósio)

5. **VIII Simpósio de Biossegurança e Descartes de Produtos Químicos Perigosos em Instituição de Ensino e Pesquisa**, 2009. (Simpósio)

6. **Pirosequenciamento uma nova abordagem molecular**, 2009. (Seminário)

7. **Seminários Avançados em Tecnologia de Microarray - Hospital Israelita Albert Einstein**, 2009. (Seminário)

8. **11 International Meeting of the Microarray and Gene Expression DATA**, 2008. (Encontro) (DOC. IX-2.15)

9. Seminar Series: "Integrated Genomics Seminar" - PRBB Barcelona, 2008. (Seminário)

10. **I Jornada Gallega de Bioinformática**, 2008. (Outra)

11. **"Lípidos e Ativação de Processos Inflamatórios no Desenvolvimento da Doença Renal Crônica**, 2007. (Seminário)

12. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **XI Semana Farmacêutica de Ciências e Tecnologia**, 2006. (Encontro)
Polimorfismo do gene TLR2 e sua associação co, o infarto agudo do miocárdio em adultos jovens.
13. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **XI Semana Farmacêutica de Ciências e Tecnologia**, 2006. (Encontro)
Paraxonase 1 e 2 como marcadores genético de infarto agudo do miocárdio em adultos jovens.
14. **VI Simpósio de Biossegurança e Descartes de Produtos Químicos Perigosos em Instituição de Ensino e Pesquisa**, 2006. (Simpósio)
15. **"The impossible dream: major discoveries in medicinal and biological chemistry"**, 2006. (Seminário)
16. **"Inflammation as pathogenic cause in cardiovascular diseases"**, 2006. (Seminário)
17. **"Cloning and Gene Expression Techniques: Fundamentals and Applications"**, 2006. (Simpósio)
18. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **57ª Reunião Anual da SBPC**, 2005. (Encontro)
"Estuda da atividade anti-angiogênica da proteína recombinante correspondente ao fragmento K1-3 do plasminogênio humano".
19. **V Simpósio de Biossegurança e Descartes de Produtos Químicos Perigosos em Instituições de Ensino e Pesquisa**, 2005. (Oficina)
20. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **Semana Nacional de Ciência e Tecnologia**, 2004. (Encontro)
Estudo da atividade anti-angiogênica da proteína recombinante correspondente ao fragmento K (1-3) do plasminogênio humano.
21. Apresentação de Pôster / Painel no(a) **XIX Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE**, 2004. (Congresso)
Estudo da atividade anti-angiogênica da proteína recombinante correspondente ao fragmento K(1-3) do plasminogênio humano.
21. **38 Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial**, 2004. (Congresso)
22. **XIX Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE**, 2004. (Congresso)
23. **III Jornada de Atualização em Genética**, 2004. (Outra)
24. **II Simpósio Paulista de Doença de Depósitos Lisossômico**, 2004. (Simpósio)
25. **I Jornada de Toxicologia Clínica**, 2003. (Outra)
26. **II Jornada de Atualização em Genética**, 2003. (Outra)
27. **I JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM GENÉTICA**, 2002. (Outra)

Organização de evento

1. SILBIGER, V. N.
XV Congresso Paulista de Farmacêuticos VII Seminário Internacional de Farmacêuticos, 2007. (Congresso, Organização de evento)

2. SILBIGER, V. N.

Curso Análise do DNA, 2002. (Outro, Organização de evento)

3. SILBIGER, V. N.

Curso Haplótipos e Polimorfismos Genéticos, 2002. (Outro, Organização de evento)

4. SILBIGER, V. N.

VII Congresso Acadêmico de Biomedicina e XXI Semana Paulista de Biomedicina, 2002.
(Congresso, Organização de evento)

ANEXO D

Tabela 1. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T2 versus GC. Genes ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

ACC	Gene	CytoBand	Descrição	FC	p-valor
NM_002104	GZMK	5q11-q12	granzyme K (granzyme 3; tryptase II)	-2,04	0,00008
NM_001004310	FCRL6	1q23.2	Fc receptor-like 6	-1,95	0,00003
NM_001335	CTSW	11q13.1	cathepsin W	-1,85	0,00001
NM_005601	NKG7	19q13.33	natural killer cell group 7 sequence	-1,73	0,00000
NM_021181	SLAMF7	1q23.1-q24.1	SLAM family member 7	-1,73	0,00001
NM_001337	CX3CR1	3p21l3p21.3	chemokine (C-X3-C motif) receptor 1	-1,72	0,00000
NM_006056	NMUR1	2q37.1	neuromedin U receptor 1	-1,61	0,00013
NM_005442	EOMES	3p21.3-p21.2	eomesodermin homolog (<i>Xenopus laevis</i>)	-1,61	0,00066
NM_018667	SMPD3	16q22.1	sphingomyelin phosphodiesterase 3, neutral membrane (neutral sphingomyelinase II)	-1,60	0,00005
NM_153837	GPR114	16q13	G protein-coupled receptor 114	-1,51	0,00001
NM_175744	RHOC	1p13.1	ras homolog gene family, member C	-1,49	0,00001
NM_024841	FLJ14213	11p13-p12	protor-2	-1,47	0,00002
NM_052939	FCRL3	1q21-q22	Fc receptor-like 3	-1,41	0,00028
NM_000878	IL2RB	22q13 22q13.1	interleukin 2 receptor, beta	-1,41	0,00007
NM_000564	IL5RA	3p26-p24	interleukin 5 receptor, alpha	-1,41	0,00075
NA	NA	NA	NA	-1,36	0,00018
NM_012483	GNLY	2p11.2	granulysin	-1,34	0,00058
NM_000713	BLVRB	19q13.1-q13.2	biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH))	-1,32	0,00061
NM_173799	VSTM3	3q13.31	V-set and transmembrane domain containing 3	-1,32	0,00028
NM_002346	LY6E	8q24.3	lymphocyte antigen 6 complex, locus E	-1,29	0,00014
NM_005810	KLRG1	12p12-p13	killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1	-1,28	0,00021
NM_001002841	MYL4	17q21-qter	myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic	-1,27	0,00044

NM_001078177	SLC29A1	6p21.2-p21.1	solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1	-1,27	0,00012
NM_175039	ST6GALNAC4	9q34	ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4	-1,27	0,00008
NM_004356	CD81	11p15.5	CD81 molecule	-1,25	0,00015
NA	NA	NA	NA	-1,22	0,00001
NM_016428	ABI3	17q21.3	ABI gene family, member 3	-1,21	0,00012
NM_002101	GYPC	2q14-q21	glycophorin C (Gerbich blood group)	-1,21	0,00089
NM_002985	CCL5	17q11.2-q12	chemokine (C-C motif) ligand 5	-1,20	0,00003
NA	NA	NA	NA	-1,18	0,00009
NM_004219	PTTG1	5q35.1	pituitary tumor-transforming 1	-1,18	0,00008
NM_000858	GUK1	1q32-q41	guanylate kinase 1	-1,18	0,00005
NA	NA	NA	NA	-1,17	0,00002
NM_033518	SLC38A5	Xp11.23	solute carrier family 38, member 5	-1,16	0,00003
NM_001077350	C16orf35	16p13.3	chromosome 16 open reading frame 35	-1,16	0,00020
NA	NA	NA	NA	-1,16	0,00002
NA	NA	NA	NA	-1,16	0,00004
NM_004957	FPGS	9q34.1	folylpolyglutamate synthase	-1,16	0,00033
NM_005628	SLC1A5	19q13.3	solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5	-1,15	0,00036
NM_003656	CAMK1	3p25.3	calcium/calmodulin-dependent protein kinase I	-1,14	0,00040
NM_005809	PRDX2	19p13.2	peroxiredoxin 2	-1,14	0,00041
NM_001504	CXCR3	Xq13	chemokine (C-X-C motif) receptor 3	-1,10	0,00023
NM_152607	C1orf177	1p32.3	chromosome 1 open reading frame 177	-1,10	0,00049
NM_147130	NCR3	6p21.3	natural cytotoxicity triggering receptor 3	-1,08	0,00054
NM_005608	PTPRCAP	11q13.3	protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated protein	-1,07	0,00068
NM_024070	PVRIG	7q22.1	poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing	-1,06	0,00077
NM_001400	S1PR1	1p21	sphingosine-1-phosphate receptor 1	-1,06	0,00083

NA	NA	NA	NA	-1,06	0,00049
NM_003863	DPM2	9q34.13	dolichyl-phosphate mannosyltransferase polypeptide 2, regulatory subunit	-1,04	0,00053
NM_001031680	RUNX3	1p36	runt-related transcription factor 3	-1,04	0,00064
NM_003132	SRM	1p36-p22	spermidine synthase	-1,03	0,00077
NM_021805	SIGIRR	11p15.5	single immunoglobulin and toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain	-1,03	0,00059
NM_012171	TSPAN17	5q35.3	tetraspanin 17	-1,02	0,00059
NM_001841	CNR2	1p36.11	cannabinoid receptor 2 (macrophage)	-1,02	0,00028
NM_030914	URM1	9q34.11	ubiquitin related modifier 1 homolog (S. cerevisiae)	-1,02	0,00013
NM_015275	KIAA1033	12q24.11	KIAA1033	1,00	0,00003
NM_004755	RPS6KA5	14q31-q32.1	ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5	1,00	0,00020
NM_030769	NPL	1q25	N-acetylneuraminate pyruvate lyase (dihydrodipicolinate synthase)	1,01	0,00003
NM_032900	ARHGAP19	10q24.1	Rho GTPase activating protein 19	1,01	0,00015
NM_013450	BAZ2B	2q23-q24	bromodomain adjacent to zinc finger domain, 2B	1,01	0,00001
NM_016143	NSFL1C	20p13	NSFL1 (p97) cofactor (p47)	1,01	0,00032
NM_152624	DCP2	5q22.2	DCP2 decapping enzyme homolog (S. cerevisiae)	1,01	0,00004
NM_004580	RAB27A	15q15-q21.1	RAB27A, member RAS oncogene family	1,01	0,00014
NM_001511	CXCL1	4q21	chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha)	1,02	0,00027
NM_175854	PAN3	13q12.2	PAN3 polyA specific ribonuclease subunit homolog (S. cerevisiae)	1,02	0,00026
NM_004859	CLTC	17q11-qter	clathrin, heavy chain (Hc)	1,02	0,00052
NM_017771	PXK	3p14.3	PX domain containing serine/threonine kinase	1,02	0,00008
NM_018643	TREM1	6p21.1	triggering receptor expressed on myeloid cells 1	1,02	0,00023
NM_003010	MAP2K4	17p11.2	mitogen-activated protein kinase kinase 4	1,02	0,00007
NM_032303	HSDL2	9q32	hydroxysteroid dehydrogenase like 2	1,02	0,00041
NM_177924	ASAHI	8p22-p21.3	N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase) 1	1,02	0,00003
NM_006469	IVNS1ABP	1q25.1-q31.1	influenza virus NS1A binding protein	1,03	0,00000
NM_001001664	SPOPL	2q22.1	speckle-type POZ protein-like	1,03	0,00058

NM_181717	HCG27	6p21.33	HLA complex group 27	1,03	0,00008
NM_002923	RGS2	1q31	regulator of G-protein signaling 2, 24kDa	1,03	0,00021
ENST00000292369	tcag7.1177	7q22.1	opposite strand transcription unit to STAG3	1,03	0,00002
NM_006549	CAMKK2	12q24.2	calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, beta	1,03	0,00040
NM_138782	FCHO2	5q13.2	FCH domain only 2	1,03	0,00051
NM_203351	MAP3K3	17q23.3	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3	1,03	0,00007
NM_004330	BNIP2	15q22.2	BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 2	1,04	0,00076
NM_031916	ROPN1L	5p15.2	ropporin 1-like	1,04	0,00084
NM_031925	TMEM120A	7q11.23	transmembrane protein 120A	1,04	0,00008
NM_020856	TSHZ3	19q12	teashirt zinc finger homeobox 3	1,04	0,00033
NM_145309	LRRC51	11q13.4	leucine rich repeat containing 51	1,04	0,00008
NM_178460	SIRPD	20p13	signal-regulatory protein delta	1,04	0,00010
NM_024586	OSBPL9	1p32.3	oxysterol binding protein-like 9	1,04	0,00001
NM_014873	LPGAT1	1q32	lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1	1,04	0,00000
NM_030759	NRBF2	10q21.2	nuclear receptor binding factor 2	1,05	0,00083
NM_007296	BRCA1	17q21	breast cancer 1, early onset	1,05	0,00002
NM_033397	KIAA1754	10q25.1	KIAA1754	1,05	0,00024
NM_014912	CPEB3	10q23.32	cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3	1,05	0,00021
NM_012198	GCA	2q24.2	grancalcin, EF-hand calcium binding protein	1,06	0,00017
NM_024617	ZCCHC6	9q21	zinc finger, CCHC domain containing 6	1,06	0,00017
NM_005472	KCNE3	11q13-q14	potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 3	1,06	0,00007
NM_182485	CPEB2	4p15.33	cytoplasmic polyadenylation element binding protein 2	1,06	0,00003
NM_000256	MYBPC3	11p11.2	myosin binding protein C, cardiac	1,06	0,00069
NM_024537	CARS2	13q34	cysteinyI-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative)	1,06	0,00010
NM_021255	PELI2	14q21	pellino homolog 2 (Drosophila)	1,06	0,00021
NM_012229	NT5C2	10q24.32-q24.33	5'-nucleotidase, cytosolic II	1,06	0,00042

NM_178169	RASSF3	12q14.2	Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 3	1,06	0,00003
NM_006608	PHTF1	1p13	putative homeodomain transcription factor 1	1,06	0,00099
NM_006519	DYNLT1	6q25.2-q25.3	dynein, light chain, Tctex-type 1	1,06	0,00001
NM_002296	LBR	1q42.1	lamin B receptor	1,06	0,00002
NA	NA	NA	NA	1,07	0,00078
NM_183013	CREM	10p11.21	cAMP responsive element modulator	1,07	0,00064
NM_015295	SMCHD1	18p11.32	structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1	1,07	0,00009
NM_001045556	SLA	8q22.3-qter 8q24	Src-like-adaptor	1,07	0,00033
NM_024874	KIAA0319L	1p34.2	KIAA0319-like	1,07	0,00044
NM_004664	LIN7A	12q21	lin-7 homolog A (C. elegans)	1,08	0,00026
NM_017917	PPP2R3C	14q13.2	protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B", gamma	1,08	0,00033
NM_022473	ZFP106	15q15.1	zinc finger protein 106 homolog (mouse)	1,08	0,00011
NM_005802	TOPORS	9p21	topoisomerase I binding, arginine/serine-rich	1,08	0,00089
NM_182914	SYNE2	14q23.2	spectrin repeat containing, nuclear envelope 2	1,08	0,00038
NM_001039590	USP9X	Xp11.4	ubiquitin specific peptidase 9, X-linked	1,08	0,00015
NM_152581	MOSPD2	Xp22.2	motile sperm domain containing 2	1,08	0,00007
NM_153810	C10orf46	10q26.11	chromosome 10 open reading frame 46	1,08	0,00002
NM_001047605	KIR3DX1	19q13.42	killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, X1	1,09	0,00025
NM_016951	CKLF	16q21	chemokine-like factor	1,09	0,00025
NM_005406	ROCK1	18q11.1	Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1	1,09	0,00097
NM_138340	ABHD3	18q11.2	abhydrolase domain containing 3	1,09	0,00002
NM_023003	TM6SF1	15q24-q26	transmembrane 6 superfamily member 1	1,09	0,00034
NM_018169	C12orf35	12p11.21	chromosome 12 open reading frame 35	1,10	0,00000
NR_004854	AMN1	12p11.21	antagonist of mitotic exit network 1 homolog (S. cerevisiae)	1,10	0,00016
NM_032900	ARHGAP19	10q24.1	Rho GTPase activating protein 19	1,10	0,00050
NA	NA	NA	NA	1,10	0,00012

NM_014089	NUPL1	13q12.13	nucleoporin like 1	1,10	0,00014
NM_007166	PICALM	11q14	phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein	1,10	0,00012
NM_173496	MPP7	10p11.23	membrane protein, palmitoylated 7 (MAGUK p55 subfamily member 7)	1,10	0,00005
NM_017905	TMCO3	13q34	transmembrane and coiled-coil domains 3	1,10	0,00021
NM_203301	FBXO33	14q21.1	F-box protein 33	1,10	0,00001
NM_013448	BAZ1A	14q12-q13	bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A	1,10	0,00006
NM_144687	NLRP12	19q13.41	NLR family, pyrin domain containing 12	1,10	0,00086
NM_005964	MYH10	17p13	myosin, heavy chain 10, non-muscle	1,10	0,00012
NM_024669	ANKRD55	5q11.2	ankyrin repeat domain 55	1,11	0,00036
NM_000720	CACNA1D	3p14.3	calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1D subunit	1,11	0,00036
NM_003864	SAP30	4q34.1	Sin3A-associated protein, 30kDa	1,11	0,00026
NM_015473	HEATR5A	14q12	HEAT repeat containing 5A	1,11	0,00073
NM_022977	ACSL4	Xq22.3-q23	acyl-CoA synthetase long-chain family member 4	1,12	0,00013
BC008651	MGC9913	19q13.43	hypothetical protein MGC9913	1,12	0,00063
NM_023037	FRY	13q13.1	furry homolog (Drosophila)	1,12	0,00036
NM_005573	LMNB1	5q23.3-q31.1	lamin B1	1,12	0,00007
NM_003953	MPZL1	1q24.2	myelin protein zero-like 1	1,12	0,00036
NM_002294	LAMP2	Xq24	lysosomal-associated membrane protein 2	1,12	0,00015
NM_052897	MBD6	---	methyl-CpG binding domain protein 6	1,12	0,00006
NM_002956	CLIP1	12q24.3	CAP-GLY domain containing linker protein 1	1,12	0,00006
NA	NA	NA	NA	1,12	0,00026
NM_138799	MBOAT2	2p25.1	membrane bound O-acyltransferase domain containing 2	1,13	0,00016
NM_001776	ENTPD1	10q24	ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1	1,13	0,00018
NM_003621	PPFIBP2	11p15.4	PTPRF interacting protein, binding protein 2 (liprin beta 2)	1,13	0,00063
NM_020803	KLHL8	4q22.1	kelch-like 8 (Drosophila)	1,13	0,00015
NM_024677	NSUN7	4p14	NOL1/NOP2/Sun domain family, member 7	1,13	0,00030

NM_001085386	NF-E4	7q22.1	transcription factor NF-E4	1,13	0,00012
NM_052957	ACRC	Xq13.1	acidic repeat containing	1,14	0,00060
NM_006256	PKN2	1p22.2	protein kinase N2	1,14	0,00000
NA	NA	NA	NA	1,14	0,00082
NM_017851	PARP16	15q22.31	poly (ADP-ribose) polymerase family, member 16	1,14	0,00008
NM_033334	NR6A1	9q33-q34.1	nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1	1,14	0,00004
NM_002392	MDM2	12q14.3-q15	Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse)	1,14	0,00006
NM_017762	MTMR10	15q13.3	myotubularin related protein 10	1,15	0,00001
NM_152271	LONRF1	8p23.1	LON peptidase N-terminal domain and ring finger 1	1,15	0,00003
NM_144649	TMEM71	8q24.22	transmembrane protein 71	1,15	0,00001
NM_020960	GPR107	9q34.11	G protein-coupled receptor 107	1,15	0,00017
NM_020531	C20orf3	20p11.22-p11.21	chromosome 20 open reading frame 3	1,15	0,00026
NM_012215	MGEA5	10q24.1-q24.3	meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase)	1,15	0,00001
NM_014465	SULT1B1	4q13.3	sulfotransferase family, cytosolic, 1B, member 1	1,16	0,00043
NM_006243	PPP2R5A	1q32.2-q32.3	protein phosphatase 2, regulatory subunit B', alpha isoform	1,16	0,00012
NM_003101	SOAT1	1q25	sterol O-acyltransferase (acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase) 1	1,16	0,00000
NM_014247	RAPGEF2	4q32.1	Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2	1,16	0,00002
NM_018590	CSGALNACT2	10q11.21	chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 2	1,16	0,00007
NM_003824	FADD	11q13.3	Fas (TNFRSF6)-associated via death domain	1,16	0,00001
NM_198082	CCDC57	17q25.3	coiled-coil domain containing 57	1,16	0,00000
NM_000158	GBE1	3p12.3	glucan (1,4-alpha-), branching enzyme 1 (glycogen branching enzyme, Andersen disease, glycogen storage disease type IV)	1,16	0,00000
NA	NA	NA	NA	1,17	0,00023
NM_021958	HLX	1q41-q42.1	H2.0-like homeobox	1,17	0,00081
NM_000608	ORM2	9q32	orosomucoid 2	1,17	0,00015
NM_006609	MAP3K2	2q14.3	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2	1,17	0,00003

NA	NA	NA	NA	1,17	0,00014
NM_012331	MSRA	8p23.1	methionine sulfoxide reductase A	1,17	0,00008
NM_000328	RPGR	Xp11.4	retinitis pigmentosa GTPase regulator	1,18	0,00022
BC101349	C20orf197	20q13.33	chromosome 20 open reading frame 197	1,18	0,00002
NM_005479	FRAT1	10q24.1	frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas	1,18	0,00035
NM_138554	TLR4	9q32-q33	toll-like receptor 4	1,18	0,00024
NM_024829	FLJ22662	12p13.1	hypothetical protein FLJ22662	1,18	0,00005
NM_004685	MTMR6	13q12	myotubularin related protein 6	1,18	0,00011
NM_003626	PPFIA1	11q13.3	protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein (liprin), alpha 1	1,18	0,00002
NM_006260	DNAJC3	13q32	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3	1,18	0,00040
NM_022457	RFWD2	1q25.1-q25.2	ring finger and WD repeat domain 2	1,19	0,00016
NM_025137	SPG11	15q14	spastic paraplegia 11 (autosomal recessive)	1,19	0,00060
NM_022113	KIF13A	6p23	kinesin family member 13A	1,19	0,00009
NM_016018	PHF20L1	8q24.22	PHD finger protein 20-like 1	1,19	0,00000
NM_002863	PYGL	14q21-q22	phosphorylase, glycogen; liver (Hers disease, glycogen storage disease type VI)	1,19	0,00069
NM_001013618	IGLL3	22q11.2 22q11.23	immunoglobulin lambda-like polypeptide 3	1,19	0,00064
NM_021250	LILRA5	19q13.4	leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 5	1,19	0,00029
NM_153261	TMEM188	16q12.1	transmembrane protein 188	1,19	0,00000
NM_033274	ADAM19	5q32-q33	ADAM metalloproteinase domain 19 (meltrin beta)	1,19	0,00034
NM_015364	LY96	8q21.11	lymphocyte antigen 96	1,19	0,00046
NM_024607	PPP1R3B	8p23.1	protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3B	1,20	0,00023
NM_006939	SOS2	14q21	son of sevenless homolog 2 (Drosophila)	1,20	0,00013
NM_024940	DOCK5	8p21.2	dedicator of cytokinesis 5	1,20	0,00003
NM_000259	MYO5A	15q21	myosin VA (heavy chain 12, myoxin)	1,21	0,00000
NM_006152	LRMP	12p12.1	lymphoid-restricted membrane protein	1,21	0,00000

NM_145170	TTC18	10q22.2	tetratricopeptide repeat domain 18	1,21	0,00009
NM_139247	ADCY4	14q12	adenylate cyclase 4	1,21	0,00008
NM_018349	MCTP2	15q26.2	multiple C2 domains, transmembrane 2	1,21	0,00024
NM_144579	SFXN5	---	sideroflexin 5	1,21	0,00000
NM_004968	ICA1	7p22	islet cell autoantigen 1, 69kDa	1,21	0,00004
NA	NA	NA	NA	1,21	0,00004
NM_021244	RRAGD	6q15-q16	Ras-related GTP binding D	1,21	0,00011
NM_001433	ERN1	17q24.2	endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1	1,21	0,00002
NM_181784	SPRED2	2p14	sprouty-related, EVH1 domain containing 2	1,22	0,00004
NM_024717	MCTP1	5q15	multiple C2 domains, transmembrane 1	1,22	0,00012
NM_003059	SLC22A4	5q31.1	solute carrier family 22 (organic cation/ergothioneine transporter), member 4	1,22	0,00015
NM_004665	VNN2	6q23-q24	vanin 2	1,22	0,00000
NM_152230	IPMK	10q21.1	inositol polyphosphate multikinase	1,22	0,00013
NM_181861	APAF1	12q23	apoptotic peptidase activating factor 1	1,23	0,00001
NM_000632	ITGAM	16p11.2	integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit)	1,23	0,00064
NM_014982	PCNX	14q24.2	pecanex homolog (Drosophila)	1,23	0,00007
AJ420442	C9orf164	9q22.2	chromosome 9 open reading frame 164	1,23	0,00003
NM_002032	FTH1	11q13	ferritin, heavy polypeptide 1	1,23	0,00001
NM_019065	NECAB2	16q23.3	N-terminal EF-hand calcium binding protein 2	1,23	0,00019
NM_003111	SP3	2q31	Sp3 transcription factor	1,23	0,00018
NM_005391	PDK3	Xp22.11	pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 3	1,23	0,00001
NM_030962	SBF2	11p15.4	SET binding factor 2	1,24	0,00008
NM_032138	KBTBD7	13q14.11	kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 7	1,24	0,00007
NM_005688	ABCC5	3q27	ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 5	1,24	0,00000
BC093004	C18orf32	18q21.1	chromosome 18 open reading frame 32	1,24	0,00003
NM_019053	EXOC6	10q23.33	exocyst complex component 6	1,24	0,00007

BC017297	FAM49B	8q24.21	family with sequence similarity 49, member B	1,25	0,00001
NM_002759	EIF2AK2	2p22-p21	eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2	1,25	0,00040
NM_001037343	CDKL5	Xp22	cyclin-dependent kinase-like 5	1,25	0,00009
NM_014916	LMTK2	7q21.3	lemur tyrosine kinase 2	1,25	0,00006
NM_198507	TMEM157	5q21.1	transmembrane protein 157	1,25	0,00003
NM_007246	KLHL2	4q21.2	kelch-like 2, Mayven (Drosophila)	1,26	0,00060
NM_003933	BAIAP3	16p13.3	BAI1-associated protein 3	1,26	0,00088
NM_015054	UHRF1BP1L	12q23.1	UHRF1 (ICBP90) binding protein 1-like	1,26	0,00000
NM_207366	SEPT14	7p11.2	septin 14	1,26	0,00000
NM_015087	SPG20	13q13.3	spastic paraplegia 20 (Troyer syndrome)	1,26	0,00053
NM_006915	RP2	Xp11.4-p11.21	retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive)	1,27	0,00004
NM_000875	IGF1R	15q26.3	insulin-like growth factor 1 receptor	1,27	0,00011
NM_020741	KIAA1257	3q21.3	KIAA1257	1,27	0,00001
NM_032831	ORAI2	7q22.1	ORAI calcium release-activated calcium modulator 2	1,28	0,00024
NM_003971	SPAG9	17q21.33	sperm associated antigen 9	1,28	0,00001
NM_004183	BEST1	11q13	bestrophin 1	1,28	0,00013
BC021569	MGC31957	8p21.2	hypothetical protein MGC31957	1,28	0,00007
AY139008	C5orf41	5q35.2	chromosome 5 open reading frame 41	1,28	0,00003
NA	NA	NA	NA	1,29	0,00009
NM_000876	IGF2R	6q26	insulin-like growth factor 2 receptor	1,29	0,00012
NM_180991	SLCO4C1	5q21.2	solute carrier organic anion transporter family, member 4C1	1,29	0,00000
NM_001550	IFRD1	7q22-q31	interferon-related developmental regulator 1	1,30	0,00000
NM_005213	CSTA	3q21	cystatin A (stefin A)	1,30	0,00093
NM_203391	GK	Xp21.3	glycerol kinase	1,30	0,00006
NM_016006	ABHD5	3p21	abhydrolase domain containing 5	1,30	0,00002
NM_002493	NDUFB6	9p21.1	NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 6, 17kDa	1,30	0,00008

NM_006954	ZNF33A	10p11.2	zinc finger protein 33A	1,31	0,00037
BC066975	C3orf25	3q21.3	chromosome 3 open reading frame 25	1,31	0,00001
NM_031412	GABARAPL1	12p13.2	GABA(A) receptor-associated protein like 1	1,32	0,00002
NM_020762	SRGAP1	12q14.2	SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1	1,32	0,00014
NM_032717	AGPAT9	4q21.23	1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 9	1,32	0,00004
NM_130469	JDP2	14q24.3	Jun dimerization protein 2	1,32	0,00008
NM_177980	CDH26	20q13.2-q13.33	cadherin-like 26	1,32	0,00001
NM_024762	ZNF552	19q13.43	zinc finger protein 552	1,32	0,00001
NM_080491	GAB2	11q14.1	GRB2-associated binding protein 2	1,33	0,00003
NM_012482	ZNF281	1q32.1	zinc finger protein 281	1,33	0,00000
NM_003137	SRPK1	6p21.3-p21.2	SFRS protein kinase 1	1,33	0,00013
NA	NA	NA	NA	1,34	0,00023
NM_006459	ERLIN1	10q21-q22	ER lipid raft associated 1	1,34	0,00012
NM_000651	CR1	1q32	complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group)	1,34	0,00047
NM_014991	WDFY3	4q21.23	WD repeat and FYVE domain containing 3	1,34	0,00025
NM_012413	QPCT	2p22.2	glutaminy-peptide cyclotransferase (glutaminy cyclase)	1,34	0,00001
NM_001995	ACSL1	4q34-q35	acyl-CoA synthetase long-chain family member 1	1,35	0,00072
NM_032294	CAMKK1	17p13.2	calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha	1,35	0,00001
NM_052889	COP1	---	caspase-1 dominant-negative inhibitor pseudo-ICE	1,35	0,00006
NM_005621	S100A12	1q21	S100 calcium binding protein A12	1,35	0,00003
NM_015556	SIPA1L1	14q24.2	signal-induced proliferation-associated 1 like 1	1,35	0,00015
NM_016230	CYB5R4	6pter-q22.33	cytochrome b5 reductase 4	1,35	0,00000
NM_001924	GADD45A	1p31.2-p31.1	growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha	1,35	0,00017
NM_002243	KCNJ15	21q22.2	potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 15	1,36	0,00085
NM_173676	PNPLA1	6p21.31	patatin-like phospholipase domain containing 1	1,36	0,00006
NM_014326	DAPK2	15q22.31	death-associated protein kinase 2	1,36	0,00015

NA	NA	NA	NA	1,36	0,00085
NM_002881	RALB	2cen-q13	v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B (ras related; GTP binding protein)	1,37	0,00042
NM_006573	TNFSF13B	13q32-q34	tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b	1,37	0,00001
NM_148894	FAM44A	4p16.1	family with sequence similarity 44, member A	1,38	0,00000
NM_001105251	ZFYVE16	5q14	zinc finger, FYVE domain containing 16	1,38	0,00000
NM_194449	PHLPP	18q21.33	PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase	1,39	0,00016
NM_003054	SLC18A2	10q25	solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2	1,39	0,00031
NM_201428	RTN3	11q13	reticulon 3	1,40	0,00002
NM_003057	SLC22A1	6q26	solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1	1,40	0,00001
NM_182755	ZNF438	10p11.23	zinc finger protein 438	1,40	0,00044
NM_152996	ST6GALNAC3	1p31.1	ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 3	1,40	0,00012
NM_198040	PHC2	1p34.3	polyhomeotic homolog 2 (Drosophila)	1,40	0,00022
NM_006441	MTHFS	15q25.1	5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase)	1,40	0,00001
NM_207325	DPY19L3	19q13.11	dpy-19-like 3 (C. elegans)	1,41	0,00011
NM_152313	SLC36A4	11q21	solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4	1,42	0,00002
NM_014861	ATP2C2	16q24.1	ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 2	1,42	0,00002
NM_006825	CKAP4	12q23.3	cytoskeleton-associated protein 4	1,42	0,00011
NM_032523	OSBPL6	2q31-q32.1	oxysterol binding protein-like 6	1,42	0,00001
BC035515	C5orf36	5q15	chromosome 5 open reading frame 36	1,43	0,00001
NM_138450	ARL11	13q14.3	ADP-ribosylation factor-like 11	1,43	0,00000
NM_001440	EXTL3	8p21	exostoses (multiple)-like 3	1,43	0,00000
NM_138337	CLEC12A	12p13.2	C-type lectin domain family 12, member A	1,44	0,00068
NM_003245	TGM3	20q11.2	transglutaminase 3 (E polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase)	1,44	0,00011
NM_007288	MME	3q25.1-q25.2	membrane metallo-endopeptidase	1,44	0,00001
NM_021209	NLRC4	2p22-p21	NLR family, CARD domain containing 4	1,44	0,00000

NM_024307	GDPD3	16p11.2	glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 3	1,44	0,00001
NM_018079	SRBD1	2p21	S1 RNA binding domain 1	1,45	0,00000
NM_024558	C14orf138	14q22.1	chromosome 14 open reading frame 138	1,45	0,00000
NM_145699	APOBEC3A	22q13.1-q13.2	apolipoprotein B RNAm editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3A	1,46	0,00001
NM_012395	PFTK1	7q21-q22	PFTAIRES protein kinase 1	1,46	0,00000
NM_005345	HSPA1A	6p21.3	heat shock 70kDa protein 1A	1,47	0,00002
NA	NA	NA	NA	1,47	0,00029
NM_032796	SYAP1	Xp22.2	synapse associated protein 1, SAP47 homolog (Drosophila)	1,47	0,00000
NM_207113	SLC37A3	7q34	solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 3	1,47	0,00001
NM_001079673	FNDC3A	13q14.2	fibronectin type III domain containing 3A	1,48	0,00000
NM_005091	PGLYRP1	19q13.2-q13.3	peptidoglycan recognition protein 1	1,48	0,00014
NM_020366	RPGRIP1	14q11	retinitis pigmentosa GTPase regulator interacting protein 1	1,48	0,00002
NM_001792	CDH2	18q11.2	cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal)	1,48	0,00003
NM_003885	CDK5R1	17q11.2	cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35)	1,49	0,00003
NM_025179	PLXNA2	1q32.2	plexin A2	1,49	0,00003
NM_004748	CCPG1	15q21.1	cell cycle progression 1	1,49	0,00000
NM_080597	OSBPL1A	18q11.1	oxysterol binding protein-like 1A	1,50	0,00017
NM_032839	DIRC2	3q21.1	disrupted in renal carcinoma 2	1,50	0,00000
NM_001100879	ST20	15q25.1	suppressor of tumorigenicity 20	1,51	0,00010
NM_020698	TMCC3	12q22	transmembrane and coiled-coil domain family 3	1,52	0,00007
NM_006576	AVIL	12q14.1	advillin	1,55	0,00002
NM_021202	TP53INP2	20q11.22	tumor protein p53 inducible nuclear protein 2	1,55	0,00001
NM_018420	SLC22A15	1p13.1	solute carrier family 22, member 15	1,56	0,00001
NM_178539	FAM19A2	12q14.1	family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A2	1,56	0,00000
NM_153046	TDRD9	14q32.33	tudor domain containing 9	1,56	0,00010
NA	NA	NA	NA	1,57	0,00007

BC115358	BTF3L1	13q22	basic transcription factor 3, like 1	1,57	0,00021
NM_001009905	B3GNTL1	17q25.3	UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase-like 1	1,58	0,00000
NR_002189	SUMO1P1	20q13.2	SUMO1 pseudogene 1	1,59	0,00000
NA	NA	NA	NA	1,59	0,00050
NM_002108	HAL	12q22-q24.1	histidine ammonia-lyase	1,60	0,00005
NM_003830	SIGLEC5	19q13.3	sialic acid binding Ig-like lectin 5	1,60	0,00020
NM_000922	PDE3B	11p15.1	phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited	1,61	0,00000
NM_024610	HSPBAP1	3q21.1	HSPB (heat shock 27kDa) associated protein 1	1,61	0,00000
NM_031476	CRISPLD2	16q24.1	cysteine-rich secretory protein LCCL domain containing 2	1,61	0,00040
NM_018050	MANSC1	12p13.2	MANSC domain containing 1	1,62	0,00019
BC128148	C1orf161	1p13.1	chromosome 1 open reading frame 161	1,64	0,00038
NM_003235	TG	8q24	thyroglobulin	1,64	0,00005
NM_078625	VNN3	6q23-q24	vanin 3	1,64	0,00000
NM_001114735	BCL2A1	15q24.3	BCL2-related protein A1	1,65	0,00002
NM_000896	CYP4F3	19p13.2	cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 3	1,65	0,00003
NM_052961	SLC26A8	6p21	solute carrier family 26, member 8	1,65	0,00012
NM_000219	KCNE1	21q22.1- q22.2 21q22.12	potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1	1,65	0,00006
NM_025113	C13orf18	13q14.12	chromosome 13 open reading frame 18	1,66	0,00000
NM_000222	KIT	4q11-q12	v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog	1,66	0,00000
NM_000804	FOLR3	11q13	folate receptor 3 (gamma)	1,67	0,00002
NM_005139	ANXA3	4q13-q22	annexin A3	1,67	0,00021
NM_021140	UTX	Xp11.2	ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat, X chromosome	1,67	0,00014
NM_001817	CEACAM4	19q13.2	carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 4	1,67	0,00003
NM_001304	CPD	17q11.2	carboxypeptidase D	1,68	0,00001
NM_001024599	HIST2H2BF	1q21.2	histone cluster 2, H2bf	1,69	0,00001

NM_004668	MGAM	7q34	maltase-glucoamylase (alpha-glucosidase)	1,70	0,00005
NM_170776	GPR97	16q13	G protein-coupled receptor 97	1,71	0,00007
NM_012387	PADI4	1p36.13	peptidyl arginine deiminase, type IV	1,72	0,00008
NM_153687	IKIP	12q23.1	IKK interacting protein	1,72	0,00002
NM_016616	TXNDC3	7p14.1	thioredoxin domain containing 3 (spermatozoa)	1,72	0,00000
NM_001001415	ZNF429	19p13.1	zinc finger protein 429	1,73	0,00001
NM_207628	ABCG1	21q22.3	ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 1	1,74	0,00001
NM_201999	ELF2	4q28	E74-like factor 2 (ets domain transcription factor)	1,75	0,00000
ENST00000370979	LOC284757	20q13.33	hypothetical protein LOC284757	1,77	0,00007
BC031976	C7orf53	7q31.1	chromosome 7 open reading frame 53	1,77	0,00000
NM_005384	NFIL3	9q22	nuclear factor, interleukin 3 regulated	1,78	0,00000
NM_000130	F5	1q23	coagulation factor V (proaccelerin, labile factor)	1,79	0,00003
NM_002758	MAP2K6	17q24.3	mitogen-activated protein kinase kinase 6	1,79	0,00001
NM_020650	RCN3	19q13.33	reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain	1,79	0,00000
NM_005502	ABCA1	9q31.1	ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1	1,83	0,00000
NM_004633	IL1R2	2q12-q22	interleukin 1 receptor, type II	1,83	0,00038
NM_006691	LYVE1	11p15	lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1	1,83	0,00002
NM_001062	TCN1	11q11-q12	transcobalamin I (vitamin B12 binding protein, R binder family)	1,85	0,00063
AF314543	OCR1	1q32.1	ovarian cancer-related protein 1	1,85	0,00006
NM_014373	GPR160	3q26.2-q27	G protein-coupled receptor 160	1,89	0,00000
NM_022746	MOSC1	1q41	MOCO sulphurase C-terminal domain containing 1	1,89	0,00000
NM_152792	ASPRV1	2p14	aspartic peptidase, retroviral-like 1	1,90	0,00000
NM_145032	FBXL13	7q22.1	F-box and leucine-rich repeat protein 13	1,90	0,00000
NM_017576	KIF27	9q21.32	kinesin family member 27	1,91	0,00000
NM_002084	GPX3	5q23	glutathione peroxidase 3 (plasma)	1,93	0,00000
NM_000717	CA4	17q23	carbonic anhydrase IV	1,94	0,00001

NM_004666	VNN1	6q23-q24	vanin 1	1,94	0,00003
NM_004444	EPHB4	7q22	EPH receptor B4	1,96	0,00000
NM_152751	C10orf30	10p13	chromosome 10 open reading frame 30	1,98	0,00093
NM_020808	SIPA1L2	1q42.2	signal-induced proliferation-associated 1 like 2	1,99	0,00014
NM_002000	FCAR	19q13.2-q13.4	Fc fragment of IgA, receptor for	2,01	0,00001
NM_004994	MMP9	20q11.2-q13.1	matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase)	2,04	0,00069
NM_181791	GPR141	7p14.1	G protein-coupled receptor 141	2,04	0,00000
NR_003542	UNQ9368	4q35.1	RTFV9368	2,05	0,00001
NM_001081640	PRKDC	8q11	protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide	2,06	0,00000
NM_020995	HPR	16q22.1	haptoglobin-related protein	2,09	0,00002
NM_000877	IL1R1	2q12	interleukin 1 receptor, type I	2,10	0,00000
NM_014358	CLEC4E	12p13.31	C-type lectin domain family 4, member E	2,10	0,00001
NM_139241	FGD4	12p11.21	FYVE, RhoGEF and PH domain containing 4	2,11	0,00000
NM_022136	SAMSN1	21q11	SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1	2,16	0,00000
NM_006212	PFKFB2	1q31	6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2	2,22	0,00007
NM_007115	TNFAIP6	2q23.3	tumor necrosis factor, alpha-induced protein 6	2,22	0,00000
AY358263	UNQ9419	2q12.1	AHPA9419	2,28	0,00014
NM_003749	IRS2	13q34	insulin receptor substrate 2	2,29	0,00001
NM_007199	IRAK3	12q14.3	interleukin-1 receptor-associated kinase 3	2,34	0,00001
NM_002129	HMGB2	4q31	high-mobility group box 2	2,36	0,00000
NM_003246	THBS1	15q15	thrombospondin 1	2,43	0,00001
NM_144590	ANKRD22	10q23.31	ankyrin repeat domain 22	2,45	0,00012
NM_003855	IL18R1	2q12	interleukin 18 receptor 1	2,52	0,00000
NM_080387	CLEC4D	12p13.31	C-type lectin domain family 4, member D	2,55	0,00000
NM_000045	ARG1	6q23	arginase, liver	2,67	0,00004

NM_018728	MYO5C	15q21	myosin VC	2,83	0,00000
NM_024693	ECHDC3	10p14	enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3	3,01	0,00000
NM_203281	BMX	Xp22.2	BMX non-receptor tyrosine kinase	3,12	0,00000
NM_015225	PRUNE2	9q21.13	prune homolog 2 (Drosophila)	3,54	0,00000

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Cytogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm 1,0$; p-valor < 0,001.

Tabela 2. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T12 versus GC. Genes ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

ACC	Gene	Cytobanddd	Descrição	FC	p-valor
NM_001140	ALOX15	17p13.3	arachidonate 15-lipoxygenase	-2,15	0,00082
NM_001738	CA1	8q13-q22.1	carbonic anhydrase I	-2,11	0,00003
NM_001978	EPB49	8p21.1	erythrocyte membrane protein band 4.9 (dematin)	-2,10	0,00001
NM_016633	ERAF	16p11.2	erythroid associated factor	-2,00	0,00013
NM_020476	ANK1	8p11.1	ankyrin 1, erythrocytic	-1,95	0,00002
CR456748	RUNDC3A	17q21.31	RUN domain containing 3A	-1,91	0,00057
NM_022648	TNS1	2q35-q36	tensin 1	-1,89	0,00006
NM_000119	EPB42	15q15-q21	erythrocyte membrane protein band 4.2	-1,88	0,00029
NM_032385	C5orf4	5q31-q32	chromosome 5 open reading frame 4	-1,81	0,00023
NM_003944	SELENBP1	1q21-q22	selenium binding protein 1	-1,78	0,00051
NM_016232	IL1RL1	2q12	interleukin 1 receptor-like 1	-1,72	0,00018
NM_001002841	MYL4	17q21-qter	myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic	-1,72	0,00000
NM_006563	KLF1	19p13.13-p13.12	Kruppel-like factor 1 (erythroid)	-1,71	0,00007
NA	NA	NA	NA	-1,70	0,00000
NM_020683	ADORA3	1p13.2	adenosine A3 receptor	-1,64	0,00001
NM_001024858	SPTB	14q23-q24.2	spectrin, beta, erythrocytic (includes spherocytosis, clinical type I)	-1,64	0,00003
NM_002101	GYPC	2q14-q21	glycophorin C (Gerbich blood group)	-1,61	0,00001

NM_002501	NFIX	19p13.3	nuclear factor I/X (CCAAT-binding transcription factor)	-1,60	0,00004
NM_138445	GPR146	7p22.3	G protein-coupled receptor 146	-1,59	0,00015
NM_001048166	STIL	1q32l1p32	SCL/TAL1 interrupting locus	-1,58	0,00008
NM_001077350	C16orf35	16p13.3	chromosome 16 open reading frame 35	-1,56	0,00000
NA	NA	NA	NA	-1,52	0,00000
NM_017709	FAM46C	1p12	family with sequence similarity 46, member C	-1,52	0,00014
NM_006039	MRC2	17q23.2	mannose receptor, C type 2	-1,52	0,00029
NM_018027	FRMD4A	10p13	FERM domain containing 4A	-1,51	0,00004
NA	NA	NA	NA	-1,46	0,00000
NM_003275	TMOD1	9q22.3	tropomodulin 1	-1,45	0,00007
NM_018667	SMPD3	16q22.1	sphingomyelin phosphodiesterase 3, neutral membrane (neutral sphingomyelinase II)	-1,45	0,00009
NM_015431	TRIM58	1q44	tripartite motif-containing 58	-1,44	0,00030
NM_005723	TSPAN5	4q23	tetraspanin 5	-1,43	0,00075
NM_005629	SLC6A8	Xq28	solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, creatine), member 8	-1,43	0,00006
NM_017495	RBM38	20q13.31	RNA binding motif protein 38	-1,41	0,00003
NM_002100	GYPB	4q28-q31	glycophorin B (MNS blood group)	-1,40	0,00001
NM_003863	DPM2	9q34.13	dolichyl-phosphate mannosyltransferase polypeptide 2, regulatory subunit	-1,37	0,00000
NM_004091	E2F2	1p36	E2F transcription factor 2	-1,36	0,00024
NM_000858	GUK1	1q32-q41	guanylate kinase 1	-1,36	0,00000
NM_012483	GNLY	2p11.2	granulysin	-1,35	0,00025
NM_138578	BCL2L1	20q11.21	BCL2-like 1	-1,34	0,00013
NA	NA	NA	NA	-1,32	0,00001
NM_000564	IL5RA	3p26-p24	interleukin 5 receptor, alpha	-1,31	0,00083
NA	NA	NA	NA	-1,30	0,00037
NM_018388	MBNL3	Xq26.2	muscleblind-like 3 (Drosophila)	-1,30	0,00004

NA	NA	NA	NA	-1,30	0,00000
NM_033518	SLC38A5	Xp11.23	solute carrier family 38, member 5	-1,30	0,00000
NM_003651	CSDA	12p13.1	cold shock domain protein A	-1,29	0,00002
NM_016016	SLC25A39	17q12	solute carrier family 25, member 39	-1,28	0,00008
NM_001078177	SLC29A1	6p21.2-p21.1	solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1	-1,27	0,00005
NM_001335	CTSW	11q13.1	cathepsin W	-1,25	0,00051
NM_017899	TESC	12q24.22	tescalcin	-1,24	0,00012
NM_001002265	MARCH8	10q11.21	membrane-associated ring finger (C3HC4) 8	-1,24	0,00006
NM_000713	BLVRB	19q13.1-q13.2	biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH))	-1,24	0,00061
NM_012179	FBXO7	22q12-q13	F-box protein 7	-1,23	0,00001
NM_020850	RANBP10	16q22.1	RAN binding protein 10	-1,22	0,00004
NM_175039	ST6GALNAC4	9q34	ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylglactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4	-1,21	0,00006
NA	NA	NA	NA	-1,21	0,00000
NM_001724	BPGM	7q31-q34	2,3-bisphosphoglycerate mutase	-1,18	0,00005
NM_203342	EPB41	1p33-p32	erythrocyte membrane protein band 4.1 (elliptocytosis 1, RH-linked)	-1,15	0,00007
NM_173799	VSTM3	3q13.31	V-set and transmembrane domain containing 3	-1,14	0,00071
NM_025241	UBXD1	19p13	UBX domain containing 1	-1,13	0,00095
NA	NA	NA	NA	-1,12	0,00001
NM_178578	PSMF1	20p13	proteasome (prosome, macropain) inhibitor subunit 1 (PI31)	-1,11	0,00004
NM_004188	GFI1B	9q34.13	growth factor independent 1B transcription repressor	-1,06	0,00035
NM_005067	SIAH2	3q25	seven in absentia homolog 2 (Drosophila)	-1,03	0,00002
NM_003486	SLC7A5	16q24.3	solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 5	-1,03	0,00005
NM_031444	C22orf13	22q11.2	chromosome 22 open reading frame 13	-1,02	0,00011
NM_032272	MAF1	8q24.3	MAF1 homolog (S. cerevisiae)	-1,02	0,00003
NM_001841	CNR2	1p36.11	cannabinoid receptor 2 (macrophage)	-1,01	0,00013

NM_004748	CCPG1	15q21.1	cell cycle progression 1	1,00	0,00012
NM_003059	SLC22A4	5q31.1	solute carrier family 22 (organic cation/ergothioneine transporter), member 4	1,01	0,00064
NM_006441	MTHFS	15q25.1	5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase)	1,01	0,00027
NM_152271	LONRF1	8p23.1	LON peptidase N-terminal domain and ring finger 1	1,01	0,00007
NM_024307	GDPD3	16p11.2	glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 3	1,03	0,00051
NM_025184	EFHC2	Xp11.3	EF-hand domain (C-terminal) containing 2	1,03	0,00008
NM_007166	PICALM	11q14	phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein	1,04	0,00011
NM_024607	PPP1R3B	8p23.1	protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3B	1,04	0,00057
NM_181785	SLC46A3	13q12.3	solute carrier family 46, member 3	1,06	0,00024
NM_012215	MGEA5	10q24.1-q24.3	meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase)	1,06	0,00002
NM_052889	COP1	---	caspase-1 dominant-negative inhibitor pseudo-ICE	1,06	0,00059
NM_019597	HNRNP2	Xq22	heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H2 (H')	1,06	0,00034
NM_002032	FTH1	11q13	ferritin, heavy polypeptide 1	1,06	0,00003
NA	NA	NA	NA	1,07	0,00028
NM_145170	TTC18	10q22.2	tetratricopeptide repeat domain 18	1,08	0,00018
NM_004972	JAK2	9p24	Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase)	1,08	0,00015
NM_021097	SLC8A1	2p23-p22	solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1	1,09	0,00059
NM_005906	MAK	6p24	male germ cell-associated kinase	1,09	0,00091
NM_138340	ABHD3	18q11.2	abhydrolase domain containing 3	1,12	0,00000
NM_006576	AVIL	12q14.1	advillin	1,14	0,00044
NM_138450	ARL11	13q14.3	ADP-ribosylation factor-like 11	1,16	0,00004
NM_006281	STK3	8q22.2	serine/threonine kinase 3 (STE20 homolog, yeast)	1,17	0,00003
NM_000804	FOLR3	11q13	folate receptor 3 (gamma)	1,17	0,00092
NM_003414	ZNF267	16p11.2	zinc finger protein 267	1,17	0,00041
NM_024945	RMI1	9q21.32	RMI1, RecQ mediated genome instability 1, homolog (S. cerevisiae)	1,20	0,00019

NM_005384	NFIL3	9q22	nuclear factor, interleukin 3 regulated	1,22	0,00011
NM_201453	CBWD3	9q13	COBW domain containing 3	1,24	0,00092
NM_173078	SLITRK4	Xq27.3	SLIT and NTRK-like family, member 4	1,26	0,00005
NM_001008394	EID3	12q23-q24.1	EP300 interacting inhibitor of differentiation 3	1,27	0,00033
NR_002189	SUMO1P1	20q13.2	SUMO1 pseudogene 1	1,28	0,00004
NM_004508	IDI1	10p15.3	isopentenyl-diphosphate delta isomerase 1	1,33	0,00010
NM_203391	GK	Xp21.3	glycerol kinase	1,35	0,00001
BC093861	FLJ34047	5p15.1	hypothetical protein FLJ34047	1,35	0,00024
NM_001100879	ST20	15q25.1	suppressor of tumorigenicity 20	1,40	0,00012
NM_006691	LYVE1	11p15	lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1	1,40	0,00030
NM_020650	RCN3	19q13.33	reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain	1,42	0,00000
NM_006009	TUBA1A	12q12-q14.3	tubulin, alpha 1a	1,46	0,00007
NM_001114735	BCL2A1	15q24.3	BCL2-related protein A1	1,52	0,00002
NM_005323	HIST1H1T	6p21.3	histone cluster 1, H1t	1,60	0,00004
NM_020995	HPR	16q22.1	haptoglobin-related protein	1,66	0,00024
NM_001024599	HIST2H2BF	1q21.2	histone cluster 2, H2bf	1,66	0,00000
NM_005139	ANXA3	4q13-q22	annexin A3	1,89	0,00001
NM_015225	PRUNE2	9q21.13	prune homolog 2 (Drosophila)	2,09	0,00059
NM_198153	TREML4	6p21.1	triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4	3,74	0,00059

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Cytogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm$ 1,0; p-valor < 0,001.

Tabela 3. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T24 versus GC. Genes ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

ACC	Gene	Cytobandddd	Descrição	FC	p-valor
NM_020683	ADORA3	1p13.2	adenosine A3 receptor	-1,30	0,0001
NM_001024858	SPTB	14q23-q24.2	spectrin, beta, erythrocytic (includes spherocytosis, clinical type I)	-1,29	0,0007
NA	NA	NA	NA	-1,19	0,0004
NM_020650	RCN3	19q13.33	reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain	1,20	0,0001
NA	NA	NA	NA	1,20	0,0010
NA	NA	NA	NA	1,98	0,0007

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Citogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm 1,0$; p-valor < 0,001.

Tabela 4. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T36 versus GC. Genes ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

ACC	Gene	Cytobandddd	Descrição	FC	p-valor
NM_001978	EPB49	8p21.1	erythrocyte membrane protein band 4.9 (dematin)	-1,58	0,0004
NM_020476	ANK1	8p11.1	ankyrin 1, erythrocytic	-1,53	0,0006
NM_001002841	MYL4	17q21-qter	myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic	-1,47	0,0000
NM_138445	GPR146	7p22.3	G protein-coupled receptor 146	-1,44	0,0005
NM_001024858	SPTB	14q23-q24.2	spectrin, beta, erythrocytic (includes spherocytosis, clinical type I)	-1,36	0,0004
NA	NA	NA	NA	-1,35	0,0001
NM_016016	SLC25A39	17q12	solute carrier family 25, member 39	-1,29	0,0001
NM_001077350	C16orf35	16p13.3	chromosome 16 open reading frame 35	-1,29	0,0000
NM_002101	GYPC	2q14-q21	glycophorin C (Gerbich blood group)	-1,27	0,0002
NM_002501	NFIX	19p13.3	nuclear factor I/X (CCAAT-binding transcription factor)	-1,23	0,0010
NM_003651	CSDA	12p13.1	cold shock domain protein A	-1,23	0,0000
NA	NA	NA	NA	-1,22	0,0000

NA	NA	NA	NA	-1,21	0,0000
NM_005629	SLC6A8	Xq28	solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, creatine), member 8	-1,2	0,0005
NA	NA	NA	NA	-1,18	0,0001
NM_000858	GUK1	1q32-q41	guanylate kinase 1	-1,13	0,0000
NM_004359	CDC34	19p13.3	cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae)	-1,11	0,0001
NM_175039	ST6GALNAC4	9q34	ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminy-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylglactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4	-1,1	0,0002
NM_001002265	MARCH8	10q11.21	membrane-associated ring finger (C3HC4) 8	-1,1	0,0003
NA	NA	NA	NA	-1,08	0,0000
NA	NA	NA	NA	-1,08	0,0000
NM_003863	DPM2	9q34.13	dolichyl-phosphate mannosyltransferase polypeptide 2, regulatory subunit	-1,07	0,0002
NA	NA	NA	NA	-1,06	0,0002
NM_006100	ST3GAL6	3q12.1	ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6	1,01	0,0004
NM_030667	PTPRO	12p13.3- p13.2 12p13- p12	protein tyrosine phosphatase, receptor type, O	1,03	0,0001
NM_024945	RMI1	9q21.32	RMI1, RecQ mediated genome instability 1, homolog (S. cerevisiae)	1,1	0,0006
NM_020650	RCN3	19q13.33	reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain	1,12	0,0001
NA	NA	NA	NA	1,24	0,0009
NM_003414	ZNF267	16p11.2	zinc finger protein 267	1,25	0,0002
NM_173078	SLITRK4	Xq27.3	SLIT and NTRK-like family, member 4	1,4	0,0000
NM_001866	COX7B	Xq21.1	cytochrome c oxidase subunit VIIb	1,45	0,0004
NA	NA	NA	NA	1,49	0,0000
NA	NA	NA	NA	1,93	0,0009

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Cytogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm 1,0$; p-valor < 0,001.

Tabela 5. Genes diferencialmente expressos entre 1º IAM T48 versus GC. Genes ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

ACC	Gene	Cytobanddd	Descrição	FC	p-valor
NM_017709	FAM46C	1p12	family with sequence similarity 46, member C	-1,3	0,0009
NM_003651	CSDA	12p13.1	cold shock domain protein A	- 1,17	0,0001
NM_016016	SLC25A39	17q12	solute carrier family 25, member 39	- 1,15	0,0003
NM_015999	ADIPOR1	1p36.13-q41	adiponectin receptor 1	- 1,06	0,0000
NM_001002265	MARCH8	10q11.21	membrane-associated ring finger (C3HC4) 8	- 1,05	0,0005
NM_006830	UQCR	19p13.3	ubiquinol-cytochrome c reductase, 6.4kDa subunit	1	0,0002
NR_002612	DLEU2	13q14.3	deleted in lymphocytic leukemia, 2	1,01	0,0007
NM_003414	ZNF267	16p11.2	zinc finger protein 267	1,08	0,0010
BC093004	C18orf32	18q21.1	chromosome 18 open reading frame 32	1,09	0,0001
NM_015364	LY96	8q21.11	lymphocyte antigen 96	1,13	0,0004
NM_024307	GDPD3	16p11.2	glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 3	1,14	0,0001
NM_004894	C14orf2	14q32.33	chromosome 14 open reading frame 2	1,17	0,0008
NM_015962	FCF1	14q24.3	FCF1 small subunit (SSU) processome component homolog (S. cerevisiae)	1,17	0,0008
NM_014402	UQCRQ	5q31.1	ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII, 9.5kDa	1,19	0,0010
NM_001099670	C8orf59	8q21.2	chromosome 8 open reading frame 59	1,19	0,0006
NM_002493	NDUFB6	9p21.1	NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 6, 17kDa	1,2	0,0001
NA	NA	NA	NA	1,23	0,0000
NA	NA	NA	NA	1,26	0,0003
NM_032231	FAM96A	15q22.31	family with sequence similarity 96, member A	1,26	0,0006

NM_005213	CSTA	3q21	cystatin A (stefin A)	1,27	0,0006
NA	NA	NA	NA	1,59	0,0008
NM_001030001	RPS29	14q	ribosomal protein S29	1,6	0,0001
NA	NA	NA	NA	1,63	0,0000
NA	NA	NA	NA	1,67	0,0006
NA	NA	NA	NA	1,77	0,0001
NA	NA	NA	NA	1,79	0,0008
NM_001866	COX7B	Xq21.1	cytochrome c oxidase subunit VIIb	1,85	0,0000
NA	NA	NA	NA	1,93	0,0008
NA	NA	NA	NA	1,96	0,0006
NM_203497	COMMD6	---	COMM domain containing 6	2,12	0,0006
NA	NA	NA	NA	2,25	0,0007
NM_033022	RPS24	10q22-q23	ribosomal protein S24	2,25	0,0007
NA	NA	NA	NA	2,26	0,0000
NA	NA	NA	NA	2,65	0,0000

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Cytogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm 1,0$; p-valor < 0,001.

Tabela 6. Genes diferencialmente expressos entre 2º IAM versus GC. Genes ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change* para cada tempo de colheita, apartir do T₂.

	ACC/AffyID	Símbolo	Posição	Descrição	FC	p-valor
T ₂	NM_000561	GSTM1	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M1</i>	-2,36	0,0000
	NM_139248	LIPH	3q27	<i>lipase, member H</i>	-1,61	0,0003
	NM_006610	MASP2	1p36.3-p36.2	<i>mannan-binding lectin serine peptidase 2</i>	-1,46	0,0007
	NM_001078177	SLC29A1	6p21.2-p21.1	<i>solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1</i>	-1,14	0,0004
	NM_024592	SRD5A3	4q12	<i>steroid 5 alpha-reductase 3</i>	-1,12	0,0009
	NM_002508	NID1	1q43	<i>nidogen 1</i>	-1,08	0,0005
	NM_000848	GSTM2	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M2 (muscle)</i>	-1,04	0,0001
	NM_000608	ORM2	9q32	<i>orosomucoid 2</i>	1,01	0,0008
	NM_003885	CDK5R1	17q11.2	<i>cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35)</i>	1,14	0,0009
	NM_024693	ECHDC3	10p14	<i>enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3</i>	1,70	0,0010
	NM_002692	POLE2	14q21-q22	<i>polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)</i>	1,86	0,0001
	NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>	2,12	0,0000
	NM_002112	HDC	15q21-q22	<i>histidine decarboxylase</i>	2,45	0,0003
T ₁₂	NM_000561	GSTM1	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M1</i>	-2,47	0,0000
	2536500	NA	NA	NA	-1,89	0,0000
	BC063788	FLJ37078	7q11.23	<i>hypothetical protein FLJ37078</i>	-1,78	0,0008
	NM_001079910	LRRIQ1	12q21.31	<i>leucine-rich repeats and IQ motif containing 1</i>	-1,67	0,0000
	NM_017950	CCDC40	17q25.3	<i>coiled-coil domain containing 40</i>	-1,61	0,0000
	NM_013427	ARHGAP6	Xp22.3	<i>Rho GTPase activating protein 6</i>	-1,55	0,0000
	NM_152607	C1orf177	1p32.3	<i>chromosome 1 open reading frame 177</i>	-1,52	0,0000
	NM_052832	SLC26A7	8q23	<i>solute carrier family 26, member 7</i>	-1,51	0,0000
	NM_024103	SLC25A23	19p13.3	<i>solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 23</i>	-1,51	0,0008
	NM_004389	CTNNA2	2p12-p11.1	<i>catenin (cadherin-associated protein), alpha 2</i>	-1,45	0,0001
	NM_022138	SMOC2	6q27	<i>SPARC related modular calcium binding 2</i>	-1,42	0,0007
	2674261	NA	NA	NA	-1,41	0,0005
	NM_181807	DCDC1	11p13	<i>doublecortin domain containing 1</i>	-1,40	0,0000
	NM_001037131	CENTG2	2q37	<i>centaurin, gamma 2</i>	-1,38	0,0007
	NM_002213	ITGB5	3q21.2	<i>integrin, beta 5</i>	-1,32	0,0003
	NM_001992	F2R	5q13	<i>coagulation factor II (thrombin) receptor</i>	-1,32	0,0004
	NM_004278	PIGL	17p12-p11.2	<i>phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class L</i>	-1,30	0,0001
	NM_001098213	HRH1	3p25	<i>histamine receptor H1</i>	-1,29	0,0001
	NM_021733	TSKS	19q13.3	<i>testis-specific kinase substrate</i>	-1,25	0,0001

	NM_033104	STON2	14q31.1	<i>stonin 2</i>	-1,24	0,0006
	3725968	NA	NA	NA	-1,22	0,0002
	NM_147127	EVC2	4p16.2-p16.1	<i>Ellis van Creveld syndrome 2 (limbin)</i>	-1,21	0,0002
	2406301	NA	NA	NA	-1,20	0,0000
	2968440	NA	NA	NA	-1,19	0,0008
	NM_005263	GFI1	1p22	<i>growth factor independent 1 transcription repressor</i>	-1,17	0,0004
	NM_001077350	C16orf35	16p13.3	<i>chromosome 16 open reading frame 35</i>	-1,15	0,0010
	NM_001769	CD9	12p13.3	<i>CD9 molecule</i>	-1,12	0,0005
	2436178	NA	NA	NA	-1,12	0,0005
	NM_000848	GSTM2	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M2 (muscle)</i>	-1,10	0,0002
	NM_002075	GNB3	12p13	<i>guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 3</i>	-1,10	0,0001
	NM_032013	NDRG3	20q11.21-q11.23	<i>NDRG family member 3</i>	-1,08	0,0004
	3556176	NA	NA	NA	-1,07	0,0010
	NM_002584	PAX7	1p36.2-p36.12	<i>paired box 7</i>	-1,07	0,0003
	NM_006739	MCM5	22q13.1	<i>minichromosome maintenance complex component 5</i>	-1,07	0,0005
	NM_005329	HAS3	16q22.1	<i>hyaluronan synthase 3</i>	-1,05	0,0001
	NM_003087	SNCG	10q23.2-q23.3	<i>synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)</i>	-1,05	0,0001
	NM_032105	PPP1R12B	1q32.1	<i>protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12B</i>	-1,02	0,0000
	4113312	NA	NA	NA	1,03	0,0007
	3743540	NA	NA	NA	1,04	0,0008
	NM_138340	ABHD3	18q11.2	<i>abhydrolase domain containing 3</i>	1,17	0,0000
	2325205	NA	NA	NA	1,18	0,0006
	NM_203391	GK	Xp21.3	<i>glycerol kinase</i>	1,19	0,0009
	NM_005574	LMO2	11p13	<i>LIM domain only 2 (rhombotin-like 1)</i>	1,38	0,0004
	NM_000566	FCGR1A	1q21.2-q21.3	<i>Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64)</i>	1,44	0,0003
	NM_001024599	HIST2H2BF	1q21.2	<i>histone cluster 2, H2bf</i>	1,48	0,0004
	NM_001114735	BCL2A1	15q24.3	<i>BCL2-related protein A1</i>	1,59	0,0002
	3145955	NA	NA	NA	1,66	0,0002
	NM_001866	COX7B	Xq21.1	<i>cytochrome c oxidase subunit VIIb</i>	1,68	0,0007
	3722318	NA	NA	NA	2,09	0,0006
	NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>	2,15	0,0000
T ₂₄	NM_000561	GSTM1	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M1</i>	-2,20	0,0001
	NM_152607	C1orf177	1p32.3	<i>chromosome 1 open reading frame 177</i>	-1,31	0,0003
	NM_001769	CD9	12p13.3	<i>CD9 molecule</i>	-1,16	0,0004
	NM_032859	ABHD13	13q33.3	<i>abhydrolase domain containing 13</i>	1,02	0,0009

	NM_174887	IFT20	17q11.2	<i>intraflagellar transport 20 homolog (Chlamydomonas)</i>	1,06	0,0008
	NM_025054	VCPIP1	8q13	<i>valosin containing protein (p97)/p47 complex interacting protein 1</i>	1,06	0,0003
	NM_138450	ARL11	13q14.3	<i>ADP-ribosylation factor-like 11</i>	1,13	0,0006
	NM_138340	ABHD3	18q11.2	<i>abhydrolase domain containing 3</i>	1,15	0,0001
	NM_016410	CHMP5	9p13.3	<i>chromatin modifying protein 5</i>	1,24	0,0009
	NM_024945	RMI1	9q21.32	<i>RMI1, RecQ mediated genome instability 1, homolog (S. cerevisiae)</i>	1,28	0,0009
	NM_001539	DNAJA1	9p13-p12	<i>DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1</i>	1,33	0,0006
	NM_002624	PFDN5	12q12	<i>prefoldin subunit 5</i>	1,45	0,0010
	NM_001114735	BCL2A1	15q24.3	<i>BCL2-related protein A1</i>	1,49	0,0004
	NM_005213	CSTA	3q21	<i>cystatin A (stefin A)</i>	1,57	0,0005
	NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>	1,61	0,0002
	NM_001866	COX7B	Xq21.1	<i>cytochrome c oxidase subunit VIIb</i>	1,65	0,0008
	NM_203497	COMMD6	---	<i>COMM domain containing 6</i>	2,54	0,0007
T ₃₆	NM_000561	GSTM1	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M1</i>	-3,29	0,0000
	BC022250	C5orf23	5p13.3	<i>chromosome 5 open reading frame 23</i>	-1,74	0,0002
	NM_001040260	DCLK2	4q31.3	<i>doublecortin-like kinase 2</i>	-1,71	0,0007
	NM_001039362	ATP6V1C2	---	<i>ATPase, H+ transporting, lysosomal 42kDa, V1 subunit C2</i>	-1,13	0,0004
	NM_080429	AQP10	1q21.3	<i>aquaporin 10</i>	-1,03	0,0000
	NM_001166	BIRC2	11q22	<i>baculoviral IAP repeat-containing 2</i>	1,04	0,0006
	BC093004	C18orf32	18q21.1	<i>chromosome 18 open reading frame 32</i>	1,08	0,0002
	NM_052889	COP1	---	<i>caspase-1 dominant-negative inhibitor pseudo-ICE</i>	1,09	0,0008
	NM_001677	ATP1B1	1q24	<i>ATPase, Na+/K+ transporting, beta 1 polypeptide</i>	1,11	0,0009
	NM_003916	AP1S2	Xp22.2	<i>adaptor-related protein complex 1, sigma 2 subunit</i>	1,12	0,0010
	NM_005574	LMO2	11p13	<i>LIM domain only 2 (rhombotin-like 1)</i>	1,13	0,0008
	NM_024945	RMI1	9q21.32	<i>RMI1, RecQ mediated genome instability 1, homolog (S. cerevisiae)</i>	1,15	0,0007
	NM_173078	SLITRK4	Xq27.3	<i>SLIT and NTRK-like family, member 4</i>	1,17	0,0003
	2599936	NA	NA	NA	1,17	0,0002
	NM_032328	EFCAB2	1q44	<i>EF-hand calcium binding domain 2</i>	1,20	0,0006
	3306593	NA	NA	NA	1,20	0,0008
	NM_003414	ZNF267	16p11.2	<i>zinc finger protein 267</i>	1,22	0,0005
	NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>	1,40	0,0002
	2968444	NA	NA	NA	1,46	0,0006
	NM_001003927	EVI2A	17q11.2	<i>ecotropic viral integration site 2A</i>	1,55	0,0006
	NM_001047605	KIR3DX1	19q13.42	<i>killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, X1</i>	1,62	0,0001
	NM_002692	POLE2	14q21-q22	<i>polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)</i>	1,68	0,0003

T ₄₈	NR_002781	TSPYL3	20q11.21	<i>TSPY-like 3 (pseudogene)</i>	-2,24	0,0003
	NM_001007271	DUSP13	10q22.2	<i>dual specificity phosphatase 13</i>	-1,93	0,0010
	NM_000561	GSTM1	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M1</i>	-1,84	0,0009
	NM_017805	RASIP1	19q13.33	<i>Ras interacting protein 1</i>	-1,59	0,0006
	NM_032432	ABLIM2	4p16-p15	<i>actin binding LIM protein family, member 2</i>	-1,34	0,0003
	AY358216	UNQ9374	5q35.1	<i>VCEW9374</i>	-1,33	0,0009
	NM_152779	GLIPR1L1	12q21.1	<i>GLI pathogenesis-related 1 like 1</i>	-1,29	0,0005
	3570105	NA	NA	NA	-1,22	0,0002
	BC048800	C10orf47	10p14	<i>chromosome 10 open reading frame 47</i>	-1,21	0,0008
	NM_000848	GSTM2	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M2 (muscle)</i>	-1,21	0,0001
	NM_017577	GRAMD1C	3q13.31	<i>GRAM domain containing 1C</i>	-1,10	0,0001
	NM_007031	HSF2BP	21q22.3	<i>heat shock transcription factor 2 binding protein</i>	-1,09	0,0005
	NM_012315	KLK9	19q13.33	<i>kallikrein-related peptidase 9</i>	-1,09	0,0004
	NM_003284	TNP1	2q35-q36	<i>transition protein 1 (during histone to protamine replacement)</i>	-1,07	0,0010
	NM_021733	TSKS	19q13.3	<i>testis-specific kinase substrate</i>	-1,05	0,0007
	NM_006801	KDELRL1	19q13.3	<i>KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1</i>	1,04	0,0004
	NM_012151	F8A1	Xq28	<i>coagulation factor VIII-associated (intronic transcript) 1</i>	1,11	0,0004
	3825163	NA	NA	NA	1,14	0,0000
	NM_014314	DDX58	9p12	<i>DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58</i>	1,16	0,0002
	NM_015492	C15orf39	15q24.2	<i>chromosome 15 open reading frame 39</i>	1,17	0,0005
	NM_030776	ZBP1	20q13.31	<i>Z-DNA binding protein 1</i>	1,17	0,0006
	3743502	NA	NA	NA	1,28	0,0001
	NM_020650	RCN3	19q13.33	<i>reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain</i>	1,32	0,0002
	NM_006417	IFI44	1p31.1	<i>interferon-induced protein 44</i>	1,65	0,0006
	NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>	1,89	0,0000

Nota: Gene, de acordo com a nomenclatura HUGO (*Human Genome Organization*); CytoBand, localização cromossômica (*Cytogenetic Band*); ACC, número de acesso do gene no banco de dados públicos (www.ncbi.nlm.nih.gov); FC – *Fold Change* $\pm 1,0$; T₂, segunda colheita após angioplastia; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h; p-valor < 0,001.

Tabela7. Genes validados listados de acordo com Localização cromossômica, celular, tipo e funções e doenças associadas.

ACC	Gene	CytoBand	Descrição	Localização	Tipo	Funções e Doenças Associadas
NM_001140	ALOX15	17p13.3	<i>arachidonate 15-lipoxygenase</i>	Citoplasma	enzima	Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; DC ; Doença Neurológica; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Hematológica; Resposta Inflamatória; Apresentação de Antígenos; Célula-Célula Sinalização e Interação; Desenvolvimento Celular; Injúria Abdominal; Bioquímica de pequenas moléculas; Doença do Sistema Reprodutor; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Transporte molecular; Resposta Imune Humoral; Trânsito de Células do Sistema Imune; Desenvolvimento Muscular e Esquelético; Ciclo Celular; Metabolismo Lipídico; Desenvolvimento de Órgãos; Funcionamento Celular; Desordem do Sistema Endócrino; Doença Metabólica; Organização Celular; Compromisso Celular; Desordem no Desenvolvimento; Desenvolvimento Tecidual; Sinalização Celular;
NM_001657	AREG	4q13-q21	<i>amphiregulin (schwannoma-derived growth factor)</i>	Espaço Extracelular	fator de crescimento	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; DC ; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Doença Imunológica; Célula-Célula Sinalização e Interação; Desenvolvimento Celular; Injúria Abdominal; Desordem Muscular e Esquelética; Doença do Sistema Reprodutor; Desenvolvimento Muscular e Esquelético; Ciclo Celular; Doenças Dermatológicas; Movimentação Celular; Desenvolvimento de Órgãos; Funcionamento Celular; Desenvolvimento Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Nervoso; Desordem na Conectividade Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Reprodutor; Morfologia Tumoral;
NM_001114735	BCL2A1	15q24.3	<i>BCL2-related protein A1</i>	Citoplasma	outros	Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Imunológica; Doença Hematológica; Apresentação de Antígenos; Célula-Célula Sinalização e Interação; Sobrevida do Organismo; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular ; Ciclo Celular; Organização Celular; Compromisso Celular; Infecção;

NM_138578	BCL2L1	20q11.21	<i>BCL2-like 1</i>	Citoplasma	outros	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; Doença Neurológica; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Imunológica; Doença Hematológica; Resposta Inflamatória; Célula-Célula Sinalização e Interação; Desenvolvimento Celular; Injúria Abdominal; Desordem Muscular e Esquelética; Sobrevivência do Organismo; Bioquímica de pequenas moléculas; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular ; Transporte molecular; Resposta Imune Humoral; Morfologia de Órgão; Trânsito de Células do Sistema Imune; Ciclo Celular; Metabolismo Lipídico; Desenvolvimento de Órgãos; Funcionamento Celular; Desordem do Sistema Endócrino; Doença Renal e Urológica; Doença Oftalmológica; Organização Celular; Desenvolvimento Tecidual; Hematopoese; Desenvolvimento do Sistema Nervoso; Desordem na Conectividade Tecidual; Morfologia Celular; Doença Hepática; Desenvolvimento do Sistema Endócrino; Remoção de Radicais Livres; ;
NM_001738	CA1	8q13-q22.1	<i>carbonic anhydrase I</i>	Citoplasma	enzima	Desordem Genética; DC ; Doença Neurológica; Desordem Muscular e Esquelética; Bioquímica de pequenas moléculas; Desordem do Sistema Endócrino; Doença Renal e Urológica; Doença Metabólica; Doença Oftalmológica; Desenvolvimento do Sistema Visual; Estrutura e Desenvolvimento do Tecido Linfóide; ; Desenvolvimento do Sistema Digestivo;
NM_001866	COX7B	Xq21.1	<i>cytochrome c oxidase subunit VIIb</i>	Citoplasma	enzima	DC ; Doença Neurológica; Estrutura e Desenvolvimento do Tecido Linfóide; ; Organismo Funcional;
NM_183013	CREM	10p11.21	<i>cAMP responsive element modulator</i>	Núcleo	regulador de transcrição	Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; Doença Neurológica; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Sobrevivência do Organismo; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular ; Morfologia de Órgão; Ciclo

						Celular; Desordem do Sistema Endócrino; Doença Metabólica; Compromisso Celular; Desordem no Desenvolvimento; Desenvolvimento do Sistema Nervoso; Morfologia Celular; Desenvolvimento do Sistema Endócrino;
NM_024693	ECHDC3	10p14	<i>enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3</i>	NA	enzima	Desordem Muscular e Esquelética; Resposta Imune Humoral; Doenças Respiratórias;
NM_000804	FOLR3	11q13	<i>folate receptor 3 (gamma)</i>	Espaço Extracelular	outros	Metabolismo de drogas; Transpote molecular; Bioquímica de pequenas moléculas; Metabolismo de aminoácidos Metabolismo de Vitaminas e Sais minerais;
NM_002084	GPX3	5q23	<i>glutathione peroxidase 3 (plasma)</i>	Espaço Extracelular	enzima	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; Sobrevivência do Organismo; Doença do Sistema Reprodutor; Desordem no Desenvolvimento;
NM_000561	GSTM1	1p13.3	<i>glutathione S-transferase M1</i>	Citoplasma	enzima	Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; Doença Neurológica; Morte Celular; Doença do Sistema Reprodutor;
NM_003855	IL18R1	2q12	<i>interleukin 18 receptor 1</i>	Membrana Plasmática	receptor transmembrana	Desordem Genética; DC ; Doença Neurológica; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Imunológica; Resposta Inflamatória; Apresentação de Antígenos; Célula-Célula Sinalização e Interação; Injúria Abdominal; Sobrevivência do Organismo; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Resposta Imune Humoral; Trânsito de Células do Sistema Imune; Doenças Dermatológicas; Movimentação Celular; Doença Oftalmológica; Desenvolvimento do Sistema Renal;
NM_016232	IL1RL1	2q12	<i>interleukin 1 receptor-like 1</i>	Membrana Plasmática	receptor transmembrana	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; DC ; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Hematológica; Resposta Inflamatória; Apresentação de Antígenos; Célula-Célula Sinalização e Interação; Desenvolvimento Celular; Injúria Abdominal; Desordem

						Muscular e Esquelética; Sobrevivência do Organismo; Bioquímica de pequenas moléculas; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular ; Morfologia de Órgão; Trânsito de Células do Sistema Imune; Doenças Respiratórias; Movimentação Celular; Desordem do Sistema Endócrino; Desordem no Desenvolvimento; Hematopoese; Resposta a Hipersensibilidade;
NM_000564	IL5RA	3p26-p24	<i>interleukin 5 receptor, alpha</i>	Membrana Plasmática	receptor transmembrana	Crescimento e Proliferação Celular; DC ; Morte Celular; Doença Imunológica; Doença Hematológica; Desenvolvimento Celular; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Doenças Dermatológicas;
NM_003749	IRS2	13q34	<i>insulin receptor substrate 2</i>	Citoplasma	outros	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; DC ; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Hematológica; Desenvolvimento Celular; Doença do Sistema Reprodutor; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular ; Transporte molecular; Morfologia de Órgão; Doenças Respiratórias; Desenvolvimento Muscular e Esquelético; Ciclo Celular; Metabolismo Lipídico; Desenvolvimento de Órgãos; Funcionamento Celular; Desordem do Sistema Endócrino; Doença Metabólica; Morfologia Celular; Metabolismo do Carboidrato; Desenvolvimento do Sistema Reprodutor; Doença Hepática; Desenvolvimento do Sistema Endócrino;
NM_000219	KCNE1	21q22.1-q22.2 21q22.12	<i>potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1</i>	Membrana Plasmática	canal iônico	Desordem Genética; Câncer; DC ; Doença Neurológica; Desenvolvimento Celular; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular; Morfologia de Órgão; Trânsito de Células do Sistema Imune; Doenças Respiratórias; Desenvolvimento Muscular e Esquelético; Movimentação Celular; Desenvolvimento do Sistema Nervoso; Doença Auditiva;
NM_004994	MMP9	20q11.2-q13.1	<i>matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type</i>	Espaço Extracelular	peptidase	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; DC ; Doença Neurológica; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Imunológica; Doença

			<i>IV collagenase)</i>			Hematológica; Apresentação de Antígenos; Célula-Célula Sinalização e Interação; Desenvolvimento Celular; Injúria Abdominal; Sobrevida do Organismo; Doença do Sistema Reprodutor; ; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular; Resposta Imune Humoral; Morfologia de Órgão ; Desenvolvimento Muscular e Esquelético; Ciclo Celular; Doenças Dermatológicas; Desenvolvimento de Órgãos; Desordem do Sistema Endócrino; Doença Renal e Urológica; Doença Metabólica; Doença Oftalmológica; Desordem no Desenvolvimento; Desenvolvimento Tecidual; Hematopoese; Desordem na Conectividade Tecidual; Morfologia Celular; Doença Hepática; Desenvolvimento do Sistema Endócrino; Morfologia Tumoral; Resposta a Hipersensibilidade; Infecção; Desenvolvimento do Sistema Renal; Desenvolvimento do Sistema Respiratório; Desenvolvimento do Organismo;
NM_001002841	MYL4	17q21-qter	<i>myosin, light chain 4, alkali; atrial, embryonic</i>	Citoplasma	outros	DC ; Resposta Inflamatória; Desordem Muscular e Esquelética;
NM_002616	PER1	17p13.1-p12	<i>period homolog 1 (Drosophila)</i>	Núcleo	outros	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Doença Imunológica; Doenças Dermatológicas; Desenvolvimento do Sistema Nervoso;
NM_002692	POLE2	14q21-q22	<i>polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)</i>	Núcleo	enzima	Desordem Genética; Câncer; DC ; Doença Neurológica; Doença do Sistema Reprodutor; ; Infecção;
NM_001078177	SLC29A1	6p21.2-p21.1	<i>solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member</i>	Membrana Plasmática	transportador	Crescimento e Proliferação Celular; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Resposta Inflamatória; Apresentação de Antígenos; Bioquímica de pequenas

<i>I</i>						moléculas; Transporte molecular; Metabolismo de Ácidos Nucléicos;
NM_018667	SMPD3	16q22.1	<i>sphingomyelin phosphodiesterase 3, neutral membrane (neutral sphingomyelinase II)</i>	Citoplasma	enzima	Desordem Genética; Doença Imunológica; Doença Hematológica; Resposta Inflamatória; Desordem Muscular e Esquelética; Bioquímica de pequenas moléculas; Metabolismo Lipídico; Desordem do Sistema Endócrino; Desordem no Desenvolvimento; Desordem na Conectividade Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Reprodutor; Doença Gastrointestinal;
NM_003246	THBS1	15q15	<i>thrombospondin 1</i>	Espaço Extracelular	outros	Desordem Genética; Crescimento e Proliferação Celular; Câncer; Morte Celular; Morfologia Tecidual; Desenvolvimento do Sistema Hematológico; Doença Imunológica; Doença Hematológica; Resposta Inflamatória; Apresentação de Antígenos; Célula-Célula Sinalização e Interação; Desenvolvimento Celular; Injúria Abdominal; Desordem Muscular e Esquelética; Bioquímica de pequenas moléculas; Doença do Sistema Reprodutor; ; Resposta Celular mediada pelo Sistema Imune; Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular ; Transporte molecular; Resposta Imune Humoral; Trânsito de Células do Sistema Imune; Doenças Respiratórias; Desenvolvimento Muscular e Esquelético; Ciclo Celular; THBS1 Metabolismo Lipídico; Movimentação Celular; Desenvolvimento de Órgãos; Funcionamento Celular; Doença Renal e Urológica; Doença Metabólica; Doença Oftalmológica; Organização Celular; Compromisso Celular; Hematopoese; Desenvolvimento do Sistema Nervoso; Desordem na Conectividade Tecidual; Morfologia Celular; Metabolismo do Carboidrato; Morfologia Tumoral; Desenvolvimento do Sistema Renal; Desenvolvimento do Sistema Respiratório;
NM_198153	TREML4	6p21.1	<i>triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4</i>	NA	outros	Gene sem associações descritas no banco de dados – IPA;

ANEXO E

Tabela 1. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T₀ vs GC, ordenadas de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

m/z	p-valor	FDR	FC
2179	0,000535	0,043	-11,06
2158	0,000117	0,022	-10,34
2182	0,000103	0,021	-10,34
2180,5	0,000290	0,033	-10,25
2195,5	0,000100	0,021	-8,77
6109	0,000082	0,021	-8,6
2156,5	0,000095	0,021	-8,03
2183,5	0,000608	0,047	-7,34
2225,5	0,000403	0,037	-6,8
2149	0,000089	0,021	-5,78
2201,5	0,000547	0,043	-5,66
2173	0,000376	0,035	-5,63
2200	0,000003	0,006	-5,45
2150,5	0,000143	0,022	-4,71
2135,5	0,000345	0,034	-4,29
2153,5	0,000448	0,039	-4,09
2213,5	0,003113	0,006	-3,98
2128	0,000280	0,033	-3,69
2803	0,000025	0,014	-3,4
4267	0,000412	0,037	-3,39
2215	0,000137	0,022	-3,29
2129,5	0,000232	0,029	-3,28
2641	0,000235	0,029	-3,21
14494	0,000472	0,040	1,95
10547,5	0,000337	0,034	2,07
13009	0,000177	0,025	2,09
17788	0,000327	0,034	2,15
11896	0,000640	0,047	2,16
9226	0,000165	0,024	2,21
13010,5	0,000193	0,026	2,28
9217	0,000010	0,013	2,31
17800	0,000313	0,033	2,33
17797	0,000143	0,022	2,33
11897,5	0,000626	0,047	2,34
17801,5	0,000358	0,034	2,34
7729	0,000309	0,033	2,37
17792,5	0,000139	0,022	2,37
6394	0,000105	0,021	2,4
8437	0,000543	0,043	2,4
17803	0,000220	0,029	2,44
6386,5	0,000526	0,043	2,47
11842	0,000246	0,029	2,49
10757,5	0,000042	0,016	2,5
17804,5	0,000130	0,022	2,57
17807,5	0,000093	0,021	2,61
10760,5	0,000019	0,014	2,65
17806	0,000086	0,021	2,66
15446,5	0,000684	0,050	2,7
6362,5	0,000039	0,016	3,12

13022,5	0,000018	0,014	3,67
15460	0,000052	0,018	3,99
15457	0,000041	0,016	4,86
15458,5	0,000023	0,014	4,9

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* $\pm 1,5$.

Tabela 2. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T₂ vs GC, ordenadas de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

m/z	p-valor	FDR	FC
2228,5	0,000391	0,024	-37,77
2203	0,000785	0,038	-11,94
2194	0,000889	0,040	-11,25
2195,5	0,000136	0,012	-9,86
2225,5	0,000160	0,012	-7,14
2722	0,000709	0,035	-5,93
2173	0,000105	0,010	-5,79
4261	0,000123	0,011	-4,57
2153,5	0,000206	0,014	-4,47
3755,5	0,000810	0,038	-4,2
2128	0,000910	0,040	-3,81
4225	0,000501	0,027	-3,64
11338	0,000086	0,009	-2,63
11339,5	0,000154	0,012	-2,58
5168,5	0,000255	0,017	-2,18
5432,5	0,000814	0,038	-2,13
12689,5	0,000169	0,012	1,92
7729	0,000795	0,038	1,99
9226	0,000124	0,011	2,09
12686,5	0,000507	0,027	2,1
9076	0,000164	0,012	2,16
8624,5	0,000847	0,039	2,17
9220	0,000040	0,007	2,18
8653	0,000406	0,024	2,23
12803,5	0,000029	0,007	2,24
6358	0,000116	0,011	2,25
8623	0,000701	0,035	2,25
14803	0,000421	0,024	2,25
12685	0,000827	0,038	2,27
12781	0,000693	0,035	2,28
6359,5	0,000068	0,009	2,3
4474	0,000226	0,015	2,35
11893	0,000614	0,032	2,35
17840,5	0,000272	0,018	2,37
13049,5	0,000328	0,020	2,42
12683,5	0,000790	0,038	2,42
10760,5	0,000006	0,003	2,47
14827	0,000677	0,035	2,51
6374,5	0,000432	0,024	2,53
14815	0,000091	0,010	2,58
11897,5	0,000151	0,012	2,58
17831,5	0,000154	0,012	2,59
10757,5	0,000028	0,007	2,63
6511	0,000014	0,005	2,63

10547,5	0,000157	0,012	2,64
17825,5	0,000170	0,012	2,66
17833	0,000112	0,011	2,68
6386,5	0,000032	0,007	2,68
14816,5	0,000069	0,009	2,69
11894,5	0,000082	0,009	2,75
6362,5	0,000940	0,041	2,75
9217	0,000004	0,003	2,8
17801,5	0,000128	0,011	2,8
11896	0,000027	0,007	2,83
14818	0,000070	0,009	2,85
17837,5	0,000035	0,007	2,86
17834,5	0,000054	0,008	2,86
17800	0,000078	0,009	2,87
17803	0,000084	0,009	2,91
6394	0,000001	0,003	2,91
6382	0,000892	0,040	2,95
17836	0,000037	0,007	2,95
14566	0,000012	0,004	3,02
17804,5	0,000056	0,008	3,02
17807,5	0,000046	0,007	3,03
14494	0,000007	0,003	3,05
17806	0,000041	0,007	3,09
15460	0,000967	0,041	3,1
17797	0,000010	0,004	3,16
15458,5	0,000960	0,041	3,17
14819,5	0,000035	0,007	3,21
17788	0,000001	0,003	3,24
8426,5	0,000175	0,012	3,31
14462,5	0,000006	0,003	3,33
6373	0,000193	0,013	3,34
17792,5	0,000002	0,003	3,38
14234,5	0,000322	0,020	3,49
14570,5	0,000003	0,003	3,51
8423,5	0,000093	0,010	3,56
17993,5	0,000407	0,024	3,77
8422	0,000081	0,009	3,82
17992	0,000474	0,026	3,84
6482,5	0,000027	0,007	3,85
8372,5	0,000912	0,040	4,13
8417,5	0,000308	0,020	4,14
8416	0,000433	0,024	4,14
8419	0,000097	0,010	4,26
8374	0,000423	0,024	4,3
6479,5	0,000079	0,009	4,47
6368,5	0,000023	0,007	5,7
6370	0,000005	0,003	7,46

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* $\pm 1,5$.

Tabela 3. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T₁₂ vs GC, ordenadas de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

m/z	p-valor	FDR	FC
2228,5	0,002114	0,035	-32,79
2191	0,002485	0,039	-20,99
2167	0,001148	0,025	-12,46
2189,5	0,000958	0,023	-12,02
2195,5	0,002170	0,036	-11,45
2192,5	0,000672	0,019	-7,23
2722	0,000394	0,015	-6,85
2146	0,000969	0,023	-6,48
2210,5	0,003685	0,047	-5,94
2689	0,000787	0,020	-5,62
2150,5	0,000350	0,014	-5,61
2639,5	0,001058	0,024	-5,49
2201,5	0,004183	0,049	-5,26
2173	0,000962	0,023	-4,96
2170	0,001782	0,033	-4,89
2144,5	0,003943	0,048	-4,87
8005	0,003480	0,045	-4,53
6049	0,002959	0,042	-4,45
2687,5	0,001977	0,035	-4,24
2215	0,003268	0,044	-4,04
2686	0,000268	0,012	-4,03
6169	0,002073	0,035	-3,9
2152	0,000606	0,019	-3,83
5339,5	0,000119	0,008	-3,81
2153,5	0,001335	0,027	-3,67
2128	0,002849	0,042	-3,54
7810	0,000110	0,007	-3,46
2723,5	0,000298	0,013	-3,37
3755,5	0,003689	0,047	-3,36
2641	0,003048	0,043	-3,35
2756,5	0,001484	0,029	-3,35
6134,5	0,002696	0,041	-3,28
5450,5	0,001325	0,027	-3,19
6247	0,002746	0,041	-3,11
2684,5	0,000719	0,020	-3,08
8003,5	0,003355	0,044	-3,01
2701	0,002265	0,036	-2,95
5683	0,000455	0,016	-2,88
2737	0,002869	0,042	-2,58
2729,5	0,003120	0,044	-2,57
4622,5	0,004049	0,048	-2,49
5842	0,001551	0,030	-2,49
7274,5	0,000506	0,018	-2,48
5486,5	0,002083	0,035	-2,33
16498	0,002748	0,041	-2,25
7324	0,004129	0,049	-2,11
11021,5	0,000775	0,020	1,56
3298	0,002749	0,041	1,63
15091	0,001834	0,033	1,64
12803,5	0,003843	0,047	1,68
15355	0,003844	0,047	1,71

10547,5	0,002021	0,035	1,71
13009	0,002255	0,036	1,74
15359,5	0,004016	0,048	1,75
14570,5	0,001934	0,034	1,75
15166	0,003238	0,044	1,76
13010,5	0,003043	0,043	1,77
15353,5	0,001400	0,028	1,77
9076	0,001522	0,030	1,8
15092,5	0,000714	0,020	1,8
15842,5	0,002950	0,042	1,8
15844	0,002154	0,036	1,82
15841	0,003779	0,047	1,82
15167,5	0,003285	0,044	1,85
15130	0,000210	0,010	1,85
15845,5	0,001359	0,027	1,85
15839,5	0,003466	0,045	1,87
15128,5	0,000217	0,010	1,87
13022,5	0,001290	0,027	1,87
11164	0,004073	0,048	1,88
16063	0,002431	0,038	1,88
6394	0,000175	0,009	1,89
15847	0,000905	0,022	1,9
15157	0,002887	0,042	1,91
15094	0,000424	0,016	1,92
15352	0,000449	0,016	1,92
15095,5	0,000447	0,016	1,92
12689,5	0,001954	0,034	1,92
15131,5	0,000079	0,007	1,93
14566	0,000579	0,018	1,94
15127	0,000210	0,010	1,95
15097	0,000260	0,012	1,95
15304	0,001137	0,025	1,95
15838	0,002619	0,040	1,95
15848,5	0,000648	0,019	1,96
15098,5	0,000159	0,009	1,97
16039	0,003849	0,047	1,97
12683,5	0,003470	0,045	1,98
16064,5	0,001285	0,027	1,99
15343	0,002926	0,042	2
15830,5	0,003283	0,044	2
15125,5	0,000233	0,011	2,01
16037,5	0,003337	0,044	2,01
15829	0,003644	0,047	2,01
15002,5	0,003710	0,047	2,02
15100	0,000095	0,007	2,02
15133	0,000056	0,006	2,02
15850	0,000502	0,018	2,02
15832	0,002520	0,039	2,03
15836,5	0,001774	0,033	2,04
16036	0,003370	0,044	2,04
16108	0,003355	0,044	2,04
15155,5	0,001278	0,027	2,04
16066	0,001111	0,025	2,04
15833,5	0,001937	0,034	2,04

6386,5	0,000315	0,013	2,05
15851,5	0,000541	0,018	2,05
12686,5	0,000941	0,023	2,05
15854,5	0,000669	0,019	2,05
12685	0,001299	0,027	2,05
13876	0,003542	0,046	2,05
15853	0,000556	0,018	2,06
13877,5	0,004027	0,048	2,06
15856	0,000708	0,020	2,06
15835	0,001559	0,030	2,06
15005,5	0,003850	0,047	2,07
15350,5	0,000219	0,010	2,07
15124	0,000246	0,011	2,07
15857,5	0,000724	0,020	2,08
15827,5	0,002754	0,041	2,08
16067,5	0,001064	0,024	2,08
15122,5	0,000343	0,014	2,09
8621,5	0,003827	0,047	2,09
6380,5	0,004012	0,048	2,09
14803	0,001122	0,025	2,09
15323,5	0,001893	0,034	2,11
15004	0,002522	0,039	2,11
15859	0,000724	0,020	2,12
17842	0,001633	0,031	2,12
16034,5	0,002043	0,035	2,12
8623	0,002316	0,037	2,13
15134,5	0,000032	0,005	2,14
8653	0,003217	0,044	2,14
15101,5	0,000053	0,006	2,15
8624,5	0,001887	0,034	2,15
15154	0,000610	0,019	2,15
15322	0,000701	0,020	2,16
15121	0,000263	0,012	2,16
15305,5	0,000139	0,008	2,16
16069	0,000825	0,021	2,16
14660,5	0,003531	0,046	2,17
15826	0,002044	0,035	2,18
15932,5	0,004236	0,049	2,18
15320,5	0,000280	0,012	2,19
15860,5	0,000605	0,019	2,19
15349	0,000218	0,010	2,19
15344,5	0,001219	0,026	2,21
6349	0,003241	0,044	2,22
14657,5	0,001246	0,026	2,22
9217	0,002106	0,035	2,22
15817	0,002015	0,035	2,22
15136	0,000021	0,004	2,23
15871	0,001121	0,025	2,23
15872,5	0,001246	0,026	2,23
15869,5	0,000908	0,022	2,23
15152,5	0,000376	0,015	2,24
15874	0,001310	0,027	2,25
15862	0,000567	0,018	2,25
15868	0,000778	0,020	2,25

16028,5	0,002751	0,041	2,26
16109,5	0,001416	0,028	2,26
15319	0,000148	0,009	2,26
15899,5	0,003746	0,047	2,26
16033	0,001016	0,024	2,26
15551,5	0,002257	0,036	2,27
15875,5	0,001342	0,027	2,27
16070,5	0,000528	0,018	2,27
15866,5	0,000659	0,019	2,28
16115,5	0,002931	0,042	2,28
15877	0,001419	0,028	2,29
15865	0,000582	0,018	2,29
15346	0,000535	0,018	2,29
15884,5	0,003765	0,047	2,29
15347,5	0,000235	0,011	2,29
15316	0,000128	0,008	2,3
15317,5	0,000110	0,007	2,3
15883	0,003020	0,043	2,3
15863,5	0,000524	0,018	2,3
16159	0,001938	0,034	2,3
15881,5	0,002516	0,039	2,3
15824,5	0,001196	0,026	2,31
15880	0,001875	0,034	2,31
15878,5	0,001575	0,030	2,31
16157,5	0,002566	0,039	2,31
15886	0,003912	0,048	2,31
13049,5	0,000753	0,020	2,31
15119,5	0,000095	0,007	2,31
15887,5	0,004123	0,049	2,32
15889	0,004136	0,049	2,32
14494	0,000051	0,006	2,32
16082,5	0,002647	0,040	2,33
16111	0,001226	0,026	2,33
15898	0,002924	0,042	2,33
16114	0,001581	0,030	2,33
15890,5	0,003853	0,047	2,33
6482,5	0,000451	0,016	2,33
15896,5	0,002746	0,041	2,34
15892	0,003402	0,045	2,34
15895	0,002663	0,040	2,34
15137,5	0,000016	0,004	2,34
16112,5	0,001228	0,026	2,35
17840,5	0,000308	0,013	2,35
15151	0,000199	0,010	2,36
15103	0,000012	0,004	2,36
15893,5	0,002954	0,042	2,36
15314,5	0,000046	0,006	2,37
15113,5	0,000091	0,007	2,37
15818,5	0,001049	0,024	2,38
16072	0,000314	0,013	2,38
15563,5	0,000200	0,010	2,38
15112	0,000059	0,006	2,38
15307	0,000016	0,004	2,39
15581,5	0,002115	0,035	2,39

15823	0,000842	0,021	2,4
16031,5	0,000627	0,019	2,4
15115	0,000093	0,007	2,41
16030	0,000858	0,021	2,41
15584,5	0,003259	0,044	2,42
15583	0,002243	0,036	2,42
15118	0,000064	0,006	2,42
15116,5	0,000085	0,007	2,42
15149,5	0,000174	0,009	2,43
16073,5	0,000262	0,012	2,43
15562	0,000159	0,009	2,44
6379	0,000775	0,020	2,44
15139	0,000013	0,004	2,44
15142	0,000040	0,005	2,45
6362,5	0,003340	0,044	2,45
15553	0,000682	0,020	2,45
15143,5	0,000071	0,006	2,46
13895,5	0,003179	0,044	2,46
15580	0,001635	0,031	2,46
15110,5	0,000020	0,004	2,47
15820	0,000700	0,020	2,47
8437	0,002383	0,038	2,48
15821,5	0,000618	0,019	2,48
13891	0,004206	0,049	2,48
15145	0,000110	0,007	2,48
15140,5	0,000020	0,004	2,48
16081	0,001422	0,028	2,48
15313	0,000015	0,004	2,48
15443,5	0,003708	0,047	2,49
6511	0,000027	0,005	2,49
16075	0,000304	0,013	2,49
15565	0,000129	0,008	2,49
17708,5	0,000403	0,015	2,5
15104,5	0,000003	0,003	2,51
11179	0,000059	0,006	2,52
15109	0,000007	0,004	2,53
15311,5	0,000008	0,004	2,53
15446,5	0,002545	0,039	2,53
15578,5	0,001164	0,026	2,54
15308,5	0,000004	0,003	2,54
15310	0,000003	0,003	2,55
10760,5	0,000459	0,016	2,55
15146,5	0,000100	0,007	2,55
15148	0,000118	0,008	2,55
15107,5	0,000003	0,003	2,55
15106	0,000001	0,003	2,56
15559	0,000191	0,010	2,56
15560,5	0,000165	0,009	2,56
16076,5	0,000511	0,018	2,56
16079,5	0,000969	0,023	2,58
13922,5	0,003917	0,048	2,6
13892,5	0,003088	0,043	2,61
15554,5	0,000204	0,010	2,61
11180,5	0,000086	0,007	2,61

15557,5	0,000153	0,009	2,62
16078	0,000713	0,020	2,62
17837,5	0,000033	0,005	2,64
6347,5	0,001043	0,024	2,67
15556	0,000114	0,008	2,68
6479,5	0,000788	0,020	2,69
17836	0,000031	0,005	2,73
12709	0,001738	0,033	2,74
17710	0,000221	0,010	2,74
10757,5	0,000077	0,007	2,76
16873	0,003281	0,044	2,76
16519	0,002379	0,038	2,77
17834,5	0,000031	0,005	2,8
16874,5	0,003354	0,044	2,89
17788	0,000029	0,005	2,93
17792,5	0,000033	0,005	2,94
16876	0,003779	0,047	2,95
17722	0,002304	0,037	2,96
17720,5	0,001766	0,033	2,98
15568	0,000063	0,006	2,98
17833	0,000023	0,004	3
17807,5	0,000053	0,006	3,03
15574	0,000532	0,018	3,06
17723,5	0,002080	0,035	3,07
16525	0,001822	0,033	3,09
17806	0,000048	0,006	3,1
17801,5	0,000077	0,007	3,11
15572,5	0,000321	0,013	3,11
17726,5	0,003325	0,044	3,12
14278	0,002264	0,036	3,12
15569,5	0,000106	0,007	3,13
17804,5	0,000053	0,006	3,13
17719	0,001190	0,026	3,13
17803	0,000058	0,006	3,14
14234,5	0,000537	0,018	3,15
14287	0,002968	0,042	3,15
14291,5	0,003960	0,048	3,18
17800	0,000053	0,006	3,19
17725	0,002135	0,035	3,2
15571	0,000158	0,009	3,21
8416	0,003622	0,047	3,22
14282,5	0,001794	0,033	3,22
17831,5	0,000014	0,004	3,23
6358	0,000093	0,007	3,24
14462,5	0,000011	0,004	3,25
14279,5	0,002020	0,035	3,25
6359,5	0,000401	0,015	3,26
16520,5	0,001234	0,026	3,26
17797	0,000017	0,004	3,27
14290	0,003318	0,044	3,28
17825,5	0,000017	0,004	3,31
17716	0,000454	0,016	3,32
17717,5	0,000620	0,019	3,35
16522	0,000634	0,019	3,63

13975	0,001867	0,034	3,67
16523,5	0,000467	0,016	3,86
13963	0,001150	0,025	4,09
13970,5	0,001134	0,025	4,61
13964,5	0,000768	0,020	4,79
13966	0,000749	0,020	5,02
13969	0,000891	0,022	5,07
13967,5	0,000750	0,020	5,15

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* $\pm 1,5$.

Tabela 4. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T₂₄ vs GC, ordenadas de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

m/z	p-valor	FDR	FC
2189,5	0,000108	0,018	-15,94
2188	0,000047	0,015	-12,42
2195,5	0,000057	0,015	-12,05
2168,5	0,000433	0,035	-8,83
2155	0,000557	0,037	-7,79
2150,5	0,000121	0,018	-7,66
2146	0,000543	0,037	-7,39
2171,5	0,000058	0,015	-6,41
2177,5	0,000339	0,031	-6,38
2173	0,000159	0,021	-6,23
2149	0,000122	0,018	-6,11
2200	0,000010	0,007	-5,61
2152	0,000411	0,034	-4,55
6029,5	0,000115	0,018	-4,33
4265,5	0,000348	0,031	-4,21
4243	0,000187	0,023	-3,7
4279	0,000141	0,019	-3,48
2129,5	0,000824	0,042	-3,38
2666,5	0,000672	0,038	-3,2
5450,5	0,000185	0,023	-3,2
4244,5	0,000066	0,015	-3,14
13417	0,000864	0,042	-2,72
5452	0,000580	0,037	-2,67
7552	0,000096	0,018	-2,67
2731	0,000257	0,027	-2,66
7324	0,000476	0,036	-2,62
2708,5	0,000339	0,031	-2,52
5227	0,000123	0,018	-2,5
5164	0,000567	0,037	-2,4
5225,5	0,000127	0,018	-2,37
15106	0,000720	0,038	1,78
15113,5	0,000952	0,044	1,79
15107,5	0,000702	0,038	1,79
15109	0,000663	0,038	1,8
15110,5	0,000605	0,037	1,8
15112	0,000515	0,037	1,83
14462,5	0,000580	0,037	1,93
8623	0,000948	0,044	2,06
8624,5	0,000425	0,035	2,15
6511	0,000044	0,015	2,15

9217	0,000576	0,037	2,29
15568	0,000563	0,037	2,3
15569,5	0,000716	0,038	2,32
15551,5	0,000377	0,032	2,37
15550	0,000609	0,037	2,38
15571	0,000854	0,042	2,41
6482,5	0,000233	0,027	2,42
15553	0,000253	0,027	2,45
15548,5	0,000813	0,042	2,47
4393	0,000788	0,041	2,49
15554,5	0,000263	0,027	2,5
15004	0,000875	0,042	2,54
6394	0,000024	0,013	2,59
15556	0,000300	0,029	2,6
15557,5	0,000548	0,037	2,61
15005,5	0,000863	0,042	2,65
15007	0,000991	0,045	2,72
6380,5	0,000903	0,043	2,73
11284	0,000037	0,015	2,78
8299	0,000648	0,038	2,79
6379	0,000356	0,031	2,8
6386,5	0,000037	0,015	2,81
17807,5	0,000088	0,017	3
6358	0,000016	0,010	3,14
17806	0,000075	0,016	3,15
14234,5	0,000489	0,036	3,17
12668,5	0,000248	0,027	3,25
17804,5	0,000080	0,016	3,29
14494	0,000008	0,007	3,46
17803	0,000065	0,015	3,54
8300,5	0,000714	0,038	3,6
17801,5	0,000063	0,015	3,65
17800	0,000043	0,015	3,73
17797	0,000010	0,007	3,73
17792,5	0,000003	0,006	3,75
17788	0,000001	0,002	3,82
13631,5	0,000491	0,036	3,9
13630	0,000873	0,042	4,55
13916,5	0,000287	0,028	5,35
13909	0,000648	0,038	6,03
13910,5	0,000602	0,037	6,39
13915	0,000194	0,023	6,42
13912	0,000449	0,035	6,84
13913,5	0,000287	0,028	7,77

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* $\pm 1,5$.

Tabela 5. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T₃₆ vs GC, ordenadas de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

m/z	p-valor	FDR	FC
2194	0.000341	0.025	-9.96
2203	0.000770	0.039	-8.3
2195.5	0.000803	0.040	-7.87
3704.5	0.000608	0.032	-4.88
2150.5	0.000941	0.042	-4.64
2200	0.000830	0.040	-3.99
7339	0.000298	0.023	-3.47
2128	0.000998	0.043	-3.25
5863	0.000122	0.017	-2.86
2708.5	0.000466	0.028	-2.64
5987.5	0.000329	0.024	-2.51
5444.5	0.000801	0.040	-2.38
3938.5	0.000305	0.023	-2.25
15364	0.000266	0.022	1.88
4474	0.000832	0.040	1.96
14462.5	0.000151	0.018	2.04
15362.5	0.000105	0.017	2.05
10547.5	0.000550	0.031	2.06
10760.5	0.000895	0.042	2.09
14566	0.000526	0.030	2.1
15356.5	0.000215	0.020	2.14
15569.5	0.000942	0.042	2.14
15353.5	0.000189	0.020	2.15
15355	0.000204	0.020	2.16
15361	0.000076	0.017	2.16
15553	0.000721	0.038	2.16
15359.5	0.000051	0.017	2.2
14570.5	0.000372	0.025	2.2
17837.5	0.000208	0.020	2.21
15358	0.000079	0.017	2.21
10757.5	0.000116	0.017	2.21
15352	0.000160	0.018	2.23
15350.5	0.000221	0.020	2.26
14494	0.000092	0.017	2.26
15349	0.000517	0.030	2.27
15568	0.000278	0.022	2.27
15554.5	0.000242	0.021	2.3
15563.5	0.000228	0.020	2.31
6511	0.000052	0.017	2.31
17836	0.000148	0.018	2.31
7729	0.000724	0.038	2.31
15560.5	0.000406	0.027	2.32
15562	0.000249	0.021	2.32
15565	0.000143	0.018	2.34
15559	0.000420	0.027	2.35
17834.5	0.000148	0.018	2.35
15556	0.000202	0.020	2.36
15557.5	0.000294	0.023	2.37
14803	0.000064	0.017	2.39
17833	0.000138	0.018	2.41
17831.5	0.000095	0.017	2.49

8653	0.000433	0.027	2.55
12689.5	0.000207	0.020	2.56
12686.5	0.000211	0.020	2.59
17788	0.000005	0.005	2.6
17801.5	0.000152	0.018	2.62
17800	0.000111	0.017	2.63
12685	0.000346	0.025	2.65
14657.5	0.000943	0.042	2.67
17797	0.000026	0.013	2.67
17803	0.000113	0.017	2.7
12683.5	0.000368	0.025	2.71
17792.5	0.000009	0.007	2.71
11179	0.000074	0.017	2.75
17804.5	0.000078	0.017	2.82
11180.5	0.000203	0.020	2.86
6482.5	0.000092	0.017	2.91
17806	0.000047	0.017	2.99
17825.5	0.000022	0.012	3
8402.5	0.000950	0.042	3.04
17807.5	0.000036	0.015	3.11
17717.5	0.000505	0.029	3.25
14234.5	0.000454	0.028	3.27
17719	0.000489	0.029	3.32
17723.5	0.000588	0.032	3.33
17722	0.000500	0.029	3.37
17720.5	0.000432	0.027	3.38
17716	0.000357	0.025	3.4
17710	0.000102	0.017	3.47
17708.5	0.000100	0.017	3.52
9220	0.000002	0.002	3.65
9226	0.000014	0.009	3.65
14279.5	0.000919	0.042	3.74
14278	0.000755	0.039	3.81
3427	0.000000	0.001	3.82
8401	0.000557	0.031	3.91
9217	0.000000	0.001	3.93
8399.5	0.000931	0.042	4.37

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* ± 1.5 .

Tabela 6. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 1º IAM T₄₈ vs GC, ordenadas de modo crescente de acordo com *Fold Change*.

m/z	p-valor	FDR	FC
2191	0,000126	0,011	-22,05
2194	0,000145	0,012	-12,5
2195,5	0,000435	0,020	-11,68
2159,5	0,000264	0,016	-11,12
2168,5	0,000651	0,025	-9,71
2192,5	0,000072	0,009	-9,22
2164	0,000823	0,029	-9,2
2146	0,000255	0,016	-8,21
2231,5	0,000306	0,017	-7,82
2173	0,000061	0,008	-6,94
2155	0,000879	0,029	-6,9

2177,5	0,000317	0,017	-6,47
2171,5	0,000196	0,013	-6,47
2639,5	0,000480	0,021	-6,45
2150,5	0,000653	0,025	-6,42
2894,5	0,000152	0,012	-6,24
2149	0,000346	0,018	-5,91
6049	0,000191	0,013	-5,84
2206	0,000329	0,017	-5,79
2695	0,000588	0,024	-5,7
2170	0,000023	0,004	-5,62
2123,5	0,000781	0,028	-5,24
3665,5	0,000844	0,029	-5,07
2153,5	0,000252	0,016	-4,86
3734,5	0,000075	0,009	-4,54
2128	0,000060	0,008	-4,47
2215	0,000064	0,008	-3,92
2743	0,000413	0,019	-3,91
2641	0,000350	0,018	-3,8
4253,5	0,000529	0,023	-3,77
2129,5	0,000331	0,017	-3,49
2635	0,000132	0,012	-3,47
5339,5	0,000266	0,016	-3,4
11594,5	0,000263	0,016	-3,37
4264	0,000891	0,030	-3,34
11596	0,000054	0,008	-3,23
5330,5	0,000178	0,013	-3,06
11597,5	0,000041	0,007	-3,03
11599	0,000136	0,012	-2,88
4283,5	0,000912	0,030	-2,87
5326	0,000583	0,024	-2,7
4277,5	0,000941	0,030	-2,56
2783,5	0,000984	0,031	-2,04
14803	0,000787	0,028	1,99
14633,5	0,000909	0,030	2
14462,5	0,000274	0,016	2,01
6341,5	0,000643	0,025	2,06
10757,5	0,000386	0,019	2,12
15557,5	0,000924	0,030	2,14
4474	0,000252	0,016	2,15
14566	0,000719	0,027	2,28
15550	0,000777	0,028	2,31
15556	0,000553	0,024	2,34
14570,5	0,000075	0,009	2,35
6394	0,000165	0,012	2,42
10547,5	0,000051	0,008	2,43
15551,5	0,000404	0,019	2,45
6479,5	0,000995	0,031	2,46
15554,5	0,000379	0,018	2,51
15553	0,000354	0,018	2,54
14494	0,000028	0,005	2,6
6511	0,000055	0,008	2,61
9226	0,000107	0,010	2,67
8296	0,000680	0,025	2,72
8426,5	0,000253	0,016	2,73

11180,5	0,000215	0,014	2,85
11179	0,000143	0,012	2,86
6482,5	0,000101	0,010	2,92
8653	0,000103	0,010	2,94
8422	0,000155	0,012	3,01
16831	0,000922	0,030	3,03
8297,5	0,000214	0,014	3,06
9220	0,000008	0,003	3,1
11384,5	0,000680	0,025	3,14
9217	0,000001	0,002	3,21
8423,5	0,000052	0,008	3,23
14234,5	0,000456	0,021	3,25
16832,5	0,000624	0,025	3,37
8437	0,000042	0,007	3,48
17848	0,000797	0,028	3,51
8438,5	0,000107	0,010	3,51
15593,5	0,000846	0,029	3,53
17846,5	0,000787	0,028	3,54
16834	0,000607	0,025	3,54
17845	0,000734	0,027	3,57
16841,5	0,000861	0,029	3,62
17725	0,000573	0,024	3,71
16835,5	0,000619	0,025	3,74
16837	0,000665	0,025	3,8
16840	0,000513	0,022	3,85
17825,5	0,000013	0,003	3,87
16838,5	0,000456	0,021	3,87
17842	0,000285	0,016	3,89
17788	0,000002	0,002	3,93
17708,5	0,000017	0,003	3,93
17723,5	0,000314	0,017	3,97
17840,5	0,000105	0,010	3,99
17834,5	0,000013	0,003	4
17993,5	0,000508	0,022	4,01
17807,5	0,000010	0,003	4,02
15595	0,000359	0,018	4,03
17992	0,000567	0,024	4,05
17710	0,000017	0,003	4,07
17836	0,000011	0,003	4,09
17833	0,000012	0,003	4,09
17831,5	0,000009	0,003	4,09
17837,5	0,000013	0,003	4,1
17806	0,000010	0,003	4,12
17722	0,000235	0,015	4,15
17804,5	0,000011	0,003	4,2
17792,5	0,000001	0,002	4,23
17719	0,000155	0,012	4,26
17803	0,000012	0,003	4,27
17720,5	0,000165	0,012	4,32
17717,5	0,000117	0,011	4,33
17801,5	0,000013	0,003	4,38
17716	0,000086	0,010	4,39
15598	0,000123	0,011	4,41
15599,5	0,000095	0,010	4,41

15601	0,000291	0,016	4,42
15596,5	0,000193	0,013	4,46
17800	0,000009	0,003	4,47
17797	0,000001	0,002	4,68

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* $\pm 1,5$.

Tabela 7. Possíveis proteínas diferencialmente expressos entre 2º IAM versus GC., ordenados de modo crescente de acordo com *Fold Change* para cada tempo de colheita, a partir do T₀.

2º IAM	m/z	p-valor	FDR	FC
T ₀	3755.5	0.000175	0.026	-3.96
	5432.5	0.000043	0.019	-2.72
	17788	0.000447	0.048	1.93
	17792.5	0.000378	0.044	2.02
	10547.5	0.000177	0.026	2.12
	10757.5	0.000147	0.026	2.14
	17797	0.000318	0.038	2.14
	14570.5	0.000290	0.036	2.15
	10760.5	0.000133	0.026	2.17
	17825.5	0.000449	0.048	2.2
	9217	0.000001	0.004	2.21
	9220	0.000062	0.022	2.22
	6386.5	0.000011	0.010	2.33
	17803	0.000387	0.044	2.35
	12689.5	0.000146	0.026	2.37
	9226	0.000165	0.026	2.37
	17804.5	0.000225	0.031	2.48
	17807.5	0.000158	0.026	2.5
	17806	0.000163	0.026	2.51
	6394	0.000004	0.007	2.56
	12686.5	0.000281	0.036	2.58
	14566	0.000085	0.022	2.6
	8653	0.000080	0.022	2.62
	6511	0.000007	0.009	2.67
	8437	0.000268	0.036	2.82
	8426.5	0.000068	0.022	3.51
	15446.5	0.000084	0.022	3.61
	15443.5	0.000055	0.021	3.75
	8296	0.000183	0.026	3.8
	6479.5	0.000140	0.026	3.81
	8423.5	0.000020	0.015	3.91
	8299	0.000127	0.026	4.11
	8419	0.000091	0.022	4.17
	8422	0.000032	0.017	4.23
	6482.5	0.000025	0.016	4.29
	8297.5	0.000044	0.019	4.47
T ₂	6965.5	0.000216	0.037	-3.74
	5567.5	0.000284	0.043	-2.89
	6112	0.000219	0.037	-2.83
	9220	0.000162	0.037	2.01
	9217	0.000009	0.022	2.04
	12803.5	0.000172	0.037	2.07
	10547.5	0.000116	0.037	2.23
	17792.5	0.000201	0.037	2.23

	6511	0.000124	0.037	2.24
	17837.5	0.000341	0.049	2.29
	17836	0.000229	0.037	2.38
	14494	0.000041	0.022	2.39
	17834.5	0.000182	0.037	2.47
	6394	0.000108	0.037	2.52
	6386.5	0.000015	0.022	2.53
	17833	0.000195	0.037	2.54
	10760.5	0.000052	0.022	2.6
	13049.5	0.000292	0.043	2.61
	17831.5	0.000219	0.037	2.65
	10757.5	0.000024	0.022	2.96
	4474	0.000024	0.022	2.99
	6482.5	0.000039	0.022	3.16
	8422	0.000108	0.037	3.17
	8423.5	0.000046	0.022	3.3
	8419	0.000177	0.037	3.46
	6479.5	0.000175	0.037	3.55
	8426.5	0.000052	0.022	3.73
T ₁₂	6220	0.000226	0.045	4.06
	6386.5	0.000165	0.040	1.96
	6394	0.000228	0.045	2.06
	6479.5	0.000238	0.045	3.3
	6482.5	0.000052	0.025	3.16
	6511	0.000123	0.033	2
	8294.5	0.000272	0.045	3.89
	8296	0.000051	0.025	4.77
	8297.5	0.000042	0.025	4.81
	8299	0.000221	0.045	4.4
	8426.5	0.000262	0.045	2.65
	10757.5	0.000011	0.022	2.89
	10760.5	0.000014	0.022	2.23
	11021.5	0.000059	0.025	1.94
	11326	0.000254	0.045	4.92
	15554.5	0.000066	0.025	2.12
	15556	0.000020	0.022	2.25
	15557.5	0.000023	0.022	2.33
	15559	0.000049	0.025	2.32
	15560.5	0.000127	0.033	2.21
	15562	0.000120	0.033	2.25
	15563.5	0.000109	0.033	2.34
	15565	0.000088	0.031	2.41
T ₂₄	17788	0.000019	0.037	2.56
	17792.5	0.000039	0.037	2.77
	6482.5	0.000036	0.037	3.24
	6511	0.000007	0.028	3.39
T ₃₆	6511	0.000057	0.022	2.12
	17788	0.000158	0.047	2.14
	6394	0.000023	0.015	2.2
	9220	0.000073	0.026	2.31
	9226	0.000096	0.031	2.51
	4493.5	0.000022	0.015	2.72
	11179	0.000058	0.022	2.76
	11180.5	0.000031	0.015	2.97

	11200	0.000030	0.015	3.28
	13874.5	0.000015	0.015	3.32
	13876	0.000002	0.007	3.51
	13877.5	0.000004	0.007	3.56
	6482.5	0.000023	0.015	3.63
T ₄₈	2708.5	0.000125	0.036	-2.08
	14462.5	0.000185	0.044	2.14
	9217	0.000006	0.006	2.18
	14641	0.000226	0.046	2.31
	9220	0.000016	0.012	2.47
	11179	0.000201	0.044	2.49
	9226	0.000025	0.016	2.59
	11021.5	0.000079	0.032	2.73
	8437	0.000128	0.036	2.75
	6325	0.000176	0.044	2.81
	6482.5	0.000083	0.032	2.83
	11200	0.000032	0.018	2.99
	8297.5	0.000109	0.036	3.27
	8299	0.000133	0.036	3.66
	11207.5	0.000004	0.006	3.83
	11204.5	0.000001	0.005	3.98
	11215	0.000204	0.044	4.01
	11210.5	0.000074	0.032	4.38
	11209	0.000005	0.006	4.39

Nota: m/z, relação massa molecular e carga da molécula ionizada; p-valor < 0,001; FDR, *False Discover Rate*; FC – *Fold Change* $\pm$ 1,5.; T₀, primeira colheita; T₂, segunda colheita após angioplastia; T₁₂, terceira colheita após 12h; T₂₄, quarta colheita após 24h; T₃₆, quinta colheita após 36h; T₄₈, sexta colheita após 48h.

ANEXO F

International Meeting of the Microarray and Gene Expression DATA, 2008, Riva del Garda. **MEGED11.**, p.84 – 84, 2008.

Poster 53

FUNCTIONAL PROFILING OF THE
PERIPHERAL BLOOD CELLS TRAN-
SCRIPTOME TO STUDY CARDIOVAS-
CULAR BIOMARKERS .

Vivian N. Silbiger

Faculdade de Ciências Farmacêutica,
Universidade De São Paulo, Brazil.
viviansilbiger@hotmail.com

A.D. Luchessi¹, L.G.L. Neto¹, C.P. Pastorelli¹,
R.D.C. Hirata¹, E.S. dos Santos², M.F.
Sampaio², A. Avezum², L.S. Piegas², I.
Quintela³, M. Brión³, A. Carracedo³, D.
Montaner⁴, F. Garcia⁴, J. Dopazo⁴, M.H.
Hirata¹

1 Faculdade de Ciências Farmacêutica, Uni-
versidade de São Paulo, Brazil.

2 Instituto Dante Pazzanese do Estado de São
Paulo, Brazil.

3 Centro Nacional de Genotipado (CEGEN),
Instituto de Medicina Legal, Universidad de
Santiago de Compostela, Spain.

4 Bioinformatics Department- Centro de In-
vestigacion Principe Felipe, Valencia, Spain.

A transcriptomic experiment was carried out to study the global gene expression in peripheral blood cells (PBC) to study surrogate biomarkers for the early diagnosis of myocardial infarction (MI). We selected 9 MI patients within 8h after MI event, 5 without prior treatment (1MI) and 4 treated (2MI), and 7 healthy controls (GC). Blood samples were obtained for RNA extraction by PAXgene system (Qiagen). PBC mRNA expression profiles were assessed by Affymetrix GeneChip Human Exon 1.0 ST array. Signals were normalized using iterPLIER algorithm and limma model from oneChannelGUI

package was applied to evaluate the differential gene expression. Comparisons of interest where 1MI versus GC and 2MI versus GC. The functional interpretation of this comparisons in terms Gene Ontology (biological process) were performed using FatiScan methodology implemented in Babelomics. The functional modulest over-expressed in both classes were explored to get gene signatures that generally identified MI. In this study it was possible to select 14 GO biological processes with adjusted pvalue < 0.05 that were common in both comparisons. The total number of genes selected by functional profiling was 1373. Functional evaluation of the PBC is a useful tool to investigate cardiovascular biomarkers that may be involved in the early stages of MI.

Poster 54

A COMPUTATIONAL APPROACH
TO IDENTIFY WHOLE GENOME
HOMOZYGOSITY MAPPING ACROSS
MULTIPLE SNP MAPPING EXPERI-
MENTS

Roberta Spinelli

Institute of Biomedical Technologies, Seg-
rate, Milan (ITB-CNR)
roberta.spinelli@itb.cnr.it

A. Gessi², M.C. Proverbio², E. Mangano²,
F. Ferrari³, I. Cifola¹, M. Bardini⁴, G.
Cazzaniga⁴, A. Salvatoni⁵, C. Battaglia²

1 Institute of Biomedical Technologies, Seg-
rate, Milan (ITB-CNR)

2 Department of Science and Biomedical
Technologies (DiSTeB) and PhD' School of
molecular medicine, University of Milan;

3 Department of Biology, University of

ANEXO G

Annual Meeting, 2009, Chicago. **Clinical Chemistry**. Washington: Clinical Chemistryv.55. p.A71 - A71, 2009.

Tuesday, July 21, 2:00 pm - 4:30 pm

B-66

Peripheral blood cells transcriptome to study new biomarkers for myocardial infarction follow up

V. N. Silbiger¹, A. D. Luchessi¹, R. D. Hirata¹, A. Carracedo², M. Brión³, L. G. Lima-Neto¹, C. P. Pastorelli¹, J. Dopazo⁴, D. Montaner⁴, F. Garcia⁴, M. P. Sampaio⁵, M. P. Pereira⁵, E. S. Santos⁵, D. Armaganijan⁵, M. H. Hirata¹. ¹*Faculdade de Ciências Farmacêutica - Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil*, ²*Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain*, ³*Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain*, ⁴*Bioinformatics Department- Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, Spain*, ⁵*Instituto Dante Pazzanese do Estado de São Paulo, São Paulo, Brazil*

Introduction: The main clinical manifestation of atherosclerosis is the acute myocardial infarction (MI), which is a medical emergency that requires a prompt diagnosis and efficient therapy. New markers to predict MI have been scarcely described in the last decade.

Objectives: A transcriptomic experiment was carried out to study the global gene expression in peripheral blood cells (PBC) to study surrogate biomarkers for the early diagnosis of myocardial infarction.

Methods: 5 MI patients and 6 healthy individuals were selected in a coronary emergency facility. MI patients were followed up 8h after MI (T1), after angioplasty (T2) and each 12 h during 48 h (T3 to T6). The control group (GC) was composed by healthy individuals and this 5 MI after one year past of the event. RNA was extracted by PAXgene system (Qiagen). PBC mRNA expression profiles were assessed by Affymetrix GeneChip Human Exon 1.0 ST array. Signals were quantile-normalized using iterPLIER algorithm, filtering (IQR, DABG and CROSS HYBR) and bayesian adjusted t-statistics from the linear models for Microarray data (limma) package interfaced on oneChannelGUI was applied to evaluate the differential gene expression. The comparisons of interest were each time of MI versus GC, and the evolution of the genes selected in the first moment during the time investigated. The functional interpretation in terms of biological process, molecular interaction and disease processes were performed using Ingenuity Systems program.

Results: After normalization and filtering were available 16869 genes. 25 genes were differently expressed between MI T1 and GC with Benjamini & Hochberg adjusted p-value < 0.05 and fold change 1.5, followed by 596, 138, 24 and 6 in T2, T3, T5 and T6, respectively. No differences were found after 24 hours (T4).

Only 13 genes were common of the first comparison when T2 (after angioplasty) was compared with CG and 3 genes after 12 h of MI (T3), which were involved in cellular growth/proliferation and lipid metabolism. Nine genes involved with cell-mediated immune response were selected only in T1.

Conclusion: The PBC transcriptome of MI follow up displayed significant variations on expression of genes involved in immune-mediated response, growth/proliferation and lipid metabolism. Immune response-related genes selected in this study may predict the initial response to the MI lesion.

ANEXO H

Simpósio Anual de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas, 2009, São Paulo. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2009

FCF142

mRNA SPLICING VARIANTS OBSERVED IN PERIPHERAL BLOOD CELLS FROM PATIENT WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER (PG), ANDRÉ DUCATI LUCHESSI (PG), LIDIO LIMA NETO (PG), CARLA PASTORELLI (PG), *MARCELO SAMPAIO (PD), *MARCOS PAULO PEREIRA, *ELIZABETHE DOS SANTOS, *DIKRAN ARMAGANIAN, **ANGEL MARIA ALVAREZ CARRACEDO, ROSARIO DOMINGUES CRESPO HIRATA, MARIO HIROYUKI HIRATA

Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil, *Instituto Dante Pazzanese do Estado de São Paulo, São Paulo, Brazil, ** University of Santiago de Compostela, Galicia, Spain.

Introduction and Objectives: The latest generation of Affymetrix microarrays allows the analysis of alternative splicing genome-wide in peripheral blood cells (PBC) to study surrogate biomarkers for early diagnosis of acute myocardial infarction (AMI).

Material and Methods: Nine AMI patients and 6 healthy individuals were recruited at the IDPC Clinical Center. Individuals with primary (AMI1, n=5) and secondary coronary event (AMI2, n=4) were followed up during 48 h. PBC mRNA expression profiles were assessed by GeneChip Human Exon 1.0 ST array. Signals were quantile-normalized using PLIER algorithm and filtered using ENSEMBLE, MIDAS from oneChannelGUI software was used to evaluate the expression of splicing variants (exon level). The gene expression (gene level) was available through linear models for microarray data (limma) package for selection of significant mRNA isoforms.

Results and Conclusions: In AMI1 group, 436 and 513 AffyID were observed by exon and gene level, respectively. In AMI2, 654 and 111 AffyID were selected by exon and gene level, respectively. Twenty-five genes were selected in both AMI groups at gene level, as ECL2AI, SORL3 and SLC29AI. Interestingly, 2 of the selected genes, C1orf177 and SLITRK4, expressed different mRNA isoforms. The PBC transcriptome is a useful tool to investigate cardiovascular biomarkers in mRNA splicing variant that may be involved in the early stages of MI.

Financing: FAPESP; CAPES

Universidade de São Paulo
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

XIV SEMANA FARMACÊUTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
XLIV Semana Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica
Simpósio Anual de Pesquisas em Ciências Farmacêuticas

Melhor Trabalho de Pós-Graduação

Certificamos que o trabalho "mRNA SPLICING VARIANTS OBSERVED IN PERIPHERAL BLOOD CELLS FROM PATIENT WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION" (FCF142), de autoria de VIVIAN NOGUEIRA SILBGER, ANDRÉ DUCATI LUCHESSI, LÍDIO LIMA NETO, CARLA PASTORELLI, MARCELO SAMPAIO, MARCOS PAULO PEREIRA, ELIZABETHE DOS SANTOS, DIKRAN ARMAGANJIAN, ANGEL MARIA ALVAREZ CARRACEDO, ROSARIO DOMINGUES CRESPO HIRATA e MARIO HIROYUKI HIRATA, foi indicado como "**Melhor Trabalho de Pós-Graduação (Doutorado)**" exposto no Simpósio Anual de Pesquisas em Ciências Farmacêuticas, realizado no período de 13 a 16 de outubro de 2009, durante a XIV Semana Farmacêutica de Ciência e Tecnologia.

São Paulo, 16 outubro de 2009.

Profa. Sandra Helena Polisselli Fatsky
Presidente da Comissão
Organizadora

Prof. Sandro Rogério de Almeida
Presidente da Comissão
de Avaliação de Posteres

ANEXO J

[Print this Page for Your Records](#)

[Close Window](#)

Control/Tracking Number: 10-A-1076-2010

Activity: Abstract

Current Date/Time: 4/11/2010 5:51:44 PM

Time course proteomic profiling of human myocardial infarction plasma samples as approach to biomarkers discovers

Author Block: V. N. Silbiger¹, A. D. Luchessi¹, R. D. C. Hirata¹, L. G. Lima-Neto¹, C. P. Pastorelli¹, E. S. dos Santos², M. P. Pereira², R. Ramos², M. F. Sampaio², D. Armaganjian², S. H. Paik³, Y. Murata³, G. O. Oi³, M. H. Hirata¹. ¹Faculdade de Ciências Farmacêutica - Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil, ²Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, Brazil, ³Sun BioMedical Technologies, Ridgecrest, CA,

Abstract:

Background: Cardiovascular diseases (CVD) continue to be a very important cause of morbidity, mortality rising health care costs far into this new century. However, acute myocardial infarction (AMI) symptoms are frequently atypical or absent and alterations in the ECG can be unspecific or absent. Furthermore, serum markers, such as CK-MB and cTnI, can have low sensitivity (35%) and specificity (86%) for diagnosis of the coronary heart arrest. To investigate plasma proteomic profile of patients with AMI who underwent angioplasty using the SELDI-TOF-MS technology and to analyze the relationship of this profile with clinical and biochemical markers within 48 h after cardiac ischemia.

Methods: Ten individuals with ST-segment elevation AMI (STEMI) were selected at the Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, Brazil, all patients with acute ischemic-type chest pain (< 8 h duration). Patients were classified according to the first (1STEMI; n=5) or second (2STEMI; n=5) cardiac event, which took place within one year after the first episode. The blood was drawn from an antecubital vein six times (stages) after the STEMI diagnose. The first stage (T₀) was in Emergency Unity before receiving any medication, the second (T₂) was in a Hemodynamic Unity just after the primary angioplasty within 2 h after T₀ and next four stages took place at the Coronary Unit by each 12 h, the third (T₁₂) was at 12 h, the fourth (T₂₄) at 24 h, the fifth (T₃₆). Individuals without AMI with similar risk factors for CVD and normal ergometric test were selected as control group (CG) and the blood was collected just one time. Biochemical analyses were carried out by routine laboratory methods. Plasma Proteomic profiling analysis was performed using the top-down (*i.e.* intact proteins) SELDI-TOF-MS, after process in Multiple Affinity Removal Spin Cartridge System (Agilent, USA). Background-adjusted and normalized data was analyzed using the R-statistics based BRB Array Tools v.3.7.

Results: Compared with CG individuals, 1STEMI group presented 91, 329, 84, 88 and 123 protein peaks differentially expressed at T₂, T₁₂, T₂₄, T₃₆ and T₄₈ ($p < 0.05$), respectively. 2STEMI group presented 27, 23, 4, 13 and 19 protein peaks differentially expressed at T₂, T₁₂, T₂₄, T₃₆ and T₄₈ ($p < 0.05$), respectively, in comparison with CG individuals. In 1STEMI, nine proteins (MW 9217Da, 17788Da, 17792.5Da, 17797Da, 17803Da, 17804.5Da, 17806Da, 17807.5Da and 17825.5Da) were down-regulated at 48 h past-AMI ($p < 0.05$). In 2STEMI, five of these proteins were down-regulated (17797Da, 17803Da, 1784.5Da, 1780 Da and 17807.5Da).

Conclusion: Proteomic analysis by SELDI-TOF-MS ProteinChip technology combined with bioinformatics tools demonstrates differential protein profile in AMI patients with one or two coronary ischemic events. Differential expression during 48 h course time suggests a potential role of some these proteins as biomarkers for AMI follow up in the most critical period of cardiac ischemic recovery.

:

Topic (Complete): Proteins/Enzymes

Keyword (Complete): proteomic ; infarction ; biomarkers

Additional Information (Complete):

Check to be considered for the Student Awards Program : True