**ESTUDO DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO OCASIONADAS PELO
USO DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARANÁ, DURANTE
O PERÍODO DE 1993 A 2000**

DALMO POLASTRO

Dissertação apresentada à Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de Mestre em Ecologia
de Agroecossistemas.

P I R A C I C A B A
Estado de São Paulo – Brasil
Maio – 2005

**ESTUDO DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO OCASIONADAS PELO
USO DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARANÁ, DURANTE
O PERÍODO DE 1993 A 2000**

DALMO POLASTRO
Engenheiro Agrônomo

Orientador: Prof. Dr. **VALDEMAR LUIZ TORNISIELO**

Dissertação apresentada à Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de Mestre em Ecologia
de Agroecossistemas.

P I R A C I C A B A
Estado de São Paulo – Brasil
Maio – 2005

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP

Polastro, Dalmo

Estudo dos casos de intoxicação ocasionadas pelo uso de agrotóxicos no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000 / Dalmo Polastro. - - Piracicaba, 2005. 116 p.

Dissertação (mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2005.
Bibliografia.

1. Consumidor – Característica 2. Intoxicação 3. Pesticida 4. Saúde ocupacional
5. Toxicologia – Classificação 6. Toxicologia ocupacional 7. Trabalhador rural I. Título

CDD 615.902

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”

OFEREÇO

A Deus, pela oportunidade diária.

A Cesarinho Ricomini *"in memorian"*,
pela amizade, bondade e exemplo de ser humano.
A minha avó Genoveva (Efa) *"in memorian"*, quem
primeiro me ensinou a ter amor pelas plantas .

Aos meus queridos pais, Luiz e Thereza,
pelo amor, educação e apoio, incondicionais
A minha filha Heloísa, minha jóia preciosa,
companheira de todos os momentos.

DEDICO

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Valdemar Luiz Tornisielo, pela orientação e amizade.

Ao amigo Ralph Rabelo Andrade, pelo incentivo e colaboração incondicional em todas as etapas desta jornada.

A Prof. Dr. Ângelo Zanaga Trapé, pelo desprendimento e pela opinião decisiva e segura.

A Regina Telles de Freitas, pela amizade, antes de tudo, e pela paciência e colaboração plena durante todo o mestrado.

Aos amigos Kurt W. Reinchenbach e Edson Koike, pela amizade sempre, e pelo apoio logístico na gramática e informática, respectivamente.

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, pela oportunidade desta especialização.

Aos amigos da SEAB, Nilson, Marcos, Keller, Jânio, Hatschbach, Norberto, Célia Nascimento e Salvador, que de um modo ou de outro, colaboraram para que este trabalho se concretizasse.

A Bibliotecária Eliana M. Garcia, pela presteza, bom humor e auxílio providencial.

A Gilka Cardoso Andretta e Baltazar H. dos Santos, do DERAL, que com colaboraram prontamente.

A Gisélia B. G. Rúbio, da SESA, que forneceu o Banco de Dados sobre as intoxicações, e ajudou a esclarecer inúmeras dúvidas.

Aos Professores Arquimedes Lavorenti, Regina Monteiro e Marcos Sorrentino, pelo exemplo grave como mestres e pela influência científica positiva.

SUMÁRIO

	Página
LISTA DE FIGURAS	vii
LISTA DE TABELAS	x
RESUMO	xii
SUMMARY	xiv
1 INTRODUÇÃO	1
2 REVISÃO DA LITERATURA	4
3 METODOLOGIA.....	31
3.1 Fonte, filtragem e tratamento dos dados.....	31
3.2 Relacionamento entre intoxicações e perfis agrícolas regionais	35
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	38
4.1 Intoxicações segundo as Causas.....	38
4.2 Distribuição das intoxicações nos núcleos regionais	41
4.3 Intoxicações segundo as vias de contaminação	43
4.4 Intoxicações segundo a classe dos agrotóxicos, grupos químicos e causas de intoxicação	45
4.5 Intoxicações segundo a classe, grupo químico e vias de contaminação	51
4.6 Intoxicações através das diferentes faixas de idade	52
4.7 Número de óbitos	55
4.8 Relação entre Intoxicações, regiões e respectivas áreas de cultivo	59
4.9 Intoxicações segundo o local da ocorrência.....	67
4.10 Intoxicações segundo a ocupação	71

4.11	Intoxicações nas regiões e núcleos regionais, segundo a classe e respectivos grupos químicos dos agrotóxicos	72
4.11.1	Região norte	76
4.11.2	Região sul	79
4.11.3	Região centro-oeste	81
4.11.4	Região oeste	83
4.11.5	Região noroeste	83
4.11.6	Região sudoeste	84
4.12	Óbitos segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos, dentro das regiões e núcleos regionais.....	86
4.13	Óbitos segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos, entre as classes de idade e sexo	88
5	CONCLUSÕES	90
	ANEXOS	92
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	104
	APÊNDICES	112

LISTA DE FIGURAS

	Página
1 Proporção do número e da área dos estabelecimentos, por grupos de área total e proporção do número e da área dos estabelecimentos, explorados pelo proprietário, arrendatário, ocupante e administrador - Paraná – 1970/1995.	12
2 Histórico,síntese e utilização dos principais inseticidas organoclorados	16
3 Óbitos registrados segundo agente tóxico. Brasil, 1997.....	22
4 Parâmetros da DL ₅₀ utilizados na classificação dos agrotóxicos segundo a classe toxicológica e tipo de formulação; dados estabelecidos através da Portaria nº 03/1992 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.	25
5 Evolução dos casos de intoxicação por agrotóxicos, para as causas profissional, suicídio e acidental, ocorridos no Estado do Paraná, nos anos de 1993 a 2000.....	41
6 Evolução dos casos de intoxicação por agrotóxicos, para as regiões norte, sul, centro-oeste, oeste, noroeste e sudoeste, ocorridos no Estado do Paraná, nos anos de 1993 a 2000.....	42
7 Intoxicações por classes de produto, ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000	46
8 Evolução do número de intoxicações causadas pelos quatro principais grupos químicos,responsáveis pelas intoxicações ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000	47
9 Principais causas e grupos químicos, responsáveis pelas intoxicações ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000	50

10 Principais vias de intoxicação e grupos químicos, responsáveis pelas intoxicações ocorridas no Estado do Paraná, no período de 1993 a 2000.	52
11 Distribuição das intoxicações para as causas profissional, suicídio, acidental, ignorada e alimentos contaminados, dentro das faixas de idade, ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.....	54
12 Distribuição do número de óbitos entre homens e mulheres, nas diversas faixas de idade estudadas, segundo a causa suicídio, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.....	56
13 Distribuição do número de óbitos, por causa de intoxicação para homens e mulheres, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000	57
14 Distribuição do número de óbitos entre homens e mulheres, dentro das diversas faixas de idade, ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.....	58
15 Evolução do número de casos de intoxicação e áreas de cultivo do grupo de cultivos de frutas, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.	62
16 Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de olerícolas grandes, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.	62
17 Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de olerícolas, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.	63
18 Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de verão, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.	63

19	Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de inverno, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.	64
20	Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de outros cultivos, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.....	64
21	Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas totais de grupos de cultivos, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000.....	65
22	Evolução dos percentuais de intoxicação, segundo o local de ocorrência, durante o período de 1993 a 2000.....	68
23	Número de intoxicações nos núcleos regionais da região norte, segundo a classe dos agrotóxicos, durante o período de 1993 a 2000..	77
24	Percentual das intoxicações segundo a classe dos agrotóxicos, na região sudoeste, durante o período de 1993 a 2000.	85
25	Evolução dos casos de intoxicação e óbito, durante os anos de 1993 a 2000.	86

LISTA DE TABELAS

	Página
1 Casos registrados de intoxicações humanas por causa, sexo e óbitos. Brasil, 1997	21
2 Regiões administrativas e respectivos núcleos regionais da SEAB	36
3 Grupos de culturas e respectivos cultivos.....	37
4 Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por causa de intoxicação, nos anos de 1993 a 2000	38
5 Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, durante o período de 1993 a 2000.....	43
6 Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, para a causa PROFISSIONAL, durante o período de 1993 a 2000	44
7 Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, para a causa SUICÍDIO, durante o período de 1993 a 2000.....	44
8 Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, para a causa ACIDENTAL durante o período de 1993 a 2000.....	44
9 Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por causa e faixas etárias, durante o período de 1993 a 2000	53
10 Óbitos causados pela intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por sexo, faixa de idade e causa, durante o período de 1993 a 2000	56

11	Análise de correlação entre as variáveis, grupos de cultura e intoxicações.....	66
12	Número de intoxicações segundo o local de ocorrência, durante o período de 1993 a 2000.....	68
13	Número total de intoxicações segundo as causas de contaminação e locais de ocorrência, para o período de 1993 a 2000.....	69
14	Número de intoxicações segundo o local de ocorrência e via de contaminação, durante o período de 1993 a 2000	71
15	Número de intoxicações segundo o local de ocorrência e a ocupação dos intoxicados	72
16	Número de intoxicações por regiões, segundo a classe e principais grupos químicos de agrotóxicos, ocorridas durante o período de 1993 a 2000.....	75
17	Número de intoxicações entre os núcleos regionais da região norte, por classe e principais grupos químicos ocorridas durante o período de 1993 a 2000.....	76
18	Número de intoxicações entre os núcleos regionais da região sul, por classe e principais grupos químicos, ocorridas durante o período de 1993 a 2000.....	80
19	Número de intoxicações entre os núcleos regionais das regiões centro-oeste e oeste, por classe e principais grupos químicos, ocorridas durante o período de 1993 a 2000.....	82
20	Número de intoxicações entre os núcleos regionais das regiões noroeste e sudoeste, por classe e principais grupos químicos, ocorridas durante o período de 1993 a 2000.....	84
21	Número de óbitos, segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos, ocorridos durante o período de 1993 a 2000	88

ESTUDO DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO OCASIONADAS PELO USO DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARANÁ, DURANTE O PERÍODO DE 1993 A 2000

Autor: DALMO POLASTRO

Orientador: Prof. Dr. VALDEMAR LUIZ TORNISIELO

RESUMO

O Estado do Paraná destaca-se por ser responsável por mais de 20% da produção nacional de grãos. Prevaecem em sua estrutura agrária, pequenas e médias propriedades onde predomina a mão-de-obra familiar. Buscando manter e aumentar as produtividades atuais, a agricultura paranaense utiliza intensivamente os insumos disponíveis no comércio, como é o caso nos agrotóxicos, onde o Paraná é tido como segundo maior consumidor nacional. A venda maciça deste insumo, o baixo grau de escolaridade dos usuários, aliado a falta de cuidados quando da sua utilização resultam no surgimento de intoxicações. Baseado nesta realidade, o presente estudo objetivou identificar e caracterizar o perfil das populações intoxicadas por agrotóxicos no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000 e propor medidas que visem diminuir os prejuízos às populações expostas. Para tanto, foram analisadas as intoxicações agudas notificadas durante o período de 1993 a 2000, referentes ao banco de dados fornecido pela Secretaria Estadual da Saúde. As intoxicações foram analisadas segundo as seguintes variáveis: sexo,

idade, local de ocorrência, via de contaminação, ocupação, evolução final (cura ou óbito), classe e grupo químico dos agrotóxicos. Após a tabulação dos dados, as variáveis foram relacionadas aos Núcleos Regionais que compõe a Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná e as intoxicações foram correlacionadas às áreas de seis grupos de cultivos (frutas, culturas de inverno e verão, olerícolas, olerícolas grandes e outros cultivos). Os resultados do estudo apontaram que a maior parte das intoxicações ocorreu em atividades relacionadas à causa profissional (53,1%), tendo sido os inseticidas os agentes causadores da maioria das intoxicações (37,9%) e óbitos (42%). A maioria dos intoxicados foram indivíduos do sexo masculino (79,8%), sendo a faixa de idade compreendida entre os 18 e 23 anos, onde ocorreram o maior número de intoxicações (21,2%) e óbitos (15,8%). O maior percentual de óbitos ocorreu mediante a tentativa de suicídio (86%), principalmente na faixa de idade entre 18 e 23 anos (16,1%). Foi na zona rural onde se deu o maior número de ocorrências (65%), em indivíduos ligados a ocupação agrícola (63%). As principais vias de contaminação, para a causa profissional foram a via respiratória com 58,3% dos casos e suas combinações com as demais vias (82,2%). Para a causa suicídio a via prioritária foi a digestiva, tendo atingido 95,7% dos casos notificados. A região norte (composta pelos núcleos regionais de Apucarana, Cornélio Procopio, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina e Maringá) deteve o maior número de ocorrências de intoxicações (43,1%) e óbitos (37%), sendo os organofosforados os maiores responsáveis por ambas. A análise de Correlação concluiu ser positiva a relação existente entre as intoxicações notificadas e as áreas de cultivos de culturas de inverno e verão, frutíferas e olerícolas. O acesso fácil, associado ao armazenamento inadequado dos agrotóxicos, assim como a participação prematura em atividades agrícolas resultou na ocorrência de intoxicações e óbitos em indivíduos menores de idade. O uso do Receituário agrônomo e Guia de aplicação para agrotóxicos de venda aplicada não impediram a ocorrência de intoxicações e óbitos causados por herbicidas bipiridílios.

CASES OF INTOXICATION CAUSED BY THE USE OF PESTICIDES IN THE STATE OF PARANÁ DURING THE PERIOD OF 1993 TO 2000: A STUDY

Author: DALMO POLASTRO

Adviser: Prof. Dr. VALDEMAR LUIZ TORNISIELO

SUMMARY

The state of Paraná is responsible for more than 20% of the national grain production. Its agricultural structure is organized in small and medium-sized properties where the labor force comes mainly from families. In order to maintain and also increase productivity, the agriculture system in Paraná makes intensive use of the available products in the market, such as pesticides, where Paraná is considered to be the second largest consumer in Brazil. The massive sale of these products, the user's low schooling level and the careless use of the products result in intoxications. Based on all that, the present study aimed at identifying and characterizing the profile of populations informedly intoxicated by pesticides in the state of Paraná during the period from 1993 to 2000, as well as proposing preventive measures in order to help such exposed populations. Therefore, the acute intoxications informed during the period from 1993 a 2000 referring to the State of Paraná Health Department databank were analyzed. The intoxications were analyzed according to the following variables: sex, age, location of occurrence, contamination method, occupation, final evolution (cure

or death), and pesticides class and chemical group. After the data tabulation, the variables were related to the Regional Centers which compose the State of Paraná Agriculture Department and the intoxications were correlated to the áreas of six different crops (fruits, winter and summer crops, vegetable crops, large vegetable crops and other crops). The results show that most of the intoxications took place during professional activities (53.1%), and insecticides were the agents causing most of the intoxications (37.9%) and deaths (42%). Most of the intoxicated people were males (79.8%) between 18 and 23 years old, with the largest number of intoxications (21.2%) and deaths (15.8%). The largest death rate occurred due to suicide attempts (86%), mainly between the ages of 18 and 23 (16.1%). The rural area accounted for most of the occurrences (65%), in individuals somehow connected to agricultural jobs (63%). The main contamination methods for a professional reason were the respiratory tract with 58.3% of the cases and its combinations with the other tracts (82.2%). For the cause of suicide the digestive tract was the most relevant, with 95.7% of the informed cases. The north region (composed by the regional centers of Apucarana, Cornélio Procopio, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina and Maringá) had the highest number of intoxications (43.1%) and deaths (37%), mainly caused by organophosphates. The Correlation analysis showed the relationship between informed notifications and the winter and summer crop areas, as well as fruit and vegetable crops, was positive. Easy access, together with inadequate storage of pesticides and premature participation in agricultural activities resulted in the occurrence of intoxications and deaths in underaged individuals. The dipyridylum herbicides, even being sold strictly under agronomic prescription associated to the application guide, did not impeded the occurrence of intoxications and deaths of pesticides's users.

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Paraná atualmente ocupa uma posição de destaque no cenário agrícola nacional. Apesar de possuir 2,3% da área do país, o Paraná é responsável por 23,4% da produção nacional de grãos, sendo o 1º produtor nacional de milho, feijão, trigo, mandioca, aveia e o 2º produtor de soja, centeio e cevada. O Paraná também é um grande consumidor de agrotóxicos, situando-se como o segundo maior consumidor de Produtos Agrotóxicos Comerciais (Paraná, 2001).

O Estado do Paraná, com uma área de 199.324 km², possuía em 1996, ano do último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma população de 9.003.804 habitantes, sendo 77,9 % residentes em áreas urbanas e 22,1% em áreas rurais. Em sua estrutura agrária, predominam pequenas e médias propriedades, exploradas, principalmente, pela mão-de-obra familiar, onde, 87% delas possuem menos de 50 ha (IBGE, 1997).

Nas pequenas propriedades, as culturas que prevalecem são culturas de subsistência, como milho e feijão, e perenes como o café, culturas estas onde ocorreram, conforme levantamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA), os maiores números de casos de intoxicação entre 1997 a 1999 (Paraná, 2002a).

No atual estágio da agricultura paranaense, o uso de agrotóxicos consiste em fator essencial para o alcance dos níveis de produtividade preconizados pelos órgãos de tecnologia e pesquisa. Entretanto, este uso deve ser efetuado de forma parcimoniosa e de modo seguro, permitindo assim, a produção de alimentos em quantidade e qualidade aceitáveis, sem comprometer a saúde dos trabalhadores rurais e dos consumidores.

Quando abordamos questões afetas aos agrotóxicos, inevitavelmente somos levados aos perigos toxicológicos inerentes ao uso destes insumos, sobremaneira no Brasil, país continental com acentuadas diferenças regionais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), citada por Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (1996) estima que nos países em desenvolvimento ocorrem aproximadamente três milhões de intoxicações agudas causadas por agrotóxicos, resultando em 220 mil mortes por ano.

No Estado do Paraná, os dados referentes ao uso de agrotóxicos igualmente apontam uma desanimadora realidade. A Secretaria de Estado da Saúde informou que no período de 1990 a 1999 ocorreram 8.768 casos de intoxicação aguda por agrotóxicos, destes, 913 vieram a óbito. Em outro levantamento, aquele órgão público apurou as causas das intoxicações, especificando que 50% delas decorreram do uso profissional desses produtos, 29% derivaram de suicídio e 17% foram acidentais. E ainda, que desse total, 78% atingiram pessoas do sexo masculino e 22% do sexo feminino. A faixa etária na qual predominou o maior número de casos de óbito foi acima de 40 anos. Em outro levantamento, abrangendo o período de 1997 a 1999 a SESA apurou que 90% dos óbitos foram provocados por suicídio, 5% pelo uso profissional e 5% por outras causas (Paraná, 2002a).

O nível de instrução dos trabalhadores rurais, bem aquém do desejável, e o descaso com que muitos tratam as questões de segurança inerentes ao uso de agrotóxicos e afins, seu armazenamento, destinação das embalagens e resíduos desses produtos, comprometem a eficácia da aplicação e elevam os riscos de acidentes. Tais fatos em grande parte justificam os casos de intoxicação aguda e de óbitos, consideradas as bem sucedidas tentativas de suicídio pela ingestão desses produtos.

O objetivo geral deste estudo foi o de identificar e caracterizar o perfil das populações notificadamente intoxicadas por agrotóxicos, de uso agrícola, no Estado do Paraná no período de 1993 a 2000. Para tanto, buscou-se conhecer os seguintes aspectos relacionados às intoxicações: quais as principais causas e vias de intoxicação; quais as classes e grupos químicos dos agrotóxicos causadores das intoxicações; qual o perfil do intoxicado, segundo a faixa de idade, sexo, ocupação e local de ocorrência da intoxicação; e à luz dos casos de intoxicação notificados, quais são as regiões e respectivos núcleos regionais da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB) consideradas mais problemáticas, e quais as possíveis justificativas, relacionando seus respectivos índices de intoxicação às suas características agrícolas, como os tipos de atividade agrícola (culturas) e intensidade de exploração (áreas de cultivo).

2 REVISÃO DE LITERATURA

A questão dos agrotóxicos, seu uso e seus benefícios, tem sido larga e exaustivamente discutida nos últimos anos. Nesta discussão surgem as mais relevantes polêmicas acerca do tema, principiando pela denominação deste insumo. De um lado, os fabricantes, na sua maioria, grandes conglomerados multinacionais e suas fusões a cada dia mais freqüentes, e no outro extremo, todos os seres vivos, onde se inclui a sociedade humana nas suas mais variadas formas de organização social e intelectual.

De modo geral, os agrotóxicos no Brasil são utilizados por agricultores de pouca instrução, que ignoram os perigos da exposição a este insumo, haja vista que nem sempre recebem as informações necessárias ou, então, quando as recebem, desconsideram, julgando possuírem capacidade e experiência suficientes para bem utilizá-los (Nieweglowski et al., 1992; Albuquerque et al., 2004).

No que diz respeito ao conhecimento sobre os riscos oferecidos pelo manuseio de produtos agrotóxicos e a evidente desatenção por parte dos indivíduos manipuladores, comportamento análogo também pode ser encontrado em países desenvolvidos, onde o nível cultural das populações expostas é superior aos do Brasil. Realidade semelhante a nossa, foi constatada em estudo sobre intoxicações agudas por pesticidas, realizado na

Holanda, pelo National Poisons Control Centre. Foram selecionados 54 casos de possível intoxicação aguda por pesticidas, destes, apenas 37 apresentaram relação direta entre exposição a agrotóxicos e problemas agudos de saúde. Dos 54 casos analisados, em 67% a exposição não ocorreu devido à aplicação de pesticidas, mas sim, durante o seu preparo (35%); 14% durante o reparo do equipamento de aplicação e 14% durante a inadvertida reentrada no local de aplicação. O autor conclui afirmando que embora a maioria dos trabalhadores seja consciente do risco em se usar pesticidas, estes ainda são negligentes nos cuidados com medidas de proteção (Meulenbelt & De Vries, 1997).

Além da questão referente à consciência sobre os perigos oferecidos pelos agrotóxicos quando da sua utilização, outro aspecto que determina terminantemente a efetividade ou não da intoxicação pelos agricultores, é o aspecto da proteção, representada pelos Equipamentos de Proteção Individual – EPI^s. Agostinetto (1988), estudando os procedimentos de segurança de trabalho adotados por fumicultores do município de Pelotas-RS, concluiu que apenas 12,8% usam equipamento básico de proteção, sendo que 26,6% não utilizam nenhum tipo de equipamento de proteção, que 27,7% destes já passaram mal após as aplicações e 6,4% já se intoxicaram com agrotóxicos. Os percentuais de uso de alguns dos equipamentos de proteção variam sobremaneira, como se pode observar em levantamento feito com produtores de olerícolas de um município do Estado de Minas Gerais, onde se apurou que a maioria dos entrevistados (59%) não utilizava EPI^s, dos restantes, alguns (29%) utilizavam apenas luvas e botas, e os demais (12%), apenas máscara (Albuquerque et al., 2004).

A grande maioria dos estudos realizados atesta que os agricultores usuários de produtos agrotóxicos tem ciência da necessidade do uso de EPI^s, entretanto, boa parte deles não os utiliza e, quando o fazem, tendem a utilizá-los parcialmente, como botas, luvas e máscara, alegando, inclusive, que apesar

da utilização dos equipamentos não estariam totalmente livres dos riscos de contaminação (Albuquerque et al., 2004).

Em estudo realizado por Oliveira-Silva et al. (2001) no Estado do Rio de Janeiro visando avaliar a exposição de trabalhadores rurais e a influência dos fatores socioeconômicos na contaminação por agrotóxicos, concluiu-se que, apesar de 90% dos entrevistados considerarem de grande importância a utilização de EPI's, apenas 70% destes os utilizavam.

A utilização parcial dos EPI's, sua não utilização ou o uso de equipamentos inadequados, seja no preparo das caldas ou na aplicação dos agrotóxicos, é um ato generalizado no ambiente das populações expostas (Agostinetto et al., 1988; Albuquerque et al., 2004; Bueno, 2004; Delgado & Paumgarten, 2004 e Faria et al., 2004).

Muitas são as justificativas pelas quais os aplicadores de agrotóxicos não utilizam os EPI's. Albuquerque et al. (2004, p.4), apurou junto a aplicadores entrevistados no município de Caratinga - MG, que:

“as luvas são grossas e dificultam o manuseio ou são finas e rasgam com facilidade. As botas são quentes e dificultam a locomoção em ambientes molhados, como é o caso das hortas. As máscaras são desconfortáveis e dificultam a respiração ou por acharem que elas não são necessárias ou simplesmente por não se interessarem em usá-las”.

A falta de costume; serem desconfortáveis; quentes; dificultar o trabalho; custarem caro; foram outros motivos encontrados por Delgado & Paumgarten (2004), para que os aplicadores não utilizassem os EPI's. Faria et al. (2004) cita em estudo feito no Sri Lanka que, apesar da consciência dos aplicadores pela existência da maioria dos itens que compõe o conjunto de

equipamentos de proteção, a grande maioria não os utilizava em razão do desconforto e dos custos. Mesmo que alguns agricultores tenham a consciência da importância do uso de EPI^s, ainda sim, não o utilizam, pelo fato deles provocarem calor e limitarem a mobilidade, conforme conclusão que se chegou num trabalho realizado em Alberta, EUA. (Garcia, 2001b).

Outro tipo de conduta, porém mais rara, e que justifica o não uso de EPI^s está ligado ao aspecto cultural, mais precisamente ao comportamento “*machista*” que prevalece em certas comunidades. Guivant (1994) em trabalho realizado junto a olericultores do Estado de Santa Catarina, argumenta que os agricultores tendem a impingir às intoxicações não ao manuseio incorreto dos agrotóxicos, mas sim, à fragilidade dos aplicadores. Segundo a autora, a utilização de equipamentos de proteção é tida pela comunidade estudada, como coisa de indivíduos “afeminados ou medrosos”.

Quando se aborda o aspecto de segurança na utilização dos agrotóxicos não se deve esquecer que parte daqueles que manuseiam estes produtos nem sempre se constituem em proprietários das áreas onde tal insumo é aplicado. Muitos são empregados, porcenteiros, arrendatários, além de outras categorias de funcionalidade e servidão. A estes, são oferecidas péssimas condições de trabalho, baixa remuneração pelos seus serviços, restando desinformados dos custos, da utilidade e da necessidade do uso de EPI^s. Também é notório o despreparo da classe patronal, insuficientemente preocupada com a saúde de seus empregados, aos quais poucas vezes disponibilizam, como é de seu dever, equipamentos, vestimentas ou maquinários adequados, capazes de diminuir sobremaneira a exposição dos aplicadores aos agrotóxicos.

Ao tratar dos itens pertinentes a proteção individual dos aplicadores de agrotóxicos, encontra-se esteio legal nas mais diversas instâncias

jurisdicionais. No âmbito estadual, a Lei nº 7827/83, que dispõe sobre a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território Paranaense, estabelece em seu art. 20 que:

“todo proprietário agrícola que venha a aplicar, em sua propriedade, agrotóxicos ou biocidas deverá se utilizar ou fornecer, àqueles que para ele trabalharem, equipamentos de proteção para a aplicação, na lavoura, de agrotóxicos e/ou biocidas” (Paraná, 1997, p.5).

O Decreto Estadual nº 3876/84, que regulamenta a citada Lei, caracteriza adequadamente, em seu art. 23, os personagens relacionados à exploração agrícola, como donos, parceiros ou arrendatários e, no seu art. 24, especifica suas obrigações enquanto usuários de agrotóxicos e/ou biocidas: “1. fornecer, conforme normas técnicas de segurança recomendada para o produto, equipamento de proteção àqueles que sobre ordem, transportem, manuseiem ou apliquem agrotóxicos e/ou biocidas” (Paraná, 1997, p.20).

Já a Lei Federal nº 7.802/89, art. 14, alínea f, dispõe que as responsabilidades administrativas, civil e penal, pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, cabem:

“f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos” (Paraná, 1997, p.74).

Do mesmo modo, o Decreto Federal nº 98.816/90 que regulamentava a citada Lei, em seu art. 73, tipificava como sendo infração o disposto nos seus incisos VIII e IX:

“Inciso VIII - utilizar inadequadamente agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como não utilizar equipamentos de proteção da saúde do trabalhador
Inciso IX - utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins sem os devidos cuidados com a proteção da saúde humana e do meio ambiente;” e inciso XV: “não fornecer ou não fazer a manutenção dos equipamentos de proteção do trabalhador” (Paraná, 1997, p.115).

Hoje, o Decreto Federal nº 4.074/02 que revogou seu anterior, de nº 98.816/90, no *caput* do seu art. 84, inciso VI, imputa as responsabilidades, administrativa, civil e pena, pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, ao que: “Inciso VI – o comerciante, o empregador, o profissional responsável ou prestador de serviços que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde ou ao meio ambiente” (Paraná, 2002b, p.22).

Como se pode notar, existe farta legislação que ampare àqueles que manuseiam, em qualquer que seja sua categoria funcional, os produtos agrotóxicos. Entretanto, na prática observa-se que o uso de Equipamentos de Proteção Individual só ocorre mediante o convencimento através de práticas educacionais, e na maioria das vezes, através da expressa imposição de sanções legais aos proprietários, empregadores e funcionários, por meio da ação de fiscais de defesa sanitária vegetal.

Ainda no quesito segurança, não se deve olvidar dos itens relativos aos equipamentos utilizados na aplicação dos agrotóxicos, como os pulverizadores, principais instrumentos do ato de se aplicar agrotóxicos, sejam eles de ação motorizada ou manual.

Tordoir & Maroni (1994) propõem a seguinte ordem das medidas gerais envolvidas na prática agrícola: substituição de produtos em uso por produtos que ofereçam menor risco a saúde; melhoria das embalagens e equipamentos utilizados na prática agrícola; melhoria na execução das

atividades, visando minimizar a exposição; uso de EPI^s enquanto as exigências anteriormente citadas são executadas.

Garcia (2001a) em estudo que visava avaliar o impacto da Lei Federal nº 7.802/89 sobre a questão das intoxicações e outros aspectos relacionados a toxicologia deste insumo, concluiu que a intensificação da fiscalização sobre o uso destes produtos, associada a medidas normativas que restrinjam o registro de produtos de alta periculosidade e priorizem o registro de produtos menos tóxicos, são providências que podem circunstancialmente minimizar o impacto destes sobre as populações expostas.

Em estudo recentemente realizado por Gandolfo & Antuniassi (2004) durante um período de cinco anos, foram avaliados, em propriedades, cooperativas e fabricantes de máquinas, cerca de 200 equipamentos de pulverização, do tipo tratorizado, onde concluíram que 80% dos aparelhos com mais de dois anos de uso apresentaram bicos de pulverização desgastados; 70% operam com erros de dosagem e 100% deles apresentaram problemas nos medidores de pressão (manômetros), ou seja, a manutenção dos equipamentos utilizados na aplicação de agrotóxicos ainda não é tida como um procedimento rotineiro e obrigatório. Deste fato implica a aplicação incorreta de agrotóxicos, gerando sub ou superdosagens de ingredientes ativos no ambiente, potencializando a ocorrência indesejável da resistência dos alvos biológicos.

A utilização de equipamentos de aplicação, modernos ou em perfeito estado de funcionamento, não é condição assaz para a não ocorrência de acidentes de trabalho junto às populações expostas ao uso de agrotóxicos. O uso adequado dos equipamentos de aplicação, apoiado pelo constante assessoramento por parte de técnicos experimentados, que levem até estas populações, de modo contínuo e continuado, as tecnologias mais adequadas a

cada conjunto de circunstâncias, é fator preponderante à minimização dos riscos de exposição a estes produtos.

Ramos et al. (2002), em trabalho realizado na cultura da uva para avaliação da exposição dérmica de aplicadores de agrotóxicos, onde foram utilizados 4 tipos de equipamentos de pulverização: semi-estacionário típico, pulverizador de barras adaptado a cultura da uva (bicos voltados para cima), turbopulverizador marca Hatsuta (modelo café com turbina adaptada a cultura da uva) e turbopulverizador marca KO (modelo Jales), concluiu que a maior exposição, quantificada através da extração do elemento marcador (cátion Cu^{+2}) presente nos coletores (absorvente higiênicos femininos) afixados em partes estratégicas do corpo dos aplicadores, aconteceu por ocasião do uso do pulverizador semi-estacionário típico, onde os bicos de pulverização são posicionados à frente dos aplicadores, obrigando-os a atravessarem a nuvem de pulverização (fog) enquanto aplicam o agrotóxico e a exposição foi elevada em praticamente todo o corpo. Os demais equipamentos utilizados no trabalho proporcionaram grande redução na exposição dérmica potencial, quando comparado ao sistema semi-estacionário, sendo as mãos, cabeça e dorso as regiões mais atingidas, o que implica em deduzir que estas são áreas que devem ser priorizadas quando da elaboração de vestuários destinados à proteção do trabalhador.

A mudança de condutas e procedimentos, consolidados de modo pético, geração a geração, é tarefa que deve ser implementada por elementos preferencialmente ligados a órgãos oficiais de pesquisa e assistência técnica governamental, para que os agricultores, de modo geral, não sejam logrados na sua boa fé por elementos, principalmente aqueles ligados a setores de venda de insumos, que não primam por promover a redução dos riscos à saúde dos trabalhadores rurais.

O Paraná é atualmente o principal Estado agrícola do país. No último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE (1997), este apurou que na estrutura agrária do Estado do Paraná (Figura 1) predominam pequenos e médios estabelecimentos com 87% possuindo menos de 50ha, onde são cultivados anualmente 5,7 milhões de hectares com lavouras; 6,7 milhões com pastagens; e 2,8 milhões com matas e florestas. Neste mesmo Censo, na discussão dos padrões tecnológicos então vigentes, concluiu-se que mais de 86% dos estabelecimentos onde vigoram explorações agrícolas, realizam o controle de pragas e doenças, e que apenas 40% destes se servem da assistência técnica, sendo 27% desta, oriunda de técnicos de fontes governamentais. O mesmo Relatório chama atenção para o fato da alta incidência de estabelecimentos que utilizam agrotóxicos, sem a devida assistência técnica.

	Proporção do número em 31/12 (%)		Proporção da área em 31/12(%)	
	1970	1995	1970	1995
Grupos de área total (ha)				
Menos de 10	53,2	41,8	10,8	5
10 a menos de 100	43,5	50,9	41,7	33,9
100 a menos de 1.000	3,1	6,9	28,9	41,1
1.000 a menos de 10.000	0,2	0,4	15,6	17,3
10.000 e mais	0	0	3	2,7
Condição do responsável	1970	1995	1970	1995
Proprietário	54,1	71,3	59	61,8
Arrendatário	33,8	14,4	11,2	5,8
Ocupante	8,9	8,6	4,8	2,6
Administrador	3,2	5,7	25	29,8

Fonte: Modificado de IBGE (1997).

Figura 1 - Proporção do número e da área dos estabelecimentos por grupos de área total e proporção do número e da área dos estabelecimentos, explorados pelo proprietário, arrendatário, ocupante e administrador – Paraná – 1970/1995

É de conhecimento público, que no atual panorama econômico já não existe mais a “agricultura nacional”, e sim uma “agricultura global”, onde alguns produtos agrícolas são considerados *commodities* e seu valor é ditado pelos pregões de Bolsas de Valores internacionais, que sabidamente manipulam preços conforme interesses políticos tendenciosos e protecionistas.

Submissos e dependentes deste mercado, encontram-se os produtos agrícolas brasileiros. A quase inexistência, o desarranjo e a descontinuidade das políticas agrícolas governamentais, a ausência de subsídios que visem proteger e amparar, ao menos o pequeno agricultor, bem como taxas, impostos, elevadas cargas tributárias, e medidas de vigilância sanitária impingidas exclusivamente para proteger mercados, seguramente desfavorecem o agricultor brasileiro.

Em tempos de globalização, a aplicação de novas tecnologias associadas ao aporte de investimentos financeiros, são requisitos cada dia mais necessários à sobrevivência do produtor rural. Desta forma, não resta ao produtor outra opção se não a de lançar mão de todos os recursos e meios para se obter bons resultados de produtividade. Neste contexto, os agrotóxicos, como outros insumos, se constituem em componentes insubstituíveis dentro do processo de produção, para que as produtividades preconizadas como mínimas, possam ser alcançadas.

Para Newman (1978), os pesticidas são utilizados na agricultura por três motivos: aumentar a produção das safras; aumentar a qualidade da produção; reduzir os gastos com a de mão-de-obra e energia dentro da produção agrícola. Em 1850 um agricultor produzia o suficiente para 4 pessoas, em 1960 para 25 pessoas e em 1975 para 44 pessoas. Este incremento na eficiência não se deve apenas ao uso de pesticidas, mas também a evolução

progressiva das atividades de mecanização e o desenvolvimento de cultivares mais produtivos.

As primeiras tentativas usadas no intuito de controlar pragas foram feitas através do uso de substâncias químicas tóxicas, como o mercúrio, enxofre, ou através do extrato de plantas como a nicotina, píreto etc. Já na era moderna, grande parte dos pesticidas sintéticos, data do ano de 1939 quando as propriedades inseticidas do DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) foram descobertas (Newman, 1978).

À semelhança do que afirmou Newman (1978), Bull & Hathaway (1986) relatam que até a década de 1930, os pesticidas (como os agrotóxicos eram então conhecidos) utilizados se resumiam a produtos de origem botânica (píretros, nicotina, rotenona etc) ou inorgânicos artificiais (arseniacaís, mercuriais, sulfurosos etc), qualquer que fosse a nação usuária, fosse ela pertencente aos países industrializados ou do 3º mundo. Foi durante as duas Grandes Guerras Mundiais que foram desenvolvidos e produzidos em grande escala, na Europa e Estados Unidos, os pesticidas orgânicos, contendo cadeias e anéis, mais ou menos extensas de átomos de carbono, em combinação com outros elementos químicos, principalmente fósforo, enxofre e nitrogênio e, um pouco mais tarde, o cloro. A finalidade principal da criação destes produtos era bélica e não agrícola. Tão logo os pesquisadores descobriram o poder biocida, em especial o inseticida, é que as indústrias promoveram o desenvolvimento técnico e comercial destes produtos, agora chamados de pesticidas.

Fundamentado nos incontáveis trabalhos científicos realizados até os dias atuais, é indiscutível os danos causados pelos agrotóxicos ao meio ambiente, em especial aos seres humanos. O despertar desta consciência se deu após a publicação, em 1962, da obra “Silent Spring” da escritora Rachel Carson (1970). Rachel descobriu, após vários levantamentos, os prejuízos

ambientais que os agrotóxicos agrícolas, especialmente o DDT, estavam causando a espécies animais, como a águia americana, por causas decorrentes da bioacumulação seguida da biomagnificação destes produtos.

Todavia, são inegáveis os benefícios trazidos ao mundo pelos pesticidas, quando ainda inexistiam outras alternativas eficientes, principalmente no uso em campanhas de saúde pública em países subdesenvolvidos com sérios problemas de epidemias causadas por doenças tropicais. A exemplo, a grande campanha empreendida após o ano de 1955 pela OMS, que intencionou erradicar globalmente a malária. Para se ter uma idéia, num balanço feito até 1970, estimou-se que a referida campanha tenha prevenido 2 bilhões de casos de malária e salvo 15 milhões de vidas (Bull & Hathaway, 1986).

O primeiro inseticida organoclorado a ser sintetizado foi o BHC, em 1825 por Faraday. Entretanto, sua aplicação prática como biocida ocorreu apenas em 1947 no Egito, quando foi utilizado no combate de caramujos do gênero *Planorbis* e *Bulinus*, hospedeiros intermediários do *Schistosoma*, agente etiológico da esquistossomose (Almeida et al., 1962). Já os organofosforados, segundo Newman (1978), são compostos perigosos, altamente tóxicos aos mamíferos, que devido a esta característica despertaram especial interesse à indústria química armamentista durante os períodos de guerra. Estes tiveram sua origem em pesquisas realizadas na Alemanha no final da década de 30.

Dos inseticidas organoclorados conhecidos, o DDT (dicloro difenil tricloroetano) foi o de uso mais intenso na agricultura. Sintetizado em 1874 na Alemanha, por Ziedler, só teve descoberta suas propriedades inseticidas em 1940 na Suíça, pelas mãos de Laüger, Martin e Muller, então pesquisadores da Cia. Geigy. A aplicação inicial descoberta por estes, consistia no uso do DDT na

proteção de lã contra o ataque de traças e outros insetos. Tal aplicação conferiu a Paul Muller, o Prêmio Nobel de Medicina em 1948 (Almeida et al., 1962).

A maioria dos organoclorados teve sua síntese na década de 1940, porém, a aplicação como agentes, inseticidas, larvicidas e molusquicidas, se deu ao final da 2ª Grande Guerra Mundial, tendo como grande descobridor o pesquisador Julius Hyman, nos Estados Unidos (Almeida et al., 1962), como pode se observar na Figura 2.

Nome Comercial	Nome Químico	Sintetizado	Utilizado	Finalidade
DDT	Dicloro Difenil Tricloroetano	1874/Zeidler	1940/Ciba	malária
BHC (lindane)	Hexaclorociclohexano	1825/Faraday	1942/Dupine	febre amarela
DDD	Dicloro Difenil Dicloroetano			inset/molusqu.
TOXAFENO	Canfeno clorado	1945/EUA	1946/Jones	inseticida
CLORDANE		1945/J.Hyman	1950/Reimschneider	(pouco eficaz)
HEPTACLORO		1945/J.Hyman	March	larvicida
ALDRIN		1948/J.Hyman	1948/J.Hyman	inseticida/larvicida
DIELDRIN		1948/J.Hyman	1950/J.Hyman	inseticida
ISODRIN		1950/J.Hyman	1950/J.Hyman	inseticida
ENDRIN		1950/J.Hyman	1950/J.Hyman	inseticida
THIODAN	Endosulfan		1956/Hoechst	inseticida

Fonte: Almeida et al. (1962).

Figura 2 – Histórico, síntese e utilização dos principais inseticidas organoclorados

O término da 2ª Grande Guerra, e suas conseqüências político econômicas foram determinantes no emprego inicial e maciço dos inseticidas organoclorados. Foi após a 2ª Guerra que a agricultura passou a sofrer suas grandes mudanças. Equipamentos agrícolas mais sofisticados, abandono da diversificação de culturas em prol da monocultura praticada em áreas de grande porte etc (National Research Council, 1989). Oportunamente ao início

deste processo, surgem os inseticidas organoclorados e organofosforados, como a grande promessa tecnológica de fomento a esta nova agricultura.

A partir de 1945, pesticidas como o DDT, BHC (Hexaclorociclohexano), parathion e malathion, entre outros, passaram a dominar o mercado mundial por completo. E não diferente do ocorrido no restante do mundo, foi a partir da 2ª Guerra Mundial que os pesticidas orgânicos adentraram no Brasil. Já em 1946, o BHC, conhecido na época como pó-de-broca, já era fabricado no Rio de Janeiro pela Eletroquímica Fluminense (Bull & Hathaway, 1986).

O primeiro uso de inseticidas no Brasil de que se tem notícia, ocorrido por meio do BHC, aconteceu em dezembro de 1946, na cidade de Caçador-SC, utilizado no combate de gafanhotos, tendo sido também largamente utilizado no combate de pragas do cafeeiro, como a broca do café e pragas do algodoeiro. Em seguida vieram outros pesticidas, como o DDT, o parathion e o toxafeno (Nieweglowski et al., 1992).

Em 1950, o DDT era fabricado na cidade do Rio de Janeiro pela Fábrica Bonsucesso da Diretoria de Fabricação do Exército, aproveitando as instalações já equipadas para a fabricação de gases de guerra. Com a chegada do regime militar em 1964, a indústria de agrotóxicos sofre um fomento substancial em seu desenvolvimento, alavancada pelos ideais militaristas da época, que tinha como ícone e arquiteto de todo o golpe, o Gal. Golbery do Couto e Silva, na época, um dos Diretores da Dow Química. No final da década de 1960, os agrotóxicos já eram isentos de impostos como ICM e IPI, além de outros benefícios, como a isenção de taxas de importação para agrotóxicos não produzidos no Brasil. Até mesmo, aviões, utilizados na aplicação de pesticidas, ficaram livres dos impostos de importação (Bull & Hathaway, 1986).

A aquisição dos agrotóxicos era condicionada aos recursos do crédito rural, com a inclusão de uma cota contingenciada ao montante do financiamento. Neste cenário, o Estado atuava como incentivador, através de um processo político orientado pelo princípio da modernização da economia nacional. Em razão da obrigatoriedade da aquisição instituída por ocasião da liberação dos recursos, a política de importação brasileira oportunizou a entrada dos produtos de grandes indústrias químicas multinacionais, inclusive com a implantação de algumas destas indústrias nos parques industriais do sul e do sudeste na década de 70. Aliada ainda à maciça propaganda dos fabricantes, intensificou-se o uso dos agrotóxicos na época, com repercussão na atualidade, tornando o Brasil um dos maiores consumidores em termos mundiais, ressaltando-se que muitos destes, consumidos no país, até hoje enfrentam proibição de utilização nos países onde são fabricados.

Na década de 1970, o 1º PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, se caracterizava principalmente pela ambição do aumento de produtividade, e contemplaria um novo modelo de agricultura através da adoção de insumos modernos, como o dos pesticidas organoclorados e organofosforados, que tiveram seus usos potencializados. A utilização de insumos modernos, nos quais, obviamente se incluíam os pesticidas, teve em 1975, a coroação de seu sucesso através da instituição do 2º PND e do PNDA (Plano Nacional de Desenvolvimento Agrícola) (Nieweglowski et al., 1992). À época, a imposição ao consumo de agrotóxicos era tão desavergonhada, que ao captar recursos financeiros junto ao sistema oficial de crédito rural, o contratante, no caso os agricultores, era compelido a adquirir de modo obrigatório o “pacote” de agroquímicos (OPAS, 1996; Lobato, 2004).

Quando se analisa o histórico de consumo de pesticidas no Brasil, fica notória a ligação existente entre membros do governo e a indústria de pesticidas, que pode ser exemplificada através de alguns dos casos mais

famosos: Gen. Golbery do Couto e Silva (Conselho Administrativo da Dow Chemical); Ernesto Geisel (Conselho Administrativo da Norquisa, durante o governo Figueiredo); Íris Resende (Conselho Honorífico da Andef); Nestor Jost (Conselho Administrativo da Bayer Brasil); Lourenço José Tavares Vieira da Silva (Secretário do Ministério da Agricultura no governo Collor – Presidente da Andef) (Nieweglowski et al., 1992).

Segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) (ANDEF, 2002), o Estado do Paraná ostentava no ano de 1999, o segundo maior consumo de agrotóxicos do país em Produtos Comerciais – 42.396 t, ou seja, 14,7% do total comercializado no Brasil.

Com o freqüente aparecimento de novos agrotóxicos, motivados quer pela descoberta de novas moléculas (princípios ativos), quer pela competitividade a cada dia mais acirrada entre as empresas produtoras ou pelo advento do surgimento quase freqüente de novas pragas, ou ainda, pela resistência adquirida pelo uso inadequado de agrotóxicos, obrigaram o agricultor a utilizar produtos sem registro para a respectiva cultura e praga, ou até mesmo utilizar dosagens não indicadas, muitas vezes superiores ao recomendado pelos próprios fabricantes.

O uso abusivo desses produtos incorre naturalmente no aumento do número de casos de intoxicações, tornando estas um dos principais problemas de saúde pública no meio rural, seja devido ao aumento respectivo da exposição, seja pela ingestão de alimentos e água contendo resíduos de agrotóxicos em níveis além dos tolerados (Oliveira-Silva et al., 2001; Araújo et al., 2000).

Para Almeida et al. (1980), são relativamente freqüentes os casos de envenenamentos agudos provocados por pesticidas, incluindo casos fatais.

Estas intoxicações são consideradas endêmicas entre os trabalhadores que manuseiam e aplicam defensivos agrícolas em países em desenvolvimento.

De acordo com Garcia (1998), estudos realizados nas décadas de 80 e 90 dão conta que são notificados por ano, cerca de 500 mil a 1 milhão de casos de intoxicações agudas causadas por pesticidas, destes resultam a morte de 3000 a 28000 indivíduos. Garcia relata também, que apesar do consumo de pesticidas ser maior em países desenvolvidos, é nos países em desenvolvimento que ocorrem o maior número de intoxicações. De modo análogo, Delgado & Paumgarten (2004) também afirmam que a ocorrência de intoxicações agudas em países em desenvolvimento é superior ao ocorrido em países industrializados, atingindo, segundo alguns autores, percentuais de intoxicações 13 vezes maior.

Dados publicados no anuário estatístico de intoxicação e envenenamento pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (1998), situam os pesticidas agropecuários como sendo o quinto agente de intoxicação no Brasil no ano de 1997 (Tabela 1). Entretanto, quando daqueles dados são excluídos os casos de intoxicação provocados por animais peçonhentos e não peçonhentos, os pesticidas agropecuários passam a compor o quarto agente responsável por intoxicações no país. Segundo estes mesmos dados, os pesticidas agropecuários são os responsáveis pelo maior número de óbitos (143) no mesmo período, inferindo a estes um percentual de 33,8%, quando comparado aos demais agentes intoxicantes mencionados na referida pesquisa (FIOCRUZ, 1998).

Tabela 1. Casos registrados de intoxicações humanas por causa, sexo e óbitos. Brasil, 1997

Agente	Causa								Sexo					
	Acidente	Abuso	Suicídio	Profiss.	Outras	Ignorada	Total		Masculino		Feminino		Ignorado	
							Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos		
	nº	nº	nº	nº	nº	nº	nº	%	nº	nº	nº	nº	nº	nº
Medicamentos	9376	434	8568	62	2443	465	21348	29,76	7955	30	13158	52	235	1
An. Peçonhentos	12463	-	-	2058	180	115	14816	20,65	8836	28	5952	13	28	-
Animais não Peç.	4537	-	-	288	82	39	4946	6,89	2688	-	2237	-	21	-
Prod. Quim. Ind.	3334	277	450	1309	184	86	5640	7,86	3660	19	1930	4	50	-
Agrotóxicos	1668	9	1858	1434	133	96	5198	7,25	3491	99	1671	43	36	1
Pes. Domésticos	1256	18	797	99	91	47	2308	3,22	1135	16	1144	7	29	-
Raticidas	1123	3	1212	16	76	57	2487	3,47	1154	17	1302	18	31	-
Domissanitários	5252	18	714	316	139	59	6498	9,06	3292	7	3125	1	81	-
Prod. de Toalete	563	-	23	5	39	10	640	0,89	313	-	319	-	8	-
Plantas	1234	71	51	22	112	24	1514	2,11	782	2	709	1	23	-
Intox. Alimentos	447	29	-	19	88	9	592	0,83	256	1	294	3	42	-
Outros Produtos	849	2311	182	341	214	116	4013	5,59	2965	20	1013	7	35	-
Não Determin.	531	42	140	66	690	265	1734	2,42	885	20	805	12	44	1
Total	42633	3212	13995	6035	4471	1388	71734	100,00	37412	259	33659	161	663	3
%	59.43	4.48	19.51	8.41	6.23	1.93	100.0		52.15	0.36	46.92	0.22	0.92	0.00

Fonte: Modificado de FIOCRUZ (1998).

No Paraná a realidade se apresenta um pouco diferente. Neste Estado os agrotóxicos são os agentes que determinam 21% dos casos de intoxicação, ficando atrás apenas dos medicamentos (36%), segundo estudo realizado no período entre 1997 a 1999, pela SESA (Paraná, 2002a).

Outro dado alarmante apontado no anuário da FIOCRUZ (1998), que pode ser constatado na Figura 3, é o fato dos Pesticidas Agropecuários serem responsáveis, em primeiro lugar, como o agente responsável pelo maior número de óbitos, decorrentes da prática do suicídio, inferindo a este, o percentual de 27,9%. Dos casos de suicídio apontados pelo citado anuário, pode-se inferir que os agrotóxicos utilizados em tal prática, no mínimo não são armazenados adequadamente, permanecendo muitas vezes em ambientes de fácil acesso, inclusive a menores, o que pode ser comprovado através do êxito nas tentativas de suicídio nesta faixa de idade. Outra possível justificativa aos

elevados casos de suicídio, talvez resida no fato do comportamento suicida ser um sintoma aparente das alterações neuropsicológicas e/ou depressivas, em decorrência das intoxicações agudas graves, próprias da exposição a inseticidas organofosforados (Trapé, 2004).

Agente	Causa						TOTAL	
	Acidente	Abuso	Suicídio	Profissional	Outras	Ignorada	nº	%
Medicamentos	15	-	49	-	13	6	83	19,62
An. Peçonhentos	35	-	-	6	-	-	41	9,69
Animais não Peç.	-	-	-	-	-	-	0	0,00
Prod. Quím. Ind.	3	3	10	3	2	2	23	5,44
Agrotóxicos	7	-	118	2	6	10	143	33,81
Pes. Domésticos	3	1	16	-	1	2	23	5,44
Raticidas	4	-	25	-	3	3	35	8,27
Domissanitários	1	-	5	2	-	-	8	1,89
Prod. de Toalete	-	-	-	-	-	-	0	0,00
Plantas	3	-	-	-	-	-	3	0,71
Intox. Alimentos	4	-	-	-	-	-	4	0,95
Outros Produtos	2	11	7	-	3	4	27	6,38
Não Determin.	5	-	1	-	2	25	33	7,80
Total	82	15	231	13	30	52	423	100,00
%	19,39	3,55	54,61	3,07	7,09	12,29	100,0	

Fonte: FIOCRUZ (1998).

Figura 3 – Óbitos registrados segundo agente tóxico. Brasil, 1997

Fato parecido ocorre em outras partes do mundo, como no Sri Lanka, onde em estudo realizado, Van der Hoek et al. (1998) concluiu que a intoxicação aguda por agrotóxicos é o maior problema de saúde pública, e que a maior partes dos casos é intencional (tentativa de suicídio), entre adultos, sobretudo mulheres; relata ainda que em uma área de irrigação os casos de suicídio atingiram 68% dos intoxicados. Van der Hoek acredita que legislações mais rigorosas, que visem restringir a disponibilidade de pesticidas mais tóxicos, bem como a melhoria dos serviços de extensão, a longo prazo, de modo que promovessem métodos alternativos de controle de pragas, seria uma importante estratégia para se minimizar o problemas das intoxicações.

Sheu et al. (1998) estudando casos de intoxicações agudas causadas por agrotóxicos na província de HsinChu, na Tailândia, concluiu que a incidência destas intoxicações é de 3,2 por 100000 habitantes onde, destes, 23% morrem. Concluiu também, que o maior agente das intoxicações foram os organofosforados e a maior causa está ligada à tentativa de suicídio. Observe-se aqui que um levantamento realizado pela SESA entre os anos de 1993 e 2000, apurou que os organofosforados foram os maiores responsáveis por intoxicações agudas neste período, inferindo a este o índice de 32% com relação aos demais agrotóxicos (Paraná, 2002a).

Entretanto, resta a dúvida se os aludidos casos de suicídio já não refletem os distúrbios neuropsicológicos causados pela exposição a agrotóxicos, quando em casos de intoxicações já consideradas crônicas (OPAS, 1996).

No Brasil, é vasto o mercado de agrotóxicos. Para se ter uma idéia, Alves Filho (2002) relata que até meados de 2000, o país contava com 444 princípios ativos registrados junto aos órgãos oficiais, estes por sua vez geravam uma combinação de mais de 850 produtos comerciais que, face a diversidade de tipos de volumes e embalagens, se desdobravam em 1.981 produtos. No estado do Paraná, devido a exigência de cadastro exclusivo para uso em território paranaense, estabelecida através da Lei Estadual nº 7827/83:

“Art. 1º - A distribuição e comercialização no território do Estado do Paraná, de produtos agrotóxicos e outros biocidas, estão condicionados ao prévio cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria do Interior.” (PARANÁ, 1997, p.1),

se tem um número mais reduzido de agrotóxicos legalmente permitidos para o comércio e uso. Atualmente, o número de princípios ativos cadastrados é de 360, e 720 produtos comerciais, destes, 321 deles apresentam alguma espécie

de restrição de uso. Dos produtos comerciais atualmente cadastrados, liberados para uso, 268 são inseticidas/acaricidas (37,2%); 241 herbicidas (33,5%); 167 fungicidas (23,2%); 29 adjuvantes (4,0%) e 15 reguladores de crescimento (2,1%) (Nascimento, 2004).

A Lei Federal nº 7.802/89, que dispõe sobre as várias ocupações e atividades relacionadas aos agrotóxicos, caracteriza este, no inciso I de seu Art. 2º, como sendo:

“I – agrotóxicos e afins:

- a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;
- b) substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento” (Paraná, 1997, p.67).

Já os parâmetros de classificação relacionados a DL_{50} e que determinam a classe toxicológica, foram estabelecidos pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Portaria nº 03, de 16 de janeiro de 1992 (Figura 4). Nestes, uma provável equalização à classificação utilizada pela OMS, os agrotóxicos são classificados em quatro diferentes categorias (classes), sendo identificadas na parte inferior dos rótulos através de cores distintas: classe I – extremamente tóxico (faixa vermelha); classe II – altamente tóxico (faixa amarela); classe III – medianamente tóxico (faixa azul); classe IV – pouco tóxico (faixa verde). A diferenciação no colorido das faixas utilizado na rotulagem dos produtos auxilia sobremaneira a identificação do grau de periculosidade, principalmente para os indivíduos de baixa instrução. Este

argumento é tão verdadeiro, que é comum em conversas junto aos agricultores, estes se referirem ou se referenciarem a determinados agrotóxicos por meio da cor da faixa, ou tarja, como eles geralmente a chamam.

Classe	DL50 para ratos (mg*/kg de peso vivo)			
	Oral		Dérmica	
	sólidos	líquidos	sólidos	líquidos
I Extremamente tóxico	< = 5	< = 20	< = 10	< = 40
II Altamente tóxico	5 a 50	20 a 200	10 a 100	40 a 400
III Medianamente tóxico	50 a 500	200 a 2.000	100 a 1.000	400 a 4.000
IV Pouco tóxico	> 500	> 2.000	> 1.000	> 4.000

(*) mg de produto formulado
Fonte: Paraná (1997).

Figura 4 - Parâmetros da DL₅₀ utilizados na classificação dos agrotóxicos segundo a classe toxicológica e tipo de formulação; dados estabelecidos através da Portaria nº 03/1992 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária

Com relação aos tipos de intoxicações causadas por agrotóxicos, a OPAS (1996, p.23) as classificam em três tipos:

“Na intoxicação aguda os sintomas surgem rapidamente, algumas horas após a exposição excessiva, por curto período, a produtos extrema ou altamente tóxicos. Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a depender da quantidade de veneno absorvido. Os sinais e sintomas são nítidos e objetivos.

A intoxicação subaguda: ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem aparecimento mais lento. Os sintomas são subjetivos e vagos, tais como dor de

cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência, entre outros.

A intoxicação crônica: caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos, por exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos irreversíveis, do tipo paralisias e neoplasias.”.

A relação existente entre a classe do agrotóxico utilizado, o grupo químico e as intoxicações sofridas pelos aplicadores em decorrência da prática agrícola, está diretamente relacionada ao tipo de lavoura (cultura) empreendida, e a conseqüente tecnificação demandada para sua exploração. Estudo realizado nos municípios de Antônio Prado e Ipê, ambos na serra Gaúcha, junto a plantadores de frutíferas, onde predominam pequenas e médias propriedades com exploração de natureza familiar, apontou as seguintes classes de agrotóxicos como causadores das intoxicações: fungicidas (28%), herbicidas (16%), inseticidas/formicidas (8%), causas envolvendo 2 ou mais produtos (16%) e 20% delas foram causadas por produtos não identificados. Entre os de ação fúngica, predominaram os pertencentes ao grupo dos ditiocarbamatos, já entre os herbicidas, o grupo predominante foram os derivados da glicina (glifosato) (Faria et al., 2004).

Trabalho realizado por Delgado & Paumgartten (2004) em algumas localidades no município de Paty do Alferes-RJ, região em que predomina a exploração econômica de lavouras olerícolas, como o tomate, pimentão e repolho, foram entrevistados 55 agricultores, onde se buscou avaliar o impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde dos trabalhadores. Entre todos os entrevistados, 34 indivíduos relataram ter “passado mal” devido ao uso de agrotóxicos, destes, 57% declararam estar usando na ocasião organofosforados, sendo que, 51% relataram que quando “passaram mal” usavam inseticidas organofosforados pertencentes à classe toxicológica I. Nas 55 propriedades visitadas foram encontrados inseticidas (19 marcas), fungicidas

(15 marcas) e acaricidas (2 marcas), não foram encontrados nenhum produto herbicida. Dos produtos encontrados a maioria pertencia aos grupos organofosforados, piretróides e ditiocarbamatos.

Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 1990 estimou que ocorrem em torno de 3 milhões de intoxicações causadas por agrotóxicos, e que destas, 220 mil se convertem em óbitos, além de estimar também que 70% dos casos ocorrem em países pertencentes ao 3º mundo (World Health Organization, 1990).

Não bastasse a crueldade dos números expostos pela OMS, resta ainda a tácita realidade dos casos de intoxicações não mensurados, decorrentes das subnotificações. Trapé (2004) relata que agências internacionais relacionadas a questões de saúde acreditam que, face ao frágil sistema de saúde pública existente em países em desenvolvimento, o número de subnotificações podem estar próximo a 98% dos casos efetivamente ocorridos, ou seja, apenas 1 em cada 50 casos são efetivamente registrados.

Para Trapé (2004) vários são os motivos que justificam a não notificação de casos de intoxicações: dificuldade de diagnóstico por parte da comunidade médica, devido à insuficiência de conhecimento na área de toxicologia, por parte destes profissionais; os pacientes de intoxicações agudas leves e moderadas apresentam sintomas que podem ser confundidos com o de outras enfermidades; dificuldade de acesso dos intoxicados aos locais de diagnóstico e tratamento, na maioria públicos, o que resulta na auto-medicação; existência de casos onde, devido a exposição contínua a inseticidas, por exemplo, quando submetidos a análises laboratoriais, não são detectados nos intoxicados os respectivos indicadores enzimáticos da intoxicação.

À semelhança do afirmado por Trapé (2004), Nunes (1995) atribui como causa das subnotificações os seguintes motivos: a dificuldade de acesso aos centros médicos hospitalares no caso de trabalhadores rurais; em alguns casos as intoxicações não são graves o suficiente para motivar a procura aos médicos, pois em alguns casos a sintomatologia é bastante vaga (diarréia, vômito, dor de cabeça, falta de ar, etc.); a falta de capacitação dos profissionais de saúde, quanto aos efeitos dos produtos químicos.

Forattini (1976) destaca como um dos aspectos importantes na análise epidemiológica de um quadro, a obtenção de dados que permitam a análise quantitativa.

É ponto pacífico que a principal ferramenta para se quantificar e qualificar os casos de intoxicações por agrotóxicos, que dão entradas nos hospitais e centros de controle de intoxicações, são as notificações de ocorrências toxicológicas apontadas através das Fichas de Ocorrência Toxicológica e Fichas Individual de Investigação de Intoxicação por Agrotóxico (OPAS, 1996). No entanto, percebe-se que além dos casos notificados, há um número ainda maior de subnotificações, que impedem que se dimensione de maneira real este problema, conforme concluiu Balderrama (2000), em estudo sobre as intoxicações profissionais rurais causadas por agrotóxicos no Estado do Paraná.

Ruegg et al. (1991) afirma que dados fidedignos sobre a mortalidade e morbidade de envenenamento por pesticidas em países em desenvolvimento são raros, uma vez que poucos casos são tratados por médicos e quase nunca são diagnosticados como envenenamento. Mesmo nos hospitais e centros de saúde, a falta de equipamentos adequados dificulta a confirmação do diagnóstico.

Crítica semelhante também faz Assunção & Ribeiro (2004), sobre o sistema de notificações e investigação dos casos de intoxicações causadas por agrotóxicos no Brasil. Segundo estes, as notificações não são investigadas pelos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, além do fato do atendimento ambulatorial dado aos casos de intoxicação ser débil e deste modo contribuir para o subregistro destas.

Apesar das inúmeras censuras feitas pela comunidade científica com relação à qualidade e a quantidade (número de registros) dos dados de notificações ofertados por instrumentos de coleta de informações, como as Fichas Epidemiológica de Ocorrência Toxicológica, a análise destes, ainda se constitui como o melhor caminho para se aferir o real impacto do uso de agrotóxicos no contexto sócio-econômico de um país, bem como instrumentar os órgãos oficiais de vigilância, sejam das áreas de saúde, previdência ou defesa agropecuária, na proposição de políticas públicas que visem minimizar os impactos dos agrotóxicos junto a sociedade como um todo.

Implantados na década de 80, em muitos estados brasileiros, os Centros de Controle de Intoxicações são responsáveis pela recepção inicial dos dados, então apontados nas Fichas de Ocorrência Epidemiológicas, que em seguida, são sistematizados e encaminhados a Fundação Oswaldo Cruz, órgão do Ministério da Saúde, que por meio do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) coordena o tratamento destes dados, e após analisá-los, publica anualmente a compilação destes na forma de estatísticas.

Segundo o Manual de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos (OPAS, 1996) a existência de um sistema de vigilância epidemiológica, consiste em fator preponderante ao conhecimento do comportamento epidemiológico das doenças ou agravo escolhido como alvo

das ações, a fim de que sejam providenciadas e desencadeadas ações com estimável sucesso.

O referido Manual, publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 1996, p.7), dita que: as ações de vigilância da saúde devem envolver todos os níveis do sistema e contemplar as seguintes funções:

“coleta de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação das medidas de controle apropriadas; análise e interpretação dos dados processados; recomendação das medidas de controle indicadas; promoção das ações de controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes.”.

3 METODOLOGIA

3.1 Fonte, filtragem e tratamento dos dados

Os dados utilizados no estudo foram obtidos a partir das Fichas Epidemiológica de Ocorrência Toxicológica (Apêndice 1) e Ficha Individual de Investigação–Intoxicação por Agrotóxico (Apêndice 2), que após terem sido devidamente digitadas e tabuladas, foram fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, na forma de planilhas do aplicativo Windows Excell. Os dados são referentes às notificações ocorridas no período de 1993 a 2000 e tratam dos casos de intoxicação ocorridos dentro do território paranaense, que tenham se submetido ao tratamento médico-hospitalar, a ponto da ocorrência ter sido oficialmente registrada, e a notificação gerada.

Os quesitos que compõem o banco de dados, e que foram analisados, são os seguintes:

- **Data do acidente** – refere-se à ocasião em que o indivíduo intoxicado deu entrada no atendimento do Sistema de Saúde em questão e foi gerada a respectiva notificação. O estudo utilizou apenas o ano da ocorrência.
- **Sexo** – Classificados em masculino, feminino e ignorado.

- **Idade** – Através deste dado, foram criadas onze faixas de idade para análise, sendo elas:

00 -----| 05 anos
05 -----| 11 anos
11 -----| 17 anos
17 -----| 23 anos
23 -----| 29 anos
29 -----| 35 anos
35 -----| 41 anos
41 -----| 47 anos
47 -----| 53 anos
53 -----| 59 anos
≥ 60 anos

- **Local de ocorrência da intoxicação** – classificado em: rural, urbano, outro e ignorado. No local denominado como outro, foram agrupados aqueles casos onde não foi possível, através das informações contidas no banco de dados, serem enquadrados nas categorias rural e urbano, tais como: escola, lazer e residência.
- **Tipo de intoxicação** – classificado em aguda. Todas as ocorrências que compõe o banco de dados estudado pertencem a esta categoria de intoxicação.
- **Tipo do agrotóxico** – neste quesito, os casos foram classificados segundo a classe e grupo químico do agrotóxico responsável pela respectiva intoxicação.

- **Via de contaminação** – refere-se ao meio pelo qual o agrotóxico entrou em contato com o intoxicado. Podendo ser respiratória, digestiva e cutânea, bem como suas combinações.
- **Causa da contaminação** – refere-se à atividade exercida pelo intoxicado na ocasião da contaminação. Podendo ser acidental, ambiental, profissional, suicídio, criminosa, alimento contaminado e ignorado.
- **Ocupação** – no presente estudo, as ocupações foram agrupadas segundo a natureza da atividade do intoxicado, de modo a minimizar o número de itens para análise. Em sendo assim, foram criadas quatro ocupações: agricultor (composto por indivíduos relacionados à atividade agrícola, tais como: agricultores, proprietários, arrendatários, meeiros e bóias-frias), estudante, doméstica e outra (composta por ocupações que não se enquadraram nas ocupações anteriores).
- **Evolução final** – refere-se ao estado final do intoxicado após a aplicação das medidas hospitalares convenientes. Pôde evoluir na forma de alta (cura) ou falecimento (óbito).

Durante a filtragem dos dados, operação esta essencial à boa análise das variáveis em estudo, foi constatada a presença do registro de muitas ocorrências contendo informações, em certas variáveis, inapropriadas. Muitas, aparentemente são oriundas do descaso no momento da coleta e preenchimento das Fichas de ocorrência. Outras tratam de ocorrências onde o agente causador da intoxicação não se caracteriza como sendo produto registrado junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento para o uso agrícola. E também foram encontradas muitas ocorrências com campos (variáveis) não preenchidos, e outras ainda que diziam respeito a intoxicações ocorridas em outros Estados da federação e até mesmo, em outros países.

Todas estas ocorrências foram eliminadas a fim de dar maior confiabilidade aos resultados.

Para analisar a relação existente entre as intoxicações e os respectivos agrotóxicos responsáveis pelas mesmas, foram considerados dezessete grupos químicos (classe inseticida: organofosforados, carbamatos, piretróides, éster do ASDC e organoclorados; classe herbicida: derivados da glicina, bipiridílios, dinitroanilinas, fenoxiacéticos + derivados do ácido picolínico e fenoxiacéticos; classe fungicida: ditiocarbamatos, triazóis, benzimidazóis, cúpricos e triazóis + organofosforados; reguladores de crescimento: cianamidas e dinitroanilinas), visto que em tais grupos se concentraram 53,3% das intoxicações contabilizadas no estudo, e que somado as categorias Outro e Misturas totalizou 94%, do total de casos notificados, no período estudado.

Face à apresentação dos resultados, onde aparece a variável classe, que faz referência aos principais tipos de agrotóxicos conhecidos (inseticidas, herbicidas, fungicidas e reguladores de crescimento), faz-se necessário explicar o sentido da classe denominada por **Misturas**. Durante a tabulação e filtragem dos dados recebidos da SESA, foi constatada a presença de várias ocorrências onde, no campo da variável “nome comercial”, referente ao agrotóxico responsável pela intoxicação, constavam a descrição de misturas de agrotóxicos pertencentes a grupos químicos diferentes, o que obviamente inviabilizou sua classificação dentro das quatro principais classes e posterior utilização na análise. Estas misturas, em alguns casos, chegavam a serem compostas por até cinco agrotóxicos diferentes. No campo “nome comercial” também foram verificadas misturas entre agrotóxicos conhecidos e outras substâncias, como, por exemplo: cola, pinga, álcool, entre outras.

A categoria **Outro** foi criada para abrigar produtos cuja informação contida no banco de dados não inspirou confiabilidade no que diz respeito ao

seu uso nas análises. Foram constatadas as seguintes situações: produtos que não possuem nome comercial conhecido oficialmente, mas possuem o grupo químico (exemplo: mata mato, grupo químico: glifosato); o grupo químico não é condizente com aquele apontado no banco de dados (exemplo: nome comercial: Roundup, grupo químico: organofosforado); produtos relacionados com o nome comercial “ignorado”; além de outros como: semente preta, semente de milho, semente de algodão, mais, veneno para grama, negrinho, pó-de-bruxa, fersol, nortox, desfolin, kwell, piruleta, curisco, cupinizada, warfarin, bico fino, iskatoks, fu, mosquil, semente azul, ramiclops, entre outros. Estes registros são, muito provavelmente, resultantes da coleta deficiente por parte dos profissionais da área da saúde ou da informação prestada de modo incorreta pelos intoxicados ou seus responsáveis.

No intuito de se uniformizar as informações relativas às marcas comerciais apresentadas no banco de dados e respectivas classes e grupos químicos dos agrotóxicos envolvidos nas diversas ocorrências de intoxicação, foi utilizado o programa *Agrofit 98: uso adequado de agrotóxicos*, fornecido pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 1998).

3.2 Relacionamento entre intoxicações e perfis agrícolas regionais

Os dados referentes aos casos de intoxicação foram analisados e posteriormente cruzados, segundo as variáveis de maior interesse, com os respectivos municípios de ocorrência que compõe os 20 núcleos regionais, reunidos segundo a divisão política-administrativa da SEAB, e suas respectivas regiões (Tabela 2). Os núcleos regionais representam um total de 399 municípios (Anexo A). Complementarmente foi aplicada análise de Correlação (Crivisqui, 1999) entre as variáveis “número de intoxicações” e “área cultivada” dos seis grupos de culturas (Tabela 3) referentes aos cultivos predominantes

em cada região estudada, objetivando conhecer a relação entre estas duas variáveis. Os dados referentes aos grupos de culturas e suas respectivas áreas em cada região, foram obtidos a partir do banco de dados do Valor Bruto da Produção Paranaense (VBP) (Paraná, 2004), fornecido pelo Departamento de Economia Rural (DERAL), que serve como base de cálculo para o estabelecimento do índice do Fundo de Participação dos Municípios no ICMS arrecadado.

Tabela 2. Regiões administrativas e respectivos núcleos regionais da SEAB

REGIÃO	NÚCLEOS REGIONAIS
CENTRO-OESTE	Campo Mourão
NOROESTE	Umuarama e Paranavaí
NORTE	Apucarana, Cornélio Procopio, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina e Maringá
OESTE	Cascavel e Toledo
SUDOESTE	Francisco Beltrão e Pato Branco
SUL	Curitiba, Guarapuava, Irati, Laranjeiras do Sul, Paranaguá, Ponta Grossa e União da Vitória

As áreas de cultivo, com as quais foram cruzadas as informações referentes às intoxicações, são representadas aqui por agrupamentos de culturas, que também obedeceram à classificação utilizada pelo DERAL na confecção do Valor Bruto da Produção (Tabela 3).

Tabela 3. Grupos de culturas e respectivos cultivos

GRUPOS DE CULTURAS	CULTIVOS
FRUTAS	todas as frutas
OLERÍCOLAS GRANDES	batata inglesa, tomate, cebola e alho
OLERÍCOLAS	demais olerícolas
CULTURAS DE VERÃO	soja, milho, feijão, café, arroz, algodão, sorgo, amendoim, girassol, milho de pipoca e mamona
CULTURAS DE INVERNO	trigo, aveias branca e preta, cevada, canola, centeio, trigo mourisco e tritcale
OUTROS	cana-de-açúcar, mandioca, fumo, vassoura, rami, bucha-vegetal, niger, sisal, fibras, painço, porongo (cuia), pamarosa, milho (palha para cigarro) e babaçu

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Intoxicações segundo as causas

No período estudado, constatou-se que a principal causa responsável pelas intoxicações foi a profissional (53,1%), seguida pelo suicídio (28,1%) e pela causa acidental (15,2%) (Tabela 4). Esta ordem foi válida para todos os anos e no decorrer de todo o período estudado. Interessante observar que a somatória de apenas estas três causas engloba 96,4% dos casos notificados de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná. Percentuais diferentes foram encontrados, considerando o total de casos ocorridos no país, para as mesmas causas, no Anuário da SINITOX, onde a principal causa das intoxicações, no ano de 1997, foi o suicídio (35,7%), seguido pela causa acidental (32%) e causa profissional (27,5%) (FIOCRUZ, 1998).

Tabela 4. Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por causa de intoxicação, nos anos de 1993 a 2000

CAUSA DA INTOXICAÇÃO	ANO								TOTAL	
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Nº	%
PROFISSIONAL	554	596	418	281	338	280	207	272	2.946	53,1%
SUICÍDIO	274	203	194	173	174	175	194	170	1.557	28,1%
ACIDENTAL	193	104	106	106	102	81	93	58	843	15,2%
IGNORADO	13	9	14	24	15	7	12	29	123	2,2%
ALIMENTO CONTAMINADO	-	-	5	8	4	2	14	12	45	0,8%
AMBIENTAL	6	4	3	3	1	1	-	4	22	0,4%
CRIMINOSA	-	1	-	-	4	3	3	1	12	0,2%
TOTAL	1.040	917	740	595	638	549	523	546	5.548	100,0%

A relação percentual existente entre as diferentes causas de intoxicação, é alterada conforme a região geográfica em questão. Na América Central, por exemplo, no ano de 2000, 36% das intoxicações estiveram relacionadas à causa ocupacional, seguido das causas suicídio e acidental (OPAS, 2002). Já no Sri Lanka, em determinada oportunidade chegou-se a constatar um percentual de 68% para intoxicações motivadas pelo suicídio, numa população de usuários de agrotóxicos, que inclusive, possuía vasto conhecimento sobre os perigos inerentes a estes produtos (Van der Hoek et al., 1998).

Ao se analisar as intoxicações, para as causas profissional, suicídio e acidental, sob o ponto de vista das regiões que comportam os núcleos regionais, se observa que os percentuais de ocorrência obedecem semelhante distribuição aqueles apurados para o quadro geral do Estado (Tabela 4), à exceção das regiões centro-oeste e noroeste, que apresentaram percentuais divergentes das demais regiões (Anexo C). Entretanto, quando se analisam as causas de intoxicação, dentro dos núcleos regionais, nota-se que em alguns, a relação dos percentuais citados é desobedecida, como é o caso dos núcleos regionais de Apucarana, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Francisco Beltrão, onde o número de intoxicações decorrentes do suicídio superaram as decorrentes da causa profissional, tendo estes apresentado os seguintes percentuais: 39,2% e 30,4%; 42% e 35,7%; 43,8% e 35%; 42% e 40,6%, respectivamente para as causas suicídio e profissional. Outro ponto observado no Anexo C diz respeito ao NR. de União da Vitória, onde o percentual de casos de intoxicação para a causa profissional (77,4%) se apresentou demasiadamente maior as demais causas estudadas, quando comparado a qualquer dos outros núcleos regionais.

Isoladas as três principais causas de intoxicação por agrotóxicos, profissional, suicídio e acidental, e a respectiva evolução dos casos no decorrer do período estudado (Figura 5), nota-se que todas tiveram um declínio brusco nos números de casos, quando comparados aos números de ocorrências nos anos de 1993 e 2000. A causa profissional teve uma redução de 50,9% no número de casos, enquanto o suicídio 38% e a causa acidental 70%. Entretanto, foi no ano de 1994 que as ocorrências tiveram, para as três causas, sua redução mais evidenciada, sendo que a causa profissional foi a que apresentou com maior clareza este comportamento. Parte da explicação para este evento talvez resida no fato de que a área plantada com a cultura do algodão, que era de 345.000 ha em 1993, diminuiu para 171.039 ha no ano de 1995 (IBGE, 1997, p.35). O algodão, sabidamente uma cultura que demanda um uso elevado de agrotóxicos e na maioria das vezes, produtos pertencentes às classes toxicológicas I e II, a redução de sua área de plantio em 50,4% provavelmente influenciou, proporcionalmente, na redução dos casos de intoxicações no período de 1994 a 1995 (52,8%), considerando-se que o algodão plantado atravessa o ano civil, sendo colhido no ano seguinte, período em que ocorre a maior parte do controle de pragas com agrotóxicos e, conseqüentemente, a maior parte dos casos de intoxicação da causa profissional. Para se ter uma idéia do quão elevado é o uso de agrotóxicos nesta cultura, segundo Relatório Técnico de Projeto de Previsão de Safra, elaborado pelo IBGE na safra 98/99, o número médio de aplicações durante o período de cultivo era de 10,75/safra, enquanto que culturas como a soja, milho e mandioca, culturas estas concorrentes em área com o algodão, o número médio de aplicações por safra foi de 4,92, 2,02 e 1,75, respectivamente. Já a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Meio Ambiente, informa que em regiões como a Nordeste, Sudeste e Sul do país, são efetuadas, em média, 18 aplicações de agrotóxicos na cultura do algodão (EMBRAPA, 2005).

Figura 5 - Evolução dos casos de intoxicação por agrotóxicos, para as causas profissional, suicídio e acidental, ocorridos no Estado do Paraná, nos anos de 1993 a 2000

4.2 Distribuição das intoxicações nos núcleos regionais

Foi na região norte do estado onde se concentrou o maior número de intoxicações (43%), tendo sido o núcleo regional de Londrina o local onde se deu o maior de intoxicações do Estado, totalizando 682, o equivalente a 12,3% do total das intoxicações ocorridas no período estudado (Anexo B). O número de intoxicações ocorrido neste núcleo, inclusive superou os totais aferidos para as regiões centro-oeste, oeste, noroeste e sudoeste do Estado. A somatória dos percentuais das intoxicações ocorridas nos núcleos regionais de Londrina,

Cornélio Procópio, Maringá, Cascavel e Campo Mourão, atingiram 50,3% das ocorrências no Estado.

As demais regiões apresentaram os seguintes percentuais totais de ocorrência: região sul (20%), centro-oeste (12%), oeste (10%), noroeste (10%) e sudoeste (4%).

A queda progressiva no número de intoxicações se deu de modo semelhante em 5 das regiões estudadas, com exceção da região sul que apresentou aumento de ocorrências a partir do ano de 1996, mas, se analisarmos o período de 1993 a 2000, todas as regiões apresentaram redução do número de intoxicações, como pode ser visualizado na Figura 6.

Figura 6 - Evolução dos casos de intoxicação por agrotóxicos, para as regiões norte, sul, centro-oeste, oeste, noroeste e sudoeste, ocorridos no Estado do Paraná, nos anos de 1993 a 2000

4.3 Intoxicações segundo as vias de contaminação

Considerando todas as causas de intoxicação, as principais vias de intoxicação, analisadas individualmente, foram: respiratória (37,2%), digestiva (35%) e cutânea (8,3%). Quando analisadas considerando suas intersecções, a respiratória continua a ser a principal via de contaminação, entretanto, o percentual de casos de intoxicações eleva-se de 37,2% para 52,14% (Tabela 5).

Tabela 5. Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, durante o período de 1993 a 2000

VIA DE CONTAMINAÇÃO	DIGESTIVA		CUTÂNEA		RESPIRATÓRIA		IGNORADA	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
DIGESTIVA	1.942	35,00%	-	-	-	-	-	-
CUTÂNEA	9	0,16%	462	8,33%	-	-	-	-
RESPIRATÓRIA	27	0,49%	801	14,44%	2.065	37,22%	-	-
IGNORADA	-	-	-	-	-	-	242	4,36%
TOTAL	1.978	35,65%	1.272	22,93%	2.893	52,15%	242	4,36%

Quando se faz o cruzamento dos dados entre as causas e vias de intoxicação, conclui-se que para as intoxicações de origem profissional, a principal via de contaminação, é a respiratória (58,3%) e suas combinações (82,2%) (Tabela 6). Quando a causa analisada é o suicídio, a via prioritária de contaminação é a digestiva (95,7%), e suas combinações (96,4%), como se pode observar na Tabela 7. Para as intoxicações originárias da causa Acidental, as vias digestiva e respiratória apresentam percentuais similares, 35,2% e 36,7% respectivamente. Neste caso, a via respiratória supera sobremaneira as demais vias, graças às suas combinações (49,7%) (Tabela 8).

Tabela 6. Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, para a causa PROFISSIONAL, durante o período de 1993 a 2000

VIA DE CONTAMINAÇÃO	DIGESTIVA		CUTÂNEA		RESPIRATÓRIA		IGNORADA	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
DIGESTIVA	56	1,90%	-	-	-	-	-	-
CUTÂNEA	3	0,10%	370	12,56%	-	-	-	-
RESPIRATÓRIA	12	0,41%	692	23,49%	1.718	58,32%	-	-
IGNORADA	-	-	-	-	-	-	95	3,22%
TOTAL	71	2,41%	1.065	36,15%	2.422	82,22%	95	3,22%

Tabela 7. Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, para a causa SUICÍDIO, durante o período de 1993 a 2000

VIA DE CONTAMINAÇÃO	DIGESTIVA		CUTÂNEA		RESPIRATÓRIA		IGNORADA	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
DIGESTIVA	1.491	95,76%	-	-	-	-	-	-
CUTÂNEA	3	0,19%	5	0,32%	-	-	-	-
RESPIRATÓRIA	7	0,45%	1	0,06%	6	0,39%	-	-
IGNORADA	-	-	-	-	-	-	44	2,83%
TOTAL	1.501	96,40%	9	0,57%	14	0,90%	44	2,83%

Tabela 8. Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por via de contaminação, para a causa ACIDENTAL, durante o período de 1993 a 2000

VIA DE CONTAMINAÇÃO	DIGESTIVA		CUTÂNEA		RESPIRATÓRIA		IGNORADA	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
DIGESTIVA	297	35,23%	-	-	-	-	-	-
CUTÂNEA	2	0,24%	78	9,25%	-	-	-	-
RESPIRATÓRIA	7	0,83%	102	12,10%	310	36,77%	-	-
IGNORADA	-	-	-	-	-	-	47	5,58%
TOTAL	306	36,30%	182	21,59%	419	49,70%	47	5,58%

4.4 Intoxicações segundo a classe dos agrotóxicos, grupos químicos e causas de intoxicação

Quando se faz um exame dos casos sob o aspecto dos produtos que causaram as intoxicações (Anexo E, Figura 7), observa-se que os agrotóxicos da classe dos inseticidas respondem pelo maior número de casos de intoxicação (37,9%), seguido pelos herbicidas (17,9%); misturas (11,3%); fungicidas (2,7%) e reguladores de crescimento (0,9%). Observe-se, que desconsiderando as categorias misturas e outros, os percentuais ficariam assim distribuídos: inseticidas, 63,7%; herbicidas, 30,2%; fungicidas, 4,6% e reguladores, 1,5%. Os percentuais de intoxicação, segundo a classe dos agentes contaminantes varia conforme o tipo de cultura explorada, como concluiu Faria et al. (2004) em levantamento realizado na região sul do país, em áreas de cultivo de frutíferas, onde a classe dos fungicidas determinou 28%, os herbicidas 16% e os inseticidas/formicidas 8%. Deve-se salientar que a classe de produtos identificada como misturas, corresponde a produtos resultantes da associação de duas ou mais substâncias agrotóxicas, onde não é possível determinar qual das classes envolvidas predomina. Outro aspecto, que deve ser relatado, diz respeito à somatória total do número de casos de intoxicação (5572 casos) ser superior a somatória de casos apontada na Tabela 4 (5548 casos). Esta diferença se justifica no fato de que alguns agrotóxicos estão registrados junto ao Ministério da Agricultura, para duas classes diferentes, como é o caso do agrotóxico Baysiston GR (nome comercial), Registro M.A. nº 5989, que apresenta registro para as classes inseticida e fungicida ao mesmo tempo (BRASIL, 1998). Diante desta característica que alguns agrotóxicos apresentam, um mesmo caso de intoxicação, foi registrado, durante a fase de seleção dos dados, em classes diferentes, daí o fato da somatória total dos casos de intoxicação apontados no Anexo E ser superior ao apontado na Tabela 4.

O item outro aparece como sendo responsável por 1.629 ocorrências (29,2%), item este, que no estudo correspondem a casos de intoxicação causados por produtos classificados como “ignorados”, ou não identificados adequadamente nas Fichas de ocorrência.

Figura 7 – Intoxicações por classes de produto, ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Numa análise mais apurada, onde se buscou avaliar quais os grupos químicos que predominaram dentro das classes de agrotóxicos estudadas (Anexo E), constatou-se que dentro da classe inseticida, o principal grupo químico responsável pelas intoxicações, foram os organofosforados (60,3%); seguido pelos carbamatos (12,6%); piretróides (8,9%); esteres do ASDC (Ácido Sulfuroso de um Diol Cíclico) (7,3%) e organoclorados (3,8%). Apesar da provável redução da área cultivada para a cultura do algodão, ocorrida no período entre os anos de 1993 e 1995, cultura onde o uso de inseticidas é

intenso, o grupo dos organofosforados foi o responsável pelo maior número de intoxicações durante todos os anos que compõe o estudo, inclusive, quando comparado aos casos de intoxicação causados pelos principais grupos químicos pertencentes às demais classes estudadas, contudo, apesar da predominância deste grupo químico, é notável o decréscimo das intoxicações causadas por este durante o período estudado (Figura 8).

Figura 8 - Evolução do número de intoxicações causadas pelos quatro principais grupos químicos, responsáveis pelas intoxicações ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

A predominância do grupo químico dos organofosforados, talvez encontre justificativa no fato dos agrotóxicos que pertencem a este grupo, serem produtos compostos por ingredientes ativos antigos, como o parathion metílico, methamidophos, malathion, entre outros, produtos comercialmente baratos e pertencentes às classes toxicológicas extremamente (classe I) e

altamente tóxicas (classe II) quando comparados a outros, compostos por ingredientes ativos de elaboração mais recente, de toxicidade mais baixa e via de regra mais caros.

O que também chama atenção na análise dos inseticidas, é a existência de casos de intoxicação resultantes do uso de organoclorados, como o BHC, Aldrin e DDT, produtos estes, que tiveram sua produção, comércio, uso e distribuição banida em 1985 por meio da Portaria Ministerial nº 329/85, sendo seu uso restringido para fins de tratamento de madeiras e em campanhas de saúde pública. No presente estudo, os inseticidas organoclorados ocuparam o 5º lugar dentre os principais grupos químicos causadores de intoxicações, sendo responsáveis por um total de 80 casos de contaminação, número este quase duas vezes maior do que as intoxicações causadas pelos fungicidas do grupo químico dos ditiocarbamatos (44 casos de intoxicação) que, atualmente, são agrotóxicos maciçamente utilizados na agricultura. Os casos de intoxicação constatados para o grupo químico dos organoclorados, se constituíram, na sua maioria (39 casos) em uso destinado ao suicídio, e os demais, através da causa accidental (21 casos), profissional (13 casos), ambiental (5 casos) e de origem ignorada (2 casos) (Anexo F). Por termo, chega-se a infeliz conclusão de que apesar das medidas proibitivas de uso destes produtos e de todo esclarecimento acerca de suas características ambientais negativas, eles ainda continuam a ser utilizados, e para os mais diversos fins. Carvalho (2000), em matéria sobre as conseqüências decorrentes do uso de agrotóxicos, relata que os organofosforados comportam-se como os principais grupos químicos causadores de intoxicações e que os organoclorados ainda são responsáveis por muitos acidentes.

Ainda em análise ao Anexo E outro aspecto que também chama a atenção é o elevado número de intoxicações causadas por agrotóxicos

pertencentes ao grupo químico dos derivados da glicina, na sua maioria agrotóxicos compostos pelo ingrediente ativo glifosato. Estes, num total de 438 ocorrências de intoxicação, representaram, dentro da classe dos herbicidas, 43,9% dos casos, número superior ao do grupo dos bupiridílios (paraquat, por exemplo). O número de casos registrados para os produtos derivados da glicina, mostrou um crescimento expressivo durante o decorrer do período estudado, tendo apresentado do início ao final do período estudado, um aumento percentual da ordem de 68,4%, motivado principalmente pelo surgimento de diversos produtos comerciais, pela eficiência do produto e pelo fácil acesso (baixo preço). Dentro do grupo químico dos fungicidas, os ditiocarbamatos foram os principais causadores de intoxicações, sendo responsáveis por 29,1% dos casos, seguidos dos triazóis (19,2%), benzimidazóis (9,9%), cúpricos (9,3%) e triazóis + organofosforados (8,6%).

Quando se analisam as causas de intoxicação sob o enfoque dos principais grupos químicos, selecionados por meio do número de ocorrências, conclui-se que, tanto para a causa profissional, suicídio e acidental, os principais agentes de intoxicação foram os inseticidas organofosforados (profissional: 543 casos; suicídio: 524 casos; acidental: 168 casos) seguido pelos herbicidas derivados da glicina (profissional: 204 casos; suicídio: 135 casos; acidental: 90). Como o terceiro e quarto grupos químicos causadores de intoxicações figuram os inseticidas carbamatos, para as causas profissional (192 casos) e acidental (41 casos), e os herbicidas bupiridílios (93 casos), para a causa do suicídio, respectivamente (Anexo F, Figura 9).

Ciciolli (2004), relatou que em estudo realizado pela Escola de Saúde Pública de Berkeley, nos Estados Unidos, demonstrou-se que o glifosato, ingrediente ativo pertencente ao grupo químico dos derivados da glicina, é o maior responsável pela maioria das doenças relativas a pesticidas em

jardineiros da Califórnia e o terceiro pesticida causador de doenças em trabalhadores agrícolas. Quevedo & Corriols (1999), estudando focos de intoxicação do tipo aguda na Nicarágua, apuraram que os inseticidas organofosforados e carbamatos e os herbicidas foram os agentes de maior importância, dentro dos 406 casos de intoxicação investigados.

Figura 9 - Principais causas e grupos químicos, responsáveis pelas intoxicações ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

No México, Duran-Nah & Colli-Quintal (2000) em um estudo epidemiológico, contendo um total de 33 casos de pacientes que sofreram intoxicações agudas, apuraram que 82% dos intoxicados eram homens, e que as intoxicações eram na sua maioria (79%) oriundas da tentativa de suicídio. Neste estudo, a causa profissional representou 21% das ocorrências, sendo os

grupos químicos dos organofosforados, carbamatos e bupiridílios, responsáveis por 33%, 27% e 18% das intoxicações, respectivamente.

Um número muito grande de trabalhos de pesquisa faz alusão aos efeitos crônicos decorrentes da exposição prolongada aos agrotóxicos, em especial, os pertencentes ao grupo químico dos organofosforados. Acredita-se que o citado grupo químico seja um potencial agente causador de distúrbios neurocomportamentais, sendo eles de ordem passageira ou permanente. Entre estes distúrbios, figuram neuropatias como a ansiedade e depressão, que podem, inclusive, redundar em casos de suicídio, naqueles indivíduos expostos ou intoxicados por agrotóxicos deste grupo, conforme relatam alguns autores (Assunção & Ribeiro, 2004; Bueno, 2004; Levigard, 2004; OPAS, 2002; Pires et al., 2005 e Trapé, 2004).

4.5 Intoxicações segundo a classe, grupo químico e vias de contaminação

A principais vias de contaminação constatadas no estudo, quando analisadas individualmente, foram a respiratória (37,2%); digestiva (34,9%) e cutânea (8,4%), sendo a somatória destas, equivalente a 80,5% do total de ocorrências notificadas no período estudado. Quando analisadas através de suas combinações, a ordem classificatória das vias de contaminação permaneceu inalterada, tendo a via respiratória representado 52% dos casos, seguido pela digestiva (35,5%) e cutânea (22,9%). Importante observar que a via cutânea + respiratória representou 14,4% dos casos, tendo superado, inclusive, a via cutânea (Anexo G).

Os inseticidas organofosforados foram os principais agentes responsáveis pelas intoxicações que ocorreram através das vias respiratória,

digestiva, cutânea e cutânea+respiratória, atribuindo a estas, a ocorrência de 413, 611, 52 e 159 casos, respectivamente. Os herbicidas derivados da glicina, se situaram como o segundo agente de intoxicações, conferindo às vias respiratória, digestiva, cutânea e cutânea+respiratória, o equivalente a 144, 172, 34 e 70 casos de intoxicação, respectivamente.

Figura 10 – Principais vias de intoxicação e grupos químicos, responsáveis pelas intoxicações ocorridas no Estado do Paraná, no período de 1993 a 2000

4.6 Intoxicações através das diferentes faixas de idade

Para se analisar em qual faixa etária ocorreram as intoxicações, foram criadas classes de idade com amplitude de 6 anos. O intuito desta segmentação reside na intenção de se isolar o grupo de indivíduos com idades entre 0 e 17 anos, faixa de idade onde, sob o aspecto legal, é proibido o

trabalho em atividades comprovadamente insalubres, como é o caso do manuseio e aplicação de agrotóxicos. Tal proibição encontra amparo legal no art. 67, incisos II e III, da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2005), bem como no art. 405, inciso I da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Tabela 9. Casos de intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por causa e faixas etárias, durante o período de 1993 a 2000

CAUSA DA INTOXICAÇÃO	CLASSE DE IDADE												TOTAL
	0 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 23	24 a 29	30 a 35	36 a 41	42 a 47	48 a 53	54 a 59	>=60	IGNORADO	
PROFISSIONAL	-	20	292	691	591	453	311	233	159	97	78	21	2.946
SUICÍDIO	1	7	196	336	259	237	177	122	75	69	64	14	1.557
ACIDENTAL	183	89	95	112	89	80	62	42	35	18	36	2	843
IGNORADO	9	1	13	25	24	13	8	8	7	8	6	1	123
ALIMENTO CONTAMINADO	15	14	4	3	3	-	-	2	2	1	1	-	45
AMBIENTAL	4	5	-	4	2	1	4	1	1	-	-	-	22
CRIMINOSA	2	-	1	1	-	4	2	1	1	-	-	-	12
TOTAL	(nº) 214	136	601	1.172	968	788	564	409	280	193	185	38	5.548
	(%) 3,9%	2,5%	10,8%	21,1%	17,4%	14,2%	10,2%	7,4%	5,0%	3,5%	3,3%	0,7%	100,0%

As faixas de idade onde ocorreu o maior número de intoxicações foram aquelas compreendidas entre as idades de 18 a 35 anos, respondendo por um percentual de 52,7% do total. Individualmente, a faixa de idades onde predominaram as ocorrências foi a compreendida entre 18 e 23 anos, tendo a somatória destas correspondido a 21,1% dos casos registrados para o período estudado (Tabela 9). Foram nestas faixas de idade onde ocorreram os maiores números de intoxicações para as causas, profissional e suicídio, durante todo o período estudado. Os Anuários do SINITOX, referentes aos anos de 1997 (FIOCRUZ, 1998) e 1999 (FIOCRUZ, 2000), relataram que a faixa de idade onde ocorreu o maior número de intoxicações foi aquela compreendida entre os 20 e 29 anos, tendo apresentado, respectivamente, 17,2% e 16,99% do total de intoxicações por agrotóxicos ocorridas no país.

Figura 11 – Distribuição das intoxicações para as causas profissional, suicídio, acidental, ignorada e alimentos contaminados, dentro das faixas de idade, ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Para a causa acidental, o maior número de ocorrências (183) se deu na faixa de idade entre 0 e 5 anos, denotando a existência de acidentes domésticos, provavelmente pelo inadequado armazenamento dos agrotóxicos. Importante ressaltar o número total de intoxicações, resultante da somatória destas três causas, ocorridas com indivíduos pertencentes a faixa entre 0 e 17 anos, que atingiu um total de 951 casos (17,2%). Tais indivíduos, pertencentes a uma faixa etária, que sabidamente, não poderiam, de modo algum ou com qualquer objetivo que fosse, estar em contato com tais produtos. Desta feita se enseja duas conclusões: menores de idade estão ingressando prematuramente nas atividades relacionadas ao uso e aplicação de agrotóxicos, e os produtos estão sendo armazenados em locais de fácil acesso, visto o sucesso obtido

pelos menores nas tentativas de suicídio (204 casos) e o número de ocorrências relacionadas à causa acidental (Tabela 9).

O presente estudo também apurou que, do total de 5.548 casos de intoxicação, 1.125 (20,2%) delas ocorreram em indivíduos do sexo feminino e 4.423 (79,8%) em indivíduos do sexo masculino. No ano de 2000 a OPAS (2002) apurou que em alguns países da América central, 70% das intoxicações ocorrem em homens. A faixa de idades onde ocorreu o maior número de intoxicações, tanto homens quanto em mulheres, foi aquela compreendida entre 18 e 23 anos, totalizando 966 e 206 casos, respectivamente.

4.7 Número de óbitos

A Tabela 10 apresenta os óbitos ocorridos, segundo a causa de intoxicação, faixas de idade e sexo das vítimas. Nela, se observa que a maioria dos casos de óbitos são oriundos da tentativa de suicídio (86 %) (Figura 13), percentual este, inclusive, próximo ao apurado pelo SINITOX (FIOCRUZ, 1998, p.21), que em levantamento realizado em todo país durante o ano de 1997, apurou um percentual de 82,5% para os casos de óbitos, decorrentes do uso de agrotóxicos. Consideradas as demais causas de intoxicação, as que apresentaram maior número de casos registrados, foram, a causa profissional (5%); ignorado (5,7%); acidental (2,6%) e criminosa (0,47%).

Tabela 10. Óbitos causados pela intoxicação por agrotóxicos no Estado do Paraná, por sexo, classe de idade e causa, durante o período de 1993 a 2000

CAUSA DA INTOXICAÇÃO	CLASSE DE IDADE																												TOTAL
	0 a 5		6 a 11		12 a 17		18 a 23		24 a 29		30 a 35		36 a 41		42 a 47		48 a 53		54 a 59		>=60		IGNORADO						
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M					
SUICÍDIO	1	-	2	-	25	15	29	59	20	61	16	60	14	54	13	39	12	29	6	37	6	40	2	4	544				
PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	1	2	5	1	6	-	5	-	2	-	3	-	2	-	5	-	-	-	-	32				
ACIDENTAL	2	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	17				
CRIMINOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3				
IGNORADO	-	1	-	-	-	1	-	4	1	7	-	5	-	2	-	3	-	3	1	3	1	4	-	-	36				
TOTAL	3	7	3	0	25	17	31	69	22	74	18	71	15	60	13	46	12	36	7	45	7	45	2	4	632

Figura 12 - Distribuição do número de óbitos entre homens e mulheres, nas diversas faixas de idade estudadas, segundo a causa suicídio, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 13 - Distribuição do número de óbitos, por causa de intoxicação para homens e mulheres, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

À semelhança do que foi apontado na Tabela 9, foi entre as faixas de idades compreendidas entre os 18 e 35 anos, onde ocorreu o maior número de óbitos (285 casos), o equivalente a um percentual de 45% em relação ao período total estudado. Analisadas individualmente, a faixa de idade onde ocorreu o maior número de óbitos foi a compreendida entre os 18 e 23 anos, apresentando um total de 100 ocorrências (15,8%), sendo 69 casos para o sexo masculino e 31, para o feminino (Figura 14). Do número total de casos de óbito (632 óbitos), 158 deles se deram em mulheres (25%) e 474 (75%), em homens. Segundo Trapé (2004), esta diferença expressiva entre o número de vítimas masculinas e femininas é decorrente do fato da cota de homens envolvidos na atividade agrícola ser superior ao das mulheres, e também por executarem tarefas onde a exposição aos produtos é maior.

Figura 14 - Distribuição do número de óbitos entre homens e mulheres, dentro das diversas faixas de idade, ocorridas no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

A OMS, através de relatório publicado em 1990, estimou que 7,3% dos casos de intoxicações causadas por agrotóxicos se convertem em óbitos (World Health Organization, 1990). No presente estudo, onde foram notificadas um total de 5.548 ocorrências de intoxicação, o percentual de casos de óbitos atingiu a cifra de 11,4%. Percentual semelhante foi obtido por Pires et al. (2005), que avaliando 1355 notificações de intoxicação, ocorridas no período de 1992 a 2002, onde constataram que a causa suicídio representou 36,9% do total de casos, tendo 27,7% destes evoluídos a óbito. O total de óbitos equivaleu a 10% do total de casos notificados no período de estudo.

A Organização Pan-americana de Saúde (2002), em levantamento realizado em alguns países da América Central, quais sejam: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panamá, constatou um

percentual de óbitos equivalente a 11%, em relação às intoxicações notificadas no ano de 2000.

4.8 Relação entre intoxicações, regiões e respectivas áreas de cultivo

Como não foi possível correlacionar as ocorrências de intoxicação às eventuais culturas onde as mesmas possam ter ocorrido, em função destas informações não estarem disponíveis no banco de dados disponibilizado pela SESA, uma das alternativas buscadas neste estudo foi relacionar as intoxicações às áreas de cultivos, aqui organizadas por meio de grupos de cultivo, que predominam nos municípios e regiões onde as intoxicações ocorreram.

Mesmo que nem todos os agrotóxicos, objetos causadores das intoxicações, estivessem condicionados ao uso expressamente agrícola, a maioria esteve sim, relacionada aos atos de aquisição, uso e armazenamento, para tal fim, como pode ser observado na Tabela 4, onde se apurou que as causas, profissional, suicídio e acidental determinaram 96,4% dos casos de intoxicação. Desta feita, o relacionamento dos casos de intoxicação às aptidões agrícolas de cada região, é uma das poucas formas de se identificar e estudar quais as regiões geográficas do Estado demandam maior atenção e análises mais profundas no que diz respeito ao comércio de agrotóxicos.

A região norte é responsável, em termos de área, pela maior atividade agrícola, ocupando 29% do total explorado. As regiões sul, oeste, centro-oeste, sudoeste e noroeste ocupam 25%, 20%, 12%, 11% e 4% da área agrícola, respectivamente (Anexo D). Em qualquer uma das seis regiões que compõe o Estado, o grupo culturas de verão foi o que deteve a maior parte das

áreas de exploração agrícola (86%), sendo sucedida pelo grupo culturas Inverno (9,0%). A exceção desta conclusão coube a região noroeste, onde o grupo outros ocupou a segunda maior área de cultivo (22,9%) provavelmente pela grande concentração de culturas relacionadas à bovinocultura de corte – pastagens e capineiras (Anexos G e H).

Foi na região norte do Estado foi onde ocorreu a maior parte das intoxicações, detendo um percentual de 43% das ocorrências totais, sendo sucedida pelas regiões sul, centro-oeste, oeste, noroeste e sudoeste, que apresentaram percentuais de 20%, 12%, 10%, 10% e 4%, respectivamente (Anexo B).

Todavia, quando se analisa o índice de intoxicações por área, aqui expresso pelo quociente: $\text{Índice} = \frac{\text{número de intoxicações}}{\text{área plantada}} \times 10.000$, a região noroeste, que ocupou apenas 4% da área cultivada no Estado, passou a ser considerada a mais preocupante, pois apontou o maior índice de intoxicações (2,39), haja vista que o índice médio apurado para o Estado foi de 1,0, ou seja, uma intoxicação anual a cada 10 mil hectares cultivados. As regiões norte e centro-oeste também apontaram índices superiores ao do Estado, tendo apresentado, 1,49 e 1,09, respectivamente (Anexo D).

Dos seis núcleos regionais que compõe a região norte, quatro deles apresentaram índice de intoxicação superiores à média inferida para o Estado: Londrina (2,23), Cornélio Procópio (1,63), Maringá (1,66) e Apucarana (1,86) (Anexo D).

Na região sul, apresentaram índices de intoxicação acima da média estadual, os núcleos de Curitiba (1,63), Irati (1,45), União da Vitória (2,31) e

Paranaguá (8,37), este último, o maior índice de todo o Estado. O N.R. Paranaguá, onde a atividade agrícola predominante é a fruticultura, e apesar desta ter ocupado, durante o período estudado, a quarta área (19.379 ha) mais extensa do grupo de cultivo frutas, dentro deste núcleo ela correspondeu a 43,9% da área agrícola total (Anexo D).

Os Núcleos Regionais de Campo Mourão, Paranavaí e Umuarama, também apresentaram índices de intoxicação acima da média estadual (Anexo D).

À exceção do N.R. Apucarana, onde prevaleceram as intoxicações motivadas pela causa suicídio, todos os núcleos cujo índice de intoxicação foi superior à média estadual, a principal causa de contaminação foi a profissional (Anexo C), tendo os inseticidas como principal agente destas intoxicações. Com exceção do N.R. Paranaguá, onde predominaram os inseticidas do grupo químico dos carbamatos, nos demais núcleos foi o grupo químico dos organofosforados que causou a maior parte das contaminações (Anexo H).

Em outra análise, onde se buscou relacionar a evolução do número de intoxicações e das áreas ocupadas pelos seis grupos de culturas estudados durante o período de estudo, concluiu-se que a do grupo culturas de verão foi o que melhor concatenou número de intoxicações e áreas (extensão) de cultivo (Figura 18). Os demais grupos de culturas estudados apresentaram relação gráfica inversa entre intoxicações e áreas de cultivo (Figuras 15, 16, 17, 18 e 19). A Figura 21, que representa a relação entre o número total de intoxicações e a área total de exploração agrícola, também não apresentou relação aparente entre estas duas variáveis, dando indícios de que as ocorrências toxicológicas não estão, pelo menos aparentemente, diretamente relacionadas à expansão ou retração das áreas cultivadas.

Figura 15 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de frutas, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 16 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de olerícolas grandes, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 17 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de olerícolas, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 18 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de verão, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 19 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de cultivos de inverno, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 20 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas de cultivo do grupo de outros cultivos, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Figura 21 - Evolução do número de casos de intoxicação e das áreas totais de grupos de cultivo, no Estado do Paraná, durante o período de 1993 a 2000

Nos grupos de cultivos olerícolas (Figura 17) e olerícolas grandes (Figura 16), onde a frequência, bem como a intensidade do uso de agrotóxicos são comprovadamente elevadas, os equipamentos de aplicação são de qualidade e estado de uso, precários e, por conseguinte, a exposição dos aplicadores a estes produtos acaba sendo maior do que nos demais grupos de cultivos analisados, não ficou evidenciado, durante os anos analisados, relação condizente entre a evolução dos números de intoxicações e respectivas áreas de exploração. Para o grupo olerícolas a relação gráfica entre as intoxicações e áreas implantadas, inclusive, foi inversa.

No grupo de cultivo frutas, à semelhança dos grupos relativos ao cultivo olerícolas, onde o uso de agrotóxicos sujeita-se a características análogas, a relação entre as variáveis intoxicação e áreas cultivadas, também foi contrária (Figura 15).

Como complemento às análises descritivas anteriores, foi feita análise de Correlação entre as variáveis “número de intoxicações” e “área cultivada” para os seis grupos de culturas. Para isto considerou-se, para cada ano estudado, todos os municípios do Estado que tenham apresentado algum caso de intoxicação, totalizando 1360 dados.

Os resultados, apresentados na Tabela 11, mostram correlações estatisticamente significativas entre as variáveis “Número de intoxicações” e as áreas cultivadas de “culturas de inverno”, “frutas”, “culturas de verão” e olerícolas, todas positivas, denotando uma relação positiva entre área cultivada e número de casos de intoxicação.

Tabela 11. Análise de correlação entre as variáveis, grupos de cultura e Intoxicações

GRUPOS	$r_{(x,y)}$	t	P	N
Culturas de Inverno	0,1357	5,05	$5,12 \cdot 10^{-7}$	1360
Frutas	0,1417	5,27	$1,54 \cdot 10^{-7}$	1360
Culturas de Verão	0,1739	6,51	$1,06 \cdot 10^{-10}$	1360
Olerícolas	0,1541	5,75	$1,11 \cdot 10^{-8}$	1360
Olerícolas Grandes	0,0018	0,07	0,94	1360
Outras	-0,0263	-0,97	0,33	1360

Uma análise de correlação não comprova a relação causa/efeito entre as variáveis, até porquê os casos de intoxicação não puderam ser identificados como oriundos de determinada cultura. O que ela mostra é a existência de um padrão, que pode ser resultante da relação causa/efeito, estatisticamente significativo entre elas.

4.9 Intoxicações segundo o local da ocorrência

O local de ocorrência rural foi onde ocorreu o maior número de intoxicações, totalizando 65% das ocorrências, no período estudado. Os locais de intoxicações denominados como outro, urbano e ignorado, apresentaram percentuais de ocorrências iguais a: 25,6%, 6,0% e 3,4%, respectivamente (Tabela 12). Os percentuais das ocorrências de intoxicações para o local rural, diferentemente dos demais locais avaliados, apresentaram durante o decorrer dos anos estudados, pequenas oscilações percentuais, conforme pode ser observado na Figura 22.

No que tange ao local de ocorrência das intoxicações, o Anuário SINITOX (FIOCRUZ, 2000), que considera apenas três zonas: urbana, rural e ignorada, relatou percentuais distintos daqueles obtidos neste trabalho. Neste, a zona rural apresentou 42,5% das intoxicações, enquanto a urbana, 54,5%.

Cabe aqui, observar que à época da coleta das informações que compõe o banco de dados empregado neste estudo, o Sistema de saúde do Paraná utilizava duas fichas distintas na coleta das informações referentes às ocorrências. Em uma delas, a Ficha Epidemiológica de Ocorrência Toxicológica (Apêndice 1), as informações sobre o local de ocorrência eram armazenadas em seu campo de nº 14, onde, neste, havia cinco opções de preenchimento, quais sejam: urbana, rural, trabalho, residência e outro. Considerando que na ocasião do preenchimento, o funcionário deveria anotar o local genérico (urbano ou rural) da ocorrência e o específico (se residência, trabalho ou outro), devido à falta de divisão física do citado campo, e obviamente pela falta de preparo de alguns que executavam esta tarefa, todos os locais se referiam a locais genéricos, além daqueles já relatados, como por exemplo: lazer, escola, lavoura, entre outros. Com isto, muitas ocorrências, que provavelmente,

aconteceram em ambientes rurais ou urbanos, foram agrupadas em outros lugares, aumentando sobremaneira o número de locais de ocorrência, e conseqüentemente comprometendo a análise segundo esta variável.

Tabela 12. Número de intoxicações segundo o local de ocorrência, durante o período de 1993 a 2000

Local	Ano								TOTAL
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
RURAL	626	565	496	396	444	382	324	373	3.606
OUTRO	398	352	121	122	145	62	131	90	1.421
URBANO	9	-	90	55	32	57	25	63	331
IGNORADO	7	-	33	22	17	48	43	20	190
TOTAL	1.040	917	740	595	638	549	523	546	5.548

Figura 22 - Evolução dos percentuais de intoxicação, segundo o local de ocorrência, durante o período de 1993 a 2000

Na Tabela 13, onde as intoxicações foram analisadas segundo o cruzamento das informações relativas a local de ocorrência e causa de contaminação, observa-se que a maioria das ocorrências referentes ao local rural tiveram cunho profissional (72%), seguida das causas suicídio (15%) e acidental (10%), enquanto que os percentuais referentes às demais causas, somados não totalizaram 2% (Tabela 13).

Duran-Nah & Colli-Quintal (2000) num estudo epidemiológico realizado no México apuraram que 70% dos casos estudados pertenciam ao meio rural, apesar das intoxicações, na sua maioria suicídios, não estarem relacionadas à prática da atividade agrícola.

Tabela 13. Número total de intoxicações segundo as causas de contaminação e locais de ocorrência, para o período de 1993 a 2000

Local	Causa de Contaminação							TOTAL
	Profissional	Suicídio	Acidental	Ignorado	Alimento Contaminado	Ambiental	Criminosa	
RURAL	2.609	557	370	47	13	5	5	3.606
OUTRO	232	744	361	37	29	12	6	1.421
URBANO	79	151	77	16	2	5	1	331
IGNORADO	26	105	35	23	1	-	-	190
TOTAL	2.946	1.557	843	123	45	22	12	5.548

Já para o local denominado como outro, local este onde foram agrupadas intoxicações ocorridas em residência, e que, face a ausência de informações oferecidas pelo banco de dados não foi possível precisar se o local estava circunscrito ao ambiente urbano ou rural, a maioria das ocorrências, teve no Suicídio a principal causa, tendo conferido a esta o percentual de 52%. Para

este mesmo local, as causas acidental e profissional apresentaram percentuais de ocorrência iguais a 25% e 16%, respectivamente. No local urbano também predominaram as intoxicações motivadas pela causa suicídio (46%), seguidas pela causa profissional (24%) e acidental (23%) (Tabela 13).

Em análise às principais causas de contaminação, a causa profissional atingiu sua maior expressão no local rural, inferindo a esta o percentual de 89%. Já a causa acidental, apresentou percentuais de ocorrências de intoxicação semelhantes, tanto para os locais rural (44%), como o local outro (43%). Para a causa suicídio, as intoxicações predominaram no local outro (48%), seguido do rural (36%) (Tabela 13).

Em efeito, fica patente que as intoxicações decorrentes da atividade trabalhista, ocorrem, preferencialmente no ambiente rural, local este, onde a priori, os agrotóxicos tem sua utilização consumada. Nas intoxicações cuja motivação tiveram como causa a intenção do suicídio, aconteceram principalmente no ambiente residencial, que neste estudo está relacionado ao local outro, e também no ambiente rural, onde o acesso aos agrotóxicos é facilitado.

Na análise dos locais, tendo em vista as vias de contaminação, concluiu-se que para as intoxicações ocorridas no ambiente rural, a principal via de contaminação foi a respiratória (47%), enquanto que àquelas referentes ao ambiente outro (onde estão inclusas intoxicações sofridas em residências), predominou a via digestiva (67%) (Tabela 14), que este estudo provou serem procedentes da prática do suicídio (76,6%) (Tabela 7). No urbano, à semelhança do ocorrido no ambiente denominado como ignorado, a via digestiva figurou como o principal meio das intoxicações relatadas, tendo sido aferido para estas, 56% e 57% (Tabela 14), onde provavelmente estejam

contidas intoxicações ocorridas no ambiente residencial, porém não declaradas a ponto de serem registradas nas fichas de notificação.

Tabela 14. Número de intoxicações segundo o local de ocorrência e via de contaminação, durante o período de 1993 a 2000

Local	Via de Contaminação							TOTAL
	Respiratória	Digestiva	Cutânea + Respiratória	Cutânea	Ignorada	Digestiva + Respiratória	Digestiva + Cutânea	
RURAL	1.710	698	681	392	99	20	6	3.606
OUTRO	284	950	73	47	60	4	3	1.421
URBANO	66	186	42	20	14	3	-	331
IGNORADO	5	108	5	3	69	-	-	190
TOTAL	2.065	1.942	801	462	242	27	9	5.548

4.10 Intoxicações segundo a ocupação

No presente estudo, as ocupações foram agrupadas segundo a natureza da atividade, de modo a minimizar o número de itens para análise, em sendo assim, foram criados quatro ocupações: agricultor (composto por indivíduos relacionados à atividade agrícola, tais como: agricultores, proprietários, arrendatários, bóias-frias, etc.), estudante, doméstica e outra (composta por ocupações que não se enquadram nas ocupações anteriores).

Foi na ocupação agricultor onde ocorreu o maior número de intoxicações (3504 casos), num equivalente percentual de 63% (Tabela 15). E tais intoxicações ocorreram na sua quase totalidade, no ambiente rural (89%) (Tabela 15). A ocupação outra totalizou 32% dos casos de intoxicação notificados, e se deram no local aqui denominado como outro. As intoxicações

ocorridas em indivíduos cuja ocupação foi registrada como sendo doméstica, representaram 208 casos e aconteceram, na sua maioria (138 casos), no local outro, que neste estudo, agrupou notificações ocorridas em residências (Tabela 15). A ocupação estudante, que no total, expressou um número de 86 intoxicações, o equivalente a 2% dos casos, se deu principalmente nos locais outro (50%) e rural (31%), sendo que os casos ocorridos neste último ambiente, denotam a presença de indivíduos, ainda na idade jovem, envolvidos em funções relacionadas à atividades agrícolas (Tabela 15).

Tabela 15. Número de intoxicações segundo o local de ocorrência e a ocupação dos intoxicados

Ocupação	Local				TOTAL
	Rural	Outro	Urbano	Ignorado	
AGRICULTOR	3.122	308	66	8	3.504
OUTRA	423	932	226	169	1.750
DOMÉSTICA	34	138	26	10	208
ESTUDANTE	27	43	13	3	86
TOTAL	3.606	1.421	331	190	5.548

4.11 Intoxicações nas regiões e núcleos regionais, segundo a classe e respectivos grupos químicos dos agrotóxicos

Cada uma das seis regiões estudadas apresentaram provavelmente em função das características agrícolas locais, tais como culturas predominantes e respectivas extensões das áreas cultivadas (Anexo D), quadros de intoxicação particularizados, resultantes da exposição a diferentes classes e grupos químicos. Todavia, os agrotóxicos da classe Inseticida

produziram intoxicações com maior intensidade, atingindo o número de 2.113 casos (37,9%), sendo acompanhado pelos herbicidas (997 casos), fungicidas (151 casos) e reguladores (51 casos) (Tabela 16). As misturas, resultante da mescla de agrotóxicos pertencentes a diferentes classes, representaram 11,3% dos casos notificados (Anexo E).

Num total de 2.400 ocorrências, o equivalente a 43,1% do total registrado para o período estudado, foi na região norte em que se deu o maior número de intoxicações. Ainda para esta mesma região, cabe observar que a mesma apresentou o maior número de intoxicações em qualquer uma das classes de agrotóxicos avaliadas. As regiões sul, centro-oeste, oeste, noroeste e sudoeste apresentaram percentuais, em relação ao total de casos apurados, iguais a 20,4%, 12,1%, 10,3%, 10% e 4,1%, respectivamente (Tabela 16).

A exceção da região sudoeste, onde predominaram os agrotóxicos da classe herbicidas, nas demais regiões foi por intermédio dos Inseticidas que ocorreram o maior número de intoxicações. Na região sudoeste os herbicidas causaram 43,3% das ocorrências, tendo como principal responsável pelas mesmas, aqueles pertencentes ao grupo químico dos derivados da glicina, que representaram 17,3% do total das intoxicações registradas nesta região. Das intoxicações ocorridas nas regiões norte, sul, centro-oeste e noroeste, predominaram absolutos os inseticidas, determinando a estas percentuais de intoxicação iguais a: 42,5%, 23,9%, 43,8%, 33,7% e 49,6%, respectivamente. Em qualquer uma destas cinco regiões, foi o grupo químico dos organofosforados o principal causador das ocorrências registradas (Tabela 16).

Dentro da classe dos Inseticidas, foi no N.R. Campo Mourão onde ocorreu o maior percentual de intoxicações, totalizando 14,0% dos casos

registrados no Estado. Dos cinco principais grupos químicos avaliados nesta classe, o N.R. Londrina apresentou os maiores percentuais de intoxicação em três deles: carbamatos (15,8%), piretróides (20,2%) e organoclorados (25,0%). O grupo químico dos organofosforados atingiu seu maior percentual (14,4%) no N.R. Cornélio Procópio. Já os inseticidas pertencentes ao grupo químico dos esteres do ASDC, apresentaram seu percentual mais elevado (27,1%) no N.R. Campo Mourão (Anexo H).

Na categoria dos herbicidas, o maior número de intoxicações, 145 casos, se deu no N.R. Londrina, o equivalente a 14,5% do total de ocorrências. Neste mesmo núcleo também se deram os maiores percentuais de intoxicação para os herbicidas dos grupos químicos dos derivados da glicina (20,1%) e fenoxiacéticos (20,0%). Já os grupos dos bipiridílios, dinitroanilinas, e fenoxiacéticos + derivados do ácido picolínico, apresentaram os mais elevados percentuais nos núcleos regionais de Pato Branco (16,6%), Campo Mourão (20,3%) e Cascavel (35,7%), respectivamente (Anexo H).

Dos cinco grupos químicos relacionados na classe dos fungicidas, o N.R. Londrina apresentou os maiores percentuais em quatro deles: triazóis (17,2%), benzimidazóis (20,0%), cúpricos (21,4%) e triazóis + organofosforados (53,8%). O N.R. Cornélio Procópio apresentou percentuais idênticos para o grupo dos triazóis e benzimidazóis. Os grupo dos ditiocarbamatos expressou seu maior percentual no N.R. União da Vitória (25,0%). No cômputo geral, o maior número de intoxicações originadas pelos fungicidas se deu no N.R. Londrina, totalizando 31 casos (Tabela 17).

Para a categoria dos reguladores de crescimento, o N.R. Curitiba deteve o maior número de intoxicações (11 casos), o equivalente a 21,6% em relação ao apresentado pelos demais núcleos, como também apresentou o

maior percentual com relação ao grupo químico das dinitroanilinas (45,8%). O grupo das cianamidas encontrou seu maior percentual (37,0%) nos núcleos regionais de Cornélio Procópio e Maringá (Anexo H).

O N.R. Campo Mourão apresentou o maior percentual de intoxicação na classe denominada outro. As intoxicações originadas através da exposição às misturas ocorreram em maior proporção no N.R. União da Vitória, atingindo 21,2% do total de casos (Anexo H).

Tabela 16. Número de intoxicações por regiões, segundo a classe e principais grupos químicos de agrotóxicos, ocorridas durante o período de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	REGIÕES						TOTAL
	Norte	Sul	Centro Oeste	Oeste	Noroeste	Sudoeste	
INSETICIDA	1.019	271	296	193	277	57	2.113
ORGANOFOSFORADO	603	179	173	141	136	43	1.275
CARBAMATO	135	48	33	18	29	3	266
PIRETOIDE	89	16	26	15	39	3	188
ESTER DO ASDC	66	0	42	8	38	1	155
ORGANOCLORADO	48	8	1	4	17	2	80
HERBICIDA	408	250	67	124	48	100	997
DERIVADO DA GLICINA	223	78	24	51	22	40	438
BIPIRIDILIOS	60	95	10	17	2	39	223
DINITROANILINAS	27	16	15	8	5	3	74
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	22	5	2	27	9	5	70
FENOXIACETICO	17	8	4	8	0	3	40
FUNGICIDA	88	36	11	5	7	4	151
DITIOCARBAMATO	16	26	1	0	0	1	44
TRIAZOIS	17	1	5	2	3	1	29
BENZIMIDAZOL	10	0	1	2	0	2	15
CUPRICO	9	2	1	0	2	0	14
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	11	0	1	0	1	0	13
REGULADORES	27	21	0	0	0	3	51
CIANAMIDA	27	0	0	0	0	0	27
DINITROANILINAS	0	21	0	0	0	3	24
MISTURAS	205	205	63	81	61	16	631
OUTROS	653	352	239	169	165	51	1.629
TOTAL	2.400	1.135	676	572	558	231	5.572

4.11.1 Região norte

Foi na região norte, composta pelos núcleos regionais de Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, Apucarana, Ivaiporã e Jacarezinho, onde ocorreram 2.400 intoxicações (Tabela 17), o equivalente a 43,1% dos casos notificados para todo o Estado durante o período estudado (Anexo H).

Tabela 17. Número de intoxicações entre os núcleos regionais da região norte, por classe e principais grupos químicos ocorridas durante o período de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	NÚCLEOS REGIONAIS						TOTAL
	Londrina	Cornélio Procópio	Maringá	Apucarana	Ivaiporã	Jacarezinho	
INSETICIDA	293	280	204	98	79	65	1.019
ORGANOFOSFORADO	139	184	118	64	59	39	603
CARBAMATO	42	37	31	16	2	7	135
PIRETOIDE	38	22	17	1	4	7	89
ESTER DO ASDC	11	21	16	3	10	5	66
ORGANOCOLORADO	20	8	11	7	2	-	48
HERBICIDA	145	55	72	39	55	42	408
DERIVADO DA GLICINA	88	26	43	29	14	23	223
BIPIRIDILIOS	20	-	4	3	28	5	60
DINITROANILINAS	5	7	11	3	1	-	27
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	11	5	3	-	-	3	22
FENOXIACETICO	8	5	3	-	1	-	17
FUNGICIDA	31	23	11	9	4	10	88
DITIOCARBAMATO	4	5	4	1	1	1	16
TRIAZOIS	5	5	2	3	-	2	17
BENZIMIDAZOL	3	3	-	2	2	-	10
CUPRICO	3	1	1	1	1	2	9
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	7	1	-	-	-	3	11
REGULADORES	7	10	10	-	-	-	27
CIANAMIDA	7	10	10	-	-	-	27
DINITROANILINAS	-	-	-	-	-	-	0
MISTURAS	64	53	49	8	20	11	205
OUTROS	154	162	148	85	61	43	653
TOTAL	694	583	494	239	219	171	2.400

Dentre os núcleos que compõe tal região, foi o núcleo regional de Londrina que apresentou o maior número de intoxicações, num total de 694 casos (28,9%), representando o equivalente a 12,5% (Anexo H) das intoxicações ocorridas em todo o Estado, durante o período estudado. Os núcleos regionais de Cornélio Procópio, Maringá, Apucarana, Ivaiporã e

Jacarezinho apresentaram percentuais de intoxicação iguais a 24,3%, 20,6%, 10%, 9,1% e 7,1%, respectivamente (Anexo H).

Como se observa claramente na Figura 23, nesta região a maior parte das intoxicações aconteceu através da exposição a inseticidas (42,5%), enquanto que a classe dos herbicidas, fungicidas e reguladores, inferiu, respectivamente, percentuais de 17%, 3,7% e 1,1%, do total de casos notificados (Anexo H).

Figura 23 - Número de intoxicações nos núcleos regionais da região norte, segundo a classe dos agrotóxicos, durante o período de 1993 a 2000

Foram 17 os grupos químicos considerados como principais e relacionados no estudo, pois através destes se consumaram 53% das intoxicações ocorridas no período estudado. Em dez destes grupos químicos (carbamatos, piretróides, organoclorados, derivados da glicina, fenoxiacético +

derivados do ácido picolínico, fenoxiacético, triazóis, benzimidazóis, cúpricos e triazóis + organofosforados) o núcleo regional de Londrina deteve os maiores percentuais de intoxicações, quando comparado aos percentuais apresentados pelos mesmos grupos, nos demais núcleos regionais que compõe a região norte. O núcleo regional de Cornélio Procopio também obteve posição de destaque, tendo apresentado os maiores percentuais de intoxicação em 6 dos grupos químicos relacionados no estudo (organofosforados, éster do ASDC, ditiocarbamatos, triazóis, benzimidazóis e cianamida) (Anexo H).

No Anexo H pode-se observar que em todos os seis núcleos regionais analisados, os inseticidas pertencentes ao grupo químico dos organofosforados foram os principais responsáveis pela maioria das intoxicações, chegando a atingir índices bastante elevados, como foi o caso do N.R. Ivaiporã (74,7%).

Importante observar que as intoxicações causadas por inseticidas pertencentes ao grupo químico dos organoclorados (Aldrin e BHC, na sua grande maioria), tiveram sua maior expressão no N.R. Londrina, onde representaram percentual de 41,7% em relação aos outros núcleos da região norte, e 25% dos casos, quando comparado aos demais núcleos que compõe o quadro geral do Estado (Anexo H).

Chamou também a atenção a ocorrência do elevado número de intoxicações causadas pelos herbicidas pertencentes ao grupo químico dos bipyridílios (paraquat) no N.R. Ivaiporã, na sua quase totalidade tendo como causa a atividade profissional. Neste mesmo núcleo, o citado grupo químico atingiu o percentual de 46,7% (Anexo H) em relação ao total deste grupo na região norte, e 12,6% em relação ao total do Estado, sendo superado apenas pelo N.R. de Pato Branco, que apresentou percentual global de 16,6%.

A classe dos herbicidas teve como principal causador de intoxicação o grupo químico dos derivados da glicina (54,7%), seguido pelos bupiridílios (14,7%), dinitroanilinas (6,6%), fenoxiacético + derivados do ácido picolínico (5,4%) e fenoxiacéticos (4,2%) (Anexo H). À exceção do N.R. Ivaiporã, como foi dito anteriormente, nos demais núcleos regionais houve o prevalecimento dos derivados da glicina como principais agentes intoxicantes. Importante observar aqui, o ocorrido no N.R. Apucarana, onde as ocorrências relacionadas a este grupo químico atingiram o percentual de 74,4%. Para se ter uma noção da dimensão deste evento, este foi o maior percentual de intoxicação obtido por um herbicida em qualquer das regiões avaliadas, durante o período estudado.

Na classe dos fungicidas, prevaleceram as intoxicações causadas pelos triazóis (19,3%). Já os reguladores de crescimento inferiram o percentual de intoxicação igual a 1,1%, sendo as cianamidas, o único grupo químico responsável pelas ocorrências (Anexo H).

4.11.2 Região sul

De modo análogo ao ocorrido na região norte, os percentuais de intoxicação, segundo a variável classe do agrotóxico, obedeceram ao mesmo ordenamento, porém em proporções diferentes. Nesta região, os inseticidas apresentaram percentual de 23,9%, enquanto que os herbicidas, 22%. Os fungicidas e reguladores, apresentaram, respectivamente, percentuais de 3,2 e 1,9 em relação ao total de casos notificados para a região (Tabela 18).

Dentro da classe dos inseticidas, os organofosforados foram os maiores responsáveis pelas intoxicações, inferindo a estes o percentual de 66,1% dos casos. Na classe dos herbicidas, o grupo químico dos bupiridílios foi

o principal causador de intoxicações (38% dos casos), diferenciando assim, do observado nas demais regiões componentes do Estado do Paraná (Anexo H), onde os herbicidas do grupo químico dos derivados da glicina predominaram. Dentro da classe dos fungicidas, o grupo químico dos ditiocarbamatos preponderou sobremaneira em relação aos demais grupos, tendo causado 72,2% das intoxicações (Tabela 18).

Tabela 18. Número de intoxicações entre os núcleos regionais da região sul, por classe e principais grupos químicos ocorridas durante o período de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	NÚCLEOS REGIONAIS							TOTAL
	Curitiba	Irati	União da Vitória	Ponta Grossa	Guarapuava	Laranjeiras do Sul	Paranaguá	
INSETICIDA	83	86	22	40	22	9	9	271
ORGANOFOSFORADO	66	46	16	29	15	3	4	179
CARBAMATO	6	25	2	5	4	1	5	48
PIRETOIDE	5	6	1	3	-	1	-	16
ESTER DO ASDC	-	-	-	-	-	-	-	0
ORGANOCOLORADO	3	-	1	2	1	1	-	8
HERBICIDA	65	44	27	28	40	39	7	250
DERIVADO DA GLICINA	21	15	7	9	7	15	4	78
BIPIRIDILIOS	26	13	9	14	21	11	1	95
DINITROANILINAS	4	6	5	1	-	-	-	16
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	1	-	-	1	-	3	-	5
FENOXIACETICO	4	1	-	-	-	2	1	8
FUNGICIDA	13	3	11	-	4	1	4	36
DITIOCARBAMATO	8	2	11	-	-	1	4	26
TRIAZOIS	-	-	-	-	1	-	-	1
BENZIMIDAZOL	-	-	-	-	-	-	-	0
CUPRICO	1	1	-	-	-	-	-	2
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	-	-	-	-	-	-	-	0
REGULADORES	11	8	1	-	-	1	-	21
CIANAMIDA	-	-	-	-	-	-	-	0
DINITROANILINAS	11	8	1	-	-	1	-	21
MISTURAS	25	21	134	9	7	6	3	205
OUTROS	129	64	31	51	39	24	14	352
TOTAL	326	226	226	128	112	80	37	1.135

O predomínio dos inseticidas, como principal agente de intoxicação, ocorreu nos núcleos regionais de Curitiba, Irati, Ponta Grossa e Paranaguá, ao passo que nos núcleos regionais de União da Vitória, Guarapuava e Laranjeiras

do Sul, a classe dos herbicidas prevaleceu como o principal agente de intoxicações (Tabela 18).

Nesta região, o N.R. Curitiba foi o que apresentou o maior número de intoxicações (326 casos), o equivalente a 28,6% do total de intoxicações da região sul, enquanto que o N.R. Paranaguá, apresentou o menor percentual (3,5%).

Aspecto interessante ocorreu no N.R. União da Vitória, que apresentou o maior percentual de intoxicação na classe misturas, o equivalente a 21,2% do total de ocorrências registradas para esta classe em todo o Estado (Anexo H). Nesta classe, este regional exibiu um percentual de 59,3% em relação às demais classes avaliadas (Anexo H) e 65,4% quando confrontado com os demais núcleos que compõe a região sul (Tabela 18).

4.11.3 Região centro-oeste

Esta região, composta apenas pelo N.R. Campo Mourão apresentou o segundo maior número de intoxicações do Estado, num total de 676 ocorrências (12,1%) (Tabela 19, Anexo H). Nesta, os agrotóxicos pertencentes à classe dos inseticidas predominaram como os maiores agentes intoxicantes, conferindo a estes o percentual de 43,8% em relação às demais classes avaliadas.

Tabela 19. Número de intoxicações entre os núcleos regionais das regiões centro-oeste e oeste, por classe e principais grupos químicos ocorridas durante o período de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	REGIÃO CENTRO-OESTE		REGIÃO OESTE		
	Campo Mourão	TOTAL	Cascavel	Toledo	TOTAL
INSETICIDA	296	296	111	82	193
ORGANOFOSFORADO	173	173	85	56	141
CARBAMATO	33	33	7	11	18
PIRETOIDE	26	26	8	7	15
ESTER DO ASDC	42	42	5	3	8
ORGANOCLORADO	1	1	1	3	4
HERBICIDA	67	67	96	28	124
DERIVADO DA GLICINA	24	24	39	12	51
BIPIRIDILIOS	10	10	12	5	17
DINITROANILINAS	15	15	6	2	8
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	2	2	25	2	27
FENOXIACETICO	4	4	6	2	8
FUNGICIDA	11	11	2	3	5
DITIOCARBAMATO	1	1	-	-	0
TRIAZOIS	5	5	-	2	2
BENZIMIDAZOL	1	1	2	-	2
CUPRICO	1	1	-	-	0
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	1	1	-	-	0
REGULADORES	-	-	-	-	0
CIANAMIDA	-	-	-	-	0
DINITROANILINAS	-	-	-	-	0
MISTURAS	63	63	36	45	81
OUTROS	239	239	112	57	169
TOTAL	676	676	357	215	572

As classes dos herbicidas e fungicidas apresentaram percentuais de intoxicação iguais a 9,9% e 1,6%, respectivamente. Nesta região não ocorreram intoxicações resultantes da exposição a reguladores de crescimento.

Na classe dos inseticidas houve o predomínio de intoxicações decorrentes do uso de organofosforados (58,4%), enquanto na dos herbicidas prevaleceu os derivados da glicina (35,8%). Já na classe dos fungicidas, os agrotóxicos pertencentes ao grupo químico dos triazóis foram os principais agentes intoxicantes, inferindo a estes o percentual de 45,5% em relação aos demais fungicidas avaliados.

4.11.4 Região oeste

A região oeste respondeu por 10,3% do total de intoxicações ocorridas no Estado durante o período referente ao presente estudo (Anexo H). Nesta, a maioria das intoxicações foi resultante da exposição a agrotóxicos da classe inseticida (33,7%), em especial aos organofosforados, que representaram 73,1% dos casos notificados (Tabela 19). Os herbicidas representaram 21,7% dos casos de intoxicação, tendo sido os produtos pertencentes ao grupo químico dos derivados da glicina os principais responsáveis pelo maior percentual de intoxicações (41,1%). Nesta região do Estado os fungicidas foram responsáveis por apenas 0,9% dos casos de intoxicação; saliente-se que para a classe dos fungicidas, este percentual foi o menor dentre os obtidos nas demais regiões estudadas. À semelhança do ocorrido na região centro-oeste, nesta região do estado também não foram registrados casos de intoxicação pela exposição a reguladores de crescimento.

4.11.5 Região noroeste

A região noroeste representou 10% dos casos de intoxicação notificados para o Estado (Anexo H). Nesta, os inseticidas foram os principais causadores de intoxicação, representando 49,6% dos casos, enquanto que os herbicidas representaram 8,6% e os fungicidas 1,3% (Tabela 20). De modo análogo ao ocorrido nas regiões oeste e centro-oeste, também não foram registradas intoxicações decorrentes da exposição a reguladores de crescimento.

Os inseticidas organofosforados, herbicidas derivados da glicina e fungicidas triazóis foram os grupos químicos onde figuraram os maiores percentuais de intoxicação, em suas respectivas classes.

Tabela 20. Número de intoxicações entre os núcleos regionais das regiões noroeste e sudoeste, por classe e principais grupos químicos, ocorridas durante o período de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	REGIÃO NOROESTE			REGIÃO SUDOESTE		
	Paranavaí	Umuarama	TOTAL	Pato Branco	Francisco Beltrão	TOTAL
INSETICIDA	151	126	277	30	27	57
ORGANOFOSFORADO	77	59	136	22	21	43
CARBAMATO	18	11	29	2	1	3
PIRETOIDE	20	19	39	2	1	3
ESTER DO ASDC	17	21	38	-	1	1
ORGANOCLORADO	8	9	17	2	-	2
HERBICIDA	31	17	48	85	15	100
DERIVADO DA GLICINA	15	7	22	33	7	40
BIPIRIDILIOS	1	1	2	37	2	39
DINITROANILINAS	3	2	5	1	2	3
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	5	4	9	4	1	5
FENOXIACETICO	-	-	0	2	1	3
FUNGICIDA	3	4	7	4	-	4
DITIOCARBAMATO	-	-	0	1	-	1
TRIAZOIS	1	2	3	1	-	1
BENZIMIDAZOL	-	-	0	2	-	2
CUPRICO	1	1	2	-	-	0
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	-	1	1	-	-	0
REGULADORES	-	-	0	1	2	3
CIANAMIDA	-	-	0	-	-	0
DINITROANILINAS	-	-	0	1	2	3
MISTURAS	22	39	61	15	1	16
OUTROS	90	75	165	27	24	51
TOTAL	297	261	558	162	69	231

4.11.6 Região sudoeste

As intoxicações ocorridas na região sudoeste foram responsáveis por 4,1% do total apurado para o Estado do Paraná, portanto, o menor percentual dentre as regiões (Anexo H). Nesta, diferente das demais estudadas, a classe dos inseticidas, que atingiu 24,7% dos casos, não acumulou o maior percentual de intoxicações, este atributo coube à classe dos herbicidas, que redundou em

43,3% das intoxicações ocorridas, tendo tais intoxicações se concentrado nos grupos químicos referentes aos derivados da glicina e bipiridílios, que inferiram, dentro desta classe de agrotóxicos, percentuais iguais a 40% e 39%, respectivamente (Anexo H). Os fungicidas e reguladores foram responsáveis por 1,7% e 1,3% dos casos, respectivamente. Importante salientar que os núcleos regionais que compõe esta região, a saber, Pato Branco e Francisco Beltrão, apresentaram comportamento distinto quanto a distribuição dos casos de intoxicação entre as classes de agrotóxicos estudadas. No N.R. Pato Branco a maioria das intoxicações se concentrou na classe dos herbicidas (52,5%), em especial os do grupo dos bipiridílios (43,5%), ao passo que no N.R. Francisco Beltrão o maior número de intoxicações se deu principalmente na classe dos inseticidas (39,1%), mais precisamente no grupo dos organofosforados (77,8%). Este comportamento díspar pode ser claramente observado na Figura 24.

Figura 24 - Percentual das intoxicações segundo a classe dos agrotóxicos, na região sudoeste, durante o período de 1993 a 2000

4.12 Óbitos segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos, dentro das regiões e núcleos regionais

As ocorrências de intoxicação que se consumaram em casos de óbito tiveram, durante o decorrer do período analisado, uma evolução semelhante àquela apresentada para o total de casos de intoxicação, como se pode observar na Figura 25. No ano de 1993 foi quando ocorreu o maior número de óbitos, 106 casos (16,8%), enquanto que o menor número (62 casos) ocorreu no ano de 1998 (Tabela 21).

Figura 25 - Evolução dos casos de intoxicação e óbito, durante os anos de 1993 a 2000

A maior parte dos óbitos teve como agente causador os Inseticidas (42,2%), enquanto que os herbicidas foram responsáveis por 16,8% dos casos, os fungicidas 0,3% e os reguladores de crescimento 0,5% (Tabela 21).

Desconsiderando as categorias misturas e outros, ter-se-ia os óbitos sido causados por inseticidas, herbicidas, fungicidas e reguladores nas proporções respectivas de 70,6%, 28,0%, 0,5% e 0,8%. Em todos os anos avaliados, os Inseticidas prevaleceram em relação às demais classes de agrotóxicos, como o principal agente responsável pelos óbitos, tendo sido os inseticidas organofosforados o principal grupo químico, em qualquer dos anos estudados (Tabela 21). Os organofosforados foram responsáveis, dentro da classe dos inseticidas, por 77,2% dos óbitos ocorridos. Já na classe dos herbicidas, predominaram os óbitos decorrentes do uso dos bupiridílios (62,3%), ficando os herbicidas pertencentes ao grupo químico dos derivados da glicina relegados ao segundo lugar. A categoria outros foi responsável por um total de 230 casos, o equivalente a 36,4% do total de óbitos apurados para o período analisado.

Dos 632 óbitos registrados no período estudado, a maior parte se deu na região norte (37%). As regiões sul, centro-oeste, oeste, noroeste e sudoeste apresentaram, respectivamente, percentuais iguais a 22%, 17%, 10%, 9% e 6%, com relação ao total apurado para o Estado (Anexo I).

Os Núcleos Regionais de Campo Mourão, Cornélio Procopio, Ivaiporã, Cascavel e Guarapuava, tendo apresentado, respectivamente, número de óbitos iguais a 105, 78, 57, 38 e 37, representaram, em relação ao total de casos registrados no Estado, percentual equivalente a 49,8% (Anexo I). Com exceção do N.R. Guarapuava, onde prevaleceram os óbitos relacionados aos agrotóxicos da classe herbicida (bupiridílios, em especial), nos demais predominaram os óbitos determinados pelo uso de agrotóxicos Inseticidas, sendo que em todos houve o predomínio do grupo químico dos organofosforados.

Tabela 21. Número de óbitos, segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos, ocorridos durante os anos de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	ANO								TOTAL
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
INSETICIDA	32	41	36	35	31	26	40	26	267
ORGANOFOSFORADO	19	30	24	30	24	24	32	23	206
CARBAMATO	-	3	3	-	-	1	1	-	8
PIRETOIDE	1	-	3	-	1	-	-	-	5
ESTER DO ASDC	8	6	5	4	4	1	5	3	36
ORGANOCLORADO	2	-	-	1	1	-	1	-	5
HERBICIDA	11	11	16	17	12	11	13	15	106
DERIVADO DA GLICINA	-	2	2	2	2	1	3	4	16
BIPIRIDÍLIOS	10	8	12	12	8	4	3	9	66
DINITROANILINAS	-	1	-	2	1	1	1	-	6
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	-	-	-	-	1	5	2	1	9
FENOXIACETICO	-	-	-	-	-	-	1	-	1
FUNGICIDA	-	1	-	1	-	-	-	-	2
DITIOCARBAMATO	-	1	-	-	-	-	-	-	1
TRIAZOIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENZIMIDAZOL	-	-	-	1	-	-	-	-	1
CUPRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGULADORES	-	-	1	-	1	-	1	-	3
CIANAMIDA	-	-	1	-	1	-	-	-	2
DINITROANILINAS	-	-	-	-	-	-	1	-	1
MISTURAS	3	3	5	5	3	-	2	3	24
OUTROS	60	40	26	20	19	25	12	28	230
TOTAL	106	96	84	78	66	62	68	72	632

4.13 Óbitos segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos, entre as classes de idade e sexo

Quando a classe analisada foi a inseticida, com exceção das classes de idade, 6 a 11 anos e ignorado, nas demais classes houve o predomínio dos organofosforados como principal agente causador de óbitos, tendo este grupo químico vitimado 55 mulheres e 151 homens. Já na classe dos herbicidas prevaleceram os agrotóxicos do grupo dos bipiridílios, que causaram a morte de 13 mulheres e 53 homens. O grupo químico do organofosforados causou o maior número de mortes na classe de idade compreendida entre 18 e 23 anos, já os bipiridílios, na faixa de idade entre 30 e 35 anos. Tais grupos causaram,

nas respectivas faixas de idade, 32 (organofosforados) e 14 (bipiridílios) óbitos (Anexo J).

Importante observar o fato de que os agrotóxicos pertencentes ao grupo químico dos bipiridílios (agrotóxicos a base dos princípios ativos paraquat e diquat), que causaram, no período estudado, o equivalente a 223 intoxicações (Anexo E) e conseqüentes 66 óbitos, tinham à época, por força da Portaria Ministerial nº 329/85, seu comércio submetido à emissão de um documento denominado “Guia de Aplicação – Venda aplicada” que, acompanhado do Receituário Agrônomo, restringia a aplicação deste grupo, e de suas combinações a outros princípios ativos, mediante ao acompanhamento de um técnico responsável (engenheiro agrônomo), devidamente cadastrado (Registro de Prestador de Serviços Fitossanitários, emitido pela SEAB) para tal fim, junto a firma vendedora de tais agrotóxicos. Consideradas as intoxicações causadas por estes agrotóxicos, qualquer que fossem suas causas de contaminação, ou motivações, fica patente, à semelhança do que ocorre por longa data ao Receituário Agrônomo, a ineficácia da citada Portaria no que tange ao controle e utilidade da aplicação de tais produtos. Atualmente por força de uma avaliação jurídica, que ocorreu após a reavaliação toxicológica sofrida pelos bipiridílios (Gramoxone 200, Gramocil e Reglone; nomes comerciais) nos Ministérios da Saúde e Agricultura, quando passaram da classe toxicológica I para a III, estes deixaram de ter sua venda condicionada a aplicação acompanhada.

5 CONCLUSÕES

A ocorrência de intoxicações esteve relacionada ao cultivo de culturas de inverno, verão, frutíferas e olerícolas.

O acesso fácil, associado ao armazenamento inadequado dos agrotóxicos, assim como a participação prematura em atividades agrícolas resultou na ocorrência de intoxicações e óbitos em indivíduos menores de idade.

O Receituário agrônômico associado a Guia de aplicação para a aquisição de agrotóxicos sujeitos à venda aplicada, não impediram a ocorrência de intoxicações e óbitos causados por herbicidas bupiridílios.

Sugestões de medidas futuras

Medidas fiscalizatórias devem ser implementadas pelos órgãos competentes visando coibir a participação de menores em atividades insalubres, como aquelas relacionadas ao uso de agrotóxicos.

A prescrição e armazenagem de produtos agrotóxicos, assim como a fiscalização destas duas etapas pelos órgãos correlatos, deve ser mais intensa e criteriosa visando minimizar intoxicações de caráter acidental e suicida, principalmente entre crianças.

ANEXOS

Anexo A. Relação dos municípios que compõe os núcleos regionais da SEAB

N.R. Apucarana		N.R. Cascavel	
APUCARANA	MARILANDIA DO SUL	ANAHY	ITAIPULANDIA
ARAPONGAS	MARUMBI	BOA VISTA DA APARECIDA	LINDOESTE
BOM SUCESSO	MAUA DA SERRA	BRAGANEY	MATELANDIA
CALIFORNIA	NOVO ITACOLOMI	CAFELANDIA	MEDIANEIRA
CAMBIRA	RIO BOM	CAMPO BONITO	MISSAL
JANDAIA DO SUL	SABAUDIA	CAP. LEONIDAS MARQUES	NOVA AURORA
KALORE		CASCABEL	RAMILANDIA
N.R. Campo Mourão		CATANDUVAS	SANTA LUCIA
ALTAMIRA DO PARANA	JURANDA	CEU AZUL	SANTA TEREZA DO OESTE
ARARUNA	LUIZIANA	CORBELIA	SANTA TEREZINHA DO ITAIPU
BARBOSA FERRAZ	MAMBORE	DIAMANTE D'OESTE	SAO MIGUEL DO IGUAU
BOA ESPERANCA	MOREIRA SALES	FOZ DO IGUAU	SERRANOPOLIS DO IGUAU
CAMPINA DA LAGOA	NOVA CANTU	IBEMA	TRES BARRAS DO PARANA
CAMPO MOURAO	PEABIRU	IGUATU	VERA CRUZ DO OESTE
CORUMBATAI DO SUL	QUARTO CENTENARIO	N.R. Cornélio Procópio	
ENGENHEIRO BELTRAO	QUINTA DO SOL	ABATIA	RANCHO ALEGRE
FAROL	RANCHO ALEGRE DO OESTE	ANDIRA	RIBEIRAO DO PINHAL
FENIX	RONCADOR	ASSAI	SANTA AMELIA
GOIOERE	TERRA BOA	BANDEIRANTES	SANTA CECILIA DO PAVAO
IRETAMA	UBIRATA	CONGONHINHAS	SANTA MARIANA
JANIOPOLIS		CORNELIO PROCOPIO	SANTO ANTONIO DO PARAISO
N.R. Pato Branco		ITAMBARACA	SAO JERONIMO DA SERRA
BOM SUCESSO DO SUL	MARIOPOLIS	JATAIZINHO	SAO SEBASTIAO AMOREIRA
CHOPINZINHO	PALMAS	LEOPOLIS	SAPOPEMA
CLEVELANDIA	PATO BRANCO	NOVA AMERICA DA COLINA	SERTANEJA
CORONEL DOMINGOS SOAR	SAO JOAO	NOVA FATIMA	URAI
CORONEL VIMDA	SAUDADES DO IGUAU	NOVA SANTA BARBARA	
HONORIO SERPA	SULINA	N.R. Guarapuava	
ITAJEJARA DO OESTE	VITORINO	CAMPINA DO SIMAO	ARANJAL
MANGUEIRINHA		CANDOI	PALMITAL
N.R. Curitiba		CANTAGALO	PINHAO
ADRIANOPOLIS	FAZENDA RIO GRANDE	FOZ DO JORDAO	PRUDENTOPOLIS
AGUDOS DO SUL	ITAPERUCU	GOIOXIM	RESERVA DO IGUAU
ALMIRANTE TAMANDARE	LAPA	GUARAPUAVA	TURVO
ARAUCARIA	MANDIRITUBA	N.R. Irati	
BALSA NOVA	PIEN	FERNANDES PINHEIRO	MALLET
BOCAIUVA DO SUL	PINHAIS	GUAMIRANGA	REBOUCAS
CAMPINA GRANDE DO SUL	PIRAQUARA	IMBITUVA	RIO AZUL
CAMPO DO TENENTE	QUATRO BARRAS	INACIO MARTINS	TEIXEIRA SOARES
CAMPO LARGO	QUITANDINHA	IRATI	
CAMPO MAGRO	RIO BRANCO DO SUL	N.R. Jacarezinho	
CERRO AZUL	RIO NEGRO	BARRA DO JACARE	JUNDIAI DO SUL
COLOMBO	SAO JOSE DOS PINHAIS	CAMBARA	PINHALAO
CONTENDA	TIJUCAS DO SUL	CARLOPOLIS	QUATIGUA
CURITIBA	TUNAS DO PARANA	CONSELHEIRO MAIRINCK	RIBEIRAO CLARO
DOUTOR ULYSSES		CURIUVA	SALTO DO ITARARE
N.R. Francisco Beltrão		FIGUEIRA	SANTANA DO ITARARE
AMPERE	NOVA PRATA DO IGUAU	GUAPIRAMA	SANTO ANTONIO DA PLATINA
BARRACAO	PEROLA DO OESTE	IBAITI	SAO JOSE DA BOA VISTA
BELA VISTA DA CAROBA	PINHAL DE SAO BENTO	JABOTI	SIQUEIRA CAMPOS
BOA ESPERANCA DO IGUAU	PLANALTO	JACAREZINHO	TOMAZINA
BOM JESUS DO SUL	PRANCHITA	JAPIRA	WENCESLAU BRAZ
CAPANEMA	REALEZA	JOAQUIM TAVORA	
CRUZEIRO DO IGUAU	RENASCENCA	N.R. Laranjeiras do Sul	
DOIS VIZINHOS	SALGADO FILHO	DIAMANTE DO SUL	NOVA LARANJEIRAS
ENEAS MARQUES	SALTO DO LONTRA	ESPIGAO ALTO DO IGUAU	PORTO BARREIRO
FLOR DA SERRA DO SUL	SANTA IZABEL DO OESTE	GUARANIACU	QUEDAS DO IGUAU
FRANCISCO BELTRAO	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	LARANJEIRAS DO SUL	RIO BONITO DO IGUAU
MANFRINOPOLIS	SAO JORGE DO OESTE	MARQUINHO	VIRMOND
MARMELEIRO	VERE		
NOVA ESPERANCA SUDOESTE			

Anexo A. Relação dos municípios que compõe os núcleos regionais da SEAB

N.R. Paranavaí		N.R. Maringá	
ALTO PARANA	PARANAPOEMA	ANGULO	MARIALVA
AMAPORA	PARANAVAI	ASTORGA	MARINGA
CRUZEIRO DO SUL	PLANALTINA DO PARANA	ATALAIA	MUNHOZ DE MELO
DIAMANTE DO NORTE	PORTO RICO	COLORADO	NOSSA SENHORA DAS GRACAS
GUAIRACA	QUERENCIA DO NORTE	DOUTOR CAMARGO	NOVA ESPERANCA
INAJA	SANTA CRUZ MONTE CASTELO	FLORAI	OURIZONA
ITAUNA DO SUL	SANTA IZABEL DO IVAI	FLORESTA	PAICANDU
JARDIM OLINDA	SANTA MONICA	FLORIDA	PRESIDENTE CASTELO BRANCO
LOANDA	SANTO ANTONIO DO CAIUA	IGUARACU	SANTA FE
MARILENA	SAO CARLOS DO IVAI	ITAGUAJE	SANTA INES
MIRADOR	SAO JOAO DO CAIUA	ITAMBE	SANTO INACIO
NOVA ALIANCA DO IVAI	SAO PEDRO DO PARANA	IVATUBA	SAO JORGE DO IVAI
NOVA LONDRINA	TAMBOARA	LOBATO	SARANDI
PARAISO DO NORTE	TERRA RICA	MANDAGUACU	UNIFLOR
PARANACITY		MANDAGUARI	
N.R. Ivaiporã		N.R. Londrina	
ARAPUAN	LIDIANOPOLIS	ALVORADA DO SUL	LUPIONOPOLIS
ARIRANHA DO IVAI	LUNARDELLI	BELA VISTA DO PARAISO	MIRASELVA
BOA VENTURA DE SAO RO	MANOEL RIBAS	CAFEARA	PITANGUEIRAS
BORRAZOPOLIS	MATO RICO	CAMBE	PORECATU
CANDIDO DE ABREU	NOVA TEBAS	CENTENARIO DO SUL	PRADO FERREIRA
CRUZMALTINA	PITANGA	FLORESTOPOLIS	PRIMEIRO DE MAIO
FAXINAL	RIO BRANCO DO IVAI	GUARACI	ROLANDIA
GODOY MOREIRA	ROSARIO DO IVAI	IBIPORA	SERTANOPOLIS
GRANDES RIOS	SANTA MARIA DO OESTE	JAGUAPITA	TAMARANA
IVAIPORA	SAO JOAO DO IVAI	LONDRINA	
JARDIM ALEGRE	SAO PEDRO DO IVAI		
N.R. Umuarama		N.R. Paranaguá	
ALTO PIQUIRI	JUSSARA	ANTONINA	MORRETES
ALTONIA	MARIA HELENA	GUARAQUECABA	PARANAGUA
BRASILANDIA DO SUL	MARILUZ	GUARATUBA	PONTAL DO PARANA
CAFEZAL DO SUL	NOVA OLIMPIA	MATINHOS	
CIANORTE	PEROBAL	N.R. Ponta Grossa	
CIDADE GAUCHA	PEROLA	ARAPOTI	PIRAI DO SUL
CRUZEIRO DO OESTE	RONDON	CARAMBEI	PONTA GROSSA
DOURADINA	SAO JORGE DO PATROCINIO	CASTRO	PORTO AMAZONAS
ESPERANCA NOVA	SAO MANOEL DO PARANA	IMBAU	RESERVA
FRANCISCO ALVES	SAO TOME	IPIRANGA	SAO JOAO DO TRIUNFO
GUAPOREMA	TAPEJARA	IVAI	SENGES
ICARAIMA	TAPIRA	JAGUARIAIVA	TELEMACO BORBA
INDIANOPOLIS	TUNEIRAS DO OESTE	ORTIGUEIRA	TIBAGI
IPORA	UMUARAMA	PALMEIRA	VENTANIA
IVATE	VILA ALTA	N.R. Toledo	
JAPURA	XAMBRE	ASSIS CHATEAUBRIAND	OURO VERDE DO OESTE
N.R. União da Vitória		ENTRE RIOS DO OESTE	PALOTINA
ANTONIO OLINTO	PAULO FRONTIN	FORMOSA DO OESTE	PATO BRAGADO
BITURUNA	PORTO VITORIA	GUAIRA	QUATRO PONTES
CRUZ MACHADO	SAO MATEUS DO SUL	IRACEMA DO OESTE	SANTA HELENA
GENERAL CARNEIRO	UNIAO DA VITORIA	JESUITAS	SAO JOSE DAS PALMEIRAS
PAULA FREITAS		MARECHAL CANDIDO ROND	SAO PEDRO DO IGUACU
		MARIPA	TERRA ROXA
		MERCEDES	TOLEDO
		NOVA SANTA ROSA	TUPASSI

Anexo B. Número de intoxicações nos diferentes núcleos regionais da SEAB, durante os anos de 1993 a 2000

NÚCLEO REGIONAL	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	TOTAL	(%)
LONDRINA	78	77	90	103	91	83	87	75	684	12,3%
CORNELIO PROCOPIO	109	104	74	70	72	52	43	58	582	10,5%
MARINGA	122	107	84	26	51	38	55	11	494	8,9%
APUCARANA	42	23	32	25	36	24	20	35	237	4,3%
IVAIPORA	54	45	29	20	31	13	13	13	218	3,9%
JACAREZINHO	22	23	26	20	16	26	25	9	167	3,0%
Região Norte	427	379	335	264	297	236	243	201	2.382	42,9%
CURITIBA	90	50	30	30	28	24	29	44	325	5,9%
IRATI	59	36	15	15	18	19	28	36	226	4,1%
UNIAO DA VITORIA	8	8	38	45	59	41	14	13	226	4,1%
PONTA GROSSA	23	25	9	20	9	4	12	26	128	2,3%
GUARAPUAVA	8	11	9	9	6	28	22	19	112	2,0%
LARANJEIRAS DO SUL	13	14	2	1	2	17	14	17	80	1,4%
PARANAGUA	2	1	2	5	1	9	10	7	37	0,7%
Região Sul	203	145	105	125	123	142	129	162	1.134	20,4%
CAMPO MOURAO	156	150	106	66	62	40	49	45	674	12,2%
Região Centro-Oeste	156	150	106	66	62	40	49	45	674	12,1%
CASCADEL	58	75	50	52	34	25	30	33	357	6,4%
TOLEDO	37	26	25	16	44	19	16	31	214	3,9%
Região Oeste	95	101	75	68	78	44	46	64	571	10,3%
PARANAVAI	67	76	37	20	26	15	19	37	297	5,4%
UMUARAMA	60	35	52	33	26	31	12	10	259	4,7%
Região Noroeste	127	111	89	53	52	46	31	47	556	10,0%
PATO BRANCO	18	15	18	14	24	33	18	22	162	2,9%
FRANCISCO BELTRAO	14	16	12	5	2	8	7	5	69	1,2%
Região Sudoeste	32	31	30	19	26	41	25	27	231	4,2%
TOTAL	1.040	917	740	595	638	549	523	546	5.548	100%

Anexo C. Números e percentuais de intoxicação, por causas de intoxicação entre os núcleos regionais da SEAB

NÚCLEO REGIONAL	CAUSA DA INTOXICAÇÃO														TOTAL
	PROFISSIONAL		SUICIDIO		ACIDENTAL		ALIMENTO		AMBIENTAL		CRIMINOSA		IGNORADO		
		(%)		(%)		(%)	CONTAMINADO	(%)		(%)		(%)		(%)	
LONDRINA	370	54,3%	153	22,4%	139	20,4%	8	1,2%	3	0,4%	1	0,1%	8	1,2%	682
CORNELIO PROCOPIO	339	58,2%	183	31,4%	40	6,9%	12	2,1%		0,0%		0,0%	8	1,4%	582
MARINGA	277	56,1%	101	20,4%	98	19,8%	1	0,2%	7	1,4%		0,0%	10	2,0%	494
APUCARANA	72	30,4%	93	39,2%	51	21,5%	6	2,5%	1	0,4%	2	0,8%	12	5,1%	237
IVAIPORA	99	45,2%	94	42,9%	17	7,8%		0,0%		0,0%		0,0%	9	4,1%	219
JACAREZINHO	88	52,7%	40	24,0%	37	22,2%	1	0,6%		0,0%		0,0%	1	0,6%	167
Região Norte	1.245	52,3%	664	27,9%	382	16,0%	28	1,2%	11	0,5%	3	0,1%	48	2,0%	2.381
CURITIBA	152	46,8%	103	31,7%	55	16,9%		0,0%		0,0%		0,0%	15	4,6%	325
IRATI	140	61,9%	37	16,4%	45	19,9%		0,0%		0,0%		0,0%	4	1,8%	226
UNIAO DA VITORIA	175	77,4%	13	5,8%	23	10,2%	2	0,9%	7	3,1%		0,0%	6	2,7%	226
PONTA GROSSA	54	42,2%	43	33,6%	23	18,0%	1	0,8%		0,0%		0,0%	7	5,5%	128
GUARAPUAVA	40	35,7%	47	42,0%	12	10,7%	8	7,1%		0,0%	3	2,7%	2	1,8%	112
LARANJEIRAS DO SUL	28	35,0%	35	43,8%	15	18,8%	1	1,3%		0,0%		0,0%	1	1,3%	80
PARANAGUA	13	35,1%	11	29,7%	9	24,3%		0,0%		0,0%	3	8,1%	1	2,7%	37
Região Sul	602	53,1%	289	25,5%	182	16,0%	12	1,1%	7	0,6%	6	0,5%	36	3,2%	1.134
CAMPO MOURAO	336	49,9%	236	35,0%	85	12,6%	1	0,1%		0,0%	1	0,1%	15	2,2%	674
Região Centro-Oeste	336	49,9%	236	35,0%	85	12,6%	1	0,1%	-	0,0%	1	0,1%	15	2,2%	674
CASCADEL	208	58,3%	87	24,4%	53	14,8%	1	0,3%		0,0%	2	0,6%	6	1,7%	357
TOLEDO	111	51,9%	61	28,5%	34	15,9%	1	0,5%	2	0,9%		0,0%	5	2,3%	214
Região Oeste	319	55,9%	148	25,9%	87	15,2%	2	0,4%	2	0,4%	2	0,4%	11	1,9%	571
PARANAVAI	182	61,3%	72	24,2%	40	13,5%	1	0,3%	1	0,3%		0,0%	1	0,3%	297
UMUARAMA	147	56,5%	72	27,7%	31	11,9%	1	0,4%	1	0,4%		0,0%	8	3,1%	260
Região Noroeste	329	59,1%	144	25,9%	71	12,7%	2	0,4%	2	0,4%	-	0,0%	9	1,6%	557
PATO BRANCO	87	53,7%	47	29,0%	26	16,0%		0,0%		0,0%		0,0%	2	1,2%	162
FRANCISCO BELTRAO	28	40,6%	29	42,0%	10	14,5%		0,0%		0,0%		0,0%	2	2,9%	69
Região Sudoeste	115	49,8%	76	32,9%	36	15,6%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	4	1,7%	231
TOTAL	2.946	53,1%	1.557	28,1%	843	15,2%	45	0,8%	22	0,4%	12	0,2%	123	2,2%	5.548

Anexo D. Número total de intoxicações, áreas dos grupos de cultivos e índices, nos diferentes núcleos regionais

NÚCLEO REGIONAL	Intoxicações			Áreas Grupos Culturas (ha)						Área Total		Área Total Região (%)
	(nº)	(%)	Índice*	Frutas	Olerícolas Grandes	Olerícolas	Culturas Verão	Culturas Inverno	Outros	(ha)	(%)	
LONDRINA	684	12,3%	2,23	14.964	2.289	10.707	2.474.615	399.521	163.501	3.065.598	19%	
CORNELIO PROCOPIO	582	10,5%	1,63	19.189	2.650	2.632	2.637.997	661.777	251.139	3.575.384	22%	
MARINGA	494	8,9%	1,66	23.430	694	3.066	2.444.860	278.978	221.099	2.972.126	19%	
APUCARANA	237	4,3%	1,86	6.849	1.949	8.181	1.033.894	171.590	54.108	1.276.571	8%	
IVAIPORA	218	3,9%	0,70	2.037	1.073	1.255	2.910.498	140.280	43.475	3.098.617	19%	
JACAREZINHO	167	3,0%	0,86	12.682	3.640	4.629	1.610.992	70.939	245.005	1.947.887	12%	
Região Norte	2.382	43%	1,49	79.151	12.294	30.470	13.112.856	1.723.085	978.326	15.936.183	100%	29%
CURITIBA	325	5,9%	1,63	33.597	172.731	70.235	1.681.523	15.040	23.779	1.996.905	15%	
IRATI	226	4,1%	1,45	2.179	23.042	1.558	1.392.903	80.159	58.387	1.558.228	11%	
UNIAO DA VITORIA	226	4,1%	2,31	3.528	24.210	5.545	902.609	11.858	29.076	976.825	7%	
PONTA GROSSA	128	2,3%	0,27	3.189	24.682	10.059	4.113.715	484.435	39.378	4.675.458	34%	
GUARAPUAVA	112	2,0%	0,36	4.253	36.945	5.247	2.657.592	344.130	20.545	3.068.712	22%	
LARANJEIRAS DO SUL	80	1,4%	0,61	703	409	1.359	1.263.919	38.646	14.054	1.319.089	10%	
PARANAGUA	37	0,7%	8,37	19.379	276	3.368	14.947	-	6.214	44.184	0%	
Região Sul	1.134	20%	0,83	66.828	282.294	97.370	12.027.208	974.268	191.432	13.639.401	100%	25%
CAMPO MOURAO	674	12,2%	1,09	2.249	1.008	1.140	5.007.157	943.245	214.014	6.168.813	100%	
Região Centro-Oeste	674	12%	1,09	2.249	1.008	1.140	5.007.157	943.245	214.014	6.168.813	100%	11%
CASCADEL	357	6,4%	0,70	6.294	631	3.727	4.524.517	484.550	67.761	5.087.480	47%	
TOLEDO	214	3,9%	0,37	3.620	594	1.960	5.166.638	562.562	90.790	5.826.164	53%	
Região Oeste	571	10%	0,52	9.914	1.225	5.687	9.691.155	1.047.112	158.551	10.913.644	100%	20%
PARANAVAI	297	5,4%	3,93	23.227	44	228	485.213	5.330	241.892	755.933	32%	
UMUARAMA	259	4,7%	1,65	7.825	167	1.518	1.253.284	20.695	290.591	1.574.080	68%	
Região Noroeste	556	10%	2,39	31.052	211	1.745	1.738.497	26.025	532.483	2.330.013	100%	4%
PATO BRANCO	162	2,9%	0,61	7.975	2.538	821	2.446.114	163.305	20.808	2.641.561	40%	
FRANCISCO BELTRAO	69	1,2%	0,18	7.328	1.782	2.805	3.787.029	99.183	38.933	3.937.060	60%	
Região Sudoeste	231	4%	0,35	15.302	4.320	3.626	6.233.143	262.488	59.741	6.578.620	100%	12%
TOTAL	5.548	100%	1,00	204.496	301.352	140.039	47.810.016	4.976.222	2.134.549	55.566.674	100%	100%

(*) Expresso pelo número total de intoxicações dividido pela respectiva área total, multiplicado por 10.000.

Anexo E. Número de intoxicações por classe e grupo químico dos agrotóxicos, durante os anos de 1993 a 2000

CLASSE DE PRODUTO	ANO								TOTAL	
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	nº	%
INSETICIDA	274	474	326	246	230	195	210	158	2.113	-
ORGANOFOSFORADO	144	297	194	154	144	115	131	96	1.275	60,3%
CARBAMATO	31	62	37	23	29	35	27	22	266	12,6%
PIRETOIDE	36	34	29	22	18	16	15	18	188	8,9%
ESTER DO ASDC	44	36	30	12	7	8	9	9	155	7,3%
ORGANOCLORADO	8	16	9	12	11	4	12	8	80	3,8%
HERBICIDA	116	102	129	112	141	139	124	134	997	-
DERIVADO DA GLICINA	27	29	44	39	77	84	65	73	438	43,9%
BIPIRIDILIOS	37	30	35	33	30	17	15	26	223	22,4%
DINITROANILINAS	22	14	11	5	8	7	5	2	74	7,4%
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	9	12	6	11	8	5	10	9	70	7,0%
FENOXIACETICO	6	2	6	3	1	1	8	13	40	4,0%
FUNGICIDA	9	25	17	26	28	25	8	13	151	-
DITIOCARBAMATO	2	14	4	10	4	4	3	3	44	29,1%
TRIAZOIS	1	2	5	3	5	7	2	4	29	19,2%
BENZIMIDAZOL	-	2	2	2	4	2	-	3	15	9,9%
CUPRICO	3	-	1	2	3	2	2	1	14	9,3%
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	-	-	1	1	7	4	-	-	13	8,6%
REGULADORES	9	6	6	8	6	7	5	4	51	-
CIANAMIDA	5	-	4	4	5	5	2	2	27	52,9%
DINITROANILINAS	4	6	2	4	1	2	3	2	24	47,1%
MISTURAS	41	22	114	86	119	100	81	68	631	-
OUTROS	593	289	150	120	121	88	98	170	1.629	-
TOTAL	1.042	918	742	598	645	554	526	547	5.572	-

Anexo F. Número de intoxicações por classe e grupo químico dos agrotóxicos e causas de intoxicação

CLASSE DE PRODUTO	CAUSA DE CONTAMINAÇÃO							TOTAL	
	ACIDENTAL	ALIMENTO CONTAMINADO	AMBIENTAL	CRIMINOSA	IGNORADO	PROFISSIONAL	SUICÍDIO	nº	%
INSETICIDA	304	29	10	6	16	1.040	708	2.113	-
ORGANOFOSFORADO	168	26	2	2	10	543	524	1.275	60,3%
CARBAMATO	41	1	-	4	2	192	26	266	12,6%
PIRETROIDE	29	1	3	-	1	96	58	188	8,9%
ESTER DO ASDC	13	-	-	-	-	95	47	155	7,3%
ORGANOCLORADO	21	-	5	-	2	13	39	80	3,8%
HERBICIDA	155	3	-	1	23	503	312	997	-
DERIVADO DA GLICINA	90	2	-	1	6	204	135	438	43,9%
BIPIRIDILIOS	27	-	-	-	7	96	93	223	22,4%
DINITROANILINAS	9	-	-	-	1	49	15	74	7,4%
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	7	-	-	-	-	47	16	70	7,0%
FENOXIACETICO	7	1	-	-	2	16	14	40	4,0%
FUNGICIDA	32	2	1	-	1	94	21	151	-
DITIOCARBAMATO	11	-	1	-	1	26	5	44	29,1%
TRIAZOIS	5	1	-	-	-	13	10	29	19,2%
BENZIMIDAZOL	-	-	-	-	-	12	3	15	9,9%
CUPRICO	5	-	-	-	-	8	1	14	9,3%
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	2	-	-	-	-	11	-	13	8,6%
REGULADORES	4	-	-	-	-	36	11	51	-
CIANAMIDA	3	-	-	-	-	21	3	27	52,9%
DINITROANILINAS	1	-	-	-	-	15	8	24	47,1%
MISTURAS	66	2	4	-	4	517	38	631	-
OUTROS	289	9	7	5	79	772	468	1.629	-
TOTAL	850	45	22	12	123	2.962	1.558	5.572	-

Anexo G. Número de intoxicações por classe e grupo químico dos agrotóxicos e vias de intoxicação

CLASSE DE PRODUTO	CAUSA DE CONTAMINAÇÃO							TOTAL	
	RESPIRATÓRIA	DIGESTIVA	CUTÂNEA	CUTÂNEA RESPIRATÓRIA	IGNORADA	DIGESTIVA RESPIRATÓRIA	CUTÂNEA DIGESTIVA	nº	%
INSETICIDA	756	857	113	316	54	14	3	2.113	-
ORGANOFOSFORADO	413	611	52	159	26	11	3	1.275	60,3%
CARBAMATO	117	56	17	58	16	2	-	266	12,6%
PIRETROIDE	77	63	20	24	3	1	-	188	8,9%
ESTER DO ASDC	69	54	7	22	3	-	-	155	7,3%
ORGANOCLORADO	23	45	4	5	3	-	-	80	3,8%
HERBICIDA	341	384	80	154	29	5	4	997	-
DERIVADO DA GLICINA	144	172	34	70	13	4	1	438	43,9%
BIPIRIDILIOS	61	109	17	28	8	-	-	223	22,4%
DINITROANILINAS	40	19	6	8	-	-	1	74	7,4%
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO	29	18	3	17	2	-	1	70	7,0%
FENOXIACETICO	8	18	4	10	-	-	-	40	4,0%
FUNGICIDA	55	43	21	31	1	-	-	151	-
DITIOCARBAMATO	15	12	8	8	1	-	-	44	29,1%
TRIAZOIS	8	13	2	6	-	-	-	29	19,2%
BENZIMIDAZOL	5	3	1	6	-	-	-	15	9,9%
CUPRICO	6	7	-	1	-	-	-	14	9,3%
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	2	1	7	3	-	-	-	13	8,6%
REGULADORES	18	11	14	7	1	-	-	51	-
CIANAMIDA	9	3	11	3	1	-	-	27	52,9%
DINITROANILINAS	9	8	3	4	-	-	-	24	47,1%
MISTURAS	228	63	127	183	28	2	-	631	-
OUTROS	675	588	114	115	129	6	2	1.629	-
TOTAL	2.073	1.946	469	806	242	27	9	5.572	-

Anexo H. Número de intoxicações nas regiões e respectivos núcleos regionais, segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos

CLASSE DE PRODUTO	REGIÃO NORTE							REGIÃO SUL							REGIÃO CENTRO OESTE			REGIÃO OESTE			REGIÃO NOROESTE			REGIÃO SUDOESTE			TOTAL
	LONDRINA	CORNÉLIO PROCOPIO	MARINGÁ	APUCARANA	IVAIPORA	JACAREZINHO	TOTAL	CURITIBA	IRATI	UNIÃO DA VITÓRIA	PONTA GROSSA	GUARAPUAVA	LARANJEIRAS DO SUL	PARANAGUÁ	TOTAL	CAMPO MOURÃO	TOTAL	CASCABEL	TOLEDO	TOTAL	PARANAVÁI	UNILASAMA	TOTAL	PATO BRANCO	FRANCISCO BELTRÃO	TOTAL	
INSETICIDA	293	280	204	98	79	65	1.019	83	86	22	40	22	9	9	271	296	296	111	82	193	151	126	277	30	27	57	2.113
ORGANOFOSFORADO	139	184	118	64	59	39	603	66	46	16	29	15	3	4	179	173	173	85	56	141	77	59	136	22	21	43	1.275
CARBAMATO	42	37	31	16	2	7	135	6	25	2	5	4	1	5	48	33	33	7	11	18	18	11	29	2	1	3	266
PIRETOIDE	38	22	17	1	4	7	89	5	6	1	3	0	1	0	16	26	26	8	7	15	20	19	39	2	1	3	188
ESTER DO ASDC	11	21	16	3	10	5	66	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	5	3	8	17	21	38	0	1	1	155
ORGANOCLORADO	20	8	11	7	2	0	48	3	0	1	2	1	1	0	8	1	1	1	3	4	8	9	17	2	0	2	80
HERBICIDA	145	55	72	39	55	42	408	65	44	27	28	40	39	7	250	67	67	96	28	124	31	17	48	85	15	100	997
DERIVADO DA GLICINA	88	26	43	29	14	23	223	21	15	7	9	7	15	4	78	24	24	39	12	51	15	7	22	33	7	40	438
BIPRIDÍLIOS	20	0	4	3	28	5	60	26	13	9	14	21	11	1	95	10	10	12	5	17	1	1	2	37	2	39	223
DINITROANILINAS	5	7	11	3	1	0	27	4	6	5	1	0	0	0	16	15	15	6	2	8	3	2	5	1	2	3	74
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLÍNICO	11	5	3	0	0	3	22	1	0	0	1	0	3	0	5	2	2	25	2	27	5	4	9	4	1	5	70
FENOXIACETICO	8	5	3	0	1	0	17	4	1	0	0	0	2	1	8	4	4	6	2	8	0	0	0	2	1	3	40
FUNGICIDA	31	23	11	9	4	10	88	13	3	11	0	4	1	4	36	11	11	2	3	5	3	4	7	4	0	4	151
DITIOCARBAMATO	4	5	4	1	1	1	16	8	2	11	0	0	1	4	26	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44
TRIAZOIS	5	5	2	3	0	2	17	0	0	0	0	1	0	0	1	5	5	0	2	2	1	2	3	1	0	1	29
BENZIMIDAZOL	3	3	0	2	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2	0	2	15
CUPRICO	3	1	1	1	1	2	9	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	14
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO	7	1	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	13
REGULADORES	7	10	10	0	0	0	27	11	8	1	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	51
CIANAMIDA	7	10	10	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
DINITROANILINAS	0	0	0	0	0	0	0	11	8	1	0	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	24
MISTURAS	64	53	49	8	20	11	205	25	21	134	9	7	6	3	205	63	63	36	45	81	22	39	61	15	1	16	631
OUTROS	154	162	148	85	61	43	653	129	64	31	51	39	24	14	352	239	239	112	57	169	90	75	165	27	24	51	1.629
TOTAL	694	583	494	239	219	171	2.400	326	226	226	128	112	80	37	1.135	676	676	357	215	572	297	261	558	162	69	231	5.572

Anexo I. Número de óbitos nas regiões e respectivos núcleos regionais, segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos

CLASSE DE PRODUTO	REGIÃO NORTE							REGIÃO SUL							REGIÃO CENTRO OESTE	REGIÃO OESTE			REGIÃO NOROESTE			REGIÃO SUDOESTE			TOTAL		
	LONDRINA	CORNÉLIO PROCOPIO	MARINGÁ	APUCARANA	IVAIPORA	JACAREZINHO	TOTAL	CURITIBA	IRATI	UNIÃO DA VITÓRIA	PONTA GROSSA	GUARAPUAVA	LARANJEIRAS DO SUL	PARANAGUA	TOTAL	CAMPO MOURÃO	TOTAL	CASCAVEL	TOLEDO	TOTAL	PARANAVAI	UMUARAMA	TOTAL	PATO BRANCO		FRANCISCO BELTRÃO	TOTAL
INSETICIDA	11	51	11	15	25	9	122	6	5	1	5	3	2	1	23	62	62	13	10	23	10	15	25	5	7	12	267
ORGANOFOSFORADO	7	47	7	14	19	6	100	4	3	1	4	3	1	1	16	43	43	10	9	19	7	9	16	4	7	11	206
CARBAMATO		1	1				2		2						2	3	3		1	1							8
PIRETOIDE			1		1		2											1		1	1		1	1		1	5
ESTER DO ASDC	3	2		1	5	3	14									15	15	2		2	2	3	5				36
ORGANOCLORADO			1				1	1			1				2							2	2				5
HERBICIDA	4	2	1	3	10	4	24	11	6	1	5	17	6	1	47	6	6	6	3	9		2	2	14	4	18	106
DERIVADO DA GLICINA	2	1		1	1	2	7	1	1			2			4	1	1	2		2				1	1	2	16
BIPIRIDÍLIOS	2			1	6	2	11	8	5	1	4	10	4	1	32	2	2	4	3	7		1	1	11	1	12	66
DINITROANILINAS								1							1	3	3								2	2	6
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO		1					1																				1
FENOXIACETICO			1				1	1							1									2		2	4
FUNGICIDA			1				1							1	1												2
DITIOCARBAMATO														1	1												1
TRIAZOIS																											
BENZIMIDAZOL																								1		1	1
CUPRICO																											
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO																											
REGULADORES	1		1				2																		1	1	3
CIANAMIDA	1		1				2																				2
DINITROANILINAS																									1	1	1
MISTURAS	3	3	1	1		2	10	5	1		1		1		8	3	3				2	1	3				24
OUTROS	8	22	9	7	22	7	75	11	4	6	12	17	7		57	34	34	19	13	32	9	18	27	1	4	5	230
TOTAL	27	78	24	26	57	22	234	33	16	8	23	37	16	3	136	105	105	38	26	64	21	36	57	20	16	36	632

Anexo J. Número de óbitos nas classes de idade, por sexo, segundo as classes e principais grupos químicos dos agrotóxicos

CLASSE DE PRODUTO	CLASSE DE IDADE																								TOTAL		
	0 a 5		6 a 11		12 a 17		18 a 23		24 a 29		30 a 35		36 a 41		42 a 47		48 a 53		54 a 59		>= 60		IGNORADO				
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
INSETICIDA	3	2	1		6	8	16	30	9	31	7	27	9	28	7	22	5	11	1	19	4	20	1		69	198	
ORGANOFOSFORADO	3	1			4	3	12	20	8	23	5	23	8	22	6	17	4	7	1	16	3	19	1		55	151	
CARBAMATO					1							1		1		1		3			1					8	
PIRETROIDE							1			2					1	1										2	3
ESTER DO ASDC			1		2	2	3	7	1	4	2	2	1	4	1	2		1		3						11	25
ORGANOCLORADO					1		1				1				1						1					1	4
HERBICIDA		2			2	1	3	12	4	14	5	14		13	3	5	3	6	3	6	2	6		2	25	81	
DERIVADO DA GLICINA					1				1	3	2	2		1	1	1		2		1		1				5	11
BIPIRIDILIOS					1	1		10	2	8	3	11		10	1	4	3	4	1	1	2	4				13	53
DINITROANILINAS		1					3													1			1		3	3	
FENOXIACETICO + DER. AC. PICOLINICO									1																	1	
FENOXIACETICO		1												1	1					1					1	3	
FUNGICIDA											1					1										2	
DITIOCARBAMATO											1															1	
TRIAZOIS																											
BENZIMIDAZOL																1										1	
CUPRICO																											
TRIAZOIS + ORGANOFOSFORADO																											
REGULADORES														1					1		1					3	
CIANAMIDA														1							1					2	
DINITROANILINAS																			1							1	
MISTURAS		1			1		3	2	1	5	1	2		2		4				1		1			6	18	
OUTROS		3	2		16	8	9	25	8	24	5	27	6	16	3	14	4	19	3	18	1	17	1	2	58	173	
TOTAL	3	7	3		25	17	31	69	22	74	18	71	15	60	13	46	12	36	7	45	7	45	2	4	158	474	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINETTO, D.; PUCHALSKI, L.E.A.; AZEVEDO, R. de et al. Utilização de equipamentos de proteção individual e intoxicações por agrotóxicos entre fumicultores do Município de Pelotas-RS. **Pesticidas**, v.8, p.45-56, jan./dez. 1988.

ALBUQUERQUE, M.A.; PENNA, F.L.R.; NEVES, N.S. **Riscos ambientais causados pela agricultura, na microbacia hidrográfica do Córrego dos Bertoldo, Caratinga-MG**. http://www.cibergeo.org/agbnacional/VICBG-2004/Eixo2/E2_220.htm. (07 nov.2004).

ALMEIDA, N.F.; PIEDADE, J.R.; SOUZA, D.A. **Química dos pesticidas**. São Paulo: Instituto Biológico, 1962. 325p.

ALMEIDA, W.F.; MELLO, D. de; PUGA, F.R. et al. Intoxicações profissionais por praguicidas. In: MENDES, R. **Medicina do trabalho: doenças profissionais**. São Paulo: Sarvier, 1980. p.511-569.

ALVES FILHO, J.P. **Uso de agrotóxicos no Brasil: controle social e interesses corporativos**. São Paulo: Annablume, 2002. 188p.

- ARAÚJO, A.C.P.; NOGUEIRA, D.P.; AUGUSTO, L.G.S. Impacto dos praguicidas na saúde: estudo da cultura do tomate. **Revista de Saúde Pública**, v.34, n.3, p.309-313, jun. 2000.
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL. **Banco de dados:** distribuição e vendas por Estado. <http://www.andef.com.br>. (09 abr. 2002).
- ASSUNÇÃO, L.F.; RIBEIRO, A. **Consumo de agrotóxicos cresce a cada ano.** http://www.an.uol.com.br/anverde/especiais/mat_esp01.htm. (03 nov. 2004).
- BALDERRAMA, E.S.R. **Intoxicação profissional rural por agrotóxicos no Estado do Paraná na última década.** Curitiba: UFPR, Setor de Ciências da Saúde, 2000. 45p.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. **AGROFIT 98:** uso adequado de agrotóxicos (compact disc). São Paulo, 1998.
- BRASIL. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069Compilado.htm. (12 abr. 2005).
- BUENO, W.C. **Veneno no prato, açúcar na pauta:** a comunicação a serviço do lobby dos agrotóxicos. <http://www.comunicaude.com.br/artigowilbuenoagrotoxicos.htm>. (07 nov. 2004).
- BULL, D.; HATHAWAY, D. **Pragas e venenos:** agrotóxicos no Brasil e no terceiro mundo. Petrópolis: Ed. Vozes, 1986. 236p.
- CARSON, R. **Silent spring.** Greenwich: Fawcett Publ., 1970. 304p.

- CARVALHO, I.S. Agrotóxicos: usos e implicações. **Mundo & Vida**. v.2, n.1, p.29-31, 2000.
- CICIOILLI, R. **Confirmado**: campesinos de San Pedro Del Paraná fueron intoxicados por agrotóxicos. <http://www.rel-uita.org/agricultura/agrotóxicos/paraguay-3htm>. (12 nov.2004).
- CRIVISQUI, E.; VILLAMONTE, G. **Apresentação dos métodos da análise fatorial de correspondência simples e múltipla**. Londrina: Programme Presta, 1999. 176p.
- DELGADO, I.F.; PAUMGARTTEN, F.J.R. Intoxicações e uso de pesticidas por agricultores do Município de Paty do Alferes, Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v.20, n.1, p.180-186, jan./fev. 2004.
- DURAN-NAH, J.J.; COLLI-QUINTAL, J. Intoxicación aguda por plaguicidas. **Salud Pública de México**, v.42, n.1, p.53-55, ene./feb. 2000.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Algodão (Bt)**. <http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=bioss::23>. (01abr. 2005).
- FARIA, N.M.X.; FACCHINI, L.A.; FASSA, A.G. et al. Trabalho rural e intoxicações por agrotóxicos. **Cadernos de Saúde Pública**, v.20, n.5, vol.20, p.1298-1308, set./out. 2004.
- FORATTINI, O.P. **Epidemiologia geral**. São Paulo: Edgard Blucher, 1976. 210p.

FUNDAÇÃO INSTITUTO OSWALDO CRUZ. Centro de Informação Científica e Tecnológica. **Estatística anual de casos de intoxicação e envenenamento**: Brasil: 1997. Rio de Janeiro, 1998. 80p.

FUNDAÇÃO INSTITUTO OSWALDO CRUZ. Centro de Informação Científica e Tecnológica. **Estatística anual de casos de intoxicação e envenenamento**: Brasil: 1999. Rio de Janeiro, 2000. 100p.

GANDOLFO, M.; ANTUNIASSI, U. **Fora do padrão**.

<http://www.revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC611952-1932,00.html>. (05 nov. 2004).

GARCIA, E.G. Avaliação das conseqüências da “Lei dos Agrotóxicos” nas intoxicações e nas classificações toxicológica e de potencial de periculosidade ambiental no período de 1999 a 2000. São Paulo, 2001a. 132 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo.

GARCIA, E.G. **Segurança e saúde no trabalho rural**: a questão dos agrotóxicos. São Paulo: Fundacentro, 2001b. 182p.

GARCIA, J.E. Acute poisoning from pesticides: human and economic costs. **Revista Panamericana de Salud Publica**, v.4, n.6, p.383-387, dec.1998.

GUIVANT, J.S. Percepção dos olericultores da grande Florianópolis (SC) sobre os riscos decorrentes do uso de agrotóxicos. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v.22, n.82, p.47-57, 1994.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo agropecuário 1995-1996**. Rio de Janeiro, 1997. n.20, 62p.

- LEVIGARD, Y.E. **A interpretação dos profissionais de saúde acerca das queixas do nervoso no meio rural:** uma aproximação ao problema das intoxicações por agrotóxicos.
http://portaldeseres.cict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_cover&id=000009&lng=pt&nrm=isso. (12 nov.2004).
- LOBATO, S.M.R. O silêncio como metáfora. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE, 2., Indaiatuba, 2004. **Resumos**. Indaiatuba: ANPPAS, 2004.
<http://www.anppas.org.br>. (15 nov. 2004).
- MEULENBELT, J.; DE VRIES, I. Acute work-related poisoning by pesticides in the Netherlands: a one year follow-up study. **Przegląd Lekarski**, v.54, n.10, p.665-670, 1997.
- NASCIMENTO, C.R. **Cadastramento de agrotóxicos:** requisitos e banco de dados. dpolastr@esalq.usp.br. (17 nov. 2004).
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Alternative agriculture**. Washington: National Academy Press, 1989. 448p.
- NEWMAN, J.F. Pesticides. In: WRIGHT, S.J.L.; HILL, I.R. **Pesticide microbiology**. New York: Academic Press, 1978. p.1-16.
- NIEWEGLOWSKI, A.M.A.; MEDEIROS, M.L.M.B. de; ZANIN, M. et al. **Agrotóxico:** coletânea sobre situação no Paraná. Curitiba: Secretaria do Meio Ambiente, 1992. 94p.

NUNES, E.F.P.A. Sistema de Informação em Intoxicação por agrotóxicos no município de Londrina–PR. Londrina, 1995. 100 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Londrina.

OLIVEIRA-SILVA, J.J.; ALVES, S.R.; MEYER, A. et al. Influência de fatores socioeconômicos na contaminação por agrotóxicos, Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v.35, n.2, p.130-135, dez. 2001.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Manual de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos**. Brasília, 1996. 69p.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Situación epidemiológica de las Intoxicaciones agudas por plaguicidas en centroamérica, 1992-2000. **Boletín Epidemiológico/OPS**, v.23, n.3, p.5-9, sep. 2002.

PARANÁ. Leis, decretos, etc. **Coletânea da legislação Estadual e Federal de agrotóxicos**. Curitiba: SEAB, DEFIS, 1997. 215p.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. **Acompanhamento da situação agropecuária no Paraná**. Curitiba, 2001. 64p.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. **Reunião sobre a política estadual a ser adotada para a destinação adequada de embalagens de agrotóxicos**. marilene@inbrapenet.com.br. (10 abr.2002a).

PARANÁ. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. **Legislação on line**. <http://www.pr.gov.br/seab/agrotóxicos/dec4074.html>. (12 nov.2002b).

PARANÁ. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.

Valor bruto da produção. dpolastr@pr.gov.br. (18 out.2004).

PIRES, D.X.; CALDAS, E.D.; RECENA, M.C.P. Uso de agrotóxicos e suicídios no Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v.21, n.2, p.598-605, mar./abr. 2005.

QUEVEDO, G.B.; CORRIOLS, M. **Características epidemiológicas y ocupacionales de los controles de foco de intoxicaciones agudas por plaguicidas em Nicaragua, 1995-1998.** Managua: Organización Panamericana de la Salud, 1999. 20p.

RAMOS, H.H. MAZIERO, J.V.G.; YANAI, K. et al. Exposição dérmica do aplicador de agrotóxicos na cultura da uva, com diferentes pulverizadores. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v.6, n. 1, p.175-179, 2002.

RUEGG, E.F.; PUGA, F.R.; SOUZA, M.C.M. de. et al. **Impacto dos Agrotóxicos.** 2.ed. São Paulo: Icone, 1991. 94p.

SHEU, J.J.; WANG, J.D.; WU, Y.K. Determinants of lethality from suicidal pesticide poisoning in metropolitan HsinChu. **Veterinary and Human Toxicology**, v.40, n.6, p.332-336, Dec. 1998.

TORDOIR, W.F.; MARONI, M. Basic concepts in the occupational health management of pesticide workers. **Toxicology**, v.9, n.1, p.5-14, 1994.

TRAPÉ, A.Z. **Efeitos toxicológicos e registro de intoxicações por agrotóxicos.** <http://www.agr.unicamp.br/tomates/pdfs/eftoxic.pdf>. (07 nov. 2004).

VAN der HOEK, W.; KONRADSEN, F.; ATHUKORALA, K. et al. Pesticide poisoning: a major health problem in Sri Lanka. **Social Science and Medicine**, v.46, n.4/5, p.495-504, Feb./Mar.1998.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Public health impact of pesticides used in agriculture**. Geneve, 1990. 128p.

APÊNDICES

APÊNDICE 1. Ficha epidemiológica de ocorrência toxicológica

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE / ISEPR / CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA DO PARANÁ / DIVISÃO DE DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
SETOR DE TOXICOLOGIA

FICHA EPIDEMIOLÓGICA DE OCORRÊNCIA TOXICOLÓGICA

IDENTIFICAÇÃO / DADOS GERAIS

1 - R.S. 2 - SEM. EPID. 3 - NOME DO PACIENTE

4 - IDADE ☐ MESES ☐ ANOS 5 - SEXO ☐ FEM. ☐ MASC. 6 - OCUPAÇÃO ☐ RURAL _____ QUAL _____ ☐ URBANA _____ QUAL _____

7 - ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA _____ TELEFONE _____

9 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA _____ CÓDIGO MUN. _____

10 - MUNICÍPIO DO ACIDENTE _____ CÓDIGO MUN. _____

11 - MUNICÍPIO DO TRATAMENTO _____ CÓDIGO MUN. _____

8 - PONTO DE REFERÊNCIA _____
EN CASO DE INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICO, ANOTE O NOME DA PROPRIEDADE E DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL ONDE OCORREU O ACIDENTE.

DADOS DO ACIDENTE

12 - DATA DO ACIDENTE DO / MM / AA 13 - HORA DO ACIDENTE HORA MIN. 14 - ÁREA/LOCAL ONDE OCORREU O ACIDENTE ☐ URBANA ☐ TRABALHO ☐ OUTRO ☐ RURAL ☐ RESIDÊNCIA 15 - FOI COMUNICADO ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)? ☐ SIM ☐ NÃO

16 - DESCREVER AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE _____

17 - TEMPO ENTRE O ACID. E INÍCIO DOS SINTOMAS _____ 18 - QUANTIDADE DE PRODUTO OU TEMPO DE EXPOSIÇÃO _____

19 - CLASSIFICAÇÃO DO CASO ☐ EXPOSIÇÃO ☐ REAÇÃO ADVERSA ☐ INTOXICAÇÃO 20 - TIPO DE INTOXICAÇÃO ☐ AGUDA ☐ SUB AGUDA ☐ CRÔNICA

21 - PRODUTO CAUSADOR

☐ PESTICIDA ☐ AGRÍCOLA NOME _____
☐ DOMÉSTICO SUBSTÂNCIA ATIVA _____
☐ VETERINÁRIO TIPO DE LAVOURA _____

☐ MEDICAMENTO NOME _____
SUBSTÂNCIA ATIVA _____
APRESENTAÇÃO _____

☐ PRODUTO DE LIMPEZA ☐ PLANTA TÓXICA
☐ PRODUTO DE TOILETE ☐ METAIS
☐ PRODUTO QUÍMICO INDUSTRIAL ☐ OUTRO _____
☐ IGNORADO

22 - VIA DE EXPOSIÇÃO/CONTAMINAÇÃO ☐ RESPIRATÓRIA ☐ DIGESTIVA ☐ OUTRA
☐ CUTÂNEA ☐ IGNORADA

23 - CAUSA DO ACIDENTE ☐ ACIDENTAL ☐ SUICÍDIO ☐ IGNORADA
☐ ACIDENTE DE TRABALHO ☐ CRIMINOSA ☐ OUTRA _____

APÊNDICE 1. Ficha epidemiológica de ocorrência toxicológica

24 - QUADRO CLÍNICO

AP CARDIO-CIRCULATÓRIO	SISTEMA NERVOSO CENTRAL/PERIFÉRICO	AP DIGESTIVO
☐ TAQUICARDIA	☐ CEFALÉIA	☐ CÓLICAS
☐ ARRITMIA	☐ TREMORES	☐ DIARRÉIA
☐ HIPERT. ARTERIAL	☐ FORMIGAMENTO	☐ NÁUSEA
	☐ MIALGIA	☐ VÔMITO
	☐ CÂIMBRAS	☐ SALIVORRÉIA
	☐ CONVULSÕES	
	☐ AGITAÇÃO/IRRITABILIDADE	
	☐ INCOORDENAÇÃO MOTORA	
	☐ VERTIGENS/TONTURA	
	☐ DIMINUIÇÃO DE FORÇA MUSCULAR	
	☐ COMA	

AP RESPIRATORIO	AP URINARIO
☐ DIFICULDADE RESPIRATÓRIA	☐ DIMINUIÇÃO DO FLUXO/OLIGÚRIA
☐ DISPNEIA	☐ URINA ESCURA/HEMATÚRIA
☐ EDEMA PULMONAR	☐ INSUFICIÊNCIA RENAL
☐ SECREÇÃO BRONQUICA	
☐ TAQUIPNÉIA	
☐ TOSSE	

OUTROS ☐ NENHUMA ALTERAÇÃO

☐ MAL ESTAR GERAL

☐ FEBRE

.....

25 - EXAMES LABORATORIAIS

.....

26 - DATA DO INÍCIO DO TRATAMENTO: ____/____/____

27 - LOCAL DO TRATAMENTO: ☐ HOSPITALIZAÇÃO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ LOCAL: _____

28 - TEMPO DECORRIDO: ENTRE ACIDENTE E TRATAMENTO: ____ HS OU ENTRE INÍCIO DA SINTOMATOLOGIA E TRATAMENTO: ____ HS

29 - PATOLOGIA ASSOCIADA: ☐ HIPERTENSÃO ☐ DIABETES ☐ OUTRA: _____

30 - EVOLUÇÃO/OBSERVAÇÕES/COMPLICAÇÕES

.....

31 - EVOLUÇÃO FINAL: ☐ CURA ☐ CURA COM SEQUELA: QUAL: _____ ☐ ALTA: ____/____/____ ☐ ÓBITO: ____/____/____ ☐ IGNORADO

☐ ENCAMINHAMENTO PARA: _____

32 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

_____/_____/_____ RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO - CARRO

EM CASO DE DÚVIDAS NO PREENCHIMENTO DESTA FICHA SOLICITE AS "ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO" NA SUA REGIONAL DE SAÚDE.

ORIENTAÇÃO PARA ACIDENTES COM AGROTÓXICOS - PARA USO MÉDICO -

organofosforados e carbamatos ATUAM INIBINDO A COLINESTERASE. PARA ANTAGONIZAR OS EFEITOS DO EXCESSO DE ACETILCOLINA PROVOCADA PELA INATIVIDADE DA COLINESTERASE, UTILIZA-SE SULFATO DE ATROPINA. NA DOSAGEM DE 1 A 4 MG DE 5 A 30 MIN ATÉ ATROPINIZAÇÃO LEVE. NOS ORGANOFOSFORADOS PARA REGENERAR A COLINESTERASE VIA-SE OXIMAS (PRALIDOXIMA/CONTRATON) NA DOSAGEM DE 1 A 2 E NOS 3 PRIMEIROS DIAS. PARA CARBAMATOS NÃO UTILIZAR OXIMAS. EM AMBOS ACIDENTES, CONTRAINDICA-SE O USO DE MORFINA, ANKNOFOLINA E TRANQUILIZANTES. NÃO USE ATROPINA SEM SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO.

organoclorados -UTILIZA-SE BARBITÚRICOS, NEPROBAMATOS OU DIAZEPÓDIOS.

piretróides - UTILIZA-SE ANTIHISTAMÍNICOS E SINTOMÁTICOS.

NAS INTOXICAÇÕES POR VIA CUTÂNEA LAVAR A PELE POR NO MÍNIMO 10 MIN. NAS INTOXICAÇÕES POR VIA DIGESTIVA NÃO ADMINISTRAR VÔMITOS E MANTER DIETA HIPOSODOROSA.

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (CIT) CURITIBA 841-146 OU 841-2257846

LONDRIANA 043-146 MARINGÁ 0442-243665

DIOM ABRIL/84

APÊNDICE 2. Ficha individual de investigação – Intoxicação por agrotóxicos

SUS-M5-FNS-CENEP1 SESA-ISEP-PARANÁ		SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA INDIVIDUAL DE INVESTIGAÇÃO		INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICO	
DADOS GERAIS					
1-NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO		2-DATA DA NOTIFICAÇÃO		3-SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE NOTIFICAÇÃO	
433402		25, 1, 01		041	
4-CÓDIGO MUNICÍPIO		5-NOME MUNICÍPIO			
		Quapongas			
6-CÓDIGO UNIDADE DE SAÚDE		7-NOME UNIDADE DE SAÚDE			
		Hospital Regional José de Fátima			
DADOS DO CASO					
8-NOME DO PACIENTE					
Luís dos Santos					
9-DATA NASCIMENTO		10-IDADE		11-SEXO	
19/05/1961		39 A		L	
12-GRAU DE INSTRUÇÃO		1-ANALFABETO 2-1º GRAU		3-2º GRAU 4-SUPERIOR	
2				5-NÃO SE APLICA 6-IGNORADO	
14-CÓDIGO ÉTNIA		15-SE INDIC. ÉTNIA		16-PRIMEIROS SINTOMAS	
				09, 01, 01	
17-CÓDIGO MUNICÍPIO		17-NOME MUNICÍPIO			
		Pitanguias			
18-CÓDIGO DISTRITO		19-DISTRITO		20-ZONA	
				1-URBANA 2-RURAL 3-DE	
21-CÓDIGO BAIRRO		22-BAIRRO DA LOCALIDADE		23-UF	
		OL Espumosa		PR	
24-ENDEREÇO GERAL, AVENIDA, Nº, APTº		Rua: Sítio de Setembro		nº 461	
25-PUNTO DE REFERÊNCIA		26-TELEFONE			
DADOS COMPLEMENTARES DO CASO					
27-LOCAL DE TRABALHO					
28-OCCUPAÇÃO					
29-RELAÇÃO DE TRABALHO					
30-FUNÇÃO					
31-ADMINISTRATIVA					
32-AGRICOLA/AGROPECUARIO					
33-APLICADOR/PREPARADOR DE CALDA					
34-OUTROS					
35-APLICADOR NA PECUÁRIA					
36-NÃO SE APLICA					
LOCAL DE OCORRÊNCIA DA EXPOSIÇÃO					
37-CÓDIGO MUNICÍPIO		38-NOME MUNICÍPIO			
		Pitanguias			
39-CÓDIGO DISTRITO		40-DISTRITO		41-ZONA	
				1-URBANA 2-RURAL 3-DE	
42-CÓDIGO BAIRRO		43-BAIRRO DA LOCALIDADE		44-UF	
		OL Espumosa		PR	
45-ENDEREÇO GERAL, AVENIDA, Nº, APTº		Rua: 07 de Setembro		nº 461	
46-PUNTO DE REFERÊNCIA		47-TELEFONE			
REGIME DE TRATAMENTO					
48-1		49-1		50-1	
1-HOSPITALAR		2-AMBULATORIAL		3-OUTROS	
4-DIAGNÓSTICO		5-DIAGNÓSTICO		6-DIAGNÓSTICO	
09, 01, 01		09, 01, 01		09, 01, 01	
51-1		52-1		53-1	
1-HOSPITALAR		2-AMBULATORIAL		3-OUTROS	
4-DIAGNÓSTICO		5-DIAGNÓSTICO		6-DIAGNÓSTICO	
09, 01, 01		09, 01, 01		09, 01, 01	
QUADRO CLÍNICO					
49-1		50-1		51-1	
1-1		2-1		3-1	
4-1		5-1		6-1	
7-1		8-1		9-1	
10-1		11-1		12-1	
13-1		14-1		15-1	
16-1		17-1		18-1	
19-1		20-1		21-1	
22-1		23-1		24-1	
25-1		26-1		27-1	
28-1		29-1		30-1	
31-1		32-1		33-1	
34-1		35-1		36-1	
37-1		38-1		39-1	
40-1		41-1		42-1	
43-1		44-1		45-1	
46-1		47-1		48-1	
49-1		50-1		51-1	
52-1		53-1		54-1	
55-1		56-1		57-1	
58-1		59-1		60-1	
61-1		62-1		63-1	
64-1		65-1		66-1	
67-1		68-1		69-1	
70-1		71-1		72-1	
73-1		74-1		75-1	
76-1		77-1		78-1	
79-1		80-1		81-1	
82-1		83-1		84-1	
85-1		86-1		87-1	
88-1		89-1		90-1	
91-1		92-1		93-1	
94-1		95-1		96-1	
97-1		98-1		99-1	
100-1		101-1		102-1	
103-1		104-1		105-1	
106-1		107-1		108-1	
109-1		110-1		111-1	
112-1		113-1		114-1	
115-1		116-1		117-1	
118-1		119-1		120-1	
121-1		122-1		123-1	
124-1		125-1		126-1	
127-1		128-1		129-1	
130-1		131-1		132-1	
133-1		134-1		135-1	
136-1		137-1		138-1	
139-1		140-1		141-1	
142-1		143-1		144-1	
145-1		146-1		147-1	
148-1		149-1		150-1	
151-1		152-1		153-1	
154-1		155-1		156-1	
157-1		158-1		159-1	
160-1		161-1		162-1	
163-1		164-1		165-1	
166-1		167-1		168-1	
169-1		170-1		171-1	
172-1		173-1		174-1	
175-1		176-1		177-1	
178-1		179-1		180-1	
181-1		182-1		183-1	
184-1		185-1		186-1	
187-1		188-1		189-1	
190-1		191-1		192-1	
193-1		194-1		195-1	
196-1		197-1		198-1	
199-1		200-1		201-1	
202-1		203-1		204-1	
205-1		206-1		207-1	
208-1		209-1		210-1	
211-1		212-1		213-1	
214-1		215-1		216-1	
217-1		218-1		219-1	
220-1		221-1		222-1	
223-1		224-1		225-1	
226-1		227-1		228-1	
229-1		230-1		231-1	
232-1		233-1		234-1	
235-1		236-1		237-1	
238-1		239-1		240-1	
241-1		242-1		243-1	
244-1		245-1		246-1	
247-1		248-1		249-1	
250-1		251-1		252-1	
253-1		254-1		255-1	
256-1		257-1		258-1	
259-1		260-1		261-1	
262-1		263-1		264-1	
265-1		266-1		267-1	
268-1		269-1		270-1	
271-1		272-1		273-1	
274-1		275-1		276-1	
277-1		278-1		279-1	
280-1		281-1		282-1	
283-1		284-1		285-1	
286-1		287-1		288-1	
289-1		290-1		291-1	
292-1		293-1		294-1	
295-1		296-1		297-1	
298-1		299-1		300-1	
301-1		302-1		303-1	
304-1		305-1		306-1	
307-1		308-1		309-1	
310-1		311-1		312-1	
313-1		314-1		315-1	
316-1		317-1		318-1	
319-1		320-1		321-1	
322-1		323-1		324-1	
325-1		326-1		327-1	
328-1		329-1		330-1	
331-1		332-1		333-1	
334-1		335-1		336-1	
337-1		338-1		339-1	
340-1		341-1		342-1	
343-1		344-1		345-1	
346-1		347-1		348-1	
349-1		350-1		351-1	
352-1		353-1		354-1	
355-1		356-1		357-1	
358-1		359-1		360-1	
361-1		362-1		363-1	
364-1		365-1		366-1	
367-1		368-1		369-1	
370-1		371-1		372-1	
373-1		374-1		375-1	
376-1		377-1		378-1	
379-1		380-1		381-1	
382-1		383-1		384-1	
385-1		386-1		387-1	
388-1		389-1		390-1	
391-1		392-1		393-1	
394-1		395-1		396-1	
397-1		398-1		399-1	
400-1		401-1		402-1	
403-1		404-1		405-1	
406-1		407-1		408-1	
409-1		410-1		411-1	
412-1		413-1		414-1	
415-1		416-1		417-1	
418-1		419-1		420-1	
421-1		422-1		423-1	
424-1		425-1		426-1	
427-1		428-1		429-1	
430-1		431-1		432-1	
433-1		434-1		435-1	
436-1		437-1		438-1	
439-1		440-1		441-1	
442-1		443-1		444-1	
445-1		446-1		447-1	
448-1		449-1		450-1	
451-1		452-1		453-1	
454-1		455-1		456-1	
457-1		458-1		459-1	
460-1		461-1		462-1	
463-1		464-1		465-1	
466-1		467-1		468-1	
469-1		470-1		471-1	
472-1		473-1		474-1	
475-1		476-1		477-1	
478-1		479-1		480-1	
481-1		482-1		483-1	
484-1		485-1		486-1	
487-1		488-1		489-1	
490-1		491-1		492-1	
493-1		494-1		495-1	
496-1		497-1		498-1	
499-1		500-1		501-1	
502-1		503-1		504-1	
505-1		506-1		507-1	
508-1		509-1		510-1	
511-1		512-1		513-1	
514-1		515-1		516-1	
517-1		518-1		519-1	
520-1		521-1		522-1	
523-1		524-1		525-1	
526-1		527-1		528-1	
529-1		530-1		531-1	
532-1		533-1		534-1	
535-1		536-1		537-1	
538-1		539-1		540-1	
541-1		542-1		543-1	
544-1		545-1		546-1	
547-1		548-1		549-1	
550-1		551-1		552-1	
553-1		554-1		555-1	
556-1		557-1		558-1	
559-1		560-1		561-1	
562-1		563-1		564-1	
565-1		566-1		567-1	
568-1		569-1		570-1	
571-1		572-1		573-1	
574-1		575-1		576-1	
577-1		578-1		579-1	
580-1		581-1		582-1	
583-1		584-1		585-1	
586-1		587-1		588-1	
589-1		590-1		591-1	
592-1		593-1		594-1	
595-1		596-1		597-1	
598-1		599-1		600-1	
601-1		602-1		603-1	
604-1		605-1		606-1	
607-1		608-1		609-1	
610-1		611-1		612-1	
613-1		614			

APÊNDICE 2. Ficha individual de investigação – Intoxicação por agrotóxicos

FICHA INDIVIDUAL DE INVESTIGAÇÃO		INTOXICAÇÃO POR AGROTOXICO	
50-APARELHO RESPIRATÓRIO 1-SIM 2-NÃO 3-IGNORADO ☒ 2 DISPNEIA ☒ 2 TOSSE ☒ 2 SECREÇÃO BRÔNQUICA ☒ 2 EDMA PULMONAR ☒ 1 IRRITAÇÃO NASAL			
51-PELE E MUCOSAS 1-SIM 2-NÃO 3-IGNORADO ☒ 2 IRRITAÇÃO OCULAR ☒ 2 DC IRRITATIVA ☒ 2 DC SENSIBILIZANTE ☒ 2 QUEIMADURA			
52-APARELHO URINÁRIO 1-SIM 2-NÃO 3-IGNORADO ☒ 2 DIMINUIÇÃO DO FLUXO/OLIGÚRIA ☒ 2 URINA ESCURA/HEMATÚRIA ☒ 2 INSUFICIÊNCIA RENAL			
53-VIA DE INTOXICAÇÃO PRINCIPAL ☒ 1 1-ORAL 2-DIGESTIVA 3-RESPIRATÓRIA 4-OUTRA			
54-TEMPO DECORRIDO ENTRE CONTATO COM OS AGROTÓXICOS E OS SINTOMAS ☒ 6 1-HORAS 2-DIAS 3-MESES ☒ 4 4-HORAS 5-DIAS 6-MESES 55-N. DE INTOXICAÇÕES ANTERIORES ☒ 1 1-C/INTERRAÇÃO 2-S/INTERRAÇÃO			
DADOS LABORATORIAIS 1-NORMAL 2-ALTERADO 3-NÃO REALIZADO 4-IGNORADO 56- ☐ EDISON/OLIVBOND DATA ____/____/____ 57- ☐ ELMA/ACT-PLASMÁTICA DATA ____/____/____ 58- ☐ ELMA/ACT-ERITROCITÁRIA DATA ____/____/____			
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA INTOXICAÇÃO ATUAL 59- ☒ 1-ACIDENTE DE TRABALHO 2-AMBIENTAL 3-INTENTATIVA DE SUICÍDIO 4-ACIDENTAL 5-ALIMENTOS CONTAMINADOS 6-CRIMINOSA			
60-PRODUTO AGROTÓXICO NOME COMERCIAL: <u>PoliHum</u> PRINCÍPIO ATIVO OU CLASSE TOXICOLÓGICA: <u>Organofosforado</u> 1-_____ 2-_____ 3-_____			
61-CULTURA/LAVOURA 1-_____ 2-_____ 3-_____			
62-ATIVIDADE, NO CASO DA INTOXICAÇÃO ATUAL ☒ 1 1-DILUIÇÃO 2-TRATAMENTO DE SEMEIO 3-ARMAZENAMENTO 4-COLHEITA 5-PLUVIALIZAÇÃO 6-TRANSPORTE 7-OUTROS 8-NÃO SE APLICA 63-TIPO DE CONTATO ☒ 1 1-DIRETO 2-INDIRETO 3-SEM CONTATO 4-TEMPO DE EXPOSIÇÃO ____ 5-HORAS 6-DIAS 7-MESES 8-ANOS			
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS EM CASO DE CONTATO COTIDIANO COM PRODUTOS AGRÍCOLAS 65-COMPRÁ DO PRODUTO ☒ 1 1-REPRESENTANTE 2-COMÉRCIO LOCAL 3-OUTROS MUNICÍPIOS 4-COOPERATIVA 5-FUNGEIRIA 6-NÃO SE APLICA 7-IGNORADO 66-ORIENTAÇÃO DE USO ☒ 1 1-SEM ORIENTAÇÃO 2-PROFISSIONAL 3-VEICULADOR 4-OUTROS 5-NÃO SE APLICA			
67-UTILIZA RECIPIENTAR AGROMÔNICO ☒ 1 1-SIM 2-NÃO 3-NÃO SE APLICA 4-IGNORADO 58-ORIGEM E TEMPO DE CARÊNCIA ☒ 1 1-SIM 2-NÃO 3-NÃO SE APLICA 4-IGNORADO			
68-UTILIZA EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL ☒ 1 1-SIM 2-NÃO 3-NÃO SE APLICA 4-IGNORADO 70-DESTINO DAS EMBALAGENS VAZIAS ☒ 1 1-VENDIDA 2-DEIXADA NO CAMPO 3-REAPROVEITADA 4-DEPOSITO DE LIXO COMUM 5-DEPOSITO DE LIXO TÓXICO 6-DEIXADA EM LIXO 7-DEVOLVIDA AO COMERCIANTE 8-OUTROS			
71-LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO ☒ 1 1-LUGAL PRÓPRIO 2-LUGAL 3-NO CAMPO 4-NÃO LAVA 5-OUTRO 6-NÃO SE APLICA 7-IGNORADO			
CONCLUSÃO DO CASO 72-DIAGNÓSTICO ☒ 1 1-COMPROVADO 2-DESCARTADO 3-PENHORANTE 73-CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO ☒ 1 1-C. CLÍNICO-LABORATORIAL 2-C. CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 74-EVOLUÇÃO DO CASO ☒ 1 1-CURA 2-CURA COM SEQUELA 3-ÓBITO 4-SEM AVALIAMENTO			
75-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT. ☒ 1 1-EMPRESA/EMPREGADOR 2-SERVIÇO DE SAÚDE 3-EQUIPE DE VIGILÂNCIA 4-TRABALHADOR/FAMILIARES 5-SIMULADO 6-NÃO ENVIADA 7-NÃO SE APLICA 8-IGNORADO			
INVESTIGAÇÃO 76-NOME DO MUNICÍPIO/UNIDADE DE SAÚDE: <u>Asupongas</u> 77-CÓDIGO DA UNIDADE DE SAÚDE: _____ 78-NOME: <u>Ismael C. M. Camalhi</u> 79-FUNÇÃO: <u>Enfermeiro</u> 80-DATA: <u>25.01.01</u> 81-ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u> DIA/MÊS/ANO: <u>25/01/96</u>			