HANS VIERTLER

BIBLIOTECA
Instituto de Química
Universidade de São Paulo

8255

ESPECTROSCOPIA NO ULTRAVIOLETA DE
CICLOALCANONAS α -ALQUILTIO-
SUBSTITUÍDAS

Tese de Livre Docência — Instituto de Química
Universidade de São Paulo

SÃO PAULO

1978

Companion, comforter and guide
and friend,
As much as love asks love, does
thought ask thought.

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que de alguma forma quer com sua colaboração direta, quer com sua amizade e apoio, contribuíram para que esta tese se tornasse possível.

Em particular agradeço:

A Profa.Dra. Blanka Wladislaw pelas valiosas discussões e constante estímulo.

As Profa.Dra. Vera Lúcia Pardini, Sra. Elisa Demant e Srta. Heloísa D.Cajon pela efetiva participação no desenvolvimento do presente trabalho.

Aos Profs.Drs. Robert Rittner, Paulo R.Olivato e José A.Vanin pela execução e discussão de alguns espectros de ressonância magnética nuclear e infravermelho.

A Sra. Isabel C.C.Calegão pela doação de algumas de suas amostras.

A Dra. Lílina Marzorati pelo cuidado com que reviu o manuscrito e pelas críticas construtivas.

A Sra. Neyde Barranjar pelo zelo e dedicação na dactilografia.

ÍNDICE

	Pag.
Capítulo I - O GRUPO CARBONILA E A TRANSIÇÃO ELETRÔNICA	
$n \rightarrow \pi^*$	1
1.1. Introdução.	1
1.2. Interações intramoleculares e seus efeitos sobre as transições eletrônicas do grupo carbonila.	4
1.2.1. Interações entre o grupo carbonila e outros grupos funcionais	4
1.2.2. Interações entre o átomo de enxofre e o gru po carbonila.	15
Capítulo II - RESULTADOS E DISCUSSÃO.	24
2.1. Introdução	24
2.2. Resultados	25
2.3. Discussão.	47
Capítulo III - PARTE EXPERIMENTAL	63
3.1. Instrumentos, medidas espectroscópicas e análises.	63
3.2. Compostos.	64
3.2.1. Solventes	64
3.2.2. Compostos disponíveis em nosso laboratório.	64
3.2.3. Compostos sintetizados.	65
3.2.3.1. 2-Etiltiociclohexanona (XXX)	65
3.2.3.2. 2-t-Butiltiobutilciclohexanona (XXXI)	66
3.2.3.3. 2-Eiltio-2-metilciclohexanona (XXXII).	68
3.2.3.4. 2-Eiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIV).	69

3.2.3.5. Octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)- naftalenona (XXXVIII)	71
3.2.3.6. Reações de sulfenilação de cetonas .	74
3.2.3.7. 2-Metiltiociclohexanona (XXIX) . . .	75
3.2.3.8. 2-Metiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIII)	76
3.2.3.9. Octahidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)- naftalenona (XXXVII)	76
3.2.3.10. 3-Metiltio-1,7,7-trimetilbiciclo- [2.2.1] heptanona-2 (XLII)	77
SUMÁRIO	79
SUMMARY	80
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	81

CAPÍTULO I

O GRUPO CARBONILA E A TRANSIÇÃO ELETRÔNICA $n \rightarrow \pi^*$

1.1. INTRODUÇÃO

As moléculas que contêm oxigênio em um grupo insaturado, geralmente mostram, nos espectros eletrônicos, bandas de absorção de intensidade reduzida ($\epsilon = 10$ a 100). Burawoy¹ as denominou *bandas - R*, pois imaginava que eram associadas a um estado excitado biradicalar. Como a existência destas bandas é devida a transições de elétrons não-ligantes a orbitais π anti-ligantes², Kasha³ as chamou de $n \rightarrow \pi^*$ ou então, bandas $n - \pi$.

Aldeídos e cetonas alifáticas apresentam uma banda de absorção $n \rightarrow \pi^*$ fraca na região de 290 nm ($\epsilon = 15$) e foi pelo estudo detalhado do formaldeído^{4,5a} que as propriedades características desta banda foram estabelecidas. Esta transição, no formaldeído, é proibida por simetria, pois o produto de um orbital p_x e um p_y não possui momento dipolar. A intensidade das bandas $n \rightarrow \pi^*$ depende somente da simetria local do orbital não-ligante. Assim, no caso do acetaldeído, a transição em questão seria permitida considerando a simetria total da molécula, porém, a banda é de baixa intensidade devido à simetria local da ligação $C=O$.

Além da banda de absorção $n \rightarrow \pi^*$ de baixa intensidade, o acetaldeído e a acetona mostram duas regiões de absorções intensas, entre 100 e 200 nm ⁶. As bandas em comprimentos de onda maiores foram atribuídas por McMurry² a transições $n \rightarrow \sigma^*$, porém, uma outra possibilidade seria uma transição $\sigma \rightarrow \pi^*$ ⁴, pois ambas seriam transições permitidas. As de comprimento de onda menor, em 170 nm , corresponderiam a uma transição $\pi \rightarrow \pi^*$ ².

A posição da banda $n \rightarrow \pi^*$ da acetona e de outros compostos carbonílicos depende da natureza do solvente e, no caso da acetona, nota-se um deslocamento hipsocrômico ou deslocamento para o azul, indo de solventes apolares a polares⁴. Esta propriedade é, geralmente, observada com as bandas $n \rightarrow \pi^*$ e foi considerada como a maior evidência do caráter das transições eletrônicas responsáveis pelas mesmas.

Um estudo de Bayliss e Johnson^{7a} de efeitos de solventes sobre as intensidades das bandas $n \rightarrow \pi^*$ de várias cetonas alifáticas acíclicas e da ciclohexanona mostrou não existir uma solução simples para o problema. A intensidade da transição $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila, no estado gasoso, é considerada como resultante do *empréstimo* de intensidade de transições permitidas de maior energia, devido a uma perturbação vibracional. Os autores consideram a chave para o problema das intensidades, em solução, a maneira pela qual as perturbações causadas pelas moléculas de solventes afetariam este *empréstimo* de intensidade. Cálculos efetuados pelos mesmos pesquisadores^{7b} resultaram em intensificações das bandas, cuja concordância com os dados experimentais era satisfatória.

A causa do pronunciado efeito de solvente parece estar intimamente ligada à grande mudança de distribuição eletrônica quando a molécula é excitada. O deslocamento hipsocrômico da banda $n \rightarrow \pi^*$ é particularmente importante quando um hidrocarboneto é substituído por um solvente hidroxílico. No estado fundamental, a formação de ponte de hidrogênio com o par solitário de elétrons não-ligantes é muito mais importante do que no estado excitado, onde um dos elétrons é removido do orbital n e promovido a um orbital π^* anti-ligante.

McConell⁸ e Pimentel⁹ apontaram que o princípio de

Franck-Condon era um fator importante no efeito do solvente nas transições $n \rightarrow \pi^*$. Assim, o máximo da banda de absorção seria determinado pela configuração particular das moléculas de solvente, favorecida no estado fundamental. Nos espectros de emissão a solvatação que confere a maior estabilidade ao estado excitado, seria responsável pela posição do máximo da banda. Desta maneira, enquanto um deslocamento para o azul de 15 nm é observado no espectro de absorção da acetona, substituindo hexano por água, a posição da banda de fluorescência em 300 nm não é afetada⁴.

O efeito de solventes, entretanto, deve ser interpretado com cautela, pois vários fatores como as conformações moleculares, podem afetar sensivelmente a solvatação^{10a,b}.

A intensidade (ϵ) da banda $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila normalmente é da ordem de 20, porém, compostos carbonílicos substituídos em diferentes posições, relativamente ao grupo carbonila, mostraram uma intensificação da transição $n \rightarrow \pi^*$ em relação aos análogos não substituídos, apesar da não ocorrência de interação direta entre os substituintes e o grupo carbonila. Uma discussão dos fatores responsáveis por tais observações, bem como uma exaustiva revisão bibliográfica, foram apresentadas por Tru_fem¹¹.

A transição $n \rightarrow \pi^*$ normal do grupo carbonila é proibida para a absorção de dipolo elétrico, porém é permitida para a de dipolo magnético. Quando a primeira se torna permitida, têm-se as condições para a rotação óptica¹². A força rotacional (R_K)^{13a} pode ser escrita como produto escalar:

$$R_K = \mu_e^K \cdot \mu_m^K \quad (1)$$

onde μ_e^K e μ_m^K possuem as dimensões de um momento dipolar elétrico e de um magnético, respectivamente. Quando uma molécula possui um centro de simetria ou um plano de simetria, o produto da relação (1) será igual a zero e a molécula será opticamente inativa. Os elétrons envolvidos nas transições de cetonas saturadas estão localizados, essencialmente, no grupo carbonila que possui dois planos de simetria e, portanto, em primeira aproximação, as regras de simetria acima referidas aplicar-se-iam ao cromóforo, como se fosse a molécula inteira. Qualquer atividade óptica, associada com as transições do cromóforo, apareceria em virtude de uma perturbação não-simétrica dos elétrons envolvidos nas transições, por uma vizinhança assimétrica ou quiral. Moffitt *et al.*¹⁴ baseados nestes princípios de simetria, deduziram uma simples regra de octantes^{13b}, que relaciona o sinal e a amplitude do efeito Cotton, exibido por cetonas saturadas, e a disposição dos átomos no espaço ao redor do grupo carbonila das cetonas. Desde aquela época, a regra dos octantes tem sido objeto de estudos tanto experimentais como teóricos¹⁵.

1.2. INTERAÇÕES INTRAMOLECULARES E SEUS EFEITOS SOBRE AS TRANSIÇÕES ELETRÔNICAS DO GRUPO CARBONILA

As interações intramoleculares serão discutidas em duas partes: a primeira (1.2.1.) envolvendo o grupo carbonila e quaisquer átomos ou grupos substituintes, com exceção do átomo de enxofre, que será objeto de discussão da segunda parte (1.2.2.).

1.2.1. Interações entre o grupo carbonila e outros grupos funcionais

Um átomo de halogênio, na posição α em relação ao grupo carbonila, em cetonas acíclicas, como a cloroacetona, não

apresenta um efeito sensível sobre a transição $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila. Em cetonas cíclicas α -halogenosubstituídas, no entanto, esta transição mostrou ser influenciada pela estereoquímica dos compostos envolvidos^{5b}. Cookson¹⁶ e Leonard e Owens¹⁷, estudando α -halogenocicloalcanonas, observaram que, quando cloro ou bromo eram equatoriais, havia pequenos deslocamentos hipsocrômicos (~ 5 nm) e reduzida ou nenhuma intensificação das bandas de absorção $n \rightarrow \pi^*$ em relação às cetonas análogas não substituídas. Átomos de cloro ou bromo axiais, entretanto, produziam deslocamentos batocrômicos de 10 e 20 a 30 nm, respectivamente, acompanhados de uma pronunciada intensificação das bandas.

Allinger e col.¹⁸ estudaram teoricamente as transições $n \rightarrow \pi^*$ de α -halogenociclohexanonas e concluíram que a interação entre um orbital π^* do grupo carbonila ($C=O$) e um orbital σ^* da ligação carbono-halogênio ($C-X$), de energia relativamente baixa quando o halogênio era axial, seria responsável pelo deslocamento batocrômico observado. A fig. 1 mostra o diagrama de interação proposto, podendo ser considerado como uma interação hiperconjugativa entre os orbitais $\pi^*_{C=O}$ e σ^*_{C-X} .

Figura 1

Labhart e Wagnière¹⁹ verificaram que a intensificação da transição $n \rightarrow \pi^*$ não era a única característica das cetonas cíclicas β, γ -insaturadas (I, II). Os espectros no ultravioleta destes compostos mostravam uma outra banda em aproximadamente 210 nm e os autores sugeriram que ela corresponderia a um

estado de transferência de carga, também responsável pela intensificação da transição $n \rightarrow \pi^*$. Murrell⁴, partindo do ponto de vista que dois estados interagem apenas quando há participação ou do mesmo orbital doador ou do mesmo orbital aceptor, examinou a possibilidade de dois estados de transferência de carga interagirem com o estado $n \rightarrow \pi^*$ (ψ_n^c) (fig. 2).

Figura 2

Os cálculos mostraram que o entrosamento entre ψ_{-1} e ψ_c era maior do que entre ψ_1 e ψ_n , portanto, a banda correspondente ao estado ψ_1^c deveria ser mais intensa do que aquela correspondente ao estado ψ_n^{-1} . Consequentemente, o autor achou mais provável ser o estado de transferência de carga ψ_1^c o responsável pelo aumento de intensidade da transição $n \rightarrow \pi^*$ (ψ_n^c). Este mesmo estado de transferência de carga seria responsável pela banda em cerca de 210 nm.

Cookson e col.²⁰ estudaram cetonas γ, δ -insaturadas e β -aminosubstituídas, nas quais havia dois orbitais p separados por três ligações σ . Verificaram que estes compostos apresentavam uma banda de transferência de carga na região do ultravioleta. A transição responsável por esta banda foi denominada de *sigma acoplada* pois a sua existência foi explicada pela interação entre os dois orbitais p através das ligações σ que os separavam. Hudec²¹ examinou empiricamente as propriedades espectroscópicas (espectros no ultravioleta, dicroísmo circular e dispersão óptica rotatória) de α - e β -aminociclohexanonas através da análise conformacional e concluiu que existiam dois caminhos pelos quais dois grupos funcionais podiam interagir através das ligações σ . As conclusões desta análise foram reunidas em oito regras, das quais quatro são de interesse nos espectros no ultravioleta:

(i) Uma parte do deslocamento batocrômico em transições $n \rightarrow \pi^*$ será resultante do acoplamento dos níveis de energia π/π^* do grupo carbonila $C=O$ e σ/σ^* das ligações $C-N$, quando estes podem interagir, posição axial para as α - (III) e equatorial para as β -aminocetonas (IV) (arranjo W).

III

IV

(ii) A outra parte do deslocamento batocrômico em transições $n \rightarrow \pi^*$ resultará quando o par solitário de elétrons, no nitrogênio, for trans-diaxial em relação à ligação $C_\alpha - C=O$ com o N ligado ao carbono α (V) ou trans-diaxial em relação à ligação $C_\alpha - C_\beta$ com o N no carbono β (VI).

V

VI

(iii) Quando a condição (ii) for satisfeita, a probabilidade da transição $n \rightarrow \pi^*$ será aumentada ($\epsilon \approx 50 - 80$) e uma nova banda aparecerá em comprimento de onda menor, descrita como uma transição *sigma acoplada*²⁰. Uma alternativa para a descrição desta banda seria um desdobramento da transição $\pi \rightarrow \pi^*$ pelo acoplamento com o par solitário do nitrogênio, sendo o componente de menor energia deslocado para 220 - 240 nm.

(iv) Quando o par solitário do átomo de N em α for cis à ligação $C_\alpha - C=O$ (VII) ou cis à ligação $C_\alpha - C_\beta$ (VIII) em uma β -aminocetona, a probabilidade da transição $n \rightarrow \pi^*$ não será

aumentada. Aplica-se a mesma conclusão quando a ligação C-N no carbono β for axial (IX).

VII

VIII

IX

As conclusões empíricas estão de acordo com um tratamento teórico da interação de orbitais através das ligações²²; entretanto, outros fatores têm importância nestas interações, tais como as energias relativas dos orbitais π e π^* do grupo carbonila, σ e σ^* da ligação carbono-nitrogênio e n do nitrogênio. No caso do nitrogênio ser substituído por oxigênio ou enxofre, a simetria dos substituintes destes átomos, provavelmente, deveria influir sobre as interações.

Levin *et al.*²³ estudaram teoricamente as interações existentes nos acetaldeído e acetona α -aminosubstituídos. Consideraram três graus de liberdade nos cálculos efetuados:

1 - Torção descrita pelo ângulo $\emptyset$ (Xa) que corresponde à rotação em torno da ligação C(1) - C(2) e é igual a zero quando a ligação C(2) - N eclipsa com a ligação C(1) - O.

2 - Torção em torno da ligação C(2) - N, descrita pelo ângulo θ (Xb) que é igual a zero quando o orbital n do nitro

gênio eclipsa com a ligação C(1) - C(2).

3 - Ângulo da ligação C-C-N

X

A fig. 3 mostra as projeções de Newman (A) que ilustram as definições de θ e ϕ e de algumas conformações importantes nos cálculos (B).

Figura 3

Cinco interações básicas foram consideradas na determinação da energia dos orbitais importantes - os dos dois pares solitários de elétrons e dos orbitais π e π^* do grupo carbonila: (a) uma interação através do espaço dos pares solitários do oxigênio e nitrogênio; (b) uma interação através das ligações em que estão envolvidos os pares solitários e a ligação σ C(1)-C(2); (c) uma hiperconjugação entre a ligação C-N e o sistema π do grupo carbonila; (d) uma interação direta entre o par solitário de elétrons do nitrogênio com o sistema π do grupo carbonila; (e) uma ponte de hidrogênio entre o par solitário de elétrons do C=O

e os hidrogênios do amino-grupo.

Dois tipos de cálculos foram efetuados diferindo apenas pelo nível de sofisticação, porém, os resultados obtidos concordaram razoavelmente. Em cada caso, os dois orbitais ocupados de maior energia, são combinações dos orbitais dos pares solitários (n_s : simétrico e n_a : anti-simétrico) sendo o simétrico (n_s) de maior energia. O desdobramento dos níveis energéticos dos pares solitários é função de interações através do espaço e das ligações, com a segunda predominando. A interação através do espaço mostrou-se mais importante para $\phi = 0$ e $\theta = 0$ ou 180° , enquanto que o acoplamento através das ligações seria máximo para os conformeros ($\phi, \theta = 0$) e ($\phi, \theta = 180^\circ$).

O espectro no ultravioleta da 1-azabicyclo [3.3.1] nonanona-3 (XI) foi examinado à luz dos resultados dos cálculos. O ângulo ϕ teria um valor entre 150 e 180° e o ângulo θ próximo

XI

a 180° . A transição de comprimento de onda maior em (XI) apresentava um deslocamento batocrômico com o decréscimo da polaridade do solvente, o que estaria de acordo com uma transição $n \rightarrow \pi^*$ e envolveria a promoção de um elétron do nível n_s . A segunda transição eletrônica, em 235 nm , foi considerada como sendo a excitação de um elétron do nível n_a e alguns aspectos do espectro sustentavam tal hipótese. Os autores concluíram que as propriedades espectrais eram extremamente sensíveis em relação ao grau

de liberdade θ . A mesma dependência de θ foi observada quando a força rotacional da transição $n_s \rightarrow \pi^*$ foi calculada e pequenas variações de θ podiam alterar tanto o sinal como a magnitude da quela.

Uma manifestação experimental²³ da interação dos pares solitários de elétrons através das ligações foi observada em dados da espectroscopia fotoeletrônica na série de (XII) a (XIV). Encontrou-se uma diferença nos potenciais de ionização de 1,03 eV entre os pares solitários de (XII) e (XIII), porém, esta diferença aumentou para 1,59 eV em (XIV) devido à interação através das ligações. Um fato inesperado, no entanto, foi o de o potencial de ionização em (XIV, 8,24 eV) ser maior do que aquele observado em (XIII, 8,02 eV).

(XII) 9.05 eV

(XIII) 8.02 eV

(XIV) 8.24 eV 9.83 eV

Com o objetivo de obter maiores esclarecimentos acerca das transições *sigma acopladas*, Verhoeven e col.²⁴ verificaram que o espectro no ultravioleta da aminocetona (XV) apresentava uma banda de absorção em 243 nm (n-hexano, $\epsilon = 1366$) inexistente nos análogos não substituídos. Os autores sugeriram que esta transição possuía a natureza de transferência de carga, envolvendo a excitação de um elétron do par solitário do nitrogênio a um orbital π^* do grupo carbonila. A transição em questão parecia *emprestar* a maior parte de sua intensidade da transição $\pi \rightarrow \pi^*$ do $C=O$, o que implicaria em uma interação dos orbitais

do grupo carbonila e do par solitário do nitrogênio. Considerando a transição $n \rightarrow \pi^*$ de (XV), esta interação ocorreria, principalmente, entre o par solitário e o nível π ocupado mais elevado e esta hipótese parecia ser sustentada pela transferência de carga relativamente pequena no estado fundamental.

XV

O espectro fotoeletrônico²⁵, entretanto, mostrou que os potenciais de ionização para o par solitário do nitrogênio em (XV) era de 8,21 eV e para o 1-aza-adamantano, o análogo não substituído, era de 7,94 eV. Os autores explicaram esta diferença como resultante do efeito indutivo do grupo carbonila sobre o nitrogênio e excluíram a interação através das ligações com o orbital π do grupo carbonila, cujos potenciais de ionização em (XV) e na adamantanona, o análogo não substituído, eram de 8,81 e 8,80 eV, respectivamente.

Ernstbrunner e Hudec²⁶ relataram as mudanças relativas nas energias das transições $n \rightarrow \pi^*$ em uma série de cetonas substituídas por fluor e iodo. Os deslocamentos batocrômico ou hipsocrômico observados dependiam do número de ligações C-C entre o grupo carbonila e os substituintes em posições nas quais as interações eram possíveis (ver ref. 21, pág.7). Assim, as cetonas α - e γ -fluorossustituídas mostraram deslocamentos batocrômicos relativos maiores do que as correspondentes substituídas

por iodo, enquanto que deslocamentos hipsocrômicos eram observados nas β - e δ -substituídas. As cloro e bromo cetonas apresentaram um comportamento intermediário. Dois fatores foram avocados para explicar estas observações: (a) o efeito indutivo de um substituinte não se manifestaria por um decréscimo uniforme da densidade eletrônica, mas através de uma alternância de cargas ao longo da cadeia carbônica; (b) a dependência das perturbações causadas pelos substituintes das conformações moleculares. Devido ao fator (a) resultaria uma estabilização ou desestabilização dos orbitais n do oxigênio carbonílico. O efeito do deslocamento σ poderia ser modificado ou mesmo alterado em sentido pela retrodoação π do substituinte e, segundo os autores, o efeito global seria responsável pela mudança da energia de transição. Em cetonas α - e γ -substituídas, o efeito do deslocamento σ controlaria, principalmente, os níveis π/π^* , enquanto que o nível n seria controlado pela retrodoação π . Efeitos opostos seriam observados nas cetonas β - e δ -substituídas. Estas conclusões foram baseadas no fator (b).

Hudec²⁷ a fim de avaliar o efeito do par solitário de elétrons do nitrogênio, um doador π , sobre as transições $n \rightarrow \pi^*$, estudou as propriedades espectroscópicas de cetonas axial- e equatorialmente substituídas na posição β pelo grupo trimetilestanila (Me_3Sn), um doador σ ²⁸. Os resultados observados permitiram estabelecer uma analogia entre a ligação C-Sn, doadora σ e o par solitário do nitrogênio doador π , quando adequadamente orientados nas moléculas.

Em 1976, Verhoeven e col.²⁹ analisaram, através da espectroscopia no ultravioleta, cetonas com β - e γ -substituintes com pares solitários facilmente ionizáveis ou elétrons π e concluíram que, se a geometria das moléculas favorecia uma interação en

tre o grupo carbonila e um substituinte, transições *sigma acopladas* eram observadas. Como a transição $\pi \rightarrow \pi^*$ em compostos carbonílicos ocorre em frequências muito maiores, os autores sugeriram que as intensidades das transições *sigma acopladas* eram devidas a outras configurações localmente excitadas, por exemplo, dos substituintes das cetonas.

1.2.2. Interações entre o átomo de enxofre e o grupo carbonila

Em 1949, Fehnel e Carmack³⁰ observaram que cetonas, contendo um grupo alquiltio ligado ao carbono α em relação ao grupo carbonila, apresentavam espectros no ultravioleta diferentes daqueles dos compostos análogos não substituídos. Assim, enquanto os sulfetos absorviam em 210 nm ($\epsilon = 1000 - 1800$) e as cetonas na região de 275 a 295 nm ($\epsilon = 15 - 30$), os cetosulfetos estudados pelos autores absorviam nas regiões de 295 a 300 nm ($\epsilon = 300$) e de 240 a 245 nm ($\epsilon = 400$). Para explicar estes espectros anômalos, foram sugeridos dois tipos de interação: a hiperconjugação e uma interação eletrônica direta entre o átomo de enxofre e o grupo carbonila.

Leonard e col.³¹ observaram que o espectro no ultravioleta da 5-tiaciclooctanona (XVI) apresentava uma banda de absorção em 237 nm, ausente nas cetona e sulfeto análogos não substituídos. Um estudo da influência de solvente nesta banda mostrou um deslocamento batocrômico ao passar de solventes apolares para polares. Baseando-se neste fato e considerando a elevada intensidade desta transição ($\epsilon = 2600$), os autores concluíram ser o estado excitado mais polarizado que o fundamental.

XVI

Bergson e Delin³² efetuaram um estudo das interações nos estados fundamental e excitado da 4-tiahexanona-2 (XVII) pelos métodos da espectroscopia no infravermelho e no ultravioleta.

(XVII)

A diminuição da frequência de estiramento da carbonila neste composto, em comparação com o não substituído, foi atribuída a uma redução da constante de força da carbonila. Os autores, baseados em um estudo da influência de solventes sobre a transição $n \rightarrow \pi^*$ em aproximadamente 300 nm, concluíram que o estado fundamental da molécula era mais polar do que o seu estado excitado. Esta conclusão era contrária à de Leonard e col.³¹, o que mostrava a importância das posições relativas do átomo de enxofre e do grupo carbonila.

Paquette e Wise³³, em 1967, sugeriram que a tiacetona (XVI) estudada por Leonard e col.³¹, devido a sua mobilidade conformacional, não permitia relacionar a interação heteroátomo-carbonila com a distância interatômica entre os centros envolvidos. Sintetizaram duas tetrahydro-1,4-tiapironas (XVIIIa,b) com o anel de seis membros da tiacetona em conformação barco rígida.

(a) $n=1$; (b) $n=2$

XVIII

Apesar da interação transanular no estado fundamental não ficar bem caracterizada, o espectro no ultravioleta mostrou uma banda de absorção em aproximadamente 240 nm. Com base no estudo do deslocamento batocrômico desta banda com o aumento da polaridade do solvente, os autores a atribuíram a uma transferência de carga do enxofre ao grupo carbonila. Um fato digno de nota são as diferenças entre as intensidades das bandas observadas na cetona (XVI) ($\epsilon = 2600$) e aquelas dos compostos (XVIIIa) ($\epsilon = 170 - 230$) e (XVIIIb) ($\epsilon = 290 - 450$). Paquette e Wise sugeriram que estas diferenças poderiam ser atribuídas a uma dependência da geometria da interação entre os orbitais $\text{S}-\text{C}_{\text{C}=\text{O}}$, pois a maior mobilidade conformacional de (XVI) permitiria uma interação orbital mais favorável.

Um estudo polarográfico efetuado por Herzs Schuh e Borsdorf³⁴ com 3-, 4- e 5-tiacicloalcanonas (XVI, XIX - XXIII) mostrou que as reduções eram consideravelmente mais fáceis do que as das cetonas análogas sem enxofre.

$X = 1, Y = 2$ (XIX) ; $X = 1, Y = 3$ (XX) ; $X = 1, Y = 4$ (XXI)

$X = 2, Y = 2$ (XXII); $X = 2, Y = 3$ (XXIII)

$X = 3, Y = 3$ (XVI)

A ordem decrescente na facilidade de redução era 3-tiacicloalcanonas (XIX - XXI), 4-tiacicloalcanonas (XXII - XXIII) e a 5-tiaciclooctanona (XVI). Os espectros no ultravioleta dos compostos estudados mostraram não serem uma simples sobreposição dos espectros de um sulfeto e uma cetona, mas que havia deslocamentos batocrômicos e intensificações das bandas de absorção observadas. Estas alterações eram especialmente pronunciadas nos espectros das 3-tiacicloalcanonas (XIX - XXI). A comparação dos potenciais de meia-onda com os respectivos espectros no ultravioleta levou os autores a sugerir que a facilidade de redução polarográfica resultaria de uma interação entre o enxofre e o grupo carbonila.

Wladislaw e col.³⁵ relataram que cetonas, substituídas em α por um grupo alquiltio, apresentavam diminuições de basicidade quando comparadas com as análogas não substituídas. Estas diminuições eram acompanhadas por deslocamentos das bandas correspondentes ao estiramento do grupo carbonila para frequências menores. Para explicar estes fatos experimentais, os autores propuseram a existência de transferência de carga do grupo carbonila para um orbital vazio do enxofre. Não foi eliminada, entretanto, a possibilidade de estarem operando efeitos não eletrônicos, tais como impedimento estérico à formação de pontes de

hidrogênio e perturbações mecânicas originárias da substituição do hidrogênio em α por um átomo de enxofre.

O estudo dos espectros no ultravioleta de algumas cetonas e derivados de ácidos carboxílicos substituídos em α por enxofre foi efetuado por Wladislaw e col.³⁶ a fim de tentar esclarecer a natureza da interação entre o grupo carbonila e o átomo de enxofre em posição α . Os autores observaram que a introdução de grupos alquiltio mais ramificados causava uma diminuição de intensidade e um deslocamento hipsocrômico da transição $n \rightarrow \pi^*$, em cerca de 300 nm, quando comparada com a 4-tiahexanona-2 (XVII). Foi sugerida uma rotação restrita ao redor da ligação $C(CO) - C(\alpha)$, resultando em uma geometria desfavorável à interação dos orbitais $S-C_{CO}$. Como um segundo máximo de absorção, observado nos espectros em aproximadamente 240 nm, mostrava um comportamento semelhante ao da transição $n \rightarrow \pi^*$, Wladislaw e col. concluíram que existia uma interdependência entre as duas bandas e que a transição de menor comprimento de onda poderia ser considerada como devida a uma transferência de carga, sendo a fonte da intensidade da transição $n \rightarrow \pi^*$.

Snatzke e Wolfram³⁷ estudaram, em 1972, as propriedades quirópticas de derivados do tiaadamantano (XXIV). A cetona (XXV) apresentava, no espectros de absorção no ultravioleta, duas bandas de máximos em 311 nm ($\epsilon = 269$) e 254 nm ($\epsilon = 324$) cuja origem os autores explicaram pela aplicação das regras de Hudc (pág. 7)²¹. O espectro da sulfona de (XXV) também mostrava duas bandas: uma $n \rightarrow \pi^*$ em 297 nm ($\epsilon = 45$) e outra em 248 nm ($\epsilon = 83$). A primeira estava de acordo com a expectativa pois o enxofre não possuía mais os seus pares solitários de elétrons, porém, a segunda somente pode ser explicada, admitindo que a ligação $S=O$ pudesse desempenhar um papel semelhante ao dos pares solitários

do enxofre.

XXIV

XXV

Cook e Djerassi³⁸ investigaram os efeitos de oxigênio, nitrogênio e enxofre sobre a transição $n \rightarrow \pi^*$ em sistemas heterocíclicos de seis membros, pela técnica do dicroísmo circular (DC). A (6S)-6-metiltetrahidrotiopiranona-3 (XXVI) e o sulfóxido correspondente mostraram uma banda DC positiva devida à transição $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila, sinal oposto àquele observado com os análogos de oxigênio e nitrogênio, embora os três pertencessem à mesma série de antípodas ópticos. Paralelamente o efeito Cotton era muito mais intenso no derivado contendo enxofre do que nos outros dois heterocíclicos. Um efeito semelhante tornou-se evidente nos espectros no ultravioleta onde a banda $n \rightarrow \pi^*$ de (XXVI) era aproximadamente dez vezes mais intensa (305 nm, $\epsilon = 178$) do que dos análogos com oxigênio e nitrogênio. As bandas DC negativas do β -cetossulfeto (XXVI) e de seu sulfóxido em 250 e 240 nm, respectivamente, resultariam, segundo os autores, de uma transição eletrônica do enxofre, provavelmente $n \rightarrow \sigma^*$.

XXVI

BIBLIOTECA
Instituto de Química
Universidade de São Paulo

A sulfona da (6S)-6-metiltetrahidrotiopiranona-3 mostrou apenas um efeito Cotton positivo em 305 nm de força rotacional reduzida. Também a sua transição $n \rightarrow \pi^*$ era de intensidade muito menor do que a observada em (XXVI). Em comprimentos de onda menores do que 270 nm não foram observadas bandas de absorção. Os autores concluíram que os efeitos Cotton observados em (XXVI) e em seu sulfóxido indicariam claramente uma interação entre o enxofre e o grupo carbonila.

As absorções no ultravioleta e infravermelho de algumas 3-tiacicloalcanonas, bem como as constantes de equilíbrio para os complexos de associação formados com p-clorofenol, determinadas pela espectroscopia de ressonância magnética protônica, sugeriram interações entre o enxofre e o grupo carbonila nos estados fundamental e excitado³⁹. Os dados experimentais indicaram que estas interações são diferentes do tipo transanular descritas para a 5-tiaciclooctanona (XVI)³¹. Buzzi *et al.*³⁹ concluíram que os resultados sugeriam interações de doação e retro-doação entre o enxofre e o grupo carbonila, dependentes das conformações moleculares, porém, não eram suficientes para decidir quais orbitais mais contribuíam e se as interações eram através do espaço ou através das ligações.

Olivato *et al.*⁴⁰ estudaram os espectros fotoeletrônico e no ultravioleta da 4-tiapentanona-2 (XXVII). O seu primeiro potencial de ionização era de 8,84 eV (par solitário do enxofre) enquanto que a segunda banda fotoeletrônica localizava-se em 9,90 eV (par solitário do oxigênio do grupo carbonila). A comparação com os potenciais de ionização do 2-tiapentano (8,49 eV) e da 2-pentanona (9,45 eV) mostrou que tanto o par solitário de elétrons do enxofre como do grupo carbonila foram estabilizados. Os autores sugeriram que nenhuma conclusão definitiva poderia

ser dada sem cálculos mecânico-quânticos refinados

(XXVII)

As bandas de absorção no espectro ultravioleta de (XXVII) em 302 e 240 nm foram atribuídas à transição $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila e a transição de camada de valência ($n \rightarrow \sigma^*$) do enxofre, respectivamente. Estes dados juntamente com os potenciais de ionização indicariam, segundo os autores, um alto grau de influência mútua entre os orbitais π^* e σ^* . Uma inversão das transições ou seja a banda em 240 nm corresponder à transição $n \rightarrow \pi^*$ e vice-versa para a $n \rightarrow \sigma^*$, parecia pouco provável, porém, a pouca informação sobre a interação entre os orbitais excitados, não permitiu a Olivato *et al.* excluir completamente esta interpretação.

Em 1977, Cole *et al.*⁴¹ analisaram os potenciais de ionização da 4-tiapentanona-2 (XXVII) correspondentes aos pares solitários do enxofre (8,84 eV) e do oxigênio carbonílico (9,90 eV) que indicaram uma estabilização nos dois casos. Uma estimativa dos potenciais de ionização de cada átomo em questão, considerando os efeitos indutivos mútuos do grupo carbonila e do átomo de enxofre, resultou em 9,75 eV (oxigênio carbonílico) e 9,17 eV (átomo de enxofre), respectivamente. Estes, quando comparados com os valores experimentais, mostraram que realmente houve uma desestabilização do nível eletrônico no enxofre e uma estabilização do nível eletrônico no oxigênio. Baseados neste resultado, os autores sugeriram uma interação através do espaço entre o enxofre e o grupo carbonila.

Recentemente⁴², foi determinado o espectro no ultra-

violeta afastado da 4-tiapentanona-2(XXVII) e os resultados sugeriram que existia pelo menos uma transição $n \rightarrow \sigma^*$ na região de 240 nm, separada de uma do tipo Rydberg $n \rightarrow 4s$, ambas envolvendo o enxofre. Nos espectros de sulfetos de alquila simples existiam indicações para as mesmas transições, porém no composto estudado as duas bandas apareceram claramente separadas. As bandas fotoeletrônicas de (XXVII) influenciadas pela interação entre os orbitais dos pares solitários deslocaram-se para energias maiores, enquanto que as bandas $n \rightarrow \sigma^*$ e $n \rightarrow \pi^*$ se deslocaram em sentido contrário.

CAPÍTULO II

RESULTADOS E DISCUSSÃO2.1. INTRODUÇÃO

A posição e intensidade das bandas de absorção $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila em cetonas substituídas dependem acentuadamente das conformações moleculares (ver referências 16, 17, 21 e 23 por exemplo). Os espectros no ultravioleta de cetonas α -alquiltiosubstituídas apresentam duas bandas de absorção nas regiões de 295 a 300 nm ($\epsilon = 300$) e de 240 a 245 nm ($\epsilon = 400$) e a sua existências fôra explicada pela interação entre o átomo de enxofre e o grupo carbonila³⁰. Wladislaw e col.³⁶, estudando os espectros eletrônicos de compostos carbonílicos com diferentes grupos alquiltio ligados ao carbono α em relação ao grupo carbonila, sugeriram que a interação entre o enxofre e o grupo carbonila dependia das conformações das moléculas consideradas.

Assim, das quatro conformações possíveis (XXVIIIa-d), duas foram sugeridas (XXVIIIb-c), nas quais as interações ocorreriam, porém, tratando-se de compostos acíclicos, não foi possível estabelecer em qual das duas a interação seria mais importante.

Era, pois, de interesse estudar cetonas cíclicas α -alquiltiosubstituídas em que a estereoquímica fosse bem definida,

a fim de poder avaliar melhor a influência das posições relativas dos átomos de enxofre e grupo carbonila sobre a posição e intensidade das bandas de absorção no ultravioleta e, consequentemente, obter informações sobre a natureza das interações envolvidas.

2.2. RESULTADOS

As primeiras cetonas cíclicas α -alquiltiossubstituídas que pareciam de interesse em nosso estudo eram as derivadas da ciclohexanona, pois os seus α -halogenoderivados foram objeto de estudo por vários anos⁴³ e uma variedade de técnicas foram empregadas a fim de estimar as populações relativas de suas conformações axiais e equatoriais. Foram preparadas, por métodos convencionais descritos na literatura, as 2-metiltio- (XXIX)⁴⁴, 2-etiltio- (XXX)⁴⁵ e 2-t-butiltiociclohexanonas (XXXI)⁴⁶ e os seus espectros no ultravioleta, determinados em n-hexano e metanol absolutos, estão nas figuras 4, 5 e 6, respectivamente.

XXIX

XXX

XXXI

O estudo da banda de estiramento do grupo carbonila, em CCl_4 , de (XXIX) no infravermelho mostrou que a cetona considerada era constituída de aproximadamente 70% do conformero XXIXa e 30% do conformero XXIXb, o que corresponde às populações relativas determinadas para a 2-clorociclohexanona⁴³.

Os espectros no ultravioleta dos três compostos mostram a existência de duas bandas de absorção, uma em aproximadamente 305 nm e outra em cerca de 250 nm.

Na 2-metiltiociclohexanona (XXIX, fig. 4) é observado um deslocamento hipsocrômico de 307 nm para 305 nm ao passar de n-hexano para o metanol, porém, as intensidades das duas bandas (ϵ_{max}) praticamente são iguais, 236 e 241, respectivamente. A posição da banda em 248 nm não é afetada pela mudança de solvente, porém, observa-se um decréscimo da intensidade da mesma de $\epsilon_{248} = 335$ para $\epsilon_{248} = 262$ ao passar de n-hexano para o metanol.

Os espectros da 2-etiltiociclohexanona (XXX, fig.5), em n-hexano e metanol, apresentam características semelhantes às daquelas do composto (XXIX): um pequeno deslocamento hipsocrômico de 309 nm (n-hexano, considerando o centro da banda) para 306 nm (metanol) e um pequeno aumento da intensidade (ϵ) de 256 (n-hexano) para 286 (metanol). A banda em comprimento de onda menor desloca-se de 248 nm (n-hexano) para 250 nm (metanol) e apresenta um pequeno efeito hipsocrômico ao passar de n-hexano ($\epsilon_{248} = 321$) para o metanol ($\epsilon_{250} = 282$).

Em n-hexano, o espectro da 2-t-butiltiociclohexanona (XXXI, fig.6) apresenta uma banda de absorção centrada em 307 nm ($\epsilon = 222$) e outra em 242 nm ($\epsilon = 405$) enquanto que, em metanol, as

Fig. 4 - Espectros no ultravioleta da 2-metiltiociclohexanona (XXIX) em n-hexano e metanol.

Fig. 5 - Espectros no ultravioleta da 2-etiltiociclohexanona (XXX) em n-hexano e metanol.

Fig. 6 - Espectros no ultravioleta da 2-t-butiltiociclohexanona (XXXI) em n-hexano e metanol.

duas bandas de absorção estão localizadas em 303 nm ($\epsilon = 292$) e 244 nm ($\epsilon = 405$). Observa-se que o deslocamento hipsocrômico da banda em comprimento de onda maior é mais pronunciado do que nos compostos (XXIX) e (XXX), como também o efeito hiperocrômico nesta banda é maior do que nos outros dois compostos estudados. A banda em comprimento de onda menor apresenta um deslocamento batocrômico ao mudar do solvente apolar para o polar prótico, porém não há mudança na intensidade contrariamente à 2-metiltiociclohexanona (XXIX) e à 2-etiltiociclohexanona (XXX) em que um efeito hipocrômico é observado.

É interessante observar que a estrutura vibracional das bandas de absorção em n-hexano, em comprimento de onda maior, apresenta-se mais definida no caso de 2-t-butiltiociclohexanona (XXXI) do que em (XXIX) e (XXX).

Como Trost e col.⁴⁴ mostraram que um grupo α -metiltio interagia com um grupo carbonila de tal forma que a conformação axial daquele era favorecida por 0,4 kcal/mol, achamos de interesse preparar a 2-etiltio-2-metilciclohexanona (XXXII), composto não descrito na literatura, em que a posição axial do grupo etiltio seria mais favorecida devido ao fato da interação 1,3 do grupo metila axial envolver uma energia maior do que a de um substituinte alquiltio no ciclohexano^{47a}.

XXXII

Os espectros no ultravioleta, em n-hexano e metanol absolutos, de (XXXII) estão na figura 7. A banda de absorção em comprimento de onda maior centrada em 307 nm ($\epsilon = 245$), no solvente apolar, é deslocada para 305 nm em metanol e um pronunciado efeito hipercrômico é observado ($\epsilon_{245} = 362$). Em 249 nm ($\epsilon = 307$) localiza-se uma segunda banda em n-hexano que, ao passar para o solvente polar, é deslocada para 252 nm ($\epsilon = 330$) acompanhado de um ligeiro efeito hipercrômico.

Com a finalidade de melhor compreender os espectros no ultravioleta dos compostos XXIX - XXXII decidimos preparar dois α -alquiltioderivados da 4-t-butilciclohexanona: 2-metiltio- (XXXIII) e 2-etiltio- (XXXIV), compostos não descritos na literatura.

XXXIII

XXXIV

Nestes compostos a presença do grupo t-butila preferencialmente na posição equatorial^{47b} permitiria, em princípio, isolar dois estereoisômeros, um com o grupo alquiltio em posição equatorial (diastereômero cis, XXXVa) e outro com o mesmo grupo em posição axial (diastereômero trans, XXXVb).

a

R = Me ou Et

b

XXXV

Fig. 7 - Espectros no ultravioleta da 2-etiltio-2-metilciclohexanona (XXXII) em n-hexano e metanol.

O composto (XXXIII) foi obtido pela reação de sulfenilação do enolato de lítio da 4-t-butilciclohexanona com dissulfeto de dimetila⁴⁴. As análises dos espectros de *rmp* e de I.V. do composto puro obtido revelaram que (XXXIII) era constituído de aproximadamente 60% de XXXVb e 40% de XXXVa. Não foi possível separar os dois diastereômeros que nas análises de cromatografia líquido-gás em diferentes colunas cromatográficas apresentavam os mesmos tempos de retenção.

A 2-etiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIV) foi preparada pela reação da 2-cloro-4-t-butilciclohexanona (XXXVI) com etanotiolato de sódio. Uma mistura dos diastereômeros *cis* e *trans* de (XXXVI) fora obtida por Allinger e col.⁴⁸ pela reação de cloro com a 4-t-butilciclohexanona em ácido acético 90%. Os autores separaram os diastereômeros por destilação fracionada.

A fim de tentar obter diferentes relações entre os diastereômeros (XXXVa e b, R = Et) da 2-etiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIV) reagimos o etanotiolato de sódio com as *cis*- e *trans*-2-cloro-4-t-butilciclohexanonas puras respectivamente, porém, em ambas as reações os espectros de *rmp* dos produtos obtidos mostraram-se idênticos e não foi possível separar os diastereômeros formados.

Os espectros no ultravioleta de (XXXIII) e (XXXIV) são mostrados nas figuras 8 e 9, respectivamente. Em *n*-hexano (XXXIII) apresenta uma banda de absorção centrada em 308 nm ($\epsilon = 247$) que é deslocada para 305 nm ($\epsilon = 320$) em metanol com um efeito hipercrômico. A banda em comprimento de onda menor apresenta inflexões tanto em *n*-hexano como em metanol, porém o máximo em ambos os casos situa-se em 242 nm e com praticamente a mesma intensidade ($\epsilon \approx 355$). A 2-etiltio-4-t-butilciclohexanona apresenta uma banda em 308 nm ($\epsilon = 280$) e 305 nm ($\epsilon = 320$) em *n*-hexano

Fig. 8 - Espectros no ultravioleta da 2-metiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIII) em n-hexano e metanol.

Fig. 9 - Espectros no ultravioleta da 2-etiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIV) em n-hexano e metanol.

e metanol, respectivamente, e outra em 248 nm ($\epsilon = 324$) e 249 nm ($\epsilon = 298$) nos mesmos solventes, respectivamente.

Tendo em vista que nas cetonas α -alquiltiosubstituídas (XXIX - XXXIV) os confôrmeros (XXIX - XXXII) ou então os diastereômeros (XXXIII - XXXIV) apresentavam os grupos α -alquiltio preferencialmente em posições axiais e como não fora possível separar os estereoisômeros de (XXXIII) e (XXXIV), era de interesse sintetizar uma cetona em que o grupo alquiltio ocuparia somente, ou então preferencialmente, uma posição equatorial. Trost e col.⁴⁴ descreveram a síntese da octahidro-4a-metil-3-metil-2-(1H)-naftalenona (XXXVII) e isolaram como produto principal o diastereômero com o grupo metiltio em posição equatorial.

A estrutura proposta pelos autores foi baseada no espectro de *rmp* em que era observado o sinal correspondente ao próton do grupo OCCHS como um duplo duplete (δ 3,43). O composto (XXXVII) por nós sintetizado, de maneira análoga a de Trost e col., apresentou, no espectro de *rmp*, um duplo duplete (δ 3,49) com $J = 12$ e 6 Hz correspondente a 0,7 H e um multiplete (δ 3,07) correspondente a 0,3 H (fig. 10). Atribuímos o sinal em campo mais baixo ao próton axial do carbono 3 enquanto que o sinal em campo mais alto corresponderia a um próton equatorial ligado ao mesmo carbono. Esta atribuição está de acordo com a de Casadevall e col.^{49,50} para as 3-bromo e 3-clorooctahidro-4a-metil-2

Fig. 10 - Espectros de *rmp* (XL-100) na região de δ 3,00 (ref. TMS) de: A - Octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVIII) em CCl_4 . B - Octahidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVII) em CDCl_3 .

$J = 7$ Hz) correspondentes ao SCH_2CH_3 e dois singletes (δ 1,11 e 1,05) correspondentes aos CH_3 da junção dos anéis da cetona estudada. O espectro de $r\text{m}^{13}\text{C}$ de (XXXVIII) apresenta dois sinais correspondentes ao carbono carbonílico (δ 202,9 e 203,3) com uma relação de intensidade de 2:1.

Os espectros no ultravioleta de (XXXVII) e (XXXVIII), em *n*-hexano e metanol absolutos, encontram-se nas figuras 11 e 12, respectivamente. Na octraidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVII) duas bandas de absorção são observadas: uma na região de 300 nm e outra na região de 245 nm. A banda em comprimento de onda maior apresenta um deslocamento hipsocrômico ao passar de *n*-hexano (304 nm) para o metanol (301 nm) e um efeito hipocrômico ($\epsilon_{304} = 170$, *n*-hexano; $\epsilon_{301} = 149$, metanol). Também é observado um deslocamento hipsocrômico da segunda banda de 246 nm (*n*-hexano) para 244 nm (metanol) acompanhado de um efeito hipocrômico ($\epsilon_{246} = 284$, *n*-hexano; $\epsilon_{244} = 255$, metanol). Os espectros da octaidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVIII) mostram características semelhantes às descritas acima. A banda em 304 nm em *n*-hexano se desloca para 302 nm em metanol e há uma diminuição de intensidade de $\epsilon_{304} = 286$ para $\epsilon_{302} = 237$. Mudando o solvente de *n*-hexano para o metanol tem como consequência um deslocamento hipsocrômico da banda em 244 nm para 241 nm e um efeito hipocrômico ($\epsilon_{244} = 377$ para $\epsilon_{241} = 332$).

As conformações das α -cloro e α -bromociclopentanonas foram estudadas por Brutcher e col.⁵¹ pela espectroscopia no infravermelho e os autores concluíram que os halogênios possuíam um caráter quasi-axial.

Um estudo da banda de estiramento do grupo carbonila da 2-etiltiociclopentanona (XL)⁵², em CCl_4 e CHCl_3 , mostrou que a mesma era constituída de dois conformeros: um com o grupo etil

Fig. 11 - Espectros no ultravioleta da octahidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVII) em n-hexano e metanol.

Fig. 12 - Espectros no ultravioleta da octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVIII) em n-hexano e metanol.

tio em posição *quasi-axial* e outro com o substituinte em posição *equatorial*. As porcentagens do primeiro em CCl_4 e CHCl_3 eram de 83% e 73%, respectivamente.

XL

XLI

Os espectros no infravermelho de 2-mercaptociclopentanona (XLI)⁵² mostraram tanto na região de absorção do grupo S-H (2570 cm^{-1}) como na do grupo carbonila (1740 cm^{-1}) duas conformações, uma das quais era associada intramolecularmente por ponte de hidrogênio e corresponderia a uma conformação *quasi-equatorial*. No outro conformero não existiria nenhuma associação intramolecular, porém o grupo S-H estaria mais próximo de uma conformação *equatorial* do que *axial*. A existência de pontes de hidrogênio intramoleculares entre os grupos S-H e carbonila fora sugerida por Wladislaw e col.⁵³ no caso de α -mercaptoésteres sendo comprovada no presente trabalho⁵². As porcentagens da conformação associada, em CCl_4 e CHCl_3 , eram de 55% e 52%, respectivamente.

Os espectros no ultravioleta de (XL) e (XLI) estão nas figuras 13 e 14. Como no caso das α -alquiltiocetonas, anteriormente estudadas, a 2-etiltiociclopentanona (XL) apresenta duas bandas de absorção na região de 220 a 350 nm. Em *n*-hexano, a banda em comprimento de onda maior encontra-se em 310 nm ($\epsilon=495$) e é deslocada para 308 nm ($\epsilon=365$) quando o solvente é metanol. A banda em comprimento de onda menor situa-se em 249 nm quando o solvente é *n*-hexano e praticamente não se desloca em metanol.

Fig. 13 - Espectros no ultravioleta da 2-etiltiociclopentanona (XL) em n-hexano e metanol.

Fig. 14 - Espectros no ultravioleta da 2-mercaptociclopentanona (XLI) em n-hexano e metanol.

(250 nm). Entretanto, observa-se um acentuado efeito hipocrômico ao passar de n-hexano ($\epsilon_{249} = 787$) para o solvente polar $\epsilon_{250} = 455$).

A 2-mercaptociclopentanona (XLI) apresenta características espectrais bastante distintas do composto (XL). A banda de absorção centrada em 304 nm (n-hexano) mostra um contorno vibracional bem definido e a sua intensidade ($\epsilon_{304} = 104$) é acentuadamente menor do que a da banda correspondente na 2-etiltio-ciclopentanona (XL) ($\epsilon_{310} = 495$). Em metanol a banda se desloca para 301 nm e um pequeno efeito hipercrômico é observado ($\epsilon = 135$). A banda de absorção em comprimento de onda menor aparece, em n-hexano, a 237 nm ($\epsilon = 268$), porém em metanol apenas se observa uma inflexão na mesma região, o que poderia ser explicado ou por um deslocamento hipsocrômico pronunciado da banda considerada, ou então, resultado de um deslocamento para comprimento de onda maior de uma banda de absorção existente no ultravioleta mais afastado.

Um fato digno de nota é o espectro no ultravioleta da 2-mercaptociclopentanona (XLI) em uma solução 10^{-3} M de KOH em metanol (fig. 15). Observa-se uma banda em 313 nm ($\epsilon = 1264$) e um ombro em 255 nm ($\epsilon = 939$).

A fim de melhor compreender as conformações do anel da ciclopentanona, decidimos preparar a 3-metiltio-1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] heptanona-2 (XLII), composto não descrito na literatura, que é um derivado da cânfora e, portanto, um composto modelo da ciclopentanona planar devido a sua geometria rígida do agrupamento R-C-C=O⁵¹. O composto (XLII) foi obtido pela reação de sulfenilação⁴⁴ do enolato de lítio da (+)-cânfora com dissulfeto de dimetila. O espectro de *rmp* apresentou um duplete ($J = 5$ Hz) em $\delta = 3,09$ correspondente ao próton ligado ao carbono

Fig. 15 - Espectro no ultravioleta da 2-mercaptociclopentanona (XLI) em solução 10^{-3}M de KOH em metanol.

3 de (XLII), o que nos permitiu concluir que o grupo metiltio estaria na posição endo^{54,55}.

XLII

Os espectros no ultravioleta de (XLII), em n-hexano e metanol, estão na fig. 16. A banda de absorção em comprimento de onda maior encontra-se centrada em 315 nm (n-hexano) e se desloca para 310 nm em metanol. As intensidades (ϵ) observadas são, respectivamente, 152 e 134. Em comprimento de onda menor uma segunda banda é observada em 245 nm ($\epsilon = 203$, n-hexano) deslocada para 247 nm ($\epsilon = 195$) em metanol.

2.3. DISCUSSÃO

Os dados dos espectros no ultravioleta das cetonas α -alquiltio-substituídas, estudadas no presente trabalho, bem como aqueles das cetonas não-substituídas correspondentes, estão reunidos na Tabela 1. Na Tabela 2 foram reproduzidos os dados espectrais de outras cetonas contendo um átomo de enxofre em posição α em relação ao grupo carbonila, descritos na literatura, com a finalidade de permitir uma discussão mais ampla sobre a interação entre o enxofre e o grupo carbonila e as suas consequências sobre os espectros eletrônicos.

Fig. 16 - Espectros no ultravioleta da 3-metiltio-1,7,7-trimetilbicyclo[2.2.1] heptanona-2 (XLII) em n-hexano e metanol.

TABELA 1
ESPECTROS NO ULTRAVIOLETA DAS CETONAS ESTUDADAS

Nº	COMPOSTOS	n-C ₆ H ₁₄ nm(ε) ^a	CH ₃ OH nm(ε) ^a
(1)	Ciclopentanona ^b	300(18) ^c	287(18)
(2)	2-Etiltiociclopentanona(XL)	310(495) 249(787)	308(365) 250(455)
(3)	2-Mercaptociclopentanona(XLI)	304(104) 237(268) - -	301(135) 237(312) ^d 313(1264) ^e 255(939) ^e
(4)	Cânfora	291(25)	288(33)
(5)	3-Metiltio-1,7,7-trimetil- biciclo[2.2.1]heptanona-2(XLII)	315(152) 245(203)	310(134) 247(195)
(6)	Ciclohexanona ^b	291(15) ^c	282(15)
(7)	2-Metiltiociclohexanona(XXIX)	307(236) 248(335)	305(241) 248(262)
(8)	2-Etiltiociclohexanona(XXX)	309(256) 248(321)	306(286) 250(282)
(9)	2-t-Butiltiociclohexanona(XXXI)	307(222) 242(405)	303(292) 244(405)
(10)	2-Etiltio-2-metilciclo- hexanona(XXXII)	307(245) 249(307)	305(362) 252(330)
(11)	4-t-Butilciclohexanona	290(16)	281(18)
(12)	2-Metiltio-4-t-butilciclo- hexanona(XXXIII)	308(247) 242(353)	305(320) 242(357)
(13)	2-Etiltio-4-t-butilciclo- hexanona(XXXIV)	308(280) 248(324)	305(320) 249(298)
(14)	trans-Octahidro-4a-metil- -2(1H)-naftalenona	288(16)	281(21)
(15)	Octahidro-4a-metil-3- -metiltio-2(1H)-naftalenona(XXXVII)	304(170) 246(284)	301(149) 244(255)
(16)	Octahidro-4a-metil-3- -etiltio-2(1H)-naftalenona(XXXVIII)	304(286) 244(377)	302(237) 241(332)

^a $\lambda_{\max}$ (l x mol⁻¹ x cm⁻¹); ^b ref.10a; ^c isooctano; ^d inflexão; ^e 10⁻³M KOH.

TABELA 2
ESPECTROS NO ULTRAVIOLETA DE ALGUMAS CETONAS α -ALQUILTIO-
SUBSTITUÍDAS DESCRITOS NA LITERATURA

Nº	COMPOSTOS	nm(ϵ) ^a	SOLVENTE
(17)	4-Tiapentanona-2(XXVII) ^b	301(218) 242(373) 295(289) 243(328)	n-C ₆ H ₁₄ 50%(v/v) EtOH/H ₂ O
(18)	4-Tiahexanona-2(XVII) ^c	301(224) 243(457) 297(229) 244(331)	n-C ₆ H ₁₄ 95% EtOH
(19)	5,5-Dimetil-4-tiahexanona-2 ^d	301(155) 235(380)	n-C ₆ H ₁₄
(20)	2-Metiltiocicloheptanona ^e	305(270) 248(538) 216(1780)	C ₆ H ₁₄
(21)	2-Metiltiociclooctanona ^e	306(291) 248(710) 215(1928)	C ₆ H ₁₄
(22)	$\Delta^{8(9)}$ -1-Metiltio-2-p-mentenona ^e epímero Z	304(264) 249(430)	C ₆ H ₁₄
(23)	epímero E	307(242) 248(358)	C ₆ H ₁₄
(24)	9-Tiabíciclo [3.3.1] nonanona-2 ^f	304(250) 251(300)	CH ₃ OH
(25)	6-Hidroxi-9-tiabíciclo [3.3.1] - nonanona-2 ^g	305(106) 242(227) 302(190) 246(265)	C ₆ H ₁₂ CH ₃ OH
(26)	2-Tiaadamantanona-4(XXV) ^h	311(269) 254(324)	Dioxano
(27)	8(e)-Hidroxi-2-tiaadaman- tanona-4 ^h	311(257) 252(302) 211(1560)	Dioxano
(28)	8(a)-Hidroxi-2-tiaadaman- tanona-4 ^h	310(99) 250(140) 208(1230)	Dioxano

-continua-

-continuação-

(29)	3-Tiaciclopentanona(XIX) ^c	300(66)	n-C ₆ H ₁₄
		247(151)	
		298(76)	95% EtOH
		248(154)	
(30)	3-Tiaciclohexanona(XX) ^c	305(166)	n-C ₆ H ₁₄
		247(295)	
		305(240)	95% EtOH
		247(295)	
(31)	(6S)-6-metiltetrahidro- tiopiranona(XXVI) ⁱ	305(178)	isooctano
		248(345)	
		306(223)	CH ₃ OH
		248(261)	
(32)	3-Etilenoditio-5 α -colestano- nona ^j	307(269)	CH ₃ OH/Dioxano
		245(646)	(2:1)
		222(1175)	
(33)	3-Etilenoditio-5 β -colestano- nona-4 ^j	311(302)	CH ₃ OH/Dioxano
		246(692) ^k	
		225(1175)	
(34)	3-(Etileno-1-oxi-2-tio)5 α - colestano-4 ^j ; 3 α -S(axial)	309(309)	CH ₃ OH/Dioxano
(35)	ibid, 3 β -S(equatorial)	255(302)	
		295(100)	
(36)	3-(Etileno-1-oxi-2-tio)-5 β - colestano-4 ^j ; 3 α -S(equatorial)	253(178) ^k	
		299(71)	CH ₃ OH/Dioxano
		250(141) ^k	
(37)	ibid, 3 β -S(axial)	314(309)	
		256(275)	

^a $\lambda_{\max}$ (l x mol⁻¹ x cm⁻¹); ^bref.40; ^cref.39; ^dref.36; ^eref.56; ^fref.57;

^gref.58; ^href.37; ⁱref.38; ^jref.59; ^kombro.

Uma análise dos comprimentos de onda e das intensidades das bandas de absorção, bem como do efeito de solvente sobre as mesmas (Tab. 1), sugere que a banda em comprimento de onda maior pode ser atribuída a uma transição $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila e a de comprimento de onda menor a transições envolvendo o par solitário de elétrons do enxofre, provavelmente uma transição $n \rightarrow \sigma^*$ ^{38,42}. Uma interpretação diferente para a banda em comprimento de onda menor foi dada por Hudec ²⁷ que, baseado em cálculos de Levin *et al.* ²³, a atribuiu a uma segunda transição $n \rightarrow \pi^*$.

Ambas as bandas apresentam deslocamentos batocrômicos quando comparadas com as transições observadas nas cetonas e tioéteres correspondentes não substituídos. Assim, as transições $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila em cetonas não substituídas normalmente são observadas na região de 290 nm ⁴ e as transições $n \rightarrow \sigma^*$ de tioéteres acíclicos na região de 200 - 230 nm, enquanto que nos cíclicos um deslocamento batocrômico é observado dependendo do ângulo C-S-C, sendo maior a medida em que o tamanho do anel diminui ⁶⁰.

Comparando os compostos (7) - (10) da Tabela 1, nota-se que as bandas de absorção correspondentes à transição $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila, encontram-se em cerca de 307 nm em n-hexano e são deslocadas para 305 nm em metanol, isto é, um discreto deslocamento hipsocrômico é observado sendo maior no caso da 2-t-butiltiociclohexanona (9). A mudança de solvente apolar para polar prótico tem como consequência um efeito hipercrômico, reduzido na 2-metiltiociclohexanona (7) e acentuado na 2-etiltio-2-metilciclohexanona (10), notando-se um aumento progressivo do composto (7) ao (10). Uma possível causa de tal aumento de intensidade poderia ser uma maior estabilização de um dos con-

fôrmeros do anel do ciclohexano, o que favoreceria a interação entre o enxofre e o grupo carbonila. Tal sugestão, entretanto, fica excluída, pois tanto a 2-metiltio- como a 2-etiltio-4-t-butilciclohexanona (compostos (11) e (12), Tab. 1), que são constituídas de misturas diastereoméricas em que a conformação do anel do ciclohexano é rígida, apresentam um efeito hipercrômico semelhante.

Nos compostos (7) - (13) o grupo alquiltio ocupa preferencialmente a posição axial, conforme foi descrito em 2.2. para a 2-metiltiociclohexanona (XXIX, (7) Tab.1) e 2-metiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIII, (12) Tab. 1). Tal fato foi confirmado nos epímeros Z e E da $\Delta^{8(a)}$ -1-metiltio-2-p-mentenona (compostos (22) e (23), Tab. 2) em que 99 e 70%, respectivamente, da mistura de confôrmeros são aqueles com o grupo metiltio em posição axial⁵⁶. Os espectros no ultravioleta desses compostos, em n-hexano, apresentam as mesmas bandas de absorção em comprimentos de onda e de intensidades comparáveis aos compostos por nós estudados.

Na 2-tiaadamantanona-4 (26, Tab. 2), um composto trícíclico de estrutura rígida em que os anéis de seis membros possuem conformações cadeira, o enxofre em posição α em relação ao grupo carbonila encontra-se em posição axial. O espectro no ultravioleta de (26), em dioxano, apresenta duas bandas de absorção, uma em 311 nm ($\epsilon = 269$) e outra em 254 nm ($\epsilon = 324$)³⁷. Devido a sua rigidez (26) pode ser considerado como composto modelo de uma ciclohexanona α -alquiltio-substituída axialmente, e o seu espectro eletrônico foi analisado por Snatzke e Wolfram³⁷ considerando as regras (i) - (iv) de Hudec²¹ (pag. 7).

Tendo em vista o fato das regras de Hudec preverem as modificações do espectro no ultravioleta ao passar da adamanta-

nona para a 2-tiaadamantanona-4 (26), cetonas com grupos α -alquiltio em posição equatorial deveriam apresentar espectros no ultravioleta com características diferentes das acima descritas.

Considerando os espectros dos compostos (15) e (16) da Tabela 1, ambos contendo o diastereômero com o grupo alquiltio equatorial em maior porcentagem, 75 e 64%, respectivamente, observa-se que apresentam duas bandas de absorção. A de comprimento de onda maior correspondente à transição $n \rightarrow \pi^*$, encontra-se em 304 nm (n-hexano) e em 301 nm (metanol). Ao comparar estes valores com os da trans-octahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona (composto 14, Tab. 1) nos mesmos solventes, nota-se que as bandas sofreram um deslocamento batocrômico de 16 e 20 nm, respectivamente, contrariamente ao esperado pela regra (i) de Hudec²¹ (pag. 7). Os valores de ϵ em n-hexano são 170 e 286, respectivamente para (15) e (16), ou seja, a intensidade da banda $n \rightarrow \pi^*$ diminui sensivelmente na octahidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)-naftalenona (15) quando comparada com as dos compostos (7)-(10), (12) e (13) da Tabela 1, porém na octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona (16) o valor de ϵ é maior do que a média dos valores observados nos mesmos compostos.

Dois aspectos precisam ser considerados nos espectros eletrônicos em metanol dos compostos até aqui considerados, a saber: (a) - Os derivados da ciclohexanona (7-10, Tab.1) e 4-t-butilciclohexanona (12 e 13, Tab.1) apresentam um efeito hipercrômico na banda $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila ao se comparar os valores de ϵ com aqueles determinados em n-hexano. Nos compostos (15) e (16), entretanto, um efeito hipocrômico é observado nas mesmas condições. (b) - Um segundo ponto a ressaltar refere-se a banda de absorção em comprimento de onda menor, provavelmente envolvendo o par solitário de elétrons do enxofre. Nos

derivados (15) e (16) da trans-octahidro-4a-metil-2(1H)-naftale nona, a banda de absorção em cerca de 245 nm apresenta um deslocamento hipsocrômico ao passar de n-hexano para o metanol, enquanto que, nos compostos (7) - (10), (12) e (13) um deslocamento batocrômico é observado. Estes fatos experimentais sugerem que os diferentes fatores responsáveis pela interação entre o enxofre e o grupo carbonila, agem com diferente intensidade ao se mudar as conformações moleculares.

Robinson *et al.*⁵⁹ estudaram as propriedades quirópticas de 3-etileno-mono- e ditiocetais das 5 α - e 5 β -colestanonas-4 (compostos 32 a 37, Tab. 2) e os seus resultados confirmam as nossas observações. Merecem uma análise mais detalhada os 3-(etileno-1-oxi-2-tio) derivados em que o enxofre pode ocupar tanto uma posição equatorial como uma axial. Assim, nos compostos (34) e (37) da Tabela 2 em que o enxofre se encontra em posição axial, os espectros no ultravioleta apresentam duas bandas de absorção na região de 310 e 255 nm, respectivamente, cujas intensidades (ϵ) são comparáveis às dos compostos (7) - (10), (12) e (13) da Tabela 1 e a banda $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila está deslocada batocromicamente em relação a da 4-colestanona não substituída. De outro lado, nos espectros eletrônicos dos compostos (35) e (36) da Tabela 2, em que o enxofre ocupa uma posição equatorial, apesar de também apresentarem duas bandas de absorção, nota-se uma redução na intensidade das mesmas e o deslocamento batocrômico em relação à banda $n \rightarrow \pi^*$ do 4-colestanona é menor do que aquele observado em (34) e (37). Pelos dados de dicroísmo circular, Robinson *et al.* sugeriram que um dos orbitais n do enxofre axial se superpõe dissimetricamente com os orbitais n e π^* do grupo carbonila, enquanto que o orbital n ou então π do último não se superpõe com o orbital excitado do átomo de enxofre que, prova-

velmente, possui um caráter σ^* .

As cetonas (29) a (31) da Tabela 2 que possuem um enxofre endocíclico, apresentam espectros eletrônicos de características semelhantes às até aqui discutidas. Observa-se que as intensidades das bandas de absorção são menores do que as dos compostos contendo o enxofre em posição axial.

Os resultados expostos parecem indicar que a posição axial do átomo de enxofre, embora importante para a existência de uma interação entre o mesmo e o grupo carbonila, não é essencial e os seus pares solitários de elétrons podem interagir através do espaço ou então através das ligações σ^{22} com o grupo carbonila. Rosenfield e Moscovitz⁶⁰ mostraram que os pares solitários de elétrons do enxofre em tioéteres diferem em energia sendo que o de energia maior estaria essencialmente em um orbital $3p$. Parece razoável sugerir que seja este par solitário que interaja preferencialmente com o grupo carbonila.

Segundo Levin *et al*²³, as interações orbitais em α -aminocetonas, em ordem decrescente de importância nas propriedades espectroscópicas daquelas seria: (1)- Acoplamento através das ligações dos pares solitários de elétrons do nitrogênio e oxigênio. (2) - Interação através do espaço destes pares solitários. (3) - Hiperconjugação entre o nível σ^* da ligação C-N e do sistema π da carbonila. (4) - Superposição direta do par solitário do nitrogênio com o sistema π da carbonila. Cada uma destas interações apresenta uma dependência conformacional distinta.

Considerando os resultados dos autores²³, a interação através do espaço do orbital $3p$ do enxofre e um orbital p do oxigênio do grupo carbonila dependerá acentuadamente do ângulo entre o grupo carbonila e a ligação C-S sendo mais importante quando os mesmos estão eclipsados, isto é, quando o grupo al-

quiltio ocupar uma posição equatorial. Além deste fator, o orbital $3p$ do enxofre deverá ficar paralelo ao orbital σ da ligação $C_{C=O} - C_{\alpha}$. Esta condição dependerá das conformações ao longo da ligação $C - S$.

O acoplamento entre o par solitário do enxofre e um do oxigênio através das ligações, envolvendo os níveis σ e σ^* da ligação $C_{C=O} - C_{\alpha}$ depende essencialmente da orientação do orbital $3p$ em relação à $C_{C=O} - C_{\alpha}$, sendo máximo quando a superposição dos mesmos for maior, ou seja, quando os dois orbitais ficam paralelos, condição esta dependente da conformação ao longo da ligação $C - S$.

As interações expostas não são as únicas importantes na explicação das propriedades espectroscópicas dos compostos estudados. Assim, a interação dos orbitais da ligação $C - S$ com o sistema π da carbonila alterará o nível π^* ^{18,23}, quando o grupo alquiltio estiver em posição axial. Uma outra variável a ser considerada é o ângulo $C_{C=O} - C_{\alpha} - S$ pois conforme mostraram Levin *et al.*²³, variações no mesmo alterarão os níveis energéticos dos orbitais dos pares solitários dos heteroátomos.

Os espectros no ultravioleta da 2-etiltiociclopentanona [(2), Tabela 1], apresentam bandas de absorção semelhantes às dos derivados alquiltio-substituídos de seis membros, porém as intensidades das mesmas são maiores, especialmente em *n*-hexano. Uma diferença fundamental, entretanto, entre os derivados cíclicos de cinco e de seis membros, é o acentuado efeito hipocrômico observado nos primeiros ao passar do solvente apolar ao polar prótico. Nas α -alquiltiociclohexanonas tal mudança de solvente tem como consequência um reduzido efeito hipercrômico na banda de maior comprimento de onda e hipocrômico na de comprimento de onda menor. Conforme foi descrito em 2.2., a 2-etiltiociclopent-

tanona é constituída por cerca de 80% do confôrmero com o grupo etiltio em posição quasi-axial e parece razoável sugerir que as diferenças espectrais entre os derivados das ciclopentanona e ciclohexanona sejam devidas às diferentes conformações do grupo alquiltio. No caso da ciclohexanona, o enxofre em posição perfeitamente axial forma um ângulo de 120° com a ligação σ do grupo carbonila, enquanto que na ciclopentanona o ângulo entre o enxofre quasi-axial e o grupo carbonila seria próximo a 90° , porém a explicação não parece ser simples.

Os espectros no ultravioleta da 3-metiltio-1,7,7-trimetil-biciclo [2.2.1] -heptanona-2 [(5), Tab. 1] permitem uma melhor análise daqueles da 2-etiltiociclopentanona e os efeitos conformacionais neles observado. O composto (5) é um modelo da ciclopentanona planar (2.2., pag. 45) com o grupo metiltio e o grupo carbonila formando um ângulo projetado de aproximadamente 60° ⁵¹. Devido à estrutura da molécula o grupo metiltio parece ficar conformacionalmente mais restrito. Além disto o átomo de enxofre ocupa uma posição intermediária entre as posições axial e equatorial. A primeira, pelos resultados do presente trabalho e os descritos na literatura, parece ser mais favorável a uma interação através das ligações entre o enxofre e o grupo carbonila, enquanto a segunda seria mais favorável a uma interação através do espaço entre os pares solitários do enxofre e do oxigênio. As interações através do espaço e através das ligações não se excluem mutuamente, sendo a sua participação relativa uma função das conformações moleculares.

Os resultados apresentados permitem concluir que a interação entre o enxofre e o grupo carbonila e as suas consequências sobre os espectros no ultravioleta das cetonas α -alquiltio-substituídas dependem essencialmente de dois fatores con

formacionais: (a) - A orientação do grupo alquiltio em relação ao grupo carbonila sendo as posições quasi-axial e axial as mais favoráveis. (b) - As conformações do grupo alquiltio em relação a ligação $C_{C=O} - C_{\alpha}$. A medida em que a superposição do orbital $3p$ do enxofre com a ligação σ se torna menos efetiva, menores serão as intensidades e os deslocamentos batocrômicos das bandas de absorção.

Estas conclusões podem ser confirmadas pela análise dos espectros no ultravioleta da 2-mercaptociclopentanona [(3), Tab. 1] que é constituída de cerca de 50% do conformero associado intramolecularmente e 50% de um conformero em que o grupo S-H não associado estaria mais próximo de uma conformação *equatorial* do que *axial* (2.2., pag. 42). Em n-hexano observa-se um deslocamento batocrômico relativamente pequeno da banda $n \rightarrow \pi^*$, de intensidade reduzida, do grupo carbonila em relação a da ciclopentanona não substituída. Estes resultados são comparáveis aos dos compostos (35) e (36) da Tabela 2, em que o enxofre ocupa uma posição equatorial. Além disto, é interessante notar que tanto no composto (3) como em (35) e (36) o enxofre, devido ao fato de participar de um sistema cíclico, apresenta restrições conformacionais e provavelmente por causa disto a interação do par solitário do enxofre com o grupo carbonila seja dificultada. A banda em comprimento de onda menor da 2-mercaptociclopentanona também aparece deslocada para o azul em relação às mesmas bandas de absorção das cetonas α -alquiltio-substituídas, o que sugere que as duas bandas estão correlacionadas³⁶.

Uma possível confirmação dos fatores importantes, para que exista uma interação pronunciada entre o enxofre e o grupo carbonila, parece ser o espectro no ultravioleta da 2-mercaptociclopentanona em meio alcalino [(3), Tab.1]. As duas bandas

de absorção observadas em 313 e 255 nm, respectivamente, são de intensidade elevada, o que está de acordo com o fato de não mais existir a ponte de hidrogênio intramolecular no composto. Isto permite ao enxofre ocupar uma posição quasi-axial e de outro lado, por não possuir nenhum substituinte, não haverá restrições quanto as diferentes orientação dos orbitais $3p$ que contêm os pares eletrônicos. Nas Figuras 17 e 18 são apresentados os espectros no ultravioleta de (2), (3) e (5) em n-hexano e metanol, respectivamente, a fim de permitir uma melhor comparação dos mesmos.

Os resultados deste trabalho e aqueles descritos na literatura (1.2.2., pag. 15) sugerem que, apesar de um número muito grande de evidências experimentais, a interação entre o enxofre e o grupo carbonila ainda está longe de ser compreendida. Em nossa opinião, somente cálculos teóricos poderão esclarecer ou então sugerir novas experiências que nos possam levar a uma compreensão melhor das interações existentes e porque não, da natureza da ligação química.

Fig. 17 - Espectros no ultravioleta, em n-hexano, de: 2-mercaptociclopentanona (XLI), 2-etiltiociclopentanona (XL) e 3-metiltio-1,7,7-trimetilbicyclo [2.2.1] heptanona-2 (XLII).

Fig. 18 - Espectros no ultravioleta, (a) em metanol de: (—) 2-mercaptociclopentanona (XLI), 2-etiltiociclopentanona (XL) e 3-metiltio-1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] heptanona-2 (XLII); (b) em solução 10^{-3} M de KOH em metanol da (-.-.-) 2-mercaptociclopentanona (XLI).

CAPÍTULO III

PARTE EXPERIMENTAL3.1. INSTRUMENTOS, MEDIDAS ESPECTROSCÓPICAS E ANÁLISES

Os espectros no ultravioleta foram registrados em um espectrofotômetro Beckman, modelo DK-2A, utilizando celas calibradas de quartzo de 1,00 cm de espessura. Os solventes empregados foram n-hexano e metanol absolutos. Foram determinados os espectros de pelo menos três soluções de concentração diferente (10^{-4} a 10^{-2} M) para cada substância estudada. As absorptividades molares (ϵ , $l \times \text{mol}^{-1} \times \text{cm}^{-1}$) foram calculadas pela regressão linear de mínimos quadrados a partir dos valores de absorbância nos espectros e das respectivas concentrações das soluções empregadas. Todas as medidas foram efetuadas a $25 \pm 1^\circ\text{C}$.

Os espectros no infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro de grade de difração Perkin Elmer 457-A ou 180. Para as medidas em solução utilizaram-se celas pareadas com janelas de cloreto de sódio de 0,5 mm de espessura e, para os espectros em filme, pastilhas de cloreto de sódio. As frequências de estiramento do grupo carbonila (ν_{CO}) foram determinadas em soluções de tetracloreto de carbono e de clorofórmio, cuja faixa de concentração variava de 2 a 5×10^{-2} M. Como referência foi utilizada a frequência de $1603,08 \text{ cm}^{-1}$ do filme de poliestireno.

Um espectrômetro Varian T-60 operando com uma fonte de radiofrequência de 60 MHz e um aparelho Varian XL-100 de 100 MHz foram utilizados para a determinação dos espectros de ressonância magnética protônica (rmp) e de ^{13}C . Nos espectros de rmp, os deslocamentos químicos (δ) são relatados em partes por milhão em relação ao tetrametilsilano (TMS), utilizado como padrão in-

terno, colocando entre parênteses o número de hidrogênios, a multiplicidade (s-singlete, d-duplete, t-triplete, q-quarteto, m-multiplete) e a constante de acoplamento (J) em Hz. Os solventes empregados foram tetracloreto de carbono e deutero clorofórmio.

As análises cromatográficas líquido-gás foram efetuadas em um instrumento Varian, modelo 1868-40, equipado com um integrador digital eletrônico, utilizando o detector de ionização de chama. O gás de arraste era nitrogênio e as colunas de 3,18 mm x 1,52 m eram: 10% FFAP sobre Chromosorb W, 60/80 mesh e 5% QF-1 sobre Chromosorb W, 60/80 mesh. As análises cromatográficas foram efetuadas isotermicamente e a temperatura empregada é indicada em cada caso.

As cromatografias em coluna foram realizadas utilizando-se sílica gel "Kiesel-gel 60, 0,063-0, 200 mm, Merck A.G.".

As análises elementares foram efetuadas nos laboratórios da Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S.A., Paulínia, SP, sob a direção do Dr. Marino T. Fabi.

3.2. COMPOSTOS

3.2.1. Solventes

Nas medidas espectroscópicas foram utilizados tetracloreto de carbono, clorofórmio, n-hexano e metanol absoluto de grau espectrométrico "Uvasol, Merck A.G.". Todos os outros solventes empregados foram purificados por métodos descritos na literatura⁶¹.

3.2.2. Compostos disponíveis em nosso laboratório

2-Mercaptociclopentanona (XLI) e 2-etiltiociclopentanona (XL) preparados e purificados pela Sra. I.C.Coelho Calegão⁵².

3 2 3. Compostos sintetizados

3.2.3.1. 2-Etiltiociclohexanona (XXX)

a) 2-Etiltiociclohexanona (XXX)⁴⁵ - A uma solução de etanotiolato de sódio, obtida a partir de 4,87g (0,21 mol) de sódio, 14,5g (0,23 mol) de etanotiol e 100 ml de etanol abs., foram adicionados, gota a gota, 28,1g (0,21 mol) de 2-clorociclohexanona (Aldrich, redestilada p.e. 81-82°C/9 Torr), dissolvidos em 10 ml de etanol abs., sob agitação e resfriamento a -10°C. Completada a adição, a temperatura da mistura reacional foi mantida a 25°C por duas horas e, em seguida, esta foi jogada em água. O óleo formado foi extraído em éter, o extrato etéreo lavado com água, solução saturada de cloreto de sódio e seco com sulfato de magnésio anidro. O éter foi removido e o produto destilado à pressão reduzida fornecendo 29,4g de um líquido de p.e. 107-109°C/7 Torr (lit.⁴⁵ p.e. 115°C/15 Torr). A análise cromatográfica (5% QF-1, 130°C) revelou a existência de uma impureza (aprox. 20%) na 2-etiltiociclohexanona, não separável por destilação fracionada. Preparou-se o 6-etiltio-1,4-dioxaspiro 4,5 decano.

b) 6-Etiltio-1,4-dioxaspiro [4,5]decano (XLIII) - Empregou-se o método descrito por Kuhn⁶² Uma mistura de 17,5g de 2-etiltiociclohexanona, obtida em a, 7,5g (0,12 mol) de etilenoglicol, 70 ml de benzeno abs. e 0,2g de ácido p-toluenosulfônico, contida em um balão de 125 ml munido de um aparelho Dean-Stark modificado⁶³, foi aquecida a refluxo até cessar a separação de água. Adicionaram-se 20 ml de uma solução metanólica de NaOH a 5%, agitou-se durante 30 min. e jogou-se em 30 ml de água. Após lavagem com água e secagem com sulfato de magnésio anidro,

o benzeno do extrato orgânico foi evaporado e o óleo obtido destilado à pressão reduzida. Obtiveram-se 18,1g de produto de p.e. 97,5-99°C/3 Torr, cromatograficamente puro (5% QF-1, 150°C).

rmp δ (CCl_4) : 3,97 (4H, m), 2,60 (2H, q, $J = 8$ Hz) sobreposto a (1H, m), 1,20 (3H, t, $J = 8$ Hz) sobreposto a 1,0 - 2,3 (8H, m).

I.V. ν_{COCOC} (filme) : 1150 (1160), 1130, 1080, 1030 cm^{-1} .

c) Hidrólise do 6-etiltio-1,4-dioxaspiro [4,5]decano - 13,8g (68 mmol) do cetal (XLIII), em 100 ml de ácido sulfúrico aquoso 5% (v/v), foram aquecidos a refluxo durante cinco horas. A mistura reacional foi extraída com éter, o extrato etéreo lavado com uma solução aquosa saturada de bicarbonato de sódio, água e, então, seco com sulfato de magnésio anidro. Após evaporar o solvente, submeteu-se o resíduo a destilação à pressão reduzida, obtendo-se 7,8g (72,6%) da 2-etiltiociclohexanona, p.e. 61-61,8°C/0,5 Torr (lit.⁴⁵ p.e. 115°C/15 Torr), cromatograficamente pura (5% QF-1, 150°C).

rmp δ (CCl_4) : 3,23 (1H, m), 2,43 (2H, q, $J = 7$ Hz) e 1,22 (3H, t, $J = 7$ Hz) sobrepostos a 1,0 - 3,1 (8H, m).

I.V. $\nu_{\text{C=O}}$ (CCl_4) : 1707 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1701 cm^{-1} .

3.2.3.2. 2-t-Butiltiociclohexanona (XXXI)⁴⁶

a) A reação entre a 2-clorociclohexanona e t-butiltiolato de sódio, empregando o procedimento de 3.2.3.1 a, forneceu o produto desejado em baixo rendimento, juntamente com vários outros produtos (análise cromatográfica, 5% QF-1, 130°C). O procedimento descrito a seguir permitiu a obtenção da 2-t-butiltiocic

clohexanona pura : - A 2,21g (96 mmol) de sódio molecular, em 75 ml de éter absoluto, foram adicionados, gota a gota, 9,5g (0,105 mol) de 2-metil-2-propanotiol, sob agitação e aquecimento. Após todo o sódio ter reagido, adicionaram-se 12,7g (96 mmol) de 2-clorociclohexanona em 10 ml de éter abs., sob agitação e resfriamento a 0°C. Completada a adição, a mistura reacional foi agitada durante nove horas à temperatura ambiente e, em seguida, jogada em 100 ml de água. O extrato etéreo foi separado, lavado com água, seco com sulfato de magnésio anidro e, após evaporar o éter, o produto bruto foi destilado à pressão reduzida. Obtiveram-se 11,4g de um líquido de p.e. 80 - 88°C/1 Torr. A análise cromatográfica (5% QF-1, 130°C) mostrou tratar-se de uma mistura: 75% correspondente ao componente principal e os restantes 25% a outras três substâncias.

b) 6-t-Butiltio-1,4-dioxaspiro [4,5]decano (XLIV) -

Pelo procedimento descrito em 3.2.3.1 b, obtiveram-se, a partir de 5,6g do produto obtido em a, 2,0g (32 mmol) de etilenoglicol e 50 mg de ácido p-toluenosulfônico em 15 ml de benzeno abs., 3,7g de um líquido de p.e. 86 - 88°C/1 Torr. A análise cromatográfica (5% QF-1, 110°C) : 91% de produto principal.

rmp δ (CCl₄) : 3,97 (4H, m), 2,50 (1H, m), 1,3-2,2 (8H, m),
1,28 (9H, s).

I.V. ν_{COCOC} (filme) : 1145, 1130, 1080, 1030 cm⁻¹.

c) 2-t-Butiltiociclohexanona (XXXI) - De 3,7g (16 mmol) do cetal (XLIV) e 25 ml de ácido sulfúrico aquoso 5% (v/v), conforme procedimento descrito em 3.2.3.1.c, obteve-se 1,8g (60,2%) de 2-t-butiltiociclohexanona de p.e. 72 - 72,5°C/0,5 Torr (lit.⁴⁶ p.e. 123 - 124°C/16 Torr), cromatograficamente pura (10% FFAP, 150°C).

rmp δ (CCl_4) : 3,30 (1H, m), 2,88 (1H, m), 1,4 - 2,4 (7H, m),
1,40 (s) e 1,30 (s) para um total de 9H.

rmp δ (CDCl_3) : 3,45 (1H, m), 2,97 (1H, m), 1,4 - 2,5 (7H, m) e
1,33 (9H, s) de acordo com a literatura⁴⁶.

I.V. $\nu_{\text{C=O}}$ (CCl_4) : 1708 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1704 cm^{-1} .

3.2.3.3. 2-Etiltio-2-metilciclohexanona (XXXII)

a) 2-Cloro-2-metilciclohexanona⁶⁴ - Partiu-se de 22,4g (0,20 mol) de 2-metilciclohexanona em 100 ml de tetracloreto de carbono e 29,7g (0,22 mol) de cloreto de sulfurila em 30 ml de tetracloreto de carbono, obtendo-se 18,9g (64,5%) de 2-cloro-2-metilciclohexanona, p.e. $85 - 87^\circ\text{C}/28 \text{ Torr}$ (lit.⁶⁴ p.e. $94 - 96^\circ\text{C}/27 \text{ Torr}$).

b) 2-Etiltio-2-metilciclohexanona(XXXII) -Empregando-se o procedimento descrito para a 2-etiltiociclohexanona em 3.2.3.1a, obtiveram-se, pela reação de 18,9g (0,129 mol) de 2-cloro-2-metilciclohexanona e de etanotiolato de sódio, preparado a partir de 2,96g (0,129 mol) de sódio, 8,2g (0,132 mol) de etanotiol e 100 ml de etanol abs., 15,6g (70,3%) de produto de p.e. $94 - 96^\circ\text{C}/5 \text{ Torr}$, cromatograficamente puro (5% QF-1, 110°C).

Análise: calculado para $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{OS}$: C 62,79% H 9,30%
encontrado : C 62,83% H 9,75%

rmp δ (CCl_4) : 1,30 (3H, s), 1,15 (3H, t, $J = 7 \text{ Hz}$) e 1,2 - 3,2 (10H, m).

I.V. $\nu_{\text{C=O}}$ (CCl_4) : 1703 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1695 cm^{-1} .

3.2.3.4. 2-Etiltio-4-t-butilciclohexanona (XXXIV)

a) 4-t-Butilciclohexanona (XLV)^{65a} - Preparou-se o reagente oxidante pela dissolução de 26,8g de trióxido de crômio em 50 ml de água e 24 ml de ácido sulfúrico conc. Esta solução foi adicionada, sob agitação e temperatura de 30°C, a uma solução de 31,2g (0,20 mol) de 4-t-butilciclohexanol (mistura dos isômeros cis e trans, Merck-Schuchardt) em 500 ml de acetona. Obtiveram-se 26,3g (85,4%) de 4-t-butilciclohexanona de p.f. 46-48,5°C (lit.^{65a} p.f. 48 - 49°C).

b) 2-Cloro-4-t-butilciclohexanona(XXXVI)⁴⁸ - Em uma solução de 53,4g (0,347 mol) de 4-t-butilciclohexanona, em 70 ml de ácido acético 90%, foram introduzidos, durante duas horas e meia, 26,5g (0,37 mol) de cloro, sob agitação e resfriamento em banho de gelo e água. Extraíu-se em éter, lavou-se o extrato etéreo com solução aquosa saturada de bicarbonato de sódio até neutralidade, água e solução aquosa saturada de cloreto de sódio. Após secagem com sulfato de magnésio anidro, evaporou-se o éter e submeteu-se o produto bruto a uma destilação fracionada, recolhendo-se treze frações: frações 1 a 3, 4,5g, p.e. 26-58°C/0,2 Torr, consistindo principalmente de 4-t-butilciclohexanona (análise cromatográfica, 5% QF-1, 155°C); frações 4 a 8, 20,1g (30,8%), p.e. 60 - 64°C/0,1 - 0,3 Torr (lit.⁴⁸ p.e. 66 - 67°C/0,6 Torr), consistindo principalmente de trans-2-cloro-4-t-butilciclohexanona (análise cromatográfica, 5% QF-1, 155°C); fração 9, 3,8g, p.e. 64 - 69°C/0,02 - 0,5 Torr, mistura de trans-2-cloro-4-t-butilciclohexanona, cis-2-cloro-4-t-butilciclohexanona e uma substância de natureza desconhecida; frações 10 a 13, 27,7g (42,4%), p.e. 90 - 102°C/0,2 Torr (lit.⁴⁸ p.e. 84 - 89°C/0,3 - 0,5 Torr), consistindo principalmente de cis-2-cloro-4-t-butilciclohexanona

(análise cromatográfica, 5% QF-1, 155°C). Recristalizada várias vezes de n-pentano, apresentou p.f. 57,5 - 58,5°C (lit.⁴⁸ p.f. 58,5 - 59,5°C).

Os espectros de rmp das cis- e trans-2-cloro-4-t-butilciclohexanonas concordam com os da literatura⁶⁶.

c) 2-Etiltio-4-t-butilciclohexanona(XXXIV)

c.1. - Reação de etanotiolato de sódio e trans-2-cloro-4-t-butilciclohexanona - Pelo procedimento descrito em 3.2.3.1a, obtiveram-se, a partir de 4,04g (21 mmol) de trans-2-cloro-4-t-butilciclohexanona, 0,49g (21 mmol) de sódio, 1,59g (26 mmol) de etanotiol e 25 ml de metanol abs., 4,01g de produto bruto que, pela análise cromatográfica (5% QF-1, 175°C) mostrou um pico principal (72%).

c.2. - Reação de etanotiolato de sódio e cis-2-cloro-4-t-butilciclohexanona - De 8,6g (45 mmol), 1,04g (45 mmol) de sódio, 3,35g (54 mmol) de etanotiol e 50 ml de metanol abs., obtiveram-se, empregando o procedimento descrito em 3.2.3.1a, 8,9g de um líquido cuja análise cromatográfica (5% QF-1, 175°C) revelou um pico principal (84%) de tempo de retenção igual ao observado na análise do produto bruto em c.1.

Os produtos de c.1. e c.2. foram reunidos e submetidos a destilação à pressão reduzida, obtendo-se 7,2g (50,2% de um líquido de p.e. 73,4 - 75°C/0,045 - 0,05 Torr, cromatograficamente puro (5% QF-1, 170°C).

Análise : calculado para $C_{12}H_{22}OS$: C 67,29% H 10,3%

encontrado : C 67,23% H 10,5%

rmp δ (CCl_4) : 3,22 (1H, m), 2,45 (2H, q, J = 7 Hz) e 1,23 (3H, t, J = 7 Hz) sobrepostos a 1,0 - 3,0 (7H, m), 0,98 (9H, s).

I.V. $\nu_{\text{C=O}}$ (CCl_4) : 1711 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1703 cm^{-1} .

3.2.3.5. Octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona (XXXVIII)

a) cis-Octahidro-4a-metil-8a-hidroxi-2(1H)-naftalenona (cis-10-metil-2-decalon-9-ol) (XLVI)⁶⁷ - A 56,0g (0,50 mol) de 2-metilciclohexanona (BDH, redestilada, p.e. $50^\circ\text{C}/10 \text{ Torr}$) contendo 3 ml de solução 3N de etóxido de sódio em etanol, mantidos a -10°C , sob atmosfera de nitrogênio e sob agitação, foram adicionados, durante seis horas, 35,0g (0,50 mol) de metil vinil cetona (Aldrich, usada sem purificação prévia). Após manter a mistura reacional por mais seis horas a -10°C , ela foi transferida a um funil de separação com ajuda de éter e uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio. A mistura resultante foi extraída quatro vezes com éter, os extratos etéreos combinados secos com sulfato de magnésio anidro e o éter destilado, mantendo-se o volume da solução constante em 700 ml, pela adição de n-hexano. Ao se iniciar a cristalização, a solução foi resfriada e, após filtração, obtiveram-se 30,0g (33%) de cis-10-metil-2-decalon-9-ol de p.f. $119 - 121^\circ\text{C}$ (lit.⁶⁷ p.f. $120 - 121^\circ\text{C}$).

b) 4,4a,5,6,7,8-hexahidro-4a-metil-2(3H)-naftalenona (10-metil- $\Delta^{1(9)}$ -octalona-2) (XLVII)⁶⁷ - 30,0g (0,165 mol) de cis-10-metil-2-decalon-9-ol foram misturados com 400 ml de solução aquosa de hidróxido de potássio a 10% e destilados com vapor. O produto bruto foi submetido a destilação à pressão reduzida, fornecendo 19,3g (71,3%) de 10-metil- $\Delta^{1(9)}$ -octalona-2-, p.e. $105 - 107^\circ\text{C}/2 \text{ Torr}$ (lit.⁶⁷ p.e. $82 - 83^\circ\text{C}/0,7 \text{ Torr}$).

c) Trans-Octahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona (trans-10-metil-2-decalona) (XLVIII)⁶⁸ - Empregou-se o procedimento descrito^{65b} para a preparação da trans-octahidro-2(1H)-naftalenona. De

16,2g (99,4 mmol) de (XLVII) dissolvidos em 70 ml de éter absoluto e aproximadamente 400 ml de amônia líquida e 3,7g (0,54 mol) de fio de lítio cortado em pequenos pedaços, obtiveram-se 14,4g de produto bruto. Este foi dissolvido em 20 ml de ácido acético glacial e foi tratado com uma solução de 4,8g (48,5mmol) de trióxido de crômio em 3 ml de água e 12 ml de ácido acético glacial. Após uma noite, à temperatura ambiente, a mistura reacional foi aquecida por duas horas em banho-maria. Adicionou-se uma solução de 9,5g de hidróxido de sódio em 37 ml de água e extraiu-se a mistura continuamente com éter. O extrato etéreo foi lavado com uma solução aquosa saturada de bicarbonato de potássio, água e solução aquosa saturada de cloreto de sódio. Após secagem com sulfato de magnésio anidro, o éter foi evaporado e o produto bruto submetido a destilação à pressão reduzida, fornecendo 11,0g (67%) de trans-octahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona de p.e. 82 - 84°C/1 Torr (lit.⁶⁸ p.e. 130°C/20 Torr). Pela análise cromatográfica (5% QF-1, 175°C), o produto mostrou conter aproximadamente 10% de 10-metil- $\Delta^{1(9)}$ -octalona-2. Purificou-se por cromatografia em coluna de sílica gel (75g) preparada em n-hexano. Como eluentes empregaram-se n-hexano, n-hexano: benzeno 9:1, 8:2 e 6:4 e finalmente benzeno. A cetona obtida foi redestilada, p.e. 71 - 72°C/0,5 Torr mostrando ser cromatograficamente pura (5% QF-1, 175°C).

d) 3(e)-Bromooctahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona
(trans-3-bromo-trans-10-metil-2-decalona)(XXXIX)⁴⁹ - A uma solução de 10,0g (60 mmol) de octahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona em 180 ml de ácido acético glacial contendo 40 gotas de ácido bromídrico 48%^{65c}, adicionaram-se, lentamente e sob agitação, 10,6g (66 mmol) de bromo dissolvidos em 60 ml de ácido acético gla-

cial. Após agitar durante três horas à temperatura ambiente, jogou-se a mistura reacional em água e extraiu-se a solução aquosa com éter. O extrato etéreo foi lavado com uma solução aquosa saturada de bicarbonato de sódio, seco com sulfato de magnésio anidro e o éter evaporado. O resíduo foi recristalizado de hexano-benzeno (10:1) fornecendo 8,45g (57,2%) de 3(e)-bromooctahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona, p.f. 100 - 105°C (lit.⁴⁹ p.f. 101°C). Uma amostra, após várias recristalizações, forneceu um produto de p.f. 105 - 107°C.

mp δ (CCl₄) : 4,63 (1H, dd, J = 13 Hz, 7 Hz), 1,12 (3H, s) e 1,0 - 2,5 (13H, m).

e) Octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona (XXVd)

A uma solução de etanotiolato de sódio obtida de 0,70g (30mmol) de sódio, 2,06g (33 mmol) de etanotiol e 17 ml de metanol absoluto, adicionaram-se gota a gota, sob agitação e resfriamento a -10°C, 7,4g (30 mmol) de 3(e)-bromooctahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona dissolvida em 25 ml de THF. Após voltar à temperatura ambiente, a mistura reacional foi jogada em água e o óleo formado extraído com éter. O extrato etéreo foi lavado com água, solução aquosa saturada de cloreto de sódio e seco com sulfato de magnésio anidro. O produto bruto submetido a destilação à pressão reduzida forneceu 4,08g (60%) de um líquido de p.e. 83-84°C/0,03 Torr, cujo espectro de mp estava de acordo com a estrutura da octahidro-4a-metil-3-etiltio-2(1H)-naftalenona. O produto foi redestilado (p.e. 108°C/0,2 Torr) e mostrou-se cromatograficamente puro (5% QF-1, 175°C).

rm δ (CCl_4) : 3,45 (0,6H, dd, $J = 12$ Hz, 6Hz) e 3,16 (0,4H, m),
2,47 (q, $J = 7$ Hz) e 2,39 (q, $J = 7$ Hz) total 2H,
1,17 (3H, t, $J = 7$ Hz), 1,11 (s) e 1,05 (s) to-
tal 3H, sobrepostos a 1,0 - 2,2 (13H, m).

rm ^{13}C δ (CCl_4), referência TMS : 202,9 e 203,3 (C = O).

I.V. ν_{CO} (CCl_4) : 1723 e 1705 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1713 (1703) cm^{-1} .

3.2.3.6. Reações de sulfenilação de cetonas⁴⁴

a) Solventes e reagentes - A hexametiltrifosforamida (HMPA) (Aldrich) foi destilada de hidreto de cálcio; a isopropilciclohexilamina (ICA) (Aldrich) foi destilada de hidróxido de potássio e o tetrahidrofurano (THF) (Aldrich) de hidreto de lítio e alumínio, imediatamente antes do uso. O HMPA e a ICA foram mantidos sobre peneiras moleculares em frascos munidos de septos. Empregou-se uma solução 2,0M de n-butillítio (Ventron, Alfa Products).

O dissulfeto de dimetila foi preparado da seguinte maneira⁶⁹: 250g (1,76 mol) de iodeto de metila, 500g (2,02 mol) de tiossulfato de sódio pentahidratado em 400 ml de metanol e 500 ml de água foram aquecidos a refluxo sob agitação durante três horas. Destilaram-se aproximadamente 250 ml de metanol, adicionaram-se, lentamente, 245g (4,37 mol) de hidróxido de potássio em 500 ml de água e aqueceu-se por mais uma hora a refluxo. A mistura reacional foi diluída com água, extraída com éter, o extrato etéreo lavado com água e seco com sulfato de magnésio anidro. Destilou-se o éter e, em seguida, o produto, obtendo-se 44,4g (53,8%) de dissulfeto de dimetila de p.e. 106 - 107°C (lit.⁶⁹ p.e. 110°C). O dissulfeto foi redistilado de hidreto de cálcio e mantido sobre peneiras moleculares em frasco munido de septo.

b) Procedimento geral - A aparelhagem usada foi seca passando-se uma corrente de nitrogênio seco pela mesma e aquecendo-a com chama fuliginosa. Adicionou-se 1 equivalente de n-butil-lítio a uma solução de 1 equivalente de ICA em THF a -78°C . Completada a adição, elevou-se a temperatura da mistura reacional a -25°C e, após trinta minutos, adicionou-se, lentamente, a cetona dissolvida em THF/HMPA. Agitou-se por trinta minutos a -25°C e, após atingir a temperatura ambiente, a mistura foi mantida sob agitação por quarenta minutos. Resfriou-se a 0°C , adicionou-se o dissulfeto de dimetila e agitou-se por uma hora à temperatura ambiente. A mistura reacional foi jogada em éter e ácido clorídrico 10%. O extrato etéreo foi lavado com ácido clorídrico 10%, solução aquosa saturada de bicarbonato de sódio, água, solução aquosa saturada de cloreto de sódio e seco com sulfato de magnésio anidro. Após evaporar o éter, o produto bruto foi cromatografado em coluna de sílica gel preparada em n-hexano.

3.2.3.7. 2-Metiltiociclohexanona(XXIX)⁴⁴ - Preparou-se o amideto (67 mmol) em 57 ml de THF. Após trinta minutos a -25°C adicionaram-se 3,0g (30,6 mmol) de ciclohexanona em 7,5 ml de THF e 30 ml de HMPA. Depois de agitar a mistura reacional durante quarenta minutos à temperatura ambiente, resfriou-se a 0°C e adicionaram-se 6,37g (67,8 mmol) de dissulfeto de dimetila. Após procedimento usual (3.2.3.6.b) obtiveram-se 4,83g de produto cuja análise cromatográfica (5% QF-1, 120°C) mostrou um pico principal (75,4%) correspondente à 2-metiltiociclohexanona.

Cromatografou-se o produto bruto em coluna de sílica gel (90g) usando como eluente benzeno absoluto. Obteve-se 1,87g (42,2%) de 2-metiltiociclohexanona cromatograficamente pura (5% QF-1, 120°C).

mp δ (CDCl_3) : 3,25 (1H, m), 2,07 (3H, s) sobreposto a 1,0 - 2,8 (8H, m).

I.V. ν_{CO} (CCl_4) : 1709 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1701 cm^{-1} .

3.2.3.8. 2-Metiltio-4-t-butilciclohexanona(XXXIII) - De acordo com o procedimento geral das sulfenilações (3.2.3.6.b), obtiveram-se, de 3,23g (21 mmol) de 4-t-butilciclohexanona em 5 ml de THF e 28,5 ml de HMPA, 6,42g (44,6 mmol) de ICA em 38 ml de THF e 4,25g (4,52 mmol) de dissulfeto de dimetila, 4,28g de um líquido cuja análise cromatográfica (5% QF-1, 160°C) mostrou um pico principal (83%). O produto foi cromatografado em coluna de sílica gel (90g) empregando benzeno absoluto como eluente. Isolaram-se 2,91g (69,4%) de um líquido cromatograficamente puro (5% QF-1, 160°C). Submetido a destilação à pressão reduzida, p.e. observado : $85 - 87^\circ\text{C}/1 \text{ Torr}$.

Análise: calculado para $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{OS}$: C 66,0% H 10,0%
 encontrado : C 66,05% H 10,16%

mp δ (CCl_4) : 3,0 (1H, m) sobreposto a (0,5H, m), 1,96 (3H, s) sobreposto a 1,2 - 3,0 (6,5H, m), 0,90 (9H, s).

I.V. ν_{CO} (CCl_4) : 1711 cm^{-1} ; (CHCl_3) : 1704 cm^{-1} .

3.2.3.9. Octahidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)-naftalenona(XXXVII)⁴⁴

O amideto (38,9 mmol) foi preparado pela maneira usual (3.2.3.6b) em 28 ml de THF a -25°C . Depois de trinta minutos adicionou-se uma solução de 3,07g (18,5 mmol) de octahidro-4a-metil-2(1H)-naftalenona em 4 ml de THF e 24 ml de HMPA. Após agitar trinta minutos a -25°C , quarenta minutos à temperatura ambiente, resfriou-se a 0°C e adicionaram-se 3,66g (38,9 mmol) de dissulfeto

de dimetila. Obtiveram-se 3,89g de produto bruto cuja análise cromatográfica (5% QF-1, 180°C) mostrou um pico principal (73%). Cromatografou-se em coluna de sílica gel (90g) empregando como eluente benzeno absoluto e isolou-se 1,75g (44,7%) de octahidro-4a-metil-3-metiltio-2(1H)-naftalenona cromatograficamente pura (5% QF-1, 180°C).

mp δ (CDCl₃) : 3,49 (0,7H, dd, J = 12 Hz, 6 Hz) e 3,07 (0,3H, m), 2,06 (s) e 2,02 (s) total 3H e 1,13 (s) e 1,09 (s) total 3H sobrepostos a 1,0 - 2,4 (13H, m).

I.V. ν_{CO} (CCl₄) : 1723 e 1705 cm⁻¹; (CHCl₃) : 1713 (1703) cm⁻¹.

3.2.3.10. 3-Metiltio-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptanona-2

(3-metiltiocânfora)(XLII) - O isopropilciclohexilamideto (90,8 mmol) em 76 ml de THF foi obtido pela maneira usual (3.2.3.6.b). Adicionaram-se 6,39g (42 mmol) de (+)-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptanona-2* em 10 ml de THF e 57 ml de HMPA a -25°C. A mistura reacional assim obtida, após agitação durante quarenta minutos à temperatura ambiente, foram adicionados 8,50g (90,4 mmol) de dissulfeto de dimetila a 0°C. Após procedimento normal, isolaram-se 8,35g de um líquido cuja análise cromatográfica (5% QF-1, 160°C) mostrou dois picos principais, um correspondente à cânfora (32%) e outro ao produto esperado (60%).

Dividiu-se o líquido obtido em duas partes e cromatografou-se em coluna de sílica gel (90g), usando benzeno absoluto como eluente. Obtiveram-se 3,32g (39,9%) de um líquido cromatograficamente puro (5% QF-1, 150°C) de p.e. 83 - 84°C/1 Torr.

* (+)-Cânfora, p.f. 176 - 178°C, Aldrich, gentilmente cedida pelo Dr. Timothy Brockson.

Análise : calculado para $C_{11}H_{18}OS$: C 66,67% H 9,09%
 encontrado : C 66,61% H 9,39%

mp δ (CCl_4) : 3,09 (1H, d, $J = 5$ Hz), 2,22 (3H, s), 0,98 (3H, s),
 0,86 (3H, s), 0,84 (3H, s) e 1,16 - 2,4 (5H, m).

I.V. ν_{CO} (CCl_4) : 1746 cm^{-1} ; ($CHCl_3$) : 1739 cm^{-1} .

SUMÁRIO

No presente trabalho são apresentados os espectros de absorção no ultravioleta, em n-hexano e metanol absolutos, das 2-mercapto-(XLI) e 2-etiltiociclopentanonas (XL), 2-metiltio-(XXXIX), 2-etiltio-(XXX), 2-t-butiltio-(XXXI) e 2-etiltio-2-metilciclohexanonas (XXXII). A fim de melhor compreender a importância das conformações moleculares nas modificações observadas nas bandas de absorção correspondentes às transições $n \rightarrow \pi^*$ do grupo carbonila e $n \rightarrow \sigma^*$ do átomo de enxofre, foram sintetizadas várias cetonas α -alquiltio-substituídas conformacionalmente definidas: 2-metiltio-(XXXIII) e 2-etiltio-4-t-butilciclohexanonas (XXXIV), os 3-metiltio-(XXXVII) e 3-etiltio-(XXXVIII) derivados da trans-octahidro-4a-metil-2(1H)-naftaleno e a 3-metiltio-1,7,7-trimetil-biciclo[2.2.1] heptanona-2(XLII).

As propriedades espectroscópicas dos compostos estudados são discutidas considerando as possíveis interações eletrônicas entre o átomo de enxofre e o grupo carbonila. Conclui-se que as interações dependem das conformações moleculares e que serão maiores quando: (a) - A ligação C-S ocupar uma posição axial ou quasi-axial; (b) - A conformação do grupo alquiltio permitir a máxima superposição do par solitário de elétrons do enxofre com a ligação $C_{C=O} - C_{\alpha}$.

SUMMARY

The ultraviolet absorption spectra in absolute n-hexane and methanol of 2-mercapto-(XLI) and 2-ethylthiocyclopentanones (XL), 2-methylthio-(XXIX), 2-ethylthio-(XXX), 2-t-butylthio-(XXXI) and 2-ethylthio-2-methylcyclohexanones (XXXII) are presented. In order to evaluate the importance of the molecular conformations upon the observed modifications of the absorption bands due to the $n \rightarrow \pi^*$ transition of the carbonyl group and $n \rightarrow \sigma^*$ transition of the sulphur atom, several conformationally defined α -alkylthio-ketones were synthesized: 2-methylthio-(XXXIII) and 2-ethylthio-4-t-butylcyclohexanones (XXXIV), the 3-methylthio-(XXXVII) and 3-ethylthio (XXXVIII) derivatives of trans-octahydro-4a-methyl-2(1H)-naphthalenone and 3-methylthio-1,7,7-trimethyl-bicyclo [2.2.1] -heptan-2-one (XLII).

The spectroscopic properties of the studied compounds are discussed, considering the possible orbital interactions between the sulphur atom and the carbonyl group. It is concluded that such interactions are conformation dependent and are more important when: (a) - The C-S bond is axial or quasi-axial; (b) - The conformation of the alkylthio group allows the maximum overlap of the sulphur lone-pair and the $C_{C=O} - C_{\alpha}$ bond.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A.Burawoy, J.Chem.Soc., 1929, 1177.
2. H.L.McMurry, J.Chem.Phys., 1941, 9, 231.
3. M.Kasha, Discuss.Faraday Soc., 1950, 9, 14.
4. J.N.Murrell, "The Theory of the Electronic Spectra of Organic Molecules", Chapman & Hall, 1971, pag. 158 e seg.
5. H.Jaffé e M.Orchin, "Theory and Applications of Ultraviolet Spectroscopy", John Wiley & Sons, Inc., 1970 (a)pag. 105; (b) pag. 181.
6. J.S.Lake e A.J.Harrison, J.Chem.Phys., 1959, 30, 361.
7. (a) N.S.Bayliss e G.Wills-Johnson, Spectrochim.Acta, 1968, 24A, 551; (b) ibid, 1968, 24A, 563.
8. H.McConell, J.Chem.Phys., 1952, 20, 700.
9. G.C.Pimentel, J.Am.Chem.Soc., 1957, 79, 3323.
10. (a) E.M.Kosower e G.S.Wu, J.Am.Chem.Soc., 1961, 83, 3142; (b) E.M.Kosower, G.S.Wu e T.S.Sorensen, ibid, 3147.
11. C.Trufem Filho, "Tese de Doutorado", Instituto de Química da Universidade de São Paulo, 1976, capítulo I.
12. H.Eyring, J.Walter e G.E.Kimball, "Quantum Chemistry", John Wiley & Sons, Inc., 1967, pag. 342.
13. C.Djerassi, "Optical Rotatory Dispersion, Applications to Organic Chemistry", McGraw-Hill Book Comp., 1960, (a) capítulo 12; (b) capítulo 13.
14. W.Moffitt, R.B.Woodward, A.Moscowitz, W.Klyne e C.Djerassi, J.Am.Chem.Soc., 1961, 83, 4013.

15. T.D.Bouman e D.A.Lightner, J.Am.Chem.Soc., 1976, 98, 3145 e referências citadas.
16. R.C.Cookson, J.Chem.Soc., 1954, 282.
17. N.J.Leonard e F.H.Owens, J.Am.Chem.Soc., 1958, 80, 6039.
18. N.L.Allinger, J.C.Tai e M.A.Miller, J.Am.Chem.Soc., 1966, 88, 4495.
19. L.Labhart e G.Wagniêre, Helv.Chim.Acta, 1959, 42, 2219.
20. R.C.Cookson, J.Henstock e J.Hudec, J.Am.Chem.Soc., 1966, 88, 1060.
21. J.Hudec, J.C.S.Chem.Comm., 1970, 829.
22. R.Hoffmann, Accounts Chem.Res., 1971, 4, 1 e referências citadas.
23. C.Levin, R.Hoffmann, W.J.Hehre e J.Hudec, J.C.S.Perkin II, 1973, 210.
24. A.W.J.D.Deckers, J.W.Verhoeven e W.N.Speckamp, Tetrahedron, 1973, 29, 1691.
25. C.Worrell, J.W.Verhoeven e W.M.Speckamp, Tetrahedron, 1974, 30, 3525.
26. E.E.Ernstbrunner e J.Hudec, J.Am.Chem.Soc., 1974, 96, 7106.
27. J.Hudec, J.C.S.Perkin II, 1975, 1020.
28. L.Libit e R.Hoffmann, J.Am.Chem.Soc., 1974, 96, 1370.
29. P.Pasman, J.W.Verhoeven e T.J.de Boer, Tetrahedron, 1976, 32, 2827.
30. E.A.Fehnel e M.Carmack, J.Am.Chem.Soc., 1949, 71, 84.
31. N.J.Leonard, T.W.Milligan e T.L.Brown, J.Am.Chem.Soc., 1960, 82, 4075.

32. G.Bergson e A.L.Delin, Arkiv Kemi, 1962, 18, 489.
33. L.A.Paquette e L.D.Wise, J.Am.Chem.Soc., 1967, 89, 6659.
34. R.Herzschuh e R.Borsdorf, J.Electroanal.Chem., 1969, 23, 55.
35. B.Wladislaw, R.Rittner e H.Viertler, J.Chem.Soc.(B), 1971, 1859.
36. B.Wladislaw, H.Viertler, F.A.C.Andrade e E.Berthold Demant, Int.J.Sulfur Chem., 1972, 2A, 161.
37. G.Snatzke e B.Wolfram, Tetrahedron, 1972, 28, 655.
38. M.M.Cook e C.Djerassi, J.Am.Chem.Soc., 1973, 95, 3678.
39. B.T.Buzzi, P.R.Olivato, R.Rittner, C.Trufem, H.Viertler e B.Wladislaw, J.C.S.Perkin II, 1975, 1294.
40. P.R.Olivato, H.Viertler, B.Wladislaw, K.C.Cole e C.Sandorfy, Can.J.Chem., 1976, 54, 3026.
41. K.C.Cole, C.Sandorfy, M.T.Fabi, P.R.Olivato, R.Rittner, C.Trufem, H.Viertler e B.Wladislaw, J.C.S.Perkin II, 1977, 2025.
42. P.R.Olivato, H.Viertler, B.Wladislaw, P.Sauvageau e C.Sandorfy, 1978, manuscrito submetido à publicação.
43. Yuh-Hsu Pan e J.B.Stothers, Can.J.Chem., 1967, 45, 2943 e referências citadas.
44. B.M.Trost, T.N.Salzmann e K.Hiroi, J.Am.Chem.Soc., 1976, 98, 4887.
45. M.Mousseron, J.Jacquier e A.Fontaine, Bull.Soc.chim.France, 1952, 767.
46. W.C.Lumma, Jr. e G.A.Berchtold, J.Org.Chem., 1969, 34, 1566.

47. E.L.Eliel, N.L.Allinger, S.J.Angyal e G.A.Morrison,
"Conformational Analysis", Interscience Publ., Inc.,
1965 (a) 44; (b) 48.
48. N.L.Allinger, J.Allinger, L.A.Freiberg, R.F.Czaja e N.A.
LeBel, J.Am.Chem.Soc., 1960, 82, 5876.
49. A.Casadevall, E.Casadevall e M.Lasperas, Bull.Soc.chim.
France, 1968, 4506.
50. M.Lasperas, A.Casadevall e E.Casadevall, Bull.Soc.Chim.
France, 1971, 3209.
51. F.V.Brutcher, Jr., T.Roberts, S.J.Barr e N.Pearson, J.Am.
Chem.Soc., 1959, 81, 4915.
52. I.C.Coelho Calegão, "Tese de Doutorado", Instituto de
Química da Universidade de São Paulo (em elaboração).
53. B.Wladislaw, P.R.Olivato e R.Rittner, Rev.Latinoamer.Quim.,
1974, 5, 206.
54. W.D.Kumler, J.N.Shoolery e F.V.Brutcher, Jr., J.Am.Chem.Soc.,
1958, 80, 2533.
55. F.A.L.Anet, Can.J.Chem., 1961, 39, 789.
56. P.G.Gassman, D.P.Gilbert e S.M.Cole, J.Org.Chem., 1977, 42,
3233.
57. A.Padwa e A.Battisti, J.Am.Chem.Soc., 1972, 94, 521.
58. C.Ganter e J.F.Moser, Helv.Chim.Acta, 1969, 52, 725.
59. C.H.Robinson, L.Milewich, G.Snatzke, W.Klyne e S.R.Wallis,
J.Chem.Soc.(C), 1968, 1245.
60. J.S.Rosenfield e A.Moscowitz, J.Am.Chem.Soc., 1972, 94,
4797.

61. D.D.Perrin, W.L.F.Armarego e D.R.Perrin, "Purification of Laboratory Chemicals", Pergamon, 1966.
62. M.Kuhn, J.prakt.Chemie, 1940, 156, 103.
63. A.I.Vogel, "A Textbook of Practical Organic Chemistry", 3^a ed., Longmans, 1970, pag. 429.
64. E.W.Warnhoff, D.G.Martin e W.S.Johnson, Org. Synth., Coll. Vol. IV, John Wiley & Sons, Inc., 1963, pag. 162.
65. R.S.Monson, "Advanced Organic Synthesis", Academic Press, Inc., 1972, (a) pag.3;(b) pag.27; (c) pag. 50.
66. J.Cantacuzène, J.Petrissans e Dang-Quoc-Quan, Tetrahedron Letters, 1967, 2543.
67. J.A.Marshall e W.I.Fanta, J.Org.Chem., 1964, 29, 2501.
68. M.Yanagita, K.Yamakawa, A.Tahara e H.Ogura, J.Org.Chem., 1955, 20, 1767.
69. S.Blackburn e F.Challenger, J.Chem.Soc., 1938, 1872.

BIBLIOTECA
Instituto de Química
Universidade de São Paulo