FRANK HERBERT QUINA

**FOTOFENÔMENOS EM SOLUÇÕES MICELARES:
SUPRESSÃO DE EMISSÃO DE ESTADOS
ELETRÔNICOS EXCITADOS**

Tese de Livre-Docência apresentada ao
Departamento de Química Fundamental
do Instituto de Química da
Universidade de São Paulo

SÃO PAULO
1977

À Mariana Theresa que antes de mais nada, atrapalhou.

Ao Hernan Chaimovich, pela amizade, pelo ímpeto de entrar no campo de micelas e pela ânsia de discutir e criar ideias e conceitos.

À Maria Lucia, Iolanda e à criança do Hernan, pela relutância em acreditar em ideias e resultados as vezes frustrantes.

AGRADECIMENTOS

Ao Vicente Toscano, pela amizade, pela confiança e pelo apoio constante:

Ao Eduardo Peixoto, pela amizade e pela revisão do português, um trabalho infelizmente maior do que a secção de choque para espalhamento de eletrons por H_2 ;

A Cecília Lopes, pela excelente ajuda técnica sem a qual eu ainda estaria limpando a sujeira da minha primeira experiência;

Aos colegas e companheiros do nosso grupo de pesquisa: Maria Lucia, Rosangela, Roberto, Bonilha, Laerte, Pedro, Eunice e Sandra, pelos resultados paralelos que permitiram a conceituação e elaboração deste trabalho;

Ao CNP_q, através do Programa CNP_q-NAS, pela bolsa a mim concedida e pelo apoio financeiro a este Laboratório de Fotoquímica;

A FAPESP, pelas bolsas concedidas e pela verba adicional que vem permitindo a continuação destes estudos;

Ao Instituto de Química pela aberta aceitação e pelas excelentes condições de trabalho.

ÍNDICE

	Pág.
SÍMBOLOS E ABREVIATURAS	vi
I. INTRODUÇÃO	1
I.1. MICELAS: ESTRUTURA E MICELIZAÇÃO	1
I.1.1. ESTRUTURA DA FASE MICELAR	1
I.1.2. MICELIZAÇÃO	4
I.1.3. NATUREZA E TERMODINÂMICA DA MICELI- ZAÇÃO	6
I.2. FOTOFENÔMENOS	17
I.2.1. APLICAÇÕES DE FOTOFENÔMENOS ÀS SOLU- ÇÕES MICELARES	17
I.2.2. A SUPRESSÃO DE ESTADOS ELETRÔNICOS EXCITADOS	18
I.2.2.1. A SUPRESSÃO DE ESTADOS EL- ETRÔNICOS EXCITADOS EM MEIO ISOTRÔPICO	18
I.2.2.2. A SUPRESSÃO DE ESTADOS EL- ETRÔNICOS EXCITADOS EM SOLU- ÇÕES MICELARES	21
II. MODELOS	22
II.1. CONCENTRAÇÃO DE MONÔMERO LIVRE	22
II.2. PARTIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS	26
III. PARTE EXPERIMENTAL	31
III.1. MATERIAIS	31
III.2. SÍNTESE	31
III.3. APARELHOS E MÉTODOS	33

	Pág.
IV. RESULTADOS	36
IV.1. CONCENTRAÇÃO DE MONÔMERO LIVRE	36
IV.2. PARTIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS EM SOLUÇÕES MICELARES	65
V. DISCUSSÃO	80
V.1. O SIGNIFICADO DE "FORÇA IÔNICA" EM SOLU- ÇÕES MICELARES	80
V.1.1. "FORÇA IÔNICA" E REAÇÕES ENTRE IONS EM SOLUÇÕES ISOTRÓPICAS	80
V.1.2. "FORÇA IÔNICA" E AS PROPRIEDADES DA MICELA	86
V.1.3. "FORÇA IÔNICA" E REAÇÕES ENTRE IONS EM SOLUÇÕES MICELARES	89
V.1.4. A MEDIDA DE "FORÇA IÔNICA" EM SOLU- ÇÕES MICELARES	93
V.2. A CONCENTRAÇÃO DO MONÔMERO LIVRE	101
V.3. A PARTIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS	110
VI. CODA: PERSPECTIVAS	116
VII. RESUMO E ABSTRACT	118
VII.1. RESUMO	118
VII.2. ABSTRACT	120
VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	122

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

C_{DM}	concentração de detergente micelar
C_nCP	n-alkuil p-ciano-piridínio
CI	contra ion
CMC	concentração micelar crítica
CTAB	brometo de cetil trimetil amônio
Det	detergente
ΔG_m^O	variação da energia livre por monômero
HPCl	cloreto de N-hexadecil piridínio
k_q	constante de velocidade para a supressão
K_{sv}	constante de Stern-Volmer
$K_{FM}/\bar{N}$	constante de partição do emissor com a fase micelar
$K_1/\bar{N}$	constante de partição do supressor (substrato) na fase micelar
$\bar{n}$	número médio de incorporação (substratos por micela)
$\bar{N}$	número de agregação (monômeros por micela)
PBTA	brometo de 4-(1-pireno)-butil trimetil amônio
r_{ex}	raio de exclusão
r_M	raio da micela
$Ru(bipy)_3^{2+}$	cloreto de tris(2,2'-bipiridina) de rutênio (II)
S	substrato
V_D	volume molar do detergente
X	fração molar
α	gráu de ionização da micela
β_D, β_O	coeficientes angulares de graficos de ϕ_{em}^O/ϕ_{em} em função de S_{tot} na presença e ausência do detergente

ϵ	carga eletrônica unitária
ϵ_M, ϵ_A	coeficientes de extinção do emissor nas fases micelar e aquosa
ϕ, ϕ^0	rendimentos quânticos de emissão na presença e na ausência do supressor
μ	força iônica
μ_{ef}	força iônica efetiva
ψ	potencial elétrico
τ, τ^0	tempos de vida de emissão na presença e na ausência do supressor
$[]_{mic(elar)}$	concentração na fase micelar
$[]_{Aq}$	concentração na fase aquosa
$[]_{livre}$	concentração livre na fase aquosa intermicelar
$[]_{tot(al)}$	concentração total na solução
$[]_{sal}$	concentração proveniente do sal

I. INTRODUÇÃO

I. 1 MICELAS: ESTRUTURA E MICELIZAÇÃO

I.1.1 ESTRUTURA DA FASE MICELAR

Quando são estudadas as propriedades físicas de solução aquosa de certas moléculas anfifílicas, cujas estruturas contêm uma porção hidrofóbica (geralmente uma cadeia hidrocarbônica) e um grupo hidrofílico (grupo iônico ou oligomero de etilenoglicol), observam-se mudanças bruscas destas propriedades, a partir de uma certa faixa de concentração. - Abaixo desta concentração, chamada de concentração micelar crítica (CMC), as moléculas anfifílicas comportam-se à seme-lhança de eletrólitos fortes. Acima da CMC, uma série de evidências, por exemplo, tensão superficial, propriedades colli-gativas, condutividade, espalhamento de luz e a solubiliza - ção de substâncias insolúveis em água, levam-nos a crer na formação de agregados, chamados micelas. ¹⁻³

Para concentrações de até dez vezes a da C M C , geralmente aceita-se que a estrutura das micelas de molécu - las anfifílicas iônicas, consiste de agregados aproximadamen - te esféricos. Na ausência de sal, moléculas anfifílicas iôni - cas (detergentes iônicos) com CMC na faixa de mM, apresentam valores típicos de número médio de agregação $\bar{N}$ no intervalo de 50-100 monômeros por micela.¹

A justaposição das porções hidrofóbicas dos mono - meros, dá origem a um núcleo hidrocarbônico, cujo raio é

aproximadamente igual ao comprimento da cadeia hidrocarbônica; por outro lado, os grupos iônicos dos monômeros juntam-se, formando uma camada superficial, conhecida como a camada de Stern. A camada de Stern é constituída de $\bar{N}$ grupos iônicos hidratados do detergente, $\bar{N} (1 - \alpha)$ íons hidratados e de carga oposta à dos anteriores (contraíons) além de água intersticial de penetração. O termo α , representa o grau de ionização da micela. O potencial de superfície da micela, devido ao excesso de cargas do detergente na camada de Stern, é responsável pela organização dos contraíons na dupla camada de Gouy-Chapman. O número e a organização destes contraíons, diminuem à medida que nos afastamos da superfície da micela. ⁴

De acordo com estes conceitos de micelas, é possível imaginarmos para elas, uma secção transversal como a que mostrarmos na Figura 1.

É importante notar que na realidade as micelas são entidades dinâmicas. Por esta razão, em experiências de relaxação as soluções micelares demonstram a existência de dois processos distintos. Os processos que passam-se numa escala de tempo de microsegundos são interpretados como uma troca de monômeros entre as fases micelar e aquosa (Vide Eq. 1); quando esta escala de tempo é de ordem de milissegundos, supõe-se então que nós estamos na presença de um equilíbrio existente entre os processos de formação e destruição de micelas (vide Eq. 2). ^{1, 2}

FIGURA 1. Secção Transversal Idealizada da Micela.

No entanto, apesar de parecerem conceitualmente - simples, a natureza da fase micelar e o mecanismo destes processos dinâmicos são extremamente complexos e, por estas razões, eles têm merecido um grande esforço por parte dos pesquisadores nesta área.^{2, 5} Porém, para melhor clareza deste trabalho, é importante discutirmos mais detalhadamente, como veremos a seguir, a natureza de alguns fatores que determinam a formação de micelas.

1. 1. 2 MICELIZAÇÃO

Quando o meio é água, um líquido altamente estruturado (devido às pontes de hidrogênio), a formação de micelas (micelização) dependerá vitalmente da maneira pela qual um dado soluto influenciará esta estrutura. Em estudos sobre a transferência de **hidrocarbonetos** alifáticos (a partir do líquido puro) para a água, demonstrou-se que a variação da entropia para o processo é negativa e prepondera sobre a variação da energia livre, indicando uma maior estruturação das moléculas de água que estão em contato íntimo com o soluto.^{3,6}

No caso de soluções aquosas de detergentes, este "efeito hidrofóbico", que induz a estruturação da água em -

volta da cadeia hidrocarbônica do detergente, contribui para um aumento da energia livre da solução, em relação a água pura. Uma vez que esta energia livre cresce a medida que mais e mais detergente é adicionado à solução, então, certos fenômenos que podem provocar uma diminuição desta energia, começam a se manifestar. Um destes, é a adsorção do detergente na interface ar-água, com conseqüente redução não só da área de contato hidrocarboneto-água como também da tensão superficial da solução. Um outro, é a agregação das moléculas do detergente, o que também leva a uma diminuição da área de contato hidrocarboneto-água. ³

Tanto a adsorção na interface ar-água como a formação de pequenos agregados, diminuem mas não evitam o aumento da energia livre com o aumento da concentração do detergente. Entretanto, agregados de tamanhos maiores, e que são capazes de formar estruturas nas quais todas as cadeias hidrocarbônicas estão mantidas à distância das moléculas de água, oferecem a possibilidade de reduzir o contato hidrocarboneto-água ao mínimo possível. ^{3,6}

Por outro lado, a agregação em si, envolve outras interações que opõem-se a esta diminuição de energia livre, devido à perda desta estruturação especial que a água tem ao redor da cadeia hidrocarbônica. Estas interações incluem não só as repulsões eletrostáticas e estéricas, entre os grupos hidrofílicos dos monômeros do agregado, como também aquelas contribuições entrópicas negativas devidas à diminuição do grau de liberdade translacional do monômero e do con -

traion. ^{6,7}

A formação de micelas, a partir da CMC, deve-se ao predomínio da contribuição do efeito hidrofóbico sobre a energia livre total do sistema. Além da CMC, o aumento do número de micelas, preferencialmente ao crescimento delas, deve-se às interações, já mencionadas, que aumentam a energia livre do agregado. Assim sendo, pode-se manter, pelo processo de micelização, um estado de energia livre mínima enquanto é aumentada a concentração do detergente. ^{3,6,7}.

I. 1.3 NATUREZA E TERMODINÂMICA DA MICELIZAÇÃO

Entre as teorias mais comumente empregadas para explicar a natureza do fenômeno de micelização, destacam-se duas : a primeira, baseia-se na lei da ação das massas e a segunda, descreve o processo como uma separação de pseudo-fases. ¹⁻³

O modelo da ação das massas considera a micelização como uma série de equilíbrios dinâmicos. Estes equilíbrios podem ser descritos de duas formas matematicamente equivalentes. A primeira destas, pode ser representada da seguinte forma:

Nestas equações, M representa o monômero do detergente livre na fase aquosa intermicelar (monômero livre), e M_n um agregado contendo N monômeros. A segunda alternativa que é equivalente à primeira, é menos realista, mas tem a vantagem de ser mais adequada para um tratamento matemático, isto é:

Nestas equações, as constantes de equilíbrio são desconhecidas. Sendo assim, para simplificar o tratamento matemático, supõe-se que todas as constantes da segunda série de equilíbrios, exceto a última, são nulas. Consequentemente

mente, para detergentes iônicos é possível escrevermos ;

Para esta equação, a constante de equilíbrio pode então ser escrita como:

$$K_{eq} = \frac{(a_M)}{(a_m)^{\bar{N}} (a_{CI})^{\bar{N}(1-\alpha)}} \quad (4)$$

onde a_M , a_m e a_{CI} são atividades da micela (M), do monômero livre (m) do detergente e do contraion (CI), respectivamente; $\bar{N}$ é o número de agregação da micela e α é o seu grau de ionização.

A variação da energia livre por monômero, isto é, ΔG_m^O , pode ser relacionada com K_{eq} , da forma usual:

$$\Delta G_{total}^O = \bar{N} \Delta G_m^O = -RT \ln K_{eq} \quad (5)$$

Substituindo o valor de K_{eq} nesta equação, obtem-se :

$$\frac{\Delta G_m^O}{RT} = \ln a_m + (1 - \alpha) \ln a_{CI} - \frac{\ln a_M}{\bar{N}} \quad (6)$$

Por outro lado, no modelo da separação de pseudo-fases considera-se a micela como uma fase separada, cujas dimensões são pequenas quando comparadas àsquelas de uma fase macroscópica. O aparecimento desta fase micelar é observado para concentrações em torno da CMC ou para valores maiores do que o desta. Para detergentes iônicos, é necessário levarmos em conta também o fato de que a fase micelar possui uma carga elétrica; por esta razão, neste casos faz-se uso de um modelo de separação de fases carregadas. A separação da fase micelar pode ser formulada através da seguinte equação:

sendo que a constante de equilíbrio é dada por:

$$K'_{eq} = \frac{1}{(a_m)^{\bar{N}} (a_{CI})^{\bar{N}(1 - \alpha)}} \quad (8)$$

De acordo com a Eq. 5, a variação da energia livre por monômero é dada por:

$$\Delta G_{total}^O = \bar{N} \Delta G_m^O = -RT \ln K'_{eq} \quad (9)$$

Fazendo-se uso da Eq, 8, a Eq, 9 pode ser reescrita como :

$$\frac{\Delta G_m^O}{RT} = \ln a_m + (1 - \alpha) \ln a_{CI} \quad (10)$$

É importante notarmos que a Eq. 6 para ΔG_m^O , baseada no modelo da ação das massas, assemelha-se à Eq, 10 para ΔG_m^O , baseada no modelo de separação de fases carregadas; porém para valores grandes de $\bar{N}$ veremos que Eq. 6 $\approx$ Eq. 10, uma vez que:

$$\lim_{\bar{N} \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln a_M}{\bar{N}} \right] = 0 \quad (11)$$

O fato deste limite tender a zero, quer dizer simplesmente que para micelas de $\bar{N}$ pequeno (o que geralmente implica num valor alto da CMC), o modelo da ação das massas é mais adequado. Porém, para valores grandes de $\bar{N}$ (> 50 , o que geralmente implica em pequenos valores da CMC), que é o caso típico dos detergentes comumente empregados, as diferenças entre os valores calculados com os dois modelos, para concentrações do monômero livre e para propriedades termodinâmicas, são pequenas.¹⁻³

Fazendo-se uso da termodinâmica do Hill para sistemas pequenos, é possível calcularmos rigorosamente funções termodinâmicas para sistemas micelares e desta forma superarmos muitas das desvantagens intrínsecas destes dois modelos mais simples;⁸ com isto porém, o trata -

mento matemático torna-se mais complexo e os benefícios obtidos, no nosso caso, não seriam compensadores.

Além destes modelos, é interessante mencionarmos um novo modelo cinético de micelização, proposto recentemente por Aniansson e col.⁵ Este modelo é análogo ao de condução de calor ao longo de um fio condutor que interliga dois reservatórios térmicos que no caso seriam os monômeros (m) e as micelas (M):

O "condutor" seria então um conjunto de agregados pre-micelares de tamanhos intermediários. Este modelo mostrou-se extremamente útil na interpretação dos tempos de relaxação (restabelecimento de equilíbrio monômero - micela após perturbações do mesmo) em experiências de salto térmico (T - jump), salto bórico (P- jump), absorção de ultrassom, etc.

A maioria das tentativas realizadas para descrever os fatores que influenciam o processo de agregação de moléculas anfifílicas, partem da suposição de que ΔG_m^O , a variação da energia livre por monômero, pode ser considerada como uma soma de dois termos: 6,7,9

$$\Delta G_m^O = \Delta U_m^O + W_m \quad (12)$$

O termo ΔU_m^O seria a contribuição devida a um componente puramente hidrofóbico e representaria a energia livre para a transferência da cadeia hidrocarbônica do detergente, do meio aquoso para o núcleo hidrocarbônico do agregado. O termo W_m corresponderia à energia livre proveniente da repulsão entre os grupos hidrofílicos da superfície do agregado. Além desta hipótese, impõe-se ainda algumas restrições geométricas quanto ao tipo de empacotamento permitido. 6, 7

Além do mais, assume-se que ΔU_m^O pode ser definido como: 6,7

$$\Delta U_m^O = \Delta u_{CH_3}^O + n_{CH_2} \Delta u_{CH_2}^O + \Delta u_r^O \quad (13)$$

onde $\Delta u_{CH_3}^O$ seria a contribuição do grupo CH_3 terminal de cadeia, $\Delta u_{CH_2}^O$ a contribuição por grupo CH_2 da cadeia, n_{CH_2} o número de grupos CH_2 na cadeia mas fora do contato com a água e Δu_r^O uma contribuição devida aos contatos residuais do tipo hidrocarboneto-água existentes na superfície do agregado. Os valores dos vários Δu^O podem ser estimados a partir de: 6, 7

(a) variação da energia livre para a transferência de hidrocarbonetos alifáticos, do hidrocarboneto alifático puro para solução aquosa, ou de solução aquosa para a fase micelar, em função do comprimento da cadeia do hidrocarboneto;

(b) variação da CMC de detergentes não iônicos -

em função do comprimento da cadeia hidrocarbônica do detergente;

(c) valores da energia livre, por unidade de área, para hidrocarbonetos alifáticos existentes na interface ar-água ou interfaces hidrocarboneto alifático-água ;

(d) modelos geométricos específicos para a microestrutura da interface agregado-água.

No entanto, uma vez que os valores derivados de (a), (b) e (c) mostram-se pouco dependentes da concentração de sais que podem estar presentes no meio, é óbvio que os valores encontrados para ΔU_m^0 também serão relativamente insensíveis à força iônica.^{6, 7, 9} Damos a seguir, valores típicos dos vários Δu^0 , assim obtidos, e que podem ou não terem sofrido correções empíricas adicionais:^{4, 6, 7}

$$\Delta u_{CH_3}^0 \approx -2000 \text{ a } -2100 \text{ cal mol}^{-1} (\text{grupo } CH_3)^{-1}$$

$$\Delta u_{CH_2}^0 \approx -650 \text{ a } -825 \text{ cal mol}^{-1} (\text{grupo } CH_2)^{-1}$$

$$n_{CH_2}^0 \approx n_{CH_2}^0, n_{CH_2}^0 - 1 \text{ (onde } n_{CH_2}^0 \text{ é o número total de grupos } CH_2 \text{ na cadeia hidrocarbônica)}$$

$$\Delta u_r^0 \approx 25(A-A') \text{ a } 70 (A-A') \text{ cal mol}^{-1}, \text{ onde } A-A' \text{ representa a área residual (em } \text{\AA}^2 \text{) de contato do tipo hidrocarboneto-água, na superfície do agregado ; esta área é calculada como a diferença entre } A, \text{ a área por monômero na superfície do agregado, e } A', \text{ a área definida pelo grupo hidrofílico lá presente .}$$

As contribuições para o valor de W_m são muito

mais difíceis de serem tratadas. Entre os fatores que devem ser levados em consideração quando se trata de moléculas anfifílicas iônicas, podemos citar alguns: 4,6,7

- (a) formato, tamanho e orientação dos grupos hidrofílicos da superfície do agregado;
- (b) densidade de carga na superfície do agregado ;
- (c) adsorção específica de ions na superfície do agregado;
- (d) a presença da camada de Stern, na qual os efeitos discretos entre cargas e o efeito de saturação dielétrica, devem ser importantes;
- (e) a presença da dupla camada de Gouy-Chapman em torno do agregado;
- (f) o pequeno raio de curvatura da superfície do agregado;
- (g) contribuições entrópicas desfavoráveis, devidas à estruturação dos grupos hidrofílicos e dos contraions.

Apesar destes problemas, vários cálculos de propriedades micelares indicam que W_m pode ser aproximado como: 6, 7

$$W_m = \frac{\text{Constante}}{A} \quad (14)$$

Nesta equação, A é a área por monômero existente na superfície do agregado, enquanto que os valores da constante - que aparece nesta equação, podem ser calculados a partir de formulas semi-empíricas encontradas na literatura. 6, 7

As restrições encontradas para o tipo de empacotamento permitido, determinam a forma geométrica do agregado. Assim, é possível escrevermos uma "equação de empacotamento" para moléculas anfifílicas como:⁷

$$\frac{V}{A\lambda_c} = 1 - \frac{\lambda_c}{2} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right] + \frac{\lambda_c^2}{3R_1R_2} \quad (15)$$

para a qual as condições de contorno são:

- a) $V/A\lambda_c \leq 1/3$, micelas esféricas;
- b) $1/3 < V/A\lambda_c < 1/2$, transição de esfera para -
cilindro; micelas globulares;
- c) $1/2 \leq V/A\lambda_c \lesssim 2/3$, micelas cilíndricas;
- d) $\sim 2/3 \leq V/A\lambda_c < 1$, lipossomas (vesículas tipo membrana);
- e) $V/A\lambda_c \geq 1$, membranas planares.

Nesta equação, V é o volume e λ_c é o comprimento da(s) cadeia(s) hidrocarbônica(s) do monômero, isto é: ^{6, 7} .

$$V = (27,4 + 26,9 N_c) \text{ \AA}^3 \text{ por cadeia hidrocarbônica} \quad (16)$$

$$\lambda_c = (1,5 + 1,265 N_c) \text{ \AA} \quad (17)$$

onde N_c é o número total de carbonos na cadeia hidrocarbô-

nica. Além disto, A representa a área por monômero na superfície do agregado e R_1 e R_2 , os raios locais de curvatura da superfície: para esferas $R_1 = R_2$, para cilindros $R_2 = \infty$ e para superfície planares $R_1 = R_2 = \infty$; para estes casos, a Eq. 15 é exata e, até mesmo para casos que fogem destes tres tipos ideais (curvatura arbitrária), tem-se uma boa aproximação do valor da relação $V/A\lambda_c$ através da Eq. 15.

A influência dramática das restrições para empacotamento no tipo de agregação observada, pode ser melhor compreendida comparando-se o brometo de dodeciltrimetilamônio (DTAB) com o brometo de didodecil dimetilamônio (-DDAB-).

DTAB

DDAB

O DTAB forma micelas pequenas e aproximadamente esféricas em solução aquosa, de acordo com seu valor de $V/A\lambda_c \approx 0,35$ (usando-se um valor de $A = 60 \text{ \AA}^2$). Por outro lado, o DDAB, cujo valor de $V/A\lambda_c$, é pelo menos duas vezes maior do que o de DTAB, forma lipossomas, (vesículas tipo membrana), ao invés de micelas, em dispersão aquosa.¹⁰

Uma vez salientados os aspectos mais importantes sobre a natureza das micelas e dos processos de micelização, passaremos a uma descrição do fenômeno de supressão de estados eletrônicos excitados; este fotofenômeno é utilizado neste Tese como técnica de medida da concentração de monômero livre em soluções de detergentes iônicos e, para o estudo dos fatores que influenciam a partição e a distribuição de substratos em soluções micelares.

I. 2 FOTOFENÔMENOS

I. 2. 1 APLICAÇÕES DE FOTOFENÔMENOS ÀS SOLUÇÕES MICELARES

Os eventos fotofísicos de nosso interesse geralmente ocorrem numa escala de tempo da ordem de 10^{-9} a 10^{-7} segundos (1-100 nseg). Logo, como os processos dinâmicos que envolvem micelas (descritos anteriormente, Eqs. 1 e 2) ocorrem num intervalo de tempo muito maior do que estes, é óbvio que tais eventos são potencialmente de grande utilidade para o estudo das propriedades das soluções micelares, em condições "quase-estáticas".

A importância de fotofenômenos no estudo de soluções micelares, pode ser avaliada facilmente pelo grande número de trabalhos a este respeito, encontrados na literatura especializada.^{11,12} O estudo da fluorescência de emissores incorporados à micela permitem, por exemplo, a discriminação entre locais(ou sítios) de solubilização e fornecem informações a respeito do microambiente destes locais.¹²⁻¹⁴ Pela depolarização da fluorescência destes emissores é possível estimarmos a "viscosidade" da micela.¹⁵ A fluorescência intrínseca de detergentes que contêm cromóforos reflete não só o estado de micelização deles, como também o do microambiente do cromóforo na fase micelar.¹⁶⁻¹⁸

Entre os fotofenômenos bimoleculares, a formação de excímeros de pireno tem sido analisada em termos da estatística de distribuição do pireno nas micelas, da velocidade de encontros bimoleculares dentro da micela e, do número de agregação da micela.¹⁹⁻²¹ A supressão da fluorescência de emissores tem sido aproveitada para investigar por exemplo, a natureza da ligação de ions com a superfície da micela,^{12,14,22} a permeabilidade da micela a vários substratos¹² e a incorporação de substratos à fase micelar.²³

I. 2.2 A SUPRESSÃO DE ESTADOS ELETRÔNICOS EXCITADOS

I. 2.2.1 A SUPRESSÃO DE ESTADOS ELETRÔNICOS EXCITADOS EM MEIO ISOTRÓPICO.

A supressão de estados excitados é um fotofenômeno de grande utilidade, uma vez que através dele é possível

vel obtermos uma série de informações valiosas não só sobre as propriedades, como também, sobre as influências do meio na probabilidade de encontros bimoleculares. Para uma molécula F, que emite luz com um rendimento quântico ϕ_{em}^0 e tempo de vida τ_{em}^0 na ausência do supressor Q e, de ϕ_{em} e τ_{em} na presença do supressor, a supressão da emissão do estado excitado de F o emissor por Q num meio isotrópico, pode ser descrita pelas equações de Stern - Volmer: ²⁴

$$\frac{\phi_{em}^0}{\phi_{em}} = (1 + k_q \tau_{em}^0 [Q]) (1 + \frac{\epsilon_{FQ}}{\epsilon_F} K_{FQ} [Q]) \quad (18)$$

$$\frac{\tau_{em}^0}{\tau_{em}} = 1 + k_q \tau_{em}^0 [Q] \quad (19)$$

Nestas equações, k_q é a constante de velocidade para a supressão e K_{FQ} a constante de equilíbrio (Eq.20) para a associação de F, no seu estado fundamental, como Q.

Os termos ϵ_{FQ} e ϵ_F que aparecem na Eq. 18 representam os coeficientes de extinção para o complexo FQ e para F, respectivamente, medidos no comprimento de onda da excitação. O fator $1 + (\epsilon_{FQ}/\epsilon_F) K_{FQ} [Q]$ na Eq.18, descreve a supressão estática (para a qual encontros bimoleculares, resultantes de difusão após a excitação, não contribuem) ; o fator $1 + k_q \tau_{em}^0 [Q]$ refere-se à supressão dinâmica (para a qual são importantes os encontros bimoleculares emissor-supressor, após a excitação). Por outro lado, a relação dos tempos de vida (Eq.19) é somente uma função da su

pressão dinâmica, não sofrendo portanto, a influência da supressão estática.

Na ausência de supressão estática, as duas equações de Stern-Volmer, Eqs.18 e 19, tornam-se equivalentes. Neste caso, o coeficiente angular do gráfico de ϕ_{em}^0/ϕ_{em} ou τ_{em}^0/τ_{em} em função da concentração de Q, fornece o valor da constante de Stern-Volmer, isto é:²⁴

$$K_{sv} = k_q \tau_{em}^0 \quad (21)$$

É importante notar que K_{sv} é simplesmente uma medida da eficiência do fenômeno de supressão. O conhecimento do valor de K_{sv} não requer um conhecimento dos vários processos e mecanismos envolvidos no ato de supressão de emissão de luz. As equações de Stern-Volmer são de grande utilidade quando desejamos determinar as velocidades de encontros controlados por difusão. Para tal, utiliza-se na Eq. 21 um valor de K_{sv} , medido com supressores da emissão de F e que têm eficiência de supressão conhecida para cada encontro supressor-emissor. Além disto, as concentrações do supressor podem ser determinadas nos casos em que K_{sv} é conhecida a priori. Como veremos mais adiante, nesta Tese nós fazemos uso das equações de Stern-Volmer com estas duas finalidades.

I.2.2.2 A SUPRESSÃO DE ESTADOS ELETRÔNICOS EXCITADOS EM SOLUÇÕES MICELARES.

É importante lembrarmos que as soluções micelares, embora homogêneas em termos macroscópicos, não são isotrópicas. Assim sendo, uma experiência de supressão de emissão dependerá dos seguintes fatores:

- a) da partição do emissor e do supressor entre as fases aquosas e micelar, isto é, do equilíbrio:

- b) da distribuição estatística do emissor ou supressor nas micelas:

- c) da distribuição mútua, do supressor e do emissor, na fase micelar;
- d) da probabilidade de encontros bimoleculares entre o emissor e o supressor na fase micelar;
- e) da probabilidade de encontros bimoleculares entre o emissor e o supressor na fase aquosa intermicelar.

II. MODELOS

II. 1 CONCENTRAÇÃO DE MONÔMERO LIVRE

Nesta Tese examinar-se-á a aplicação da supres -
são de emissão para a medida da concentração de monômero -
livre em soluções de detergentes iônicos e, para o estudo -
dos fatores que influenciam a partição e distribuição de
substratos em soluções micelares.

Para melhor clareza das considerações que fare -
mos a seguir, é importante formularmos algumas hipóteses .
Assim sendo, suponhamos a existência de um detergente ca -
tiônico $D+X^-$, que tem a propriedade de formar micelas e,
cujo grupo hidrofílico seja supressor da emissão de um emis -
sor F, solúvel em água. Segundo os modelos atuais de miche -
lização (Vide Introdução), o detergente $D+X^-$ comportar -
se-á como um eletrólito forte, quando for usado abaixo da
sua CMC. A partir da CMC, as micelas de $D+X^-$ (M_{DX}) come -
çarão a se formar, em concentrações apreciáveis, na solu -
ção. Desta forma, acima da CMC, ter-se-á um equilíbrio en -
tre o monômero livre $D+$ e as micelas M_{DX} . Este comporta -
mento hipotético do detergente, pode ser melhor compreendi -
do com o auxílio da Figura 2, onde mostrarmos a varia -
ção de $[D^+]_{\text{livre}}$ e de $[D^+X^-]_{\text{mic}}$, em função de $[D^+X^-]_{\text{total}}$.

A supressão dinâmica da emissão de F dependerá -
das concentrações dos vários supressores presentes na solu -
ção, enquanto que a supressão estática dependerá das cons -

FIGURA 2. Variação das Concentrações de Monômero Livre e Detergente Micelar em Função da Concentração Total de Detergente.

tantes de equilíbrio para a formação de complexos no estado fundamental. Levando-se em conta o comportamento esperado para soluções micelares de $D+X^-$, esperar-se-ia que o comportamento da supressão da emissão de F, em função da concentração de $D+X^-$, obedecesse às seguintes equações (que devem ser comparadas com as Eqs. 17 e 18):

$$\frac{\phi_{em}^0}{\phi_{em}} = (1 + K_{sv} [D^+]_{livre} + K'_{sv} [M_{DX}]) (1 + \frac{\epsilon_M}{\epsilon_A} K_{FM} [M_{DX}]) \quad (24)$$

$$\frac{\tau_{em}^0}{\tau_{em}} = 1 + K_{sv} [D^+]_{livre} + K'_{sv} [M_{DX}] \quad (25)$$

onde K_{FM} é a constante de partição de F, entre as fases aquosa e micelar, e ϵ_M e ϵ_A representam os coeficientes de extinção de F nas fases micelar e aquosa, respectivamente, ambos medidos no comprimento de onda da excitação. Deve-se notar que a Eq. 24 implica na inexistência de associação entre D^+ livre e F na fase aquosa e que a supressão sofrida pelas moléculas de F incorporadas à micela, é de natureza puramente estática.

Além disto, as Eqs. 24 e 25 indicam que é possível medirmos a concentração de D^+ livre na presença das micelas de $D+X^-$, através da medida da supressão da emissão de F. Por outro lado, sabendo que abaixo da CMC de $D+X^-$ ($[M_{DX}] \approx 0$), o único supressor presente na solução será D^+ , é possível então determinarmos o valor de K_{sv} (Eq. 26)

$$\frac{\phi_{em}^0}{\phi_{em}} = \frac{\tau_{em}^0}{\tau_{em}} = 1 + K_{sv} [D^+] \quad (26)$$

Acima da CMC, existirão dois supressores dinâmicos potenciais, D^+ livre e M_{DX} . No entanto, uma vez que:

$$[M_{DX}] = \frac{[D^+X^-]_{mic}}{\bar{N}} \approx \frac{D^+X^-_{total} - CMC}{\bar{N}} \quad (27)$$

onde o número de agregação ($\bar{N}$) é da ordem de pelo menos 50 - 100 monômeros por micela, $[M_{DX}]$ será inferior à $[D^+]_{livre}$, na faixa de concentração imediatamente acima da CMC. Logo, esperar-se-á, mesmo quando $K_{sv} \approx K'_{sv}$, que a supressão dinâmica pela micela possa ser considerada desprezível em relação àquela devido a D^+ livre.

II. 2 PARTICÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS

De uma maneira geral, se S fôr um substrato solúvel em água, a sua incorporação na fase micelar dependerá não só da sua partição entre as fases micelar e aquosa, como também da sua distribuição entre as micelas disponíveis. Neste caso, a constante de partição (K_1) dependerá da relação entre as velocidades de entrada (k_1) e da saída (k_{-1}) do substrato, de uma micela desocupada:

$$K_1 = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[M_1]}{[S]_{Aq} [M_0]} \quad (28)$$

Esta distribuição dependerá dos valores relativos das sucessivas constantes de partição do substrato nas micelas (M_n) ocupadas por n substratos, isto é:

onde

$$K_n = \frac{k_n}{k_{-n}} = \frac{[M_n]}{[S]_{Aq} [M_{n-1}]} \quad (30)$$

Embora o sistema geral seja altamente complexo, é possível introduzirmos simplificações que permitam-nos tratá-lo quantitativamente. Para tal, supomos primeiramente que as incorporações sucessivas do substrato, são independentes do número destes já presentes na micela; em segundo lugar, que o número máximo de ocupação (n_{max}), de uma micela pelo substrato, é grande quando comparado com a fai

xa experimental de ocupações. Neste caso, as velocidades de entrada (k_n) do substrato são todas iguais a k_1 e as de saída (k_{-n}), iguais a nk_{-1} . As sucessivas constantes de partição, a concentração de micelas com n substratos (M_n) e a fração das micelas que contém n substratos (P_n), obedecem às Equações 31, 32 e 33, respectivamente.²⁵

$$K_n = K_1/n \quad (31)$$

$$[M_n] = \frac{(K_1[S]_{Aq})^n}{n!} \quad (32)$$

$$P_n = \frac{(K_1[S]_{Aq})^n/n!}{\sum_{n=0}^{n_{\max}} (K_1[S]_{Aq})^n/n!} = \frac{[M_n]}{[M]_{\text{total}}} \quad (33)$$

Assintoticamente, isto é, para valores grandes de $n_{\max}$, teremos:

$$\sum_{n=0}^{n_{\max}} \frac{(K_1[S]_{Aq})^n}{n!} \approx e^{K_1[S]_{Aq}} \quad (34)$$

Desta forma, P_n aproxima-se de uma distribuição de Poisson, ou seja:

$$P_n \approx \frac{(K_1[S]_{Aq})^n}{n!} e^{-K_1[S]_{Aq}} \quad (35)$$

Por outro lado, através de uma análise estatística do nosso sistema¹⁹, é possível demonstrarmos que P_n pode ser definido como:

$$P_n \approx \frac{(\bar{n})^n}{n!} e^{-\bar{n}} \quad (36)$$

onde $\bar{n}$ é o número médio de substratos por micela:

$$\bar{n} = \frac{[S]_{mic}}{[M]_{total}} \quad (37)$$

Combinando-se as Equações 35, 36 e 37, tem - se que:

$$\bar{n} = K_1 [S]_{Aq} = \frac{[S]_{mic}}{[M]_{total}} \quad (38)$$

ou que:

$$K_1 = \frac{[S]_{mic}}{[S]_{Aq} [M]_{total}} \quad (39)$$

Logo, uma vez que

$$[S]_{mic} = [S]_{tot} - [S]_{Aq} \quad (40)$$

e que

$$[M]_{total} = \frac{[Det]_{tot} - CMC}{\bar{N}} \quad (41)$$

então, qualquer determinação de $[S]_{Aq}$ em função das concentrações totais de substrato ($[S]_{tot}$) e detergente ($[Det]_{tot}$), permitirá a determinação de $K_1/\bar{N}$ através da seguinte equação:

$$\frac{[S]_{mic}}{[S]_{Aq}} = \frac{[S]_{tot} - [S]_{Aq}}{[S]_{Aq}} = \frac{K_1}{\bar{N}} ([Det]_{tot} - CMC) \quad (42)$$

Quando o substrato S é também um supressor da emissão de um emissor A, localizado exclusivamente na fase aquosa intermicelar, pode-se medir $[S]_{Aq}$ por meio da equação de Stern-Volmer. Na ausência do detergente e de supressão estática, tem-se que

$$\frac{\phi_{em}^o}{\phi_{em}} = 1 + K_{sv}[S]_{tot} \quad (43)$$

Na presença do detergente, a equação correspondente é:

$$\left(\frac{\phi_{em}^o}{\phi_{em}} \right)_D = 1 + K_{sv}[S]_{Aq} \quad (44)$$

Finalmente, combinando-se as Equações 42 e 44, obtém-se a seguinte equação:

$$\frac{\frac{\phi_{em}^o}{\phi_{em}} - \left(\frac{\phi_{em}^o}{\phi_{em}} \right)_D}{\left(\frac{\phi_{em}^o}{\phi_{em}} \right)_D - 1} = \frac{K_1}{\bar{N}} ([Det]_{tot} - CMC) \quad (45)$$

Esta equação descreve o comportamento da supressão, em função de $[Det]_{tot}$, quando ϕ_{em}^o/ϕ_{em} e $(\phi_{em}^o/\phi_{em})_D$ são medidas para um mesmo valor de $[S]_{tot}$. Porém, quando os valores de $[S]_{tot}$ são diferentes, os coeficientes angulares dos gráficos de ϕ_{em}^o/ϕ_{em} e de $(\phi_{em}^o/\phi_{em})_D$ em função de $[S]_{tot}$, podem ser usados para determinar $K_1/\bar{N}$, de acordo com a seguinte equação:

$$\frac{\beta_o}{\beta_D} - 1 = \frac{K_1}{\bar{N}} ([Det]_{tot} - CMC) \quad (46)$$

onde os coeficientes angulares β_D e β_o são medidos na presença e na ausência do detergente e β_o é igual à constante K_{sv} da Eq. 43.

III. PARTE EXPERIMENTAL

III. 1 MATERIAIS

Água bidestilada foi rotineiramente usada na preparação de todas as soluções. O cloreto de sódio (Carlos Erba, 99,5%) Foi recristalizado em água bidestilada. Brometo de potássio (Merck, Uvasol), 1,3-dinitrobenzeno (DNB , Merck, para a determinação de 17 - cetosteroides, p.f. 90-91°C), metanol (Aldrich Chemical Co., grau espectroscópico), ácido 4-(1-pireno)- butílico (Eastman Organic Chemicals) e os demais reagentes (de pureza p.a. ou superior) não foram repurificados.

Brometo de hexadecil trimetil amônio (CTAB, Merck p.a.) foi recristalizado tres vezes em acetona-álcool - (85:15) e secado a vácuo. Cloreto de N-hexadecil-piridínio (HPCl, BDH Ltda., p.f. 82-84°C) foi cristalizado três vezes em dioxano, que por sua vez foi destilado com LiAlH_4 no momento de uso, e posteriormente secado a vácuo.

Uma amostra de cloreto de tris (2,2' - bipyridina) de rutênio (II), $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+} \text{Cl}_2$ (G. Frederick Smith) foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Henrique Toma.

III. 2 SÍNTESE

Brometo de 4-(1-pireno) butil trimetil amônio (PBTA): Brometo de 4- (1-pireno) butano (0,4g) foi dissolvido por aquecimento em 10 ml de etanol absoluto. A solução foi refluxada por 4 horas ao mesmo que se passava - trimetil amina com uma corrente de argônio através da solu

ção. A amina foi arrastada com argônio a partir de uma solução aquosa (BDH Ltda.) e secada (KOH) antes de ser introduzida na solução. Após resfriamento a trimetilamina e o solvente foram evaporados a vácuo, e o sólido obtido foi lavado com benzeno. Várias tentativas de purificação do produto por meio de recristalização numa mistura de metanol-eter, acetonitrila e outros solventes orgânicos comuns bem como em água, não se mostraram satisfatórias, o que pode ser visto pelos valores obtidos na análise elementar (Laboratório de Microanálise, Instituto de Química, USP), após lavagem subsequente com benzeno e secagem a vácuo.

Calculado ($C_{23}H_{26}NBr$): 69,7%C; 6,6%H; 3,5%N

Encontrado: 63,8%C; 6,4% H; 3,8%N

64,1%C; 6,1% H; 4,5%N

Por outro lado, os valores encontrados são razoáveis para uma mistura na proporção de 87:13 em peso de PBTA e hidrobrometo de trimetil amina, para a qual calculamos: 64,0%C; 6,7%H; 4,4%N. Esta composição foi confirmada por absorção; usando-se ácido 4-(1-pireno)butílico como referência obtivemos um valor de $86 \pm 1\%$ em peso de PBTA. Uma vez conhecida a natureza da impureza, e sabendo que a sua concentração máxima seria $6 \times 10^{-6}M$, achamos razoável não submeter o PBTA a nenhuma purificação adicional.

Brometo de N-alkil p-ciano piridínio(C_nCP)^{26,27}

Refluxamos 5,2g (0,05 moles) de 4-ciano-piridina (CP, Aldrich, 99%) e 0,05 moles do brometo de n-alkila com 20ml de acetonitrila (Aldrich, 99%) durante dois dias. As propriedades dos brometos de alkila foram as seguintes: bro-

meto de n-hexadecila, brometo de n-dodecila e brometo de n-decila da Merck, para síntese; brometo de n-octila da Aldrich, 99%; brometo de etila da Malinckrodt, 99%. No caso de $C_{16}CP$, $C_{12}CP$ e C_2CP , esfriamos e recristalizamos o precipitado pelo menos quatro vezes em acetonitrila. No caso de C_8CP e $C_{10}CP$, a mistura da reação foi esfriada e o sal foi precipitado com benzeno, para em seguida recristalizar o precipitado duas vezes numa mistura de acetonitrila e benzeno (50:50). O produto obtido foi secado a vácuo na temperatura ambiente.

Análises Elementares (IQ, USP):

$C_{16}CP$, calculado ($C_{22}H_{37}N_2Br$): 64,5%C; 9,1%H; 6,8%N.
encontrado 64,2%C; 9,8%H; 5,3%N.

$C_{12}CP$, calculado ($C_{18}H_{29}N_2Br$): 61,2%C; 8,3%H; 7,9%N.
encontrado 60,7%C; 8,3%H; 7,7%N
60,8%C; 8,1%H; 7,8%N

Os compostos $C_{10}CP$, C_8CP e C_2CP são bastante higroscópicos. Dentro de um erro experimental de ~2% as medidas da absorbância de soluções de $C_{16}CP$, $C_{12}CP$, $C_{10}CP$, C_8CP , C_2CP edo tetrafluoroborato de N-metil-p-ciano piridínio(C_1CP)²⁶ forneceram valores iguais para os coeficientes de extinção em dois comprimentos de onda diferentes ($\lambda_{max}=278nm$ e $\lambda_{max} = 230nm$).

III. 3 APARELHOS E METODOS

As experiências de supressão da emissão foram realizadas na temperatura ambiente e em celas de quartzo - especiais para fluorescência, com um caminho ótico de um

cm. Os espectros de emissão foram registrados com um espectrofotômetro Hitachi - Perkin Elmer MPF-4 trabalhando em "ratio".

Espectros de absorção foram registrados num espectrofotômetro Cary 17 ou Zeiss DMR-21.

Nas experiências para a determinação da concentração de monômero livre, 3,00 ml de uma solução aquosa do emissor, PBTA ou $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$, já com a quantidade determinada de sal, foram colocadas na cela e o espectro de emissão registrado. Adições sucessivas de alíquotas de uma solução concentrada do detergente, isto é HPCl, C_{12}CP ou C_{16}CP , foram feitas por meio de uma microsiringa de Hamilton, registrando-se o espectro de emissão após cada adição. As experiências de supressão da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por C_2CP foram feitas de uma maneira análoga, a alíquota (3,00 ml) adicionada à cela já contendo, na quantidade predeterminedada, KBr, NaCl, CTAB ou HPCl.

Soluções para o estudo da partição de C_{12}CP , C_{10}CP e C_8CP , contendo $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$, KBr e CTAB, foram preparadas da maneira descrita nos Resultados e a supressão feita de modo análogo, pela adição de alíquotas do supressor por meio de uma microsiringa de Hamilton. Nas experiências com DNB, alíquotas de uma solução de DNB em metanol foram adicionadas a balões volumétricos e o metanol removido a vácuo. Soluções contendo uma concentração constante de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ e concentrações variáveis (0 a 0,08M) de CTAB foram adicionadas e o DNB dissolvido por ligeiro aquecimento. Com a solução na temperatura ambiente, completamos o seu

volume e registramos espectros de emissão relativa de todas as soluções.

Os comprimentos de ondas escolhidos para a excitação de emissão foram de 327 nm (fenda de 2 nm) para PBTA e de 450 nm para $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$. Intensidades relativas de emissão foram determinadas no máximo das bandas de emissão e, quando necessário, corrigidas para efeitos de diluição. Sob as condições empregadas, a relação de intensidades de emissão na presença e na ausência de supressor é igual à relação de rendimentos quânticos de emissão.

Os tempos de vida da fluorescência de PBTA foram determinados empregando-se um Fluorômetro de Tempo de Decaimento Modelo 75A com Computador de Tempo de Decaimento Modelo 32A, ambos da TRW Systems, acoplado a um osciloscópio Tektronix Tipo 7704. A luz de excitação (lâmpada de N_2) foi filtrada através de filtros CS 7-54 e CS 7-39 e a luz de emissão através de um filtro CS 3-74, todos da Corning Glass. A adição de HPCl foi feita de maneira idêntica àquela usada nas experiências correspondentes de supressão da fluorescência. As medidas relativas e absolutas de τ_f mostraram-se repetitivas dentro de um erro de 1-2% e ~5%, respectivamente.

IV. RESULTADOS

IV. 1 CONCENTRAÇÃO DE MONÔMERO LIVRE

Para início de nossos estudos escolhemos o de -
tergente cloreto de N-hexadecil piridínio (HPCl) e o emis -
sor fluorescente brometo de 4-(1-pireno) butil trimetil -
amônio (PBTA).

HPCl

PBTA

A escolha de HPCl foi baseada nos seguintes fa -
tos:

- N- alquil piridínios são bons supressores da fluo -
rescência de hidrocarbonetos aromáticos;²⁸
- a fluorescência de hidrocarbonetos aromáticos, in -
corporados em micelas de HPCl é quase totalmen -
te suprimida;²⁸
- a CMC de HPCl²⁹ é aproximadamente 1mM.

Consequentemente, os prerequisites que o emissor
fluorescente deve satisfazer são:

- que tenha um longo tempo de vida de fluorescência
(por exemplo, pireno);
- seja solúvel em água (contenha um grupo hidrofíli -
co);
- que sofra supressão somente dinâmica na fase aquo -
sa (tenha uma carga igual àquela do detergente).

O emissor escolhido, o PBTA, preenche estas condições. Es -

nectros de absorção de PBTA na presença e na ausência de HPCl possuem um ponto isobéstico em 327 nm. Uma vez que os coeficientes de extinção ϵ_M e ϵ_A (Eq.24) de PBTA são iguais neste comprimento de onda, o mesmo foi então escolhido para a excitação da fluorescência de PBTA.

Com o auxílio das Tabelas 1 e 2 e da Figura 3, nos podemos facilmente observar que os valores de ϕ_f^0/ϕ_f e τ_f^0/τ_f obedecem a mesma equação para concentração abaixo da CMC. No entanto, acima da CMC os seus valores divergem, refletindo a incorporação (e supressão estática) de PBTA na fase micelar. Este comportamento é exatamente aquele que deveríamos esperar teoricamente com o auxílio das Eqs. 24 e 25 (vide Modelos) quando $K'_{sv} \approx 0$.

Por outro lado, as Eqs. 24, 25 e 27 indicam que a relação $(\phi_f^0/\phi_f) / (\tau_f^0/\tau_f)$ deve ser uma função linear de $[HPCl]$ com um coeficiente angular igual a $K_{FM}/\bar{N}$ (uma vez que $\epsilon_M \approx \epsilon_F$ a 327 nm). No entanto, se examinarmos as curvas mostradas na Figura 3, veremos que esta relação não é exatamente uma função linear de $[HPCl]$, ou seja, $K_{FM}/\bar{N}$ também depende de $[HPCl]$.

Esta dependência pode ser atribuída ao efeito de força iônica, proveniente do próprio detergente, sobre a constante $K_{FM}/\bar{N}$; isto pode ser compreendido mais facilmente com o auxílio da Figura 4, onde mostrarmos valores (resumidos na Tabela 3) de ϕ_f^0/ϕ_f em função de $[HPCl]$ para diversas concentrações de NaCl. Nota-se que os pontos de inflexão desta curvas, e que correspondem aos valores

TABELA 1. Valores de ϕ_f^0/ϕ_f para a Supressão da Fluorescência de PBTA por HPCl em Água (21°C).

$[HPCl], M \times 10^3$	ϕ_f^0/ϕ_f	ϕ_f^0/ϕ_f
	$[PBTA] = 3,5 \times 10^{-5}M$	$[PBTA] = 1,7 \times 10^{-5}M$
0,16	1,05	1,05
0,33	1,13	1,12
0,49	1,20	1,19
0,66	1,28	1,26
0,84	1,35	1,35
0,99	1,41	1,41
1,18	1,44	1,43
1,34	1,47	1,45
1,50	1,49	1,47
1,67	1,51	1,47
2,49	1,60	1,56
3,30	1,71	1,66
4,12	1,83	1,78
4,92	1,97	1,91
5,73	2,14	2,05
6,53	2,31	2,22
7,32	2,48	2,39
9,70	3,12	3,02
12,0	3,92	3,76
14,4	4,81	4,63

TABELA 2. Valores de Tempos de Vida para a Supressão da Fluorescência de PBTA por HPCl em Água (22°C).

$[HPCl], M \times 10^3$	$\tau_f, nseg^a$	τ_f^0/τ_f
0	94	1,00
0,15	89	1,06
0,31	85	1,11
0,48	80	1,18
0,61	76	1,24
0,76	73	1,29
0,92	70	1,34
1,07	70	1,34
1,24	68	1,38
1,39	68	1,38
1,76	68	1,38
2,14	69	1,36
2,52	69	1,36
2,89	70	1,34
3,65	71	1,32
4,40	71	1,32
5,15	71	1,32
5,90	71	1,32
6,65	72	1,31
8,87	72	1,31
11,1	72	1,31
13,3	72	1,31

a) PBTA = $3,5 \times 10^{-5}M$ ou $1,7 \times 10^{-5}M$

FIGURA 3. Comportamento da Supressão da Fluorescência de PBTA por HPCl em Água (21° C). ϕ_f^O/ϕ_f para PBTA $3,8 \times 10^{-5}M$: $\circ$; ϕ_f^O/ϕ_f para PBTA $1,9 \times 10^{-5}M$: $\square$; τ_f^O/τ_f : $\bullet$.

TABELA 3. Valores de ϕ_f^0/ϕ_f para a Supressão da Fluorescência de PBTA por HPCL em Água (29°C) e na Presença de Várias Concentrações de - NaCl.

[HPCL], Mx10 ³	ϕ_f^0/ϕ_f				
	OM NaCl	0,005M NaCl	0,010M NaCl	0,015M NaCl	0,020M NaCl
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,082	1,04	1,05	1,08	1,07	1,07
0,16	1,07	1,10	1,14	1,13	1,13
0,25	1,11	1,14	1,18	1,17	1,17
0,33	1,15	1,18	1,21	1,20	1,22
0,41	1,19	—	1,24	1,23	1,24
0,49	1,24	1,22	1,27	1,27	1,31
0,65	1,32	1,26	1,32	1,34	1,40
0,82	1,40	1,30	1,37	1,40	1,47
0,98	1,47	1,33	1,43	1,47	1,56
1,23	1,52	1,39	1,51	1,58	1,68
1,63	1,56	1,49	1,65	1,75	1,89
2,45	1,62	1,67	1,93	2,09	2,32
3,68	—	—	—	—	2,99
4,90	1,85	—	—	—	3,72

FIGURA 4. Comportamento da Supressão da Fluorescência de
PBTA ($3,8 \times 10^{-5}M$) por HPCl ($29^{\circ}C$) em Água
(—, ○), NaCl 0,0050M (— —, □), NaCl 0,010M
(— · —, Δ), NaCl 0,015M (·····, ■) e NaCl 0,020M (—, ●).

de CMC, deslocam-se para concentrações menores a medida que $[NaCl]$ aumenta; além do mais, pode-se notar que a relação ϕ_f^O/ϕ_f é uma função linear de $[HPCl]$, quando em presença de NaCl e para valores acima da CMC. Estimativas de CMC e de $K_{FM/\bar{N}}$ (coeficiente angular acima da CMC), na presença e ausência de NaCl, são apresentadas na Tab. 4.

Apesar desta concordância entre a experiência e o modelo teórico, procuramos outros sistemas análogos que pudessem realçar a validade deste modelo e que fossem de preferência sistemas nos quais o emissor não se incorporasse na fase micelar.

Paralelamente a estes estudos, outras experiências realizadas no nosso laboratório indicaram que o ion tris (2,2'-bipiridina) de rutênio (II) isto é, $Ru(bipy)_3^{2+}$, não se incorpora em micelas positivamente carregadas. Embora sensíveis à presença de detergentes negativos, como por exemplo dodecil sulfato de sódio (SDS), os espectros de absorção e emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ são idênticos quer na presença que na ausência de brometo de cetil trimetil amônio (CTAB, 0 - 0,08M) e de HPCl (0 - 0,05M).

SDS

CTAB

Estas observações são bastante razoáveis, uma vez que o $Ru(bipy)_3^{2+}$ é um ion hidrofílico de carga duplamente positiva.

O estado excitado de $Ru(bipy)_3^{2+}$ tem um longo tem

TABELA 4. Valores da CMC para HPCL e de $\frac{K_{FM}}{\bar{N}}$ para a Incorporação de PBTA em Micelas de HPCL.

[NaCl]	Fluorescência ^a	CMC, mM Condumetria	Literatura ²⁹	$\frac{K_{FM}}{\bar{N}}, M^{-1}$
0	_____	0,97 ± 0,04	b	_____
0	1,0 ± 0,5	0,95 ± 0,04	c	ca. 80
0,0050	0,31 ± 0,02	_____		230 ± 20
0,010	0,20 ± 0,03	_____		330 ± 30
0,015	0,15 ± 0,05	_____		420 ± 30
0,020	0,15 ± 0,05	_____		510 ± 30

a) Estimados usando a Figura 4.
b) Na ausência de PBTA.
c) Na presença de PBTA (3,8 x 10⁻⁵M)

po de vida (435 n seq em água não degaseificada³⁰), apresenta uma banda de emissão com λ_{max} em torno de 610 e sua emissão é suprimida por várias moléculas orgânicas - através de um mecanismo de transferência de carga.^{26,31} Destas moléculas orgânicas, as de maior interesse, do ponto de vista de síntese de detergentes, são as de N-alkil n-ciano piridínicos, para as quais o mecanismo de supressão sabe-se ser o seguinte: 26, 32

Por estas razões, sintetizamos os seguintes compostos anfifílicos: brometo de N-hexadecil-p-cianopiridínio (C_{16} CP) e brometo de N-dodecil-p-cianopiridínio²⁷ (C_{12} CP), isto é:

Os valores de ϕ_{em}^o / ϕ_{em} para a supressão da emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ ($3 \times 10^{-5} M$) por $C_{12}CP$, em água, KBr 0,0095 M, KBr 0,050 M, KBr 0,095M e $C_{16}CP$ em água, acham-se resumidos nas Tabelas 5 e 6 e podem ser melhor apreciados nas figs. 5 e 6. Como esperado, estas curvas evidenciam a não incorporação de $Ru(bipy)_3^{2+}$ na fase micelar (Eq. 24 - com $K_{FM} = 0$). Valores da CMC, obtidos por condutimetria ou estimados a partir das Figuras 5 e 6, podem ser encontra-

TABELA 5. Valores de ϕ_{em}^o/ϕ_{em} para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ ($25^\circ C$) por $C_{12}CP$ em Água, 0,0095M KBr e 0,095M KBr.

$[C_{12}CP]$ $M \times 10^3$	ϕ_{em}^o/ϕ_{em}		
	Água	0,0095M KBr	0,095M KBr
0	1,00	1,00	1,00
0,74	1,32	1,51	1,75
1,48	1,70	2,03	2,52
2,22	2,10	2,58	3,28
2,95	2,53	3,11	4,06
3,68	2,99	3,65	4,75
4,41	3,47	4,28	4,92
5,14	3,98	4,85	5,03
5,86	4,44	5,49	5,16
6,58	—	6,09	—
7,30	5,48	6,64	5,17
8,74	6,45	7,67	5,24
10,2	7,49	9,03	5,36
11,6	8,54	9,41	5,54
13,0	8,62	9,85	5,59
14,4	9,24	10,00	—
15,8	9,35	—	—
17,1	9,47	—	—
18,5	9,46	—	—
19,9	9,44	—	6,11
21,2	9,56	10,27	—
26,5	9,42	—	6,54
27,8	9,42	10,26	—

TABELA 6. Valores de ϕ_{em}^o / ϕ_{em} para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ (27°C) por $C_{12}CP$ em 0,050 M KBr e por $C_{16}CP$ em Água.

$[C_{12}CP]$ M x 10 ³	ϕ_{em}^o / ϕ_{em}	$[C_{16}CP]$ M x 10 ³	ϕ_{em}^o / ϕ_{em}
0	1,00	0	1,00
0,54	1,51	0,24	1,08
1,08	2,03	0,41	1,14
1,61	2,52	0,58	1,18
2,14	3,04	0,75	1,23
2,66	3,50	0,92	1,28
3,19	4,00	1,08	1,32
3,71	4,40	1,25	1,36
4,22	5,01	1,58	1,41
4,73	5,36	1,91	1,40
5,24	5,64	2,23	1,41
5,75	5,74	2,56	1,40
6,25	5,81	2,88	1,39
7,74	5,85		
9,20	6,06		
10,6	6,07		
12,0	6,13

FIGURA 5. Comportamento da Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por $C_{12}CP$ em: Água ($\text{---}, \bigcirc$); KBr 0,0095M ($\text{---}, \square$); KBr 0,050M ($\text{---}, \bullet$); KBr 0,095M ($\text{---}, \blacksquare$).

FIGURA 6. Comportamento da Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por $C_{16}CP$ em Água.

dos na Tabela 7.

Acima da CMC, as soluções de $C_{16}CP$ apresentam uma opalescência pouco característica de soluções micelares de detergentes comuns. Esta observação, bem como questões relativas à estabilidade de N-alkil-p-ciano-piridínio com relação à hidrólise em meio aquoso, levou-nos a outros estudos, ainda em andamento no nosso laboratório; estas pesquisas estão sendo feitas atualmente em colaboração com o grupo do Prof. Hernan Chaimovich deste Instituto.

Estudando a hidrólise alcalina de N-metil-p-ciano piridínio (C_1CP), Kosower e col.³³ demonstraram que a piridona (C_1P) e a amida (C_1AP) são formadas em quantidades variáveis:

Nestes estudos³³ observou-se que a relação $\frac{[C_1P]}{[C_1AP]}$ depende do pH do meio; esta relação é nula para valores de pH abaixo de 9,2 e atinge um limite máximo de ~2 para valores de pH acima de ~13.

Finalmente, é interessante notar que os resultados preliminares obtidos nos nossos laboratórios³⁴ demonstram que:

a) os dados de Kosower e col.³³ para C_1CP , tanto para o valor absoluto das constantes de velocidade como para a relação de produtos, são confiáveis;

b) a hidrólise de $C_{12}CP$, abaixo da sua CMC, é análoga àquela de C_1CP ;

TABELA 7. Valores da CMC para C₁₂CP e C₁₆CP.

[KBr] , M	CMC, mM	
	Fluorescência ^a	Condumetria (25°C)
<u>C₁₂CP:</u>		
0	12 ± 1	13,3 ± 0,3
0,0095	11 ± 1	10,5 ± 0,5
0,050	5,3 ± 0,5	—
0,095	4,0 ± 0,3	—
<u>C₁₆CP:</u>		
0	1,5 ± 0,1	1,5 ± 0,1

a) Valores estimados a partir da Figura 5.

b) Valor estimado usando a Figura 6.

c) ao contrário do observado para C_1 CP e C_{12} CP, as constantes de velocidade para hidrólise de C_{16} CP dependem da sua concentração para valores desta acima de $\sim 10^{-5}M$, característica de um processo de autocatálise;

d) a velocidade de hidrólise de C_{12} CP (pH 10) é acelerada por um fator de $\sim 10^2$ e a de C_{16} CP (pH 9,2) por um fator de $\sim 10^3$, na presença de micelas de CTAB;

e) além deste efeito sobre a velocidade, CTAB tem também um efeito marcante sobre o rendimento relativo dos produtos da hidrólise de C_{12} CP e C_{16} CP; a relação piridina/amida na presença de CTAB (4-8 a pH 9-12) é apreciavelmente maior do que aquela observada na ausência de CTAB (sendo nula a pH $\leq 9,2$ e ~ 2 a pH ≥ 13);

f) a hidrólise de C_1 CP em pH 12 não sofre influência de CTAB na presença de KBr 0,1M ;

g) as meias vidas para hidrólise dos N-alkil-p-cianopiridínios, tanto na presença quanto na ausência de micelas, são extremamente longas, isto é, da ordem de pelo menos algumas semanas em solução aquosa com pH ≤ 7 e nas condições experimentais necessárias para supressão.

O objetivo deste estudo é estimar as concentrações de detergente livre em função da concentração total do mesmo. Assim sendo, é necessário transformarmos os dados de supressão em concentrações efetivas do supressor livre, fazendo-se uso das Eqs. 24 e 25. Desta forma deveria ser possível obtermos K_{SV} a partir do comportamento da supressão abaixo da CMC. Entretanto, pode-se notar que no caso da supressão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por C_{12} CP em água

(figura 5), a relação ϕ_{em}^0 / ϕ_{em} obviamente não é uma função linear da $[C_{12}CP]$, quando este valor é inferior ao da CMC. A curvatura observada deve-se a um efeito cinético primário de sal (que neste caso é o próprio supressor) sobre a constante de Stern-Volmer (K_{sv}). A correção de K_{sv} para tais efeitos³⁵ pode ser efetuada fazendo-se uso da seguinte equação:

$$\log K_{sv} = \log K_{sv}^0 + C' z_1 z_2 \sqrt{\mu} \quad (47)$$

onde K_{sv}^0 é a constante de Stern-Volmer quando $\mu = 0$ e z_1 e z_2 são as cargas do emissor e do supressor. Define-se a força iônica μ como:

$$\mu = \frac{1}{2} \sum_i z_i^2 c_i \quad (48)$$

onde z_i e c_i são respectivamente a carga e a concentração do ion, sendo que a somatória que aparece na Eq.48 inclui todas as espécies iônicas presentes na solução. No caso de sais monovalentes, por exemplo KBr, então $\mu = [KBr]$.

Uma correção semi-empírica deste tipo é relativamente fácil de ser aplicada abaixo da CMC. No entanto, acima da CMC, o cálculo de uma "força iônica efetiva" requer um conhecimento das contribuições da micela para a força iônica e de outros efeitos específicos presentes. Desde que estes incluem contribuições tanto do contraion dissociado como da própria micela, será necessário sabermos o grau de ionização, concentração e carga efetiva da micela, para

metros estes para os quais desconhece-se não só os seus valores como o papel específico de cada um.

Por estas razões decidimos então investigar de modo empírico, a "força iônica efetiva" na fase aquosa intermicelar de soluções micelares de CTAB e HPCl. Com esta finalidade, estudamos a supressão da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por brometo de N-etil-p-ciano piridínio (C_2CP). Neste sistema, tanto o emissor como o supressor (pelo estudo da hidrólise alcalina de C_1CP na presença de CTAB) devem estar localizados na fase aquosa intermicelar. Portanto conhecendo os valores de K_{sv}^0 e C' , os dados de K_{sv} em função da concentração do detergente permitirão um cálculo da "força iônica efetiva" (μ_{ef}) na fase aquosa intermicelar, fazendo uso da Eq. 47.

Resultados para a supressão da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ ($3,0 \times 10^{-5}\text{M}$) por C_2CP em presença de várias concentrações de KBr, CTAB, NaCl e HPCl são dados na Tabela 8. Gráficos da Eq. 47 para a supressão em presença de KBr e NaCl podem ser apreciados na Figura 7. Utilizando-se estes gráficos e os valores de K_{sv} na presença de várias concentrações de CTAB ou HPCl (Tabela 8), pode-se construir gráficos de μ_{ef} da solução micelar em função da concentração total de detergente (Figura 8).

Os resultados obtidos (os valores da CMC são desprezíveis em relação a $[\text{Det}]_{\text{total}}$) indicam que os valores de μ_{ef} para soluções de CTAB obedecem a uma equação do tipo:

$$\mu_{ef} = [0,5 \pm 0,1][\text{CTAB}]_{\text{total}} \quad (49)$$

TABELA 8: Valores de $\log K_{sv}$ para a Supressão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por C_2CP na Presença de KBr , $CTAB$, $NaCl$ e $HPCl$.

$[KBr]$	$\log K_{sv}$ 24°C	$[CTAB]$	$\log K_{sv}$ 24°C	$[NaCl]$	$\log K_{sv}$ 21°C	$[HPCl]$	$\log K_{sv}$ 21°C
0	2,59	0	2,59	0	2,56	0	2,56
0,0093	2,70	0,0053	2,61	0,030	2,76	0,021	2,67
0,010	2,69	0,010	2,68	0,040	2,81	0,042	2,75
0,0127	2,71	0,011	2,68	0,050	2,80	0,064	2,79
0,017	2,77	0,021	2,72	0,070	2,84	0,085	2,83
0,032	2,79	0,042	2,76	0,080	2,85	0,100	2,85
0,042	2,80	0,064	2,80				
0,053	2,85	0,085	2,82				
0,064	2,87						
0,074	2,92						
0,085	2,94

FIGURA 7. Efeito de Sais sobre a Supressão da Emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ ($3 \times 10^{-5}\text{M}$) por C_2CP : KBr (○); NaCl (●); C_2CP (□, ■).

FIGURA 8. Estimativa da "Força Iônica Efetiva" de Soluções Micelares de CTAB (○) e HPCl (●) Através da Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por C_2CP .

enquanto que os valores de μ_{ef} para soluções de HPCl podem ser definidas como:

$$\mu_{ef} = [0,7 \pm 0,1] [\text{HPCl}]_{\text{total}} \quad (50)$$

Os valores da "força iônica efetiva" de soluções de HPCl também podem ser estimados a partir dos dados para a partição de PBTA na fase micelar. Fazendo-se um gráfico de $K_{FM}/\bar{N}$ em função de $\log (\text{CMC} + [\text{NaCl}])$, com o auxílio da Tabela 4, obtém-se uma correlação empírica entre estes dois parâmetros (Figura 9). Assim, é possível calcularmos valores de $K_{FM}/\bar{N}$ para os dados da Tabela 1, quando $[\text{HPCl}] > 0,005 \text{ M}$, através da seguinte equação:

$$\frac{K_{FM}}{\bar{N}} = \frac{\frac{\phi_{f^o}}{\phi_f} \cdot \frac{\tau_f}{\tau_{f^o}} - 1}{[\text{HPCl}]_{\text{tot}} - \text{CMC}} \quad (51)$$

Neste caso nós usamos o mesmo valor médio de ϕ_{f^o}/ϕ_f para as duas concentrações de PBTA. Com estes valores de $K_{FM}/\bar{N}$ e com a ajuda da correlação empírica aqui obtida na presença de NaCl, podemos construir um gráfico de μ_{ef} em função de $[\text{HPCl}]_{\text{tot}} - \text{CMC}$. Este gráfico, que pode ser visto na Figura 9, fornece a seguinte equação para μ_{ef} de HPCl acima da sua CMC:

$$\mu_{ef} \approx \text{CMC} + 0,25([\text{HPCl}]_{\text{tot}} - \text{CMC}) \quad (52)$$

Como veremos mais adiante, esta estimativa de μ_{ef} é provavelmente mais correta do que aquela baseada na supressão -

FIGURA 9. Estimativa da "Força Iônica Efetiva" de Soluções Micelares de HPCl Através da Constante de Partição de PBTA.

da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por C_2CP .

Tendo em vista estes resultados para a " força iônica efetiva ", os dados de tempo de vida para a supressão, da fluorescência de PBTA por HPCl (Tabela 2) foram convertidos em concentrações de HPCl livre da seguinte maneira:

a) Usamos o modelo simples, isto é:

$$\frac{\tau_f^0}{\tau_f} = 1 + K_{sv} [\text{HPCl}]_{\text{livre}} \quad (53)$$

onde Eq. 53 = Eq. 25 com $K'_{sv} = 0$.

b) Construímos um gráfico de $\log K_{sv}$ (calculado a partir dos dados da Tabela 3) em função de $\sqrt{\mu}$, usando $\mu = [\text{HPCl}] + [\text{NaCl}]$ e valores de ϕ_f^0 / ϕ_f medidos abaixo da CMC. Este gráfico, que pode ser visto na Figura 10, fornece para este sistema um valor de 2,5 para o fator $C'z_1z_2$ que aparece na Eq. 47.

c) Abaixo da CMC, calculamos o valor de K_{sv} com o auxílio da seguinte equação:

$$\log K_{sv} = 2,52 + 2,5 \sqrt{[\text{HPCl}]} \quad (54)$$

onde $\log K_{sv}^0 = 2,52$ representa um valor determinado a partir dos dados da Tabela 2.

d) Acima da CMC, aproveitamos a Eq.52 para calcular K_{sv} através da seguinte equação:

$$\log K_{sv} = 2,52 + 2,5 \sqrt{\text{CMC} + 0,25 ([\text{HPCl}]_{\text{tot}} - \text{CMC})} \quad (55)$$

onde o valor da CMC é aquele determinado por condutimetria, (Tabela 4).

Os valores de $[\text{HPCl}]_{\text{livre}}$ assim calculados podem ser vistos na Figura 19.

FIGURA 10. Efeito de Força Iônica Sobre a Supressão da Fluorescência de PBTA por HPCl.

Os dados para a supressão da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por C_{12}CP (Tabelas 5 e 6) foram transformados em valores de $[\text{C}_{12}\text{CP}]$ livre da seguinte maneira:

a) Usamos o modelo simples, isto é:

$$\frac{\phi_{\text{em}}^{\text{O}}}{\phi_{\text{em}}} = 1 + K_{\text{sv}}[\text{C}_{12}\text{CP}]_{\text{livre}} \quad (56)$$

onde Eq.56 = Eq.24 com $K'_{\text{sv}} = K_{\text{FM}} = 0$.

b) Construímos um gráfico (Figura 11) de $\log K_{\text{sv}}$ em função de $\sqrt{\mu}$, usando $\mu = [\text{C}_{12}\text{CP}] + [\text{KBr}]$ e valores de $\phi_{\text{em}}^{\text{O}}/\phi_{\text{em}}$ medidos abaixo da CMC (Tabelas 5 e 6). Logo, os parâmetros da Eq.47 para este sistema são:

$$\log K_{\text{sv}} = 2,58 + 2,4 \sqrt{[\text{C}_{12}\text{CP}] + [\text{KBr}]} \quad (57)$$

para $\sqrt{[\text{C}_{12}\text{CP}] + [\text{KBr}]} < 0,15$

c) Na presença de KBr 0,05 M e 0,095M, a variação de K_{sv} é desprezível, permitindo-nos usar valores constantes - para K_{sv} . Nestes casos os valores usados para K_{sv} foram : $K_{\text{sv}} = 940 \text{ M}^{-1}$ na presença de KBr 0,05M e $K_{\text{sv}} = 1025 \text{ M}^{-1}$ na presença de KBr 0,095M.

d) Na ausência de KBr e na presença de KBr 0,0095 M, usamos (abaixo da CMC) valores de K_{sv} calculados pela Eq.57. Acima da CMC, fizemos uso da seguinte equação:

(58)

$$\log K_{\text{sv}} = 2,58 + 2,4 \sqrt{\text{CMC} + 0,25([\text{C}_{12}\text{CP}]_{\text{tot}} - \text{CMC}) + [\text{KBr}]}$$

onde a CMC é o valor obtido por condutimetria (Tabela 7).

Nesta equação, nós supomos que a contribuição das micelas - de C_{12}CP para a "força iônica efetiva" é dada pela CMC mais

FIGURA 11. Efeito de Força Iônica Sobre a Supressão da Emissão de Ru(bipy)_3^{2+} por C_{12}CP ;
Os Símbolos Correspondem Aos da Figura 5.

a ionização da micela (vide Discussão). Quando os valores da raiz que aparece na Eq.58 são superiores a 0,15 então nós empregamos um valor constante (880 M^{-1}) para K_{sv} . Os valores calculados desta maneira podem ser apreciados na Figura 21.

As constantes de velocidade para a hidrólise alcalina de $C_{16}CP$ dependem da concentração de $C_{16}CP$ (vide supra). Esta autocatálise, mesmo para concentrações de $C_{16}CP$ da ordem de $10^{-5}M$, é interpretada em termos de uma agregação do detergente abaixo da CMC (agregação pré-micelar). Desconhecendo-se a natureza e a extensão desta agregação, não se pode analisar os dados da supressão por $C_{16}CP$ à luz do modelo simples (uma equação análoga à Eq.56). Estudos ainda em andamento no nosso laboratório sobre a condutividade-específica³⁶ e sobre as constantes de velocidade para a hidrólise alcalina em função da concentração de $C_{16}CP$, devem fornecer maiores detalhes a respeito desta agregação.

IV.2 PARTIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS EM SOLUÇÕES MICELARES.

A medida da constante de partição ($K_1/\bar{N}$) de um supressor, por meio das Eqs. 45 e 46 (vide Modelos), requer não só que o emissor esteja localizado exclusivamente na fase aquosa intermicelar, como também que o supressor obedeça a uma distribuição do tipo Poisson. Acharmos importante, portanto, testar estas equações através do estudo de um sistema simples.

Assim sendo, com base nos resultados acima descritos, escolhemos $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ como emissor e CTAB como detergente. Para evitar os efeitos indesejáveis da força iônica sobre a constante de Stern-Volmer, empregamos um supressor não carregado ($Z_1 = Z_2 = 0$ na Eq.47) do estado excitado de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$. Destes supressores,^{26,31} o que tem a maior solubilidade em água ($2,80 \times 10^{-3} \text{M}$, 15°C)³⁷ e as propriedades químicas mais adequadas é o 1,3-dinitrobenzeno (DNB).

Os resultados da supressão da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ ($3,0 \times 10^{-5} \text{M}$) por DNB, para diversas concentrações de CTAB, são dados na Tabela 9 e podem ser apreciados na Figura 12. Utilizando o valor da constante de Stern-Volmer (2000M^{-1}), determinado na ausência de CTAB, podemos calcular: a) a concentração de DNB na fase aquosa, $[\text{DNB}]_{\text{Aq}}$, quando CTAB está presente na solução (Eq.44); b) a relação das concentrações de DNB nas fases aquosas e micelar, isto é:

$[\text{DNB}]_{\text{mic}} / [\text{DNB}]_{\text{Aq}}$ (vide Eq.42); c) o número médio ($\bar{n}$) de DNB por micela, ou seja:

TABELA 9. Valores de ϕ_{em}^O/ϕ_{em} para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por DNB em Pre-sença de CTAB.

$[CTAB], M$	$[DNB]_{tot}, M \times 10^3$	ϕ_{em}^O/ϕ_{em}	$[DNB]_{Aq}, M \times 10^3$	$\frac{[DNB]_{mic}}{[DNB]_{Aq}}$	$\bar{n}$
0	0	1,00	—	0	—
0	0,60	2,13	0,60	0	—
0	1,20	3,44	1,20	0	—
0	1,80	4,63	1,80	0	—
0	2,40	6,07	2,40	0	—
$\beta_O = 2000M^{-1}$					
0,010	0	1,00	—	—	—
0,010	0,60	1,72	0,36	0,57	2,0
0,010	1,20	2,48	0,74	0,65	3,8
0,010	1,80	3,33	1,16	0,56	5,4
0,010	2,40	4,10	1,55	0,64	7,2
$\beta_1 = 1240M^{-1}$				$0,61 \pm 0,05$	—
0,020	0	1,00	—	—	—
0,020	0,60	1,52	0,26	1,17	1,4
0,020	1,20	2,08	0,54	1,26	2,6
0,020	1,80	2,66	0,83	1,19	3,9
0,020	2,40	3,27	1,13	1,23	5,0
$\beta_2 = 905$				$1,21 \pm 0,04$	—

TABELA 9. Continuação.

[CTAB] , M	[DNE] _{tot} , Mx10 ³	ϕ_{em}^o ϕ_{em}	[DNE] _{Aq} , Mx10 ³	$\frac{[DNE]_{mic}}{[DNE]_{Aq}}$	$\bar{n}$
0,040	0	1,00	—	—	—
0,040	0,60	1,33	0,16	2,42	0,84
0,040	1,20	1,63	0,31	2,87	1,7
0,040	1,80	2,02	0,51	2,56	2,5
0,040	2,40	2,35	0,67	2,76	3,3
		$\beta_4 = 550 \text{ M}^{-1}$	—	$2,65 \pm 0,20$	—
0,060	0	1,00	—	—	—
0,060	0,60	1,26	0,13	3,35	0,6
0,060	1,20	1,49	0,24	3,99	1,2
0,060	1,80	1,76	0,38	3,78	1,8
0,060	2,40	2,16	0,58	3,37	2,3
		$\beta_6 = 435 \text{ M}^{-1}$	—	$3,6 \pm 0,3$	—
0,080	0	1,00	—	—	—
0,080	0,60	1,15	0,08	6,53	0,50
0,080	1,20	1,37	0,18	5,42	0,98
0,080	1,80	1,62	0,31	4,85	1,4
0,080	2,40	1,79	0,39	5,42	1,9
		$\beta_8 = 300 \text{ M}^{-1}$	—	$5,6 \pm 0,7$	—

FIGURA 12. Gráficos de Stern-Volmer para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por DNB. Curva 1, água; Curva 2, CTAB 0,010M; Curva 3, CTAB 0,020M; Curva 4, CTAB 0,040M; Curva 5, CTAB 0,060M; Curva 6, CTAB 0,08M.

$$\bar{n} = \frac{[DNB]_{mic}}{[CTAB]_{mic}} = \frac{[DNB]_{mic} \bar{N}}{[CTAB]_{tot} - CMC} \quad (59)$$

empregando-se um número de agregação $\bar{N} = 75$ para o CTAB¹⁹ e o valor da sua CMC sob estas condições ($9 \times 10^{-4} M$)¹; d) os coeficientes angulares β_o e β_o na presença e ausência de CTAB. Estes valores assim calculados são apresentados na Tabela 9. Nota-se que o valor da relação $[DNB]_{mic}/[DNB]_{Aq}$ depende, dentro do erro experimental, somente de $[CTAB]$, sendo independente da $[DNB]_{total}$ numa faixa de concentração compreendida entre $0,6 \times 10^{-3}$ e $2,4 \times 10^{-3} M$ e de $\bar{n}$ entre 0,5 e 7,2. Um gráfico (Figura 13) dos dados para β_o e β_o , segundo a Eq.46, fornece um valor de $66 \pm 4 M^{-1}$ para $K_1/\bar{N}$.

Uma vez testado o modelo, o mesmo foi aplicado para a determinação das constantes de partição ($K_1/\bar{N}$) dos brometos de N- dodecil-, N-decil- e N-octil-p-cianopiridínio (isto é, $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP , respectivamente) nas micelas de CTAB. Note que a constante de Stern-Volmer (K_{SV}) para a supressão da emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por estes compostos, depende da "força iônica efetiva". Portanto, é importante mantermos a "força iônica efetiva" constante na fase aquosa intermicelar, a fim de evitarmos variações de K_{SV} com a concentração de CTAB,

Com este intuito, nós adotamos alguns critérios empíricos para mantermos uma força iônica efetiva de 50mM na fase aquosa intermicelar. A Eq. 49 indica que a "força iônica efetiva" deveria ser aproximadamente $0,5 [CTAB]_{total}$

FIGURA 13. Determinação da Constante de Partição ($K_1/\bar{N}$) de DNB com as Micelas de CTAB

Por esta razão e outras (vide Discussão) nós adicionamos às soluções contendo CTAB, quantidades de KBr calculadas usando a seguinte equação:

$$0,050M = [KBr] + 0,45 [CTAB]_{tot} \quad (60)$$

Experiências sobre a supressão da emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ ($3,6 \times 10^{-5}M$) por $C_{12}CP$ em KBr 50 mM e em soluções micelares de CTAB (completando-se com KBr segundo a Eq.60) mostraram que K_{sv} realmente mantém-se constante ($\pm 5\%$ Tabela 10) em toda a faixa de concentração de CTAB (0,005 - 0,08 M).

Resultados obtidos para a supressão da emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ ($3,6 \times 10^{-5}M$) por $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP em condições idênticas, podem ser vistos nas Tabs. 11-13 e Figs.14-16. Nota-se que, à semelhança do DNB (compare com a Figura 12), o comportamento da supressão depende somente da $[CTAB]_{total}$. Os valores de $K_1/\bar{N}$ para $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP podem ser obtidos graficamente a partir da Figura 17, para a qual fizemos uso da Eq.46; os valores obtidos são os seguintes:

$$C_{12}CP: \quad K_1/\bar{N} = 175 \pm 10 \text{ M}^{-1}$$

$$C_{10}CP: \quad K_1/\bar{N} = 16 \pm 1 \text{ M}^{-1}$$

$$C_8CP: \quad K_1/\bar{N} = 2,7 \pm 0,3 \text{ M}^{-1}$$

TABELA 10. Valores de K_{sv} para a Supressão da Emissão de -
 $Ru(bipy)_3^{2+}$ (27°C) por C_2CP em Presença de CTAB
e KBr.

$[CTAB], M$	$[KBr], M$	K_{sv}^a, M^{-1}	$\phi_{em}^0/\phi_{em}^0 (CTAB)$
0	0,050	840	1,00
0,0050	0,050	810	—
0,010	0,046	840	1,01
0,020	0,041	810	0,98
0,030	0,037	815	1,01
0,040	0,032	810	1,00
0,060	0,023	810	0,98
0,080	0,019	810	1,00

a) $\pm 5\%$

b) Relação entre os rendimentos quânticos de emissão, na
ausência (ϕ_{em}^0) e na presença ($\phi_{em}^0 (CTAB)$) de CTAB, sem
o supressor.

TABELA 11. Valores de ϕ_{em}^0/ϕ_{em} para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ (27°C) por $C_{12}CP$ em Presença de CTAB.

$[C_{12}CP]$ $M \times 10^3$	ϕ_{em}^0/ϕ_{em}		
	0M CTAB	0,010M CTAB	0,020M CTAB
0	1,00	1,00	1,00
0,54	1,56	1,21	1,13
1,08	2,12	1,41	1,27
1,63	2,67	1,60	1,39
2,17	3,29	1,79	1,51
2,71	3,83	1,96	1,64
3,25	4,47	2,13	1,75
	$\beta_o=1040M^{-1}$	$\beta_{0,01}=366M^{-1}$	$\beta_{0,02}=240M^{-1}$

FIGURA 14. Gráficos de Stern-Volmer para a Supressão da Emissão de Ru(bipy)₃²⁺ por C₁₂CP: Curva 1, CTAB 0M; Curva 2, CTAB 0,010M; Curva 3, CTAB 0,020M.

TABELA 12. Valores de ϕ_{em}^O/ϕ_{em} para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ (27°C) por $C_{10}CP$ em Presença de CTAB.

$[C_{10CP}]$ M x 10 ³	ϕ_{em}^O/ϕ_{em}				
	OM CTAB	0,010M CTAB	0,020M CTAB	0,030M CTAB	0,040M CTAB
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,53	1,48	1,42	1,38	1,31	1,30
1,07	1,96	1,84	1,73	1,63	1,60
1,60	2,45	2,25	2,12	1,96	1,86
2,13	3,00	2,65	2,47	2,25	2,17
2,67	3,54	3,08	2,84	2,59	2,48
3,20	4,01	3,54	—	2,90	2,80
$\beta_O = 915\text{ M}^{-1}$					$\beta_{0,04} = 555\text{M}^{-1}$
					$\beta_{0,03} = 595\text{M}^{-1}$
					$\beta_{0,02} = 700\text{M}^{-1}$
					$\beta_{0,01} = 790\text{M}^{-1}$

FIGURA 15. Gráficos de Stern-Volmer para a Supressão da Emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por C_{10}CP : Curva 1, CTAB 0M; Curva 2, CTAB 0,010M; Curva 3, CTAB 0,020M; Curva 4, CTAB 0,030M; Curva 5, CTAB 0,040M.

TABELA 13. Valores de ϕ_{em}^O/ϕ_{em} para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ (27°C) por C_8CP em Presença de CTAB.

$[C_8CP]$ $M \times 10^3$	ϕ_{em}^O / ϕ_{em}			
	OM CTAB	0,040M CTAB	0,060M CTAB	0,080M CTAB
0	1,00	1,00	1,00	1,00
0,54	1,50	1,43	1,44	1,41
1,07	1,98	1,88	1,87	1,81
1,61	2,48	2,33	2,31	2,21
2,15	2,97	2,77	2,72	2,60
2,68	3,49	3,34	3,16	3,00
3,21	3,96	3,65	3,65	3,45
$\beta_O = 920\ M^{-1}$				$\beta_{0,08} = 755\ M^{-1}$
$\beta_{0,04} = 825M^{-1}$				$\beta_{0,06} = 800M^{-1}$

FIGURA 16. Gráficos de Stern-Volmer para a Supressão da Emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por C_8CP : Curva 1, CTAB 0M; Curva 2, CTAB 0,040M; Curva 3, CTAB 0,080M.

FIGURA 17. Determinação das Constantes de Partição ($K_1/\bar{N}$) de C₁₂CP (Curva 1), C₁₀CP (Curva 2) e C₈CP (Curva 3) com as Micelas de CTAB.

V. DISCUSSÃO

V. 1 O SIGNIFICADO DE "FORÇA IÔNICA" EM SOLUÇÕES MICELARES.

V. 1.1 "FORÇA IÔNICA" E REAÇÕES ENTRE IONS EM SOLUÇÕES ISOTRÓPICAS.

Há muito tempo, sabe-se que as constantes de velocidades para reações entre espécies iônicas são sensíveis as variações do ambiente iônico do meio. Estas variações podem ser induzidas tanto pela variação das concentrações dos próprios ions reativos como também pela adição de outros sais não reativos como é o caso dos eletrólitos inertes.

Qualitativamente, o efeito de sais sobre a constante de velocidade para uma reação entre ions pode ser resumido como tendo o seguinte comportamento: quanto maior a concentração do sal no meio, tanto menor será a constante para reações entre ions de cargas opostas e maior a constante para reações entre ions de cargas iguais.^{35, 38.}

O ponto de partida para tratamento teóricos do efeito cinético primário de sais é geralmente a equação de Brønsted-Bjerrum:³⁸

$$k_s = k_o F \quad (61)$$

que na sua forma logarítmica pode ser escrita como:

$$\log k_s = \log k_o + \log F \quad (62)$$

onde k_s e k_o são as constantes de velocidade na presença e na ausência (diluição infinita) do sal, sendo F um coeficiente que descreve o efeito do sal.

Supondo-se que dois ions M e N reagem através de de um complexo ativado MN, isto é:

então, a velocidade de reação dependerá da concentração de MN da seguinte maneira:

$$-\frac{dM}{dt} = k_{MN} [M][N] \quad (64)$$

Em termos do efeito de sais sobre a constante de equilíbrio K_{MN} , chega-se ao seguinte resultado:³⁸

$$\frac{k_{obs}}{[N]} = k_s = k_o F = k_o \frac{f_M f_N}{f_{MN}} \quad (65)$$

onde os f_i representam os coeficientes de atividade de M, N e MN.

Existe no entanto uma outra alternativa baseada na equação de Poisson-Boltzman. Uma vez que as forças coulômbicas entre M e N são contrabalançadas pela energia térmica das partículas, pode-se descrever $[MN]$ em termos da concentração média de ions N a uma distância r do ion M;^{38,39} neste caso, r é o raio da secção de choque para a reação entre M e N:

$$[MN] \propto [M][N] e^{-\epsilon z_N \psi_M / kT} \quad (66)$$

Nesta equação, ϵ é a carga eletrônica unitária, z_N é a carga do ion N e ψ_M é o potencial elétrico a uma distância r de M. Neste caso, pode-se escrever:³⁸

$$\frac{k_{obs}}{[N]} = k_s = k_o F = k_o e^{-\epsilon z_N \psi_M / kT} \quad (67)$$

De acordo com estes tratamentos, o problema da descrição de efeitos de sais reduz-se à formulação de expressões explícitas, ou para os vários coeficientes de atividade (Eq.65) ou para ψ_m (Eq.67). Aplicando-se a teoria simples de Debye- Hückel ($\epsilon z_N \psi_M / kT \ll 1$), ambos os tratamentos fornecem, no limite de alta diluição, uma equação do tipo:³⁸

$$\log k_s = \log k_o + 2A z_M z_N \sqrt{\mu} \quad (68)$$

onde A é uma constante que depende do meio (0,51 para água) z_M é a carga do ion M e a força iônica μ é definida pela Eq. 48. Para soluções menos diluídas, os dois tratamentos fornecem uma equação do tipo:³⁸

$$\log k_s = \log k_o + 2A z_M z_N \frac{\sqrt{\mu}}{1 + B a \sqrt{\mu}} \quad (69)$$

onde o produto de B, que é uma constante do meio (0,33 para água), por a , um parâmetro para o qual não existe um significado físico muito preciso, é próximo de unidade.

Para soluções mais concentradas do sal, várias equações semi-empíricas para os f_1 têm sido empregadas, dando origem as seguintes equações para k_s :³⁸

$$\log k_s = \log k_o + 2A z_M z_N \sqrt{\mu} - B' \mu \quad (70)$$

$$\log k_s = \log k_o + 2A z_M z_N \frac{\sqrt{\mu}}{1 + \sqrt{\mu}} - B'' \mu \quad (71)$$

Nestas equações, B' e B'' são constantes empíricas. Como alternativa, pode-se calcular F a partir da Eq.67 integrando-se numericamente a equação de Poisson-Boltzman .

De uma forma geral, até 1949 pensava-se que os efeitos de sais sobre a constante de velocidade para reações entre ions, isto é, o efeito cinético primário de sais podiam ser quantitativamente descritos de acordo com este formalismo. Porém, em 1949 Olson e Simpson⁴⁰ chamaram a atenção para as deficiências do conceito clássico de força iônica e enunciaram o **princípio** das interações específicas entre ions de cargas opostas. Basicamente, este princípio diz que a concentração e a valência dos ions de carga oposta àquelas dos ions reativos são os fatores determinantes do efeito cinético primário e não a força iônica clássica como supunha-se até então. Desde então, a importância de tais interações específicas, que podem ou não incluir a formação de pares iônicos, principalmente quando em presença de ions polivalentes, tem sido amplamente demonstrada.

Atualmente, não existe um tratamento teórico que englobe de maneira quantitativa, todos os efeitos cinéticos primários de sais. No entanto, pode-se dizer ³⁸ que o comportamento "clássico", isto é, aquele esperado considerando-se a força iônica, é geralmente observado para reações entre ions de cargas opostas, Isto deve-se ao fato de que as respectivas interações dos ions positivos e negativos do eletrólito inerte com os ions reativos negativos e positivos, estão implícitas na definição da força iônica. Por outro lado, o conceito de força iônica é totalmente falho

quando aplicado às reações entre ions de cargas iguais. Nestes casos, o fator determinante parece ser a concentração do ion do eletrólito inerte de carga oposta (contra ion) àquela dos ions reativos. Quando esta concentração é mantida constante, então a velocidade da reação é muito pouco influenciada pelas variações da valência do ion do eletrólito inerte de carga igual (co ion) àquela dos ions reativos..

Estes efeitos específicos do contraion do eletrólito, tornam-se particularmente evidentes em reações de transferência de eletrons. Além do mais, tais reações são extremamente sensíveis a outros fatores não incluídos nos tratamentos acima mencionados, como por exemplo é o caso da formação de pares iônicos.³⁸ As reações de nosso interesse, isto é, a supressão dos estados excitados de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por N- alquil -p-cianopiridínicos e de PBTA por HPCl são, indubitavelmente, reações onde ocorre a transferência de um eletrón do emissor excitado para o supressor. 28, 31, 32

Sendo reações entre dois ions de cargas positivas, podemos esperar que a constante de velocidade para a supressão será muito mais sensível aos ions de carga negativa, do que àqueles de carga positiva, presentes na solução.

Para a análise dos resultados obtidos sobre o efeito de sais na constante de Stern-Volmer (na ausência de micelas) fizemos uso de uma equação simples como é a Eq. 47. Esta equação é análoga à Eq. 68, mais difere desta por tratar A como um parâmetro ajustável, que correlaciona $\log K_{sv}$ com $\sqrt{\mu}$. Esta escolha foi baseada nas seguintes considerações:

a) para nossa finalidade é necessário conhecermos somente o comportamento empírico de K_{sv} em função da concentração de sal;

b) Equações análogas às Eqs. 69, 70 e 71 não forneceram correlações melhores;

c) Uma vez que os sais e detergentes empregados são, em princípio, eletrólitos 1:1, a força iônica clássica na ausência de micelas é igual a concentração de contraion presente na solução.

No entanto, devemos considerar que, nas nossas condições, a equação empregada é desprovida de fundamento teórico; portanto, julgamos de pouca utilidade pensarmos em atribuir um significado absoluto aos coeficientes angulares obtidos. Apesar disto, notamos algumas diferenças interessantes entre a supressão da emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por $C_{12}CP$ abaixo de sua CMC e aquela por C_2CP . Embora os valores de $\log K_{sv}^0$ para os dois supressores sejam iguais dentro do erro experimental, os efeitos de KBr sobre o valor de $\log K_{sv}$ são bastante diferentes. No caso de C_2CP , o valor de $\log K_{sv}$ aumenta gradualmente com o aumento da concentração de sal (Figura 7). Por outro lado, além de ser mais sensível a sais do que no caso de C_2CP , o valor de $\log K_{sv}$ para a supressão por $C_{12}CP$ atinge assintoticamente um valor limitante (Figura 11). A partir deste valor limitante ($\log K_{sv} \approx 3,02$), calculamos que $K_{sv} \approx 1050 M^{-1}$.

Com $\tau_{em}^0 = 435 \text{ n seg}$,³⁰ obtemos (eq. 21) um valor limitante de $k_2 \approx 2,4 \times 10^9 M^{-1} \text{ seg}^{-1}$, o qual é aproximadamente

um terço daquele de difusão em água ($7 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{ seg}^{-1}$).³⁵ Este comportamento diferencial poderia refletir tanto a formação de pares iônicos entre $C_{12}CP$ e brometo como uma mudança sutil no mecanismo de transferência do elétron, o que certamente merece um estudo mais detalhado no futuro.

V. 1. 2 "FORÇA IÔNICA" E AS PROPRIEDADES DA MICELA

Vários estudos têm demonstrado que as propriedades das micelas são bastante sensíveis à presença de espécies iônicas no meio. No caso de detergentes iônicos, a adição de sais leva a uma diminuição do valor da CMC e a um crescimento do tamanho da micela ($\bar{N}$ maior). Por outro lado estudos realizados por Romsted⁴¹ indicam que α , o grau de ionização da micela, é relativamente insensível à presença de sal.

Quando o sal tem um íon comum com o detergente, torna-se então possível correlacionar a CMC e $\bar{N}$ com $[CI]_{\text{sal}}$ a concentração deste íon comum, através das seguintes equações empíricas:^{1,6a,41,42}

$$\log CMC = C_1 - C_2 \log (CMC + [CI]_{\text{sal}}) \quad (72)$$

$$\log \bar{N} = C_3 + C_4 \log (CMC + [CI]_{\text{sal}}) \quad (73)$$

Combinando estas duas equações, nós podemos mostrar que:⁴²

$$\log CMC = C_5 - C_6 \log \bar{N} \quad (74)$$

Esta diminuição da CMC pode ser tratado em termos dos modelos de micelização anteriormente apresentados (vide Introdução). Escrevendo-se a Eq.8 em termos de concentrações teremos que:

$$-\frac{\log K'_{eq}}{\bar{N}} = \log [\text{monômero}] + (1 - \alpha) \log [\text{contraion}] \quad (75)$$

No entanto, para um sal que tem um ion em comum com o detergente, $[\text{monômero}] \approx \text{CMC}$ e $[\text{contraion}] \approx \text{CMC} + [\text{CI}]_{\text{sal}}$, onde $[\text{CI}]_{\text{sal}}$ é a concentração do ion comum do sal. Desta forma, podemos escrever:

$$\log \text{CMC} = -\frac{\log K'_{eq}}{\bar{N}} - (1 - \alpha) \log (\text{CMC} + [\text{CI}]_{\text{sal}}) \quad (76)$$

Esta equação é semelhante a Eq. 72 e tem sido largamente empregada na determinação de α , o grau de ionização da micela.^{1, 41} Contudo, é importante enfatizarmos que a Eq. 76 não é formalmente correta uma vez que $\bar{N}$ (e talvez K'_{eq}) varia com a concentração de sal (vide infra).

Por esta razão é que passamos a considerar a partição de um monômero livre com a micela de tamanho mais provável ($M_{\bar{N}}$) para uma concentração constante de sal, isto é:⁹

Desde que $[M_{\bar{N}}] \approx [M_{\bar{N}+1}]$ (as micelas são polidispersas) e $[\text{monômero}] \approx \text{CMC}$, então teremos que:

$$K_m = \frac{[M_{\bar{N}+1}]}{[M_{\bar{N}}][\text{monômero}]} = \frac{1}{\text{CMC}} \quad (78)$$

Tomando-se a fração molar como referência, podemos então escrever, como de costume:

$$\Delta G_m^0 = -RT \ln \frac{55,5}{\text{CMC}} = \Delta U_m^0 + W_m \quad (79)$$

que pode ser escrita da seguinte forma:

$$2,3 RT \log \frac{\text{CMC}}{55,5} = \Delta U_m^0 + W_m \quad (80)$$

Lembrando que ΔU_m^0 , a contribuição hidrofóbica para a energia livre, deve ser relativamente insensível à presença de sal, é possível utilizarmos as Eqs. 72 e 80 para mostrar que:

$$W_m = C_7 - C_8 \log (CMC + [Cl]_{sal}) \quad (81)$$

Na realidade, esta última equação está desprovida de fundamentos teóricos sólidos, uma vez que as formas explícitas de W_m provavelmente envolvem funções de $\sqrt{CMC + [Cl]_{sal}}$, geralmente complexas.^{4,6,7,9}

A Eq. 73, e consequentemente a Eq.74, também não estão fundamentadas em conceitos teóricos justificáveis. Recentemente, Ninham e col.⁷ derivaram a seguinte equação semi-empírica:

$$\log CMC = C_9 + C_{10} (\bar{N})^{-\frac{1}{3}} \quad (82)$$

que demonstra a correlação existente entre os dados experimentais e que reproduz as medidas tão bem quanto a Eq.74.

A literatura demonstra claramente que tanto a CMC como o $\bar{N}$ da micela de detergentes iônicos são, antes de mais nada, determinados pela concentração do ion comum do eletrólito, $[Cl]_{sal}$, livre na fase aquosa intermicelar, e não pela força iônica clássica do meio. Já em 1948, Debye⁴³ notou que os valores para $\bar{N}$ e CMC de cloreto de N-dodecilamônio variam com $[Cl^-]$; além do mais, ele observou que esta variação é independente do cátion do eletrólito. Mais tarde, em 1949, Ralson e col.⁴⁴ demonstraram que a CMC de cloreto de N-dodecil piridínio depende somente de $[Cl^-]$ quando o eletrólito adicionado for HCl, NaCl ou Ba Cl₂.

Dados mais detalhados de Wasik e Hubbard⁴⁵ demonstram um comportamento semelhante (Tabela 14), corroborando aquelas observações.

Estes dados indicam que as propriedades da micela de detergentes positivos devem ser ligeiramente influenciadas pela nossa escolha do cation do eletrólito. Além disso, se conseguirmos efetivamente manter constante a concentração do contra ion na fase aquosa intermicelar, enquanto variamos a concentração do detergente, devemos esperar que estas propriedades não serão alteradas.

V. 1. 3 "FORÇA IÔNICA" E REAÇÕES ENTRE IONS EM SOLUÇÕES MICELARES

No caso de reações entre ions hidrofílicos em soluções micelares, o efeito cinético observado dependerá de outros fatores além daqueles existentes em soluções isotrópicas. Dependendo das cargas dos ions reativos, a presença do sal pode dar origem a uma série de efeitos como: catálise na superfície da micela,^{1,41} depleção de um dos ions reativos por ligação com a superfície da micela⁴¹ e concentração dos ions reativos na fase aquosa intermicelar.⁴¹

Quando consideramos uma reação entre ions hidrofílicos de cargas opostas, podemos prever que sua velocidade diminuirá com o aumento da concentração do detergente iônico, simplesmente considerando a ionização da micela. Além disso, a ligação de um dos ions reativos na superfície da micela, isto é, daquele de carga oposta à da micela, dimi -

TABELA 14. Efeitos de Sais sobre as Propriedades de Micelas de Sulfato de Tetradecil trimetil amônio (TTAS) e Brometo de Dodecil trimetil amônio (DTAB).⁴⁵

Detergente	sal	[sal], M	[CI], M	CMC, mM	N̄	α
TTAS	Na ₂ SO ₄	0,010	0,010	0,82	83	0,055
TTAS	Na ₂ SO ₄	0,020	0,020	0,77	86	0,079
TTAS	MgSO ₄	0,020	0,020	0,89	85	0,011
TTAS	La ₂ (SO ₄) ₃	0,0067	0,020	0,87	86	0,12
DTAB	NaBr	0,0125	0,0125	11,6	67	0,14
DTAB	CaBr ₂ ·2H ₂ O	0,00625	0,0125	11,3	67	0,14
DTAB	LaBr ₃ ·7H ₂ O	0,00417	0,0125	11,7	68	0,17

nuirá ainda mais a velocidade da reação (inibição). O significado real de cada um destes efeitos é bastante complexo e em princípio requer um conhecimento a priori da constante de ligação do ion reativo na superfície da micela.

Este tipo de comportamento pode ser melhor apreciado pelo seguinte exemplo.^{34b, 46} A constante de velocidade para a hidrólise alcalina de N-metil p-cianopiridínio, (C₁CP) a pH 12 diminui por um fator de ~2 a medida que variamos a força iônica de 0,01 M (NaOH, pH 12) para 0,11M com KBr. Embora C₁CP não se ligue às micelas de CTAB, é possível obtermos, na presença deste detergente, constantes de velocidade (k_{CTAB}) ainda menores do que aqueles obtidos para igual concentração de KBr (k_{KBr}) na ausência de CTAB. A diferença $k_{KBr} - k_{CTAB}$ diminui com o aumento da concentração de KBr e CTAB, sendo quase nula quando $[KBr] = [CTAB] = 0,10$ M. Quando fazemos a hidrólise alcalina em CTAB a pH 12 na presença de KBr 0,10M, a constante de velocidade não indica a existência de inibição por CTAB. Nestas condições, a competição do OH⁻ pelos locais de ligação na superfície da micela é altamente desfavorecida.

No caso de reações entre ions hidrofílicos de cargas iguais, o efeito de detergentes iônicos sobre a velocidade obviamente dependerá da carga da micela. Quando esta carga é oposta àquela dos ions reativos, qualquer efeito cinético de sal na fase aquosa intermicelar será mascarado pela eficiência da catálise da reação devida à concentração destes ions reativos no ambiente da superfície da micela. Por exemplo, a reação de H₂O com Co(NH₃)₅ Cl²⁺ e que é

induzida por mercúrio (II), isto é :

é catalizada pela presença de dodecil sulfato de sódio (SDS), em cujo caso a reação pode-se tornar cerca de 42.000 vezes mais rápida.⁴⁷

Quando a carga da micela é igual àquela dos ions hidrofílicos reativos, devemos esperar que a ligação dos ions reativos com a superfície da micela não seja significativa. Logo, podemos ver que a velocidade de reação entre estes ions deve depender da concentração dos contraions, presentes na fase aquosa intermicelar. Quando o contraion do detergente e do sal é comum, a concentração destes contraions pode ser considerada como proveniente da dissociação do monômero livre do detergente ($\sim \text{CMC}$), da ionização da micela, ($\sim \alpha ([\text{Det}]_{\text{tot}} - \text{CMC})$) e devida ao teor de sal inerte ($[\text{CI}]_{\text{sal}}$), isto é:

$$[\text{CI}]_{\text{livre}} = \text{CMC} + \alpha ([\text{Det}]_{\text{tot}} - \text{CMC}) + [\text{CI}]_{\text{sal}} \quad (83)$$

Ao mesmo tempo, a não ligação destes ions reativos com a superfície da micela implica num outro efeito, isto é a exclusão destes ions da vizinhança da micela com consequente aumento da concentração efetiva dos mesmos na fase aquosa intermicelar.

Quando um dos ions reativos é anfifílico, isto é contém uma parte hidrofóbica além do grupo iônico hidrofílico, como é por exemplo o caso do PBTA, ter-se-á um efeito de sal do próprio detergente ou do eletrólito inerte adicionado sobre sua constante de partição na fase micelar. Este

efeito já foi por nós observado em nosso estudo de supressão de 4-(1-pireno)butilato de sódio por iodeto de sódio em SDS.²³

Este efeito pode ser significativo. Isto pode ser demonstrado pelos nossos resultados sobre o efeito de NaCl na constante de partição de PBTA em micelas de HPCl (Figuras 4 e 9). Por outro lado, reações entre um ion hidrofílico e um substrato iônico anfifílico e que sejam catalizadas por micelas, são geralmente efetuadas mantendo-se constante e razoavelmente alta a concentração do ion hidrofílico, de tampão ou de um outro eletrólito inerte, enquanto são mantidas baixas as concentrações de detergente (≤ 10 CMC). Nestas condições a constante de partição do substrato iônico anfifílico, como no caso de PBTA, não dependerá da concentração do detergente. Assim sendo, corrigindo-se para partição do substrato as constantes de velocidade observadas, eliminaremos as contribuições devidas às variações da constante de partição com o sal.

V. 1. 4 A MEDIDA DE "FORÇA IÔNICA" EM SOLUÇÕES MICELARES

Considerando os objetivos desta Tese, é óbvio concluirmos que os efeitos cinéticos de sal sobre a reação entre dois ions positivos em soluções micelares de detergentes positivos, são de importância vital. Por outro lado, efeitos deste tipo, pequenos e de difícil quantificação, e que refletem somente mudanças de reatividade na fase aquosa intermicelar, estão longe do enfoque principal dos grupos de pesquisa interessados na obtenção e no estudo de catálise

por micelas. Por este motivo, não encontra-se na literatura estudos detalhados de reações, como a nossa, que são influenciadas, mas não formalmente "catalizadas", por detergentes.

Ao iniciarmos os estudos sobre "força iônica efetiva" de soluções micelares, esperávamos observar um comportamento do tipo descrito pela Eq.83. Na ausência de sal, teríamos então que:

$$\mu_{ef} = [CI]_{\text{livre}} = CMC + \alpha ([Det]_{\text{tot}} - CMC) \quad (84)$$

e em gráfico de μ_{ef} em função de $[Det]_{\text{tot}}$ teria um coeficiente angular igual a α , o grau de ionização da micela. Valores de α para detergentes iônicos são geralmente em torno de 0,2.⁴¹ De fato, encontramos na literatura^{3,41} valores de 0,12, 0,21, 0,15 e 0,23⁴⁸ para α de CTAB e de 0,38, 0,31, 0,21, 0,14 e 0,11 para α de HPCl.

O coeficiente angular obtido (Eq.52) através do efeito de NaCl sobre a partição de PBTA com as micelas de HPCl é 0,25, um valor condizente com os valores de α para este detergente e de acordo com a nossa expectativa. Por outro lado, os coeficientes obtidos a partir da supressão de $Ru(bipy)_3^{2+}$ por C_2CP são $0,5 \pm 0,1$ no caso de CTAB (Eq.49) e $0,7 \pm 0,1$ no caso de HPCl (Eq.50).

Tendo em vista nossa discussão anterior, notamos uma diferença importante entre estes dois métodos para se estimar μ_{ef} . Segundo o primeiro método, o PBTA e o HPCl têm acesso à micela de HPCl. Por outro lado, tanto $Ru(bipy)_3^{2+}$ como C_2CP são excluídas das micelas de CTAB e de HPCl. Assim sendo, podemos ter neste segundo método, além de um efeito cinético de sal, um efeito de concentração dos

ions reativos na fase aquosa intermicelar.

No tratamento dos dados para a supressão da emissão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por C_2CP , fizemos uso do coeficiente angular dos gráficos de $\phi_{\text{em}}^0 / \phi_{\text{em}}$ em função da concentração analítica ($[\text{C}_2\text{CP}]_0$) do supressor, para determinarmos a constante de Stern-Volmer, K_{sv} , isto é:

$$\frac{d \left[\frac{\phi_{\text{em}}^0}{\phi_{\text{em}}} - 1 \right]}{d [\text{C}_2\text{CP}]_0} = K_{\text{sv}} \quad (85)$$

A concentração efetiva do supressor na fase aquosa intermicelar, $[\text{C}_2\text{CP}]_{\text{ef}}$, está relacionada com $[\text{C}_2\text{CP}]_0$ da seguinte forma:

$$[\text{C}_2\text{CP}]_0 = [\text{C}_2\text{CP}]_{\text{ef}} (1 - C_{\text{DM}} V_D) \quad (86)$$

onde $C_{\text{DM}} = [\text{Det}]_{\text{tot}} - \text{CMC}$ é a concentração de detergente micelar e V_D é o volume de exclusão criado pelo detergente, dado em litros por mole de detergente. A constante de Stern-Volmer corrigida para efeitos de exclusão, isto é K_{sv}'' , pode ser calculada como:

$$K_{\text{sv}}'' = K_{\text{sv}} (1 - C_{\text{DM}} V_D) \quad (87)$$

para a qual fizemos uso das Eqs. 85 e 86. Na ausência de micelas, $K_{\text{sv}} = K_{\text{sv}}''$, enquanto que na presença de micelas $K_{\text{sv}} \geq K_{\text{sv}}''$.

Voltando então para a Eq. 47, podemos ver que uma equação mais geral seria a seguinte:

$$\log K_{\text{sv}}'' = \log K_{\text{sv}}^0 + C' z_1 z_2 \sqrt{\mu_{\text{ef}}} \quad (88)$$

Podemos ainda usar os valores de K_{sv} aproveitando a seguinte equação quando em presença do detergente:

$$\log K_{sv} = \log K_{sv}^0 + C^2 z_1 z_2 \sqrt{\mu_{ef}} - \log(1 - C_{DM} V_D) \quad (89)$$

Usando os valores de $\log K_{sv}$ da Tabela 8, os parâmetros da Eq.50 para HPCl e da Eq. 49 para CTAB e μ_{ef} calculado através da Eq.84 com $\alpha = 0,25$, podemos então calcular $C_{DM} V_D$ em função de C_{DM} para estes dois detergentes. Os resultados destes calculos podem ser apreciados na Figura 18. Como podemos ver, a correlação entre $C_{DM} V_D$ e C_{DM} é bastante satisfatório para o caso de HPCl, em cujo caso o valor de V_D (coeficiente angular) decresce de 3,5 para 2,5 litros/mole a medida que aumentamos a concentração de HPCl.

Se supôrmos que as micelas de HPCl são esféricas e que possuem um número de agregação de 80,⁴⁹ podemos então usar os valores de V_D acima para estimar o raio de exclusão, r_{ex} , por meio de um cálculo geométrico simples, isto é:

$$V_D = \frac{\frac{4}{3} \pi (r_{ex})^3 N_0}{\bar{N}} \quad (90)$$

onde N_0 é número de Avogadro. Deste modo, obtemos um raio de exclusão da ordem de 45 Å.

Se calcularmos o raio da micela r_M como sendo o correspondente ao do comprimento de uma cadeia com 16 átomos de carbono (22 Å, Eq.17) acrescida da espessura da camada de Stern (~ 5 Å)⁴, podemos desta forma estimar o raio de exclusão na base das tabelas de Loeb e col.³⁹ Por exemplo, para $[HPCl] = 0,02M$, $\mu_{ef} = 0,006 M$; com $r_M = 27$ Å e para um potencial superficial da micela definido como $e\psi \approx 5kT$,

FIGURA 18. Volume de Exclusão ($C_{DM} V_D$) em Função da Concentração Total de Detergente (C_{DM}).

é possível calcularmos um comprimento efetivo de $20 \text{ \AA}$ para a dupla camada. O valor de r_{ex} assim estimado é então da ordem de $47 \text{ \AA}$, o que nos possibilita concluir que a concentração de C_2CP na fase aquosa intermicelar, devida a sua exclusão da vizinhança das micelas de HPCl , de fato desempenha um papel nas experiências de supressão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por este supressor.

No caso de CTAB, a correlação entre os valores calculados para $C_{\text{DM}} V_{\text{D}}$ e C_{DM} é altamente não linear. Ainda assim, os valores obtidos de V_{D} permitem-nos calcular raios de exclusão da ordem de $45 - 35 \text{ \AA}$, os quais são, como no caso de HPCl , bastante razoáveis.

A diminuição do raio de exclusão com o aumento de C_{DM} , pode ser racionalizada em termos de uma diminuição simultânea do comprimento efetivo da dupla camada, a qual é inversamente proporcional ao raiz quadrada da concentração de contraíons livres na fase aquosa intermicelar.³⁹ Além disto o crescimento das micelas (aumento de $\bar{N}$) a medida que aumentamos C_{DM} , pode ser na realidade um fator importante.

Os resultados para a "força iônica efetiva" indicam que, num sistema em que o emissor está localizado exclusivamente na fase aquosa intermicelar e o supressor tem fácil acesso à fase micelar, então a contribuição do detergente para o efeito cinético pode ser melhor compreendido em termos das Eqs. 83 e 84. Por este motivo, fizemos uso destas equações como compensação para o efeito da ionização da micela sobre K_{SV} nas experiências de medida da concentra

ção de monômero livre (vide Eqs.55 e 58). A escolha do valor de $\alpha = 0,25$ no caso de HPCl (vide infra), foi baseada nos resultados para a partição de PBTA (Eq. 52). O uso do mesmo valor no caso de $C_{12}CP$, baseia-se na semelhança existente entre este e os valores de α para brometo de dodecil piridínio (0,17, 0,20 e 0,23)⁴¹, na faixa geral de valores de α para detergentes iônicos⁴¹ e no fato de que os valores de $[C_{12}CP]_{\text{livre}}$ são relativamente insensíveis à escolha de valores de α entre 0,15 e 0,30.

Por outro lado, nos casos em que o supressor tem acesso limitado à fase micelar, teremos que levar em consideração também os efeitos de exclusão do supressor sobre K_{sv} . Quanto a partição de $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP , notamos que nesta série as medidas de $K_1/\bar{N}$ requerem um aumento de C_{DM} a medida que $K_1/\bar{N}$ diminui. O uso da Eq.60 com um valor de 0,45 $[CTAB]$ para a contribuição do CTAB reflete então uma tentativa de compensação para os efeitos cinéticos e de exclusão. Embora esta escolha possa ser criticada, notamos que os gráficos de Eq.46 (Figura 17) não mostram desvios significativos que eventualmente pudessem ser interpretados como falhas do método, nestas condições.

Os resultados para o efeito de NaCl sobre a partição de PBTA sugerem que deveria ser possível medirmos α e a CMC de detergentes derivados de piridínios por meio de supressão de fluorescência. Se tivéssemos escolhido, ao invés de PBTA, um emissor fluorescente derivado de um hidrocarboneto aromático cujo tempo de vida de fluorescência fosse mais curto, por exemplo antraceno:

deveríamos esperar que a supressão dinâmica do mesmo pelo detergente livre e pelas micelas seria desprezível. Assim sendo, a supressão (totalmente estática) começaria somente a partir da CMC quando o emissor começa a se incorporar na fase micelar (Eq. 24 com K_{sv} e $K_{sv}' \approx 0$). Através de medidas de $K_{FM} / \bar{N}$ na presença e na ausência de sal, poderíamos então estimar o valor de α para o detergente na ausência de sal.

V. 2 A CONCENTRAÇÃO DO MONÔMERO LIVRE

Como mencionamos na Introdução desta Tese, o processo de micelização pode ser tratado em termos não só do modelo da ação das massas como também à luz do modelo de separação das fases. Além disso, quando o número de agregação da micela é maior do que ~50 monômeros por micela, as diferenças entre os valores para as concentrações de monômeros livres, calculados com os dois modelos, são pequenas.

Sabe-se no entanto que o número de agregação de HPCl é de aproximadamente 80 em água.⁴⁹ Embora o número de agregação ($\bar{N}$) de $C_{12}CP$ seja desconhecido, existem na literatura valores de $\bar{N}$ para um detergente semelhante, isto é, para o brometo de N-dodecil piridínio (DPB). Os valores de $\bar{N}$ encontrados⁵⁰ para DPB são de 58 em água, 80 em presença de KBr 0,02M, 95 em presença de KBr 0,04 - 0,08M, e 139 em presença de KBr 0,10 M. Podemos esperar então que os valores de $\bar{N}$ para $C_{12}CP$ também serão da mesma ordem de grandeza (> 50). Por este motivo, trataremos nossos resultados de acordo com o modelo de separação de fases.

Nossos resultados para o comportamento da concentração de HPCl livre, em função da concentração total de HPCl, podem ser apreciados na Figura 19. Supondo-se que as atividades do monômero e do contraion na fase aquosa intermicelar são constantes acima da CMC e iguais às das concentrações dos mesmos, teremos (Eq.75) que:

$$\frac{-\log K'_{eq}}{\bar{N}} = \log [HPCl]_{livre} + (1 - \alpha) \log [CI] \quad (91)$$

Uma vez que $[CI]$ é dada pela seguinte equação:

$$[CI] = [HPCl]_{\text{livre}} + \alpha ([HPCl]_{\text{tot}} - [HPCl]_{\text{livre}}) \quad (92)$$

podemos escrever que:

$$\log [HPCl]_{\text{livre}} = - \frac{\log K'_{eq}}{\bar{N}} - (1 - \alpha) \log \{ [HPCl]_{\text{livre}} + \alpha ([HPCl]_{\text{tot}} - [HPCl]_{\text{livre}}) \} \quad (93)$$

Com $\alpha = 0,25$, os pontos experimentais imediatamente acima da CMC fornecem um valor de 5,24 para o parâmetro $(\log K'_{eq})/\bar{N}$ que aparece na Eq. 93. Utilizando estes valores, é possível calcularmos o comportamento hipotético de $[HPCl]_{\text{livre}}$ em função de $[HPCl]_{\text{tot}}$, o qual é demonstrada na Curva 1 da Figura 19.

Notamos que, em torno de $HPCl \ 4 \times 10^{-3} M$, a Curva 1 começa desviar-se significativamente dos pontos experimentais. Numa tentativa de melhorar a concordância entre a teoria e a experiência, variamos os parâmetros da Eq. 55 para verificar a influência destes sobre os valores de $[HPCl]_{\text{livre}}$ calculados a partir dos dados experimentais. Variando-se o valor de α para o detergente na faixa de $0,25 \pm 0,10$, observamos variações de ~5% nos valores calculados. De uma forma análoga, a variação de $C'z_1z_2$ na faixa de $2,5 \pm 1,0$ ocasionou variações de $\pm 15\%$ nestes valores. Finalmente, iterando a Eq. 55 (usando-se o valor calculado para $[HPCl]_{\text{livre}}$ ao invés da CMC) os valores calculados para $[HPCl]_{\text{livre}}$ va-

FIGURA 19. Valores de $[HPCl]_{livre}$ (O), calculados com o Auxílio da Eq. 53, em Função da Concentração Total do Detergente. Curva 1: Eq. 93 com $\alpha=0,25$ e $(\log K'_{eq})/\bar{N}=5,24$; Curva 2: Eq. 95.

riam numa faixa inferior a 2% .

Alternativamente, foi possível determinarmos os parâmetros da Eq. 93 a partir do efeito de NaCl sobre CMC (medida por fluorescência, Tabela 4) de HPC1. De acordo com a Eq. 76, obtivemos a seguinte equação:

$$\log \text{CMC} = -5,10 - 0,70 \log (\text{CMC} + [\text{NaCl}]) \quad (94)$$

a qual permitiu-nos calcular os seguintes parâmetros para a Eq. 93: $(\log K_{eq}')/\bar{N} = 5,10$, $(1-\alpha) = 0,70$ e $\alpha = 0,30$; assim sendo obtém-se:

$$\begin{aligned} \log [\text{HPC1}]_{\text{livre}} = & -5,10 - 0,70 \log \left\{ [\text{HPC1}]_{\text{livre}} \right. \\ & \left. + 0,30 ([\text{HPC1}]_{\text{tot}} - [\text{HPC1}]_{\text{livre}}) \right\} \quad (95) \end{aligned}$$

O comportamento hipotético de $[\text{HPC1}]_{\text{livre}}$ em função de $[\text{HPC1}]_{\text{tot}}$, segundo a Eq.95, pode ser melhor apreciado com o auxílio da Curva 2 que aparece na Figura 19. Embora tenhamos enfatizado anteriormente que a Eq.76 não é formalmente correta quando utilizada para o cálculo de α , esta equação é bastante útil na presente situação, uma vez que ela contém a dependência destes parâmetros em função da concentração de contraion livre. No entanto, observamos que a correlação entre o modelo e a experiência ainda deixa muito a desejar.

Procurando uma explicação para esta deficiência, é importante notarmos que os valores de $[\text{HPC1}]_{\text{livre}}$ que constam da Figura 19 foram calculados fazendo uso da Eq.53, a qual presuppõe que deve haver supressão de PBTA pelas mices de HPC1 ($K_{sv}'=0$). Voltando à Eq.25, podemos escrever:

$$\frac{\tau_f^O}{\tau_f} = 1 + K_{sv} [\text{HPCl}]_{\text{livre}} + \frac{K'_{sv}}{\bar{N}} ([\text{HPCl}]_{\text{tot}} - [\text{HPCl}]_{\text{livre}}) \quad (96)$$

Se agora calcularmos K_{sv} usando o valor de $\alpha = 0,30$ obtido - da Eq. 94, teremos (compare com a Eq.55) que:

$$\log K_{sv} = 2,52 + 2,5 \sqrt{[\text{HPCl}]_{\text{livre}} + 0,30 ([\text{HPCl}]_{\text{tot}} - [\text{HPCl}]_{\text{livre}})} \quad (97)$$

Uma vez que tanto K'_{sv} como $\bar{N}$ devem mostrar de - pendências semelhantes quando a concentração de contraions variar na fase aquosa intermicelar, acreditamos que podemos tratar $K'_{sv} / \bar{N}$ como se fosse aproximadamente constante. Re - solvendo simultâneamente as Eqs. 95 - 97 por métodos itera - tivos obteremos um valor de $K'_{sv} / \bar{N} = 10 \text{ M}^{-1}$. Isto pode ser melhor apreciado na Figura 20 onde mostramos o comporta - mento dos dados experimentais, calculados a partir das Eqs. 96 e 97 com $K'_{sv} / \bar{N} = 10 \text{ M}^{-1}$, e o comportamento hipotético calculado com a ajuda da Eq. 95.

Como podemos ver, existe agora uma concordância - entre o modelo e a experiência. Não obstante, é importante encontrarmos uma justificativa para o valor de $K'_{sv} / \bar{N}$ - obtido com $\bar{N} = 80$, é $\tau_f^O = 94 \text{ nseg}$, podemos calcular - (Eq. 21) que a constante de velocidade para a supressão da fluorescência de PBTA pela micela deve ser de $k'_q \approx 10^{10} \text{ M}^{-1} \text{ seg}^{-1}$.

Por outro lado, os valores de K_{sv} fornecem uma constante de velocidade para a supressão da fluorescência de PBTA pelo monômero livre $k_q \approx 4,5 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{ seg}^{-1}$, acima da CMC.

FIGURA 20. Valores de $[HPCl]_{livre}$ em Função da Concentração Total do Detergente. Valores Corrigidos para Supressão pelas Micelas (O) e Curva Teórica (—) Calculada Segundo a Eq. 95.

De acordo com a teoria das velocidades limitadas por difusão,⁵¹ podemos escrever que:

$$\frac{k_q'}{k_q} \approx \frac{\rho' (D_o + D_M)}{\rho (D_o + D_m)} \quad (98)$$

onde ρ' e ρ são os raios das secções de choque para a reação de supressão do estado singlete excitado de PBTA pela micela e pelo monômero, respectivamente. D_m , D_M e D_o são os respectivos coeficientes de difusão do monômero, da micela e do estado excitado de PBTA. Simplesmente na base da carga do sistema, esperaríamos que a importância das repulsões eletrostáticas fosse menor no sistema micela - PBTA do que no sistema micela - Ru(biny)_3^{2+} . Além disto, no estado excitado, as moléculas de PBTA podem aproximar-se da micela de tal maneira que o seu grupo pireno coloque-se mais próximo da superfície da micela do que o seu grupo hidrofílico, diminuindo ainda mais a influência destas repulsões. Um calculo simples com $D_o \approx D_m \gg D_M$, $\rho' = r_M + \rho = 27\text{\AA} + \rho$ e $\rho \approx 7\text{\AA}$, fornece um valor de $k_q' \approx 1,1 \times 10^{10} \text{ M}^{-1} \text{ seg}^{-1}$, mostrando que o valor de $K_{sv}' / \bar{N}$ é de fato bastante razoável.

Os resultados experimentais para o comportamento de $[C_{12CP}]_{\text{livre}}$ em função de $[C_{12CP}]_{\text{total}}$ podem ser vistos na Figura 21. Fazendo-se uso dos valores de CMC na Eq. 76, podemos avaliar os parâmetros da Eq. 93 para o comportamento hipotético, isto é:

$$\log [C_{12CP}]_{\text{livre}} = -3,00 - 0,60 \log \{ [C_{12CP}]_{\text{livre}} + [KBr] + 0,4([C_{12CP}]_{\text{tot}} - [C_{12CP}]_{\text{livre}}) \} \quad (99)$$

Este comportamento hipotético é representado pelas curvas - da Figura 21. Notamos que a concordância entre o modelo e a experiência é totalmente satisfatória somente no caso de $C_{12}CP$ em presença de KBr 0,050M. Em presença de KBr 0,0095 M e em água, a relação ϕ_{em}^0 / ϕ_{em} torna-se grande, quando acima da CMC. Pequenos erros nas medidas das intensidades de emissão introduzem erros grandes nesta relação e portanto - nas concentrações de monômeros livres (da ordem de 10%) . Além disso, o valor de $\bar{N}$ para estes casos provavelmente estará mais próximo ao limite (~ 50) onde a aplicação do modelo da ação das massas seria mais apropriada.

Em presença de KBr 0,095M, observamos um desvio - semelhante ao daquele observando com $HPCl$. Supondo a existência de supressão pelas micelas, podemos calcular um valor de $\sim 60 M^{-1}$ para $K_{sv}' / \bar{N}$. Com $\bar{N} = 100$ e $\tau_{em}^0 = 435 nsec$,³⁰ obtemos um valor de $k_q' \approx 1,5 \times 10^{10} M^{-1} sec^{-1}$ para a constante de velocidade para supressão do estado excitado - de $Ru(bipy)_3^{2+}$ pelas micelas. Fazendo-se uso do valor limite para a constante de velocidade para supressão da emissão pelo monômero, anteriormente obtido ($k_q \approx 2,5 \times 10^9 M^{-1} sec^{-1}$), e empregando a teoria para a transferência de eletrons no estado excitado,^{26,31} é possível estimarmos que a variação da energia livre para esta transferência é quase nula. Assim - sendo, interações entre os grupos p-cianopiridínicos na superfície da micela poderiam, por diminuição do potencial de redução destes grupos lá presentes, ter uma influência marcante na velocidade da transferência para a superfície da micela.

FIGURA 21. Valores de $[C_{12}CP]_{livre}$ em Função da Concentração Total do Detergente. Os Símbolos Correspondem aos da Figura 5.

No entanto, ainda é necessário que o estado excitado de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ chegue suficientemente perto da superfície para que a transferência ocorra. Neste sentido, notamos que evidências convincentes existem somente para a ocorrência desta supressão pelas micelas em presença de KBr 0,095M. De novo recorremos às tabelas de Loeb e col.³⁹ para estimar o comprimento da dupla camada em função de $[\text{KBr}]$. Com $e\psi/kT \approx 5.49$ e $r_M \approx 22 \text{ \AA}$, os valores deste comprimento à CMC são: água, $\sim 13 \text{ \AA}$; KBr 0,0095 M, $\sim 10 \text{ \AA}$; KBr 0,050 M, $\sim 6 \text{ \AA}$; KBr 0,095 M, $\sim 4 \text{ \AA}$. Se levarmos em consideração também a carga de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$, podemos ver (vide também a Eq. 66) a necessidade do estado excitado do $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ aproximar-se a uma distância quase de contato molecular com a superfície da micela para que haja transferência do eletrôn e assim explicar o comportamento observado.

Um dos propositos desta Tese é a medida do comportamento da concentração de monômero livre acima da CMC. No caso de HPCl, os resultados obtidos são bastante satisfatórios e indicam claramente que esta concentração diminui acima da CMC de acordo com o modelo de separação de fases. Os resultados para C_{12}CP , embora menos satisfatórios do ponto de vista de correlações quantitativas, certamente apoiam o método empregado.

O comportamento da concentração de monômero livre acima da CMC é um assunto bastante discutido na literature. Embora calculos recentes efetuados por Tanford^{6c} tenham indicado um aumento desta concentração acima da CMC, os resultados de Aniansson e col.⁵ mostram a necessidade de haver

uma diminuição desta concentração no caso de SDS. Resulta - dos recentes, fazendo-se uso de eletrôdos seletivos, sensí - veis ao monômero do detergente, também demonstram que a con - centração do monômero livre de SDS diminui acima da CMC de acordo com o modelo de separação das fases.^{52, 53} Nossos resultados, além de representarem as primeiras experiên - cias neste sentido com detergentes positivamente carregados exibem uma sensibilidade muito maior na região de maior in - teresse, isto é, imediatamente acima da CMC.

V. 3 A PARTIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS

Quando um substrato é solúvel em água, a sua par - tição entre as fase aquosa e micelar depende de vários fa - tores. No caso de substratos anfifílicos e de carga oposta àquela da micela, tanto a atração eletrostática como o - efeito hidrofóbico favorecem uma forte associação entre o substrato e a fase micelar. Para substratos anfifílicos de carga igual àquela da micela, a partição refletirá o equilí - brio entre a repulsão eletrostática e o efeito hidrofóbico. A partição de substratos não carregados dependerá não só das contribuições hidrofóbicas como também das interações - específicas de substituentes do substrato com os grupos hi - drofílicos de detergente.

Como mencionamos anteriormente, as frações de ΔU_m^0 correspondentes à incorporação do monômero do detergente na micela podem ser estimadas por vários métodos, nenhum dos quais é totalmente satisfatório. A variação da energia li - vre para a transferência de hidrocarbonetos alifáticos, do -

hidrocarboneto alifático puro para a solução aquosa, ou da solução aquosa para a fase micelar, não inclui as contribuições entrópicas desfavoráveis, devidas à menor nobilidade do monômero em relação a um hidrocarboneto alifático, na micela. A variação da CMC em função do comprimento da cadeia hidrocarbônica do detergente, incluirá contribuições mais apropriadamente atribuídas a Δu_m . Variações do número de agregação com o comprimento da cadeia hidrocarbônica podem influir no raio de curvatura da superfície da micela e portanto no empacotamento e na orientação dos grupos hidrofílicos desta superfície. Estes mesmos fatores podem também induzir variações no grau de penetração de água (contatos residuais do tipo hidrocarboneto-água) em função do comprimento da cadeia.

É porém nossa intenção, nesta parte da Tese, examinar a partição com a fase micelar, de substratos que se assemelham a um monômero do detergente. Nestes substratos, $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP , o grupo hidrofílico foi mantido constante, variando somente o comprimento da cadeia hidrocarbônica. Além disto, fizemos uso do mesmo detergente, CTAB, sob condições aproximadamente constantes. Deste modo, a variação constante de partição deve depender predominantemente de variações do efeito hidrofóbico em função do comprimento da cadeia hidrocarbônica. Assim sendo, é possível estimarmos não só o valor de $\Delta u_{CH_2}^0$, a contribuição por grupo CH_2 para este efeito, como também a magnitude de Δu_m . Este método contorna então, em princípio, a maioria das objeções que podem ser levantadas contra os outros métodos

utilizados para a estimativa destes parâmetros.

Nesta Tese nós fazemos distinção entre partição e distribuição do substrato, usando como definição de partição, o equilíbrio de um único substrato com uma micela não ocupada (Eq.28). No entanto, como foi demonstrado nesta Tese, quando a distribuição do substrato entre as micelas disponíveis é do tipo Poisson, a constante de partição K , de um único substrato com uma micela não ocupada, é igual à constante de partição bruta do substrato entre as fases aquosa e micelar (Eq.39).

Esta última constante representa uma quantidade termodinâmica que pode ser relacionada à variação da energia livre (ΔG_m^O) para a transferência do substrato da fase aquosa para a fase micelar.⁶ Em termos de frações molares de substrato na fase micelar (X_{SM}) e na fase aquosa (X_{SA}), podemos escrever uma constante de equilíbrio (K_T^O) que tem significado termodinâmico, isto é:

$$K_T^O = \frac{X_{SM}}{X_{SA}} \quad (100)$$

Logo, podemos verificar que existe uma relação entre K_T^O e nosso valor experimental de $K_1/\bar{N}$, isto é:

$$K_T^O = \frac{[S]_{mic} (55,5)}{[S]_{Aq} ([Det]_{total} - CMC)} = 55,5 K_1 / \bar{N} \quad (101)$$

onde 55,5 M é a molaridade da água. Além disto, teremos que:

$$\Delta G_m^O = - RT \ln K_T^O = - RT \ln 55,5 K_1 / \bar{N} \quad (102)$$

Finalmente, fazendo uso da Eq. 12, é possível relacionarmos nossos valores de $K_1 / \bar{N}$ (para a partição de substratos) com as contribuições do tipo ΔU_m^O e W_m que aparecem - quando discutimos o processo de micelização:

$$-RT \ln 55,5 K_1 / \bar{N} = \Delta U_m^O + W_m \quad (103)$$

Fazendo-se uso da Eq.13, terenos que:

$$-RT \ln 55,5 K_1 / \bar{N} = \Delta u_{CH_3}^O + n_{CH_2} \Delta u_{CH_2}^O + \Delta u_r^O + W_m \quad (104)$$

Na Figura 22, mostramos um gráfico dos resultados por nos obtidos para $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP , de acordo com a Eq. 104. Estes gráficos fornecem valores de $\Delta u_{CH_3}^O = -0,64 \pm 0,08$ kcal/mole / grupo CH_2 e de $\Delta u_{CH_3}^O + \Delta u_r^O + W_m \approx 2,2$ kcal/mole. O valor de $\Delta u_{CH_2}^O$ é próximo dos menores-atê então utilizados para o calculo das propriedades das micelas.⁶ Aceitando um valor de aproximadamente -2,0 kcal/mole/grupo CH_3 para $\Delta u_{CH_3}^O$ ^{6,7} e $\sim 1,0$ kcal/mole^{4,6} para Δu_r^O , podemos estimar que W_m deve ter um valor próximo de 3,2 kcal mole⁻¹.

Um outro dado interessante é a semelhança entre - os valores de ΔG_m^O para a transferência $C_{12}CP$ da água para a micela de CTAB e da água para a micela de $C_{12}CP$ em presença de KBr 0,050 M. Para o primeiro caso, calculamos ΔG_m^O (água /CTAB) = - 5,51 kcal/mole (Eq.102) e para o segundo, ΔG_m^O (água / $C_{12}CP$) = - 5,53 kcal/mole (CMC = 5,5 mM, Eq.79). Assim, de uma forma independente do método de cálculo para a contribuição hidrofóbica (com a possível exceção de pequenas diferenças em Δu_r^O), teremos que W_m (água/CTAB) $\approx$

FIGURA 22. Valores de ΔG_m^O para a Partição de $C_{12}CP$, $C_{10}CP$ e C_8CP com as Micelas de CTAB em Função do Número de Metilenos (n_{CH_2}) na Cadeia Hidrocarbônica.

W_m (água/ $C_{12}CP$).

Finalmente, devemos comentar sobre as implicações da validade das Eqs. 39 e 101, demonstrada pelos nossos dados experimentais. Quando estudamos uma reação catalizada por micelas, geralmente fazemos uso de uma concentração baixa do substrato¹. No entanto, na faixa de concentração imediatamente acima da CMC onde a concentração de micelas ainda é pequena, é possível termos multiocupação das micelas. Além disto, muitos métodos para a determinação de constantes de equilíbrio para a incorporação de um substrato à fase micelar,¹ dependem de dados obtidos numa faixa de concentração onde multiocupação é bastante provável. A ausência de efeitos óbvios de multiocupação sobre estas medidas é facilmente compreendida uma vez a formulação das Eqs. 39 e 101 implica numa ocorrência mais ampla de uma distribuição do tipo Poisson para substratos solúveis em água.

VI. CODA: PERSPECTIVAS

Nesta Tese tentamos mostrar que o estudo de foto-fenômenos em soluções micelares pode fornecer informações - interessantes e valiosas a respeito das propriedades de soluções micelares.

Os estudos aqui descritos não representam, de modo algum, um assunto consumado, mas sim os nossos primeiros passos, às vezes falsos, como neófitos num campo de grandes horizontes. Entre os estudos planejados ou já em andamento baseados neste trabalho, podemos citar alguns:

- 1) Aplicação de PBTA ao estudo de outros detergentes derivados de piridínio;
- 2) Medidas de α de detergentes derivados de piridínio;
- 3) Medidas do raio de exclusão e de "força iônica" empregando-se reações no estado fundamental;
- 4) Estudos mais detalhados dos fatores que influenciam a partição de substratos;
- 5) Obtenção de dados mais preciosos a respeito das contribuições hidrofóbicas e eletrostáticas para o processo de micelização;
- 6) Análise de fotoreações em soluções micelares;
- 7) Desenvolvimento de emissores negativamente carregados que irão permitir a aplicação deste conceitos ao estudo de soluções de detergentes negativamente carregados;
- 8) Reações químicas catalizadas por detergentes de

rivados de ionôforos;

- 9) Separação e identificação dos fatores responsáveis pela catálise micelar de reações orgânica.

VII. 1 RESUMO

Resultados de estudos sobre a supressão de estados eletrônicos excitados em soluções micelares, são apresentados. Estes estudos estão relacionados não só com o papel de espécies iônicas na fase aquosa intermicelar, como também com o comportamento da concentração de monômero livre acima da CMC do detergente e, com os fatores que influenciam a partição e a distribuição de substratos na fase micelar.

No caso de reações entre espécies iônicas da mesma carga, e que têm acesso à fase micelar, conclui-se que o efeito de micelas de igual carga sobre a velocidade da reação, pode ser interpretado em termos de ionização do detergente monomérico e da micela. Quando estas espécies são excluídas da fase micelar, observa-se que esta pode ter uma grande influência sobre a velocidade de reação. Além do mais, propõe-se experiências através das quais torna-se possível a determinação do grau de ionização de micelas de detergentes piridínicos, na ausência de sais.

Resultados concernentes à supressão da fluorescência de brometo de 4(1-pireno)butil trimetil amônio (PBTA) por cloreto de N-hexadecil piridínio (HPCI) e da emissão de cloreto de tris (2,2' bipyridina) de rutênio (II), $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$, por brometo de N-dodecil-p-cianopiridínio (C_{12}CP), são analisados em termos do modelo de separação de fases carregadas para micelização. Quando a supressão pela micela é levada em consideração, observa-se uma concordância quantitativa entre teoria e experiência no caso de HPCI e semi-quantitativa ou quantitativa, dependendo da concentração de KBr, para C_{12}CP .

Resultados relativos à supressão de $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ por 1,3-dinitrobenzeno (DNB) em solução micelar de brometo de cetil trimetil amônio (CTAB), aqui apresentados, demonstram que as moléculas de DNB obedecem a uma distribuição de Poisson, entre as micelas de CTAB. Conclusão idêntica é verificada para a série C_{12}CP , brometo de N-decil-p-cianopiridínio (C_{10}CP) e brometo de N-octil-p-cianopiridínio (C_8CP), a partir dos respectivos dados de supressão. Para estes últimos (C_{12}CP , C_{10}CP e C_8CP) determinou-se os seus coeficientes de partição e a grandeza das variações de energia livre des-

-119-

tes processos de incorporação de substratos (semelhantes aos detergentes) à fase micelar.

VII. 2 ABSTRACT

The results of studies of the quenching of electronically excited states in micellar solutions are described. These studies bear on the role of ionic species in the intermicellar aqueous phase, the behavior of the free monomer concentration above the CMC of the detergent, and the factors which influence the partitioning and distribution of substrates in the micellar phase.

In the case of reactions between like-charged ionic species which have access to the micellar phase, it is concluded that the effect of micelles of the same net charge on the rate of the reaction can be interpreted in terms of ionization of the free monomer and the micelle. When these reactive species are excluded from the micellar phase, effects of such exclusion on the reaction rate can be significant. In addition, experiments are proposed which should permit the determination of the degree of ionization of micelles of pyridinium-derived detergents in the absence of added salt.

Results for the quenching of the fluorescence of 4(1-pyrene)butyl trimethyl ammonium bromide (PBTA) by N-hexadecyl pyridinium chloride (HPCI) and of the emission of tris (2,2' bipyridine) ruthenium (II) chloride ($\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$) by N-dodecyl-p-cyano pyridinium bromide (C_{12}CP) are analyzed in terms of the charged-phase-separation model for micelization. When quenching by the micelle is taken into account, the agreement between theory and experiment is quantitative in the case of HPCI and ranges from quantitative to semi-quantitative, depending on the concentration of added KBr, in the case of C_{12}CP .

Data for the quenching of the emission of $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ by 1,3-dinitrobenzene (DNB) in micellar solutions of cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) demonstrate that the distribution of DNB between the CTAB micelles obeys Poisson statistics. A similar conclusion is derived from quenching data for the series C_{12}CP , N-decyl-p-cyano pyridinium bromide (C_{10}CP), and N-octyl-p-cyano pyridinium bromide (C_8CP). The results for these latter compounds permit

determination of their respective partitioning coefficients and preliminary estimates of the magnitude of the free energy changes involved in the incorporation of detergent-like substrates in the micellar phase.

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) J.H. Fendler e E.J. Fendler, "Catalysis in Micellar and Macromolecular Systems", Academic Press, New York, N.Y., 1975.
- 2) L.R. Fisher e D.G. Oakenfull, Chem. Soc. Rev., 6, 25 (1977).
- 3) P.H. Elworthy, A.T. Florence e C.B. Macfarlane, "Solubilization by Surface Active Agents," Chapman and Hall, London, 1968.
- 4) D. Stigter, J. Phys. Chem., 68, 3603 (1964); 78, 2480 (1974); 79, 1008, 1015 (1975); J. Coll. Int. Sci., 23, 379 (1967); 47, 473 (1974).
- 5) E.A.G. Aniansson, S.N. Wall, M. Almgren, H. Hoffmann, I. Kielmann, W. Ulbricht, R. Zana, J. Lang e C. Tondre, J. Phys. Chem., 80, 905 (1976).
- 6) a) C. Tanford, "The Hydrophobic Effect: Formation of Micelles and Biological Membranes," J. Wiley, New York, N.Y., 1973;
b) C. Tanford, J. Phys. Chem., 78, 2469 (1974);
c) C. Tanford, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 71, 1811 (1974).
- 7) J.N. Israelachvili, D.J. Mitchell e B.W. Ninham, J. Chem. Soc. Faraday II, 72, 1525 (1976).
- 8) D.G. Hall, Trans. Faraday Soc., 66, 1351, 1359 (1970); J. Chem. Soc. Faraday II, 68, 668, 1439 (1972).
- 9) M.F. Emerson e A. Holtzer, J. Phys. Chem., 69, 3718 (1965); 71, 1898 (1967).
- 10) T. Kunitake e Y. Okahata, J. Amer. Chem. Soc., 99, 3860 (1977).
- 11) Para uma revisão da literatura até 1974, vide cap. 8 da ref. 1.
- 12) J.K. Thomas, Accounts Chem. Res., 10, 133 (1977).
- 13) H.A. Davis, J. Amer. Chem. Soc., 94, 5089 (1972).
- 14) L.K. Patterson e E. Vieil, J. Phys. Chem., 77, 1191 (1973).

- 15) M. Shinitzky, A.C. Dianoux, C. Gitler e G. Weber, Biochemistry, 10, 2106 (1971).
- 16) S.J. Rehfeld, J. Phys. Chem., 74, 117 (1970); J. Coll. Int. Sci., 34, 518 (1970).
- 17) M. Almgren, Photochem. Photobiol. 15, 297 (1972).
- 18) N.E. Schore e N.J. Turro, J. Amer. Chem. Soc., 96, 306 (1974).
- 19) R.C. Dorrance e T.F. Hunter, J. Chem. Soc. Faraday I, 68, 1312 (1972); 70, 1572 (1974).
- 20) M. Hauser e U. Klein, Z. Phys. Chem., 78, 32 (1972).
- 21) U. Khuanga, B.K. Selinger e R. McDonald, Aust. J. Chem., 29, 1 (1976).
- 22) R.R. Hautala, N.E. Schore e N.J. Turro, J. Amer. Chem. Soc., 95, 5508 (1973).
- 23) F.H. Quina e V.G. Toscano, J. Phys. Chem., 81, no prelo (1977).
- 24) J.N. Demas e J.W. Addington, J. Amer. Chem. Soc., 98, 5800 (1976).

Este artigo também discute a aplicação da Eq. 69 à análise dos efeitos de sais sobre K_{sv} para a supressão da emissão de $Ru(bipy)_3^{2+}$, por ions negativos.
- 25) M. Tachiya, Chem. Phys. Letters, 33, 289 (1975).
- 26) C.R. Bock, Tese de Doutorado, Univ. de Carolina do Norte, Chapel Hill, NC, USA, 1974.
- 27) J.K. Landquist, J. Chem. Soc. Perkin I, 454 (1976).
- 28) G.A. Davis, J. Chem. Soc. Chem. Comm., 728 (1973).
- 29) H.B. Klevens, J. Amer. Oil Chem. Soc., 30, 74 (1953).
- 30) R. Bensasson, C. Salet e V. Balzani, J. Amer. Chem. Soc., 98, 3722 (1976) e referências citadas ali.
- 31) C.R. Bock, T.J. Meyer e D.G. Whitten, J. Amer. Chem. Soc., 97, 2909 (1975).
- 32) T.J. Meyer, comunicação pessoal (Julho, 1977).
- 33) E.M. Kosower e J.W. Patton, Tetrahedron, 22, 2081 (1966).

- 34) a) M.J. Politi, M.L. Cardoso de Almeida, I.M. Cuccovia, F.H. Quina e H. Chaimovich, 69 Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica, Caxambu, MG, 1977, Resumo 85;
- b) M. Politi, I.M. Cuccovia, H. Chaimovich, M.L.C. de Almeida, J.B.S. Bonilha e F.H. Quina, a ser submetido.
- 35) V. Balzani, L. Moggi, M.F. Manfrin, F. Bolletta e G.S. Laurence, Coord. Chem. Rev., 15, 321 (1975).
- 36) E.J. Bair e C.A. Kraus, J. Amer. Chem. Soc., 73, 1129 (1951).
- 37) "Handbook of Chemistry and Physics", 44.^a Ed., Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio, 837 (1963).
- 38) B. Permuter-Hayman, Prog. Reaction Kinetics, 6, 239 (1972).
- 39) A.L. Loeb, J. Th. G. Overbeek e P.H. Wiersema, "The Electrical Double Layer Around a Spherical Colloid Particle," The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1961.
- 40) A.R. Olson e T.R. Simpson, J. Chem. Phys., 17, 348, 1167, 1322 (1949).
- 41) L. Romsted, Tese de Doutorado, Univ. de Indiana, Bloomington, Ind., 1975.
- 42) B.W. Barry e G.F.J. Russell, J. Coll Int. Sci., 40, 174 (1972).
- 43) P. Debye, J. Coll. Sci., 3, 4079 (1948).
- 44) A.W. Ralston, D.N. Eggenberger e F.K. Broome, J. Amer. Chem. Soc., 71, 2145 (1949).
- 45) S.P. Wasik e W.D. Hubbard, J. Res. Nat. Bur. Stand., Sec. A, 68, 359 (1964).
- 46) M. Politi e J.B.S. Bonilha, resultados não publicados.
- 47) J.R. Cho e H. Morawetz, J. Amer. Chem. Soc., 94, 375 (1972).
- 48) J.W. Larsen e L.J. Magid, J. Amer. Chem. Soc., 96, 5774 (1974).
- 49) W. Philippoff, Disc. Faraday Soc., 11, 96 (1951).
- 50) W.P.J. Ford, R.H. Ottewill e H.C. Parreira, J. Coll. Int. Sci., 21, 522 (1966).

- 51) A.H. Alwattar, M.D. Lumb e J.B. Birks em "Organic Molecular Photophysics," J.B. Birks, Ed., J. Wiley e Sons, London, 1973, pag. 403.
- 52) T. Sasaki, M. Hattori, J. Sasaki e K. Nukina, Bull. Chem. Soc. Japan, 48, 1397 (1975).
- 53) B.J. Birch e D.E. Clarke, Anal. Chim. Acta, 61, 159 (1972).