ERRATA

FRANCESCHINI, M.H.D. **Sensoriamento remoto hiperespectral nos níveis laboratório, campo e aéreo como ferramentas auxiliares no manejo do solo**. Piracicaba, 2013. 172 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
24	31	nos meados da década de 80	no início da década de 1990
24	33	agricu ltura	agricultura
38	27	*Datum* SAD-69	*Datum* WGS84
42	9	empregoua metodologia descrita porEmbrapa (1997)	empregou a metodologia descrita por Embrapa (1997)
45	18	digramas	diagramas
58	19	equações 9 e 10	equações 20 e 21
64	24	do pontos	dos pontos
72	13 e 14	o mesmo padrão	padrão semelhante ao
72	16 a 20	De maneira que, os autovetores com coeficientes semelhantes na região do visível e na região após 2200 nm (Figura 10 – c, d), sendo estes ao mesmo tempo opostos aos observados para a região entre 1000 e 2000 nm (para os dados em reflectância), são os autovetores das CPs que melhor segregaram amostras das mesmas parcelas (Figura 11).	De maneira que, os autovetores com coeficientes elevados na região próxima ao visível (até cerca de 800 nm), em contraste com o albedo da curva a partir de 1000 nm (Figura 10 – c, d), no caso dos dados em reflectância, são relativos às CPs que melhor segregaram amostras de parcelas distintas (Figura 11).
72	22	*Item inserido*	Com relação aos dados após a remoção do contínuo, as correlações entre autovalores e os atributos foram maiores (Tabela 3.2) para as CPs com maior importância dada a região do visível até cerca de 1000 nm (Figura 10), sendo que estas também segregaram melhor amostras de parcelas distintas (Figura 11).
74	4	absorção na região próxima a	reflexão na região acima de
104	24 e 26	*Datum* SAD-69	*Datum* WGS84
106	32	60%	65%
108	11 e 12	montada numa barra de ferramentas, sendo puxado por trator	acoplada numa barra de ferramentas, sendo montado em engate de 3 pontos e puxado por trator
108	16	(VNIR-SWIR)	(Vis-NIR-SWIR)
123	24	da altura	da profundidade de trabalho
129	16	obtidos em laboratório	obtidos em laboratório, para as amostras das parcelas de textura média
129	17	ralação	relação