

ERRATA

FEREZ, A.P.C. **Efeito de práticas silviculturais sobre as taxas iniciais de seqüestro de carbono em plantios de restauração da Mata Atlântica.** Piracicaba, 2010. 104p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
9	9	<i>Brachiaria</i>	<i>Urochloa</i>
11	8	<i>Brachiaria</i>	<i>Urochloa</i>
17	4	<i>Brachiaria</i>	<i>Urochloa</i>
37	16	<i>Brachiaria</i>	<i>Urochloa</i>
40	2, 13	<i>Brachiaria</i>	<i>Urochloa</i>
40	11	12 e 24 meses	12, 24 e 36 meses
93	3	<i>Brachiaria</i>	<i>Urochloa</i>

Página 66

$$\ln(\text{BLA}) = 6,03857 + 0,94494 * \ln(\text{AS}) + 0,96147 * \ln(\text{H}) + 1,02221 * \ln(\text{DB})$$

Página 83

Tabela 9 – Área Basal e biomassa estimada por parcela, da parte aérea (BPA) para as classes de árvores, acima de 10cm de diâmetro e entre 5 a 10cm e suas respectivas biomassas de raízes (BRA)

Parcela	AB (m ² ha ⁻¹)	Árvores com DAP de 5 a 10cm		Árvores com DAP >10cm	
		BPA	BRA	BPA	BRA
		-----Mg ha ⁻¹ -----			
1	56,5	18,1	4,9	303,5	67,0
2	75,0	7,6	2,2	368,2	80,2
3	49,8	16,5	4,5	198,8	45,3
4	54,9	21,9	5,9	260,4	58,2
5	53,7	9,0	2,6	256,4	57,3
6	54,1	13,6	3,8	318,0	70,0
7	54,4	17,8	4,9	228,3	51,5
8	52,8	11,4	3,2	185,6	42,5
9	43,6	21,7	5,8	187,1	42,8
10	59,9	12,5	3,5	317,3	69,9
Média e Desvio	55,5 ± 8,1	15,0 ± 5,0	4,1 ± 1,3	262,4 ± 63,1	58,5 ± 13,0